




L9F3

M95

115318

FALCONER'S
MANUAL OF MIDWIFERY

FOR
MIDWIVES AND STUDENTS.

TRANSLATED FROM THE ENGLISH INTO TAMIL

BY

R. JAGANAICKULU RAZU,

1ST CLASS HOSPITAL ASSISTANT,

*In subordinate charge of the Egmore Female Dispensary
and Teacher for the Native Pupil Midwives of the Government
Lying-in-Hospital, Madras.*

WITH ILLUSTRATIONS.

FIRST EDITION.

MADRAS:

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS

1890



A MANUAL OF MIDWIFERY FOR MIDWIVES AND STUDENTS.

மருத்துவ மாணாக்கியர்களுக்கும் மாணாக்கர்
களுக்கும் உபயோகமான
ஓர் கைப்புத்தகம்.

மருத்துவ மாணாக்கியர்களுக்கும்
சென்னை-வைத்திய வித்தியாசாலையின்
கீழ்வகுப்பு மாணாக்கர்களுக்கும்

உபயோகமான

கைப்புத்தகம்.

1974

17
1-96

இந்தப் புத்தகம்

மட்ராஸ் ஆர்மியில் அசிஸ்டென்ட் அபாத்திகெரியும்,
கவான்மென்ட் பிரசவ வைத்தியசாலையின் தலைமை
அபாத்திகெரியுமாகிய

எஸ். ஈ. பால்கனெர்

என்பவரால் திருஷ்டாந்தப்படங்களுடன் எழுதப்பட்டு,
எக்மோர் - டீமேல் - டிஸ்பென்சரி நிர்வகிப்பவரும், கவான்
மென்ட் பிரசவ வைத்தியசாலையில் மருத்துவத்தொழில்
பயிலும் சுதேச ஸ்திரீகளுக்கு
உபாத்தியாயருமாகிய
1 - வது கிளாஸ் ஹாஸ்பிற்றல் அசிஸ்டென்ட்

ஆர். ஜெகந்நாயகுலராஜ்

அவர்களால்

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

முதலாம் பதிப்பு 23 JAN. 96
OFFICE OF THE REGISTRAR OF BOOKS, MADRAS.

சென்னப்பட்டினம்:

கவான்மென்ட் பிரெஸ் சூப்பரிண்டென்டென்ட் அவர்களால்
அச்சியற்றப்பட்டது.

கச்சிட்டு.

PREFACE.

THIS translation has been undertaken at the request of the Madras Branch of the Countess of Dufferin's Fund, the Government of Madras having been good enough to make a special grant for the purpose, and to allow the book to be brought out at the Government Press. It is believed that the work will prove of value to a large number of native midwifery pupils, training in various hospitals throughout the Presidency, who are unable to read the English work; and it will also serve as a useful text-book and book of reference to the same women after they have passed as midwives and are in the practice of their profession.

A. M. BRANFOOT, M.B.,
Surgeon Lt.-Colonel,
Supdt., Govt. Lying-in-Hospital

MADRAS,
31st January 1893.

74
18. 9.

மு.க.வு.நா.

கவுண்டெல் - ஆப் - டிப்ரீன் ப்ரீன்ட் மட்ரூஸ் (Branch) பிரான்ச்சாரின் வேண்டுகோளின் பேரில் இந்த நூல் மொழிபெயர்க்கவாயிற்று. மட்ரூஸ் கவர்ன்மென்டார் பூரணவன்புடன் இதற்கென்று ஓர் நன்கொடை கொடுத்ததோடு இதை "கவர்ன்மென்ட் அச்சுக்கூட"த் தில் அச்சியற்றவும் இடங்கொடுத்தார்கள். இந்தப் புத்தகமானது, இராஜதாவி ஒட்டெக்குமுள்ள பல வைத்தியசாலைகளில் கல்விபயிலும் - இங்கிலிஷ்புத்தகம்வாசிக்க சக்தியில்லாத - அநேக சுகேச மருத்துவ மாணாக்கியர்களுக்கு அதிக உபயோகமானதாயிருக்குமென்று நம்புகிறேன். மேலும் இது அம்மாதர்களுக்கு பிரயோஜனமான ஓர் பாடப்புத்தகமாகவும், அவர்கள் பரிட்சைகொடுத்து உத்தியோகத்திலிருக்கையில் சந்தேகத்தெளிய ஒத்துப்பார்க்கும் ஓர் புத்தகமாகவும் இருக்கும்.

எ. எம். பிரான்பூட் - எம்.பி.,
சர்ஜன் லெப்டினென்ட் கர்னல்,
சூப்பரின்டென்டென்ட் கவர்ன்மென்ட்
லயிங் - இன் - ஆஸ்பிற்றல்.

சென்னைப்பட்டினம்,
1893 ஜனவரி 31.

மூன்றும்பதிப்பிற்கு முகவுரை.

“மானுயல் பர் பிபுபில் மிட் வயிவ்ஸ்” (Manual for Pupil Midwives) என்னும் மருத்துவநூலின் அச்சுப்பிரதி செலவாய்விட்டபடியால் நான் கேட்டுக்கொண்டபடி (கவான்மென்ட்) பிரச்சவ வைத்தியசாலையின் தலைமை அபாத்திகெரிமென்ட். எஸ். ஈ. பால்கென்ர் அதைத் திருத்தியுதிக்கலாயினர். இந்தப் புத்தகம் மருத்துவச்சிகளாகவேண்டுமென்று ஆஸ்பிற்றவர்களுவந்து, கற்றுக்கொள்ளும் மாதர்களின் உபயோகத்திற்காக முக்கியமாய் எழுதப்பட்டது. ஆனால், வைத்திய வித்தியாசாலையில் கல்விக்கும் ஜூனியர் டிபார்ட்மென்ட் மாணுக்கர் பெரியபுத்தகத்தைப் பயன்பட அப்பியசிக்க அசகத்தர்களாய் இருக்கிறபடியால், இது அவர்களுக்கும் உசிதமானதே.

இந்தப்புத்தகம் ஸ்திரீகளின் ஜனன உதாப்புகளின் தத்துவம், பூததர்மகுணசாஸ்திரம், இவைகளைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்வதுடன், கர்ப்பக்குறிகள், பிரசவகுத்திரம் முதலியவற்றையும் போதுமான விவரத்துடன் சொல்லுகின்றது. இன்னும் சாதாரண - கஷ்ட - பிரசவங்கள், அவைகளை நிர்வகிக்கும்படியான விதங்கள், பிரசவசௌகரியை, சிசுக்களைப்பரிபாவிக்கும் முறைகள், இவைகளைப்பற்றியும் பூர்த்தியாய் சொல்லுகின்றது.

கஷ்டமானதும், அபாயகரமானதுமான பிரசவங்களில் சிவச்சைசெய்ய மருத்துவச்சிகள் சக்தியில்லாதவராதலின், அந்த விஷயங்கள் அவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படுகிறதில்லை; ஆகையால் பிணியோடுகலந்த பிரசவத்தின் விவரம் சாதாரணமாய் சுருக்கமாகவும், அபூர்த்தியாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் ஏற்றசமயத்தில் வயித்திய உதவியாக வரவழைத்துக்கொடுவது

வண்டிய ஆவசியகம் தெரியும்படியாக அபாயக்குறி என்ன போதுமானவரையில் விவரித்துக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

இதன் கையெழுத்துப் பிரதியைப் பார்வையிடுதல் பொருட்டு என்னிடம்கொடுக்கப்பட்டபடியால், பிரசவ வைத்தியசாலையின் அப்பியாசங்களுக்கு இந்தப்புத்தகம் புதுகூவிக்கும்படி எனக்கு உசிதமாய்த தோன்றிய சில வகைகளையும் இதில் நான் குறித்துச் சொல்லியிருக்கிறேன்.

உ. எ. ஹாரிஸ், எம்.டி.,

சென்னப்பட்டனம்,

சூப்பரின் டென் டென்ட்,

377/ஸ்ரீ மேன் 1வ.

பிரசவ ஆஸ்பிற்றவ்.

நான்காம் பதிப்பிற்கு முகவுரை.

இந்த மருத்துவக்கைப்புத்தகத்தின் நான்காம் பதிப்புக்கு எத்தனாம் சென்றவருளும் துவக்கப்பட்டாலும், அச்சுக்கூடத்தின் எதிர்ப்பாராத தடைகளால், இந்தப் பதிப்பு வெளியாக அதிக தாமதமாயிற்று.

இந்தப் பதிப்பில் சற்றேறக்குறைய புத்தக முழுமையும் திருத்தி எழுதப்பட்டு, அநேகசங்கதிகளும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதலாவதாக திருஷ்டாந்தப் படங்களும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிணியோடுகலந்த பிரசவத்தின் சிசிச்சை அதிகவிவரமாய் எழுதியிருக்கிறது. பிரசவசம்பந்தமான வியாதிகளைப்பற்றியும் சில அதிகாரங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இப்போது இருக்கிற பிரகாரமாக இந்தப் புத்தகம் மருத்துவச்சிகளுக்குத்தேவையான அளவிற்கு அதிகமாகவும் வளர்ந்துவிட்டபடியால், இதுவைத்திய வித்தியாசாலையில் கல்விகற்கும் ஜூனியர் டிபார்ட்மென்ட் மாணுக்கர்களுக்கு ஓர் பூர்த்தியான பாடப்புத்தகமாகவும், முனிசிப்பல் - லோக்கல் பண்டு போர்ட் - ஆஸ்பிற்றல்களின் புத்தகசாலையில் ஓர் நல்ல உபயோக கிரந்தமாகவும் இருக்குமென்று நம்புகிறேன்.

எ. எம். பிரான்ஸ்ட், எம்.பி.,

குப்பரினென்டென்ட்,

பிரசவ ஆஸ்பிற்றல்

சென்னப்பட்டனம், }
1883 ஜூலை 17வ. }

1-ம் அதிகாரம்.

பக்கம்

பகி தத்துவம்—பிரசவ சம்பந்தமாய் கூபகத்தின் தன்மையைக் கண்டறியவேண்டும்—கூபக துருவங்கள் ... 1

2-ம் அதிகாரம்.

பிரசவத்தின் ஜனன உறுப்புகளின் தத்துவம்—சூதகம்—கர்ப்பமாயிருத்தல்—கர்ப்பாசயத்தின் உள்வாய்ப்பக்கப்புகைகள்—கருப்பையின் பீடம்—கர்ப்பாசய பக்கப்புகையின் சாயை—மாயை—நாபிக்கொடி—பிண்ட ஜவங்கள்—பிண்டம் ... 15

3-ம் அதிகாரம்.

கர்ப்பக்குறிகளும், ஜடைகளும்—கர்ப்ப பூரண காலம் ... 32

4-ம் அதிகாரம்.

கர்ப்பகாலரோகங்கள்—கர்ப்பநஷ்டம் அல்லது கருவழிவு—விபரீத கர்ப்பம்—அகால பிரசவம் ... 45

5-ம் அதிகாரம்.

பிரசவருத்திரம்—உச்சி உதயம்—உதயமாகும்பாகம்—சார்பானபாகம்—புலாகுழல்போன்ற கட்டி ... 58

6-ம் அதிகாரம்.

பிரசவவேதனைப் பிரிவுகள்—பிரசவத்திற்கு முன்குறிகள்—பிரசவகால பாதங்கள் ... 70

7-ம் அதிகாரம்.

பிரம அல்லது சாதாரண பிரசவ சிசிச்சை—மருத்துவச்சி நடந்துகொள்ளும்படியான விதம்—யோனிமார்க்கப் பிரிசோதனை—“படுகை”—கர்ப்பாசயக் கழுத்தின் எதிர் உதடு பிதுங்குதல்—மூத்திரப்பையைக் காலியாக

பக்கம்

குதல்—பிரசவகால இரண்டாம்பாதத்தில் அடிக்கடி
ஞ்சையறிகருவினை (ஸ்டெத்தஸ்கோபினை) பிரயோஜி
த்தல்—விடபந்தைத் தாங்குதல்—பிரசவமூன்றாம்பாத
த்தை நடத்துமவகை—செவை கவனிக்கும்வகை ... 80
(இதனுடன் 23-ம் அதிகாரத்தை வாசிக்கவும்).

8-ம் அதிகாரம்.

பிரசவத்திற்குப்பின்பு பராமரிக்கும் வகை—பிரசவித்த
பிறகு பிள்ளைத்தாய்ச்சி இருக்கவேண்டியநிலை—இடுபு
புக்கட்டு—பத்திய ஆகாரம்—அழுக்கு பதெல்—பிரசவ
த்திற்குபின்காணும் வயிற்றுநோய்—மூத்திரக் கட்டு—
நாடி நடை—பால்கொடுத்தல்—பால் கட்டுஜாரம்—ஸ்த
னக்காம்பு இரணமாகுதல்—சுத்தியைப்பற்றிய கவனி
ப்பு ... 100

9-ம் அதிகாரம்.

செவைப் பாராட்டும்வகை—குளிப்பு—புட்டுதல்—உடுத்தல்
—தித்தினை—போஷிப்பு—மல ஜலாசிகள்—பேதி மரு
ந்து—மலம்—பேதி—வாந்தி—வாய் இரணம்—கண்
னோய்—மஞ்சட் காமாலை—வலி—பூ வுண்ணாதிருத்
தல்—பருவத்திற்குமுந்தி பிறக்கும் செவைக் காப்பாற்
றுமவகை ... 114

10-ம் அதிகாரம்.

சிரமஜீன சிரோதயம்—முக உதயம்—நெற்றி உதயம் ... 124

11-ம் அதிகாரம்.

கஷ்டபிரசவம்—தாமஸ பிரசவம்—பட்டுக்குமிஞ்சின பு
ணரிநீர்—கர்ப்பாசயம் எதிரில் மடிதல்—ஜவ்வுகளின்
அசாதாரண காடினயம்—பருவத்திற்குமுந்தி பணிக்கு
டம் உடைதல்—எதிர்த் திபுங்கல்—ருத்த ஜன்னி—
ஜன்ன மார்க்ககாடினயம் ... 131

12-ம் அதிகாரம்.

கடனபிரசவம் (தொடர்ச்சி)—பிரயாச பிரசவம்—பிள்
ளையையும், தாயையும்பற்றிய காரணங்கள்—கூபகத்
தில் கட்டிகள்—இரத்த நரம்பில் உதிரக்கட்டி—தலை
உள்தங்குதல்—தலைநெருக்குண்ணுதல் ... 140

13-ம் அதிகாரம்.

பக்கம்

சிரமாதிபிரசவம்—கவிழ்ந்த பிரசவம்—புட்ட உதயம்—
கஷ்டமான புட்ட உதயம் ... 144

14-ம் அதிகாரம்.

சிரமாதிபிரசவம் (தொடர்ச்சி)—குறுக்குப் பிரசவம்—
தனக்குத்தானாய் திரும்புதல்—தானாய் நிலைமாறுதல்—
சிக்கான பிரசவம் ... 155

15-ம் அதிகாரம்.

அபாய பிரசவம்—இரட்டைப்பிள்ளைகள்—மூன்றுபிள்ளை
கள்—உதிரப் பிரவாகம்—மாயை முன் நோக்கிவருதல்
—தம்செயலான உதிரப்பிரவாகம் ... 164

16-ம் அதிகாரம்.

அபாய பிரசவம் (தொடர்ச்சி)—உதிரப்பிரவாகம் (தொ
டர்ச்சி)—கர்ப்பாசய ஒழுங்கினை நக்கம்—அனோக்சி
ய ஹேதுவாய் மாயை ஒட்டியிருத்தல்—கர்ப்பாசய
உட்புறம் வெளிப்புறமாகுதல் ... 180

17-ம் அதிகாரம்.

அபாய பிரசவம்—பிரசவித்தபிறகு உண்டாகும் உதிரப்
பிரவாகம் (தொடர்ச்சி)—கர்ப்பாசய உதிரப்போக்கை
தடுக்கும்படியான இயற்கையான வகைகள்—அயத்தி
ராவகத்தை உள்ளுக்குச்செலுத்துதல்—இரண்டாவதா
ன உதிரப்பிரவாகம் ... 190

18-ம் அதிகாரம்.

அபாய பிரசவம் (தொடர்ச்சி)—கர்ப்பாசயமும் யோனி
யும் கிழிபடுதல்—பிரசவவலிப்பு அல்லது ஜன்னி—
நாபிக்கொடி சரிதல் ... 198

19-ம் அதிகாரம்.

பிள்ளையைத் திருப்புதல்—தலையைத் திருப்புதல்—காலைத்
திருப்புதல்—உபயபாதாக்கிரங்களைப்பிடித்துத் திருப்பு
தல்—அகின் மூன்றுநிலைகள்—நோயாளியின் நிலை—மு
துகுபக்கம் கைச்சிக்குண்ணல் ... 204

20-ம் அதிகாரம்.

பக்கம்

நீண்டகுறடுகள்—கிரமப் பிரசவம்—கஷ்டப் பிரசவம்—
பிரசவத்தின் மூன்றுபாதங்கள்—உசிதமான குறடுகள்—
நீண்ட குறட்டின் பிரயோகம்—அவருகளை செலுத்-
தும் வகை—பூட்டுதல்—கழற்றல்—அலகை எடுத்துவி-
டும் வகை—கழற்றுவதற்கு வேண்டிய காலம்—அநா-
ங்க சிகிச்சை—ஊர்த்வாங்க சிகிச்சை—முக உதயம்—
பின்வரும் தலைக்கு குறட்டை உபயோகப் படுத்தும் வகை—
இவ்விதச்சேதனத்தில் உண்டாகக்கூடிய அபாயங்கள். 217

21-ம் அதிகாரம்.

பிரசவத்தில் பிரக்ஷிணையற்றுக்கிடக்கை—குளோமஸ் ஹை-
ட்ரஸ்—குளோமடபாறம் ... 238

22-ம் அதிகாரம்.

பிரசவ இரம்—ஸ்வகதம், விசதம் என இருவகை—சார-
ணங்கள்—குறிகள்—சிகிச்சை—வெள்ளைக் கால், அல்ல-
து பிரசவ அடைப்பு—குறிகள்—போக்கு—சிகிச்சை... 241

23-ம் அதிகாரம்.

பிரசவத்தில் கர்ப்பினியின் சரீர (விஸ்வாசணி) மாபிச-
அழுகல் அகற்றி. (இதனுடன் 7-ம் அதிகாரத்தைச்
சேர்த்து வாசிக்கவும்) ... 249

அரும்பத அகராதி ... 255

படங்களின் அட்டவணை.

படம்	பக்கம்
1. கூபகம்	2
2. கர்ப்பாசய முதலியவற்றின் நிலை	20
3. கர்ப்பாசய உள்பாகம்	22
4. கருக்கவசஜீவ்வு உண்டாகும் விதம்	25
5. சிசுவின் தலையானது முதல்திலையில் இருக்கும் வ- கை	60
6. முதல்திலையில் தலையின்தோற்றத்தையும், வெளிப்- படுத்தும் விதத்தையும் காட்டுதல்	62
7. முதல்திலையில் தலை திரும்பச்சுழலல்	63
8. சிசுவின் தலையானது, மூன்றாம் நிலையில் கூபகவி- ளிப்பில் இருக்கும் வகை	66
9. பிடரி பின்னாநிலையில் தலையை வெளிப்படுத்தும் விதம்	67
10. பிரசவசமயத்தில் உள்ளப்பிரகாரம் கர்ப்பாசய வாய் திறப்பட்டு, யோனி விரிவாயிருக்கும் வகை.	78
11. புஜ உதயத்தின் முதல்திலை	158
12. புஜ உதயத்தின் மூன்றாம் நிலை	159
13. தானாய் சுழல்கையில் குழந்தையின் உடம்பு வளை- ந்திருப்பதைக் காட்டுவதற்கு	162
14. கர்ப்பாசயத்தை மண்டலாகாரமாக வகுத்துக்கா- ட்டுவது	169
15. உபயபாதம் பிடித்தத் திருப்பதல்—முதல்திலை	208
16. உபயபாதம் பிடித்துத் திருப்பதல்—முதல் கிரியை யின் இரண்டாம் நிலை	210
17. உபயபாதம் பிடித்துத் திருப்பதல்—இரண்டாம் கிரி- யை	211
18. உபயபாதம் பிடித்துத் திருப்புகையில் உண்டாகும் மூன்றாம் கிரியை	215

படம்	பக்கம்
19. உபயபாதம்பிடித்துத் திருப்புதல்—மூன்றாம் கிரையின் முடிவு	213
20. நீண்ட குறட்டின் முதல் அலகை உட்செலுத்தல்—முதல் கிரைய	221
21. நீண்ட குறட்டின் அலகை உட்செலுத்துவதற்குரிய மூன்று கிரையகளும்	222
22. நீண்ட குறட்டின் வலது அல்லது இரண்டாம் அலகை உட்செலுத்தல்	224
23. நீண்ட குறடுபூட்டி இரண்டுகைகளினாலும் கெட்டியாய்ப்பிடித்திருப்பதைக் காட்டுகிறது	226
24. நீண்ட குறட்டால் இழுக்கும்படியான கடைசித்லையைக் குறிக்கிறது	229

ERRATA.

சுத்தபத்திரிகை.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
1	1	மாணக்கர்களுக்கும் ...	மாணக்கியர்களுக்கும்.
14	8	தாய்க்கும் ...	தாய்க்கும்.
16	11	கிடக்கப்படுகின்றன ...	கிடக்கின்றன.
18	21	கால் ...	வாய்க்கால்.
33	29	ள்ளலாம் ...	கொள்ளலாம்.
34	15	ஆண்டிடும் ...	ஆண்டாகும்.
34	26	ஸ்தனங்கள் ...	ஸ்தனங்கள்.
34	30	குற்றுதல் ...	குத்துதல்.
39	9	சுயந்துகொடுக்கும் ...	சுந்துகொடா; நெகிழா.
41	31	சொருளை ...	சொதளை.
42	24	புரந்தல் ...	புரந்தல்.
45	26	உபத்திரபமான ...	உபத்திரவமான.
46	25	விருப்பற்றி ...	விருப்பற்று.
47	28	கந்தகத்தித்திப்பா ...	கந்தகலேகமா.
48	21	திரும்பிருந்தும் ...	திரும்பியிருந்தும்.
51	25	துன்னிக்கொண்டி ...	துன்னிக்கொண்டி.
53	21	இசுவிவிசுந்து ...	இசுவிசித்து.
58	2	பிரசவப்பாதை ...	பிரசவப்பாதை.
59	11	பொருத்திற்கு ...	பொருத்திற்கு.
62	1	முன்சாயந்தவும் ...	முன்சாயந்தவுமான.
65	16	பிண்டப்பெருந்தல் ...	பிண்டம்பெருந்தல்.
67	10	முகவாக்கடை ...	முகவாய்க்கடை.
72	16	இது ...	இதில்.
72	20	இவைகளை அடக்கும் ...	இவைகள் அடக்கும்.
72	28	ஜலம்விட ...	ஜலம்விடல்.
73	5	இன்னேரம் ...	இந்நேரம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
73	9	இளங்கு	இறங்கு.
73	27, 29	ஸ்திரிகளா	ஸ்திரீகள்.
74	11	பெருவதை	பெறுவதை.
74	14	இது பிரசவ ஆரம்பத் தையும்.	இதில் பிரவ ஆரம்ப மும்.
74	15	விரிவாகுவதையும் அட க்கும்.	விரிவாகையும் அடங் கும்.
75	4	சுறுக்கு	சுருக்காய்.
75	10	பேதிக்க	பேதிக்கு.
75	18, 20	நேரயவெழும்	நொவெழும்.
76	23	இப்போ	இப்பொழுது.
77	26	குழாய்	குழை.
79	8	குளற	குழற.
79	17	பவுத்திரமாய்	பத்ரமாய்.
83	18	மெதுவாக	மிருதுவாக.
83	28	குழிக்குள்ளா	குழிக்குள்ளே.
84	11	பிள்ளைத்தாய்ச்சி	பிள்ளைத்தாய்ச்சி.
87	15	வருகுதோ	வருகிறதோ.
88	29	விளிம்புக்கூட்டாய்	விளிம்புக்கூட்டாய்.
100	13	பெற்றவளுடைய	பெற்றவளிருக்கும்.
100	20	தொடக்கம்	தொடங்கி.
104	23	கர்ப்பநஷ்டத்தா	கர்ப்பாசயச்சரிவா.
109	9	சொட்டாய்	சொட்டென்று.
111	19	தேங்காய் எண்ணெ	"ஆலிவ்" எண்ணெ.
113	4	மாற்றப்பட	மாற்ற.
113	7	ஒன்றுக்கு நாற்பது	நாற்பதுக்கு ஒரு.
113	9	அறுத்	அறுத்த நகக்குச்சா லஜாக்கிரதையாய்ச் சுத்திசெய்து.
114	18	ஜன்னி	பல்கட்டு ஜன்னி.
116	17	அரை	அரை.
120	14	ஒத்தடம்	ஒற்றிடம்.
121	11	தாகவாவது	தாகவாவது.
123	18	தொட்டியில்	தொட்டிவில்.
126	20	இரக்கம்	இறக்கம்.
126	22	அகன்றி	அகன்றி.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
127	31	இருக்கலும்	இறக்கலும்.
139	1	ஒத்திடம்	ஒற்றிடம்.
167	27	யில்லை	வில்லை.
202	8	சமீபதசையில்	சமீபதசையில்.
222	1	இருவத்ததரன்மும்	இருபத்தொன்றும்.
227	32	அப்பொதை	அப்போதை.
235	30	வெளிக்கி	வெளிக் கு.
239	8	குன்றியமணி	தானியமணி.
245	13	"	"

மருத்துவ மாணுக்கர்களுக்கும்
சென்னை வைத்திய வித்தியாசங்கத்தின்
கீழ்வகுப்பு மாணுக்கர்களுக்கும்

உபயோகமான

கைப்புஸ்தகம்.

1-ம் அதிகாரம்.

கூபகத்தின் நத்துவம்.

ANATOMY OF THE PELVIS.

(அனாட்டமி ஆப் தி பெல்விஸ்.)


முண்டத்திற்கும், கீழ் அங்கங்களுக்கும் மத்தியிலிருக்கப் பட்ட வக்கிராகாரமான எலும்புக்குழிக்கு கூபகம் என்று பெயர். இதைப்பற்றி வாசிப்பது ஆவசியகமானது.

எனெனில், கர்ப்பமில்லா நிலமையில் உற்பத்தி விஷயத்திற்கு சம்பந்தமான எல்லா உறுப்புகளும் இதில் அடங்கியிருக்கின்றனமல்லாமல், இந்த வழியாகவே பிரசவ நேரத்தில் சிகலானது வெளியாகவேண்டியது. ஆகையால் பிரசவ சூத்திரத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு அதின் வாடிவத்தையும், பிரமாணத்தையும் தெரிந்து கொள்வது ஆவசியகமாயிருக்கிறது.

கூபகமானது நான்கு எலும்புகளால் அமைந்திருக்கிறது. இருபக்கங்களிலும் பீடிகை எலும்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பெயரற்ற எலும்புகளாகிய பூசனச்

முதலாம் படம்.

FIG.1.



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. இடுப்பெலும்பு. | 12, 13. சரியந்த குறுக்களவு (வலது). |
| 2. ஆசனவெலும்பு. | 14, 15. ஆசனவெலும்பின் மூட்டுகள். |
| 3. மேகனவெலும்பு. | (a) முன், பின்னான குறுக்களவு. |
| 4. பீடிகை எலும்பு. | (b) குறுக்கான அளவு. |
| 5. புச்சு எலும்பு. | (c) கடை முன் ஈந்தண்டு. |
| 6. மேகனப்பொருத்தி. | |
| 7. சாய்ந்த குறுக்களவு (இடது). | |

சந்தெலும்புகளிருக்கின்றன. பீடிகை எலும்புக்கு கீழ் புச்சு எலும்பு இணைத்திருக்கிறது. அதாவது இந்த எலும்பு பீடிகை எலும்பின் தொடர்ச்சியென்பதே.

ஆசனச் சந்தெலும்பு, Os innominatum (ஆஸ் இன் ஓமினேட்டம்) அல்லது பெயர்ற்ற எலும்பானது குழ

ந்தைப்பருவமுதல் மடந்தைப் பருவம் வரையில் கம்சம் என்று சொல்லப்பட்ட எலும்புக்குழியண்டை குருத் தெலும்பால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற பிரத்தியேகமான மூன்று துண்டுகளடங்கிய ஓர் வக்கிராகார எலும்பா யிருக்கும். இவ் வெலும்புகளாவன:—இடுப்பெலும்பு (இசியம்) ஆசனவெலும்பு (இஸ்கியம்) மேகன வெலும்பு (ப்யூபெஸ்) பருவ மடைந்ததின் இவைகள் எலும்பால் ஒன்றாக சேர்க்கப்படுகின்றன.

இடுப்பெலும்பு, Ilium (இசியம்) இது அகலமாகவும், தட்டையாகவும், முக்கோண வடிவமாகவும், கூபகத்தின்மேலாகவும், வெளிப்புறமாகவும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது முண்டம், செட்டை, பொருட்டுகளென வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முண்டமென்பது கம்சம் அல்லது எலும்புக்குழி உருப்பட ஆதாரமாயிருக்கும் பாகம். செட்டைமென்பது முண்டத்திலிருந்து வெளிப்புறமாகவும் கொஞ்சம் எதிராகவும் இருக்கும் அகலமானபாகம். அதின் வெளிப்புறம், தசை சேர்மானத்திற்காக சொர சொரப்பாக இருக்கிறது. உட்புறம் மழமழப்பாயும், உட்கவந்தவண்ணமாய் இருக்கிறது. பின்னாக கூபகத்தோடு இணைக்கப்பட்டு கூபக ஆசன வெலும்பின் ஓர்மாகிறது. செட்டையின் கீழாக ஒரு வளைந்த ஓரம் கூபக முனையின் பின்மட்டமாகவும் அதின் எதிரில் மேகன வெலும்பின் கார்மையான ஓரத்தில் உள்வட்ட விரிம்பு (இவியோபெக்ட்டிரியல் லயின்) ஆகி, இது போலிக் கூபகத்தையும் (பால்ஸ் பெல்விஸ்) மெய்க்கூபகத்தையும் (ப்ரோபெல்விஸ்) வேறுபடுத்துகிறது. பொருட்டுகள் (ப்ரோசஸ்ஸஸ்) செட்டையின்மேல்ஓரத்தில் ஓடி எதிராக மேற்பொருட்டில் முடிகிற வரம்புகளாம். இந்த பொருட்டின் கீழாக ஒரு புள்ளி இருக்கிறது. இது இந்த பொருட்டையும், எதிராக கீழ் இருக்கிற இன்னொரு பொருட்டையும் பிரிக்கிறது. இவ்வரம்பு பின்புறமாக மேல்பொருட்டின் வரம்பில் முடிகிறது;

இதாவும் அவ்விதமாகவே கீழேயிருக்கப்பட்டபின்புறக் கீழ்ப்பொகுட்டிலிருந்து ஒரு புள்ளியினால் பிரிக்கப்படுகிறது.

ஆசன வெலும்பு, Ischium (இஸ்சியம்) அல்லது உட்காரும் எலும்பானது கூபகத்தின் கீழாகவும், வெளிப்புறமாகவும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முண்டமும், பொகுட்டுகளுமுண்டு. அவ்வெலும்பின் முண்டமாவது கம்சம் ஏறபட ஆதரவாயிருக்கும் பாகமாகப் பொகுட்டுகளை (பிரோசஸ்ஸஸ்) அல்லது முனைகள் பின்னாகவும், உள்ளாகவும், பிதுங்கி சிறிய ஆசன நாகர்களை ஒட்டியிருக்கின்றன. ஆசன வெலும்பின் பொகுட்டுகளுக்கு கூபகத் திறவுகோல் (கீ ஆப் தி பெல்விஸ்) என்று பெயர். ஏனெனில் இந்த இடங்களில்தான் பிரசவ ரூத்திரத்தில் ஏழலுகிற அசைவு ஆரம்பிக்கிறது, அதாவது - கணுவின் பேரில் உட்காரும்போது தேகமானது தங்குகிற இடமும், கொடியானது கணுவிலிருந்து உட்புறமாகவும், எதிராகவும் ஏறி மேகனக் கொடியுடன் சேர்ந்து மேகன வளைவை யுண்டாக்குகிற இடமுமாகும்.

மேகன வெலும்பு, Pubis (ப்யூபிஸ்). இது கூபகத்தின் எதிராக உள்ளது. அது உடலு, பொகுட்டுகள் என வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உடலானது வெளிப்பாகம். அது இப்பெலும்பு, ஆசனவெலும்புகளின் வெளிப்பாகங்களும் சேர்ந்து கம்சம் அல்லது எலும்புக்குழியை உண்டிபண்ணுகிறது. பொகுட்டுகளானவை உடலிலிருந்து எதிராகவும், உள்ளாகவும் போகிற நேரானகொடியாம். அதின் மேல்புறத்தில் இருக்கப்பட்ட ஒரு கூர்மையான ஓரம் கூபக உள்வட்ட விளிம்பின் தொடர்ச்சி. இந்த விளிம்பின் உள்முனையில் இருக்கப்பட்ட முதுகெலும்பு (போப்பாட்ஸ் விக்மெண்டு) என்னும் தசை நாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேகனப்போந்தாவது, Symphysis pubis (சிம்பெலிஸ் ப்யூபிஸ்). எதிரில் நாருகளாலும், இடைக்கி

டையே நாரோடு சேர்ந்த குருத்தெலும்பினாலும் கூட்டப்பட்ட மேகன வெலும்புகளாம். மேகனப் பொருத்தின் கீழிருந்து இறங்கும் கொடியானது ஏறும் ஆசன வெலும்பின் கொடியைச் சேர்ப்பின்புறமாகவும், வெளிப்புறமாகவும் செல்லுகிறது.

பீடிகை, Sacrum (சேக்ரம்) எலும்பானது கூபக எலும்பின் மேலும், பின்புறமாகவும் வைக்கப்பட்டு முதுகெலும்பின் தொடர்ச்சியாயிருப்பதுடன், ஆசனச் சந்தெலும்புகளை ஒன்றாகக் கட்டுகிறது. இது குருத்தெலும்புகளால் ஐந்துபிரிவாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பருவம் வந்தபின் இவைகள் ஒரே எலும்பாக சேர்ந்துவிடுகின்றன. இவ்வெலும்பு முக்கோணவடிவாயும், ஆப்புபோல வுமிருக்கிறது. மேலே இருக்கப்பட்ட இதன் அடிப்புறம், கடைமுள்ளந்தண்டோடு சேர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதின் தலைப்பு கீழாகவும், புச்சு எலும்போடு சேர்க்கப்பட்டும் இருக்கிறது. இதனோடு கீல்முனையைப் போன்றதாகி கூபகத்தின் வழியாய் செல்லும் தலைக்கு பின்புறமாக அசைவுக்கு இடந்தருகிறது. கடைமுள்ளந்தண்டோடு சேரும் இடத்திற்கு பீடிகை மேல்முனை என்னப்படும். இது முக்கியமானதாயிருக்கிறது. ஏனெனில் இது உட்புறத்தில் பிதுங்கி இருப்பதினால் பிரசவத்தில் அநேக வருத்தங்கள் உண்டாகும். இந்த எலும்பின் எதிர்பார்ப்பு உட்கவிந்து பீடிகை எலும்பின் வளைவை உண்டாக்குகிறது. அதின் மேல்பாகி கீழும், பின்புறமாகவும் இருக்கிறது; கீழ்ப்பாகி கொஞ்சம் எதிர்ப்புறமாக திரும்பி இருக்கிறது. அதின்பின் பார்ப்பு புறங்கவிந்து தசைகள் பொருந்தும் பொருட்டு சொரசொரப்பாகவும் ஒழுங்கினமாகவும் இருக்கிறது.

புச்சு எலும்பு, Coccyx (காக்ஸிக்ஸ்) அல்லது வால் எலும்புவெவ்வேறான நான்கு சிறு எலும்புகளால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது முகிர்ந்த பிராயத்தில் ஒன்றாய்க்கூடும். இவைகளில் எல்லாவற்றிற்கும் மேலி

ருக்கும் எலும்பு பீடிகை எலும்போடு சேர்ந்து கீல் முளை பூட்டெலும்பாகிறது.

பிரசவ நேரத்தில், பிரசவிக்கும் அவயவம் அல்லது பாகம்-இதை பின்னால் தள்ளுவதினால் கூபகக்கீழ்வெளியின் முன்பின்வட்ட அகலம் ஒரு அங்குலம் வரையிலும், அதற்கு அதிகமாகவும் கூட விரிவாகும். இந்த புச்சு எலும்பு சில சமயங்களில் எலும்பினால் பீடிகை எலும்போடு சேர்க்கப்படும். அதனால் பிரசவம் தடைப்படுவது முண்டு.

பொருத்துகளும், அஸ்திபித்தனம் அல்லது தசை நாரீகட்டுகள், Articulations and Ligaments (ஆர்ட்டிக்குலேஷன்ஸ் அன்ட் லிகமென்ட்ஸ்). கூபகத்தின் எலும்புகள் அநேக பொருத்துகளினாலும் தசைநாரினாலும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றுள் முக்கியமான பொருத்துகளாவன:—(சேக்ரோ - இனியாக் - சின்காண்ட்ரோசல்) அதாவது பீடிகை எலும்பை இடுப்பெலும்போடு குருத்தெலும்பால் சேர்ப்பது. (லம்போ - சேக்ரல்) பீடிகை எலும்பை கடைமுள்ளந்தண்டெலும்போடு சேர்ப்பது (சேக்ரோ-காக்ஸிஜிடிஸ்) அதாவது பீடிகை எலும்பு புச்சு எலும்போடு சேர்ந்து உண்டாகிற கீல்முளையைப்போன்ற மூட்டு. மேகனப்பொருத்து அதாவது மேகன் எலும்புகளை ஒன்றோடொன்று எதிரில் தசைநாரினாலும் குருத்தெலும்பினாலும் கூட்டுவது. முக்கியமான அஸ்திபந்தனங்கள் அல்லது தசை நாரீகளாவன:—சிறிதும் பெரிதுமான “சேக்ரோசையாட்டிக்” இவைகள் பீடிகை, புச்சு எலும்புகளை ஆசன வெலும்போடு இணைத்து, கூபகத்தின் பின்பொருத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன. இவைகள் கூபகக்கீழின் ஒர்பாகமாகவும் புறவெளியின் அத்தகனாகவும் இருப்பதால் கொஞ்சம் விசேஷமானவை. நான்கு அஸ்திபந்தனங்கள் அல்லது தசைநாரீகள் எதிரில் மேகன எலும்புகளை ஒன்றாக இணைத்து வைத்திருக்கின்றன. அவையாவெனில்:—எதிர் தசைநாரீ பின்

சைநாரீ, மேல்தசைநாரீ, பலத்த கீழ் அல்லது கீழ் மேகன் (சப் ப்யூடிக்) தசைநாரீ. இவ்வெலும்புகளின் மத்தியில் ஒவ்வொரு குருத்தெலும்பிருக்கிறது. பிரசவ காலத்தில் கூபகத்தின் எலும்புகளுக்கும் மத்தியில் சுவல்ப அசைவு உண்டாகிறது. அது கணுவின் உள்ளும் சுற்றிலும் உள்ள விபூகனங்களில் நேரிடும் மாறுபாடுகளால் சுலபமாக்கப்படுகிறது.

கூபகம், PELVIS (பெல்வீஸ்).

பிரசவசம்பந்தமாய் இதைப்பற்றி வாசிக்கையில் மெய்க்கூபகம், போலிக்கூபகமென இருவகுப்புகளாக வகுக்கிறோம். கூபக உள்வட்ட விளிம்பு (இனியோபெக்ட்டினியல்லைன்)க்கு மேல்பாக மெல்லாம் போலிக்கூபகமென்றும் அதற்கு கீழ்ப்பட்டது மெய்க்கூபகமென்றும் பெயர்பெறும். போலிக்கூபகமானது பிரசவ குத்திரத்தில் சம்பந்தப்பட்டாதபடியால் மருத்துவத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. வயிற்றிலடங்கிய குடல் முதலியவற்றையும் கருக்கொண்ட கர்ப்பாசயத்தையும் தாங்குகிறதுதான் இதன் முக்கிய உபயோகம். மேலும் பிரசவத்தை துரிதப்படுத்தும் அநேக தசைகள் ஆட, இது ஒர் நிலைக்களமாயிருக்கிறது. இது பக்கங்களில் செட்டை அகண்டிருப்பதாலும், பின்னால் கடைமுள்ளந்தண்டெலும்புகளாலும், எதிரில் வயிற்றின் தசைகளாலும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரியாய் அமைக்கப்பட்ட கூபகத்தின் முன்புறச் செட்டைக்கும், மேல் செட்டைக்கும் சமார்ப்பத்து அங்குலம் தூரம் இருக்கும். மெய்க்கூபகமானது, முழுமையும் எலும்பால் சூழப்பட்டும் மேல்வெளி அல்லது வட்டவிளிம்பு (இன்லெட்) அல்லது (ப்ரிம்) மத்திய வெளி (காவெட்டி) கீழ்வெளி அல்லது புறவெளி (அவுட்லெட்) என வகுக்கப்பட்டு மிருக்கிறது. கூபகத்தின் மேல்வெளி அல்லது வட்ட விளிம்பு இருதய உருவமுள்ளதுவாரா இது இருபக்கங்களிலும் கூபக உள்வட்ட விளிம்புகளினாலும், பின்னால்

பீடிகை எலும்பினாலும், எதிரில் மேகன எலும்புகளினாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது.

அதற்கு முக்கியமான நான்கு குறுக்கனவுகளுண்டு:—

1. முன்பின்ன அல்லது துறுக்கிய விட்டம் (ஆன்ட்டிரோ போஸ்டீரியர் அல்லது கான்ஜுகெட்டையாமிட்டர்).—மேகன வெலும்பின் மேல்பாகத்திலிருந்து பீடிகை எலும்பின் மேல்முனைக்கும் அளவு நான்கு அங்குலம்.

2. வலது-இடது-சாய்ந்த துறுக்களவு (ஒப்ளிக் டையாமிட்டர்).—இருபக்கங்களிலுமுள்ள பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலிருந்து எதிரிலிருக்கும் உள்வட்டவெளிமீன் மேட்டிற்கும் நாலேழுக்கால் அங்குலதூரம்.

3. துறுக்குவிட்டம் (ட்ரான்ஸ் வெர்ஸ் டையாமிட்டர்).—ஒருபக்கத்து உள்வட்ட வளிமீன் நடுவிலிருந்து அதற்கு எதிராக இருக்கும் அதைப்போலொத்த இடத்திற்கும் ஐந்தேகால் அங்குலதூரம்.

மெய்க்கூபகத்தின் மத்தியவெளியானது பின்னால் பீடிகை எலும்பின் பள்ளத்தாலும் எதிரில் மேகனப் பொருத்தின் பின்பரப்பாலும் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஆசனவெலும்பின் பின்பரப்பாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றில் குறுக்கனவுகளாவன:—

1. முன்பின்ன அல்லது துறுக்கியவிட்டம்.—மேகனப் பொருத்தின் பின்புறத்து மையத்திலிருந்து பீடிகை எலும்பின் பள்ளத்தின் மையம்வளையில் நாலரை அங்குலதூரம்.

2. வலது-இடது-சாய்ந்த துறுக்களவு.—குந்தக துவாரத்திலிருந்து (ஆப்ஸ்கூடோட்டர் பொரோமன்) அதின் எதிர்ப்பக்கத்திலிருந்து பீடிகை ஆசனவெலும்பின் புள்ளிவளையில் ஐந்து அங்குலதூரம்.

3. துறுக்களவு.—ஒருபக்கம் எலும்புக்குழியின் உள் ஓரமுதல் இன்னொரு எலும்பின் குழி உள் ஓரம்வளையில் நாலேழுக்கால் அங்குலம். கூபகத்தின் மத்தியவெளியில்தான் பிரசவகாலத்தில் சிசுவின் தலை திக்குமாறு ம்படியாக நேரிகிறது.

கூபகத்தின் கீழ்வெளி நான்கு சதுரமாகவும், எதிரில் மேகனவெலும்பின் வளைவாலும், பின்னால் புச்ச எலும்பாலும் பீடிகை ஆசனதசைநாராலும் இருபக்கங்களிலும் ஆசனவெலும்பின் மூட்டுகளாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அதின் குறுக்கனவுகளாவன:—

1. முன்பின்புறமான துறுக்களவு.—மேகனப் பொருத்தின் கீழ் ஓரத்திலிருந்து, புச்ச எலும்பின் துளிமட்டம் நான்கு அங்குலம். பிரசவ நேரத்தில் புச்ச எலும்பு பின்னால் அசைவதினால் அது ஐந்து அங்குலமாகிறது.

2. சாய்ந்த அளவானது.—சாதாரணமாய் அளக்கப்படுகிறதில்லை.

3. துறுக்களவானது.—ஒரு ஆசனவெலும்பின் மூட்டின் உட்புறத்திலிருந்து இன்னொரு ஆசனவெலும்பின் மூட்டுவெளியில் நான்கு அங்குலம்.

இந்த அளவுகள் உலர்ந்த எலும்புகளில் எடுக்கப்பட்டவை அவைகள் ஜீவியகாலத்தில் தசைமுதலியவற்றால் அதிகமாய் பேதப்படுகின்றன. மேல்வெளியின் பக்கங்களில் தசையிருப்பதால் அவ்விடத்தில் குறுக்களவு அரை அங்குலம் குறைவாகவும் அதின் முன்பின் குறுக்களவும் மத்தியவெளியின் எல்லா குறுக்களவுகளும் கால் அங்குலம் குறைவாகவும் இருப்பதாய் முக்கியமாய் தெரிகிறது. மேல் வெளியின் சாய்ந்த குறுக்களவு உலர்ந்த கூபகத்திலும்கூட இடதுபக்கத்தைவிட வலதுபக்கத்திலுள்ளது வெகுவாய் கொஞ்சம் பெரியதாகவேயிருக்கும். ஒருவேளை வலதுகாலில் அதிகமாய் உபயோகப்பதினால் அதிகமாக விருத்தியாய்நுக்கலாம். இதுவுமன்றி இடதுபுறம் சாய்வான குறுக்களவானது அந்த

பக்கத்தில் ஆசனக்குடல் இருப்பதால் ஜீவதசையில் கொஞ்சம் குறைவாயிருக்கிறது.

கூபகத்தின் வலதுசாய்ந்த குறுக்களவின் பக்கமாய் சிசுவின் தலை வெகுவாய் வெளிப்படுவதினால் உண்டாகும் அதுகூலம் இதனால் தெளிவாகிறது. சாதாரண பிரசவத்தில் கூபகத்தின் வெளி அளவுபிரமாணங்கள் அவ்வளவு பிரயோஜனமானதல்ல, அவைகளால் குருபங்கள் இருக்கின்றனவாவென்றும் எவ்வளவு குருபங்கள் இருக்கின்றனவென்றும் அறிய சலபமாயிருக்கும்.

கூபகத்தின் மட்டங்களாவன, Planes of the Pelvis (ப்ளேன்ஸ் ஆப் பெல்விஸ்).—அதின் சுற்றளவின் எந்த பாகத்திலாவது இருக்கிறதாக உத்தேசிக்கக்கூடிய மட்டங்களாம். நாம் ஒரு தடிப்பான காகித அட்டையை அறுத்து அதை கூபக குழிக்கு சரியாகி அதை மேல் வெளியிலாகிலும், அல்லது எங்கேயாகிலும் வைத்தால் அது அந்த குழித் தட்டத்தில் கூபகமட்டத்தைக் காட்டும். ஆகையால் மூட்டைய இஷ்டப்பிரகாரம் எந்தெந்தபாகத்தில் காகித அட்டையை வைப்போமோ அத்தனை கூபகமட்டங்கள் ஏற்படும்.

கூபகத்தின் துருவங்கள், Axes of the Pelvis (ஆக்ஸிஸ் ஆப் பெல்விஸ்).—கூபகத்தின் துருவமென்பதினால் அறிந்துகொள்ளவேண்டியதென்னவென்றால் சிசுவானது வெளியாகும்போது, அது செல்லுகிறமார்க்கத்தை காட்டும் ஓர் உத்தேசகோடாம். மெய்க்கூபகத்தின் உள்வெளியின் துருவமானது அதின்மட்டத்திற்குச் சரித்திரமாய்க் கிழிப்பட்டிருக்கும்: அதின்மத்தியில் சென்று ஒருமுனைக்கு நேராக நாடியும் இன்னொரு முனையில் புச்ச எலும்பின் துனியுமாய் இருக்கிறகோடாம். அது கீழ்ப்புறமாகவும், பின்புறமாகவும் இருக்கிறது. புறவெளியின் துருவமானது பீடிகை எலும்பின் முனைமுக்கத்திலிருந்து ஆசன வெலும்புகளின் மேடு

ளின்மத்தியில் செல்லுகிறது. அது கீழாகவும், கொஞ்சம் பின்புறமாகவும் செல்லுகிறது.

மத்தியவெளியின் துருவமானது சிலவேளை யில் கேறஸ் வளைவென்று (கர்வ் ஆப் கேறஸ்) சொல்லப்படுகிறது. இது கூபக மத்தியவெளியைப்போலவளைந்தும் ஏறத்தாழ பீடிகை, புச்ச எலும்புகளின் உள் கவிந்தவளைவுபோலயிருக்கிறது. விடபம் அகன்றிருக்கையில் மிருதுவான பாகங்களின் புறவெளித் துருவம் ஏறக்குறைய நேர் எதிர் நோக்கியிருக்கும்.

* ஆண் கூபகத்திற்கும், பெண் கூபகத்திற்கும் உண்டான வித்தியாசங்கள்.

DIFFERENCES BETWEEN THE MALE AND FEMALE PELVIS.
(டிபெரென்ஸ் பிட்வீன் மேல் ஆன்ட் பீமேல் பெல்விஸ்.)

ஆண் கூபகத்திற்கும் பெண் கூபகத்திற்கும், மிகவும் தெளிவான வித்தியாசம் உண்டு. பெண் கூபகத்தில் எல்லா எலும்புகளும் அமைப்பில் அதிக சன்னமாகவும், விரிவாகவும், இடுப்பெலும்புகள் அகலமாகவும், அகலெனியும், புறவெளியும் பெரிதாகவும், மத்தியவெளி விசாலமாகவும், மேகன வளைவு அதிக அகலமாகவும், ஆசன வெலும்பின் மூட்டுகள் அதிகூரம்போய் பிரிவுபட்டும் இருக்கின்றன.

சாய்ந்தாட்டங்கள், Inclined Planes (இன்கிளைன்ட் ப்ளேன்ஸ்).—உள்வெளி எலும்புகளின் உள்பரப்பில் நான்கு சாய்ந்த மட்டங்கள் உண்டு. எதிரிதிரும்பும் ஓர்மட்டம் மேகனப்பொருத்தின் பின்பரப்பால் உண்டாகி கீழ்ப்புறமாகவும், பின்புறமாகவும், சாய்ந்திருக்கிறது; பின்புறத்தில் இருப்பது பீடிகை எலும்பின் மேல்பாதியால் உண்டாகி இதுவும் கீழ்ப்புறமாகவும், பின்புறமாகவும் இருக்கிறது. பக்கங்களில் இரண்டுமட்டங்களும் இடுப்பெலும்பாலும், ஆசன வெலும்பாலும் ஏற்பட்டு கீழாகவும், பின்புறமாகவும், உட்புறமாகவும்

கவும் சாய்ந்திருக்கின்றன. மேல்வெளியில் ஐந்து சரீய்ந்த மட்டங்களிருக்கின்றன. பின்புறத்திலொன்று பீடிகை எனும்பின் கீழ்ப்பாதி யாலும், பீடிகை ஆசனத்தினை நார்களாலும் உண்டாக்கி கீழ்ப்புறமாகவும், எதிராகவும் சாய்ந்திருக்கிறது. பக்கங்களில் இரண்டுமட்டங்கள் மேல்புறத்தின் கீழ்மட்டவெளியில் ஆசன வெளும்புகளால் உண்டாக்கி கீழ்ப்புறமாகவும், கொஞ்சம் உட்புறமாகவும், சாய்ந்திருக்கின்றன. எதிர்பக்கங்களிலிருக்கப்பட்ட இரண்டு ஆசனவெளும்பின் எழும்புகளையாலும், மேகன் எழும்பின் இறங்கும் கிளையாலும் உண்டாக்கி எதிராகவும், மேலாகவும், உள்ளாகவும் சாய்ந்திருக்கின்றன. இந்த மட்டங்களின் பிரயோஜனமென்னவென்றால் சிசுவின் தலையானது வேண்டியபடி திரும்பவும், வழுவவும் அதற்குவழுவழப்பான இடங்கொடுத்து அது சுலபமாய் வெளிப்படும்படியாய் செய்வதேயாம்.

ஆசனவெளும்பின் பொருட்டிருக்கிற கூபகத்திறவுகோல் (கீ ஆப் பெல்விஸ்) என்று பெயர், என்னெனில் பிரசவ குத்திரசலனநேரத்தில் இந்த இடத்தில்நான் சாதாரணமாய் சுழலும் அசைவு ஆரம்பிக்கிறது.

சிகத் தலையின் எழும்புகளில் கவனிக்கவேண்டியவை யாவன.—இரண்டு நெற்றி எழும்புகள் (பிரண்டல்) இரண்டுபித்திகை எழும்புகள் (பெண்டல்) பிடரி எழும்பு (ஆக்ஸிபெண்டல்)மாம் இவைகள் தளர்ந்த ஜவ்வினால் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதினால் தலையானது அமுக்கப்படும் போது அதற்கு எற்றப்படி அதிகமாய் உருவம் மாறும்படியாயிருக்கிறது. மேலும் இவ்வகையாய் அது கூபகத்தின் வழியாய் செல்ல மிகவும் இலேசாயிருக்கிறது.

இவ்விதமாக எழும்புகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதினால் பிரசவகாலத்தில் சிசுத்தலையின் சரியான இருப்பிடம் கண்டுபிடிக்க கமக்கு சாதகியமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த சேருமானங்களைச் சரியாக அறிந்துகொள்ளுதல் மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது.

இரண்டு நெற்றி எழும்பின் மையத்தில் நெற்றிகோகை (பிரண்டல் ரூச்சர்) அல்லது நெற்றி மையகோகை இருக்கிறது. நெற்றி எழும்புக்கும் இரண்டு பித்திகை எழும்புக்கும் மத்தியில் லலாடகோகை (கோனல் ரூச்சர்) இருக்கிறது. பித்திகையின் இரண்டு எழும்புகளின்மத்தியில் விலகோகை (சாஜிட்டல் ரூச்சர்) இருக்கிறது. இரண்டு பித்திகை எழும்புகளுக்கும் பிடரி எழும்புக்கும் மத்தியில் குறகோகை அல்லது குறவினிப்பு (லாம்ப்டாய்டல் ரூச்சர்) இருக்கிறது. உச்சிகளாவன:—இந்தகோகைகள் சேரும் மத்திய இடங்கள் இரண்டு நெற்றி எழும்புகளும் பித்திகை எழும்புகளும் சேரும் இடத்தில் நான்குமூலையுள்ள அல்லது நான்கோணமான ஜர் இடம் விடப்பட்டிருக்கிறது—இதுதான் ஸ்ரீ உச்சி (ஆன்டிரியர் பான்ட்டெனல்) இதில் நான்கு விளிம்புகளும், நான்கு கோணங்களும், சேருகின்றன. இதில்முன் உச்சியானது நெற்றிகோகை அல்லது விளிம்புகளால் உண்டாக்கி அதிகமாய் நீண்டு நன்றாய் காணப்படுகிறது. பின் உச்சியானது (போஸ்டிரியர் பான்ட்டெனல்) விலகோகை, குறவினிம்புகளின் பொருத்தத்தால் உண்டாக்கப்பட்டு மூன்று பக்கங்களுள்ள முக்கோண வடிவமுள்ளதாய் முன்னுச்சியைவிட சின்னதுமானது. சில சமயங்களில் இது வெறுமன்பள்ளம்போலிருக்கும்.

சிசுவின் தலைக்கும் அது புகும்படியான வழிக்கும் உண்டானபொருத்தத்தை தெரிந்துகொள்வதற்காகச் சிசுத்தலையின் குறுக்களவு பிரமாணங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டியது, இவற்றில் மிகவும் முக்கியமானவைகளாவன.—பிடரிக்கும், நெற்றி எழும்புக்கும் நேரானது.—இது நெற்றியின்மத்தியிலிருந்து பிடரி எழும்பின் மூட்டுவெளியில் நாலாமைதல் ஐந்து அங்குலம்வரையிலிருக்கும். இந்த குறுக்களவு பிரசவ சமயத்தில் உருமாறுதலால் மிகவும் அதிகரிக்கிறது. பிடரிமுதல் முகவாய்க்கட்டை வரையில் ஐந்தேகால்முதல் ஐந்தரை அங்குலம்.

குலமிருக்கும்; ஓர் பித்திகைகளும்புமுதல் எதிரில் இருக்கும் மற்றொரு எலும்புவரையில் குறுக்களவு மூன்றே முக்கால் முதல் நான்கு அங்குலமிருக்கும்; நெற்றியின் மேல்புறமுதல் முகவாய்க்கட்டைவரையில் மூன்றே கால்அங்குலமிருக்கும். சாதாரணமாய் ஆண்குச்சுகளின் தலையானது பெண் குச்சுகளின் தலையைவிட பெரியதாயிருக்கும்: இதனால் பிரசவம் அதிககஷ்டமாகவும், தாயுக்கும் குச்சுக்கும் அதிகஅபாயகரமாகவும் இருக்கும். கூபகவழியில் குச்சு இறங்கும்போது அக்கூபகவழியின் உருவப்பிரகாரம் குச்சின் தலை அசைந்து செல்லும், ஜீவீதகாலத்தில் கூபகவழியின் நீண்டகுறுக்களவு சாய்ந்ததாயிருப்பதால் அதின் நீண்ட குறுவத்தால், சாய்ந்த (வலது) குறுக்களவினாலாவது, சாய்ந்த (இடது) குறுக்களவினாலாவது தலையானது பிரவேசிக்கிறது. தலையானது மத்தியவெளியில் பிரவேசித்தபோது அது சாய்ந்த குறுக்களவு நீட்டாயிருப்பதால் அந்த குறுக்களவு விளேயே தரித்திருக்கிறது. புறவெளியில் குறுகியவிட்டமே நீண்ட குறுக்களவாதலால் குச்சுத்தலை தன் நீண்ட குறுவத்தில் அங்கே தங்குகிறது. குச்சுத்தலையின் நீண்ட குறுக்களவு அது தங்கும்படியான கூபகத்தின் அளவோடு பொருந்தும்படியாக அந்த குச்சுத்தலை இப்படி அசையவேண்டியது அவசியமென்று தெரியவருகிறது.

2 - ம் அதிகாரம்.

ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகளின் தத்துவம்.

THE ANATOMY OF THE FEMALE ORGANS OF GENERATION.
(அனாட்டமி ஆப் தி பீமேல் ஆர்கன்ஸ் ஆப் ஜெனிரோஷன்.)

ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகள் வெளி உறுப்புகளென்றும், உள் உறுப்புகளென்றும் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வெளி உறுப்புகள் வெளியில் இருக்கப்பட்ட மர்மஸ்தானம் (வல்வா) உள் உறுப்புகளாவன—சினைப்பைகள் (ஓவரிஸ்)—இவற்றுள்தான் சினைகள் உண்டாவதால் எல்லாவற்றிலும் இவை முக்கியமானவை. நாதக்குழல்கள் (பல்லோப்பியன்ட்ரூப்ஸ்) இந்த வழியாக சினைகள் கர்ப்பாசயத்தில் செல்லுகின்றன. கருப்பை அல்லது கர்ப்பாசயம் (யூட்டிரஸ்) இதில் கர்ப்பமான போது சினைகள் தரித்து விருத்தியாகும்.

வெளி ஜெனன உறுப்புகள்.

EXTERNAL ORGANS OF GENERATION.

(எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆப் ஜெனிரோஷன்.)

அல்தல், Mons veneris (மான்ஸ் வெனிரிஸ்) என்பது மேகனப்பொருத்திற்குமேல் சேர்த்தாற்போலிருக்கிற மர்மஸ்தானம் (வல்வா) என்னும் வெளி உறுப்புகளின் மேல்பாகத்திலிருக்கும் மெத்தைபோன்ற மேடு. அந்த இடத்தின்மீது ருதுவானபிறகு உரோமம் நிறைந்திருக்கும்.

யோனியின் பெரிய இதழ்கள், Labia majora (லேபியாமஜோரா) என்பவை அல்தலின் கனதியாக இருந்து அவ்விடத்திலிருந்து கிழாகவும் பின்புறமாகவும் ஆசனத்திற்கு ஒரு அங்குலம்வரையில் சென்று அங்கு விடபத்தின் (பெரினியம்) எதிரில் ஓர் ஜவ்வின் பகுதியின் மெல்லியம்மிப்பாஷ் ஒன்றாய்ச் சேர்க்கப்படுகின்றன. இந்த ஜவ்வின்மிடிப்புக்கு விடபக்கடிவாளம் (போர்ஷெட்டி) அல்லது பின்கமிஷியூர் என்று பெயர். மேல் பகுதி

வுக்கு முன்கமிஷியூர் என்று பெயர் : இந்த விடபக்கடிவாளம் பெரும்பாலும் முதல் பிரசவத்தில் கீழிப்பெலுண்டே.

சிறிய இதழ்கள் அல்லது உள்நிதழ்கள், Labia minora (லேபியா மைனோரா) இரண்டுமடிப்புகளுள்ள ஜவ்வுகளாம். இவை இருபக்கங்களிலும் பெரிய இதழ்களின் உள்பரப்பில் கிட்டதட்ட நடுவகுபாதி யின்பேரில் ஆரம்பமாகின்றன. இவைகள் மேலே செல்லும்போது ஒன்றுக்கொன்று சமீபித்து இரண்டாகப் பிரிகின்றன. இந்த உள் இதழ்கள் சாதாரணமாய் முழுமையும் பெரும் இதழ்களால் மறைந்து கிடக்கப்படுகின்றன; ஆனால் பிள்ளை பெற்றதற்குப்பிற்பாடும், தளர்ந்த பிராயத்திலும், அவைகள் பெரும் இதழ்களுக்கு கொஞ்சம் புறம்பாயுமிருக்கும்.

சுமரி, Clitoris (கிளிடோரிஸ்) என்பது எதிரோ இருக்கும் விடபக்கடிவாளத்திற்குக் கீழ் இருக்கும் சிறிய முக்கோணவடிவுள்ள (வெஸ்டிப்பூல்) என்று வழங்கும் ஸ்தானத்தின் முனையிலிருக்கும் ஒரு சிறிய தசை உறுப்பு.

வெஸ்டிப்பூல் - என்பது முக்கோண வடிவுள்ளபாகம். இது அதின் முனையில் சுமரியினாலும், இரண்டு பக்கங்களிலும் உள் இதழ்களின் மடிப்புகளாலும், சூழப்பட்டிருக்கிறது. இது நீளத்தில் சுமார் ஒரு அங்குலமுள்ளதாம், பரப்பு மழமழப்பாயுமிருப்பதுடன் மூத்திரமிடக்கும் குழாயை (காத்திட்டர்) செலுத்தும்போது அதை செலுத்தும் வீரலுக்கு உதவியாகவுமிருப்பதால் அதிகபிரயோசனமானது.

நீர்துவாரம் அல்லது ஜலத்துவாரம், Meatus Urinarius (மியேட்டஸ் யூரினேரியஸ்) இது தன்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் ஜவ்வின் சிறுமேட்டினால் இன்னதென்று அறியப்படுகிறது. இது வெஸ்டிப்பூலுக்கு கீழும், யோனிவாசலுக்கு எதிராகவுமிருப்பதால் விரலினால் பரிசுத்து தெரிந்து காணப்படும். இது நீர்த்தாயின்வழி. இது

ஒன்று அல்லது ஒன்றை அங்குலம் நீளமும், கர்ப்பமில்லாதநிலைமையில் ஏறக்குறைய நேராகவுமிருக்கிறது.

மூத்திரக்குழலை பிரயோகிப்பதில் நோயாளியை சாதாரணமானவரையில் அம்மணமாக்காமல் பிரயோகிக்கவேண்டியது ஆவசியகம். இதை அநேகவிதமாய் செலுத்தலாம். எல்லாவற்றிலும் சுலபமானது யாதெனில், நோயாளியை மல்லாக்கப் படுக்கவைத்து இடது ஆள்காட்டி விரலின் துணியை வெஸ்டிப்பூல் முனையின்பேரில் வைத்து, நீர்த்துவாரத்தை சுற்றிலுமிருக்கும் சுலபமாய் அறியக்கூடிய மேட்டைத்தொடும்வரையில் விரலை மெதுவாக நழுவிடவேண்டும். மூத்திரக்குழலானது ஓலளும்படியானதும், அடைப்புக் கம்பியில்லாததுமானதற்கு எண்ணெய்ப்பூசி வலதுகையில்பிடித்து அதை விரல்மார்க்கமாகவே, நீர்த்துவாரத்திற்குள் மெதுவாய் செலுத்தவேண்டியது. மூத்திரக்குழல் யோனியில் செல்லாமல் நீர்த்துவாரத்தில் செல்லும்படியாக நாம் ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்க்கவேண்டியது. நோயாளி பிரசவநேரத்தில் சாதாரணமாய் இருக்கும்வகையாக இடதுகை பக்கமாய் ஒஞ்சரித்தாற்போலிருந்தால், யோனியில் விரலைச் செலுத்தி அதின் மேல் ஓரத்தை தடவிப்பார்ப்பதினால் இந்தசெய்கை மிகவும் இலேசாய் செய்யக்கூடும். இதற்கு சேர்ந்தாற்போல் மேலே நீர்த்துவாரம் இருப்பதால் விரலின்முன்பக்கமாய் மூத்திரக்குழலை நழுவிட்டால் யாதொரு வருத்தமில்லாமல் அதை உட்செலுத்தலாம். இருந்தாலும் பிரசவநேரத்தில் அந்த பாகங்களைல்லாம் சாதாரணமாய் வீங்கியிருப்பதால் அந்த அவாரத்தைக் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமாயிருக்கலாம். அப்போது அதை வெகுநேரம் தடவிப்பார்ப்பதால் நோயாளியைக் காயப்படுத்துவதைவிட அந்த இடத்தைப்பார்ப்பது உத்தமம். இந்த மூத்திரக்குழலை எடுக்கும்போது பெருவிரலை வெளியிலிருக்கும் அதின் துவாரத்தின் மீது வைக்கவேண்டும். இப்படிச்செய்வதால் மூத்திரம் அல்லது சிறுநீர் படுக்கையில்படாது.

கோயாளிக்கு இந்த மூத்திரக்குழலே அடிக்கடி பிரயோகிக்கவேண்டியபடிஷத்தில் அந்த ஆபுதத்தை உபயோகித்தபிற்பாடு கன்றாய்ச் சுத்திப்படுத்தவேண்டியது. அதை உபயோகிப்பதற்கு சற்று முன்னதாக அதை கொஞ்சம்நேரம் கர்பாலிக்லோஷனில் (60 - இல் - 1) (அதாவது ஒருபாகம் கர்பாலிக் ஆலிடிஸ் அறுபதுபாகம் சுதெண்ணீர்சேர்த்து செய்யப்பட்டலோஷனில்) போட்டுவைப்பது நல்லது. இதை அலகடியம்செய்வதால் மூத்திரப்பையின் கோளாறும் இன்னும் இதை விட பெருந்த அபாயங்களும் நேரிடும்.

பிறைச்சவ்வு, Hymen (ஹைமன்) என்பது யோனி துவாரத்தை கொஞ்சதூரம் அடைத்திருக்கிற மடிப்பாளஜவ்வு. சாதாரணமாய்இந்த ஜவ்வானது கிஷேகத்திற்குப்பிர்பாடு சேதப்பட்டுப்போகும். சிலசமயங்களில் இது இல்லாமலே இருக்கிறதுண்டு. சிலருக்கு அது மெத்த உரப்பாக இருந்து பிரசவகாலத்தில் தடைசெய்வதுண்டு: அப்போது அதைக்கீறுவது அவசியமாயிருக்கிறது.

யோனி, Vagina (வஜைனா) என்பது உள்ஜெனன உறுப்புகளுக்கும், வெளிஜெனன உறுப்புகளுக்கும் மத்தியில் செல்லும்கால். அது கொஞ்சம் கர்பப்ப்பையை தாங்கிகொண்டுவளைந்துபின்புறமாய்புறங்களிந்துகிழே குறுகி, மேலாக கர்ப்பாசயத்தின்கழுத்து (செர்விக்ஸ்) இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்தில் விரிந்துமிருக்கிறது. யோனியானது சுயகூபகத்தில் எதிரில் மூத்திரப்பைக்கு பின்னால் மலக்குடல் அல்லது ஆசனக்குடல் இவைகளுக்கு மத்தியிலிருக்கிறது. சாதாரணமாய் அதின் முன்பின் சுவறுகள் ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கி இருக்கின்றன; ஆனால் அது சிசு வெளியாகும்போது அகலுவது போல் அதிகமாய் அகன்று பெருக்கக்கூடியதாயிருக்கிறது. அது வளைந்திருக்கிறபடியால் எதிர்சுவறுனது பின்சுவற்றைவிட குட்டையாயிருக்கிறது. யோனியானது முக்கியமாய் ஜவ்வு, தசையாலானது. இதின்சுவறுகள்

அதிகமாய் விரியும்போது கர்பப்ப்பை இரங்கிப்போகிறது. இது எதிரிலிருக்கும் மூத்திரப்பையோடு நெருங்கி சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் இந்தப்பையும் அதனோடு கீழ் இழுக்கப்படலாம்; அதனால் மூத்திரக்குழலே செலுத்துவதில் கொஞ்சம் கஷ்டமும் நேரிடலாம்.

விடபம், Perineum (பெரினியம்) இது யோனித்துவாரத்தை ஆசனத்துவாரத்திலிருந்து பிரிக்கிறது; இது சாதாரணமாய் ஒன்றரை அங்குலம் நீளமானது. இது பிரசவகோத்தில் அதிகமாய் அகலமாகக்கூடியது. இது பிரசவ ஆரம்பகோய்களில் பலசமயங்களில் கொஞ்சமாய் அல்லது அதிகமாய் கிழிந்து அதனால் பின்னிட்டு அகேகதொந்தரவுகளுக்கு இடமாகும்.

உள் ஜெனன உறுப்புகள்.

INTERNAL ORGANS OF GENERATION.


(இன்ட்டர்னல் ஆர்கென்ஸ் ஆப் ஜெனிரோஷன்.)

கர்பப்ப்பை அல்லது கர்ப்பாசயம், Uterus (யூட்டிரஸ்) மெய்கூபகத்தில் ஆழமாய்ப் பொருத்தப்பட்டு அதற்கு மூத்திரப்பை எதிரிலும் ஆசனக்குடல் பின்னாலேயும், குடல்கள் மேலாகவும், யோனித்துவாரம் கீழாகவும் இருக்கின்றன. அது பம்பா (பைரிபாரம்) உருவமாகவும் முன்புறத்திலிருந்து பின்புறமாக தட்டையாகவும் இருக்கிறது.

கர்பப்ப்பையின் மேல்லுமானது ஒன்றோடும் சேராமலும் மேகனப்பொருத்திலிருந்து பீடிகை மேடுவனாயில் கூபகத்தில் கிழிக்கப்படும் கோட்டிற்கு நேராகவும், அதின் கீழ்முனை முன்சொன்ன இடத்திலிருந்தே முன்புறமாக பீடிகை எலும்பின் நாள்காவது எலும்புவனாயில் வளையப்படும் கோட்டிற்குநேராகவும் இருக்கும். பின்னை பெற்ற ஸ்திரீகளில் கர்ப்பாசயத்தின் பம்பாக்காரம் சிறிது உருகுலெந்துபோய் முன்னும்பின்னும் ஆகியிலிருந்ததைவிட வட்டமாகவும் எடை கொ

ஞ்சம் அதிகரித்துமிருக்கும். கன்னிகைகளில் இது சுமார் ஒரு அவுன்ஸ் (2½ ரூபாய்) எடையும் மூன்று அங்குல நீளமுள்ளதாயிருக்கும். அகலம் இரண்டு அங்குலம், இருசுவறுகளுக்குள் கனம் ஒரு அங்குலம் கர்ப்பப் பையானது, —அடிப்புறம் (பண்டஸ்), உடல் (பாடி), கழுத்து (செர்விக்ஸ்) என மூன்றுபிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஜோண்டாழி படம்.



- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. கர்ப்பாசயத்தின் உடல். | 6. யோனி. |
| 2. கர்ப்பாசயத்தின் உன்பாகம். | 7. மர்மஸ்தானப்பிளவு. |
| 3. யோனி பாகம். | 8. மூத்திரப்பை. |
| 4. கர்ப்பாசயக் கழுத்தின் மார்க்கம். | 9. நீர்த்துவாரம். |
| 5. கர்ப்பாசயவாய் (வெளி பாகம்). | 10. யோனியின் எதிர்த்துவாரம். |
| | 11. ஆசனக்குடல் அல்ல மலக்குடல். |

கர்ப்பாசயத்தின் அடிப்புறம் என்பது கர்ப்பப்பையின் மேல்புறம். அதின் இருபக்கங்களிலும் நாதக்குழல்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதின் உடல் என்பதற்கு மேலே நாதக்குழல்களும், கீழே கர்ப்பப்பையின் கழுத்தின் மேல்முனையும் இருக்கின்றன. இந்தபாகத்தில்தான் முக்கியமாய் கருசென்று தங்குவளருகிறது. கர்ப்பப்பையின் கழுத்தென்பது ஒன்றரை அங்குலம் நீளமுள்ள அதின் அடிப்பாகம்; இது யோனியில் சுமார் அரை அங்குலம் நீண்டிருப்பதுடன் பிரசவநேரத்தில் சிசு வெளிப்பட அகலமாகின்றது. அதின் அடிப்பாகம் கர்ப்பப்பையின்வாய் என்னப்படும் ஓர் குறுக்குத்துவாரம்; இதற்கு முன்னும் பின்னும் இகழ்கள் இருக்கின்றன. கர்ப்பாசயத்தின் உள்மட்டத்தில் அதின் உடலினுடையவும், கழுத்தினுடையவும் குழிகளும் சேர்ந்திருக்கின்றன.

உடலின் குழியானது முக்கோண வடிவுள்ளது. அம்முக்கோணத்தின் அடியானது நாதக்குழல்களின் துவாரங்களைச் சேர்க்கும் கோடு. அதின்முனை கர்ப்பப்பையின்கழுத்தின் மேல்துவாரம். அது ஒரு அங்குல நீளமானது. கழுத்தின் குழியானது கதிர்கம்பி வடிவமாகவும் ஒன்றரை அங்குல நீளமாகவும் இருக்கிறது.


கர்ப்பப்பையின் குழியினுடைய துருவமானது கூபகத்தின் உள்வெளியின் தருவத்திற்கு சரியாயிருக்கிறது. அதாவது கீழாகவும், பின்புறமாகவும் செல்லுகிறது. கர்ப்பப்பையின் உருவமைப்பானது முக்கியமாய் தசை நார்களால் ஆனது. இத்தசைநார்கள் மூன்று அடுக்குகளாக வகுக்கக்கூடியவையாய் மூன்றுவிதமாக வரிசை தீர்த்திருக்கிறது. துவாரங்களண்டையில் வளைவாகவும், அடியில் முக்கியமாய் குறுக்காகவும், அடிமுதல் கழுத்துவளையில் நெடுக்காகவும் மிருக்கிறது. கடைசியில் சொன்னவை பிரசவநேரத்தில் அடியை கீழ்ப்புறமாக இழுப்பதுமல்லாமல், கழுத்தின்பாகத்தை சிசுவின் உதயபாகத்திற்கு மேல்புறமாயும் இழுத்து, இவ்விதமாய்

22 ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகளின் தத்துவம்.

கர்ப்பப்பையின் துவாரத்தை விரிவாக்குகிறது. கர்ப்பப்பையின் வெளிப்புறம் அந்தரவேஷணஜவ்வு (பெரிட் டோனியம்) என்னும் ஓர் மெல்லிய பளபளப்புள்ள ஐவ வினாவு மூடப்பட்டிருக்கிறது. உட்புறத்தில் கழுத்தின் குழியும், துவாரமும் ஜவ்வினாவு குழம்பட்டிருக்கிறது. இது கர்ப்பப்பையின் உட்புறத்தில் (அட்ரிக்குலர் க்ளா ன்ட்ஸ்) என்று சொல்லப்பட்ட கோளத்தால் நிறைந்திருக்கிறது.

முற்றும் படம்.

FIG. 3.



கர்ப்பாசயக்குழி அல்லது உள்பாகம்.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. கர்ப்பாசய உடலின் குழி. | 5. கர்ப்பப்பையினது வாயின் உள்பாகம். |
| 2. இடதுபக்க ஓரம். | 6. கர்ப்பப்பையினது கழுத்தின் குழி. |
| 3, 3. மேல் ஓரம். | |
| 4, 4. அவற்றின் மேல்மூலைகள் நாதக்குழல்களோடே இருத்தல். | |

ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகளின் தத்துவம். 23

கர்ப்பாசயமானது எட்டு அஸ்திபந்தனங்களால் சரியான நிலையில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டு அஸ்திபந்தனங்கள் எதிரிலும், இரண்டு பின்னாலும், இரண்டு விசால அஸ்திபந்தனங்கள் பக்கங்களிலும், இரண்டு வட்ட அஸ்திபந்தனங்கள் மேற்பக்கத்திலும் இருக்கின்றன. கடைசியிற்கூறியவைதவிர மற்றவையெல்லாம் அந்தரவேஷணஜவ்வினாவு உருப்படுகின்றன.

நாதக்குழல்கள், Fallopian tubes (பல்வோப்பியன் யேப்ஸ்) என்பவை மூன்றுமுதல் நாலு அங்குலம் நீளமுள்ள இரண்டு கனத்தகொடிகளாம். இவைகள் கர்ப்பப்பையின் பிரதி மேல்முனையிலிருந்து ஒவ்வொன்றும் வெளிகொக்கி பரவுகின்றது. நாதக்குழல்களின் மேற்புறக்கொணையில் (Fimbria) பிம்சிரியா என்னப்பட்ட விரல்போன்ற கருங்கல்களும் அவற்றோடுகூடிய எக்காளம்போன்ற ஓர் குரகம் இருக்கின்றன. இந்தகொணை சினைப்பையின்மேல் கிழ்முகமாய்ச் செல்லுகிறது. இருபக்கத்திலுமுள்ள பிரதிகொடியின் மத்தியில் ஒருசிறு வாயக்கால் செல்லுகிறது. சினையானது (கிராபியன்) (Graafian vesicle) வெலிக்கலிலிருந்து வெளியானதும், நாதக்குழலின் எக்காளம்போன்ற கொணையானது அதை ஏற்றுக்கொண்டு, நாதக்குழலின்வழியாக அதை கர்ப்பப்பைக்குள் கொண்டுவருகிறது; இந்த குழல்கள் அந்தரவேஷணஜவ்வினாவும், தசையாலும், நினைங்களாலும் கவசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

சினைப்பைகள், Ovaries (ஓவரிஸ்) இந்த பைகளில் சினைகள் உண்டாகி அவைகளிலிருந்து வெளியில் தள்ளப்படுகின்றன; சினைப்பைகள் இரண்டாம். அவைகள் கர்ப்பாசய அஸ்திபந்தனத்தோடு தொடுக்கப்பட்டும், அதன் அடிப்புறத்திற்கு சுமார் ஒன்றரை அங்குலதூரத்தில் பக்கத்துக்கு ஒன்றாயும் இருக்கின்றன. இந்த பைகளின் அகிகளும் சுமார் ஒன்றரை அங்குலமும் என்பது (30) குண்டெணி எடையுமிருக்கும். இவைகளை அ

24 ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகளின் தத்துவம்.

அத்துப்பார்த்தால் சினை யிலும் (கர்ப்பியன் வெலிகல்ஸ்) என்னும் சிறுகொய்கள் போன்ற உருவங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு (கெம்போன்ற) கொப்புனத்திலும் கீரால் சூழப்பட்ட இன்னும் ஒரு முட்டை இருக்கும் அந்த (பாலிக்கல்ஸ்) வளர வளர சினைப்பையின் வெளிப்பரப்பில் சேரும், இவ்விதமாக வெகுசின்ன (பாலிக்கல்ஸ்) சினைப்பையின் மத்தியில் காணப்படும். இவைகள் முதிர்ந்தபோது, உள்னேயிருக்கும் கீர் அதிக வேகமாய் சுரப்பதால், இவை வெடித்து அதிகவிருந்து வெளிப்படும் முட்டைகள் நாதக்குழல்மார்க்கமாய் கர்ப்பாசயத்திற்குள் செல்லும்.


குந்தம் (மாதவிடாய்), Menstruation (மென்ஸ்ட்ரூயேஷன்) இப்படி (பாலிக்கல்ஸ்) மர்மஸ்தானம்கனிவது காலநிலைகளுடையதாகும். அப்படியாகும்போது கர்ப்பாசயத்திற்கு உதிரம் அதிகமாய் சென்று உள் ஜவ்வின்வழியாக கசிந்துவெளிப்படும். இதற்கு மாதவிடாய், மாதக்கணக்கு, அல்லது பிஷ்டையாகுதல் என்று பெயர். இந்தமாதவிடாயானது சுகதேயமான ஸ்திரீக்கு பிரதிசாந்திரமாகும் (ஆனந்தமன்ஸ்) வரும். ஆனால் கர்ப்பமாயிருக்கும்போதும், பால்கொடுக்கும்போதும் ஆகாமல் சாதாரணமாய் நின்றிருக்கும். இந்த மாதவிடாய் பருவம் அடையும் சமயத்தில் முதல் முதல் காணும். சீதனபிரதேசங்களில் சாதாரணமாய் 14 முதல் 16 வயதிற்குள்ளும், உஷ்ணபூமியில் சுமார் இரண்டொருவரும் முன்னடியாகவும் மாதவிடாய் துவங்கும்.

கர்ப்பம், Pregnancy (ப்ரெக்னென்ஸி) சினைப்பையில் கருநிரித்ததும் சிசு பூரணமாய் வளரும்பரியந்தம் அச்சினைப்பையிலும், கர்ப்பப்பையிலும் சிலபேதங்கள் படிப்படையாய் உண்டாகின்றன. இவ்விதங்கற்பங்கள் நிகழும்போது இருக்கும் ஸ்திரீக்குத்தான் கர்ப்பமாய் நூதல் அல்லது பிஷ்டையுண்டாய்நூதல் என்று பெயர். கர்ப்பப்பையின் உள்ளோரத்திலிருக்கும்படியான ஜவ்

ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகளின் தத்துவம். 25

வானது கனதியாகி அதாவது தடிப்பாகி மாறுபடுகிறது. இதற்கு எறிஜவ்வு (டெஸிலோ) என்று பெயர், ஏனெனில் பிள்ளை பிறந்தபிறகு, இந்த ஜவ்வானது எறிந்துவிடப்படும். இந்த ஜவ்வில்தான் கருவானது முதல் புதைந்து இருக்கிறது. இந்த ஜவ்வானது பொருந்திய ஸ்தானத்திலிருந்து கிரமமாய்வளர்ந்து கிளையின்மேல் எழும்பி அதை முழுவதும் மூடிக்கொள்ளும். இப்படி மூடிக்கொள்ளும் ஜவ்விற்கு (டெஸிலோ ரிப்னெக்ஸா) "எறி ஜவ்வுகவசம்" என்று பெயர். இக்கவசம் கருக்குழியை கிரப்பும்பரியந்தம் கூடவே வளருகிறது.

நான்காம் படம்.



1. கர்ப்பாசய அடிபாகம்.

2. சுய எறிஜவ்வு.

3. எறிஜவ்வு கவசம்.

4. கர, சினை.

5. இன்னும் இணைப்படாத டெஸிலோவீராளன்ற சுய எறிஜவ்விற்கும், டெஸிலோ ரிப்பிளெக்ஸா என்ற அதன் கவசத்திற்கும் மத்தியிலுள்ள கருக்குழி.

6. தீர்பர்வயிட்டி - ஜவ்வின் ருட்சம்.

7. கர்ப்பாசய கண்டம் அல்லது கழுத்து.

8. கர்ப்பாசய மேல் முனையில், நாதக்குழல்கள் செல்லும் மார்க்கம்.

9. டெஸிலோ செலொட்டெனா (எறிஜவ்வு பிடம்).

இதுபற்றி (டெஸிலோ) எறிஜல்வு இருபுரையுள்ள தெளச்சொல்லப்படும். கருக்குழியை ஒட்டியிருக்கும் ஜவ்விற்கு (டெஸிலோ வீரா) சுய எறிஜல்வு என்றும், இதிலிருந்து உண்டாவதும், கருவை மூடுவதமான ஜவ்விற்கு (டெஸிலோ ரீபிளெக்ஸா) எறி ஜவ்வக்கவசம் என்றும் பெயர். (டெஸிலோ வீரா) சுய எறிஜல்வில் கருநிற்கும் இடத்திற்கு (டெஸிலோ செரோட்டி) எறிஜல்வு பீடம் என்று பெயர். இது முக்கியமாய் மாயை அல்லது நஞ்சை உருப்படுத்துவதற்கு உரித் தானதாயிருக்கிறது. (டெஸிலோ ரீபிளெக்ஸா) எறி ஜவ்வக்கவசத்திற்கு உன்னே பிண்டக்கவசம் (கோரியன்) என்பது பிண்டத்திற்கு ஒரு போர்வையாயிருக்கிறது. கர்ப்பமுண்டான ஆரம்ப வாரங்களில் அதிகப்பேரில் சொரசொரப்பாயும், (வில்லை) என்று சொல்லப்படுகிற உரோமம் போன்ற சுனை முளைத்துமிருக்கும். பிண்டமானது கர்ப்பப்பையை சேர்ந்தாற்போலிருக்கும் இடம் தவிர மற்ற இடத்தில் இவையெல்லாம் மறைந்து போய்விடுகின்றன. அந்த இடத்தில் அவைகள் டெஸிலோ என்ற எறிஜல்வோடுசேர, மாயை அல்லது நஞ்சென்பது உண்டாகிறது.

கோரியன் என்ற ஜவ்விற்குள்ளாக இன்னொரு ஜவ்விற்கு உதற்கு (ஆம்னியன்) பனிநீர்க்கோசம் என்று பெயர். இது மெல்லியதாயும் பெலமுள்ளதாயும் இருக்கும். அதில் ஓர்வித நீர் இருக்கிறது. இதற்கு பனிநீர் (லைக்கர் ஆம்னியை) என்று பெயர். இந்த நீரில்தான் பிண்டமானது மிதக்கிறது. இது கோரியன் என்ற ஜவ்வோடே எல்லா இடத்திலும் தளர்ந்தாற்போல் இணைத்திருக்கிறது. ஆனால் இதை அதிகிலிருந்து வெறுப்படுத்தவும்கூடும். பனிநீர் (ஆம்னியன்) பனிநீர்க்கோசத்தினால் உண்டாகிமதென்று எண்ணப்படும். இந்த நீரின் பிரமாணம் அதிகமாய் வித்தியாசப்படுகிறது. ஆனால் சாதாரணமாய் ஒருபவுண்ட் நிறையாம். சில சமயங்களில் கோரியனுக்கும், ஆம்னியனுக்கும் மத்

தியில் ஓர்வித நீர் கொஞ்சம் இருப்பதுண்டு. இதற்கு போலிநீர் (டால்ஸ் வாட்டர்ஸ்) என்று பெயர். இது இருந்தால் பிரசவ ஆரம்பத்தில் வெளியாகும். அப்போது இதை மெய் அல்லது சரியானபனிநீரென்று பிசகாய் நினைக்கக்கூடும். பிண்டம் உலாவ நீராகவும், சில சமயங்களில் பிண்டத்திற்கு உண்டாகக்கூடிய அடிமுதலானவைகள் படாமல் அதை தடுக்கவும், பிண்டத்தின்பேரில் கர்ப்பாசயமானது தாக்காமலிருக்கவும், பிரசவநேரத்தில் பனிக்குடமுதலியஜவ்வுகள் கர்ப்பவாய் வழியாகச்செல்ல அதை அகலப்படுத்தவும், யோனிவாயை ஈரமாக வைக்கவும் பனிநீர் பிரயோஜனமானது. கர்ப்பப்பையை அது விரிவாக்குவதால், பிண்டம் புரண்டு உருளும்போது கர்ப்பப்பைக்கு ஏதாவதும் பிண்டத்தினால் அடிமுதலியது படாமல் தப்புவிக்கிறது. மேலும் பிண்டமானது ஓரிடம் விட்டு மற்றோரிடம் தாராளமாய் மாறவும் அதுகூலமாயிருக்கிறது.

மாயை அல்லது பிஞ்சு, Placenta (ப்ளெசென்ட்டா) என்பதினால், பிண்டமானது கர்ப்பப்பையினிருக்கும் போது போஷிக்கப்படுகிறது. இது கர்ப்பமான இரண்டாம்மாதக்கடைசி முதற்கொண்டு (கோரியன்) என்ற ஜவ்வின் ஓர்பாகத்திலிருந்தும் (டெஸிலோ செரோட்டி) வினாலும் உண்டாக ஆரம்பித்த பிரசவமட்டும், வரவர பிரமாணத்திலும் எடையிலும் அதிகமாகிறது. அப்போது இந்த மாயையானது, வக்கிராகார வட்டமுள்ள கட்டிபோன்றதாயிருக்கும். இது மிருதுவானது. எடை 20 அவுன்சும், அதிக அகலம் $7\frac{1}{2}$ அங்குலமும், மத்தியபாகம் $3\frac{1}{4}$ அங்குலமும், ஓரம் $\frac{1}{8}$ முதல் $\frac{1}{4}$ அங்குலமும் உடையதாம். மாயைக்கு இரண்டு பரப்புக்குண்டு. இதின் உள்பரப்பு மழமழப்பாயும் (ஆம்னியன்) என்றதால் மூடப்பட்டதாயிருக்கிறது. அதின்பேரில் பிண்டத்தை போஷிக்கிற இரத்த நரம்புள்ள மாயைக்குள் பிரவேசிக்குமுன் பிரிவுபட்டும், உட்பிரிவுபட்டும் காணப்படுகின்றன. நாகிக்கொடி, அல்லது

(தொப்புள்) கொப்பூழ்க்கொடி இந்த பாப்பின் மத்தியிலிருக்கிறது. இந்த கொடி மாயையின் ஓர் ஓரத்தில் இருந்தால் அகற்கு (பாட்டில் டோர்) “ஓட்டு அல்லது ஓரமாயை” என்று பெயர். கர்ப்பப்பையோடு சேர்ந்திருக்கப்பட்ட மேற்புமானதும், தாயைச்சேர்ந்த அமான பாப்பு சொரசொரப்பாகவும், அநேகமான ஒழுங்கற்ற மடல்களாக (டெலிவோலினால்) வருக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதின்பேரில் அநேக சின்ன சின்னது வாரங்கள் காணப்படும். இவை கர்ப்பப்பையிலிருந்து சிதைக்கப்பட்ட இரத்த நரம்புகளின் துவாரங்களாம். மாயையானது, கர்ப்பப்பையின் எவ்விடத்திலாவது ஓட்டிக்கொண்டிருக்கலாம், கர்ப்பவாய்மீதுகூட இருக்கலாம். ஆனால் அதின் சாதாரண இடம் கர்ப்பாசயத்தின் அடிப்புறம்தான். பிரசவத்திற்கு பிறகு, சிசுவை மூடியிருக்கும் ஜவ்வுடன் இதுவும் வெளியாக்கப்படுவதாலும் இவிலிருக்கும் துவாரம் கர்ப்பப்பையோடு ஒத்திருப்பதாலும், இந்த மாயையானது, வெளியானபின்பு அதை சோதித்து பார்வையிட்டால் அது கர்ப்பப்பையில் இன்னவிடத்தில் ஓட்டியிருந்ததென்பதை மிகச்சரியாய் பெரும்பாலும் நிச்சயிக்கலாம். சிசுபிறந்த பின்பு வெளிக்காற்று சுவாசப்பையில் போவதினால் சிசுவின் உதிரம் மிகவும் சுத்தமாகிறதாயிருந்தும், முன் சிசுவின் இரத்தம் மாயையின் வழியாகப்பாவி தாயின் இரத்தத்தில் கலப்பதினால் ஜீவசக்திக்குவேண்டிய மாறுபாடுகள் உண்டாகின்றன. தாய் குழந்தை இவர்களின் இரத்தம் ஒன்றாக நேரில் மாயையில் கலக்காமலிருக்க இவ்விதமே உதிரங்களையும் இரத்தநரம்புகளின் சுவர்கள் வேறுபடுத்துகின்றன.

நாபிக்கொடி அல்லது தொப்புள்கொடி, Umbilical cord, Navel string, Funis (அம்பலைக்கல் கார்ட், நேவல் ஸ்டிரிங், ப்யூனீஸ்). இந்த மார்க்கமாகவே மாயைக்கும், சிசுவுக்கும் சம்பந்தமுண்டாகிறது. இந்தக்கொடி இரண்டு நாபிகொடிகளாலும், ஒரு நாடி நாளத்தினாலும்

மானது. நாபிகொடிகள் நாபிகாளத்தை சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன. இவையெல்லாம் பிசின்போன்றதான ஓர்வித வஸ்துவைக்கொண்ட ஆம்னியன் என்கிற உறையில் அடங்கியிருக்கிறது. நாபிக்கொடி சிசுவின் நாபியிலும், மாயையில் சாதாரணமாய் மத்தியிலுமாக தொக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கொடியானது நீளத்தில் அதிக வித்தியாசப்படுகிறது. இது சராசரி 20 அங்குலம் நீளபிறக்கும். நாபிக்கொடியின் இரண்டு நாபிகொடிகளும் சிசுவிலிருந்து அகத்த இரத்தத்தைக் கொண்டு போய் மாயையில் சுத்திகரித்து அந்த சுத்த இரத்தம் நாபிகாளத்தால் மேல்சென்று சிசுவின் தேகத்தில் பரவுகிறது. சில சமயங்களில் இந்தக்கொடி சின்னதாயிருப்பதால் பிரசவம் தாமதப்படுகிறது; இந்த கொடி பல சமயங்களில் சிசுவின் கழுத்தை யாகிலும், எந்த அவயவத்தையாகிலும் சுற்றிக்கொண்டிருப்பதுண்டு. இது சராசரி ஒரு சுண்டெவிரல் பருமனிருக்கும்.

கருப்பிண்டம், Fetus (பீட்டஸ்). முசல் மாதத்தில் பிண்டமானது பிசிபிசிப்பும், சொற்ப பளபளப்புமுள்ள சிறுசாம்பல்திறக் கட்டியாயிருக்கும். கருவழிகையில் இந்த கட்டியானது சுற்றியிருக்கும் உதிரக்கட்டிகளில் மறைந்து உருத்தெரியாமலிருப்பதால் இதைக்கண்டுபிடிப்பது அரிது.

இரண்டாம் மாதத்தில், பிண்டமானது முன்னிலும் மிகத்தெளிவாய்க் காணப்படும். அது தன்னில்கானே வளைந்திருக்கும். $\frac{1}{2}$ முதல் $\frac{3}{4}$ அங்குலம்வரை நீளமாகவும், 60 தானிய மணிசிறையுள்ளதாயுமிருக்கும். தலையும், கால்களும் நன்றாய்த்தெரியும். முகபரிசுங்களில் சிறு கறுப்புப் புள்ளிகள் போன்று கண்கள் காணப்படும்.

மூன்றாம் மாதத்தில், பிண்டத்தின் நீளம் $2\frac{1}{2}$ முதல் $3\frac{1}{2}$ அங்குலமிருக்கும். சரீரத்தைப் பார்க்கிலும் தலை பெருத்திருக்கும். கண்கள் விகாசமாய் அல்லது பிழிள்

30 ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகளின் தத்துவம்.

சித்தோற்றம். விரல்கள் ஜாடை அப்போதுதான் முதல் முதல் கண்டறியக்கூடும்.

காங்காமாதத்தில், பிண்டத்தின் நீளம் 6 அங்குலமாம். ஆண் பெண் என்பதும் அப்போதுதான் தெரியும்.

ஐந்தாம்மாதத்தில், 9 அல்லது 10 அங்குலம் நீளமாகும். தலையை உலோமம் மூடக்காணலாம். விரல்களில் நகங்களும் உண்டாக வாரம்பிக்கும்.

ஆறாம்மாதத்தில், பிண்டம் 1 பவுண்ட் கனமுள்ளதாகும், உலோமமும் முன்னிலும் கறுப்பாகும். அப்போது கண் இமைகள் உண்டாகவிடும்.

எழாம்மாதத்தில், 3 முதல் 4 பவுண்ட்பாரமும் 13 முதல் 15 அங்குலம் நீளமுமாகும், * சர்மத்தின்பேரில் (வேர்னிக்ஸ் காலி யோசா) வென்ற ஓர்வித பாலாடை மூடியிருக்கிறது. கண் மடல்கள் திறந்தவண்ணமாயிருக்கும்.

எட்டாம்மாதத்தில், 4 முதல் 5 பவுண்ட் பாரமுள்ளதாகவும் 16 முதல் 18 அங்குலம் நீளமுள்ளதாகவும், நகங்கள் பூரணமாக வளர்ந்தும் இருக்கின்றன. பூரண கர்ப்பத்தில் பிண்டம் சராசரி 6½ பவுண்ட் நிறையும் 18 முதல் 20 அங்குலம் நீளமுமுள்ளதாயிருக்கிறது.

கர்ப்பப்பையில் பிண்டமிருக்கும்வகை:—கர்ப்பகாலமுழுதும் கர்ப்பப்பையானது ஏறக்குறைய முட்டைபோன்ற உருவமுள்ளதாயிருக்கிறது. சிசுவும் இவ்வித உருவத்தைக்கொண்டிருக்கும். சிசு சாதாரணமாய் பின் சொல்லப்படும் விதமான நிலையிலிருக்கும்:—முதுகு எலும்பு முன்னோக்கிவளைய தலை கீழ்நோக்கியிருக்கும்.

* சர்மம் = தோல்.

1 வீசைக்கு 3 பவுண்ட் 2 அவுன்சு. 1 அவுன்சு 2½ ரூபாய் எடை.

ஸ்திரீகளின் ஜெனன உறுப்புகளின் தத்துவம். 31

முகவாய்க்கட்டை, மார்புளும்பின்மேல் புதைந்து முகம் வலப்புறம்பார்த்தாற்போலிருக்கும். தொடைகள் வயிற்றின்பேரில் மடிந்து முழங்கால்களும் கால்களும் மடங்கி ஒன்றின்மேல் ஒன்று குறுக்காக இருக்கும். முன்கைகள் மடங்கி மார்பின்மேல் மடிந்திருக்கும். இங்கிலேயில் சிசுவானது கர்ப்பக்குழியில் பொருந்தியிருக்கும்.

3 - ம் அதிகாரம்.

கர்ப்பக்துறிகளும் அடையாளங்களும்.

SIGNS AND SYMPTOMS OF PREGNANCY.

(ஸயின்ஸ் அன்ட் ஸிம்ப்டம்ஸ் ஆப் ப்ரெக்னன்ஸி.)

இவைகளை ஸ்திரீயின் அதுபோகத்திற்கும் உணர்ச்சிக்கும்மாத்திரம்; தெரிந்த, சந்தேகம்மயங்களில் நம்பக்கூடாத அடையாளங்களென்றும், நாம் பார்க்கிறதினாலும், கேட்கிறதினாலும், தொடுகிறதினாலும் அறியக்கூடிய இயல்பான குறிகளென்றும் இவையே வகுக்கலாம்.

அடையாளங்களில் முக்கியமானவை :—

- (a) சூதகம் வரா திருத்தல்,
- (b) காலைக் குமட்டல்,
- (c) வயிறு கோளங்கள், இவைகளின் ஒத்துணர்ச்சி,
- (d) ஸ்தனப் பூரிப்பு,
- (e) பிண்டசலனமும் அதற்குப்பின் உண்டாகும் பிண்டஸஞ்சாரமும்,
- (f) இன்னும் பல அடையாளங்களும்.

(a) சூதகம் வரா திருத்தல்—இதுதான் கர்ப்பமானதைக்காட்டும் முதல் அடையாளமாகும். இது ஒன்றுதான் பிரசவ உத்தேச காலத்தை கணக்கிட, நம்பக்கூடிய முக்கிய ஆதாரமாயிருக்கிறது; ஆகிலும் இந்த அடையாளம் முழுமையும் நம்பக்கூடியதல்ல, ஏனெனில் கர்ப்பமில்லாமலே அநேககாரணங்களால் இவ்வித சூதகத்தையுண்டாக்கும் அதாவது அதிக குளிரான இடங்களிற் செல்லுவதாலும், மனோசலனத்தாலும், பலவீனத்தினாலும், இளைப்பை உண்டாக்கும் இரத்தகாசம், கிராணி முதலியவற்றாலும், உண்டாகும்.

சிலசமயங்களில் இரத்தக் குறைவினால் அப்படியாவதுமுண்டு. முக்கியமாய் கலியாணமாகாத ஸ்திரீகளுக்கு அப்படியாவதுமுண்டு. இவ்விஷயத்தில் அரிச்சய ந்நையுண்டாக்கும் இன்னொரு பிரமேயமுமுண்டு. சிலருக்கு கர்ப்பமானபின்பும்கூட இரண்டொரு முறை அல்லது கர்ப்பகாலமுமுதும் மாததூரம் நீற்காமல் ஆவதுமுண்டு. இது அதிக அருமை. முன்சொன்னது அவ்வளவு சாதாரணமல்லவா அல்லவெனினும் அதற்கு காரணம் அடியிற்கண்டவாறு சொல்லக்கூடும். கர்ப்பமான ஆரம்பத்தில் கருவானது கருப்பை முழுமையும் நிரப்ப அவ்வளவு பெரியதாய் வளர்ந்திராதபடியால், அதைச்சுற்றியிருக்கும் டெலிவோ ரிபெளக்ஸா என்னும் ஜவ்விய டெலிவோ வீரா என்பதற்கும், மத்தியில் இடமிருப்பதால் டெலிவோ வீரா என்ற ஜவ்வியிருந்து, மாததூரம் தாராளமாய் உண்டாகும். மூன்றாம் மாதத்திற்குப்பிறகு டெலிவோ ரிபெளக்ஸாவும், டெலிவோ வீராவும் ஒன்றாய்சேர்ந்துவிடுவதால் அவைகளுக்கு மத்தியில் இடம் இராது. இதன்பிற்பாடு உண்டாகும் சூதகத்திற்கு காரணம்சொல்லவது இன்னும் அதிகவருத்தம். அப்படியாகும் சூதகம் கர்ப்பப்பையின் கழுத்துத் தவாரத்திலிருந்துமாத்திரம்தான் வரக்கூடும். எப்போதும் கிரமமாய் மாததூரம்வந்து கொண்டிருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கு வேறெந்த வியாதியாலன்றி சூதகம்நிற்குமாகில், அவர்கள் கர்ப்பமாயிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அதையே பலமான அத்தாட்சியாகக் கொள்ளலாம். இதனோடு முக்கியமாய் அடியிலும் கிரமமாய் பெருத்துக்கொண்டே வந்தால் அப்படியே என்னலாம்.

(b) காலைக் குமட்டல்—இது அதிகாலையில் படுக்கையிலிருந்து எழுந்தவுடனே உண்டாகிறதினால் இந்தபெயர் இதற்குவந்தது. இது கர்ப்ப ஆரம்ப அடையாளம். இவ்விதக்குமட்டல் சில வேளைகளில் கர்ப்பம்தரித்தவுடனும்

னே ஆரம்பிப்பதமுண்டு. ஆனால் சாதாரணமாக இரண்டாம் மாதத்திற்குமுந்தி ஆரம்பிப்பதில்லை. அது நான்குமாதத்திற்கு அதிகமாயிருப்பதும் அரிது. சாதாரணமாய் வாங்கியவிட கும்ட்டல்தான் விசேஷித்து இருக்கும். கர்ப்பிணியானவன் கும்ட்டலால் காலையில் எதையும் சாப்பிடமாட்டான். ஆனால் பளபளப்பான ஒருவித நீரை அடிக்கொருதரம் வாங்கி எடுப்பான். சில பேருக்கு படிப்படிவாந்தியே ஆகிறது. சிலசமயங்களில் கும்ட்டல் மிகவும் அதிகமாயிருப்பதால் எல்லாப் பரிகாரிப்பும் பிரயோஜனமின்றி கர்ப்பிணியின் தேக்கக் கம் மிகவுக்கெட்டு, பிராண அபாயம்கூட நேரிடும். இந்த அடையாளமானது, வயிற்றிற்கும் கருப்பைக்கு முள்ள உடலிகழ்ச்சியல்லது, சம்பந்தக்கிரியையைக்காட்டுகிறது. இது முக்கியமாய் கர்ப்பாசய நரம்பு ஹனிகளிலுண்பெடுக்கரிப்பு முழு நரம்புகளையும் தாக்குவதா லுண்டாகும்.

(c) வயிற்றிற்குங் கோளத்திற்குமுள்ள ஒத்துணர்ச்சி இது அதிகமாய் உமிழ்நீர் சுரப்பதாலும், பால் கட்டி கொள்வதாலும் சில சமயம் உண்டாகிறது. மஞ்சட்கா மாலைக்கும், சில சமயம் பித்தகழிச்சுவாக்கும் இடம்செய்யும். இவையும் ஸ்மரணைநாம்பின் கோளாறுகள்.

(d) ஸ்தனிய சின்னங்கள்—ஸ்தனங்கள் கர்ப்ப ஆரம்பத்திலிருந்து சிறிசில குறிகளுக்கு இருப்பிடமாயிருப்பதால் அவைகள் மற்ற குறிகளோடு கூட்டிப்பார்க்கும்போது சற்றே முக்கியமானவையாகின்றன. சாகாரணமாக இரண்டாம் மாதத்தில் ஸ்தனங்கள் பூரித்து பளுவாக இருப்பதாய் கர்ப்பிணிகள் முறையிடுவார்கள். இது சிலபோது உண்மையாய் நோவாகவே இருக்கும்; ஸ்தனக்கம்புகளில் இருந்திருந்து சுருக்கு சுருக்கெனக் குறுகுறுத்தோன்றுவதுமுண்டு.

(e) பிண்டசலனம் அல்லது பிண்ட சுத்தநரம்—கர்ப்ப பாசயத்தில் பிண்டமானது உலாவுகிறதாக முகவமுதல் தாய்க்குத் தோன்றுமகாலம்தான் பிண்டசலன கா

லமாம். இந்த உணர்ச்சி - கருப்பையானது, உயர் எழுமப்பீழ், பிண்டசஞ்சாரத்தால் ஜனிக்வும் அதிர்ச்சி தாய்வயிற்றின் சுவர்களில்படுதலால் உண்டாகும். இதுசாதாரணமாய் “மந்தகமனம்” என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இது முதல்முதல் தோற்றுமையில் அடிக்கொருதரம் அருவருப்பான ஓர் உணர்ச்சியுண்டாகிறது. கருப்பையானது பெரிதாகப்பெரிதாக இந்தபிண்டசலனம் அல்லது சஞ்சாரம் அதிக தெளிவாக சாதாரணமாய் சுருக்கென்று உறுத்தும்படியான பல குத்துகளும், உடைகளாகத் தட்டுப்படும். இவை சில சமயங்களில் வயிற்றுச்சுவர்களின் அசைவினால் வெளியில்கண்ணுக்கு நன்றாய்த்தெரியும். இவ்வித அசைவு சிலசமயங்களில் பதினாறாம்வாரத்தவளவு சீக்கிரத்திலும், சில சமயங்களில் இருபது அல்லது இருபத்திரண்டாம்வாரத்திலும் உண்டாகும். இந்த அடையாளம் தாயானவளுக்கு விசேஷமானதாயிருந்தாலும், குடல்களில் வாய்வு வேக சேஷடைகளை அல்லது உபாதைகளை பிண்டசலனமென்று பிசகாய் எண்ணாமலிருக்க அதை நினைப்புக்குக் கொண்டுவருவது நலம்.

(f) இன்னும் பல அடையாளங்கள்—முன்சொல்லப்பட்டவையன்றி கர்ப்பிணி தனக்கு இன்னும் சில அடையாளங்கள் தோன்றுகின்றனவென்பதும் உண்டு. அவையாவன—மர்மஸ்தானத்தில் திளவும், தலையிடியுமாம். மூர்ச்சைவருவதுபோன்ற தோற்றம் சாதாரணம். கர்ப்பமில்லாகாலங்களில் இம்மூர்ச்சை வரப்பெறுத ஸ்திரீகளுக்குக்கூட கர்ப்பகாலத்தில் காணப்படுவதுண்டு. சொத்தைப்பல்லில்லாதவரும் சிலவேளைகளில் பல்நோவுதென்பதுண்டு.

காய சின்னங்கள்.

இவைகள் நம்முடைய சொந்தக்கண், காது, பரிசம் இவைகளினால் அறியக்கூடியவைகளாம். இவற்றுள் முக்கியமானவைகளாவன :—

1. கண்ணால் அறியும் குறிகள்.

- (a) அடிவயிற்றைப்பற்றியவை,
- (b) ஸ்தனத்தைப்பற்றியவை,
- (c) யோனியைப்பற்றியவை.

2. காதால் அறியும் குறிகள்.

- (a) பிண்ட இரத்தாசயப் படப்படப்பு,
- (b) கருப்பையில் உதிரப்பாய்ச்சல் ஓசை.

3. ஸ்பரிசுத்தால் அறியும் குறிகள்.

- (a) பிண்ட சலனம்,
- (b) பிண்ட எற்றம் - இறக்கம்,
- (c) கர்ப்பாசயம் பெருததல்.

கண்ணால் அறியும் குறிகள்.—(a) வயிறு. இது கர்ப்பகிலை மையிலெல்லாம் கடைசியவரைக்கும் வரவரப்பெருந்து வரும். கர்ப்ப ஆரம்ப மாதங்களில், கர்ப்பப் பையா னது கூபக்குழியின் மத்தியிலேயே இருக்கிறது. அதி லுடைய வளர்ச்சியானது யோனிமார்க்கப்பரிசோதனை யால்மாதிரம் தெரியவரும். கர்ப்பப்பை வளரவளர அது கூபகத்தில் அடங்கக்கூடாத அத்தனை பெரிதாகி விடுகிறது. ஏறக்குறைய மூன்றாம்மாத மத்தியிலாவது அல்லது நான்காம் மாதத்தின் துவக்கத்திலாவது கர்ப்ப ப்பபையின் மேற்பாகம் கூபகவிரிம்புக்குமேல் பதமை யாகவும், கொஞ்சங்கொஞ்சமாகவும் எழும்பும். அப் போது அது மிருதுவும், வட்டமூமான ஓர் வீக்கக்கடடி போல் தட்டுப்படும்.

நான்காம்மாதத்தின் கடைசியில் கர்ப்பாசயமானது, மேகனப்பொருத்திற்குமேல் மூன்றுவிரங்கடை அகலத் திற்குவருகிறது.

ஐந்தாம்மாதத்தின் கடைசியில் கர்ப்பாசயத்தின் மேற்பாகம் தொப்புளுக்கும், அங்குலுக்கும் மத்தியில் தட்டுப்படும். ஏறக்குறைய ஆறாம்மாதத்தில் தொப்புள் மட்டத்திற்காவது அல்லது தொப்புளுக்கு கொஞ்சமே லாகவாவது இருக்கும். ஏறக்குறைய எழாம்மாதத்தில்

தொப்புளுக்குமேல் இரண்டு அங்குலம் இருக்கும். இந்த நிலைமையில், நாபியானது கர்ப்பமில்லாதபோது அமிழ்த்தியிருப்பதுபோலிராமல் பெருத்து பிதங்கியிருக் கும். எட்டாம்மாதத்தில், நாபிக்கும், நெஞ்செலும்பின் கடைக்குறுத்தெலும்புக்கும் மகதியிலிருக்கும். ஒன்ப தாம்மாதத்தில் அந்நெஞ்சு எலும்பின் கடைசிக் குறுத் தெலும்பின் கீழிறங்குகிறவகாக்கும் அது வளர்ந்தவண் ணமாயிருக்கும். பிரசவத்திற்கு இரண்டொருவாரத்தி மருமுன் மர்மஸ்தானமுகவிய உறுப்புகள் தளர்ச்சிய டைவதால் கர்ப்பாசயமானது கூபக மத்தியவெளியில் இறங்குகிறது. கர்ப்பிணிக்கு இப்போது முன்னிலும் தான் சிறுத்து இலேசாயிருப்பதாகத்தோன்றும். கர்ப் பிணியின் கருப்பைக்கு ஸ்பரிசுவுணர்ச்சி லெகு கூர்மை யானது. அதிலே கருப்பைக்கு இயல்பானருணம். அது அடிப்புடும் சிறுத்து பம்பர வடிவமுள்ளதாக விருக்கும்.

இஷ்டெரு அடிவயிற்றடையாளம் - நாபிமுதல் அவ் குல்வரையில் - சிலசமயம் அதற்குமேல் நெஞ்சின்கடை சி குறுத்தெலும்புவரையில்-பாவும் ஒரு கறுப்புவரியாம். வயிற்றின் இருபக்கங்களிலும், தொடைச்சாந்துகளிலும் வெளித்தோல் நெகிழ்வதால் வெண்மையான இரோகை கள்தோன்றும். இந்த இரோகைகள் முதல்காப்பத்தை ஈச்சயிக்க மெத்த விசேஷித்த சின்னங்களாம். கர்ப்பக் கடைசி மாதங்களில் வயிற்றின் “கீழ்ப்பாக இரத்த நர ம்புகள்” அதிகப்பெரிதாகும்.

கர்ப்பாசயமானது கைக்குத்தட்டுப்படத்தக்க அத்த னை பெரிதானபோது அதின்பேரில் கைவைத்து அதை நகர்க்காமலும், அழுக்காமலும் பிடித்தால், ஒருவாறு கெட்டிப்படுவதுபோல் ஸ்பந்தமாயத் தட்டுப்படும். கர்ப்பாசயம் இப்படி 5 அல்லது 10 கீமிஷத்துக்கு ஒரு ஆவர்த்தி - அல்லது - சிலசமயம் பல ஆவர்த்தி - விட்டு விட்டு குவிதலும் விரிதலுமுண்டு. இந்நிலை நோய் பொறுத்து அவ்வாறு குவிதல் விரிதல் அரிது. ஆனால்

இக்குவிதல் விரிதல் கர்ப்பகாலமுழுதும் இருந்துகொண்டேயிருக்கும். பிண்ட சலனத்தைவிட அடிக்கடி உண்டாவதனாலும், வேறே எதுவேர்வென்று மயங்க இடஞ்செய்யாமையாலும், பிண்டம் உயிரோடிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் கர்ப்பத்தில் செத்தபிள்ளை அல்லது உருவழிந்த கருவிருந்தாலும், இந்த கர்ப்பாசயத்தின் குவிதல் விரிதல்களமாத் திரும் இருப்பதாய் விளங்கிக்கொண்டிருப்பதால் இவை அப்பிண்டசலனத்திலும் அபிமுக்கியமான குறிக்களாகும்.

(b) ஸ்தனக்குறிகள். ஸ்தனங்களில் ஆரம்பத்திலேயே சில மாறுதல்கள் உண்டாகும். இரண்டாம்மாதத்தில் சாதாரணமாய் ஸ்தனங்கள் பருத்து மிருதுவாகும். அவைகள் வரவரபெரிதும், செட்டியும் ஆகி பச்சை நரம்புகள் ஒப்பெற்றிருக்கும். ஸ்தனக்காமடிலும், அதைச் சுற்றியிருக்குமிடத்திலும் மிகவும் விசேஷ மாறுதல்கள் இருக்கும்; ஸ்தனக்காமடிகள் (நிப்பிள்) அதைத்து புதிதாய் சுரக்கும்பால் வரட்சியினால் அவைகளின் மேல் சாதாரணமாய் பொருக்குக்காணப்படும். ஸ்தனக்காமடிகள் (அரியோலி) மிகவும் பெருத்து விசேஷமாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஓர்வித வர்ணப்பச்சைசேருவதினால் கறுக்கின்றன. சிலத்த ஸ்திரீகளில் அது அறிந்துகொள்ளக்கூடாதபடி கொஞ்சமாக இருக்கும். கறுத்த ஸ்திரீகளின் ஸ்தனங்களில் இது பெரும்பாலும் வியாபித்த அதனால் அவ்வட்டங்கள் சாதாரணமாய் கொஞ்சம் ஏறத்தாழ அசல் கறுப்பாகவிளங்கும். ஸ்தனவட்டங்களில் காமப்பச்சுற்றிலும் இலைபோன்ற அநேக தழும்புகள் உண்டாகின்றன. கர்ப்பமான பிள்மாதங்களில் ஸ்தனவட்டத்தை சுற்றிச் சின்னசின்ன நிறம் மாறுபட்ட, புள்ளிகள் அநேகம் உண்டாகின்றன. இதற்கு “தொடர் ஸ்தனவட்ட” மென்று பெயர். கர்ப்பக்கடைசியிலாவது சற்று முந்தியாவது ஸ்தனகோளங்கள் மிகவும் பெருத்திருந்தால் வெண்மையான இரோகைகள் (சிவ்வர் ஸ்ட்ரீக்ஸ்) கா

ணப்படும். சாதாரணமாய் இரண்டாம்மாதக் கடைசியில் பால்சுரக்கும். சிலகாலம் பால்கொடாதிருக்கும் ஸ்திரீகளில் இஃதினாலேயே அவர்கள் கர்ப்பமென்று நிச்சயிக்கக்கூடாததாயிருந்தாலும், இது அதிக விசேஷித்த குறியாய். ஸ்தனக்குறிகள் முதல்கர்ப்பத்தில் அதிக விசேஷித்தவைகளாயிருக்கும்.

(c) யோனிக் குறிகள். கர்ப்பமில்லாத நிலைமையில் கர்ப்பக்கழுத்தின் தசைகள் கெட்டியாகவும், உறுதியாகவும், சுயந்துகொடுக்குத் தன்மையுள்ளனவாகவுமிருக்கும். கர்ப்பம் ஆரம்பிக்கும்போது கர்ப்பவாய்முதற்கொண்டு வரவர கர்ப்பக்கழுத்துமட்டுமே முழுமையும் மிருதுவாகும். நான்காம்மாதக்கடைசியில் கர்ப்பாசயவாயின் இரண்டு உதடுகளும் தடித்து மிருதுவாகி, தொட்டால் பட்டுபோலிருக்கும், அப்போதே கர்ப்பக்கழுத்தின் தசை மிருதுவாகி அதின்குழி அகன்று வெளி உதடு பெருத்துமிருக்கும். கர்ப்பமாயிருக்கும்போது யோனியின் ஜவ்வானது சாதாரணமாய் ஒருவித ஊதாவர்ணமாயிருக்கும். இது முக்கியமாய் இரத்தம் அவ்விடங்களில் அதிகமாயிருப்பதாலும், பெரிதான கர்ப்பாசயமானது அழுத்துகிறதினாலும், இப்படியுண்டாகும். யோனியானது கர்ப்பமில்லாதபோது இருந்ததைவிட கர்ப்பநிலைமையில் சூடாகவும் ஈரமாகவும் இருக்கும். அப்போது ஒருவித வழுவழப்பான நீர் கர்ப்பக்கழுத்தின் வழியை அடைக்கும்.

காதல் அறியும் குறிகள்.—(1) பிண்டத்தின் ருத்தாசயத்துடிப்பானது தலையணையின்கீழ் இருக்குக்கடியாரத்தின் இரட்டை ஒலிக்கு எப்போதும் ஒப்பிடப்படுவதுண்டு. இந்த இரண்டு ஒலிகளும் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அடிக்கும். முதல் ஒலி பலமாகவும் தெளிவாகவும் கேட்கும், இரண்டாவது சில வேளையில் கேட்கவேகேட்காது. இந்த அடிப்பு நிமிஷத்திற்கு சராசரி 130, அல்லது 120 முதல் 150, அல்லது தாயின் நாடிக்கு இரண்டத்தனையாயிருக்கும். இது முதல்

முதல் 18-ம் வாரத்தில் - அல்லது அதற்குமுற்று முன்னதாகவே - கேட்கும். இந்தக்காலமுதல் 7-ம் மாதவரையில் பிண்டமானது இடம்விட்டு இடம் மாறுகிறதினால் அப்பிண்டம் இருக்கும் இடத்தில்தான் அதின் இரத்தாசயத் துடிப்பும் நன்றாய்க்கேட்கும். பிண்ட இரத்தாசயத் துடிப்பு ஒருதரம் கேட்டுக்கொள்கில் கர்ப்பமாயிருப்பது கெட்டி. அது கேட்கக்கூடாமல்போனால் அதைப்பற்றியே பிள்ளை செத்ததென்று சொல்லக்கூடாது, ஏனெனில் பிள்ளை இருக்கும்பக்கத்தை அறிந்து இரத்தாசயத் துடிப்பை கொடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். அதுவுமன்றி பரிசீலினை எராளத்தாலும் கேட்காது. சிலசமயங்களில் அது ஒருநாள் கேட்டும்; இன்னொருநாள் கேட்காது. பிண்டத்தின்முதுகு சாதாரணமாய் தாயின் இடதுபக்கமாகவும், எதிராகவும் கிரும்பி இருப்பதால் அதின் இரத்தாசயத்துடிப்பு நாடிக்கும் இடது இடம்பெறும்பின் மேல்பொருட்டுக்கும் மத்தியில் வெகுசாதாரணமாய் கேட்கும். வலதுபக்கத்தில் அதே இடத்திலும் சில சமயங்களில் கேட்கும்.

(b) கர்ப்பாசய உதரப்பாய்ச்சல். இது கர்ப்பாசயத்தின் மிகப் பெரிய இரத்தநரம்புக் குழல்களின்வழியாய் இரத்தம்பாய்வதால் உண்டாகும் தும்பி இரைவதைப்போன்ற ஓர்வித சத்தமாம். இந்த சத்தமானது மாயக்குமேலாவது அதின் அருகிலாவது கெட்டியாய்க்கேட்கும். இந்த சத்தமானது சாதாரணமாய் பிண்ட இரத்தாசயத்துடிப்புண்டாக முன்னதாகக்கேட்கும். இந்த சத்தத்தினதன்மை வித்தியாசப்படுவதுமுண்டு: சிலவேளை அது மெல்லன ஊதும் சத்தம்போலவும் சிலவேளை கெட்டியாகவும், உரப்பாகவும் கேட்கும், சிலசமயங்களில் இடைவிடாதுகேட்கும். சில சமயங்களில் விட்டுவிட்டு கேட்கும். பிரசவத்தில் “இடுப்பு கோடுக்கையில்” இந்த சத்தம் சாதாரணமாய் கேட்பதில்லை. அது விட்டுவிட்டு உண்டாவதற்குக் காரணம் கர்ப்பகாலமுழுதும் இருந்திருந்து தோன்றும்

கருப்பை சுருக்கத்தால் என்னலாம். இந்த சத்தம் முதலில் சாதாரணமாய் 16-ம் வாரத்தில் கேட்கும். ஆனால் மெலிந்த ஸ்திரீகளில் சிலசமயம் அதிலும் முன்னதாகக் கேட்கும். இந்தசத்தம் கருப்பையின் எந்த பக்கத்திலாவது கேட்கும். மிகச்சாதாரணமாய் கீழ்ப்புரத்திலும் இரண்டுபக்கங்களில் எந்தபக்கத்திலாவது கேட்கும். ஒவ்வொருநாள் நாடிக்குமேலாவது, கர்ப்பாசயத்தின் மேல்புறத்திலாவது கேட்கும். இதுபோன்ற ஓர்சத்தம் கர்ப்பாசயத்திலுள்ள பெரிய வீக்கச்சட்டிகளினால் அடிக்கொருதரம், கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாலும், வயிற்றுப்பெருக்கத்திற்குக்காரணம் இன்னதுதான்மென்று நாம் தீர்மானிக்க இது உதவாமையாலும், இவ் “வுதி ரப்பாய்ச்சல்” கர்ப்பவட்சணங்களில் ஒன்றெனத்தக்க விசேஷம் உடையதல்ல.

ஸ்பரிசத்தால் அறி திறினை.—(2) பிண்ட சஞ்சாரம். கர்ப்பிணியை மல்லாக்கப் படுக்கசெய்துவயிற்றின்பேரில் கைவைத்து அழுக்க ஒரு தாக்கமாவது, உதையாவது தட்டுப்பட்டால் அது பிண்டம் பலோற்காரமாய்த் தள்ளுதல்; கர்ப்பமாயிருப்பதற்கு இது ஓர் க்ச்சயமான அத்தாகியாம். ஆதிலும் வயிற்றின் கைகள் சுருங்குவதாலாவது அல்லது குடல்கள் அசைவதினாலாவது உண்டாகும் அசைவை இதென்று மோசம்போகாமல் விழிப்பாயிருக்கவேண்டும்.

(b) பிண்டயேற்ற இயக்க சோதனை. கர்ப்பவகாணத்தைக்கண்டறிய ஒரு நல்ல உபாயமென்று. சோதனை விரலால் பரிசீலினை மிதந்துகொண்டிருக்கும் பிண்டத்தை அழுத்தித்தள்ளி, அது திரும்ப மெதுவாய் விரலின் மேல்வந்து தாக்ககாண்பதே இச்சோதனையாம். இச்சோதனையை வெளிப்புறமாகவாவது, உட்புறமாகவாவது அப்பியதிக்கலாம்.

வெளிப்பக்க சோதனை. இதை பின்வருமாறுசெய்யலாம். கர்ப்பிணியை முழங்கால் முழங்கைகளுள்

நிற்கச்செய்ய பிண்டமானது கார்ப்பாசய அடிப்புறத்தில் இறங்கும். அப்போது அந்த அடிப்பாகத்தில் கைவைத்து உயரத்தினை பிண்டமானது பனிக்ஞடத்தின் எதிர்ப்பக்கம் தள்ளுனாடு, கார்ப்பாசயத்தின் அடிப்பாகத்தில் கையின்பேரிலேயே வந்துதாக்கும்.

உட்பக்கச்சோதனை. கர்ப்பிணியை கட்டிவிட்டுப் பேரில் அரைக்காரலாய் உட்காரச்செய்து இச்சோதனையை மிகவேகாய் முடிக்கலாம். இடது சோதனைகைவிரலை யோனிச்சுவர்முலமாய் கருப்பைதட்டுப்படுத்தி மட்டும் செலுத்தி, வெளிப்புறமாக கருப்பையின் அடியை வலதுகையால் நிலைநிறுத்தி, இடதுகைவிரலால் சட்டெனத் தள்ள பிண்டம் பனிரீர்ப்பையில் மேலெழும்பி சோதனைவிரலுக்கு தட்டுப்பட்டக்கடியவிதமாய்திரும்பி இறங்கும். இந்தசோதனை 4-ம்மாதமுதல் 7-ம் மாதவரையில் செய்யக்கூடியது. 4-ம் மாதத்திற்குமுந்தி பிண்டம் அதிககிள்ளாதாக இருக்கும். 7-ம் மாதத்திற்குமுற்கு மிகப்பெரிதாகியிருப்பதால் அது பனிரீரில் கிளையும் சுவபமாய் கிளப்பக்கூடாததாகும். எனினில் அறியக்கூடுமானதாகில் இது உண்மையான கர்ப்பக்குறி. இதனால் பிண்டம் உயிருள்ளதோ இல்லதோ வென்று அறியக்கூடாது. இந்தசோதனையில் (பலாட்மென்டு) பிண்டசவனியில்லாவிடில் அதை கர்ப்பமின்மைக்கு அத்தாட்சியென்று கொள்ளக்கூடாது. ஏனெனில் சிசு இடம் புரத்தல்-மாயை கர்ப்பாசயக்கழுத்தினமேல் புதைதல் ஆகிய சில நிலைமைகளில், இது அறியக்கூடாமையால்தான்.

(c) கர்ப்பாசயப் பெருக்கம். 4-ம் மாதத்தில் கர்ப்பினியை மல்லாக்கக்கிடத்தி பார்த்தால் மேகனப்பொருத்திற்குமேல் கருப்பையானது ஒருவாறு நன்றாய்த் தளர்ந்தாற்போலதென்படும். ஆகையால் கர்ப்பமென்பதற்கு அனேகமான குறிகளும், அடையாளங்களும் இருந்தபோதிலும் அவற்றினால் சிலவற்றை தான் நிச்சயமென்று நம்பக்கூடும். நிச்சயமாய் அல்லது

உறுதியாய் நம்பக்கூடிய கார்ப்பக்குறிகளும் அடையாளங்களும் அவன :—

1. பிண்ட இரத்தாசயத்துடிப்பு.
2. பிண்ட சலனம் அல்லது பிண்டம் உலாவுதல் :
இது மருத்துவச்சிகியைக்கொண்டு அறிந்துகொள்ளத்
தக்கது.
3. பிண்ட ஏற்ற இரக்கச்சோதனை (பலாட்டம்
ண்டு - Ballottement).

இந்தக்குறிகளோடு, முக்கியமாய் முதல்காப்பத்தில் இருந்து இருந்து கருப்பைச்சுருந்தலையும் ஸ்தனம் களிக்காணும் புதுப்பால் காப்பையும் ஒருவாறு கூட்டிக்கொள்ளலாம்.

பிக்கொள்ளலாம்.

கருப்பகால அளவு.—இதைச் சூதகம்வராமல் நிரும் தேதிமுதற்கொண்டு கணக்கிடுதல் உத்தமம். பிரசவங்கள் பெரும்பான்மையும் மாதவிடைந்தான் 274-ம் நாள் அல்லது 230-ம் நாளுக்குள் நேரிடுகின்றன. சராசரி காலம் 278-ம் நாள். ஆனால் இதற்கு முன்னும் பின்னுமாகப் பிரசவங்கள் ஆவதனால் காப்பகாலப் பின்னுமாகப் பிரசவங்கள் ஆவதனால் காப்பகாலப் பிரமாணத்தைக் கணித்தலைக்குறித்து பண்டிதர் எம் டன் கூற துரை விதித்தவியாவது—“ஸ்திரீயானவளுக்கு முதல்முதல் சூதகம் நின்றதினத்தைக் கண்டுபிடித்து அந்த தினத்திலிருந்து 9 மாதம் அல்லது 275 நாட்களை எண்ணவேண்டும். ஆனால் இந்தமாதங்களில் பெப்ரவரியாதம் வருமாகில் 273 நாட்கள்தான் கணக்கு. இந்த நாட்களோடு, முன்சொன்ன 275 நாள் கணக்கில் 3 நாட்களையும், பின்சொன்ன 273 நாள் கணக்கில் 5 நாட்களையும் கூட்டி 278 நாட்கள் சம்பவிக்கக்கூடிய வாரத்தின் - மத்தியை அல்லது இக்கணக்கை இன்னும் திட்டமாய்ச் சொல்லவேண்டுமென்றால் அவற்றுக்கு இரண்டுவாரத்தின் மத்தியை காட்டுவதாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இக்கணக்கின் முன்பாகவும், பின்ன

கவும் ஆறும் பிரசவங்களுக்குச் சற்றே நாட்களைக்கூட்டிக் குறைத்துக் கணக்கிடவும்.”

பிரசவவேதனைவருகைக்குக் காரணம் கர்ப்பமான பிறகும், தூரம்வரும் நாட்களில் வழக்கப்படியுண்டாகும் சினைப்பைக்கிளர்ச்சியென்பார்கள். பத்தாம்மாதத்தில் பிண்டம் பூரணபக்குவமாக, நஞ்சுக்கொடியும் அதன் உறுப்புகளும் அழுக்கத்தொடங்கி தத்தம் தொழில் களைச்செய்ய வுதவாதனவாய்ப்போக, கர்ப்பம் உண்டாகாதிருந்தால் எத்தினத்தில் மாதவிடைவருமோ அத் தினத்தில் இச் “சினைப்பைக்கிளர்ச்சி” தோன்றி, அது கர்ப்பாசயச்சுருங்குதலை உண்டெண்ணும். இச்சுருங்குதல்தான் பிரசவவேதனைக்குக்காரணம். ஏழாம்மாதமுடிவுமட்டும் பிண்டமானது சுயஜீவியல்ல - அதாவது - தாயின் மாயையோடுள்ள சம்பந்தம் அறுபட்டுப்போனால் பிழைக்கமாட்டாது. அவ்வேழுமாதம்கடந்தபின்பு பிழைக்கவும் ஜாக்கிரதையாய் வளர்க்கப்படவும் கூடும். பிண்டமானது பூரணநிலையைக்கூட்டிக்கிட்ட அது பிழைத்தற்கு எது உண்டென்னலாம்.

4 - ம் அதிகாரம்.

கர்ப்பகால வியாதிகள்.

DISORDERS OF PREGNANCY.
(டிஸஆர்டர்ஸ் ஆப் பிரக்னன்ஸி.)

கர்ப்பிணிகளல்லாத ஸ்திரீகளுக்கு வரும் வியாதிகளே கர்ப்பிணிகளுக்கும் வருவது சகஜம். ஆனால் இந்த அதிகாரத்தில், ஸ்பஷ்டமாய் கர்ப்பிணிகளுக்கே உரித்தானவைகளென்று கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வியாதிகளைக் குறித்து சொல்லவேண்டியதாயிருக்கிறது. சில வியாதிகள் மிகவும் அற்பமாயிருப்பதினாலே கொஞ்சக்காலம் மாதிரி அசந்தர்ப்பத்தை விளைவிக்கும். சில வியாதிகள் மிகவும் கொடியவையாயிருப்பதால் கர்ப்பிணியின் உயிருக்கே அபாயமாகும். சில வியாதிகள், உட்காரணங்களென்னத்தக்க பாரமான கருப்பை நெருங்குண்பதாலும், கர்ப்பமானது புரளுவதாலும் உண்டாகும். வேறு சில ஒத்துணர்ச்சியால் ஜனித்த வேக்காட்டினாலும், கர்ப்பநிலைமையால் உண்டாகும் நெருக்கம் முதலிய தெரிதற்கரிய ஆழமார மாறுபாட்டினாலும் உண்டாகும்.

கர்ப்பநிலைமையில் விசேஷமும்பட்டலும், வாக்ஷியும், பெரும்பான்மை சங்கடமாயும் குறுபான்மை அபாயமாயும் இருக்கின்றன. சில வேளைகளில் வாந்தியானது காலையில் மாதிரி உண்டாகும்; அப்போது ஆஹாரம் வெறுக்கப்படும். அதன்வி ஓர்வித உயிழ்நீரம் வாயில் சுரந்துக்கொண்டு பித்தத்தோடு கலந்துவரும்; மத்தியானவேளையில் சாப்பிடுவதற்கும்; குமட்டலும் இவ்வாறிருக்கும்; சிலருக்கு குமட்டலும் வாந்தியும் ஓயாமலிருக்கும். கர்ப்பிணி எந்நேரமும் நோயாய் இருப்பான் அன்னத்தை சும்மா ருசித்தாலும் பார்த்தாலும் அதிக உபத்திரபமான வாந்தியுண்டாகும்.

பரிசீலிப்பு.—மலபந்தமிருந்தால் அந்த நீக்கவேண்டியது. மல்லாக்கப்படுக்கவே கூட்டாயஞ்செய்யவேண்டும். வயிற்றுக்குழியில் கடுகுப்பற்று (மஸ்டர்ட் பினாஸ்டர்) போடுவதால் சுகமுண்டாகும். 20 கிதேன் (grains) (பைகார்போனெட் ஆப் பொட்டாஷ்) என்ற உப்பு மருந்தில் எலுமிச்சம்பழ ரஸம்விட்டு, அது பொங்கி யெழும்பும்போது குடிக்கக்கொடுக்க வயிற்று உபத்திரவத்தை சாந்தியாக்கும். 10 அல்லது 15 துளி அபினி திராவகம் (லாட்னம்) கொடுத்தல் நலம். கர்ப்பிணியா னவன் காலையில் தன் படுக்கையைவிட்டு எழுந்திருக்கச் சற்றுமுன்னமே கொஞ்சம் ஆக்ராம் சாப்பிடவேண்டியது. இதற்கு கொடுக்கக்கூடுமென்ற மருந்துகளாவன:—அதிகமும்முரமான குமட்டிலும் வாந்தியிலும் ஒருமணிக்கு ஒரு விசையும் அத்தனை அபாயமில்லாத பட்சத்தில் தினம் மூன்று அல்லது நான்குவிசையும் துளிக்கணக்காய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இபிகாக் வைனம் என்றும் மருந்தைத் தரலாம். (ஆக்ஸெலெட் ஆப் சீரியம்) என்ற பஸ்பத்தை 3 முதல் 5 கிதேன் (grains) மாத்திரைகளாகத் தினம் 3 முறை கொடுக்கலாம். பரிசீலிப்புக்கள் எல்லாம் பிரயோஜனப்படாமற்போய் கர்ப்பிணியும் மிகவும் ஒடுங்கி படுகிடையாய் சிடக்கும் அத்தனை கேவலஸ்திதிக்கு வந்துவிடுவானாகில், கருவையழிப்பது ஆவ்சியகமாகலாம். ஆறிலும் இதை மற்றவர்களோடு கலந்து ஆலோசியாமல் செய்யப்படாது.

போசனத்தில் முழுதும் விருப்பத்திப்போகுதல், அகால கள்ளப்பசி, வயிற்றுவேதனை புளியேப்பம், அஜீரணம் இவையெல்லாம் கர்ப்பிணிகளுக்கு உண்டாவதும் வெறுப்பாயிருக்கும். சில சமயங்களில் மெத்த அபூர்வமான பதார்த்தங்களை சாப்பிடவும் ஆத்திரமுண்டாகும் இதுதான் மசக்கை “லாங்கிங்ஸ்” என்னப்படும்.

பரிசீலிப்பு.—போஜனபத்தியம் திரமப்படி காலோசித்யாய் கொடுத்துவரவேண்டும். சுகத்தைக் கெடுக்கும் படியானதும் அஜீரணமேறாததுமான போஜனபதார்த்தங்களை விலக்கவேண்டும். (சோடா) உப்பாவது, மாக்னீஷியா உப்புரவது நெஞ்செரிவையும் வயிற்றின்புளிப்பையும் நிவர்த்தியாக்கும். ஒழுங்காய்ச் சாதாரணமாய் மலம் கழியும் படியாக சிற்றமுணக்கெண்ணெயை யாவது, அதிமதுரசஞ்சுரணத்தை (காம்பவுண்ட் லிக்கரிஸ் பஸ்டர்) யாவது ஒரு தேயிலைக்காண்டியளவு இடைக்கிடை கொடுத்து வயிற்றுபாதையை நீக்கலாம்.

பேதி.—இது கர்ப்பமாயிருக்கும்போது சிற்சிலவேளைகளில் உண்டாகிறதுண்டு, இது அதிகப்படுமாகில் அகாலபிரசவம் (பிரிமெட்கூர் லேபர்) உண்டாகும்.

பரிசீலிப்பு.—பேதி அதிகமானால் அதை சாதாரணமாய் மிதுத்துவதுபோல் சீமைச் சுண்ணாம்பு கலப்புடன் (ச்சாக் மிக்ஸ்சர்) கொஞ்சம் அபினிதிராவகத்தை (லாட்னம்) அல்லது (குளோறடயினை) சேர்த்து கொடுக்கலாம். மலபந்தத்தோடு பேதியும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடுமென்று மனதில் வைக்கவேண்டும்.

மலபந்தம்.—இது கர்ப்பிணிகளுக்கு வெகு சாதாரணமானது. நிறை கர்ப்பாசயமானது மலக்குடலை நெருக்குவதாலும் கர்ப்பகாலத்தின் உதிரஸ்திதியினாலும் மலபந்தம் உண்டாகும்.

பரிசீலிப்பு.—முதலாவது சாப்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தவேண்டியது: புதிதான பழங்களும், மாக்கறிவகைகளும் சாப்பிடச்செய்யவேண்டும். வாற்கோதுமையும், ஓட்ஸ் என்னும் தானியமும் பிரயோஜனப்படும். படுக்கப்போகும்போது ஒரு தேயிலைக்காண்டி கந்தகத்திதி அளவு அதிமதுரசஞ்சுரணமாவது (காம்பவுண்ட் லிக்கரிஸ் பவுடர்) சாப்பிடுவதினால் வெகுவாய் பிரயோஜனகரமா.

யிருக்கும். சோப்பும், தண்ணீரும் கலந்து பீச்சாங்குழி
லால் ஆசனத்திற்குள் செலுத்தலும் (எஸ்டி.டி.) வெகு
வாய் நல்லது. இது ஜீரணசக்தியைக்கெடுக்காது. கர்ப
காலமுடிவில் மலக்குடல்நிறைந்து சங்கடமான ஒருவித
பொய் இடுப்புநோயையுண்டாக்கும். மலத்தை பரிஷ்
காரமாய் கழித்தவிடத்தருந்த அளவாய் கிற்றாமணக்
கெண்ணெய்கொடுப்பது ஆவகியகம்.

மூலம்.—இதுவும் ஒரு சங்கடமான கர்ப்பகாலநிலை
யும். இதற்கு தருந்த சிகிச்சையாவது பிரதிநிலைமும் மல
த்தை இலேசாய் கழியச்செய்வதேயாம்.

நீர்க்கட்டி.—இது கர்ப்பிணிக்கு ஒரு சாதாரணமாய்
உண்டாகும் அடையாளம். கர்ப்பாசயம் நிலைபுரளுவ
தாலும் அடிக்கடி கர்ப்பாசயம் பின்னுக்கு வளைவதா
லும் (ரிட்ரோவர்டன்) அல்லது முன்னுக்கு வளைவதா
லும் (ஆன்டிவர்டன்) இது உண்டாகும். சோதிக்கும்
போது மூத்திரப்பை மிகவும் பெருந்து கர்ப்பிணிக்கு
அதிலிருக்கும் நீரை வெளியிட சக்தியில்லாதிருந்தலா
ல், அடிக்கொருகரம் கொஞ்சம்கொஞ்சமாய் நீர் இறங்
கும். இதனால் கர்ப்பிணியானவள் நீர் இறங்கிவிட்ட
தாக எண்ணி நீர்க்கட்டை பாராட்டாமலிருப்பாள்.
யோனிமார்க்கமாய் சோதிக்கும்போது பின்பக்கம் திர
ம்பிருந்தும் கர்ப்பாசயக்கூழ்த்து மேகைப்பொருத்திறு
ப்பின இருக்கும். கூபாத்தின் மத்தியவெளியை வட்
டமானகட்டி ஒன்று அடைத்துக்கொண்டிருக்கும்.

பரிகரிப்பு.—உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட சாதா
ரண ஆயுதத்தை செலுத்தக்கூடாதபடி நீர்த்துலாரம்
நீண்டு இறுகிக்கொண்டிருப்பதால் நீண்டதும் வளையு
தக்கதமான மூத்திரக்குழலால் நீரை வெளியிடுபதி
புரண்டிருக்கும் கர்ப்பாசயத்தை நிமிர்த்தவேண்டியது
கர்ப்பிணிக்கு மயக்கம்கொடுத்து இடதுகையின் இரண்
டொரு விரலை ஆசனக்குடலுக்குள் செலுத்தி, கர்ப்பா
சயத்தின் அடியை பீடிகையின் மேல்முனைக்கு மேல்தன்

எரிக்கொண்டு அதேகாலத்தில் யோனியில் செலுத்தியிரு
க்கும் வலதுகை விரல்களால் கர்ப்பக்கழுத்தைக் கீழ்க்
கிழுத்து, கர்ப்பாசயமானது சரியானநிலையில் நிிற்கும்
படியாக நோயாளியை குப்புறப்படுத்திருக்கச்சொல்ல
வேண்டியது.

கர்ப்பநட்டம் (கருவழித்தல்).

ABORTION (அபார்டன்).

கருவழிதலென்பது, கரு அல்லது பிண்டம் இரு
பத்தெட்டு வாரத்திற்குமுன் அதாவது அது தாயின்
உதவியின்றி (சுயஜீவியாய்) பிழைக்கக்கூடியதற்கு முந்
தி வெளிப்படுவதாம். இது பலமுறைகளில் உண்டா
கிற சம்பவம். ஸ்திரீகளில் அநேகம்பிள்ளைகளை பெற்ற
வர்கள் தங்கள் ஜீவியகாலத்தில் ஒரு முறையாவது பல
முறையாவது கருவழிக்காதவர்கள் மிகச்சிலர். இது
பிராணநஷ்டத்தை உண்டாக்குவதானது. ஆனால் கரு
வழித்தபின் அதிக உதிரம்சாய்வதால் பலசமயம் இது
அதிக பலவீனமுண்டாக்குகிறது. சாதாரண பிரசவத்
திற்குப்பின்பு ஸ்திரீகள் ஜாக்கிரதையாய் இருப்பது
போல் கருவழிவுக்குப்பின் ஜாக்கிரதையாயிராமையிற்
காலத்தில் நானுவித கர்ப்பவியாதிகளுக்கு காரணமா
கின்றது.

கர்ப்பகாலநிலையின் பற்பலமாதங்களில் உண்டாகும்
கருவழிவு அதிகமாய் கர்ப்ப ஆரம்பமாதங்களில் உண்
டாகிறதுமுண்டு-எனினில் அக்காலத்தில் (கோரியன்)
என்ற ஜவ்விற்கும், (டெசிவோ) என்ற ஜவ்விற்கும் சம்
பக்கம் உபாயமாய் இருப்பதாலேயாம். இப்படியாக
கருவழிவு மூன்று அல்லது நான்காம்மாதவகையில்
உண்டாவது சாதாரணமாம். கர்ப்பமானபிறகு ஆறு
வாரம் முதல் இரண்டுமாதத்திற்குள் உண்டாகும். கரு
வழிவில் (கோரியன்) (டெசிவோ ரீப்ளெக்ஸ்) என்ற
ஜவ்வப்போர்வையுடன் கருவானது வெளியாகும்.
ஆறுவாரத்தில் கருவானது மிகவும் துட்பமானதா

யிருப்பதால், கருவழிவு தோற்றாமலே போய்விடும். ஸ்திரீகளுக்கு இரண்டொருவாரம் தின் துவரும் சூதகம் அதிகமாய்வருவதால், அப்படி யாகின்றவைகளெல்லாம் கர்ப்பத்துவக்கத்திலே கருவழிந்தமைக்கு அத்தாக்ஷிக ளாம். மூன்று, நான்குமாதங்களில் ஆகும் கர்ப்ப நஷ்டத்தில் கர்ப்பம் சுருங்குவதினாலே, ஜவ்வுகள் வெடித்து பிண்டம்மாத்நிரமே முதலில் தள்ளுண்ணப்படும். பிறகு நஞ்சுக்கொடியும் மாயையும் தள்ளுண்ணப்படும். சில சமயங்களில் கரு வெடியாமல் எல்லாம்சேர்ந்து ஒரே மொத்தமாக வெளியாகும். இது பிண்டம் தள்ளுண்ணப்படுவதற்கு முன் நசிந்துபோயிருக்குமானால், இப்படியாகும் - ஏனெனில் அப்போது கர்ப்பப்பைக்கும், மாயைக்கும் சம்பந்தமில்லாமல் போகித்தினுலென்க.

காரணங்கள்.—கருவழிவுக்குக் காரணங்கள் அநேகம். அக்காரணங்கள் (a) தாய், (b) பிண்டம், (c) மாயை, அதின்ஜவ்வுகள் ஆகிய இவைகளைப்பற்றியிருக்கும்.

(a) தாயைப்பற்றிய காரணங்கள்.—கர்ப்பப்பைக்கும் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் அதிக ஒத்துணர்வுண்டு. அதனால் இந்த உறுப்புகளில் உண்டாகும்படியான வியாதி அல்லது அதிர்ச்சி கருவழிவையுண்டாக்கக்கூடும். மேகவியாதி, கர்ப்பாசயம் பின்புறந்திரும்புதல், விடாவாந்தி, அகஸ்மாத்தான சந்தோஷம்; துக்கமுதலிய பல மன எழுச்சிகள் இவையனைத்தும் கர்ப்பநஷ்டத்துக்கு ஏதுவாகும். சில சமயங்களில் மருந்து பிரயோகமுதலிய செயற்கை சாதனங்களாலும் கர்ப்பம் கறைப்படுகிறதுண்டு. அளவுக்குமிஞ்சின சரீர அப்பியாசமும் ஓர் காரணமாம்.

(b) பிண்டத்தைச்சேர்ந்த வியாதிகள்.—மேகவியாதி, அடி வயிற்றுப்பாசக்கட்டு ஜவ்வுகளின் வேக்காடு, குண்டிக்காய் அல்லது கல்லீரலின் பிணிகள் அல்லது பிண்டநாசத்துக்கேதுவான எந்தவியாதியும் கருவழிவுக்குக் காரணமாகும்.

(c) கருவைச்சுற்றிய ஜவ்வின்வியாதி.—மாயையின் கொழுப்பு சகாதல், அழற்சி, (கோரியன்) ஜவ்வில் உண்டாகும் நீர்வியாதி இவையெல்லாம் கருவழிவுக்குக் காரணங்களாகும்.

குறிகள்.—கட்டிவருகின்ற கர்ப்பநஷ்டத்தை அறிவிக்கும் முன்குறிகளில் ஏறக்குறைய இரத்தங் காணப்படுவொன்று. இந்த இரத்தம் முதலில், கொஞ்சமாய்க்காணப்படும், சிலநாள்களில் திரும்ப சிலநாட் சென்று உண்டாகும்; அல்லது துவக்கத்திலிருந்தே உதிரப்போக்கு ஏராளமாயிருக்கும். கொஞ்சக்காலம் பொறுத்து கருப்பையானது கிரமமாய் விட்டுவிட்டுக் குவியவும் விரியவும் ஆரம்பிக்கும். முடிவில் பிண்டமும் விழுந்துவிடும். கர்ப்ப ஆரம்பகாலமாயிருந்தால் முழுக் கருவும் சிறிதும் கஷ்டமில்லாமல் சுற்றியிருக்கும் உதிரக்கட்டிகளோடு பெரும்பாலும் தோற்றமல் வெளிவந்துவிடும். ஆகையினாலே வெளிகாணும் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்ப்பது ஆவசியகம். இரண்டாம் மாதத்திற்குப்பிறகு சுருங்கிவருக்கும் கர்ப்பக்கழுத்துத் தடைப்படுத்துவதனால் அது பூரணமாய் விரிந்து பிண்டம் வெளிப்பட்ட கொஞ்சம் சாவகாசமாகும். பரீட்சையில் (எப்போதும் பழக்கத்திலிருக்கவேண்டிய) யோனியில் மார்க்க பரிசோதனையில் கர்ப்பாசயவாய் கொஞ்சம் திறந்தவண்ணமாய்க்காணப்படும். பிண்டம் கர்ப்பாசயவாயண்டை வெளிப்பட்டிருக்கும் அல்லது கொஞ்சம்வெளியாகத்துன்னிக்கொண்டிருக்கும். கருப்பையானது இருந்திருந்து சுருங்குவதால் கெட்டியாய்த் தட்டுப்படும்.

பரிசீலிப்பு.—கர்ப்பநஷ்டத்தை தடுக்கக்கூடாமா அதாவது கர்ப்பத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடாமாவென்று முதல் முதல் நிச்சயிக்கவேண்டியது. உதிரம் அதிகப்படாமல் கர்ப்பவேகனை கொஞ்சமாயிருந்தால், அல்லது முற்றிலும் இல்லாதிருந்தால், யோனிசோதனை செய்யும்

போது கர்ப்பாசயவாய் விரியாதிருந்தால் கருவழிவு உண்டாகாதென்று நம்ப நியாயமுண்டு. அப்போது அதைத் தடுப்பதற்குரிய பரிகரிப்புச் செய்யவேண்டியது. இந்த பரிகரிப்பாவது—கர்ப்பிணியை யாதொரு வேலையும் செய்யலொட்டாமல் மல்லாக்கப் படுக்கச் செய்து 3 அல்லது 4 மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை 20 குளி அபினிதிராவகம் (லாட்ன்ம்) கொடுக்கவேண்டும். இந்த அபினி திராவகத்திற்குப் பதிலாக (க்ளோரல் ஹைட்ரேட்ஸ்) 15 கிதேன் (grains) எடையாவது, க்ளோறடைன் 20 அல்லது 25 குளியாக இரண்டு மூன்று அளவு (டோஸ்), இரண்டுமணி நேரத்திற்கு ஒருமுறையாக கொடுக்கலாம். ஆகாரம் உபாயமானதாகவும், இலாகிரியற்றதாகவும் இருக்கவேண்டியது. அப்படிக்கன்றி கர்ப்பவாயானது திறக்க ஆரம்பித்து, பிண்டத்தைத் தொடும்படியாக உன்விரலே உட்செலுத்தக்கூடியொனால், அதனோடு முக்கியமாய் கர்ப்பாசயச் செய்கையும், இருக்குமாகில் கருவழிவு தப்பாமல் உண்டாகுமென்று நினைக்கலாம். ஏனெனில் அவை கருவை வெளிப்படுத்துவதற்கு சூறிகளாகும். பிண்டமானது கர்ப்பவாயினிடமிருந்து ஒரு பக்கமாய் பிதுங்கியிருக்குமாகில், அது வெருவாய் பற்றற்று போயிருக்கும்; மேலும் அதைக் கையால்கொஞ்சம் அசைத்தால் அது சுலபமாய்வந்துவிடும். ஆகிலும், உதிரம் மட்டாயிருந்து கர்ப்பச்செய்கையானது மும்முரமாயிருக்குமானால் யாதொரு உதவியும் வேண்டாமலே கருப்பை பிண்டத்தை தள்ளுமாதலால், பொறுத்து காத்திருப்பது நலம். அனாஸியமாய் விரலிட்டு அழுத்திப்பார்ப்பதினால் கர்ப்பக்கழுத்துசுருங்கி இசிவுகண்டு அதினால் அபாயமும் அதிகரிக்கும். உதிரப்பிரவாகமாயிருந்தால் செயற்கை உதவி அவசியமாம். செயற்கை உதவி வேண்டியபோது பின்வருமாறு செய்யவேண்டும்.—கர்ப்பிணியை மல்லாக்கப் படுக்கச்செய்து வயிற்றின் தசைகள்தளர்ச்சியாகும்படி துடைகளை உயர்த்துக்கச்செய்து

ய்து நீ கர்ப்பிணிக்கு இடதுபுறமாகின்று உன் வலது உத்தங்கையினால் மேகனப்பொருத்திற்குமேல் கர்ப்பாசய அடிப்புறமானது கூபகமத்தியவெளியில் படியும்படியாக அமிழ்த்து. இப்படியெய்வதினால் யோனி வழியாய் செலுத்தியிருக்கும் விரல் கருப்பையை சுலபமாய் எட்டிக்கொள்ளவும், வெளியேவைத்திருக்கும் கை அந்த உறுப்பைத்தாராளமாய்ப் பிடித்தாளவும். இடம்பெறும். கர்ப்பஅழிவில் கர்ப்பாசயமானது சாதாரணமாய் கூபகத்தின் அடியில் இறங்கியிருக்கும். யோனி தளர்த்திருப்பதால் அதை எட்டிப்பிடிப்பது பெரும்பான்மை கஷ்டமானதல்ல. கர்ப்பாசயத்தை ஸ்வாதினமாய்க் கையாட யோனியில் சிலவேளைகளில் கைமுழுமையும் செலுத்தவேண்டியவரும். இது பிண்டம் கர்ப்பாசயத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருந்தால் முக்கியம் செய்யவேண்டியகாரியம். கர்ப்பாசயக்குழிக்குள் விரலைச்செலுத்தி அதையும் அப்படியே அகிளமேற்புறத்தையும் சுற்றுப்பக்கமெல்லாம் ஒட்டுக்கும் பெருக்கி மெடுத்தாற்போல் தடவி ஆராய்க்கு கூட அழிக்குவதால் பிண்டம் வெளிப்படும். சிலசமயங்களில் பிண்டம் வெளியாடபின்பு நஞ்சுக்கொடியின்பேரில் கர்ப்பாசயம் சுருங்கும். மேலும் கர்ப்பக்கழுத்து இசவிவிடத்து சுருங்குகிறதினால் நஞ்சுக்கொடி உள்நங்கிவிடும். கர்ப்பக்கழுத்தின் சுருங்குகையைத் தடுப்பது முதலாவது கஷ்டம். நஞ்சுக்கொடியை ஒழிக்க கர்ப்பக்கழுத்துவிரிய கொஞ்சம்நேரம் செல்லும். அதுபற்றி உதிரத்தை மட்டுபடுத்தும்படியாக கர்ப்பப்பையை சுருங்குவிக்க சிறுசில சாதாரண உபாயங்களைச் செய்யவேண்டியது. மூன்றுமணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை தண்ணீரில் $\frac{1}{2}$ டிராம்முதல் 1 டிராம்வலையில் (ஸ்குட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப் எத்கெட்) கொடுக்கவேண்டியது. வயிற்றின்மேரில் (ஐஸ்) பனிக்கட்டிவைக்கலாம் அல்லது ஐஸ்தண்ணீரை பிச்சுக்குழலால் ஆசனத்துவாரத்தால் செலுத்தலாம். இன்னும் உதிரம் நிற்காமலிருந்தால்

கர்ப்பாசயவாயை நீண்ட நூல் அல்லது கயிறு கட்டின “விண்ட்” என்ற பஞ்சுத்துணித் துண்டினாலாவது ஸ்பன்ஜ் துண்டினாலாவது அடைக்கலாம். இவைகள் கர்ப்பாசயவாய்க்கு ஓர் அடைப்பாகி உதிரத்தை கிறுத்துவதுடன் அதை விரியவுஞ்செய்து அதிலடங்கிய கருவின் சேஷத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு உதவியாகின்றன. கர்ப்பவாயானது நன்றாய் அகன்று உள்ளவெல்லாம் ஒழிந்து கிர்ப்பலமாகிவிட்டால், பிற்பாடு உதிரக்கிவி இருப்பது அரிது. கர்ப்பிணிக்கும் மோசமில்லை. சிற் சில தருணங்களில் கர்ப்பாசயங்காலியாகியும், தேகத் தளர்ச்சியினாலாவது மற்ற எந்தக் காரணத்தினாலாவது உதிரம் கிழங்கு வந்துகொண்டேயிருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட சமயங்களில் இரு ம்புகிராங்கம் (சொலாஷன் ஆப் பெர்க்குளோரைட்) ஆயில் அல்லது நான்சில் ஒருபாகம் எடுத்து கர்ப்பாசயத்தை சுத்திப்பூச, ல்லமாம். எல்லாச்சமயத்திலும் வயிற்றிற்கு கெட்டியான இடுப்புக்கட்டு (பயிண்டர்) கட்டவேண்டியது முக்கியம். வேண்டுமானால் ஒரு சிறு பஞ்சுணை (pad)யுஞ் சேர்த்துக்கொள்ளவும். வெளிகாணும் எல்லாவற்றையும் வைத்தியர் கண்ணோக்கத்திற்கென்று பத்திரம்செய்து வைக்கவேண்டுமென்பதாய் திட்டம்செய்யவேண்டியது. உதிரக்கட்டிகளை தண்ணீரில் அலம்பி ஜாக்கிரதையாய் பரிசோதிக்கவேண்டியது.

விபரீத கருத்தரித்தல்.

ABNORMAL PREGNANCY.

(ஆபதார்ப்பம் பிரக்னென்ஸி.)

கர்ப்பத்தின்மேல் கர்ப்பம், Super-foetation (சூப்பர் டீட்டேஷன்) என்பது கர்ப்பப்பையில் ஒருகரு தரித்தபிறகு அதனோடு மற்றொரு கருத்தரித்தலுக்கு சொல்லப்படும். இது கர்ப்பத்தரித்த முதல்வாரத்தில், (டெலிவேராவின்) இரண்டுகாலங்களும் சேருமுன்னேதான் சம்ப

விக்கும். விபரீத கருத்தரித்தல் என்னும் முகவுவியின் கீழ்க் கூறிய கர்ப்பங்களில் அநேகம் இரட்டை பேறுகளாம். இவ்விரட்டைப்பேறுகளில் ஒன்று கர்ப்ப ஆரம்பத்திலேயே கருங்குண்டு மாய்க்கு சரியாக பிரசவகாலம் வரும். இவ் கர்ப்பாசயத்திலேயே தாமியிருக்கும்.

கண்மறைவிலேயே, Missed Labour (மிஸ் லேபர்).—கிர்ப்பவான கர்ப்பகாலமுடிவில் பிரசவவேதனைதோன்றிவிடுவதுவிட, பிண்டம் கர்ப்பாசயத்திலேயே தங்கிவிட நேரிடுமாயின் அதுவே “கண்மறைந்த பிரசவம்.” இப்பிண்டம் அழிந்து தானே தள்ளுண்ணப்படும் அல்லது துண்டிடுண்டாய் வெளியே எடுத்துவிடப்படும். இப்படி நேரிடுவது மிக அரிது.

தையாலான கர்ப்பம், Molar Pregnancy (மோலார் பிரக்னென்ஸி).—கர்ப்ப ஆரம்பத்தில் உதிரங்காணுமானால் அதின்பலன் சாதாரண கர்ப்பகாலமென்க. அல்லது, கருவானது கர்ப்பத்தில் கொஞ்சக்காலம் தரித்திருந்து (பிளேஷிமோல்) “சதைப்பிண்டம்” என்னப்பட்ட சதையாகமாவும். இது சிலவாரங்கள் சென்றலொழிய வெளிப்படமாட்டாது.

கருவழிவுக்கு சாதாரணகாரணம் என்னவெனில் (கோரிபன்) என்ற “பிண்டகவசஜவ்வானது சிறு திராட்சப்பழங்களைப்போன்ற கொப்புளங்களாக மாறுவதேயாம். இது (வெலிக்குலர் மோல்) “கொப்புளப்பிண்டம்” என்னப்படும். இம்மாதலுதல் சாதாரணமாய் மாயை உருப்படுவதற்குமுந்தி துடங்கி ஏறக்குறைய எப்போதும் பிண்டநாசத்தை விளைவிக்கும். சாதாரணமாய் கர்ப்பமானபின் உண்டாகும் இத்தற்குமிகு குறிகள்; ஆனால் கர்ப்பப்பையின்கணக்கிக்குத் தக்கபடி மிகாவிரித்தவளையின்கணக்கிக்குத் தக்கபடி கர்ப்பப்பையானது அமுக்கினால் மாய்ப்போல் மிருதுவாய்த் தட்டுப்படும். சிலவேளை

களில் உதிரம் அல்லது உதிரம்கலந்த நீர்வரும். சிறு கொப்புளம்போன்றவை அப்போதைக்கப்போது வெளிப்படும். பெருஞ்சுண்கள் வெளிப்படும்பொழுது சாதாரணமாய் கொடிய இரத்தப்பெருக்கு முண்டாகும்.

பரிசீப்பு.—வியாதியின்றி அறிந்தமாத் திரத்தில் கர்ப்பாசயக்குழத்தை அவ் (சீட்டாங் கில் டென்ட்) என்ற குச்சுகளாலாவது (பார்ன்ஸ் பாக்) என்ற பைகளாலாவது நீக்கித்திறந்து, கர்ப்பத்திலுள்ளதை அப்புறப்படுத்தவேண்டியது. சாதாரணமாய் உதிரப்பிரவாகம் மிக அதிகமாகிடுக்கும்; ஆனால் கர்ப்பப்பையை ஒட்ட காலியாக்விட்டால் உதிரப்பிரவாகம் காண்பது அரிது. கர்ப்பாசயக்குழிக்குள் இரும்புகிராவகம் பிரயோகித்தல் அவசியமாயிருக்கலாம். சிலருக்கு வியாதியினாலாவது வேறு காரணத்தினாலாவது (வில்லி அப்தி கோரியன்) பிண்டகவசத்தின்மேலுள்ள சுணையை கொழுப்பு அடர்ந்து மூட பிண்டம் நசிந்து கர்ப்பநஷ்டமுண்டாகும். இப்படி அடர்ந்துமூடிய தூர்மாம்சபாகம் “கொழுப்பு அடை” (ஃபாற்றி மோல்) என்னப்படும். சோதிக்குமிடத்து, மாயை சாதாரணமாய் வெண்ணிறமுள்ளதாயும் சுலபமாய் பிண்டுபோகக்கூடியதாயும் இருக்கும். சதைப் பிண்டத்தைப்போலவே இதுவும் பலநாள் உள்தங்கியிருந்து பின்புகழிந்துபோகும்.

பரிசீப்பு.—அவசியமா யிருந்தால், கர்ப்பப்பையை நீக்கித்திறந்து அதில் ஒன்றுமில்லாதபடி காலிசெய்து விடு.

கர்ப்பகாலம்.—வெறங்கேயாவது கர்ப்பமாத தல் Fine Gestation (எக்ஸ்ட்ரா யூட்ரைன் ஜெஸ்டேஷன்) அதாவது கர்ப்பப்பையைவிட்டு அதற்கு வெளிப்புறத்தில் எங்கேயாகிலும் கருத்தரித்தலாம். அடிவயிற்றுக்குழியில் கருத்தரித்தால், கும்பி கர்ப்பதா

ரணம் (அட்ஷன்) என்று அல்லது டாட்ரல் ஜெஸ்டேஷன் என்று அழைக்கப்படும். எனது சினைப்பையின் (ஓவெரி)ல் சூழ்ந்து அதற்கு (ஓவெரியன் ஜெஸ்டேஷன்) “அண்டகப் பதாரணம்” என்னப்படும். ஆகிலும் அதிகாப்பதாரணத்திற்கு மிகச் சாதாரண ஸ்தானம் நாக்குழல்களில் ஒன்றும். இதற்கு “நாதாசய கர்ப்பதாரணம்” (ட்யூபல் ஜெஸ்டேஷன்) என்றுபெயர். முன்றாவது அல்லது நாலாவது மாதத்தில் கரு அடங்கியபையானது வெடித்துப்போய் விடுமாதலால் பெரும்பாலும் பிராணசங்கட கர்ப்பதாரணமென்க. இந்த அதிகர்ப்பதாரண விசித்திரங்கள் பேதுகாலப்பரியந்தம் நீடிப்பதுமுண்டு. பிண்டம் நசிந்து, வயிறு ஆசனம் அல்லது யோனிவழியாக தானே கழிந்துபோகும்; அல்லது ஆயுதப் பிரயோகத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படும்.

அகால பிரசவநே. **அகால பிரசவநே.**

PREMATURE LABOR.

(பிரிமெட்சூர் லேபர்.)

ஏழாம்மாத முடிவில்நின்று பூரணபிரசவகாலத்திற்குமுந்தி யெப்போதேனும் முண்டாகும் பிரசவவேதனைக்கு “அகால பிரசவம்” என்றுபெயர். இது கருவழிவைப்போல அடிக்கடி சம்பவிககாது. இந்த தேசத்தில் போஜனக்குறைவாலும் கடைசிவகையில் உழைத்து வேலைசெய்யவேண்டிய ஆவசியகத்தினாலேயும் இது மிக அடிக்கடி நேரிடுகிறது. கருவழிவை யுண்டு பண்ணும் நேறுதுக்களே அகாலபிரசவத்துக்கும் நேறுதுக்கள் ஆகக்கூடும்.

5-ம் அதிகாரம்.

பிரசவ சூத்திரம், MEAN OF LABOUR.
(மெக்கனிஸம் ஆப் லேபர்.)

உச்சி உதயம், VERTEX PRESENTATION.
(வெர்டெக்ஸ் பிரசென்டேஷன்.)

பிரசவ சூத்திரத்தைக்குறித்து யோசிக்குமிடத்து, அது, கூபகத்துக்கூடாகவும் பிரசவபாதைக்கூடாகவும் செல்லும் பிண்டச்சிரசின் பல அசைவுகளை கண்ணாங்குருத்துமாய்ப் பார்த்துக் கற்கவேண்டியவொன்றாகவிருக்கிறது. பிண்டச்சிரசோ தான் துழைந்துசெல்லவேண்டியவரும் கூபகத்துக்குச் சரிப்படுத்தக்கூடியவரும் வடிவமுள்ளதாக இருக்கவேண்டும். கூபகப்பாதையானது பிண்டச்சிரசு தாராளமாய் செல்லுவதற்கு போதுமான விசாலமுள்ளதாய் இருக்கவேண்டும். கர்ப்பாசயமோ வெறும் கூபகமார்க்கமாய் பிண்டத்தைத் தள்ளிவிடுவதற்குப்போதிய நெட்டுஞ் சக்தியுள்ளதாகவும் இருக்கவேண்டும். இவைகளெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று இருக்கவேண்டிய விதங்களில் ஏதொன்றிலாகுதல் தவறுகில் கிரம்பிரசவ நடைமீதும் பிசுருண்டபெட்டுக் கஷ்டமும் கேரிடும்.

இயல்பான உதயங்களில் சிரசு நாலாவகை நிலைகளில் கூபகத்துக்குள் செல்லுவது உதையமாவதுண்டு. சிரசு பிரசவப்பாதை யூடாகச்செல்லும்பொழுது பல்வகையாகத் திருப்பப்படும் அந்தத்திருப்புதல் கள் அல்லது அசைவுகளே “பிரசவசூத்திரம்” ஆகுமென்க. முதல் இரண்டு நிலைமைகளில் பிடரி பெரும்பான்மையும் பக்கம் இருப்பதால் அவை (ஆக்ஸிபிடேட்) “பிடரி முன்தட்டு” என்னப்படும். இரண்டு நிலைமைகளில் “உது பின்புறம் திரும்பிப்பிடரி” (ஆக்ஸிபிடேட் போஸ்டீரியர்) பிடரி பின்புறம் என்னப்படும்.

1.—கபால நிலை அல்லது வலப்புறம் சாய்ந்த பிடரி முன்தட்டு (கிரோனியல் பொசிஷன் ஆர் லைட் ஒப் லிக் ஆக்ஸிபிடேட் ஆன்டீரியர்). இதில் பிடரி இடது கம்சம் அல்லது எலும்புக்குழியிலும், நெற்றி வலதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கு எதிரேயும் இருக்கும்.

2.—கபால நிலை அல்லது இடப்புறம் சாய்ந்த எதிர்பிடரி (கிரோனியல் பொசிஷன் ஆர் லைட் ஒப் லிக் ஆக்ஸிபிடேட் ஆன்டீரியர்). இதில் பிடரி வலது கம்சத்திற்கு பின்னும், நெற்றி இடது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கு எதிரேயுமிருக்கும்.

3.—கபால நிலை அல்லது வலதுபுறம் சாய்ந்த பின் பிடரி (கிரோனியல் பொசிஷன் ஆர் லைட் ஒப் லிக் ஆக்ஸிபிடேட் போஸ்டீரியர்). இதில் பிடரி வலது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கு எதிரிலும், நெற்றி இடது கம்சத்தின் பின்புறத்திலும் இருக்கும்.

4.—கபால நிலை அல்லது இடதுபுறம் சாய்ந்த பின் பிடரி (கிரோனியல் பொசிஷன் ஆர் லைட் ஒப் லிக் ஆக்ஸிபிடேட் போஸ்டீரியர்). இதில் பிடரி இடது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கு கேரிலும், நெற்றி வலது கம்சத்திற்கு கேரிலும் இருக்கும்.

மேற்குறித்திருக்கும் எல்லா நிலைகளிலும், பிண்டச்சிரசானது கூபகத்தின்வழியாய் இறங்குகையில் செய்யும் சலகங்கள் மூன்று, தலை வெளித்துவரத்தில் இருந்து வெளியில்வந்தபின், நான்காவதாய் தோள்களும் ஒரு சலகஞ்செய்யும். அவையாவன:—


மடங்கல், Flexion (ப்ளெக்ஷன்).
கழலல், Rotation (ரொட்டேஷன்).

விரிதல், Extension (எக்ஸ்டென்ஷன்).
திரும்பிக்குழலல், Restitution or Re-rotation (ரெஸ்டிட்டுஷன் ஆர் ரொட்டேஷன்).

சிரசின் ஒவ்வொரு நிலையிலுஞ் சிரசின துபோக்கை அடியில் விவரித்திருக்கிறது.

முதல் நிலை.—இதில் “பிடரி” இடது கம்சத்திற்கும், “நெற்றி” வலது பீடிகை யெலும்பின் பொருத்திற்கும், எகிர்புருமாய்விந் சிரசானது கூபகத்தின் வலஞ்சாயந்த விட்டத்தில், அல்லது குறுக்களவில் பிரவேசக்கும்.

ஐந்தாம் படம்.



முதல் நிலையில் பின்னச்சிரசு கூபகத்திற்குள் பிரவேசிப்பதைக் காட்டுகிறது.


(எப். பார்தெஸ் துரைசித்தாரந்தத்தின்படி.)

பிடரி நெற்றியைப்பார்க்க அற்பமாய் தாழ்ந்திருக்கிறது. அதினால் உச்சிகள் ஒரோமட்டத்திற்குக்கின்றன. கூபகத்திற்குள் முதல்முதல் தட்டுப்படும் சிரசினபாகம் வலது பித்திகை யெலும்பின்மேடாக இருப்பதால் சிரசின் இடப்புறத்தைப்பார்க்க வலப்புறம் தாழ்ந்திருக்கிறது - அல்லது - தாழ்ந்திருப்பதுபோல் தோன்றுகிறது.

பிரசவவேதனை ஆரம்பத்தில் யோனிவழியாக பரிசோதித்தால் சோதிக்கும் விரலுக்கு, கர்ப்பாசயக்கழுத்தின் அதாவது முன்புறம் தட்டுப்படும். அதற்க்கூடாய் பித்திகை எலும்பின் மேடு தட்டுப்படும். கர்ப்பாசயத்தின் வாய் பீடிகை எலும்பிற்குக்கும்பக்கத்தில் உயரத்தென்படும். கர்ப்பாசய வாய் சோதனைசெய்வதற்குத்தக்கதாய் விரிந்திருக்கில் கர்ப்பினியை இடதுபக்கம்படுக்கச்செய்து சோதிக்க, வில்விளிம்பு பின் உச்சிக்கு கீழ்நோக்கியும் முன்னோக்கியும், முன் உச்சிக்கு மேல் நோக்கியும், பின்னோக்கியும் குறுக்கே சாய்ந்து ஓடக்காணலாம். வலது பித்திகை எலும்பு, இடது பித்திகை எலும்பைச் சற்று போர்த்தாற்போல் இருக்கும், இதனால் தலையின் பிரமாணம் குறையும். வலது பித்திகை எலும்பின் மேல்பாக மத்தியபாகங்கள், கர்ப்பாசயவாயின் வட்ட மத்தியில் தென்படும். இதுவே உதயமாலை பாகம். இங்கேதான் புரைகுழல்போன்ற கட்டி (Caput Succedaneum) யுண்டாகும். கர்ப்பாசயலாயானது அதிக விரிவானால் உச்சிகள் அதிக சலபமாய் தென்படும். பிரசவவேதனை அதிக மதிகமாயுண்டெட மடங்குதல் உண்டாகும் நெற்றியைப்பார்க்கப் பிடரி அதிகவேகமாய் இறங்குவதால் இது உண்டாகும். சிசுவின் முள்ளந்தண்டானது, நெற்றி முனையைப்பார்க்கப்பிடரி முனைக்கு கிட்டேயிருக்கும்; இதனால் பிடரி முனை கீழ்ப்புறம் அதிகமாய் அழுக்குண்டு இறங்குகிறது. முன்னிருந்ததின மதிகமாய் முகவாய்க்கட்டைமார்பில் அழுக்கப்படும். அசைவு சம்பவங்கும்போது இந்த பிடரியானது மத்தியவெளியில் இடது சரிவின் வழியாய் ஆசன எலும்பின் மூட்டுமெட்டும், கூபக அடிப்பாகம்வரையும் கீழாய் வழுவுகிறது. பிரசவவேதனை பலக்கப் பலக்கச் சிசுவின் தலை “சுழலல்” என்னும் தன் பிரதான சலனத்தைசெய்கிறது. வலதுபுறம் சாய்ந்த சூதுக்குவட்டத்திலிருப்பதை தொட்டு தலையானது எதிர்ப் பின்புறமாய் திரும்புகிறது. பிடரியானது கூபக

கீழ்வெளியின் வலது சாய்ந்தவும், முன்சாய்ந்தவும் பாப்பில்கழுவி மேகன வளைவுக்கு முன்பக்கமாய் நகர்ந்து சென்று அம்மேகனவளைவின் கீழாய் நிலைத்துவிடும். சிசு மடங்கல்கொண்டபிறகு சோதித்தால், சோதிக்கும் விரல் வலது பித்திகை எலும்பை யசுன்பின் கோணத்துக்கருகே தெழும். சுழலல் முடிந்தபிறகு, மேற்புறம் பின்கோணம் உதயபாகமாகும். இங்கே இப்போது புனாகுழற்கட்டி விரலும். பித்திகை எலும்பின் இந்த

ஏறும் படம்.




முதல் நிலையில் பிண்டத்தின்தலை நீளுதலும் வெளிப்படுதலும்.

(டைலர் ஸ்பித் பண்டிதர் கொள்கையின்படி.)
புள்ளிவரைகள் தலை கோற்றுக்கையில் உண்டாகும் தலை மாறுதல்களைக் குறிக்கின்றன.

பாகம் முதல்வெளிப்படும். தலைச்சுழற்றலின் அளவு ஒருவட்டத்தின் எட்டிலொரு பாகமாம். இதற்கப்புறம் தலை பெருத்தலுக்காக ஓர் அசைவு உண்டாகும் அது பின்சொல்லியபடி சம்பவிக்ஞம்:—சிசுவின் முகமும் நெற்றியும் இத்தருணம் பீடிகை எலும்புமுழியிலிருக்கும். பிடரி மேகனவெலும்பின் பொருத்துக்குப் பின்னால் நிலைத்திருக்கும். சிசுவெவளியே தள்ளிவிடும் கர்ப்பாசயச்செய்கை நடந்துகொண்டிருக்கும்பொழுது, முகமும் நெற்றியும் மர்மஸ்தான வழியாய் வெளிகாணுமட்டும் கர்ப்பாசய விசர்ஜஜன சக்தியால் பீடிகை எலும்புக்கும் விடபத்திற்கும் கீழ்ப்புறத்தின் மேலாக அசைவு கீழே தள்ளுண்ணப்படும்.

ஏறும் படம்.



முதல் நிலையில் பிண்டத்தின்தலை சுற்றுதல் அதாவது வெளிப்புறம் சுற்றுதல்.

(ஹாட்ஜி பண்டிதர் கொள்கையின்படி.)

இச்செய்கையினால் மார்பில் ஓட்டிக்கொண்டிருந்த சிசுவின் முகவாய்க்கட்டைவிலகும். அதாவது அம்மு கவாய்க்கட்டையை முன் மடங்கியிருந்த மார்பின்மே விருந்து நிழித்தும்.

இப்போது தலை மர்மஸ்தானத்துக்கு வெளியிலிருப்பதால் கடைசியாக ஒரு சுற்றுச்சுற்றும். சிசுவின்முகம் தாயின் வலது தொடைப்பக்கம் மேல்நோக்கித் திரும்புவதே இக்கடைசி சுற்று.

கூபகத்தில் தலை இருக்கும் இடத்திற்கு எதிரிலுள்ள சாயவுவட்டத்தில் சிசுவின் தோள்களிறங்குவதால் இச்சுற்றுத் தண்டாகும். அதாவது தலையானது வலப்புறச்சு வட்டத்தில் சுழல்வதுபோல் கூபகத்தின் இடதுசாயவு வட்டத்திலும் தோள்கள் பிரவேசித்து சுழல்கின்றன. எதிர்ப்பக்கம் சிசுவின் தோள்கள் இப்படிச் சுழல்வதால் மர்மஸ்தானத்திற்கு வெளிப்புறத்திலும் தலைதிரும்பி ஹேதுவாகிறது. வலதுதோளானது வலதுகம்ஸம் அல்லது எலும்புக்குழியின் பின்னேயிருப்பதால் மேகனவளைவுக்குச் சுழன்றுசெல்லும். இடதுதோளோ இடதுபீடிகை இடுப்பெலும்புகளின் பொருத்திலிருந்து பின்புறமாய் பீடிகை எலும்புக்குழியில் செல்லுகிறது. வலதுதோளானது மேகனவெலும்புக்குப்பின் நிலைத்துநிற்கும். இடது தோளோ முதல் உதயமாகிப் பின்பு வலதுதோள் உதயமாகும். புட்டமானது தோள்களைப்போலவே உதயமாகும். ஒருபக்க இடுப்பு மேகனவெலும்புக்குக் கீழ் இறங்கும் மற்றது விடபவழியாய்ச்செல்லும்.


தோண்டாம் நிலை.—பிடரி வலது கம்ஸத்திற்குப் பின்னும் நெற்றி இடது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கு எதிரிலும் இருக்க, இடதுசாயவு விட்டவழியாய்ச் சிசுவின் தலை கூபகத்தில் பிரவேசிக்கும். வில்விளி

ம்பானது இடதுசாயவு விட்டத்திலிருக்கும். மேற்பக்கமும் முன்பக்கமும் செலுத்த பின் உச்சிக்கும், கீழ்பக்கமும் பின்பக்கமும் செலுத்த முன் உச்சிக்கும் சோதனைவிரல் வரும். இடது காது மேகனவெலும்பின் பின்னாகத் தட்டுப்பெடும். இடது பித்திகை எலும்பின் மேடு அடிப்பாகமென்க. பித்திகை எலும்பின் வலப்புறத்தின் மேற்பாகமும் நடுவும் உதிக்கும்பாகங்களாம். பிடரி கூபகத்திற்கியவெளியின் வலதுபக்கப்பரப்பில் இறங்குவதால் சிசுவிற்கு மடங்கல் உண்டாகிறது. முதுவிலையில் எவ்வாறோ அவ்வாறே இம்மடங்கல் நிலைக்கும். ஓர் சுற்றுதல் உண்டாகிறது. ஆனால் இச்சுற்றியகல் எதிர்முகத்திலிருந்து அதாவது வலப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கம் உண்டாகிறது இப்பொழுது உதித்தும்புக்கம் இடது பித்திகை எலும்பின் மேற்கோழம் பின் கோணமுமாம். இதற்குப்பின் முதல் வியத்தபோலவே பிண்டப் பெருத்தல் உண்டாகும். இந்தியில் இடது கம்ஸத்தக்கு பின்புறத்திலுள்ள இடதுதோள் மேகன வளைவுக்காய் முன்னோக்கிச்சுழலும். இடதுதோளோ பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலிருந்துகொண்டு அப்பீடிகை எலும்புக்குழியில் பின்புக்கம்மாய்ச்சென்று விடபத்தைத் துடைத்துக்கொண்டு முத்திலு உதிக்கும் இடதுதோள் பின்பு உதிக்கும். முத்தம் கீழ்ப்பக்கம் அல்லது தாயின் இடது தொடைப்பக்கம் திரும்பும்.

மூன்றாம் நிலை.—கூபகத்தில் பிரவேசித்தவுடன் பிடரி வலது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கும் எதிரிலும் நெற்றி இடதுகம்ஸத்தின் பின்னாமாய் வலதுசாயவுவிட்டத்தில் சிசுவின் தலை அமரும். வில்விளிம்போ வலதுசாயவு வட்டத்தில் சென்று பின் உச்சிக்குமேலும் பின்னும், முன் உச்சிக்கு முன்னுங்கீழும் ஓடிமுடியும்.

எட்டாம் படம்.

FIG. 8.




மூன்றாம் நிலையில் கூபகவீரீம்பில் உதயாகு
பிண்டச்சிரை.
(யெப். பார்ன்ஸ் பண்டிதர் கொள்கையின்படி.)

இடது பித்திகை எலும்பின்மேல் யாவற்றிற்கு வளைந்த அல்லது ஆதாரமாகும். சோதிக்குமிடது, இப்போது உதிக்கும் பாகமாகிய இடதுபித்திகை எலும்பின் மேல்பாகமும் நடுப்பாகமும்; சோதனைவிரலுக்குத் தட்டுப்படும். மற்ற நிலைகளிற் போலவே இந்நிலையிலும் “சிகமடங்கல்” உண்டாகும். சுழலல்: “மடங்க” விற்பிறகு, பிடரியானது இரண்டிலொருமார்க்குமாய்ச்சென்று. (சாதாரணமார்க்கம் வலப்புறமிருந்து இடப்புறத்தைநோக்கி ஒருவட்டத்தில் மூன்றிலொருபங்கை உண்டெண்ணல்.) இரண்டாம்நிலையில் போலவே, பிடரி மேகன எலும்பின் கீழிருந்து புறப்பட, முகம் பீடிகை எலும்புக்கும் விடபத்திற்கும் மேலாகச்செல்ல, இந்தச்சுழற்சியை முடிக்கும். கூபகம் அளவுகடந்து விசாலமாயிருந்தால், அல்லது தலை சிறுத்திருந்தால் கூபகத்தின் போதுமானதாக்கம் இன்மையால் மூன்றாம்நிலையிலிருந்து இரண்டாம்நிலைக்குப் பின்

டச்சுழற்சி யுண்டொடமவிருக்கலாகும். பிடரி பின்புற நிருக்கச் சிசு கூபகமார்க்கமாய் தள்ளப்படும். அல்லது பிடரி இறப்பெலும்பின் பிற்பக்கத்தை யடைந்தவுடன் அதற்குப் பின்னாகச்செல்லுமாகில் அப்பிடரியின் பின் நிலையில் சிரசு புறப்பட்டு மேகன எலும்பின்பக்கமாய் கிரும்பினமுதலுடன் உதிக்கும்.

ஒன்பதாம் படம்.

FIG. 9.



பிடரி பின்னாநிலையில் சொதயமாகுதல்.
(டயிலர் ஸ்மித்பண்டிதர் கொள்கையின்படி.)

இப்போது உதயமாகும்பாகம் முதல்பிறக்கும் இடதுபித்திகையின் எலும்பின் மேற்புறத்தின், முற்கோணம். பிடரி அப்போது மிகவிரிந்திருக்கும் விடபத்தின் மேற்பக்கம்செல்லும். கெற்றி, மூக்கு, வாய், முக வர்க்கட்டை இலையெல்லாம் ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் உதிக்கும். கடைசியில் பிடரி உதிக்கும். இவ்வித பிரசவங்களில் சிரசு உதயமாகாதற்குக் கஷ்டமும் தாமதமுமுண்டுபடுவது ஏறக்குறைய நிச்சயம். சிரசு உதிக்கு முன் வெருவாக உருப்படுத்தப் பட்டுவெண்டியிருக்கின்

தது. பிடரியோ நெருக்கப்படுவதால் தலைக்குள் உள்ள வையெல்லாம் முறபக்கமாய் நெற்றிக்குள் நெருங்கி திரளும். இதனால் பிள்ளைபிறந்தவுடன் நெற்றி உயர்மாகவும் முன்னகத்தன் எடுப்பட்டதாகவும், பிள்ளைந்தலை சப்பையாகவும் தோன்றுகின்றது. இவ்வித நிலையில் தான் அபுகப்பிரயோகஞ்செய்து பிரசவத்தைச் சலபமாகச் சிசுவைக்காப்பாற்றுவது பலகாலும் ஆவசியகம்.

நான்காம் நிலை.—இந்த நிலையில் பிடரி இடதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கெதிரிலும், நெற்றிவலது கம்சத்திற்குப்பின்னுமிருக்க, வில்லிசரிப்பு, இடதுசாய்வு விட்டமார்க்கமாய்ப்பின் உச்சிக்குக் கீழ்ப்புறமாகவும், பின்புறமாகவும்; முன் உச்சிக்கு மேல்புறமாகவும் முன்புறமாகவும் ஒடிச்செல்லத் தலையும் இடதுசாய்வு விட்டமார்க்கமாய்க் கூபகத்தில் பிரவேசிக்கும். வலது பின்புறம் இடப்புறத்தைப்பாக்கத் தாழ்ந்து கிடக்கும். வலதுபித்திகை எலும்பின்மேற்பாகமும் நடுப்பாகமும் உதிர்ந்தும் பாக்களாம். இந்நிலையில் “சிசுமடங்கு” மூன்றாம் நிலையில்போலவே பிடரியானது முன்னே பின்னோதிரும்பி (அது சாதாரணமாய் முன்னோக்கித்திரும்பும்) முதலநிலையில் முடிந்தவாறுமுடியும். அது பின்னோக்கிச் சுழலுகையில் முகமானது மேகனவளைவைப் பார்த்தாற்போலிருக்கும். பிடரியோ பீடிகைக் குழியில்விழும். இந்நிலையில் உதயபாகம் வலப்பித்திகையெலும்பின் மேற்புறத்தின் முன்புறக்கோணமாம்.

முதலநிலையில் பிரசவோதயங்கள் மிகவும்சாதாரணமானவையாம். அவற்றிற்கடுத்தவை மூன்றாம்கிலே பிரசவோதயங்களாம். இரண்டாம் நான்காம் நிலைகளில் இவ்வுதயங்கள் அடிக்கடி யுண்டெடுகிறதிலே, மூன்றாம்கிலே பிரசவோதயங்கள் அநேகம் இரண்டாம்கிலே பிரசவோதயங்களாகச் சாசனிக்கப்பட்டன. அவ்வுதயங்கள் இரண்டாம்கிலையில் சுழன்றவலையில் கண்டுபிடிக்காமையே இப்படிச் சாசனித்ததற்குக் காரணமென்பார்கள். சிரோதயப்பிரசவங்கள் (100) நூற்றுக்குத்

தொண்ணூற்றெட்டு, முதல்கிலே இரண்டாம்கிலேப் பிரசவங்களாகவிருக்கும். பீடிகை மேல்முனையின் இடது புறத்திலிருக்கும் கடைமலப்பை கூபகத்தின் இடது விட்டத்தைக் குறைப்பதால் முதலநிலை இரண்டாம்கிலைகளும் அடிக்கடி உண்டாகின்றன. இதனால்தான் தலையானது விசாலமாயிருக்கின்ற எதிர்விட்ட மார்க்கமாய்ப் பிரவேசிக்கும்.

உபசிரசு (காப்பட் சக்லீடேவரியம்) என்பது பிரசவவேதனைச் சமையத்தில் சிசுத்தலையின் உதயபாகத்தில் உண்டாகின்ற கீக்கமான புரைகுழந்தையின் பெயராம். பிரசவவேதனையின் முதல்பாதத்தில் கர்ப்பாசயவாயும் இரண்டாம் பாதத்தில் கூபகமும் சிரசைச் சுற்றி நாலுபக்கமும் நெருக்குவதால் இந்த “உபசிரசு” உண்டாகின்றதென்க. சிரசு இடம்மாறாமா உபசிரசின் இடமும் மாறிக்கொண்டேயிருக்கும். வலதுபித்திகைபெலும்பை உறிக்கும்பாகமாய்க்கொண்ட முகலாவது அல்லது நாலாவது “நிலைமை” ப் பிரசவத்தில் சிசு உதயமாகும்பொழுத்தில் அவ்வலதுபித்திகை எலும்பின்மேற்பிரலேயே “உபசிரசு” உண்டாகும். இரண்டாம்கிலையும் “நிலைமை” ப் பிரசவங்களில்போல, இடதுபித்திகை எலும்பு உறிக்கும் பாகமாயிருந்தால், இப்புரைகுழல் (உபசிரசு) அவ் விடதுபித்திகையெலும்பின் மேல்தான் அமரும். சிரோதயமாகும் நீடித்த பிரசவவேதனையில் பிண்டச்சிரசு வெவ்வேறு விகாரங்களை அடைகின்றது. இது “பிண்டச்சிரசு உருப்படுத்தப்படுகை” என்னப்படும். கூபகம் சிறுத்ததாயிருந்தால் சிரசு தன் கோளவடிவத்துடன் அகிலிருந்தும் வெளிவரக்கூடாது. பிடரிமுதல் நெற்றிவரைக்கும், பிடரிமுதல் முதலாய்க்கட்டைவளக்கும் ரூறுக்களில் சிரசு விசேஷம் வளர்ந்துவிட்டபடியால் அது இப்போது நீண்டு விடலாச்சது. இவ்வாறு உண்டான அந்நிகாரம் சிக்கிரம்மறைந்து சிலநாள்களுக்குள் சிசுனிந்தலை தன் கோளவடிவத்தை யதிகமாய் மீளவும் பெறும்.

6 - ம் அதிகாரம்.

பிரசவவேதனை வகுப்பு.

DIVISIONS OF LABOUR.
(டிவிஷன்ஸ் ஆப் லேபர்.)

டென்மான் பண்டிதர் வகுத்த பிரசவவேதனை வகுப்பையே இங்கே யெடுத்துக்காட்டப்படும். அதின்படி நாலுவகுப்புகள் உண்டு, அவையாவெனில்:—

சாதாரண பிரசவம் (நாட்ச்சரல் லேபர்).

கஷ்ட பிரசவம் (டிப்பிக்கல் லேபர்).

விரமாத பிரசவம் (பிரீட்டர் நாட்ச்சரல் லேபர்)

அபாயப் பிரசவம் (காம்பிளெக்ஸ் லேபர்) இவைகளே.

I.—சாதாரண அல்லது கிராமபிரசவம், Natural Labour (நாட்ச்சரல் லேபர்).—விவரம்: இந்தப் பிரசவத்தில் வே முன்னே உதயமாதி எவ்விதசெயற்கை உதவியும் இல்லாமல், இருபத்துநாலுமணி நேரத்துக்குள்ளாகப் பிரசவம் முடியும்.

II.—தடிப்பிரசவம், Difficult Labour (டிப்பிக்கல் லேபர்).—இந்தப் பிரசவத்தில் தலையுதயமாதி, பிரசவம் முற்றுப்பெறுவதற்குச் செயற்கை உதவியுண்டியதாகும், அல்லது எவ்வித செயற்கை உதவியுமின்றி இருபத்துநாலுமணி நேரத்துக்குப்பின், பிரசவம் முடியும். இந்த வகுப்பில் இரண்டுபிடிவுகள் உண்டு அவைகள்:—

ஒன்று - அலுப்பைக்கொடுக்கும் தாமத பிரசவம், Tedious Labour (டீடியஸ் லேபர்); மற்றது வருத்தமான பிரசவம், Laborious Labour (லேபோரியஸ் லேபர்).

அலுப்பைக்கொடுக்கும் தாமதபிரசவம்.—விவரம்: இந்தப் பிரசவத்தில், தலை உதையமாதி இருபத்துநாலு மணி நேரத்தின்பின் இயற்கையின்சக்தியால் பிரசவம் முடி

வதாம். பிரசவத்தின் முதற்பாதத்திலே சாதாரண மாய் இந்த தாமதம் உண்டபெடுன்றது. இகற்றுக்காரணம் சர்ப்பாசயக்கிரியைக் குறைவு, அல்லது சிசுவெளிப்படுவதற்கு யோனிலிரிந்து கொடுக்கக்கூடாமல் கடினமாய் இருத்தல்.

நடுத்தமான பிரசவம், Laborious Labour (லேபோரியஸ் லேபர்).—இதில் திசுவின் தலை உதயமாதியின் பிரசவம் முற்றுப்பெறுவதற்காய் ஆயுதங்களை அல்லது கைமைப் பிரயோகிக்கவேண்டியதாய்வரும். பிரசவத்தின் இரண்டாம்பாதத்திலேயே பிரசவதாமதம் அதிகப்பற்றாய் உண்டபெடும். அந்தற்குக்காரணங்கள், சிசுவின் தலை இடம்மாறி இருக்குகல், தலை அளவிற்கு மேலாய்ப் பருத்திருக்குதல், அல்லது தலை எலும்பாதி வயிரங்கொண்டிருக்குதல், தலையை ஆழத்து நீர்கட்டித் திரண்டிருக்குதல், நாபிக்கொடி சூறுபிச்சுறுத்திருக்குதல் முதலிய இவைகளே. இவை சிசுவின் என்று எழுப்பும் காரணங்கள். கூபகத்தின் அந்தக்கேடு அல்லது பழுதுகள், எலும்புகள் சிறுத்திருக்குதல், அசனத் தட்டெலும்பு ஆடுத்து நீர் திரண்டெட்டியிருக்குதல், பெலவின் தால் அல்லது பேறுகாரணங்கள் இவை சிசுவின் யேதள்ளிவிடுவதற்கு சக்தியில்லாதிருக்குதல், இவைகள் தாயில்கின்றெழும்புக்காரணங்கள். இவை பலவினபிரசவத்துக் திட்டமாகும்.

III.—கிராமாத பிரசவம், Preternatural Labour (பிரிட்டர்னாட்சரல் லேபர்).—விவரம்: இதில் முண்டத்தின் எந்தப்பாகமாவது, அல்லது கையாவது காலாவது உதையமாகுதலாம். இது மூன்று வகுப்புகளாக வகுக்கப்படும்:—

(a) கவிழ்த்தபிரசவம் (இன்ஹெர்ட்டெட் லேபர்).

(b) குறுக்காபிரசவம் (ட்ராஸ்ஸ்வர்ஸ் லேபர்).

(c) கலப்பாபிரசவம் (சரம்பவுண்ட் லேபர்).

(a) கவிந்த பிரசவம், Inverted Labour (இன்வெர்ட்டெட் லேபர்).—இதில் சிசுவின் இடுப்பு, புட்டம் அல்லது கால் உதையமரிகுவதாம்.

(b) துருக்கான பிரசவம், Transverse Labour (ட்ரான்ஸ்வெர்ஸ் லேபர்).—இதில் சிசுவின் கையாவது அல்லது சிசு முண்டத்தின் எந்தப் பாகமாவது உதையமரிகுவதாம்.

(c) கலப்பான பிரசவம், Compound Labour (காம்ப்வுண்ட் லேபர்).—இதில் ஒரேவேளையில் சிசுவின் இரண்டு அல்லது பலபாகங்கள் உதையமரிகுவதாம்.

IV.—சுபாயப்பிரசவம், Complex Labour (காம்ப்ளெக்ஸ் லேபர்).—விவரம்: இதில் பிரசவம் அதிகக் கொண்டிருக்கும்பொழுதே ஏதாவது ஒரு அபாயம் தாய்க்கு அல்லது பிள்ளைக்கு, அல்லது இருவருக்குச் சம்பவிப்பதாம். எப்போதும் தற்சண் உதவிவேண்டியதாயிருக்கும். இது ஒன்றுக்கதிகமான பிள்ளைகள், உதிரப்பிரவாகம், கர்ப்பாசயமாவது அல்லது யோனியாவது வெடித்தல், ஜலப்பை வெடித்தல், கர்ப்பாசயம் புரண்டுகிடுக்குதல், ஜன்னிவலிப்பு, மயக்கம், நாபிக்கொடி இறங்குதல் முதலிய இவைகளை அடக்கும்.

பிரசவ எச்சரிப்புக்குறிகள்.

PREMONITORY SIGNS OF LABOUR.

(பிரிமானிட்டரி ஸயின்ஸ் ஆப் லேபர்.)

பிரசவவேதனை தொடங்குவதற்குமுன்னே, பிரசவம் கிட்டி வருகிறதைக் காட்டுஞ் சில அறி குறிகளும், அடையாளங்களுமுண்டு. அவைப்பாவெனில்:—வயிற்று இறங்குதல் அல்லது வாடுதல், யோனிவழியாய்ச் சளி வடிதல், அடிக்கடி ஜலம்விட ஜலோபாதையுண்டுபெடுதல், கருப்பாசயம் கோவில்லாமற் சுருங்குதல், மனக் கவலை உண்டபெடுதல், இவையேயாம். பிரசவம் உண்டபெடப் பதினாலாட்களுக்குமுன் வயிறுவாட அல்லது இறங்கத்தொடங்கும். இப்படி தொடங்கும்பொழுது

அடிவயிறு சிறுக்கும், கர்ப்பாசயத்தின் மேற்பகுதியில் இருந்த நெருக்கத்திலிருந்து கர்ப்பாசயஞ் சற்றே இவகு வடையும். இந்த நெருக்கக்குறைவு சுவாசித்தலை இலேசாக்கி, நடக்கும்போது உண்டாயிருந்த இளைப்பையும் அதிகமாய்க்குறைக்கும். இன்னோர் கர்ப்பாசயத்தின் முட்டைவடிவம் தெளிவாய்ந்தோற்றும். இது கூபகத்தில் போதிய இடமுண்டாய் விட்டதைக்காட்டுவதால், இது ஒரு நல்ல அடையாளமாய் எண்ணப்படுகின்றது. இப்படி கர்ப்பாசயம் கீழ் இளங்குவதால் மலப்பையிலும் ஜலப்பையிலும் பல ஒழுங்கினங்கள் உண்டபெடுகின்றன. எப்படியெனில், வயிற்றில் உளைச்சலும், அறிஞால் சிலவேளைகளில் முக்கவருதலும், நாளொன்றுக்கு இரண்டு மூன்று முறை மலங்கழிதலும், அடிக்கடி ஜலம்விட வருதலுமான இவை உண்டபெடுகின்றன. இப்படி அடிக்கடி மலஜலங்கழிவதால், அளவிற்கு அதிகமாய்க் கூபகத்திலிருக்கின்ற அசடுகள் நீங்கும். அதினால் சிசுவின் தலை கூபகத்துள் கூடாகச் செல்லுவதற்கு இடமுண்டாகும். ஏறக்குறையக் கர்ப்பந்தரித்தகாலம் முழுக்கூறும் கர்ப்பாசயம் விட்டுவிட்டுச் சுருங்கிக்கொண்டே வருவதால், அடிவயிற்றில் இப்பொழுது கையைவைத்துப்பார்த்தால் கர்ப்பாசயம் சுருங்குவது நன்றாய் நோந்துவதுமல்லாமல் கருப்பைக்குள் இருக்கும் பிண்டத்தின் பருமை எவ்வளவுவெனவும் நன்றாய்த் தோற்றும். பிரசவந்தொடங்க ஏறக்குறைய இருபத்துநாலுமணிநேரத்துக்குமுன் யோனிவழியாய் சளிவடிய ஆரம்பிக்கும். இது வோர் நல்ல அடையாளம். ஏனெனில் இது கருப்பையின்கழுத்து விரிந்துவருவதைக்காட்டும். ஸ்திரிப்பையின்கழுத்து விரிந்துவருவதில் இவ்வேளையில் உண்டபெடும் மனத்தயர், அதிகம், ஆயினுஞ் சில ஸ்திரிகள் பேறுகாவல் கிட்டிவரும்போது, ஒருவேளை தங்களுக்கு உயிர்நஷ்டம் உண்டபெடக்கூடுமென்று நினைத்துப் பயந்து பதறுவதுமுண்டு. இது பிரசவவேதனையை நீடிக்கச் செய்யும்.

பிரசவ பாதங்கள்.

STAGES OF LABOUR.

(ஸ்டேஜஸ் ஆப் லேபர்.)

பிரசவ தற்களாவன.—தோஷ்டேன கர்ப்பாசயஞ்சு ருங்குதல், யோனிவழியாய் இரத்தம் கலந்தசளி வடிதல், கர்ப்பாசயக்கழுத்து மிருதுவாகி விரிதல், பனிநீரால் அகலப்பட்ட சவ்வுகள் கர்ப்பாசயக்கழுத்தை நெருக்குதலுமே. பிரசவம் மூன்றுபாதங்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முதற்பாதம் (பர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்) அல்லது விரிதல் (டய்லேஷன்). இரண்டாவது (செக்கண்ட்) அல்லது தள்ளுதல் (எக்ஸ்பல்ஷன்). மூன்றாவது (தார்ட்) அல்லது நஞ்சு (placenta) வெளியேவருதல் (டிரெசென்டல் ஸ்டேஜ்). ஒவ்வொரு பாதமும் ஒவ்வொருகாரியம் மூற்றுப்பெருவதைக்காட்டும்.

முதற்பாதம், First Stage or Dilatation (பர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆர் டய்லேஷன்) அல்லது விரிவாகுதல். இது பிரசவ ஆரம்பத்தையும், கர்ப்பாசயக்கழுத்து கன்றாய் விரிவாகுவதையும் அடக்கும். விரிவாகியவுடன் சாதாரணமாய்ப் பனிநீர்க்குடம் உடையும்.—**தற்கள் :** முதற்பாதம் குமட்டலுடனும் வாந்தியுடனும் ஆரம்பிக்கும். இவை சுதேச ஸ்திரீகளுக்குச் சாதாரணமானவையல்ல. இவை கர்ப்பாசயக்கழுத்து விரிவாகுவதற்கு அறிஞர்களும், ஆதலால் இவை நல்ல அறிஞர்கள் தான். பிரசவம் ஆரம்பித்துவிட்டதென்றதைக் காட்டும் ஒருவகை வெண்ப்பான் சளிபோன்ற நீர் வெளிப்படும். இதை “Shew” அல்லது குறி கண்டிவிட்டதென்று சொல்லப்படும். கர்ப்பாசயக்கழுத்து விரிவாகிவிடுவது அதின்மேலுள்ள சிறு காய்க்குள் அதுந்து அவைகளிலிருந்து உதிரும்வரும். கர்ப்பாசயஞ்சுருங்குவதால் இடுப்புநோய் உண்டாகும். இந்தநோய் பிரசவத்திற்கு விசேஷமானகுறியாய், கர்ப்பினிக்குச் சிலவேளை நோய் உண்டாவதுமுண்டு. எப்படியெனில் அந்த நோய் கர்ப்பாசயத்திலிருந்துவராமல் அடிவயிற்றி

விரிந்து காணப்படும். இதற்கு பொய்நோய் அல்லது சண்டிநோய் (பால்ஸ் பெயின்ஸ்) என்றுபெயர். இந்த நோய் பிரசவத்துக்கு அதுகூலமாயிருக்கும். ஆயினும் இந்தநோய் பிரசவத்தைச்சுறுக்கு வரப்பண்ணுகிறதாயில்லை, கர்ப்பாசயக்கழுத்து இதனால் விரிகிறதாயில்லை. இந்த நோய்வந்தால் சிக்கிரத்தில் ஆறித்திரும்ப உண்டாகும். இவ்வண்ணம் நின்றாகின்று உண்டாகும் காலமும் ஒழுங்கற்றதாயிருக்கும். இந்தநோய் மலக்குடயின் கோளாறினால் அடிவயிற்றின் எதிரிலுண்டாகும். அது அகற்றுவதற்குப் பேதிக்கக் கொடுக்கவேண்டும். தூக்கத்தை உடிகமாய்க்கெடுத்தால் அபிச்சேர்ந்த மருந்து கொடுக்கவேண்டும். கர்ப்பப்பையின் கழுத்துவிரிவதால் உண்டாகுஞ்சரியான பிரசவநோய் இந்தப்பாதத்தில் மிகக்கடுமையுந் தாக்க முடியாததுமாயிருக்கும். இது சரியான காலமுறையாய் வந்துகொண்டிருக்கும். வரும்பொழுது முதலின் பிற்பகுதியில் தொடங்கி, அடிவயிற்றின்மீதுப் புகுதிக்குச்சென்று இடுப்பையுந் தொடையையுந்தாவி நோயும் ஒருமுறை நோய்வெழும்புமாயி மற்றமுறை அதலெழும்பு எவ்வளவுநேரஞ் செல்லுமோ அந்தநேரமே நோய்வெழும்பும் எல்லாமுறைகளுக்குஞ்செல்லும். ஆயினும் வாவா நோய்வரும் முறையும் அதின்கடுமையும் அதிகப்பட்டுக்கொண்டே வரும் அதாவது பிரசவத்தொடக்கத்தில் நோய் அற்பமாயும், அமைணிகநேரத்துக் கொருமுறையு முண்டுபட்டு வாவாச் சிக்கிரஞ் சிக்கிரம் எழும்பும் இதுவுமல்லாமல் வந்தபின் அதுகிறதும் நேரமும் அதின் கடுமையும் அநிகமாயிருக்கும். இவ்விதமாய் ஒரு குறித்த பருவம்வரைக்குஞ் சம்பவித்துப் பின்பு அவைகள் மெல்ல ஓய்க்குவிடும். இந்த வகையான நோய் வந்திருக்கும்போது கர்ப்பாசயத்தின் அடிப்பகுதிவயிரிப்பாகும், ஓய்க்கேநோ மெல்லாம் அந்தப்பகுதி மெதுவாகிவிடும். நோய் எழும்பியிருக்கும்பொழுது யோனிவழியாய் விரிவிட்டபிரிசோதித்தால், கருப்பைவாய் கருங்குகிறதாயும், அநி


னாடாகப் பிறங்கிக்கொண்டிருக்கும் பனிநீர்க்குடம் நீர் முட்டிய ஜல்பையைப்போல இருக்கிறதாயும் விசுவக் குத்தோற்றமும். கருப்பையின் கழுத்து விரிவதற்கு இரண்டு ஓராயங்களுண்டு. கருப்பையின் கழுத்தை மேலே யிழுபடச்செய்யும் காரணங்களாய் கருப்பையின் முண்டமும் அடியுஞ் சுருங்குதல் ஒன்று; மற்றது நோய் எழும்பியிருக்கும்பொழுது பனிநீர்க்குடம் கருப்பையின் கழுத்தை நெருங்குதல்; இவை யிரண்டுங்கூடியே கருப்பையின் கழுத்தை விரியச்செய்கின்றன. இந்தப்பாதத்தில், சாதாரணமாய் இதின்முடிவில், குலைப்பின் என்று சொல்லப்படும் உறுதுறையும் சீக்கரமும் கிலவேளை உண்டபெறுதுமுண்டு. பிரசவத்தின் முதற்பாதத்தில் கர்ப்பினியின் குரல் கம்மிய சீச்சுக்குரலாயிருக்கும். சிசுவின் உதயமாகும்பொழுது கூபகத்திற் பிரவேசிப்பதைத் தடுக்கத்தக்கதான ஏதொரு தடைப் கருப்பையின் கழுத்தில் இல்லாதிருக்கும்பொழுது, அதாவது கருப்பைவாய் நன்றாய் விரிந்திருக்கும்பொழுது நோவிற்பெறும் பனிநீர்க்குடத்தை வெடிக்கவும் அதற்குள்ளிருக்கும் நீரை வெளியே ஓடவும்பண்ணும். இதலவையிலும் பனிநீர்க்குடம் கருப்பையின் கழுத்தை விசாலமாக்குவதற்கு அனுகூலமுள்ளதாயிருக்கது. ஆனால் பூரணமாய் விரிந்தபின் அதிலுள் யாதொரு பிரயோஜனமில்லை. ஆகையால் அது இப்போ உடையாதிருந்தால் பிரசவத்தைத் தாமதிக்கப்பண்ணும். இந்தப் பாதத்தின் காலநீட்சி பிகவாய் வித்தியாசப்படும். அது ஒரு மணிநேரத் தொடங்கி யிருபதுமணிநேரம் வரைக்கும் அல்லது அதற்கும் அதிகமாகவும் நீடிக்கும். முன்னே பிள்ளைப்பெற்ற ஸ்திரிகளைப் பார்க்க முகம்மீளே பெறும் ஸ்திரிகளுக்கு இந்தக்காலநீட்சி அதிகப்படும். அது அதிகப்படும்பொழுது அடுத்த பாதத்தின் காலநீட்சி குறையும்.

இரண்டாம் அல்லது வெளியே தள்ளிவிடும்பாதம், Second or Expulsive Stage (செக்கண்ட் ஆர் எக்ஸ்பல்

சிவ் ஸ்டேஜ்).—இது கருப்பைவாய் முழுதும் விரிந்து பனிநீர்க்குடம் உடைவதில் ஆரம்பித்த சீசு ஜெனனத்தடல் முடியும். கருப்பையின் வாய்முழுதும் விரிந்து பனிநீர்க்குடம் உடைந்தபின் கருப்பை சுருங்குஞ் செய்கையும், சற்றுநேரத்துக்குமுன்னே அடிக்கடியுண்டபெட்டும் அதிகரித்துக்கொண்டும் இருந்த நோய் இப்போ வராமல் சந்தே ஓயும். ஆயினுஞ் சீக்கிரத்தில் அதிக கடுமையாய் ஆரம்பிக்கும். இப்பொழுது அடிவயிற்றைப் பரிசோதித்தால், பனிநீர் வெளியில்வந்து கூபகக்குழியில் சிசு இறங்கிவிட்டபடியால், அடிவயிறு மிடிவது சிறுத்துத்தோன்றும். சிசுவை வெளியிற்பிடுகிறத்தள்ளிவிடக் கருப்பை இப்பொழுது அதிக பலமாய் சுருங்கும், முதற்பாதத்திலிருந்தகட்போல நோய் இப்பொழுது கத்தியாலறுக்கிறதபோலவும் தாங்க முடியாதமாயிராமல், மேலேயிருந்து கீழேதள்ளிவிடுவதுபோல அல்லது கீழாக நெருக்குவதுபோலத் தோற்றமும். ஒருமுறை நோய் எழும்பி மாறி மற்றமுறை நோய் எழும்பச்செல்லுங்காலம் குறையும், இப்படியே நோய் முன்னேயிலும் அதிக சீக்கிரம் வந்துகொண்டிருக்கும்பொழுது அது கடுமையிலும் காலநீட்சியிலும் அதிகப்பட்டு, சிசு உதயமாகச் சந்தேமுன் உறுதுறைய இடைவிடாது வந்துகொண்டேயிருக்கும். இந்தப்பாதத்தில் அல்லது படியில், கருப்பைவாய்முழுதும் சிசுவின் உதயமாகும்பாகம் அல்லது பகுதிக்குமேலே சுருண்டு விரலுக்குத் தோற்றமாய்ந்தாது. யோனியுள் கருப்பையும் ஒரே குரூரப்போல அல்லது வாய்க்கால்போல இருக்கும். மூர்க்கத்தல் ஹரிதமாகும் நோய் வெளியும்பொழுது அடிவயிற்றின் உரம்புகள் சுருங்கி வாங்குவதால் கருப்பைக்கு அனுகூலமாயிருக்க, வெளியேதள்ளும் அதிகச்சக்திக்கு உதவியாய் கர்ப்பினி தன்பெலன் எல்லாங்கூட்டி தன்கைக்குக் கிட்ட இருக்கும் எதையுந் தாவிப்பிடிப்பான். நோய் எழும்பியெழும்பி ஓயும்போதெல்லாம் சிசுவின் தலை வெளியில்வருகிறதும் உள்ளே

பத்தாம் படம்.

FIG. 10.



கருப்பையின்வாய் தோற்றமாட்டாது; பிரசவவேதனையிற் காணப்படுவதுபோல யோனி விரிந்திருக்கும் C - என்னும் குறியைக்கொண்ட வளைவான வரி பிரசவப்பாதையின் மத்தியைக்காட்டுகின்றது. B - கீழ்வெளியின் பரப்பையும் A - உள்வெளியின் பரப்பையும் காட்டுகின்றது.

ப்ளேவெயர் (Playfair) உடையகொள்கைப்படி.

போகிறதாமாயிருக்கும். - இப்படிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ச் சிசு வெளிப்படுவதால் யோனிலாய் கிழியும் மோசம் உண்டென இடம் இருக்கமாட்டாது. சிசுவின் தலை மலப்பையைஞ் சலப்பையையும் அழுக்குவதால் மல சலங்கழியும்; சாதாரணமாய் ஜலம்போ

வது கர்ப்பிணிக்குத் தெரியாமலிருக்கும். படிப்படியாய்த் கலை விடபத்தை அழுக்கத்தொடங்கி, அதிகமாய் வெளியில் அது வரும்போது பெலனாக முக்கும்படி நோரிடும். இப்பொழுது தலையதிகம் அதிகமாய் மாம்ஸ்தானத்தைச் (Vulva) சுற்றியிருக்குத் தசைக்கு ஊடாக வெளிப்பட்டு விடபத்துக்கு மேலாய்வுவி வெளியில் தள்ளப்படும். இன்னேரம் நோய் தாங்கமுடியாத அளவாய் உண்டெனக் கர்ப்பினியைக் குளறப்பண்ணும் இதன்பின். கொஞ்சம்-இளைப்பாற நோய் உண்டெனும். இந்த ஆற்றிவேளைமுடியவே ஒரோநோவுடன் சிசுவின் புஜங்களும் உடம்பும் வெளிப்படும். அந்த நோவுடன் தானே மீதியான பனிக்கும் வெளியில்வந்துவிடும்.

மூன்றம்பாதம் ஆகிய நடுக்க வெளிப்படும்பாதம், Third or Placental Stage (பின்னெனட்டல் ஸ்டேஜ்). - இந்தப் பாதம் சிசு வெளியில்விழுந்த அந்த நோமே தொடங்கும். இந்தப்பாதத்தில் தாது கர்ப்பினியை கூடியஜாக் கிரதையாயும் பவுத்திரமாயும் பார்க்கவேண்டியது. சிசு பிறந்தவுடன் கருப்பை நோய் மூன்றாந்தாமாய் நியும். ஓய்ந்தபின் அது படிப்படியாய்த் திரும்பவும் எழும்பும், அப்போது நஞ்சு அகின் இடத்தைவிட்டுப் பெயர்க்கப்பட்டு வெளியிலே தள்ளப்படும். நஞ்சுவிழ ஐந்துநிமிஷம் தொடக்கம் முப்பதுநிமிஷக்காலம் வரைக்குஞ் செல்லும்; நஞ்சு இருந்த இடத்தில் இருக்கின்ற நரம்புகள் கிழிவதால், அவைகளில் கீன்றுபாயும் இரத்தம், இப்பொழுது கர்ப்பாசயஞ் சுருங்கத்தொடங்குவதால் வெளிப்படாது. ஏனெனில் கருப்பை சுருங்குவதால் அந்த நரம்புகள் நெருக்கப்பட்டு அவைகள் வாயில் காணப்படும் இரத்தம் கட்டியாய் உறைந்துபோம். இப்பொழுது கர்ப்பாசயம் சுருங்கி ஒரு சிசுவின் தலையளவாய்க் கைக்குத் தோற்றி கூபகத்துக்குள்ளே டிடக்கு. இத்தடனே பிரசவம் முடிவாகும்.

வருகுதோவென்றும், அந்த சப்தம் கர்ப்பாசயத்தின் எந்தப்பக்கத்திலிருந்து வருகுதென்றும் அறியும்பொருட்டாய் ஸ்றமெ தஸ்கோப் என்னும் சப்தம் அறியுங்கருவியால் அடிவயிற்றை பரிசோதனைசெய்யவேண்டும்.

கர்ப்பிணியைப் பராமரிப்பவளாகிய மருத்துவிச்சிக் கும் அப்படியே கர்ப்பிணிக்கும் திருத்தி உண்டாகும்படியோனிவழியாய்ப் பரிசோதனைசெய்வது மிகவும் முக்கியமானகாரியம்; ஏனெனில் இதனால் சரியான பிரசவந் தொடங்கியதா என்பதையும் சிக் இயல்பானவிதமாய் உதயமாசுமா அல்லது வழக்கமற்றவிதமாய் உதயமாகுமா என்பதையும் அறியக்கூடியதாயிருக்கும். இராக் காலம்படுக்கைக்குப்போகும்பொழுது பெண்கள் தரிக்கும்விதமான இலேசான உடையை கர்ப்பிணிதரிக்க வேண்டும். அதன்பின் இடதுகைவிரலால் கிழாய் இருக்கத்தக்கதாய் கர்ப்பிணி ஒருகட்டிலிவகுத்தகாய், அதாவது இடுப்பு கட்டிலின் ஓரத்தில் இருக்கும்படியாய்ப்படுக்கவும் முழங்கால்கள் அடிவயிற்றுப்பக்கமாய் உயர்ந்து மடங்கவும் வலதுமுழங்கால் இடதுமுழங்கால்கு எதிராக இருக்கவுந்தக்கதாய் படுக்கும்படியெய்யவேண்டும். இப்படி மருத்துவிச்சிக் தன் இடதுகையின் ஆள்காட்டிவிரலிலும் நடுவிரலிலும் பரிசோதிக்கும் எண்ணையை (carbolie) கடவிக்கொண்டு அவைகளைக் கர்ப்பிணியின் யோலிக்குள் மேல்ப்புறம் பின்புறமாய் பீடிகை எலும்பு (sacrum) குழிக்குள் கருப்பை வாய்விரல் களுக்குத் தென்படுமெலகைக்கும் செலுத்தி ஆராயவேண்டும். இப்படி ஆராய்ந்து அறிவது எப்பொழுதும் இலகுவாயிருக்கமாட்டாது. ஏனென்றால் பிரசவ ஆரம்பத்தில் கருப்பையின்கழுத்து மெத்தப்பிரயாசத்துடன் எட்டித்தொடவேண்டிய அவ்வளவாய் உயர்ந்திருக்கும். அல்லது பீடிகைக்குழிக்கு நேராக பிற்புறமாய்க்கிடக்கும், ஆயினும் இப்பொழுது வலதுகையை வயிற்றின் மேல்வைத்து கருப்பையை அமுக்குவதால் இந்தப்பிரயாசத்தை நீக்கிக்கொள்ளலாம். சாதாரணமாய் நோய்

எழும்பியிருக்கும்பொழுதே இந்தப்பரிசோதனை செய்யப்படுகின்றது; ஏனென்றால் அந்த வேளையில் கர்ப்பிணி தன் நோவு சமதே தனக்குருறைந்திருக்கிறதாய்க்காண்பாள் - ஆயினும் மனத்திரிப்திக்கர்க் நோவு முடியும் வரைக்கும் விரல்கள் யோனிக்ஞர் செலுத்தப்பட்டதாயிருக்கவேண்டும். அடுத்த நோவு எழும்புவதற்குமுன்னும், எழும்பியுநோவு மாறுவதற்குமுன்னும் இந்த பரிசோதனை யச் செய்து முடித்துப் போடவேண்டும். இப்படிச் செய்தபதால் யோனியின்குடும், சரஸிப்பும், விசாலமும் வலவென்றும், அத் வலவளவுக்கு விடீந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அகின் பின்புறத்துக்கூடாய்ப் பரிசீலிப்பதற்குரிய ஆசனக்குடல் (rectum) கனங்கொண்டு நிற்கிறதாவென்றும், ஜலப்பை நிரல்கிறதாய் நிரலா அல்லவா என்றும், ஆசனத்தட்டுடன் பின்விசாலமும் வடிவமும் இன்னதென்றும், கருப்பைவாய் இருக்கும்விதமெப்படியென்றும், அதன் பருமை எவ்வளவென்றும், கருப்பையின்கழுத்து தடித்ததா அல்லது மெதுவாகவாயிருக்கின்றதென்றும், அத் விரியத்தக்கவிதமாயிருக்கிறதா, அல்லது மெதுவாக அல்லது வன்மையாக அல்லது விரியக்கூடாதுமெனக் இருக்கிறதா என்றும், பலரிக்குடம் இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா என்றும், சிக்வின எந்தப்பாகம் உடையதாகும் என்றும், பிரசவம் ஆரம்பித்தவிட்டதா இல்லையா என்றும் அறியக்கூடியது. சிக்வின்கலை இதுதானென்று, அதின் வன்மையையும் உண்டையான வடிவத்தையும் கபாலப்பொருத்துக்களையும் கொண்டு கன்றாய் அறிந்து கொள்ளலாம். இன்னும் அதின் தலை கூபகத்தின் ஓரத்திருக்கிறதா அல்லது கூபகக்குழிக்குள்ளாயிருக்கிறதாவென்றும் அறியலாம். கருப்பைவாய் போதிய அளவு விரிந்திருந்தால் தலை எந்தப்புறமாய்த்திரும்பி இருக்கிறதென்றும் அறியலாம். பனிக்குடம் இலகுவில் உடைத்துபோகக்கூடிய தன்மையை யுடையதாயிருப்பதால் நோய் எழும்பி இருக்கும்பொழுது இந்தப்பரிசோதனை

செய்வதில் பலிக்குடத்தை உடைத்துப்போடாதபடி மிகவும் விழிப்புக்கவனமுமாயிருக்கவேண்டும். சிசுவின் தலை எப்படிமாயிருக்குதென்பதை அறியப் பிரயாசப்படுவதைப்பார்க்க, காலத்துக்குமுன் பலிக்குடம் உடையும் மோசத்தைத்தவிர்த்துக்கொள்ளல் அபியுத்தமம். பரிசோகனைமுடிந்தவுடனே பிரசவ அவஸ்தை எவ்வளவு நேரம் நிற்குமென்பதையும் அதின் விர்த்தியையும்குறித்துமருத்துவச்சிகியை ஐனுவல்துண்டு, ஆராய்வு பின்பு பொய்யாய்ப்போகக்கூடிய ஏதொன்றை மருத்துவச்சி இப்பொழுது திட்டமாய்ச்சொல்லுகிறாது. தலைச் சண் பிள்ளை தாச்கிகளுக்கு பிரசவ சாதாரணமாய் நிகழ்பதுண்டென்பதையும், ஆராய்ச்சில் பெலனாய் நொந்து பிறகு நோய் குறைந்துபோகின்றென்பதையும், கருப்பைக்கழித்து ஒருமட்டுக்கு விரித்த கொண்டேவந்து பின்பு ஸீரியாமல் திமிர்கொள்ளுவதுண்டென்பதையும், பனிக்குடங்காலத்துக்குமுன் உடைந்துபோவதுண்டென்பதையும், அப்படி உடைவதினால் கருப்பைக்கழித்தை வன்மையாக்குவதுமன்றி பிரசவம் நிகழ்கவும், தீவநஷ்டத்தை உண்டெடுத்தத்தக்க பலவகைக் கஷ்டங்கடையுங்கொண்டு வருமென்பதையும் நன்றாய் ஞாபகத்தினைவந்து நடக்கவேண்டும். நல்ல பிரசவத்துக்கடுத்த அறிஞர்முதலிய ஒவ்வொருகாரியமும் அனுகூலமாயிருக்கின்றதென்றும், நோய் பெலமாயெழும்பினால் பிரசவஞ்சேர்த்தில் முற்றுப்பெறுமென்றும் கர்ப்பிணியின் பந்துக்களுக்கு நிச்சயப்படுத்திச்சொல்லுவது போதியதாயிருக்கும்.

பிரசவத்தின் முதற்பாதத்தின்முதலில் கர்ப்பிணியை அவள் இஷ்டப்படி அறைக்குள்ளே உலால், உளுக்கார அல்லது நிற்க இடங்கொடுக்கலாம். கருப்பைவாய வறக்குறைய முழுமையும் விரியுமுன் கர்ப்பிணிபடுக்கையில் படுத்துக்கொள்ளுவது அவசியமல்ல - படுக்காமல் விடுவதே மிகவும் நன்மையென்பது திட்டமாய்த்தெரிந்தகாரியம். எப்படியெனில் சிசுவை வெளியேதள்ளு

ஞ்சுத்தி சிசுவின்பாரத்தின் ஒத்தாசையைக்கொண்டு அதிந்தலையை கூப்பகத்தில் இரகசயசெய்யவேண்டியிருப்பதால், அப்படி அது இலேசாய்செய்வதற்காய் கர்ப்பிணியை உலால் அல்லது ஒரு நாற்காலியில் சாய்ந்தகொண்டிருக்கத் தைரியப்படுக்கவேண்டியது. கர்ப்பிணிமுன்னே பிள்ளைகளைப்பெற்றிருந்த காரணத்தால் வயிறு மிகவுஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்குமாயில், கருப்பையைத் தாதுக்கொண்டிருப்பதற்காய் வயிற்றை ஒரு வயிறுக்கட்டு நிர்யால் (பயிண்டர்) கட்டுவது பிரசவத்தின் இந்தப்பாதத்துக்கு மிகவும் அனுகூலமாயிருக்கும்.

மருத்துவச்சி இப்பொழுது தேவையான மற்றுள் காரியங்களைச் செய்து ஜாக்மிரதையாயிருக்கவேண்டும். மாட்டிதைச்சித் தேத்தண்ணீர் (beef tea) அல்லது ஆட்டிதைச்சி ருப்பை (mutton broth) சித்தப்படுத்தி வைத்துக்கொண்டு, அதிலே கர்ப்பிணிக்கு அடிக்கடி கொஞ்சக்குடிக்கக்கொடுக்கவேண்டும். மிகவும் அவசியத் தேவையாய்க்காணப்படும்பொழுதன்றி, மற்றப்படி லாகிரிவஸ்துக்களில் ஏதொன்றையுக் கொடுக்கப்படாது.

கர்ப்பிணி இருக்கும் அறைக்குள் சாற்றுதாராளமாய் வரத்தக்கதாய்ப் பண்ணவேண்டும். கர்ப்பிணியினசீரத்தின் ஒரோபகுதியிலுமாதிரம் காற்றுவிசுத்தக்கதாய் அவளை ஒரு நெருக்கமான வாசல்வழியாய் அல்லது ஜன்னல்வழியாய் வருங்காற்றுக்கெதிரோ வைக்கப்படாது.

கர்ப்பிணியிருக்கும் அறைக்குள் அதிகமாய் ஜனங்கள் வந்து சேரவிடப்படாது; ஏனெனில் அப்படி இடங் கொடுப்பது கர்ப்பிணியின் செளக்கியத்துக்கு நஷ்டமாகும். கர்ப்பிணியின் பந்துக்களில் ஆராயேனுமொருவனாமாதிரம் அறைக்குள்ளே இட்டுக்கொள்ளலாம். தேவையாய்வுரும் ஒவ்வொருசாமானுஞ் சமீபத்தினிருக்கவேண்டும். தேவைநேரிடும் அந்தவேளையில் ஓனதைத்தேடி, மருத்துவச்சிக்கும் அப்படியே கா

ப்பிணிக்கும் வெகுதொல்லைக்கிடமாகும். பின்னூற்றொல்லைப்படுபவைகளைச் சரமிப்பதில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். அவைகள்:—இரண்டுமுறை மாற்றிப்போடத் தக்கதானப் பருத்தித் துழைகள்; இரண்டு இராஉடுப்புகள் (night gowns); சிகவிற்கும் அதின் படுக்கைக்கும் வேண்டிய துணிகள்; வயிற்றுக்கடவதற்குவேண்டும், ஒன்றேகாலகெஜம் நீளமும் பத்தாறு அங்குலமுமான கசரிகம் அல்லது உரப்பான லாங்கினாத்துணி; மூன்றுமூலை நப்பின் குட்டைகள் (napkins); குழிந்தஜலமும் வெக்கீரும்; மிதுவீசையும் மாலைய அல்லது நஞ்சையும் பிடித்துவைக்க பாத்திரம்; சப்புக்கல் (soap); துவாலைகள் (towels); இன்னும் இந்த அக்காரத்தில் சொல்லியவற்றைகளும், மருத்துவவசதிகளும்.

இதன்பின் மருத்துவச்சி படுக்கையைப்பற்றிக் கவனிக்கவேண்டும். படுக்கையை காரைய சித்தப்படுத்தவதற்குத் தேவையானவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதிருந்தால், உள்ளதைக்கொண்டு மருத்துவச்சி சமாளிக்க வேண்டியது. எளியவர்களென்றால் இருப்பதைக்கொண்டு கூடியபாட்டுஞ்சராய் நடத்திக்கொள்ளவேண்டியது. கல்லறத்திலிருப்பவர்க்கிடம் வேண்டியவைகளைக்கேட்டுப் பெற்றுக்கொள்ளவாம். பிரசவநேரத்தில் கர்ப்பிணி படுப்பதற்காய் கல்லப்படுக்கையை சித்தப்படுத்திக்கொள்வது அவசியமென்பதையும், அவள் பிரசவித்தபின் கொஞ்சமாளும் சரமிவராததும் படுத்துக்கொள்ளாத சகமானதும் அடிக்கடி இடம்மாற்ற ஆஸ்பத்திரிசெய்வாததமான படுக்கையை சித்தப்படுத்திக்கொள்வது அதிலும் அதிக அவசியமென்பதையும் மறக்கப்பட்டது. இவைகள் இரண்டும் மருத்துவச்சியின் பிரதான கோக்கமாயிருக்கவேண்டியது. படுக்கையை சித்தப்படுத்தும் விதமானது - வழக்கப்படி சித்தப்படுத்திய படுக்கையில் விரித்திருக்கும் துணிக்கு (sheet)க் கீழே இருக்கும் துணிக்குமே வே தண்ணீர் உட்செல்லக்கூடாத துணியை விரிக்க

வேண்டும். இதற்குமேலே இடுப்புக்குகீழே மடிக்கப்பட்ட கம்பினியை (blanket) ஆகிலும், குட்டு (gudary), என்னும் மடித்தத்தைத் துணியையாகிலும் ஒழுங்காய்வைக்கவேண்டும். பிரசவநேரத்தில் வயிற்றின்குந்து வெளியில்வரும் பல்வகை அழுக்கும் இவைகளின் மேற்படிவதால், பிரசவம் முடிந்தவுடன் கர்ப்பிணி காய்ந்த துணிமீடல் படுக்கத்தக்கதாய் இவைகளை மெதுவாய் இழுத்து அகற்றிப்போடலாம்.

எல்லாவகை ஆயத்தங்களும் முடிந்திருக்க, மருத்துவச்சியும் கர்ப்பினியும் பிரசவசமயத்தைக் கவனித்திருக்கவேண்டியது. இந்தசமயத்தில் அடிக்கடி யோனிவழியாய்ப் பரிசோதனைசெய்வது புத்தியல்ல. அப்படிச்செய்வதினால் கருப்பைக்கழுத்தில் எரிச்சல் உண்டாகும்ல்லாமல் யாதொரு பிரயோசனமுமிராது. ஆயினும் கருப்பைவாய விரிந்து வருகிறதோவென்று அறிவதற்காய், இடைக்கிடை பரிசோதிப்பது அவசியமாயிருக்கும். பிரசவ ஆரம்பத்தில் நிர்ப்பதியான பரிசோதனை ஒருமுறை செய்திருந்தால், இனிச் சிகவைக் கீழே அடிவயிற்றில் இரக்க நோய் எழும்பும்வகைக்கும் அல்லது பணிக்குடம் உடையும்வகைக்கும் இரண்டாம் பரிசோதனைசெய்வது அவசியமல்ல. சிகவின் தலையுடனே நாபிக்கொடியும் அல்லது கையும் உதயமாகுமோவென்பதை மருத்துவச்சி அறிவது அவசியம், ஏனெனில் இதை எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அறியக்கூடியதோ அவ்வளவு சுருவில் அதை திருத்திக்கொள்ளக்கூடியதாயிருக்கும். ஆதலால்தான் இந்த இரண்டாம் பரிசோதனை மிகவும் முக்கியமாயிருக்கின்றது. அன்றியும் சிகவின் தலை எந்தப்பக்கமாயிருக்கிறதென்று இப்பொழுது சரியாய்த் தீர்மானிக்கக்கூடியதாயிருக்கும்.

பிரசவத்தின் இரண்டாம் பாதம் ஆரம்பிக்கும்பொழுது கர்ப்பினியை படுக்கப்பண்ணுவது புத்தி. இப்பொழுது யோனியை வெளியே தள்ளுவதாய் தோன்றும். கருப்பையின் வாய் முழுதும் விரிந்திருக்கிறதால்,

யும் இப்பொழுது யோனியும் கருப்பைக்கழுத்தும் ஒரே குழல்போல் ஆகிவிட்டதால் கருப்பைக்கழுத்தின் விளிம்பு ஒரு சிறிய வட்டத்தைப்போலவும் விரலுக்குத்தோன்றும். கருப்பை வாய்முழுதும் விரிந்தபின் பணிக்குடம் உடையாதிருந்தால் அதை உபாயமாய் உடைத்து விடலாம். அப்படிச்செய்யாமல் விடுவது இந்தப் பாதத்தை நீடிக்கப்பண்ணுவதுமன்றி அதிகால் யாதொரு பிரயோசனமுமிராது.

கர்ப்பிணி முக்கிப் பிண்டத்தை வெளியே தள்ளிவிடப் பிரயாசப்படுமொழுது, அவள் தனக்கு ஆதாரமாய் இழுத்துப் பிடித்துக்கொள்ளுவதற்காய் கட்டிவரின் குத்துக்காவில் ஒரு துவாலையைக் கட்டித் தொங்கவிடுவது வழக்கம். சிசுவின் தலை விடத்தை (perineum) முட்டத்தொடங்கும் வரைக்கும் கர்ப்பினியை அவள் இஷ்டப்படி எப்பக்கமாயாகிலும் படுத்துக்கொள்ள இடங்கொடுக்கலாம். பிரசவத்தின் இந்தப்பாதத்தில் யோனிவழியாய்ப்பண்ணும் பரிசோதனை முதல்பாதத்தில் பண்ணினதைப்பார்க்க அதிகமாய்ப்பண்ணவேண்டும். ஏனெனில், இது சிசுவின் தலை கருப்பையின் எப்புறத்தில் எப்பக்கமாய்க் கிடக்குதென்பதையும்; கீழ் இரங்குவதில் அதின் வீரத்தியின் தன்மையும் மருத்துவச்சிக்குத் தெரியப்படுத்தும். சிசுவின் தலை படிப்படியாய் இரங்குவதைத் தெரிந்துகொள்ளுவது எப்படியெனில், மேகன எலும்புகளுக்கு (pubic bones) கீழாயும் பின்புறமாயும் விரலை இட்டு சிசுவின் பிடரி, மேகனத்தின் வில்லானை வரையையக் கீட்டிவருகிறதாவென்று ஆராயவேண்டும் - இரண்டாவதாய், ஒரு விரலால் ஓரம் அல்லது விளிம்பு (brim) முழுவதையுஞ் சுற்றித் தடவிப்பார்த்து சிசுவின் தலை விளிம்புக்குட்டாய் வெளிப்பட்டுக்கீழ் இரங்குகின்றதாவென்று அறியவேண்டும் - மூன்றாவதாய் கபால ஓட்டின் பொருத்துக்களின் (sagittal suture) திசையைத் தடவிப்பார்த்து தலைமையகத்தை (conjugate diameter) க்கிட்டிவருகிறதாய்க் கண்டால், அது கீழே

இரங்குகிறதென்று நிச்சயமாய் அறிந்துகொள்ளவேண்டும் - நாலாவதாய் இரண்டு அல்லது அதிகமான விரல்களை செலுத்தி சிசுவின் உச்சிக்கும் கூபகத்தின் கீழ்வெளிக்கும் உள்ள தூரத்தைக் கவனித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றால் முதலமுதலையில் விரல்கள் தாராளமாய்ச் செல்ல இடங்காணப்படும். பின்பு வர வர விரல்கள் உள்செல்ல உச்சி இடங்கொடுக்கமாட்டாது.

கருப்பை வாய்முழுதும் மறைவதற்குமுன் தலை கூபகத்திலும் அதின் கீழ்வெளியிலும் பலமுறைகளிலும் இரங்கிவிடுவதுமுண்டு. தலைவெளிமடலை அழுக்குவதால் வெளிமடல் விக்கங்கொண்டு தலைக்கும் மேகன என்புற்கும் இடையில் அகப்பட்டுக்கொள்ளுவதுமுண்டு. இப்படிச்சம்பவிக்கும்பொழுது பிரசவம் தாமதப்படும்; நோய் ஓய்ந்திருக்கும்வேளையில் மடலை மெதுவாய் தலைக்குமேல் இழுத்து, மறநோய் எழும்பித் தலையை அகரகுகீழா விரங்கப்பண்ணுவதற்குமுன் அந்த இடத்திலேயே அதைப் பிடித்துக்கொண்டிருப்பதால் இந்தச் சங்கடத்தை அகற்றிவிடலாம். ஆனாலும் அவசரமின்றிக்கைவிடப்படாது. கையை இடவருகிலும் அதிகம் மெதுவாய்க் கையை இட்டுக் கிரியை செய்யவேண்டும்.

நோய் எழும்பி பிரசவவிர்த்தியைத் திர்ப்தியாய் நடந்தேறச்செய்யுமேயாகில் எவ்வளவேனும் தலையிடுவது அவசியமல்ல. மருத்துவச்சி ஜலப்படி நிறைந்திருக்கிறதாவென்றதைப்பார்த்து, நீர் முட்டியிருந்தால் காத்திட்டர் என்னுங்குழலால் அதை வெளியாக்கவேண்டும். பிரசவம் தாமதப்பட்டிருக்கிறவேளையில் சப்தம் அறியும்கருவியாகிய ஸ்த்ரெதஸ்கோப் (stethoscope) கொண்டு சிசுவின் நெஞ்சுத்துடிப்பு நன்றாயிருக்கிறதோ வென்பதை அடிக்கடி சோதித்து அறியவேண்டும். வெளியேதள்ளிவிட முக்கும்சக்தி குறைந்தவராக்கண்டால், கருப்பை தன் கிரியையை நடத்தும்சக்தியைப் பலப்ப

தெத வயிற்றின்மேல் துணியால் இறுக்கிக்கட்டவேண்
டும். அல்லது பலம்புகாடுக்கும் ஏதேனும் ஒருமருந்
தை அபானவழியாய் உள்ளே செலுத்தவேண்டும். கலை
அதிகமாய் இரங்கும்பொழுது விடபம் (perineum)
விசாலிக்கும். மருத்துவசகி இப்பொழுது கர்ப்பிணிக்
குப்பிற்பக்கமாய் உளுக்கார்த்துகொண்டு அவளை மேலே
விவரித்துக்காட்டியபடி ஆப்ஸ்டெட்ரிக் பெரிசிஷன்
ஆக (obstetric position) படுக்கையில் குறுக்காய் படுக்
கும்படிசெய்யவேண்டும். உதவிசெய்யத்தக்க ஆள் பக்
கத்தில் இருந்தால் கர்ப்பிணியின் வலதுகாலே உயர்த்தி
க்தாக்கிக்கொண்டிருக்கும்படி அவளுக்குக் கற்பிக்கவே
ண்டும். ஒருவரும் இல்லாதபட்சத்தில் ஒரு தலையணை
யை இரண்டாய்மடக்கி கர்ப்பிணியின் இரண்டு முழ
ங்கால்களையும் பிரித்துவைக்கும்படிக்கு, அவைகளுக்கு
இடையில் அதைவைக்கவேண்டும். விடபம் கீழியாமல்
பிரசவம் நடக்கும்படியான அவ்வளவு கவனமாய் மருத்
துவசகி இப்போது தன்வேலையைமுடிப்பது அவளு
டையகடமை. சிகவீன்தலை விடபத்தை அதிகமாய்
விரியச் செய்யும்படிசெய்தல் அதாவது தலை விடபத்தில்
முட்டிக்கொண்டு கொடுங்குவதால் அதை உப்ப அல்லது
ஊதப்பண்ணுமேயாகில் வலதுகையின் பெருவிரலா
லும் அதின் மற்ற விரல்களாலும் மர்ப்புதான் இருபக்க
ங்களையும் கொடுக்கி இப்பொழுது இரண்டு துடைகளு
க்கும் இடையே கொண்டுபோயிருக்கின்ற மற்றக்கை
யின் துணிப்பகுதியால் புறப்படுகின்ற சிகவீன் உச்சி
யை அதவழியுயர்த்தள்ளப்படாமல் மெதுவாய் வெளி
க்கிடத்தக்கதாக அமர்த்திக்கொள்ளவேண்டும். இப்
படிச்செய்வதால் விடபம் சுகதியாயும் பலமாயும் விரி
வதை அல்லது உப்புங்கதைத்தடைப்படுத்தி, அது கீழி
யவரும் மோசமான நிலையையும் சந்தே மாற்றலாம்.
கைகளை இவ்விதமாய் விடபத்தில் வைத்துக்கொண்டு
கர்ப்பிணியின் அருகில் கெடுதோம் உளுக்கார்த்திருக்கப்
படாது. தலைவெளிப்படும் உள்வாங்கிக்கொண்டும்

ருப்பதால் படிப்படியாய் உண்டாகும் யேனையை அடு
த்த இடங்களின் விரிவைத்தக்காற்படி அதற்குப்போ
தியதோர் கொடுக்கவேண்டும். இனி இடமில்லவெய்
து சொல்லத்தக்க அவ்வளவு அதிகமாய் அகண்ட அல்
வது விரிவுகொண்டு சிகவீன்தலை வெளியே தள்ளப்ப
டும் அந்தச்சமயத்தில் மருத்துவசகி உதவிரெய்வது
அவசியம். சத்தத்ததப்பற்றி விடபத்தின்மேல் ஒரு
துவாலையைவைத்துப் பின்பு அதன்மேல் மருத்துவ
சகி தன் கையை வைத்துக்கொள்ளலாம். விடபம் மெ
த்த உரப்பாய்த்கொத்துமாறில் அதை இளகப்பண்ணு
வதற்காய் வெந்நீர்ச் சப்பளாஹைநனைத்து பிழிந்து ஒற்
றிடம்போடவேண்டியது. சிகவீன்தலை புறவம்வலா
க்கும் வெளியான உள் புள்ளி மூக்கும் வாயும் நாடி
யும் வெளிப்படும்வகைக்கு விடபத்தை மெதுவாய் பின்
துக்கிழுக்கவேண்டும். இப்போது சிகவீன் வாயிலும்
மூக்கிலும் காணப்படும்சூதையை அதற்குவிட்டு உட
லே கழுத்தைசுற்றித் தாங்கிக்கொடி சற்றிக்கொண்டி
ருக்கிறதானென்று விசுவஸ்துபிந்தது அப்படியிருந்தால்
அதைகொஞ்சும் இழுத்து தழுக்குமெவரயத் தள்ளிவிட
வேண்டும். இப்படிச் செய்க்கூடாதான புஜங்கள்
புறம்பாக்கப்படும்போது அவ்வுகளைப்போய் நடுவலிட
வேண்டும். சிலசமயங்களில் இரண்டு மூன்றுசுற்று
பூத்துக்க சுற்றியிருந்து அவற்றை எடுக்கக்கூடாமற்போ
னால் நாபிக்கொட்டியது இரண்டாக்கி உடலே சிகவை
பிறப்பிக்கப்பண்ணுவது விரியாநவாழக்கம். சிகவீன்
தலை உதயமாகியவுடனே சுருப்பாசியம் விரிந்துவிரிந்து
சுருங்குருசெய்யாதுசிறுந்து சந்தே ஓய்ந்துகிடக்கும்.
புஜங்கள் உதயமாகும்பொழுது விடபத்தை மறுபடியுந்
நாங்கிக்கொள்ளவேண்டும்; புஜங்கள் வெளிப்பட்டவுட
னே சிகவீன்பிடிசையை வலதுகையால் தாங்கிக்கொண்டு
கர்ப்பாகக் கொஞ்சித் தாங்கி உடலை வெளியிப்பிடுக்
கித்தள்ள இடங்கொடுக்கவேண்டும். உடல் உதயமாக
அதிகமாய்த் தாங்கப்படும்மேயாகில் அதனைசெய்கையை

தடுத்துவிடுவதற்காய் அதின் அடிப்புறத்தை உணர்ச்சு தேய்க்கவேண்டும். ஆயினும் இப்படியான தாய் தம் உண்டாவது மிகவும் அரிது. உடம்பை வெளியில் வரப்பண்ணுவதற்காய்க் காலத்திக்குமுன்னே தரிதப்பட்டால் உதிரப்பெருக்கை வரப்பண்ணுவதற்கும் என்னென்றால் கர்ப்பாசயம் இளைத்துப்போயிருக்கிற மயத்திலே அதிலிருந்து உடம்பை வெளிப்படுத்தியும் செய்கை உதிரப்பெருக்கிற்கு மிக அதிக உலமையிருக்கும். கர்ப்பாசயத்தில் சிசு ஒருவேளை பலம் ஒடுமதி அசைவற்றுக் கிடக்கக்கூடிய மோசம் நேரிலெவகாதத் தோன்றினால் இரண்களையின் ஆனகாட்டி விரவ்களையும் மெதுவாய் உள்ளே செலுத்தி சிசுவின் அக்குளி அல்லது கழுக்கட்டில் கொழுநிக்கொண்டு மெதுவாய் இழுக்கவேண்டும். ஆனால் இப்படிப்பட்ட செயல்கள் இடமுண்டாவது மெத்த அரிது.

கர்ப்பாசயம் சுருங்கும்பொழுது அதை அழுத்திச் சுருக்கப்பண்ணுவதற்காய் அடிப்புறத்தையே மெல்ல வந்த திருக்குங்கையை உலவையாக அத்துடனே பதிகது செல்லப்பண்ணவேண்டும். உதிரப்பெருக்கு வராமற்பண்ணுவதற்கு இதொரு மகாமுக்கியதருணர்.

பூன்றும்பாதம் ஓகியந்தக வேளிப்பமே பாதம். — பிரசவத்தொடங்கின உடனே அதின் நாபிக்கொடியைக் கட்டவும் வெட்டவும் ஆரம்பிக்கலாம். கர்ப்பாசயத்தை இன்னும் அழுக்கிக்கொண்டேயிருக்கவேண்டும். உதவிச் செய்பவர்கள் ஆரம்பிலும் அருகிலிருந்தால் அவர்கள் பொறுப்பில் இந்த வேலை யை விடலாம். உதவி ஆன இல்லாதிருந்தால் வயிற்றைக் கட்டிப்போடவேண்டும். தொப்புளிலிருந்து ஒரு அங்குலத்துக்கு மேலாக ஒருகட்டம் இதில் இருந்து ஒன்றரை அங்குலத்துக்கப்பால் இன்னமொரு கட்டமாய் நாபிக்கொடியில் இரண்டுகட்டி கட்டவேண்டும். நாபிக்கொடியை அழக்கும்பொழுது சிசுவின் கைவிரல் கால்விரல்களை லெட்டிப்போடாத

படி கவனமாய்ப் பார்த்து அழக்கவேண்டும். நாபிக்கொடியின் முதற்கட்டு சிசுவிலிருந்து இரத்தம் ஓடாமல் தடுப்பதற்காய்க் கட்டுவதால் இதை நன்றாய் இது கிக்கட்டவேண்டும். இரண்டாகக் கட்டு நஞ்சுபக்கமா இருந்து உதிரம்வராமலும் சுத்தத்திற்காகவும் கட்டப்படுவது - ஒரே நஞ்சுடன் இரட்டைப்பிள்ளைகள் திறந்தால் அதினால் உதிரம்போவது இரண்டாம்பிள்ளைக்கு மோசத்தை விளைவிக்குமாகையால் அதை கவிரக்கவேண்டும்.

சிசு தாயைவிட்டுப் பிரிக்கப்பட்டவுடன் அதை ஒரு துண்டு கம்பினியால் சுற்றிமுடி ஒரு பக்கமாய் கிடத்தி விட்டு தாயை மல்லாக்கக் கிடத்தி அதாவது முதுகு பக்கங்களில் படுக்கையாய்ப் படுக்கப்பண்ணவேண்டும். இப்படிப் படுப்பதால் கருப்பையை வேண்டியபடி செலுத்துகொள்ளவும் அதின் முற்புறத் தோற்றம்படி இருப்பதற்கு நண்ணவும் கூடியதாயிருக்கும். இப்பொழுது சர்ப்பாசயம் எலும்புக்கு (pubes) மேலாய் பெரிதாயும் கைக்கு மெதுவாய் ந் தோற்றம். பிரசவத்தின் இந்தப் பாதத்தின் செய்யப் படும் நிரவாகம் தலவது பக்குவமே மலமெல்லாப் பக்க வங்கிலும் அதிமுக்கியம். பிரசவத்தின் பின் உண்பதற்கும் உதிரப்பெருக்கு (post-partum hemorrhage) குறைவதும், கர்ப்பாசயம் நன்றாய்ச் சுருங்குவதும், பிரசவத்தின் பின் உண்டாகும் நோவின் அளவும் கடுமையாக குறைவதும் தாய் அபாயத்தில் வின்று நீங்கி மருத்து ஆறுதல் அடைவதும் இந்த வேலையில் செய்யும் வேனமான பக்குவத்தால் ஆகவேண்டியது. கர்ப்பாசயம் நன்றாய்ச் சுருங்கி, இவ்விமலம் அதற்குள் இருந்த உதிரம் கரக்கவும் அதினால் அதை விரியச்செய்யவரும் கூடாமற்போகும் வகைக்கும் சிசு உதயமாகியபின்னும், நஞ்சு அல்லது மாயைவிற்பனையும் சற்றுநேரம் ஓய்வு உண்டாவது நல்லது; ரணெனில் அது கர்ப்பாசயத்துக்குள் இருக்குஞ் சிறு நரம்புகளின் வாய்கள் மூடப்படுவதற்காய் அவைகளில்

இருந்து பொதியும் உதிரும் உறையும்பொருட்டு
காகவேண்டிய சமயம் நிகரென்கிறதாகும்.

மாயை அல்லது கஞ்ச வெளியே தள்ளப்படுவது
குர சாதாரணமாய்க் காலமணிநேரம் அல்லது இருபது
நிமிஷங்கு செல்லும். கஞ்ச வெளியே தள்ளப்பட்டபொ
றும் உதிரும் பொகாமலும் இருந்தால் அனாமணிநேரம்
பொறுத்திருந்து, அதன்பின் அதை வெளியே பிதுக்கித்
தள்ளப் பிரயத்தனப்படலாம். எப்படி வெளியில் வயிற்
துக்கு மேலாய் கருப்பைநிள் அடிப்புறத்தை இருகை
யின் உட்புறத்தால் - விரல்கள் கீழாக நிற்கவும் கருப்
பையின் அடிப்புறத்தின் இருபக்கத்திலும் இருகையும்
இருக்கவும் - பலமாய்ப்புறநிப் பிடிக்கவேண்டும். இவ்
வொரு பக்கத்தையும் பலமாய் நெருக்குவதால் கருப்
பை கருகிவிடுகிறதாய்க் கைக்குத்தேர்ந்திலுமாத்
தீரம் இப்படி நெருக்கவேண்டியது. இந்த உபாயம்
யாய் நடத்தப்பட்டு பிரசவ அளவு பலமாய்க் கஞ்சப்
பாசம் கசகையுமேயாகில் கஞ்சை காலிப்பபெ
உறைந்த உதிர்ப்புடிசனருடன் இது தள்ளப்பட்டு வெ
ளியில் வரும். இப்படிச்செய்து கஞ்சை வெளியி
மல் இருப்பது மிக அருமை. நாடிப் பாடி சவ்வுக்கு
குள்கிருக்க சவ்வுக்குமேல் காப்பாட்டத்தின் உட்புற
தில் முட்டிக்கொண்டிருக்கும் கஞ்சை சாதாரணமா
வெளியில் தள்ளப்படுகின்றது.

கஞ்சை வெளிப்படுத்துவதற்குப் முதலசெய்த பி
யத்தகனத்தால் அனுகூலம் அடையா நுக்தால் காப்ப
சயம் மறுபடியும் கருக்கத்தொடங்கு வனாகுகற் கா
திருந்து முன்போல் திரும்பவும் காப்பாசயத்தை அம
த்தி நெருக்கவேண்டும். அப்பொழுதும் அது கஞ்சை
வெளியே தள்ளாமல்போனால் யோனியை ஆராய்ந்த
பார்க்கவேண்டும். கஞ்சை முழுதும் யோனிகுள்ள
ருப்பதாய்க் காணப்பட்டால் மெதுவாயும் - உதிரம்
யும் அதை வெளியே இழுக்கப்போடலாம். அப்பொழுது

காப்பாசயவழியாய் கஞ்சைக்கொடியாகிய காபுக்கொடி
யைத் தொடர்க்கதோய் கஞ்சைக்காப்பாசயக் குழியில்
தாய்க் கண்டால் அதை வெளியே தள்ளித்
இருப்பவண்ணிக் காப்பாசயத்தைத் திருப்பவும் அழுக்க
வேண்டும்.

வெளியே தள்ளப்பட்டபின் சவ்வுகள் சாதா
யோனிகுள்ளே சிந்துவீடும். காப்பாசயம்
பாடிருக்கும்பொழுது அல்குச்சை மெதுவாய்
எடுக்கப்போடவேண்டும். என்னெனில் அந்
தான் சவ்வுகள் எல்லாம் வெளியேவரும்.
நெருக்கப்பட்ட கஞ்சை பூரணமாய் அல்லது முழுதாயிரு
வெளியே இல்லையா என்று சேர்த்துப்பார்க்கவேண்
கிறது. என்னெனில் கஞ்சில் அவ்வாறு சவ்வுகளில் ஒரு
துண்டி காப்பாசயத்தில் சிந்துபோனால் தாய் அபாய
மானவகிதியில் இருப்பதாய் என்னெனிக்கொண்டுவே
மும். என்னெனில் இது அவனுக்கு இரண்டாம்காமன்
பிரப்பெருக்கையும் பிரசவ நாத்தையும் காப்பாசய
ஸ்தம்பனத்தையும் கொண்வெளும்.

உதிரப்பெருக்கல்லாமலும் கருப்பை கலையுங் கரு
கி இனிமேல் இளகுநீர் தன்மையைக் காட்டாமலும்
நிர்ந்தால், கஞ்சை விழுக்கவுடனே வயிற்றைக்கட்டிப்
போடலாம். அனுகூலம் சிகரேந்த அனாமணிநேரத்
துக்குப்பின் அப்படிச்செய்யவேண்டும். உதிரப்பெருக்
கிருக்குமேயாகில் வயிற்றைக்கட்டிநெண் காப்பாசயத்
தைக் கைகளால் இரண்மெணிநேரம்மட்டும் அப்படிப்
பிசைககக்கொலாடிருக்கவேண்டும்.

வயிற்றைக் கட்டித்தொடங்குமுன் தாய்க்கொடு
புழம் இழுக்க உதிர்காமல் சாரமான உடையவளிடம்
நாயாகவும் மெதுவாய் ஆகற்றவேண்டும். தள்ளை
உச்செல்லக்கூடாதுதணிக்கு தேவே விரித்தகணியை
மேலே சிந்து காப்பாசயம்மடித்து, அத்தாடனே
இப்ப்பைத்தாக்கவைத்தும்மெனியயுத்திரைக்கமெயு

பதிலாய் வெளுத்துப் ஆய்வுகள் சோதனம் இரத்த
தாசயத்தில் துடிப்பில்லாமலும் பிறப்பதுண்டு இந்த
ஸ்திதி முகநியதைப்பார்த்து மகமோசமானது
சலாகிப்பதை தூண்டிவிடுதற்கு துரிதப்பட்டுவண்ண
டும். உடனே நாபிக்கொடியை அறுத்துத் தாயிலிரு
ந்து சிசுவைப் பிரித்தெடுத்துக் கொண்டு வரவும் வாய்
வாயிருக்கும் சளியை அதற்கிவீட்டு, முகத்திலும் மார்பி
லும் பச்சைத்தண்ணீர் ால் அடித்துப், புட்டத்தைக் கை
யால் அடித்துப் கற்பூரதயிலத்தை மார்பிலும் முகத்தி
லும் பூசிக்கேயத்து, சிசுவை வெந்நீரிலும் குளிர்க
நீரிலும் ாற்றிமாற்றி வைக்கவேண்டும். நுகம் அ
மாய் கன்றின சிவவகொண்டிருந்தால் நாபிக்கொடி
உடனேவெட்டாமல் அழிவிருந்து இரத்தக் கிசவுக்
செல்ல நுடங்குகொடுக்கவேண்டும். இவைதனித்த
யும் வாய்க்காமற்போனால் இவர்க்கையால் சுகன்

ணவேண்டும். சிலவெஸ்ட்ஸ் (Sylve
ராலும் உபாயத்தை இரத்ததாய்ச் செ
அதைச் செய்துபார்க்கவும். எப்ப
யை மல்லாக்கப் பிசைச்செய்து உ
மருத்துவசரி தன் இருக்கையால்
சிசுவின் கலைக்கு மேலாகச் செ
ந்து உயர்த்தி டின்பு உடனே அ
புறங்களுக்குக் கொண்டு வந்து சுட்டு
ண்ணெய் அகிள் நெருக்கி நெரு
அந்தவிதமாய் இடைவெட்டாமல் ஒரு
ராட்டு அல்லது இரத்தப் புண் முறை
சய்வுகே. இதிலுள்ள சித்திபெரு
உறால் (Marshall Hall) பண்டிதர்
ய்ச் செய்துபார்க்கவும். அது எப்
பு முன்போல மல்லாக்கச் சுட்டுத்தி
டும் ஒருபுறமாய்த் திருப்பும் அ
ள அகிள் சிலையின் பின்புறத்தைத் தை
மாந்திக்கொள்வது உதும் ஒருவகை

ராயக்குழந்தையை மூச்சுவிட்டபண்ணை எப்பொழுதும்
விடாமுயற்சியாய் நாம் பிரயத்தனப்படவேண்டும். ஒ
ருமணிநேரத்துக்குள்ளாகவும் அதற்கு அதிகமான நேர
த்துக்குப் பின்னும் இவ்வழிவகைகளினால் சித்தியடைந்
ததாயப் புத்தகங்களில் அநேக உதாரணங்கள் சொல்
லப்பட்டிருக்கின்றன. இரத்ததாசயத்தில் துடிப்பு இரு
க்கும்வரைக்கும் நம்பிக்கை விடத்தேவையில்லை.

7-ம் அதிகாரத்துக்கு அதுபந்தம்.

பிரசவ நிர்வகிப்பு.

1. இங்கிளின் (Ingram's) பிரசவகுழல் (இது அபரண மார்க்கப்பிரயோகத்துக்குமாத்திரம் உதவும்).

2. இங்கியா ரப்பர் மூத்திரக்குழல்.

3. கண்ணாடி மூத்திரக்குழல்.

4. இரண்டு இடுப்புக் கட்டுகள்.

கைப்பிடியுள்ள ஜலபாத்திரம் (irrigation can)—இது உட்புறம் தந்தம் அல்லது எவரேரிய வர்ணம் பூசிய பிங்கான் அல்லது மண்பாத்திரமாக விருப்பதோடு, இரண்டு (quarts) காஸ் கால்வன் ஜலம்பிடிக்கக்கூடியதாக வுரிருக்கவேண்டும்.

5. 1-க்கு 4 - பங்குஜலம்சேர்த்த (Iodoform ointment) அபோப்பரம் ஆயின்மேண்டு கிரப்பிய ஓர் சிறு பிடி.

6. 50-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த (antiseptic solution) அழகல் அகற்றித் திராவக புட்டியொன்று—இது ஒருசமயத்திற்கு சுமார் 6 - அவுன்சு அளவுபோதுமானது. இதற்குப்பலிகை “சல்விரசுரணம்” (corrosive sublimate) பன்னிரண்டுபொட்டலம் கையில்லகொண்டுபோகலாம்.

7. ஒருநாளியமணி சவ்வியம் (கரோசீவ்சப்ளிமேட்) கறைத்து 2-அவுன்ஸ் கிளரின் மருந்தில்சேர்த்த (ex-amining fluid) “பரிட்சாத்திராவகம்” அடங்கிய லீஸா ஒன்று - இது (பிட்டத்திட்ட) 1000 - ந்துக்கு 1 - பங்காய்ச்சேர்த்த மருந்தின் வலிவு இருக்கவேண்டும்.

8. சுமார் 2 - அவுன்ஸ் “காற்பாலிக் ஆலிட்” (carbolic acid) திராவகம் லீஸா ஒன்று. 8 - அவுன்ஸ் தண்ணீருக்கு ஒருதேயிலைக்கரண்டி இம்மருந்தைச் சேர்

க்க, 40-க்கு 1 - பங்காய்க்கூட்டிய மருந்தின் வலிவுடையதாகி, லோலுததாற்செய்த ஆயுதங்களைத் தோயவைக்கத்தக்கதாகும்.

9. ஹிலெட்ஸ் லிகர் எங்கட்டி (Hewitt's Liquor Ergotie) அல்லது எக்ஸ்ட்ராக்ட் எங்கட்டிஷி (Extract Ergot. Liquid) அடங்கிய லீஸா ஒன்று.

10. காற்பாலிக் துஷிட்ஸோப்பு (carbolic acid soap) கட்டி ஒன்று.

யதார்த்த பிரஸவவேதனையில் காற்பாசயம் இறுதும் காற்பாசயங்கழுத்து சிறிதுவிரியும். யோனியின்னும் (கோழைபோன்ற) ஓர் வெண்பசைநீர் கசிவுகொண்டு, அவ்யோனி வாய்க்கால் ஓயர்ந்துவிற்கும். பொய்ப்பிரஸவவேதனையில் காற்பாசயம் நிற்பாதிதமாயிருக்கும். கோயோ சொற்பநேரத்ததும், பிடிப்போடுகடியதுமாயிருக்கும். இது ஏதேனும் பேதிமருந்து அல்லது வாய்வுகண்டன (கார) மருந்துகொடுக்க, சிவர்த்தியாகும்.

குறிப்பு.—இதனோடு 23 - வது “அதிகார” த்தையஞ்சேர்ந்து வாசிக்கவும்.

8 - ம் அதிகாரம்.

பிரசவத்தின்பின் பராமரிக்கும்வகை.

MANAGEMENT OF THE PUERPERAL STATE.

மாணேஜ்மென்ட் ஆப் தி பூர்பெரல் ஸ்டேட்.

பிள்ளைபெற்றவளுடைய சுகமானது பலவகை அபாயங்களினாலும் விபாதிகளினாலும் வளராமல் கடைபட்ட ஏதாவயிருப்பதால், அதைக் கவனமாய்பராமரிப்பது முழுதும் வைத்தியனை பொறுத்த கடமையாயிருக்கின்றது. பிள்ளைபெற்ற ஒருமாதிரிவகையில் தாதி செவ்வலேண்டிய பிரதான வேலைகளை அவளுக்குக்காட்டுவதும் அவளுடைய கடமையான விவரமாயச் சொல்லுவதுமே இந்த அதிகாரத்தின் எழுதும் நோக்கம்.

பிள்ளைபெற்றவளுடைய அறை யாகொரு சத்தமுமின்றி முழு அமைதியாயிருக்கவேண்டும். சில நாட்கள் கழியும்வகைக்கும், பிள்ளைகளையும் அவசரமின்றி வேடிக்கைப்பார்க்க, சூருபவர்களையும் அறைக்குள்ளே வராமல் முழுதும் தூங்கவேண்டும். பிள்ளைபெற்றவளுடைய நெருங்கிய பந்துக்களைத்தவிர வேறொருவரும் அவளைப்பூர்க்கப்போகப்படாது. ஏனெனில் இவைகள் எல்லாம் அவள் இளைப்பாறுவதைக்கடுத்து, மனதைக்கலங்கி, சுகத்தைவளரவிடாமல் கெடுக்கும்நாணங்களாயிருக்கின்றன.

ஸ்திரீயைச் சுகமாய் படுக்கைப்பண்ணியபின் அவளைத் தூங்கவிடவேண்டும். பிரசவித்தகேரம் தொடக்கம் ஆறுமணிகேரம்வரைக்கும் அவளைக் கவனமாய்ப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும், அந்நேரம் முகத்திலுள்ள மூச்சிலாவது ஏதும் வித்தியாசம் காணப்பட்டால் அதை உடனே கவனிக்கவேண்டும். அவளுக்குக் கூட்டிய கைக்குட்டையில் தீட்டுப்படுத்தித் தோவென்றும், அதிசந்தனமை எப்படியிருக்கிறதென்றும், கர்ப்பாசியின்

கைக்குத்தோற்றுப் பருமன் எவ்வளவென்றும் கவனிக்கவேண்டும். பெய்துள்ள அல்லது கைக்குட்டைகளைந்து கர்ப்பாசியம் மெதுவாகவும், தளர்ந்தும், பெய்தாகியும் கைக்குத்தோற்றுமாநில கர்ப்பாசியத்தில் உதிரக்கட்டிகள் இருப்பதாக ஊகித்து வைத்தியரை அழைக்கவேண்டியது. ஏனெனில் சிக்கிரமாக இந்த உதிரக்கட்டிகளை அப்புறப்படுத்துவது அதிக உத்தமம். அவர் இல்லாவிட்டால், மருத்துவசகி இரண்டுவிவரங்களை கர்ப்பாசியவாய்க்குள் செலுத்தி கர்ப்பாசியத்தை சுத்திசெய்யவேண்டியது. இது ஆளபிதரு சிலதரம் எர்ட்டெகிராகம் கொடுத்தால் அது கர்ப்பாசியத்தை நிச்சயமாகச் சுருங்கச்செய்து, திரும்பவும் உதிரக்கட்டிகள் உண்டாகாமல் தடுக்கும். முதல் இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு இரண்டு மூன்றுமணிகேரத்திற்கு ஒருமுறை பக்கினை மாற்றவேண்டும்.

ஆறு அல்லது எட்டுமணிகேரம் கழிந்தபின்பு அவளது ஸ்திரீயானவள் விழித்தப்பிற்பாடு அவளை ஒன்றுக்கு இரீக்கச்செய்யவேண்டும் இப்படி செய்யக்கூடாமாயிருந்தால் கம்பினியை சுமெஜலத்தித் தோய்த்து, பிழிந்து, சூடுறைக்க மர்மஸ்தானத்தின்பேரில் ஒத்திடம் போட்டால் இவ்வித உபாலை சிவர்த்தியாகும். அவள் திரும்பவும் இன்னொருமுறையிருந்து பார்க்கலாம்; இந்நேரமும் போகக்கூடாமையானால் மூத்திரப்பை நிறைந்திருக்கிறதாவென பீடிக்கமேல் கையைவைத்து அவிந்துகொண்டு, அப்படியிருக்குமாகில் ஒருசுத்தமான மூத்திரவளைகுழலால் நீரா வெளிப்படுத்திவிடவேண்டும். அவள் முக்கும்படியாக விடக்கூடாது. ஏனெனில் அதினால் கர்ப்பாசியம் எந்த பக்கமாகிலும் பெயர்ந்து இடம்மாறும்; அதினால் உதிரப்போவாகம் உண்டாகும்.

இப்போது ஆகாசம் தேவையாயிருக்கும், வலித்தியர்சொல்லுகிற ஆலோசனைபின்பிரகாரம் எப்போதும்

102 பிரசவத்தின்பின் பராமரிக்கும்வகை.

சரியாய் நடத்தவேண்டியது. அது ஏதாவிருந்தாலும் சொல்லியபடி அதை செய்விக்கக்கொடுப்பது தாதிபி என்பொறுப்பான கடமை. வயித்தியர் சொன்னதை மீறி கோயாளியையாவது அவள் இஷ்டர்கேளையாவது சீரியப்படுத்துவதற்காய் தாதி வேறே ஏதாவது செய்யப்படுகிறது. மீறிச்செய்யத் தாதி போதிய ஞாயங்கண்டால், அடுத்தமுறை வைத்தியர் வந்தவுடனே அதை அவருக்குத் தெரியப்படுத்தவேண்டியது.

பிரசவமான பன்னிரண்டுமணிநேரத்திற்குள்ளாக சுத்தமான சுடுநீரினால் மர்மஸ்தானம் முகலியன்த நன்றாய் அலம்பவேண்டும். இப்படி குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளில் இரண்டுமுறையாவது கழுவவேண்டியது. இப்படிச்செய்யும்போது கோயாளிக்குக் குளிர்காற்றுப்பட்டு ஜவதோலும்பிடிக்கச் சற்றும் இடக்கொடுக்காதபடி கவனமாயிருக்கவேண்டும். முகன்முதல் கழுவின்பின் ஸ்திரீயை ஒஞ்சரிக்கச்செய்து அந்த பாகங்களை மெல்லலாம் துட்பமாய் பரிசோதித்து பிரசவத்தில் பின்னங்களை ஏதாவது உண்டாயிருக்குமோவென்று பார்க்கவேண்டியது. பின்னபாகத்தை அயதிராவகத்தால் தொட்டு வேண்டியது. ஏனெனில் இது அழுக்கை உறிஞ்சுவதால் சீயபிடிக்காமல் மிகவாய்த்ததிக்கும். இந்த சமர்தாரத்தையும் வயித்தியருக்குச் சொல்லவேண்டியது. இப்போதும் வயிற்றைக்கட்டியதுணியாகிய பரிண்டா கிரும்பவும்கட்டி, கட்டுமுன் கர்ப்பாசயமானது உதடியாகவும் சரியான பிரமாணமாகவும் இருக்கிறதாவென்றும் அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

வயித்தியர் சாதாரணமாய் பிரசவித்த பன்னிரண்டுமணிநேரத்திற்குப்பின்பு வரும்போது, பின்வரும் குறிப்புகளின்பேரில் அவருக்குச் சங்கதி சொல்லவேண்டும். எவ்வளவுகேரம் கோயாளி தூங்குகுளென்றும், அமைதியாய் தூங்குகுளோ அல்லது சங்கடப்பட்டாளோவென்றும், தானே ஒளதுக்குபோனாளோ அல்லது

முகத்திரக்குழலால் நீர் எடுக்கப்பட்டதோவென்றும், மர்மஸ்தான நிலைமையும், அழுக்கினதன்மையும் இன்னவையென்றும், பிரசவத்திற்குப்பின்வரும் வயிற்றுக்கோய் (after-pains) கஷ்டமாயிருந்ததோ, அல்லது, உதிரக்கட்டிகள் போனதோவென்றும், கர்ப்பாசயம் சரியானபடி சுருங்கினதோ அல்லது அது இருக்கவேண்டியதைவிட பெரியதாயிருக்கிறதோவென்றும் சொல்லவேண்டும்.

வயித்தியர் பின்பு வரும்போதெல்லாம் மருத்துவச்சி சாதாரணமாய் உண்டாவதை தப்பிடடக்கும் சங்கதிகளை அவருக்குத் தெரிவிக்கவேண்டும். முக்கியமாய் பிரசவித்தபின் காணப்படும் மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிறக்கலாக அழுக்கு கொஞ்சமாய்ப்படுகிறதோ அல்லது அநிகமாய்ப்படுகிறதோவென்றும், அதினதன்மை யெப்படியென்றும், ஜோரம்வருகிறதோவென்றும், தூக்கம்வராமல் இருக்கிறதோவென்றும், ஸ்தனத்தில் பால்கட்டிக் கொண்டிருக்கிறதோவென்றும், வயிற்றில் வாய்வுப்பொருள்கள் இருக்கிறதோவென்றும், அடிவயிறு மெதுவாயிருக்கிறதோவென்றும் இன்னும் வேறெவ்விதமான கோயானது கோயாளியால் சொல்லப்பட்டால் அதையும் சொல்லவேண்டியது. நிலை (position) சில சினங்களுக்கு (மல்காக்க) நேராகப் படுக்கவைக்கவேண்டும். ஏனெனில் இது கர்ப்பத்திலிருந்து உதிரம்செல்லுதற்கும், கர்ப்பாசயம் படிப்படியாய்த் தன் சாதாரண உண்டைவடிவத்தை அடைவதற்கும் சகாயமாயிருக்கும். பிரசவித்த ஸ்திரீகள் இதை மிகவும் முக்கியமாய் ஏண்ணாமல் இருக்கிறது வழக்கம். பிரசவித்த சிலநினைக்களில் இங்கு நடப்படியை அலட்சியம்செய்வதால் பலவித கர்ப்பாசய நேசங்கள் உண்டாகிறதாய்க் கண்பெரித்த உண்மையை அவர்கள் அறிந்திருப்பது உத்தமம். நேராகப் படுத்திருப்பது சங்கடமாயிருக்கும்படித்தில் சற்றுநேரத்திற்கு ஒருபக்கமாய் திரும்பலாம். இப்படி செய்வதற்கு தாதிபியானவன் உதவிசெய்யவேண்டும்.

பிரசவித்த அரும்நாளில் படுக்கையில் எழுந்து உட்கார சுதேசஸ்திரீயாகில் இடந்தரப்படாது. ஐரோப்பியஸ்திரீயாகில் ஒன்பது அல்லது பத்துநாளைக்குமுன் உட்காருவது நல்லதல்ல. அதிகசிக்ஞரம் உட்காருவதால் அழற்சி நோவால் உண்டாகும் இரத்தகர்ப்பும் இன்னும் பலவகை அபாயங்களும் உண்டாக ஏதுவாகும். இந்த காரணத்தினாலேயே பிராணசேதமும் உண்டாகியும் இருக்கின்றது. உட்காரும்போதும், தலையணைகளின்பேரிலாவது, சாய்மணைகளின்பேரிலாவது சாய்ந்திருக்கவேண்டியது. இளைப்புண்டாகாத படி வெகுநேரம் இருக்கப்பட்டாது. உதிரப்பிரவாகத்தினாலாவது, ஜூரம், வயிற்றில் நோயாலாவது பாதிக்கப்படும் ஸ்திரீகளை இன்னும் சிலநாட்களுக்கு மல்லாக்கப்படுக்கச்செய்யவேண்டியது. பத்து அல்லது பன்னிரண்டுநாள் செல்லுமுன் நடக்க எத்தனிக்கக்கூடாது. பிறகு இலேசான இதர உடுப்பை உடுத்திக்கொண்டு முதல்முறை ஒருமணி அல்லது இரண்டுமணி நேரத்திற்கு ஒரு சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து இருக்கலாம். பின்பு படிப்படியாய் உட்காருதையையும் கடைபையும் அதிகப்படுத்தலாம். சுதேசஸ்திரீகளுக்கு சிக்ஞரமாய் எழுந்திருக்கக்கூடியதாயிருக்கின்றது. எட்டு ஒன்பது நாளில் படுக்கையையிட்டு நடப்பார்கள். ஆகிலும் அழுக்கு தாராளமாயும் கறுப்புநிறமாயும் அல்லது கர்ப்பநஷ்டத்தால் ஸ்திரீயானவள் முன் சங்கடப்பட்டிருப்பானாகில், சுகப்பட படுக்கையில் அநேகநாள் இருக்கவேண்டும்.

வயிற்றுக்கட்டு (பயிண்டா):—மருத்துவச்சியானவள் வயிற்றுக்கட்டு சரியாக கட்டியிருக்கிறதோவென்று அதிக ஜாக்கிரதையாய் பார்க்கவேண்டும். கட்டுதளர்ந்தாலும், இடத்தைவிட்டு சரிந்துபோனாலும் (இவ்விதம் ஒருகிணத்தில் அநேகமுறை சம்பவிக்குமாதலால்) அதை திரும்பப்போடவேண்டும். அதைக்கட்டும் ஒவ்வொருநாட்களிலும் கர்ப்பாசயம் சரியாய் சுருங்கின

தோவென்றும் கர்ப்பாசயம் கூபகத்தின் எந்தப்பக்கத்திலாவது தள்ளப்படாமலிருக்கிறதோவென்றும் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

பத்திய ஆகாரம், diet (டையட்).—இந்த விஷயத்தில் வைத்தியர் சொல்லியபடி ஆகாரம் தாதியானவன் செய்ய வேண்டியது. நோயாளிக்கு சாப்பிட மனதானால் முதல் இரண்டு நாளில் ரொட்டிவெண்ணெயுடன் கொடுக்கலாம். முன்னே இருந்தவழக்கப்படி நோயாளிக்கு இந்த இரண்டுதினங்களுக்கும் வெறும் நீராகாமே கொடுப்பது புத்தியல்ல; ஆட்டினைச்சிக்குப்பு அல்லது மாட்டினைச்சி இரத்தம் (beef-tea) ஒருநாளைக்கு ஒருமுறை கொடுக்கலாம். முன்றும் நாளாக்குப்பிறகு காய்ச்சல் இவ்வாறிருந்தால், ஒரு சிலநாளை இளைச்சி கொடுத்து, வரவர சாதாரண ஆகாரம்கொடுக்கலாம்.

அழுக்குப்படுதல், Lochial discharge (லோக்கியல் டிஸ்சார்ஜ்).—பிரசவித்ததுமுதற்கொண்டு, ஏறக்குறைய மூன்றுவாரங்கள் வரையில் கர்ப்பாசயத்திற்குள்ளிருந்து வெளிப்படுவதை அழுக்கு (லோக்கியா) என்று சொல்லுவார்கள். அதில் கர்ப்பாசயத்தின் உள்ஜுவின் துண்டுகள் இருக்கின்றன. முதலில் அதின் சுத்த உதிரமும், அதனுடன் சிறு சிறு உதிரக்கட்டியும் அடங்கியிருக்கும். நஞ்சு வெளியானபிறகு பலமாய் கர்ப்பாசயம் சுருங்காதபடித்தல் பிரசவத்திற்குப்பின்பு இரண்டொருநாளைக்கு பெரிய பெரிய உதிரக்கட்டிகள் அந்த அழுக்குடனேகூட வெளிப்படும். மூன்று நாளை நாட்களில் அழுக்கில் சுத்த உதிர கிறமான் து. மாறும். இந்த கிறம் மாறி எழு எட்டுநாளில் வரவர சிவப்புநிறமாய் சாமல் அருவருப்பும் துக்கந்தமுமான ஒரு பச்சைநிறமான நீராகும். இதற்கு சாதாரணமாய் “பச்சை நீர்” என்று பெயராம்.

அழுக்கானது பலஸ்திரீகளுக்கு பல அளவாகப்படும். முதலில் - அதாவது - பிரசவித்த முதல் மூன்று

தினத்தில், அழுக்கு அடிக்கடியு மொழுங்காயும் பட வேண்டியது. மலக்குடலும், மூத்திரப்பையும், சுத்தி யாயிருக்கும்பொழுதும் பிரசவத்திற்கு பின்வரும் வயி ற்றுநோயிருக்கும்போதும் சாதாரணமாய் அதிகப்ப டும். ஒரு அற்பமனக்கலக்கம் அல்லது கோளாறு உண் டானால், அழுக்கு திரும்பவும் சிவப்புநிறமாக மாறி அதி கமாகப்படும். சீக்கிரமாய் எழுந்திருப்பதினாலும், முத லில் அதிகமாய் நடமாடுவதினாலும் இந்த அழுக்கு ஒரு மாதம் அல்லது அதற்கு அதிகமாய் பட் எதுவாகும்.

முதலில் அழுக்கு தாராளமாய் படாதபடிக்கில் உ திரக்கட்டி கர்ப்பாசயத்தின் வாயை அடைப்பதினாலே அழுக்கு உள்ளேயே தங்கும். இக்க சமயத்தில் வெ ளுவெதுப்பான ஜலம் கொண்டு பிச்சங்குழலால் உதி ரக்கட்டிகளை கழுவி வெளியிடல் நல்ல யோசனையாம். அழுக்குபடாமலே முற்றும் தங்கிவிட்டால் வெதுவெ துப்பான பாலும் தண்ணீரும் சேர்த்து, யோனிக்குள் ளாக பிச்சங்குழலால் உள்ளேபாய்ச்சலாம்.

சிலவேளையில் அழுக்கு அதிக நாற்றமாயிருக்கும். ஒருவேளைக் கர்ப்பாசயத்தில் உதிரக்கட்டிகள் தங்கி அ ழுக்குவது இதற்குக்காரணமாயிருப்பதால் பிரசவஜ்ஞம் உண்டாகும் என்னும் பயம் எப்போதும் உண்டாகவே ண்டும். ஆகையால் பிரசவத்திற்குப்பிறகு கர்ப்பாசயம் ஒரோகிலையாய் முழுமையும் சுருங்கும்படிச் செய்வது மிக வும் அவசியம். தூக்கந்ததைமாற்ற, அழுக்குபடும் தன் மைக்கு ஏற்றப்பிரகாரம் ஒருநாளையில் இரண்டுமூன்று தரம் அகாமணிநேரத்திற்கு கர்ப்பாசயத்தின் உள்ளே கர்பாலிக்லோஷன் (ஒரு பாகத்திற்கு 100 அல்லது 120 பாகம்) கர்ப்பாசயத்திற்குள்ளே பாய்ச்சவேண்டும். பி ன்வருமாறு கர்ப்பாசயத்திற்குள் நீர்பாய்ச்சவேண்டும். இரண்டுபக்கத்திலும் அடைப்புள்ள ஒரோபாக மூத்திரக் குழலை அதின் அடைப்புக்குச்சியுடன் கர்ப்பாசயத்தின் அடிமட்டாகச்செலுத்தி அதை 5 காலன் வெதுவெதுப்

பான ஜலமுள்ள ஒருதகர்த்தொட்டியில் அடுத்திருக்கும் நீண்ட குழலோடினைத்து, இதன்முனையில் இருக்கும் முடுக்குகம்பியை திருப்ப ஜலம் காப்பாசயத்திற்குள் மெ துவாக ஓடி நோயாளி படுக்கிருக்கும் கட்டிலின்கீழே வைத்திருக்கும் பெரிய பாத்திரத்தில் இரங்கும். இந்த தகர்த்தொட்டி வெறுமையாக அகாமணிநேரம் செல் லும். கால்பாகம் தண்ணீர் தகர்த்தொட்டியிலிருக்கும் போதே (ஒன்றுக்கு 100 அல்லது 120 பலமுள்ள) கர்பா லிக்லோஷன் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். காண்டி ஸ் ப்ளூயிட் (Condy's fluid) அல்லது சோடா க்ளோரி னேட்டா தண்ணீர் இவற்றை கர்பாலிக் ஆசிகெக்கு (car-bolic acid) பதிலாக உபயோகிக்கலாம்.

கர்ப்பாசயத்திற்குள் நீர்பாய்ச்ச பரத்திரம் முதலா னவை அகப்படாதவிஷயத்தில் இரண்டுதவாரமுள்ள மூத்திரப்பிச்சங்குழலை (கெஜ்ஜா) 3 அல்லது 4 அவு ன்ஸ் பிடிக்கும்படியான ஹிக்கின்சென்ஸ் பிச்சங்குழ லுடன் அல்லது பித்தளைப்பிச்சங்குழலுடன் இணை த்து இப்படிசெய்யலாம். கர்ப்பாசயவாய் கன்றாய் திற க்கப்பட்டு உள்ளேபாய்ச்சிய நீர் தாராளமாய் வெளி யே வரக்கூடியதமாயிருக்கவேண்டியது. ஜலம் உள் ளே பாய்ச்சுவதில் பலமாய்ச் செலுத்தப்பட்டது. காப் பாசயவாயினில் ஒரு விரல்செலுத்த இடம் இருந்தால் ன்றி கர்ப்பாசயத்திற்குள் நீர்பாய்ச்சப்பட்டது. ஏனெ னில் இதனால் எப்போதும் அபாயம் நேரிடுகின்றது. மேலும் காற்று யோனிதவாரத்திற்குள் செல்லாமல் ஜாக்கிரதையாயிருக்கவேண்டியது.

பிரசவத்திற்குபின்வரும் வயிற்றுநோய் (ஆபட்டா பேயன்ஸ் - after-pains) கால ஒழுங்கின்றி கர்ப்பாசய த்தில் உண்டாகும் இந்த நோய் அதின் கிரமவிரோத மாய்ச் சுருங்குகையாம். கர்ப்பாசயத்திற்குள் உண் டாயிருக்கும் உதிரக்கட்டிகளை அது புறம்பாக்குவதற்கு பிரயத்தனப்படுவதால், இந்தநோய் உண்டாகிறது. பிர

சலித்த சிலமணிநேரத்திற்குப் பிறகு ஆரம்பித்து, அபாயபிரசவங்களில் மூன்று நான்கு நாளைக்கு இருக்கும். இதற்கு அதிகப்படுவது அருமையாக்கும். குழந்தையை முலையுண்ணவிடும்பொழுது இந்த நோய் சாதாரணமாய் அதிகப்பட்டு உதிரக்கட்டிகளில் ஒன்று வெளியானவுடனே தணியும். இந்த நோய் முதல் பிரசவத்தில் காணப்படுவது அபூர்வம். ஆனால் அநேகம் பிள்ளைகளைப்பெற்ற ஸ்திரீகளுக்கு சாதாரணமானது. அதிக உபத்திரவமாயிராதபடித்தில் இது நல்லருந். ஏனெனில் அது கர்ப்பாசயத்தில் தடைப்பட்டு நிற்கும் எவற்றையும் புறம்பாக்கப்பண்ணும் முயற்சியும். அதிக உபாதையாயிருக்கும்போது கஷ்டப்படுத்தும் வஸ்துவை புறம்பாக்க, பரிசோதிப்பது சியாயம். கர்ப்பாசயத்தை ஸ்திரமாகவைக்க இரண்டொருமுறை “எர்கட்டு” திராவகம் கொடுப்பது பிரயோசனமானது. விக்ஷிளையை தடுக்கும்படியான அவ்வளவு நோயிருந்தால் எர்கட்டு திராவகத்தோடு அபினி திராவகமும் சேர்த்து கொடுக்கலாம்.

நீர் கட்டுப்பாட்டிற்குத் தடை, Retention of urine (ரிட்டென்ஷன் ஆப் யூரின்).—சாதாரணமாய் பிரசவத்திற்கு சில நாளைக்கு ஒன்றுக்குப்போகக் கூடாமையாகும். முக்கியமாய் முதல்பிரசவத்திற்குப்பிறகு இது வுண்டாகும். இது சிலருக்கு பயத்தாலும், மற்றவர்களுக்கு பிரசவம் உண்டாயிருந்தபோது மூத்திரப்பை அழுக்கப்பட்டிருந்ததால் ஜலம் விடக்கூடாமவிரும்பதாலும், நீர்ப்பாதை வீங்கியிருப்பதாலும் உண்டாகின்றது. கட்டை ஸ்பாண்டை மெகனத்தின்பேரில் ஒற்றிடும்பொருவது சிலவேளைகளில் பிரயோசனப்படுகின்றது. இப்படி கஷ்டப்படும் நோயாளியை உபாதையினின்று கிவர்த்தியாக்க வெகுநேரம் தாமதிக்கக்கூடாது. இந்த உபாதையை நீக்க 2½ மணிநேரத்தில் இரண்டு மூன்று முறை மூத்திரக்குழுவைச்செலுத்தி நீரை வெளிப்படுத்தவேண்டியது.

மூத்திரப்பையில் பலமுண்டாகும்வகைக்கும் அல்லது நீர்த்தாரையின் வீக்கம் வற்றுமபரியந்தம் இப்படிசெய்யவேண்டியது. நீர்கட்டானது பலயினத்தால் அந்த வேளையிலுண்டானதாய் காணப்பட்டால், அரைமணி நேரத்திற்கு ஒருமுறையாக மூன்று நான்கு டோஸ் எர்கட்டுதிராவகம் (20 குளி) கொடுத்தால் பிரயோசனமாயிருக்கும்.

வேளாவேளையில் மூத்திரப்பை அதிகமாய் பெருந்து பின் நீர் சொட்டு சொட்டாய் வெளிப்பட்டு நீங்க, உபாதை ஒருமட்டுக்கு கிவர்த்தியாகின்றது. இவ்வகை விஷயமானது நோயாளிக்கும் தாதிக்கும் தெரியாமலும், மூத்திரப்பை அழற்சியினால் வீங்கும்படியாகவும் நேரிடும். வயிறு இருக்கும் ஸ்திதியையும், கர்ப்பாசயத்திற்குமேல் அடிவயிற்றில் இருக்கும் பெரியவீக்கத்தையும் அந்த வீக்கம் அந்தப்புறம் இப்போது மூலம் வதால் உள்ளகிலமையையுந் கவனிப்பது, உண்டாகும் வித்தியாசம் இன்னதென்று தாதி அனுமானித்தறியக்கூடும் அப்போது நீர்க்குழுவை உள்ளேசெலுத்து வகினாலே இந்த நீர்க்கட்டினால் உண்டானதென்று உடனே தெரியவரும்.

நாடிநடை (புல்ஸ்).—பிரசவத்தின் தொடக்கம் நின்ற சிலமணிநேரத்திற்கு நாடியை கவனிக்கவேண்டியது. ஒரு கிமிஷத்தில் 100 தாத்திற்கு குறைவாய் அடிக்குமானால் எல்லாம் நன்றாய் இருக்கிறதென்று அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் 100 க்கு அதிகமானால் உதிரப் பிசுவாகம், ஜாரம், அல்லது வேறு உபாதிதரும் வியாதிகள் வருமென்று பயப்படவேண்டும்.

பால் சுரக்கும் காலம், Lactation (லாக்டேஷன்).—தாயானவள் கொஞ்சநேரம் இளைப்பாறினவுடனே குழந்தை பாதுகாண அதை மார்போடு அணைக்கவேண்டியது. இது கர்ப்பாசயம் சுருங்குவதால் தாய்க்கும் அது கூலமாகும். பிரசவத்திற்கு முந்தியே பால் உண்டா

கிறது. ஆனால் பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க முன்றும்நாள் வரையில் போதுமானபால் சாதாரணமாயிராது. முதலாவது உண்டாகும் பாலுக்கு “சிம்பால்” அல்லது “கெம்புப்பால்” (கொலாஸ்டர்ம்) என்று பெயர். இது பேதிமருந்தினதன்மையையுடையதால் சிகலின் வயிற்றை சுத்திசெய்து அதின் “காட்டுமலத்தை” (மெக் கோலியம்) நீக்கிவிடும். முதல் உண்டாகும்பாலானது மஞ்சள் கிறமாகவும், இதற்கு பின்பு உண்டாவது தண்ணீர் பாலாகவும், தோற்றத்தில் கொஞ்சம் ஊதாநிறமானதாயிருக்கும். குழந்தை பிறந்தவுடனே அதற்கு ஆகாரம் வேண்டியதில்லை ஆதலால் அப்போது அதற்கு ஏதாவது கையால்செய்த ஆகாரம் (ஆர்டிபிஷல் பூப்ட்) கொடுக்க அவசியமில்லை.

இளந்தையான நாயானவள் குழந்தையை மார்க்போடு அணை வழக்கப்படாததால் வருத்தப்படுவாள். ஆதலால் அவள் மன்குழந்தையை எந்தவிதமாய் வைக்க வேண்டுமென்றும், குழந்தை ஸ்தனக்காம்பை நன்றாய் வரயால் கவலிப்பிடுக்கிறதாவென்றும், ஸ்தனத்தை நன்றாய் பிடிக்கிறதாவென்றும் பார்த்து தாய்க்குச் சொல்லிக்கொடுப்பதும் தாழியின் கட்டையாயிருக்கிறது ஸ்தனக்காம்பானது சாதாரணமாயிருக்கவேண்டிய அளவுக்குச் சின்னதாக அல்லது சுருங்கினதாக இருக்குமானால் வெகுசங்கடம் ஸ்தனக்காம்பை இழுத்துவிடும்படியானவகைகளை பிரயோகிப்பதை அசட்டைபண்ணினால் பிள்ளைக்கு பால்கொடுப்பதை விட்டிவிடவும் பிற்பாடு உண்டாகும் பிரசவங்களில் பால்கொடுக்க கூடாமற்போகவும் நேரிடும். ஸ்தனக்காம்பை முன்னுக்கு இழுக்க பிரஸ்ட் பம்ப் (breast-pump) அல்லது சோடாவார்ட்டர் புட்டியை காம்பின்பேரில்வைப்பதால் காம்பை இழுக்கலாம், அல்லது குழந்தை சின்னதும் பலவீனமுள்ளதுமாயிருந்தால் ஒரு பெரியபிள்ளையை பால்குடிக்கவிடலாம். இந்த விஷயமாய் புட்டியை அப்போகிக்கும்போது மிருதுவானதும், வட்டமானது

ஒன்றை தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். புட்டிவற்றீரால் சிறப்பி உடனே அதை வெளியிலிருவிட்டு அந்த புட்டியின்வாயில் எண்ணெயையாவெண்ணெயையாவதுதடவி, ஸ்தனக்காம்பின் மெதுவாகவைக்கவும், புட்டி குளிர்த்துபோகிறதிதில் கார்பில்லாமல் வெறுமையான இடம்உண்டும். இதை பெரிதாக்க அந்த புட்டியின்மேல் ஈரதையை சுற்றவேண்டும். இப்படி செய்யும்போது மெதுவாக புட்டியில் இறங்கி ஸ்தனக்காம்பு நன்முழுப்பட்டுபோம்.

பால் ஜாம், Milk-fever (மிலக் பஃவர்).—பாலுண்டாகும்போது தேகத்தில் ஒருவிதமான சங்கடம் உண்டாகிறது. இதற்கு பால் ஜாம் என்று பெயர். இதற்கு முன்காய்ச்சலும், பலமான தலைநோயும், நாக்கில் மாபடிதலும், நாடி துரிதமாய் ஓடுதலும் உண்டாவதுண்டு. பிறகு ஜாம் வரும். இதற்குமுன் கொடாகிருந்தால் உப்புபேதி கொடுக்கவேண்டும். ஸ்தனங்கள் கோக்காடாகவும், முடிப்புமுடிப்பாகவும் பால்கட்டிக் கொண்டிருந்தால் கற்பூரத்தை தேக்காடியெண்ணெயில் சேர்த்து அடிக்கடி தேயக்கலாம், இப்படி தேயப்பதில் கார்பில்லாமல் ஸ்தனக்காம்புவரையில் (விரல்துளிகளால் அல்ல) உள்ளங்கையால் முரட்டுத்தனமாயல்ல, ஸ்சிரமாயும், கெட்டியாயும் தேயக்கவேண்டியது.

பால் குழந்தைக்கு அதிகமாகிருந்தால் பிரஸ்ட் பம்பினை பாலே இழுத்துவிட்டு மூன்று நாளுக்கு அங்குலங்களத்திற்கு ஸ்தனத்தின்பேரில் பஞ்சலைத்து அதின் மேல் எண்ணெய்தோய்த்த பட்டுதணியைவைத்துக் கட்டவேண்டியது.

பலவீனத்தால் பால் குறைவாகும். அந்த சமயங்களில் பால் உண்டாக்கசெய்வது அப்பிரயோஜனமும் அபாயமானதுமாயிருக்கும். சிற்றாய்வுக்கு இலையை அரைத்து ஸ்தனத்தின்பேரில் பற்றுபோடுவதால் பால்

அதிகப்படும் என்பார்கள். ஆகாரம் வேண்டிய கவும், போஷிக்கும்தன்மை யுடையதாகவும் இரண்டும்.

ஸ்தனக்காய்பின் இரணங்கள், Sore nipples (சோப்ரஸ்ஸஸ்).—குழந்தை பால்குடித்தபிறகு ஸ்தனங்கள் ஸ்வொருமுறையும் குடைத்து இரணங்கள் உண்டாகும் கடுக்கவேண்டியது. ஸ்தனக்காய்ப் இரணம் க்கும்போதும் ஒழுங்காய் குழந்தைக்கு பாதுகாட்டி மிகவும் தைரியமாயிருக்கவேண்டியது. இரணங்களில் பால் ஊட்டுவதால் உண்டாகும் உபத்திரவத்தை சகித்தாலும் சகிக்கலாம், பால் கட்டிக்கொள்ளக் கூடாது. ஸ்தனங்களில் அழற்சியுண்டாகி மாறும்படி அல்லது ஸ்தனங்களில் கட்டியுண்டாகும். இராமாயிருக்கும் ஸ்தனக்காய்பின் பேரில் * கிளசரின் டி. லிக் ஆசிட் என்ற எண்ணெயை பிள்ளை பால்குடித்தபிறகு ஸ்வொருமுறையும் தடவவேண்டியது. ரப்பர் காய்ப்புள்ள இரணங்களை மூடி கவசங்களை தரித்துமெத அவசரமானபோது மாதிரி பால் கொடுக்கவேண்டியது. பிள்ளை அடிக்கடி போஷிக்கப்படவேண்டியதனால் ஒரு பால்தாடி (வெட் நர்ஸ்) இருக்கவேண்டியது. இல்லாவிட்டால் கொஞ்சகாலம் பசும்பால் கொடுக்கவேண்டியது. ஸ்தனங்களில் பால்கட்டிச் சுரப்புக்கெண்டிருந்தால் மூன்றாம் நாளில் கிற்றாமணக்கெண்ணெய்கொடுப்பதற்கு பதிலாக ஒரு உப்புபேதி கொடுக்கவேண்டியது. பிள்ளை பிசைந்த பிறந்தாலும், உப்புபேதியை கொடுத்து பால் கட்டாதபடி கூடுமானவரையில் தடுக்கவேண்டியது. பஞ்சுவைத்து எண்ணெய்ப்பட்டால் மூடி நாலாபக்கங்களிலும் சரியானபடி இறுக்கட்டினால் அதிகமாய் பால்கட்டிவைத்த தடுக்கும்.

சுத்தம் முதலியவற்றைப்பற்றிய கவனிப்பு.—சுத்தத்தைப்பற்றிக் கூடுமான வரையில் கவனிக்கவேண்டியது. பிள்ளை பெற்ற ஸ்திரீயின் துணிமுதலியதை அடிக்கடி மாற்றப்படவேண்டியது. அழுக்குபட்ட துணிமுதலியதை அந்த அறையைவிட்டு உடனே நீக்கவேண்டியது. நோயாளியைக் குளிப்பாட்டுவதில் முதல் சிலநாட்களுக்கு தாகியானவள் தன்கையை (ஒன்றுக்கு நார்பது பாக் மாஸ்) கர்பாஷிக்கலாஷன் கண்ணீரில் தேய்த்து, நகம் களை குட்டையாக அறுத்து, நன்றாய் துடைத்தாலொழிய ஸ்திரீயின் ஜனன உறுப்புகளை தொடக்கூடாது. இதைப்போலொத்த எச்சரிப்புகள் அற்பமாய் தோன்றினாலும் அவைகளைக் கவனியாததினால் உண்டாகும் துன்பங்களை தடுப்பதினால், முற்றிலும் அவசியமானவைகள்.

* ஒருபாகம் டிராஸிக் ஆசிட் (மாசிக் அய்டுஸ்) மூன்றாம் கிளசரின் எண்ணெய்.

9 - ம் அதிகாரம்.

செவை பராமரிக்கும்வகை.

MANAGEMENT OF INFANT:

(மாண்புமிகு மெண்ட் ஆப் இன் பென்ட்.)

தாயைச் சொகுசாய்ப் படுக்கச் செய்த பிறகு அலளை இளைப்பாறவிடவேண்டியது. பிள்ளையை அது பிறந்தவுடனே தூங்கும்படி விட்டுவிடவேண்டியது. ஒரு மணிநேரம் பொறுத்து அல்லது பிள்ளை விழித்தவுடனே மருத்துவச்சியானவள் அதிகவசேஷமாய் அசைக்கவிடக்கேண்டியது. பிள்ளை பிறந்தவுடனே குளிப்பாட்டி மென்சாத்தாணவழக்கத்தை விட்டுவிடவேண்டியது. ஏனெனில் இதனால் தாயானவளை பாராட்டாமல் விட்டுவிட ஏதுவாகும்.

தூளிப்பாட்டுதல் அல்லது கழுவதல் (வாஷிங்).—தட்டையான ஒருபாத்திரம், சோப்பு (கிளசரின் சோப்பு மிகவும் நல்லது), வெங்கீர் இவைதேவை. தண்ணீரின் சூடானது 98° F. ஆக இருக்கவேண்டியது. இது முன்னடியாக “பாத் கொர்மாயிட்டர்” என்ற கருவியினால் பரிசோதிக்கப்படவேண்டியது. ஏனெனில் தையை தண்ணீரில் தோய்த்துப்பார்ப்பதினால் அதன் உஷ்ணத்தை அறிவது கஷ்டமாகும். அதிக சூடாயிருந்தால் வலிப்பு அல்லது இசிவு ஜன்னிகாணும். அதிக சிலவென்றிருக்கால் குளிரையும், உள் உறுப்புகளில் தோஷமும் அழற்சியாவண்டாகும் சாப்பையும் கொண்டுவரும். பிள்ளையை குளிப்பாட்ட அறையின் ஒருமூலையில், முன்ஜன்னல்களை மூடி அதைச் சற்றங்குளிர்த்த காற்று வீசாமல் தடுக்கவேண்டியது.

பிறந்த பிள்ளையின் உடம்பின் பேரில் (வெர்னிகாஸியோசா) vernix caseosa வென்ற ஓர்வித மூப்புப்போன்றதொருபடிந்திருக்கும். இது தண்ணீரையேகையாகையாக, சோப்புக்கும் இலேசில்

யாது, இதழுக்கியமாய் உடம்பின் மடிப்புகளிலும், கொடைச்சந்திலும், அகாயிலும், கழுத்தின் மடிப்புகளிலும் அதிகமாயிருக்கும். ஆலில் அல்லது நல் எண்ணெய் (olive oil) பூசினால் சோப்பும் தண்ணீரும் அதை அதிகச்சீரமாய் சுத்தியாக்கும். ஒரு மிருதுவான ஸ்பாஜ் அல்லது சுத்தமான கம்பிளித் துண்டை உபயோகிக்கவேண்டியது. குளிப்பாட்டும்வேலையை துரிதமாயும், மெதுவாயும் செய்யவேண்டியது. தேகத்தை அல்லது உடம்பை நன்றாய் மெல்லிய துவாலையால் (towel) துடைக்கவும், தேர்வ மிருதுவானதால் உரப்பாய் கேய்க்கப்பட்டாது.

முதல் நாளைக்கு பிறகு குழந்தையை காலையிலும் மாலைமீளும் குளிப்பாட்டவேண்டும். முதல் இரண்டு மூன்று நாளைக்கு தண்ணீரின் சூடானது முதல் உடைய பிறகு பிறகுச் சமமானமாய் இருக்கவேண்டியது. அதன்பிறகு கண் துவாம்பரமாயும், மஞ்சள்மாவை அடைபாணியில்லாமலுமிருந்தால் தண்ணீரின் சூட்டை 85° F. க்கு குறைக்கலாம். இரண்டொரு மாதத்திற்குப் பிறகு மலைக்கல்லாத மைதான பிரதேசங்களில் குளிர்த்த ஜலம் உபயோகப்படுத்தலாம்.

நாளைக்கு (நெல்லு ஸ்டிரிங்).—குழந்தையை நன்றாய்துடைத்தபிறகு நாபிக்கொடியை மெல்லிய வஸ்திரத்தினால்துடைத்து சுருட்டி வயிற்றின் மேல்கிடக்கவிட்டுவிட்டு ஒரு சதுரமான துண்டு துணியின் மத்தியில் ஒரு துண்டைச் செய்து நாபிக்கொடியை அதற்குள் துழைத்து வைக்கலாம். நாபிக்கொடியானது ஐந்தாம் நாளில் விழுந்தபோதும், அப்படி விழாமல் நான்படவிருந்தால் அதை வேறுபடுத்த யாதொரு முயற்சியும் செய்யக்கூடாது. அப்படி செய்வதால் உதிரம் பிரவாகமாகப்போகும். அது விழும்போது கொஞ்சம் புண் இருக்கும். அது ஆறா கின்ற பரிகாரம் போலும், அது வெண்ணெய் பிளாஸ்திக் (simple dressing) போலேதே. வீசாமல்களில் நாபிக்கொடியானது தூக்கத்தத்தை

க்கொடுக்கும்; அப்போது அதைநீக்கப்படுத்த அடுப்புக்கரி அல்லது குளேரினோட்டட்சோடா போலியசு போடவேண்டியது. நாபிக்கொடி விழுந்தபிற்பாடு உதிரம் வறாமாகில் மெதுவாக அமுக்கினால் அது நின்று போகும்.

உடுப்பு (டி.ஓ.லிங்).—குழந்தையை உடுத்துதல் பெற்றோருடைய மாதிரிப்படியும், அவர்களுடைய நிலைமை விளப்படியும் வித்தியாசப்படும். மருத்துவச்சி தன்மனதில்லைக்கும்படியான முக்கிய குறிப்புகளாவன, உடுப்பானது சூட்டைத்தரும்படியாக இருக்கவேண்டியது. ஏனெனில் புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை எளிதில் குளிர்ச்சிக்கும். அதனோடு உடுப்பு இலேசாயும், அங்கங்களை ஆட்ட அசைக்கப்போதுமான இடமுள்ளதாகவும் இருக்கவேண்டியது. இறுக்கமான (பான்டேஜ்) கட்டுகளை தவித்து, குண்டுகளைக்குத்தாமல் கபிற்றால் கட்டவேண்டியது. உடுத்துவதற்குமுன் உடம்பிலும் முக்கியமாய் முழங்கை முழங்கால், தொடைச்சந்து, அரை, கழுத்து முதலிய இடங்களிலும், கோலுடன் தோல்படும் மற்ற எல்லா மடிப்புகளிலும் நன்றாய் பவுடர் போடவேண்டியது. இதை அலக்கியம் செய்தால் தோல் வழண்டுபோகும். அப்போது ஆகக் கூடுதலாகப் பவுடரை ஹைப்பர்டோடு நன்றாய் கலந்துபோடலாம். மல ஜலத்தினால் உடுப்பு அழுக்காகாதபடி ஆசனத்திற்கு நடுக்கிட்டவேண்டியது. பிறகு தோலுக்கடுத்து மெல்லியதான கம்பினி அல்லது சல்லாத்துணியால் செய்யப்பட்ட சட்டைபோட்டு அதின்பேரில் துணிச்சட்டைப்போட்டு எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பின்னால் திறக்கவும், நீண்டகழுத்துள்ளதும், நீண்டகைகளுடையதுமான சட்டைபோடவேண்டும். இவைகளே வீட்டின் அறைக்குள் குழந்தைக்கு போடவேண்டியவைகள். சுத்தி விஷயத்தில் கூடுமான ஜாக்கிரதையாய் இருக்கவேண்டியது. நடுக்கி எத்தனைதாம் அழுக்காகி, நாமாகிறதோ அத்தனைதாம் நடுக்கி மாற்ற

வேண்டியது. இல்லாவிட்டால் தொந்தரையான அழற்சி வீக்கம் உண்டாகும். பிள்ளையை உடுத்தின்பிறகு ஏனையிலாவது, தொட்டிலிலாவது பங்கா காற்றை அல்லது வேறுவகையால் குளிர்காற்று படாதிருக்கும் இடத்திலாவது படுக்கச்செய்யவேண்டியது, மெல்லிசான கம்பினியால் மூடிவைக்கவேண்டியது.

நூக்கம் (ஸ்லீப்).—இப்போது பிள்ளை சற்றுநேரம் தூங்கும். அதை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. அது விழித்தால் அல்லது அழுதால் அது குளிர்காற்றுபட்டோ அழும்; ஆதலால் இன்னொரு போர்வை அல்லது வெந்நீர் கிரப்பிய புட்டிவைக்கவேண்டியது; இவைகள் பிள்ளையை சாந்தம்செய்யும்.

போஷ்பு (நரிஷ்மென்ட்).—இரண்டாந்தாம் குழந்தை தூங்கி விழித்தவுடன் தாய் பால்கொடுக்கவேண்டும். இது தாயின் காப்பம் சுருங்கும்தன்மைக்கு அது கூலமாகும். முதல் சிலநாள்களுக்கு நன்றாய் பால் உண்டாகும்வரையில் வெகுநேரத்திற்கு ஒருமுறை தாய்பால் உண்ணக்கொடுக்கவேண்டும். வெறுமையான மாப்பை குழந்தை சப்பும்படி முயற்சிபெவதினால் தாயும், பிள்ளையும் ஏமாந்து ஸ்தனக்காம்பை புணனுக்கும்படியாகவும் எதுவாகும். ஆகையால் முதல் இரண்டொருநாளைக்கு ஒருநாளில் இரண்டுமுறை அல்லது இருபத்தை நான்குமுறை நேரத்திற்கு மூன்றுமுறையாக பால்கொடுத்தால் போதும். பிள்ளை பால் இல்லாமல் வருந்துமென்று கவலைப்படத்தேவியில்லை. பாலும் தண்ணீரும்சேர்ந்து நேரத்திற்குநேரம் சில தேக்காரைகூடவும் லவுகொடுப்பதாக, தாயுக்கு பால்சேரும்வகையில் யாதொரு அபாயமின்றி குழந்தை காக்கப்பட்டிருக்கும்.

தேகசவுக்கியம் இடங்கொடுக்கும்பொழுதெல்லாம் தாய், தானே தனகுழந்தைக்கு பால்கொடுப்பது அவசியமானது. ஏனெனில் பால்கொடுத்தல் காப்பாசியமானது. ஏனெனில் பால்கொடுத்தல் காப்பாசியமானது. கண்டமாவை அல்லது தைநன்றாய் சுருங்கச்செய்யும்.

கூடியோருக்கு அல்லது பலவீனம் இருந்தாலேயன்றி தாயானவள் இரண்டொருமாதம் பால் கொடுக்கிறாள். அந்த பால்கொடுக்கும்படி முயற்சிசெய்ய புத்திசொல்லு வது தாழியின்கடமை.

தாயானவள் கொடுக்கக்கூடாதபடித்தின் அதற்கு பதிலாக வேறொருத்தியைப் பார்க்கவேண்டும். பால் கொடுக்கவேண்டிய பிள்ளைக்கு ஒத்தவயதுடைய அல்லது அந்தபிள்ளைக்கு கொஞ்சம் முத்தவயதான பிள்ளை யையுடைய - தேகசவுக்கியமுள்ள ஒருத்தியைத் தாதி யாக (wet-nurse) அமர்த்தலாம். சாதி 30 அல்லது 35 வயதிற்குமேற்படாதவளும் சவுக்கியமுமுள்ளவளுமான ஒரு ஸ்திரீயைத்தேடவேண்டும். முன்சொ ள்ளவயதிற்கு மேற்பட்டவளின் பாலும் 16 அல்லது 17 வயதுள்ளவளான பால்ஸ்திரீயின் பாலும் நன்றாய் ராதாகையால், இப்பேர்ப்பட்டவர்களை வைத்துக்கொ ள்ளப்படாது. வைத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த ஸ்திரீ நல்ல தேகபுஷ்டியுடையவளும், கழுத்திலும் தாடையிலும் கண்டமாலை காயம் வடுவில்லாமலும், கழுத்தில் நெறிக்கட்டிகள் இல்லாதவளுமாய் இருக்கவேண்டியது. ஸ்தனங்கள் பால் நெறிகளையுடையதாயும் உறுதியாயும் இருக்கவேண்டும். அதிகமாய் பெருத்தவையும் தளர்ந்தவையுமான ஸ்தனங்களில் அதிககொழுப்பு இருக்கிறதால் அவை நல்லவையல்ல. ஸ்தனக்காம்பு நீண்டிருக்கலாம், அதிக பெரியதாயிருக்கப்படாது. அவைகளில் வெடிப்பாவது, காயமாவது இருக்கப்படாது. ஸ்தனத்தை அழுக்கும்போது சுலபமாய் பால்வரவேண்டும். அதிநீராகவும் நீலம்சேர்ந்த வெண்ணிறமாயிருக்க வேண்டும். தாழியின் குழந்தை பெய்ப்படிந்துக்கிறதென்று நன்றாய் கவனித்துப்பார்க்கவேண்டியது. ஏனெனில் அதிநீர் நிலையால் பாலைக்குறைந்ததை நிதானிக்கலாம். அது பாரியாகவும், நன்றாய் போஷிக்கப்பட்டும் உடம்பில் எந்தவிதமான ரசமும் இல்லாததாயிருக்க வேண்டும். அது பலவீனமாய் மூக்கால் ஒழுக்கிக்கொ

ண்டும், மேலே ஏதாவது சொறி வந்திருக்குமானால் உடனே தாழியை தள்ளிவிடவேண்டும்.

முதல் சிலநாள்களுக்கு பால்கொடுப்பதிலும், குடிப்பதிலும் தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் ஒழுங்கான பழக்கம் உண்டாவது அதிக அவசியம். பிள்ளைபின் அழுகையை ஓயப்பண்ணும்படியாக அது அழும்போதெல்லாம் தாயானவள் பால்கொடுத்துபழக்கினால் சிக்கிரம் அவள்தேக்ககம் கெட்டு பிள்ளைக்குப் பால்செரிக்க போதுமானகாலமில்லாததால் சிக்கிரம் பேதி அல்லது அஜீர்ணத்தின் பல ஞானவேறெதாவது நேரிடும். இரண்டொருமாதத்திற்கு பிறகு பிள்ளை இரவில் பால் அடிக்கடி கேளாமல் புகலில் கேட்பதைப்பார்க்கக் குறைவாய் கேட்கும்படி பழக்கிக்கொள்ளவேண்டும்.

தாதிவைப்பது இஷ்டமில்லாத விஷயத்தில் குழந்தையை கை ஊட்டத்தால் வளர்க்கலாம். பசும்பாலில் சரிபாகம் தண்ணீர்சேர்த்து கொஞ்சம் சாக்காரோஸ் து கொடுக்கவேண்டும். பிள்ளை பெரிதாக வளர்வனர தண்ணீரை குறைக்கவேண்டியது. இது தன்மையில் ஏறக்குறைய தாய்ப்பாலுக்கு சமானமாகும். ஒருதடவையில கொடுக்கும் பாலின் அளவு குழந்தையின் பசிக்கும் பலத்திற்கும் ஏற்றதாயிருக்கவேண்டும். முதல் மாதத்தில் இரண்டு மூன்றுமணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை ன்சு பால் குழந்தைக்கு போதுமானது. அதன்பிறகு இடைவிலுள்ள சமயம் நீடிப்பதன்படி பாலும் அதி கப்பட்டவேண்டியது. சாதாரணமாய் பால்புட்டியில் (feeding bottle) சிறு குவாரமுள்ள ரப்பர்காம்புடைய புட்டி நல்லது. அதை சுலபமாய் சுத்திசெய்யலாம்.

மலஜலக்கூழ்வு (எக்ஸ்க்ரிஷன்).—சாதாரணமாய் 6 அல்லது 12 மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை மலோபாதையாகும். சில சமயங்களில் 24 மணி நேரத்திற்கும்

மலஜலம் இரங்காமலும் இருக்கலாம். இந்த சமயத்தில் அல்லது அதற்குமுன்னதாக யாதொரு வயிற்றுநோய் அல்லது அழற்சியிருந்தால், தாகி உடனே ஆசனத் துவாரம் சரியாயிருக்கிறதோவென்று அறிந்துகொள்ள வேண்டும். இப்போதாவது பின்பு எப்போதாவது மலோபாதையாக்கவேண்டுமானால் சோப்பை ஒரு அங்குல நீளத்திற்கு குவிந்த வடிவாக அறுத்து சின்ன முனையை தண்ணீரில் நோய்த்து ஆசனத்திற்குள் செலுத்தி அனாநிமிஷம் அப்படி வைக்கவேண்டியது. அது ஆசனக்குடலை எழுப்பதல்செய்து மலம் கழியச்செய்யுமா? சிலசமயங்களில் முதலில் "நீரைப்பற்றி" கஷ்டமுண்டாகும். பன்னிரண்டுமணிநேரமாகியும் நீர் இரங்காவிட்டால் சுடச்சுட ஸ்பன்ஜை மேகன பொருத்தின்பேரில் ஒத்தபும்போடுதல், அல்லது வெதுவெதுப்பாக குளிப்பாட்டுதல், அல்லது குளிர்ந்த ஜலத்தை தொடைகளின் பேரில் தெளித்தல், மூத்திரப்பை வெறுமையாயிலலா விட்டால் அதிலுள்ள மூத்திரத்தை வெளியில்விடும். இப்படியும் நீர் இரங்காவிட்டால் வைத்தியரின் உதவியைத் தேடவேண்டியது.

பேதிமந்து (பிசிக்).—தாதியானவன் ஒருபோதும் குழந்தைகளுக்கு வைத்தியம்செய்ய முயலக்கூடாது. தனக்குரியதல்லாததும், தன் சக்திக்கு மிஞ்சினதுமான எதையும் தனக்குத் தெரியாததாய் அறிக்கைசெய்வதினால்தான் அமர்த்தினவர்கள் தன்னை நம்பவும், மதிக்கவும்செய்வான். அதையன்றி தனக்கு தெரியாததைத் தெரிந்தாற்போல் அபிநயித்துத் தன்பேரில் எல்லாப் பொறுப்பையும் போட்டுக்கொள்வதினாலே தனக்கும் தன் நோயாளிக்கும் கெடுதலையை வரப்பண்ணுவான்.

விநயங்கர் அல்லது விகாரங்கள் (மால்பார்மேஷன்ஸ்).—குழந்தைபிறந்து 24 மணிநேரத்திற்குள்ளாக மலஜலவிசர்ஜனம் இல்லாதிருந்தால் ஆசனவழியும், நீர்த் தானாயும் இல்லையென்று சந்தேகிக்கலாம்.

கழிச்சல் (டையரியா).—குழந்தையின் ஆகாரத்தில் ஏதாவது தப்பிதமிழ்ந்தால் இது சம்பவிற்கும். இந்த குணக்கேடு அடிக்கடி பால் கொடுப்பதால் உண்டாகும். குழந்தையின் ஆகாரத்தை ஒழுங்குபடுத்தியும், நிற்காவிட்டால், இரண்டு மூன்றுமணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை இரண்டொரு கிறெயின் கிறையுள்ள வாசனை சீமைச்சண்ணாம்பு பஸ்பம் (அரோமாட்டிக் சாக் பவுடர்) கொடுக்கவும்.

வார்த்தி (வாமிடிங்).—அநேகதடவைகளில் குழந்தைக்கு அதிகமாய் பால் கொடுப்பதாலாவது அல்லது பால் புளித்து குழந்தைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாததாகலாவது வார்தியாகும். புட்டிப்பால் கொடுக்கும்படித்தலில் புளிப்பைக் கண்டிக்கும்படி கொஞ்சம் சண்ணாம்பு தண்ணீர் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது.

வாய்ப்புண் அல்லது வாய் இரணம் அல்லது வாய்க்கிரந்தி (திரஷ்).—இது குழந்தைக்கு சாதாரணமாய் கெட்ட ஆகாரம் கொடுப்பதினால் அல்லது அசுத்தத்தினால் உண்டாகும். கைகண்டவளர்ப்பானால், பால் மாற்றவேண்டியது. வாயிலுள்ள இரணங்களை வெண்காரமும் தேனும் (போராக்ஸ் அன்ட் ஹனி) சேர்த்து நாக்கில் தடவலாம். குழந்தைக்கு வாயிலுள்ள இரணங்களோடு ஆசனத்துவாரத்தை சுற்றியும் புண்ணிருந்தால் அதற்கு உளளுக்கும் மருந்து தேவையாயிருக்கும்.

கலோனோய் (சோர் ஐ).—இது குழந்தைக்கு பிறக்கும் போது மரம்மல்தானத்தின் அழுக்கு ஏதாவது படுவதால் அல்லது அதைக் குளிப்பாட்டும்போது அல்லித் அழுகைகளன்றிய நீக்காமல் விடுவதால் சாதாரணமாய் உண்டாகும். இவை காரணங்களாய் இருக்கும்படித்தலில் பிறந்த 24 மணிநேரத்திற்குள் இந்த விபாதி ஆரம்பிக்கும். பிறந்த சிலகாளைக்குப் பின்பு காணப்பட்டால் குளிரினால் அல்லது அழுக்கு ஸ்பன்ஜால் அல்லது அழுக்

122

சிசுவை பராமரிக்கும்வகை.

குக்கையால் துடைப்பதால் உண்டாகும். அது தொற்றுவியாதியும் அபாயமுமானது. சிலவேளைகளில் அது கண்ணை முழுதும் கெடப்பண்ணும். ஆகையால் அல்த உடனேயும் அடிக்கடியும் கவனிக்கவேண்டியது. கண் களுக்கு நன்றாய் வைத்தியம்செய்தால் 72 மணிநேரத்தில் நல்ல சுகமாகவிடும். படிசாரம் (ஆலம்) 2 கிறெய்னை ஒரு அவுன்சு கண்ணீரில் சேர்த்து கண்ணாழலினால் நல்லது. அவசியமானால் ஓட்டக மயிரால் செய்யப்பட்ட பிரஷினால் நன்றாய் சுத்தம்செய்யவேண்டும். அங் சியமானால் கண்ணாடி பீச்சாங்குழலைப் பிரயோகிக்கலாம். வெகு சீக்கிரமாக கண்ணில் அழுக்குக்கட்டும். இதை சுத்தமாக்க கண்ணைத்திறந்து பீச்சாங்குழலால் சுத்தஜலம் மெதுவாய் அடித்து கண்ணீரால் நீர்ப்படாத அழுக்கை பிரஷினால் எடுத்து - படிசாரத்தண்ணீரில் ஒருதுண்டெனின்ட் துணியை மடித்துத் தோய்த்து, கண்ணின்பேரில் போடவேண்டும். முகவில் ஒருமணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கவனிக்கவேண்டியது. சீக்கிரமாய் சவுக்கியப்படாவிட்டால், வயித்திறுரை யோசனை கேட்கவேண்டும்.

மஞ்சட் காரை (ஜான்டில்).—சாதாரணமாய் குழந்தை பிறந்து முதல்வாரத்திலேயே உண்டாகும். இது குளிரினால் உண்டாகும். வெந்நீரால் குளிப்பாட்டி வயித்தியரை யோசனைக் கேட்கவேண்டியது.

வலி அல்லது பிச்சு.—இது குழந்தைநோய்களில் மிகப்பிரமாதமான வியாதி. நரம்புகள் முருக்கிக்கொள்ளுதல், கை கால்களின் பெருவிரல்களும், மற்றவிரல்களும் குறுகி மடங்கிக்கொள்ளுதல். இவை - இந்த வியாதியின் வரவை குசிப்பிக்கும். வைத்தியரை வரவழைக்கவேண்டும். அவர்வருவதற்குள் சிசுவுக்கு வெந்நீர் ஸ்நாநஞ்செய்க்கலாம். சிசுவுக்கு உடுப்புபோடாமல் ஒருகம்பிளி, அல்லது துப்பட்டிமாத்திரம்போர்த்து வைத்துக்கொண்டிருக்கலாம்.

பால்தடிக்க மறுத்தல் (ரிப்யூசல் டீ சக்).—பலகிட்டி இசிவு சன்னியுடன் பால் தள்ளிவிடுமொகில் அது பொருமோசமான அறிகுறியாம் - குழந்தையின் வாயில் வீரலைவிடுவதால் இசிவு சன்னி யுண்டாச்சுகென்று இலேசாய்றியலாம். ஏனெனில் அப்படியிருக்கில் வாயைத் திறப்பது கஷ்டமாயிருக்கம். பால்குடிக்க மறுப்பது சாதாரணமாய் சுவாசகோசலெப்பத்திற்கு (pneumonia) அறிகுறியாம்.

காலத்திற்து முத்தி பிறக்கும் துழந்தையை பராமரிப்பது (ப்ரிமெட்ஞர் சல்ட்ரொன்).—காலத்திற்குமுந்தி பிறக்கும் குழந்தையை வளர்க்க அதிக சிரத்தைகொள்ளவேண்டும். காலத்திற்குமுந்தி பிறந்தபடியால் அந்த சிசுவின் பூரண வளர்ச்சி யற்றிருக்கிறது. தேக அனலைக்குறையாமல் காக்க அதற்கு சக்தி போதாது. ஆதலால் பூரணகால அளவில் பிறந்த பிள்ளையைவிட இதற்கு உஷணம் அதிகமாய் கொடுக்கவேண்டியது. அதை சுற்றிப் பஞ்சுபோட்டு கம்பிளியால் அதை சுற்றவேண்டியது. தொடடியில் இருந்தால் அதன்பக்கத்தில் வெந்நீர் சிரப்பின புட்டிகள் வைக்கவேண்டியது. அதை குளிப்பாட்ட அவசரப்படலாகாது. ஏனெனில் குளிப்பாட்ட வெதால் உண்டாகும் வெயாவை அனலைக் குறைக்கும் அது குழந்தைக்கு தீங்காகும். குழந்தை பால் குடிக்க மாட்டாதாகில் அடிக்கடி போஷித்து இரண்டு மூன்று மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை இரண்டு மூன்று துளி குரந்தி கொடுப்பது பிரயோசனமாயிருக்கும்.

10 - ம் அதிகாரம்.

ஒழுங்கின் தலை உதயங்கள்.

IRREGULAR HEAD PRESENTATIONS.
(இர்ரொகுலர் ஹெட் பிரசென்ட்டேஷன்ஸ்.)

முகஉதயம் (பேஸ் பிரசென்ட்டேஷன்).—இதில் பிண்டத்தின் நெற்றிமுதல் முகவாய்க்கட்டை வரையிலுள்ள குறுக்களவு கூபகத்தின் ஏகாவது ஒருபங்கத்தின் சாய்ந்த குறுக்களவுக்குச் சரியாயிருக்கும். சில பிரசவங்களில், பிரசவம் ஆரம்பிப்பதற்குமுந்தி முகம் உதயமானாலும் அநேகமாய் பிரசவம் ஆரம்பித்தபிறகு தலையின் நீட்சியால் அல்லது பிடரி கவிழ்வதனால் இது உண்டாகிறது. இது சாதாரணமாய் தலை நீண்டு கூபகத்தினால் முகம் இடங்கும்படியாக வட்டவிலிம்பு அல்லது மேல்வெளியில் பிடரி பிடிபடுவதால் உண்டாகிறது என்பது உண்மை. இவ்விதம் சம்பளிப்பதற்கு காரணம் கர்ப்பாசயம் சாய்ந்தாற்போல் இருப்பதே. காலத்திற்குமுந்தி பிரசவம் உண்டாவதாலும், பனிநீர் அதிகமாக இருப்பதாலும், சடுதியாய் பனிக்குடம் உடைவதாலும், பிள்ளை செத்துப்பிறக்கும்போதும் இவ்வித முக உதயம் சாதாரணமாய் உண்டாகின்றது.

தலை உதயமாகும்வண்ணமாகவே, முகமும் காங்குவிதநிலைகளில் உதயமாகிறது. இதில் உச்சி உதயமாகும்போது, பிடரி எந்த இடத்திலிருந்துவந்தாலும் அந்த இடத்திலேயே, இந்த உதயத்தில் நெற்றி தங்குவதென்பதை ஞாபகத்திலவைத்தால் வெகு இலேசாய் இந்தநிலைகளை அறியலாம். ஆகையால் ஒவ்வொருநிலையும், சாதாரண உச்சி உதயத்தின் ஒவ்வொரு நிலைக்கொப்பாய் இருக்கத்தக்கதாய் நால்கிலைகள் உண்டு. அந்த நான்கிலைகளில் ஒவ்வொன்றும் உச்சி உதயங்களின் ஒவ்வொருநிலையின் மாறுபாடுபெண்க.

• முதல் நிலை (பஸ்ட் பொசிஷன்).—நெற்றி இடது கம் சத்திலும், அதாவது துடைச்சாந்தின் பொருத்திலும் முகவாய்க்கட்டை வலது பீடிகை இடப்பெலும்பின் பொருத்திலும் இருக்கும். முகத்தின் நீண்டகுறுக்களவு கூபகத்தின் வலதுசாய்ந்த குறுக்களவுக்குச் சரியாயிருக்கும். குழந்தையின்முதுகு தாயின் இடதுபக்கத்திலிருக்கும். இது உச்சி உதய முதல்நிலைக்கு மாறுதலான நிலை.

• இரண்டாம் நிலை (செக்கண்ட் பொசிஷன்).—நெற்றி வலதுகம்சத்திலும், முகவாய்க்கட்டை இடதுபீடிகை இடப்பெலும்பின் பொருத்திலும் இருக்கும். முகத்தின் நீண்ட குறுக்களவானது கூபகத்தின் இடதுசாய்ந்த குறுக்களவுக்குச் சரியாகும். இது உச்சி உதய இரண்டாம் நிலைக்கு மாறுதலான நிலை.

• மூன்றாம் நிலை (தர்ட் பொசிஷன்).—நெற்றி வலதுபீடிகை இடப்பெலும்பின் பொருத்திற்கு எதிரிலும், முகவாய்க்கட்டை இடதுகம்சத்தின் எதிரிலும் இருக்கும். முகத்தின் நீண்டகுறுக்களவு, கூபகத்தின் வலதுசாய்ந்த குறுக்களவில் இருக்கும். இது உச்சி உதய மூன்றாம் நிலைக்கு மாறுதலானநிலை.

• நான்காம் நிலை (போர்த் பொசிஷன்).—நெற்றி இடதுபீடிகை இடப்பெலும்புக்கெதிரிலும், முகவாய்க்கட்டை வலதுகம்சத்துக்கெதிரிலும் இருக்கும். முகத்தின் நீண்டகுறுக்களவு கூபகத்தின் இடதுசாய்ந்த குறுக்களவாகும். இது உச்சி உதய நான்காம் நிலைக்கு மாறுதலான நிலை.

இந்த நிலைகளில், முதலாவதும் இரண்டாவதும் சாதாரணமாகவும், மூன்றாவதும் நான்காவதும் பெத்த அழர்வமாகவும் சம்பளிக்கும். முக உதயம் (230 இல்-1) ஆகும். முகம் பிறக்கும்படியான பிரசவ குட்சமநிலை, உச்சி உதயநிலைபோலவே உச்சி உதயத்தில் பிடரியை

நெற்றியாய் எண்ணிக்கொண்டால், மற்றப்பகுதிகளை எதெதற்கு எடுக்கவேண்டுமென்பது தெளிவாயிருக்கும்.

முகத்துக்கு ஈராலுவகையான அசைவுகளும், புஜங்களுக்கு ஒருவகை அசைவுமுண்டு. அவையாவெவ்வில், உச்சி உதய பிரசவத்தில் விரைதலுக்குச் சமாளமான விரிகை; உச்சி உதய விரிவிற்குரசமாளமான இரங்கலும், சுழலலும் விரைதலும்; தலை உதயத்தின் அசைவைப்போன்று திரும்ப நிலைக்குவருதலுமே.

முதல் நிலை.—நெற்றியானது, இடதுகம்சத்தின் பின்னும் முகவாய்க்கட்டை வலதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலும், தலையின் நெற்றிமுதல் முகவாய்க்கட்டை வலதுபீடிகை முன் குறுக்களவு கூபகத்தின் வலதுசாய்ந்த குறுக்களவிலும் இருக்கும். முதல் அசைவானது தலையின் நீளகை. இது பங்குடம் உடைந்த சிற்பாடு காப்பாசயம் சுருங்குவதினால் உண்டாகும். பிடியானது இன்னும் அதிகமாய் பின்னுக்குத்தள்ளப்படுவதால் முகம் முழுவதும் நன்றாய் உதயமாகிறதாய்க் காணப்படும். இப்போது நெற்றியைப்பார்க்க முகவாய்க்கட்டை அதிக இலேசாய்க் கைக்குத்தென்படும். 2, இரக்கம்.—பிரசவவேகனை அதிகப்பட்டு வரவர முகமானது கீழே கூபகத்தில் நன்றாய் இரங்கும். காப்பாசயவாய் நன்றாக அகண்டிருக்கிறபோது, பரிசோதித்தால் விரல் முக்குத்தண்டின்மேல்வந்து வலதுசாய்ந்த குறுக்களவாய் ஓடும். இடதுபுறமாய் விரல் விடில் மண்டையோட்டின் முன்பக்கப்பொருத்து இடது கம்சத்தின் அருகாமையிலும், பின்னால் வலதுபுறமாகவிடில், முக்கும், வாயும், இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால்விட, முகவாய்க்கட்டை வலதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கு சமீபமாகவும், தென்படும் முகத்தின் வலதுபக்கம் கூபகத்தின் அடியிலிருக்கும். இதுவே உதயமாகும்பாகத்தை யடுத்துவரும்பாகம் உதயமாகும்பாகம் வலதுகன்னமும் வாய்முனையுமாகம். 3, சுழலலு—

பிரசவவேகனை நடந்தேறுவதால் சுழற்சியுண்டாகும். இது விசேஷமான அசைவாம். ஏனெனில் அது உண்டாகாமல்போனால் சரியளவான கூபித்திலிருந்து முழு அளவுக்கு வளர்ந்ததலை வெளிப்படுவது கூடாமையாயிருக்கும். முகவாய்க்கட்டையானது வலதுகம்சத்தின் எதிரிலும் மேகனவில்லவையுக்கு கீழாகவும் வர பீடிகை எலும்பின்பள்ளத்தில் பிடிபி சுழலுகிறது. 4 மடங்கல, மேகனவிலைவின் கீழே கொஞ்சநேரம் முகவாய்க்கட்டைபொறுத்துக்கொண்டு ஒருநிலையாய் நிற்கையில் தலை குறுக்காக சுழலும், அந்நேரம் உச்சி பீடிகை எலும்பை அழுத்திக்கடந்து விடபுத்தை விசாலித்து புறம்பாய்த்தள்ளப்படும். முகவாய்க்கட்டைமுகல் வெளிப்பட, முக்கும், நெற்றியும் அதைப் பின்பொடா, கடைசியில் பிடிபி உதயமாகும். 5 திரும்பச்சுழலல், தலை உதயமாகும்போது உண்டாகும் அசைவுபோலத்தான்; அதைப்போலவே, புஜங்கள் பெறும் அசைவுகளால் தங்கியிருக்கின்றது.

இரண்டாம் நிலை.—இதில் நெற்றி வலதுகம்சத்தின் பின்னும் முகவாய்க்கட்டை இடது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்துக்கெதிரிலும் இருக்கும். முக்குத்தண்டி இடது சாய்ந்த குறுக்களவாக ஓடும். இந்த குத்திர வேலையின் விபரங்கள் முழுதும் முதல்நிலைக்கு எதிரிடையானவைகளே. முகவாய்க்கட்டை இடது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலிருந்து மேகனவிலைவலையில் சுழலும், உச்சியானது விடபுத்தைக்கடந்து வெளியாகும். இடது கன்னமானது அடிபாகமாகம். இடது கன்னமும் வாயின்முனையும் உதயமாகும் பாகங்களாம்.

மூன்றாம் நிலை—முகவாய்க்கட்டை இடது கம்சத்திலும் நெற்றி வலதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலும் இருக்கும். நீளுதலும், இருதலும் இரண்டாம் நிலையில் நடப்பவைபோல நடக்கும். சுழற்சியில், முக

வரயக்கட்டை மேகனவளைவுக்குவர இருந்குந்தாரம், இரண்டாம்கிலையில் அதற்கிருப்பதைப்பார்க்க கொஞ்சமாயிருக்கும். இந்த நிலை அதிக அதுகூலமான நிலையாக எண்ணப்படவேண்டியது.

நான்காம் நிலை.—நெற்றி இடதுபிழை இடப்பெறு ம்பின் பொருத்திலும், முகவாய்க்கட்டை வலதுகம்சத்திலும் இருக்கும். இது மூன்றாம்நிலைக்கு நேர் எதிரி டையாகும்.

பூரண உருவடைந்த நிலையும் இயற்கை அளவான கூபகமும் இருந்தால் முகவாய்க்கட்டை பின்புரத்திலிருக்கப் பிரசவமாகுதல் கூடாமை. தலை மிகவும் சின்னதாயும், அல்லது கூபகம் மிகவும் பெரியதாகவும் இருந்தால்மாதிரியே இவ்விதபிரசவம் சம்பவிக்கும். முகத்தை வளைவின் ஒரு அசைவினால் உதயமாகப்பண்ணக்கூடாமலிருக்கும். கழுத்தின் அதிக நீட்சியும், மேகன எலும்புக்குப்பின்னால் இடமில்லாமையுமே இந்தக்கஷத்திற்குக்காரணம்.

தாய்க்கோ சாதாரணமாய் இந்த உதயம் அதுகூலமானது. என்றாலும், சாதாரணமாய் பிரசவவேதனையின் நேரம் அதிகப்படும். பிள்ளை அதிகம் நெருக்குண்பதால் அதற்கு இது அத்தனை அதுகூலமானதல்ல முகவாய்க்கட்டை எதிரில்கழன்றாலும், பத்தில ஒருபிள்ளைதான் செத்து பிறப்பதாகச்சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. பிள்ளை உபிராயபிறந்தபோது முகம் சாதாரணமாய்விடிக், முகம் விரைப்பட்டுப்போகும். சிலசமயங்களில் உறுப்புடன் இன்னன்னதென்று அறியக்கூடாதபடி சிசுவின் அங்கங்காரம் அத்தனை அதிகமாகவிரும்பும். ஆனால் இது சிலநாளையிலே மறைந்துபோகும்.

தேவிகை (டையக்கோலில்).—இந்த உதயத்தை சிசுவின் மூக்குதண்டினாலும், வாயின் கெட்டி அதுகளாலும், பல் தின்று முளைக்கின்ற பள்ளங்களினாலும், கண்குழ

ஒரங்களாலும், அறிந்துகொள்ளலாம். முக உதயத்தை தப்பாக, புட்ட உதயமாக எண்ணுவார்கள். சந்தேகம்ஜனித்தால் சிசுவின் தலை இருப்பது காப்பாசயத்தின் அடிப்புறத்திலா அல்லது கீழ்ப்பகுதியிலாவென்று வயிற்றின் வெளிப்புறத்தை கடவி ஆராய்ந்தறிந்துகொள்ளலாம். அடிக்கடி பரீகரிப்பது தகாசகாரியம். என்னெனில் இது சிசுவின் கண்ணையும் அதின் மற்ற மிருதுவானபாகங்களையும் காயப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாகும்.

நீர்வகீக்தம்வகை.—பெரும்பான்மையாக முக உதயங்களில் பிரசவம் சாதாரணமாய் இயல்பாயுண்டாகும் சக்தியால் நடந்தேறும். இதை முகவிலேயே அதாவது முகம் உகிக்கும்போதே அறிந்துகொண்டால், சிலசமயத்தில் இந்த தப்புநிலையை மாற்றலாம். அதெப்படியெனில், நெற்றியின்பேரில் இரண்டுவிரல் முனையையுமவைத்து அதை இன்னம் இரங்கவொட்டாமல் தடுத்து, பிடரி கீழே இரங்கும்படிச் செய்வதினால்தான் உச்சி உதயம் வருவிப்பதே இப்படிச்செய்வதின்கருத்து. என்னெனில், முக உதயத்தைக்காட்டிலும் இது சிசுவிற்கு ஈர்சயமாகவே மெத்த அதுகூலமானதென்க. இது அதுகூலப்படாமல் முகம்முழுமையும் உதயமானால் தற்செயலாய் பிரசவக்கஷமில்லது நல்லயோசனையாகும். முகவாய்க்கட்டை சுழலுவதில் தாமதப்பட்டு உதவி அவசியம் கேட்கவாயிருந்தால் அப்போது சிசுவின் வாயில் இரண்டு விரல்களையிட்டு முகவாய்க்கட்டையை கீழாகவும், எதிராகவும் மேகனவளைவுக்கெதிராய் இழுக்கவேண்டியது. இது செய்யக்கூடாதபக்கத்திலே சிசுவை திருப்பியாவது அல்லது ஆயுத்த்கிலாவது பிறப்பிக்கவேண்டியது.

நெற்றிப் பிரசவங்கள், முக உதயங்களுக்கும், உச்சி உதயங்களுக்கும் மத்தியையானவை. இவை தலையின் பின் எலும்பினிருந்து முகவாய்க்கட்டைவரையிலுள்ள குறுக்களவானது கூபகத்தின் சாய்ந்த குறுக்களவுக்கு

எதிரிடையாக இருப்பதால் உண்டாகும். இதின் குறி
களை அறிவது கஷ்டமல்ல. உதயமாகும் நெற்றியின்
மேடானது வட்டமாய் எழும்பி இருப்பதிலும், முன்
உச்சி சுலபமாய் தென்படுவதாலும் அறிந்துகொள்ள
லாம். இப்பேர்ப்பட்ட சமயங்களில் ஏப்போதும் வை
த்தியர் ஒத்தாசை அவசியமாகும். நெற்றியை அழு
க்கி இந்த உதயத்தை உச்சி உதயமாகமாற்ற பிரயாசப்
படலாம். இது முடியாமற்போனால் குறடுகளினாலா
வது (Forceps) சிக்வை திருப்புவதினாலாவது (version)
பிறப்பிக்கவேண்டியிருக்கும்.

11 - ம் அதிகாரம்.

II. கஷ்டப் பிரசவம்.

II. DIFFICULT LABOUR.

(டிப்பிகெல்ட் லேபர்.)

(A).—தாமத பிரசவம்.—விவரம்.—இதில் தலைஉதய
மாகி 24 மணி நேரத்திற்குப்பிறகு யாதொரு உதவியும்
இல்லாமல் பிரசவம் முடியும். பிரசவத்தின் முதல்பா
தத்தில் அது வழக்கமாய் தாமதப்பட்டும்; அதற்குக்கார
ணங்கள்:—

- (a) கர்ப்பாசயத்தின் தூர்ப்பலச செய்கையும்.
- (b) யோனிமார்க்க கடினத் தன்மையும்.
- (c) வேறுகாரணங்களுமே.

(a) கர்ப்பாசயத்தின் தூர்ப்பலச செய்கைக்காரணங்கள்
அநேகம்-ஒவ்வொன்றிற்கும் அதற்குரிய சிடுச்சைசெ
ய்யவேண்டும்.

(1) கர்ப்பாசய தூர்ப்பலமானது, முக்கியமாய்
நான்பட்ட வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டு பலஜீனப்
பட்ட ஸ்திரீகளிலும், அநேகம் பிள்ளைகளைப்பெற்ற
ஸ்திரீகளிலும், வயது முதிர்ந்தபிறகு முதல் தடவை
யாக கர்ப்பமாகும் ஸ்திரீகளிலும் உண்டாகும். பட்டி
னியும் சுதயரோகம் கழிச்சல்முதலான வியாதிகளும் ஸ
்திரீயை பலஜீனப்படுத்தவதால் இவைகள் பிரசவம்
தாமதப்பட ஏதுவாகும். பிரசவ நோயானது பிரசவ
காலமுழுதும் அற்பமாக இருக்கும். அல்லது சொ
ஞ்சநேரத்தின்சின் ஓய்ந்துபோகும். கர்ப்பாசயத்தில்
சிக்வின்தலை ஒழுங்கான நிலையின்றும், கூபகம் சரியா
ய் அமைந்திருந்தும் பிரசவம் ஆகாகிருந்தால், கர
்ப்பாசயத்தின் செழுகை சரியாயில்லாமையால் அந்த
தாமதம் உண்டாகும். பனிக்குடம் உடைவதற்கு
முந்தி பிரசவ முதல்பாதத்தில் ஒரு குறித்த காலம்
அல்லது பருவம்வரைக்கும் பிரசவந்தாமதப்படுமொகில்
அது யாதொரு அபாயக்குறகளோடும் தொந்தப்பட்டி

ராகு. சில பிரசவங்களில் நோய் ஓய்ந்துபோனதாய்க் சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் கர்ப்பாசயமானது அந் நேரம் குழந்தையின்பேரில் சுருங்கினவண்ணமாயிருக்கும். இதனால் குழந்தைக்கு மாயையில் நின்று உதிராமல் செல்லுவது தடைப்பட்டு அபாயத்துக்கிடமாகும். பிரசவ மூன்றும்பாதத்தில் பலவீனம் நீடிப்பதால் சில சமயங்களில் பிரசவத்திற்குப்பிறகு உதிரப்போவர்கமுண்டாகின்றது.

சிகிச்சை (டிரீட்மென்ட்).—ஸ்திரீ சரியாக போஸ்டிக் கப்படாதிருந்தபடிதத்தில் அடிக்கடி கொஞ்சம் பிராந்திகலந்து ஆதாரம் கொடுக்கலாம். இடுப்பை இதுக்கெக்கட்டுவதால் கர்ப்பாசயச் செய்கை அதிகப்படும். சிற்று மணக்கெண்ணெயோடு கற்பூரத்தெலம் கலந்து பிச்சம் குழலால் ஆசனத்திற்குள் (எனிமா) செலுத்தினாலும் கர்ப்பாசயச்செய்கை அதிகப்படும். பிரசவநேரத்தொடங்கி அதிகநேரமாகாவிட்டால் அதையில் உலர்ந்திரியப்பண்ணவேண்டும். வெகுநேரம் தூங்காதிருந்தால், கர்ப்பாசயவாய் அதிகமாய் விரிவாகாதபடிதத்தில் தூக்கம்வருவதற்காய் 20 துளி அபிஷிசிராவகம் கொடுக்கலாம். இதன்பிறகு கர்ப்பாசயச்செய்கை வழக்கமாய் பலமாக உண்டாகும். ஸ்திரீ மல்லாக்கப்படுத்திருந்து நோய்வரும்போது கர்ப்பாசயத்தின் அடிமை உன்னங்கையால் அமுக்குவது மெத்த அனுகூலமாகும். பிரசவங்களில் “எர்கட்” திராவகம் கொடுக்கலாம். ஆனால் இப்படி கொடுக்கையில் அதிக யேரசனை பண்ணிக்கொடுக்கவேண்டியது. ஏனெனில் அதை அஜாக்ராதையாய்க்கொடுப்பதால் அதிக அபாயமுண்டாகிறது. “எர்கட்” திராவகம் கொடுப்பதற்குமுந்தி அது கர்ப்பாசயத்தின்மேல் பலன்வெய்து அதின் ஓயாதபலமான சுருங்கும் செய்கையை உண்டாக்குமென்று ஞாபகத்தில் வைக்கவேண்டும். ஆகையால், இவ்வாறு பலமாய்ச் சுருங்கும் கர்ப்பாசயச்செய்கையை தடுக்கின்ற தடை ஏதாவது இருந்து சிகிச்சைத்தள்ளிவிடவொட்டா

மல் பண்ணுமேயாகில், அது கிழிபடக்கூடியதாகும். ஆகையால் அதிகபிள்ளைகளைப் பெற்றவளின் பிரசவத்தில் கர்ப்பாசயச்செய்கை குறைவாயிருந்தால் கர்ப்பவாய் நன்றாய் விரிந்தும், சிசுவின் தலை புறவெளிக்குச் சமீபமாய்க் கீழேயிரங்கியும் கூபகத்தில் இடம் இருக்கிறதாயின் காணப்படும். இப்பேர்ப்பட்டவர்களுக்கு கூட “எர்கட்” திராவகம் சிறு அளவாய்கொடுக்கலாம். 8 அல்லது 10 துளி விக்யுட் எர்கட் எக்ஸ்டிராக்ட்டை (liquid ergot extract) அரை ஒயின்களால் ஜலத்தில் ஒரு மணிகேரம்வரையில் 10, 15 நிமிஷத்திற்கு ஒரு முறை கொடுத்துக்கொண்டுவந்து கர்ப்பஸ்திரீயை மெத்த ஜாக்ராதையாய்க் கவனித்துக்கொண்டிருக்கவேண்டியது. நோய் பலமாக எழும்புமேயாகில், அந்த “எர்கட்டை” நிறுத்தவேண்டியது. சிசுவின் இருதயத்தை அடிக்கடி பரிசோதித்து அது பலவீனப்பட்டு மெதுவாவதாய்க் காணப்பட்டால் வைத்தியனில்லாவிட்டால் சிசுவை திருப்பி (டர்னிங்) பிறப்பிக்கலாம்.

(2) அதிகமான பனிநீரும் பலவீனமான கர்ப்பாசயச்செய்கைக்கு காரணமாகும். கர்ப்பாசயமானது மிதமிஞ்சி பெருத்திருப்பதால் அது தன்வழக்கமான பலத்துடன் சுருங்காதபடி தடுக்கப்பட்டு அதிகநேரம், பிரசவதாமதமுண்டாகும். இடுப்புநோய் அற்பமாயிருப்பதால் கர்ப்பாசயத்தின் கழுத்து அதிகமாய் விரியப்பண்ணக்கூடாததாயிருக்கின்றது. வயிறு அதிக பெரியதாகி வட்டமாயிருக்கும். வயிறு அதிகமாய் வீம்பியிருப்பதால் தோலானது சிலசமயங்களில் பளபளப்பாயிருக்கும். யோனிமார்க்கமாய் பரிசோதித்துப்பார்க்கையில் பிண்டம் வீரல்களுக்கு வருஷிப்போவதால் உதயமாகும்பாகம் தென்படுவது கஷ்டமாயிருக்கும். பனிக்குடமானது நேர்புண்டாகையில் தொங்கமாட்டாது. சிசுவின் இருதயச்சப்தம் நன்றாய் வெளிப்படுத்தோன்றாது. சிசுவின் இருதயத்துடிப்பு தெளிவற்றதாயும் காதாற்கேட்கக்கூடாமலுமிருக்கும். இவ்விதமாய்

பிறக்கும் பிள்ளைகள் சாதாரணமாய் சின்னவையாய் அல்லது நோயாளிகளாய் அல்லது இறந்தவையாய் இருக்கும்.

பரிசீப்பு.—பனிக்குடத்தின் ஜவ்வை மேல்புறத்தி லுழித்து, பனிநீரை மெதுவாக வெளிப்படுத்தவேண் டும். ஏனெனில் சடுதியாய் பனிநீர் வெளிப்பட்டா சிசு கிலேமாரி நாகிக்கொடி பிதுங்கிவிழும். நோயி ன் தன்மை சுறுக்குச்சுறுக்கென மாறி பின்பு மெத்தப் ப மாயெழும்பும். பனிநீர் வெளியே பாய்ந்தபின் வயி றில் ஒருகட்டு (பயிண்டர்) கட்டவேண்டும். உதிரப் பரவாகமும் அதனால் அதிக பலவீனமுஞ்சம்பவிக்க டெ குசாதாரண நியாயங்களிருப்பதால், சிசு ஜெனனம் கும்போது கர்ப்பாசயத்தைத் தள்ளிக்கொண்டேயிரு கவேண்டியது. இதனோடு கர்ப்பாசயம் சுருங்கும்படி பிரசவத்திற்கு முந்தியும் பிந்தியும் “எரிகட்” திராக கம் கொடுக்கவேண்டியது.

(3) கர்ப்பாசயம் முன்புறம்மடங்குதல் அல்லது அடிவய று முன்புறம் சரிந்து நோய்துவதுபோலநீங்கல்.—இவைகள் உதயமாகும்பாகம் கூபகவீளிம்பில் பிரவேசியாதபடி டுத்து, வயிற்றின் தசைகள் தளர்ந்து இருப்பதினால், க ர்ப்பாசயம் எதிரில் தள்ளப்பட்டு தப்பானமார்க்கமாய் சென்று தலை கூபகவீளிம்பில் பிரவேசியாமல் பீடின ளும்கின்பக்கமாய் தள்ளப்படுவதால் பிரசவம் தாம ப்படும். பரிசோதனையில் பீடிகைஎலும்பின் மேட்டு பக்கமாய் கர்ப்பாசயவாய்தென்படும். அதை எட்டி பிடிப்பது கஷ்டமாயிருக்கும்.

நீர்வகீத்தல் அல்லது அத்திற் சிகிச்சை.—நோயாளிக ட் மல்லாக்கக்கிடத்தி கர்ப்பாசயத்தின் சாய்ந்த நிலை வைய மாற்றுவதற்காய் அடிவயிற்றில் ஒருகட்டு (பயி டர்) பவமாய்க்கட்டவேண்டும். சிசுவை திருப்பது சிலசமயங்களில் ஆவசியகமாகும்.

(4) பனிக்குடம் அளவிற்துமித்தி உறுதியாயிருப்பதாலும் பிரசவம் தாமதமாகும்.—கர்ப்பாசயவாயானது முழுதும் அகண்டபிறகு கர்ப்பாசயமானது தன் முழுச்செய்கை யை செய்ய அது தடைசெய்கிறது. பனிக்குடம் கைந கங்களாலாவது, மூத்திரக்குழலின் கம்பியினாலாவது மு ப்பன்றிமுள்ளினாலாவது உடைக்கப்படவேண்டியது.

(5) பனிக்குடம் பநலத்தீர்துமுன் உடைதல்.—கர்ப்பாச யக்கழுத்தை விரியவொட்டாமல் தடுத்துப் பிரசவத்தை த்தாமதப்படுத்தும். பனிக்குடம் கர்ப்பாசயத்தின்கழுத் தை நெருக்குவதற்குப்பதிலாக சிசுவின் உரப்பான தலை அதை நெருக்குவதால் அது வீங்கிக்கடினப்படும்.

நீர்வகீத்தல்.—கர்ப்பாசய வாயானது உரப்பாயிருந் தால் வெதுவெதுப்பான ஜலத்தை உள்ளே பாய்ச்சுவது பிரயோஜனமாகும். எப்படியெனில் அமைமணிகோ த்திற்கு ஒருமுறை பத்து நிமிஷத்திற்கு ஹிக்கின்சன்ஸ் பிச்சாக்குமுலால் கர்ப்பாசயக்கழுத்தில படுமபடியாக வெதுவெதுப்பான ஜலத்தை உட்செலுத்தவேண்டும். இவ்விதமாய் நான்கு ஐந்து முறை செய்யலாம். ஆனால் தண்ணீரை கர்ப்பாசயத்தின் கழுத்துக்குள் செல்லவிடா மல் ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்க்கவேண்டியது. ஏனெனில் இந்தத்தண்ணீர் கர்ப்பாசயத்திற்குள் செல்லுமாயில் அ திகமான அபாயம் சம்பவிக்கும். நீர் உள்பாய்ச்சினபின் ரப்பினி தூங்காவிட்டால் அபிவித்திராவகம் கொடுத் தால் கர்ப்பாசயவாய் மிருதுவாய் அகலமாகும். பிரச வமும் சீக்கிரம் ஆகும்.

(6) கர்ப்பாசய அடிப்புறம் எதிரில்வநீங்கல்.—அதாவது அதின் குறுக்கு அல்லது வளைவு இடம் மாறி எதிராக ருவதால், அதின் வெளிஉட்டுமுன்புறம் பிதுங்கித் ததாங்கித்தாமதப்பிரசவத்திற்குக்காரணமாகும். உதடு சுவின்தலைக்கும் மேகன் எலும்புக்கும் இடையில் அ ரப்பட்டு நெருக்குவதால் விடிகி பிரசவம் வேகத்தைத் மதிக்கப்பண்ணும்.

நீர்வகித்தல்.—நோய்காணும்போது மர்மஸ்தான உதட்டை சிசுவின் தலைக்குமேல் மெதுவாகத்தள்ளி தலை பிரங்கும்வகையில் அதை அங்கேயே வைத்திருக்கவேண்டும்.

(7) கருப்பவாயுயின் சேட்டையும் மனோவியாதலும் கவலையும்.—கருப்பவலியுள்ள ஸ்திரீகளும் பயஸ்தரான ஸ்திரீகளும் காப்புக்கடைசிகாலத்தில் அதிகபயமுறும் கவலையுக்கொள்ளுகிறார்கள். உடம்பில் அவ்விதபயத்தின் தாக்கம் பிரசவம்வகாக்கும் இருக்கும். மனக்கவலையானது நோயைத்தடுப்பதால் பிரசவத்தை தாமதப்படுத்தும்.

பரிசீப்பு அல்லது சிகிச்சை.—நோயாளியை அமரிக் கையாகவும் சந்தோஷமாகவும் வைக்கவேண்டியது. மலத்தைக்கழியப்பண்ணும் எதையேனும் பிச்சுக்குழலால் ஆசனத்துள் செலுத்தவேண்டியது. கர்ப்பாசய வாய் நன்றாய் அகண்டவுடன் பனிக்குடத்தை உடையச் செய்து வயிற்றை இறுக்கிக்கட்டவேண்டியது. கொஞ்சம் கிராக்ஷ இரசம் (ஒயின்) அல்லது பிரார்தி கொடுப்பது அவசியமாய் இருக்கலாம். சில வேளைகளில் பிரசவத்திற்கு உதவியாக சிசுவைத் திருப்புவது அவசியமாகும்.

(8) மலக்குடலும் மூத்திரப்பையுள் சுணங்கொண்டிருப்பது பிரசவத்தை நீடிக்கச் செய்வதற்குரிய ஒர் சாதாரணகாரணமாம். மலத்தினால் நிறைந்து மலக்குடல் இறுகின் சிசுவின் தலை வெளியாவதற்கு தடையாகிருக்கும். ஆதலால் சோப்பும் (saler) தண்ணீரும் அல்லது தண்ணீரும் சிற்றமணக்கொணையும் சேர்த்து பிச்சுக்குழலால் ஆசனத்திற்குள் செலுத்தி மலக்குடலை சுத்திசெய்யவேண்டியது. மூத்திரப்பை உப்பியிருந்தால் கர்ப்பாசயச்செய்கை கடைப்படும். மூத்திரப்பையில் மூத்திரக்குழலைச் செலுத்தி அதை வெறுமையாக்கினால் அந்தத்தடை நீங்கும்.

(b) (சிக் வெளியாதும்) வழிகளின் கடினத்தன்மை.—

(1) கர்ப்பாசயக்கழுத்தானது கடினமாயிருப்பதால் பிரசவமுதற்பாதத்தில் தடையுண்டாவது அதிக சாதாரணமாம். அதுபக்குவமாவதற்குமுன் பனிக்குடம் உடைவதாலும், பனிக்குடத்திற்குப்பதிலாய் தலைகெட்டியாக கர்ப்பாசயக்கழுத்தை நெருக்குவதால் அதிவீங்கி சிக்கிரம் இலகுவாகாவிட்டால் அதினால் பயங்கரமான காரியங்களுண்டாகும். சிசு வெளிப்படும்பொருதையின் காரணியத்துக்குச் சிலருக்கிருக்கின்ற தேகக்கூறே காரணமாயிருக்கின்றது. எப்படியெனில் அதிகவலிவான தேகத்தையுடையவர்களுக்கு நோய் அதிகமாய் உறுத்து தேகத்தையுடையவர்களுக்கு நோய் அதிகமாய் உறுத்துவதால் அதை அவர்கள் தாமதமாட்டார்கள். இது கர்ப்பாசயச்செய்கைக்கு இடையூறாகும். இப்போர்ப்பட்டவர்களது நோவின் கொடுமை அவர்களுக்கு மனவேதனையை யுண்டெண்ணும்; இந்த நோய் தன்மைமில் சிறுவலிப்புபோலிருந்து மெல்லியதாயும் சிசுவின் தலை மேல் இறுக்கமாய்ப்பிடித்துக்கொண்டுமிருக்கும் கர்ப்பாசயக்கழுத்தை விரியப்பண்ணுவதற்கு அனுகூலமானதாயிராது. பனிநீர்க்குடம் உடைவதால்வரும் அவ்வளவானமோசம், அது உடையாதிருந்தால் உண்டாகமாட்டாது. ஆனால் தாய்க்காவது பிள்ளைக்காவது அதிகமோசமுண்டாகாமல் பிரசவம் வெகுநேரம் நீடிக்கவுண்டுகூடும்.

பரிசீப்பு.—பனிநீர்க்குடம் உடையாதிருக்கின்ற இவ்வகையான அநேக பிரசவங்களின் கஷ்டத்தை சற்று நேரமாகப் பொறுமையாய்ப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தால் அது தானாய் நீங்கிவிடும். ஸ்திரீ இளைப்புற்றுத் தூக்கம் இல்லாதவளுமாயிருந்தால் 20 அல்லது 30 துளி ஆபின் கிராவகம் (laudanum) அவளுக்கு இளைப்பாற்றிக்கொடுத்துக் கர்ப்பவரையை மெதுவாக்கி ஸ்திரீ விழித்தவுடனே ஒருவேளை பிரசவம் கிராமமாயும் நடக்கும். சிலவேளைகளில் இப்படிச்செய்வது பிரயோஜனப்படா

விட்டால் வெதுவெதுப்பான நீரை ஹிஸ்சன் பீச் சங்குமலால் உள்ளே செலுத்தவேண்டும்.

முந்திய பிரசவங்களில் கர்ப்பாசயக்கழுத்துகிழிந்ததால் அல்லது அதில் புண்ணுண்டாயிருந்ததால் அதின் சதையில் உண்டான மாறுதல் இத்தகடினத்தன்மைக்கு காரணமாயிருந்ததாய்ச் சில பிரசவங்களில் காணப்பட்டிருக்கின்றது. சில பிரசவங்களில் அழற்சியாலுண்டான வீக்கத்தினால் கர்ப்பாசயவாய் அடைபட்டு கர்ப்பாசயவாய் இருக்கும் இடத்தில் ஒருவிதப் பள்ளம் மாத்திரம் கென்படும். சில சமயங்களில் கர்ப்பாசயவாயை ஒரு வித மெல்லிய ஜவ்வமுடியிருக்கும். அது பரிசோதிக்கும் விரல்கள் படச் சீக்கிரங்கிழிந்துபோகும். இவ்வித எலலாச்சமயங்களிலும் (ப்ரான்ஸ் பாக்) என்ற பைக்ளால் அவ்வாயை விரியச் செய்து, வேண்டியதானால் உதவியாக அளேககேரல்களைக் கீறியும்விடலாம்.

(2). யோனியின்கடினத்தன்மை.—இது சாதாரணமாய் யோனித்துவாரஞ் சுருங்கியிருந்தலாலும் அல்லது சிள்ளையிருப்பதாலும் அல்லது புண்ணுண்டான காயவடுவினால் அது சுருங்கிப்போவதாலும் உண்டாகும்.

பரிசிப்பு.—வெதுவெதுப்பான ஜலத்தை மாத்திரம் உள்ளே பாய்ச்சி (ப்ரான்ஸ்பாக்) பைக்ளால் விரியச் செய்து போதுமானது. சில பிரசவங்களில் அளேககேரல்தேவையாகும்.

(3) விடபக்கடினமும் அல்குலின்கடினமும் முதலிய பிரசவத்தில் வழக்கமாயுண்டாகின்றன. சில வேளைகளில் இவை முந்திய பிரசவங்களிலுண்டாயிருந்த கரங்களின் வடுக்கள் நிமித்தம் உண்டாவதாகவுங் காணப்படுகின்றன. விடபஞ்சிலவேளைகளில் ஆசனத்தாரம்வனாக்கும் கிழிபடும். அல்லது அதின்மத்தியில் நிவண்டாகி அதன்வழியாய் சிசு வெளியே தள்ளப்படுமுண்டு. நோய் பலமாயிருந்தால் அபிவித்தி

வகம் தேவையாகும். விடபத்திற்கு சுஜெல ஒத்திடம் பிரயோஜனமாயிருக்கும். நோய் உண்டாகையில் விடபத்தை கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் விசாலமாக்கும்படி ஸ்திரீயை நோய்வரும்போது கூவி அழும்படி சொல்லவேண்டும். அதேசமயத்தில் தலையானது சடுதியாகப் புறம்பாக்காதபடி தடுக்கப்படவேண்டும். விடபம் கிழியும்போது கூடுமான சீக்கிரத்தில் அதை தைத்துவிடுவது நல்லயோசனை.

சில சமயங்களில் யோனியின் பெரும் உதடு அதிகமாய் வீங்கி நீர்கொண்டிருக்கும். இந்த ஸ்திதி சாதாரணமாய் கால்அதைப்போடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். அப்போது அந்த பாகங்களை ஊசியால்குத்தி நீராவெளியிடுவதால் உபாதை நிவர்த்தியாகும். கர்ப்பினி அசையாமல் படுக்கையில் இருப்பதும் அவசியம்.

சில பிரசவங்களில் தலை உதித்தபிறகு கர்ப்பாசயவாய் சிசுவின் கழுத்தில்சுருங்க, பிரசவநாமதம் உண்டாகும். மருத்துவம்தெரிந்த வைத்தியர் கிட்ட இல்லாவிட்டாலும், சிசுவுக்கு மூச்சுகிணரும் ஜாடைதோற்றினாலும், உடனே சிசுவை இழுத்து வெளிப்படுத்தவேண்டியது.

(c) வேறு காரணங்கள்.—சுவாசப்பை அழற்சி இருமல் அல்லது வேறுவகை மாப்பு சம்பந்த வியாதிகளால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிக்கு பிரசவம் உண்டாகுமாயில் அது தாமதப்படக்கூடியது. ஏனெனில் அவன் பெருமூச்சு விடவும் சாதாரணமாய்ச்செய்வதுபோல் மூச்சுப் பிடித்து கர்ப்பாசயத்தின் செய்கையை உதவிசெய்ய முக்கவுங்கடாமலிருக்கும். அதினால் கர்ப்பாசயம் தன் வேலையைத் தானேசெய்யநேரிடுவதால் பிரசவம் ஆவசியமாய் ஆகும். ஈத்தர் அம்மோனியா (æther and ammonia) வென்ற மருந்துகளை அடிக்கடி கொடுப்பது அவசியமாயிருக்கும்.

பதால் அடிவயிறு சாதாரணமாய் அதிகமாய்ப் பெருங்கி நிற்கும். பிழைகளையும் தட்டையாயிருந்தால் அப்போது அது கூபகவெளியின் குறுக்களவைநருக்கும். இதுவும் பிரசவந் தாமதப்படுவதற்கு ஒரு காரணமாகின்றது. பிழைகளையும் புட்ட எலும்புஞ்சேரும் பொருத்து சிலவேளைகளில்பலத்து. போதிய அளவு அசைவு கொட்டாமலிருக்கிறதுமுண்டு. அதைச்செவின தலை அழுக்குவதால் பின்னாகத் தள்ளப்படமாட்டாது. அதனால் பிரசவம் வருத்தத்தை யுண்டாக்கும். ஆனால் பிப்படி யந்தபொருத்து பலத்திருப்பது அருகும். காப்பாசயக்கழுத்து யோனித்துவாரம், விடபம் இவை கடினப்பட்டு பிரசவத்தைப் பிரயாசமுள்ளதாக்கும். இச்சமயம் ஆயுதபிரயோகத்தால் பிரசவத்தை அரிதப்படுத்தவேண்டியதாகும்.

இரத்தக்கட்டியும் யோனிமார்க்கமாய் தலைசெல்லத் தட்டையாயிருக்கும். இரத்தக்கட்டியானது இரத்தம் பிழைப்பதினாலே உண்டாகும். அது சாதாரணமாய் யோனித்துவாரப் பக்கங்களிலாவது அல்லது யோனி உதட்டிலாவது கூட உண்டாகும். நரம்பு வெடிப்பதால்வரும் உதிரம் பெரியளிக்கம்போல் அல்லது கட்டிபோல் உருப்படும்வகைக்கும் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்ச் சேர்ந்துகொள்ளும்.

தாயைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதற்காய் அல்லது பின்னையைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதற்காய் ஆயுதப்பிரயோகம் அவசியம்செய்யத்தக்கதாய் “கர்ப்பாசய அசைவினமை” சிலசமயங்களில் அடிக்கடிபுண்டாகும்.

தலை உதயமாகும் பிரசவத்தில் தம்மதம் இரண்டினதமாய் உண்டாகும்; ஒன்று கர்ப்பாசயபலவீனத்தினாலே தலைசமமா மின்றுகொள்ளுதல்; மற்றொன்று கூபகமும் தலையும் அளவிலே ஒன்றுக்கொன்று சரிப்பதாதால் தலைகிலையாவது கூபகத்தை நெருக்கிக்கொண்டிருத்தல். ஒவ்வொரு நிலைக்கும் அதற்குரிய

வித்தியாசமான அடையாளங்களிருப்பதால், தருந்த நேரத்தில் உதவியைப்பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாயிருக்கும்படி, நாதி அவ்வடையாளங்களை நன்றாய்நிற்குக்கவேண்டும். தலைதட்டுப்பட்டால் ஒருநேரத்தில் தலை கொஞ்சம் முன்னுக்குவந்து அடுத்தநேரம் வராமுன் அது உள்நுக்குப்போய்விடும். மேகனப்பொருத்திற்கும் தலைக்கும் மத்தியில் விரல்செல்ல இடமுண்டாகும். பித்திகை எலும்புகள் ஒன்றின்மேல் ஒன்று ஏறியிருக்க மாட்டாது. ஒருகாதுதென்படும் - உச்சியின்கட்டிபெரியதாக இராது. யோனித்துவாரம் குளிர்ச்சியாயும், சரமாகவும் இருக்கும். நீர் தராளமாயிராகும். ஸ்திரீ இளைப்பேல்லாமலும் கவலைகொள்ளாமலும் மிருப்பாள். தலை கூபகத்தில் இறுக்கமாய் பின்னேக்கியாவதுபோதால் அது முன்னேக்கியாவது பின்னேக்கியாவதுபோதாமல் ஒரேயிடத்திலிருக்கும். தலைக்கும் மேகனப்பொருத்திற்கும் மத்தியில் விரல்செல்லாது. காதும் தென்ப டாது. பித்திகை எலும்புகள் அதிகமாய் ஒன்றின்மேல் ஒன்று ஏறியிருக்கும். உச்சியில் உண்டாகும்கட்டி பெரியதாக இருக்கும். யோனித்துவாரம் உஷ்ணமாகவும் லறண்டும் விங்கியுமிருக்கும் - கர்ப்பாசயமானது விடாமல் சுருங்கிக்கொண்டிருக்கும். நாடி நடையும் தேக அளவும் அதிகமாகும். ஸ்திரீயானவள் விழிப்பு என்னவாய் ஆறுதலற்று இளைப்படைந்தபோவாள். இந்த நிலைமையில் இப்படியே விட்டுவிட்டால் அதிக அபாயமுண்டாகும்; குமட்டலும் வாந்தியும் உண்டாகும். நாக்கில் மாவுபடியும். அகுவறண்டுசெங்கல் மங்கலாய் அல்லது கபிலநிறமாயிருக்கும். நாடிநடையும் தேக அளவும் அதிகமாகும். சாவுக்கு முந்தி மெதுவாய் வாய்க்குமுறுதலும் புறப்பேச்சும் சாதாரணமாய் உண்டாகும்.

13 - ம் அதிகாரம்.

III. கிரமாதீத பிரசவம்.

PRETERNATURAL LABOUR.
(பிரிட்டர்நாட்சரல் லேபர்.)

விவரம்.—இந்தப் பிரசவத்தில் சிசுவினுடைய அங்கத்தின் எந்தப் பாகமாவது, அல்லது, கையாவது காலாவது உதயமாகும் - இந்தப்பிரிவில் மூன்று வகுப்புகளுண்டு: (a) கவிழ்ந்த பிரசவம் - இதில் சிசுவின் இடுப்பாவது, புட்டமாவது, காலாவது உதயமாகும்; (b) குறுக்கான பிரசவம் - இதில் சிசுவின் கையாவது, அங்கத்தின் வேறெந்தப் பகுதியாவது உதயமாகும்; (c) தொந்தப்பிரசவம் - இதில் சிசுவின் இரண்டொரு பாகங்கள் ஒரே முறையில் உதயமாகும்.

(a) கவிழ்ந்த பிரசவம்.—இந்த தலைப்பின்கீழ் இப்பு, புட்டம், முழங்கால், கால் உதயங்கள் தொகுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. புட்ட உதயங்கள் அநேகங்களில், பிரசவவேதனை காலத்துக்குமுன் ஆம்பிக்கும் - ஆகையால் பிரசவத்தளவில் பிரயாசைகொஞ்சமாயிருக்கும். தலையல்லது முக உதயங்களைப் பார்க்கிலும், கவிழ்ந்த உதயத்தில் சிசுவுக்கு அதிக அபாயமுண்டாகும். அதற்குக் காரணங்கள்:—(1) சிசுவின் உடம்பு கூபகத்துக்கூடாகச் செல்லுகையில், நாபிக் கொடி நசுங்க அல்லது நெருக்குண்ணை எதுவாகும்—இது சிசுவின் உதிர ஓட்டத்தைத் தடுப்பதால் சிசு மரிக்கவேண்டி நேரிடல்; (2) மாயை அல்லது நஞ்சு சிசுவின் தலையால் ஒருவேளை நசுங்குண்ணை நேரிட்டால், அதில் இரத்த ஓட்டம் மின்றுவிடுதல்; (3) இந்த உதயத்தில், தலையத்திற் சம்பவிப்பதுபோல, கூபக மேல்வெளியை உதயமாகும் பாகம் முழுதும் கீரப்பக்கூடாத்தால், பனி முழுதும் வெளியே ஓட, பிரசவவேதனை சாதாரணமாக

மாய் நீடிப்பதால், காப்பாசயங் குழந்தையின்மேல் பல மாய்ச் சுருங்கும்போது அது இறந்துபோகக்கூடியதாயிருத்தல்.

புட்ட உதயம்.—(ப்ரீசு பிரசண்டேஷன்) இது கவிழ்ந்த பிரசவத்தின் மற்ற உதயங்களைப் பார்க்க அதிக சாதாரணமாக யுண்டாவதால், அக்கவிழ்ந்த பிரசவத்தின் குறியாய் எண்ணப்படுகின்றது. புட்டம் தலையைப் போல நாலாவகை நிலைகளில் உதயமாகும். உச்சிபுதத்தில் பிடரி எங்கே காணப்படவேண்டுமோ அந்த இடம், இப்பொழுது பீடிகையென்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டால், மற்ற மாறுதல்களை இலேசாய் கீர்த்துக்கொள்ளலாம்.

முதல்தலை, அல்லது வலதுபுறமாய்ச் சாய்ந்த முதல்தலையிருப்பது.—குழந்தையின் பீடிகை யெலும்பு தாயின் இடது கம்சத்திற்கு (acetabulum) நேராகவும், மேகன் எலும்பு இடது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்தம் எதிராகவும் இருக்கும். இடுப்பின் குறுக்களவாது கூபகத்தின் இடது சாய்ந்த குறுக்களவாயிருக்கும்.

இடதுபுறமாய்ச் சாய்ந்த முதல்தலையிருப்பது.—குழந்தையின் பீடிகை யெலும்பு எலும்பு கம்சத்திற்குப் பின்னும், மேகன் எலும்பு இடது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலுமிருக்கும். இடுப்பெலும்புகள் வலது சாய்ந்த குறுக்களவினிருக்கும்.

முற்றந்தலை அல்லது வலதுபுறமாய்ச் சாய்ந்த முதல்தலையிருப்பது.—இதில் குழந்தையின் பீடிகை, எலும்பு வலது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலும், மேகன் எலும்பு இடது கம்சத்தின் எதிரிலும் இருக்கும்.

தான்காந்தலை அல்லது இடதுபுறமாய்ச் சாய்ந்த முதல்தலையிருப்பது.—இதில் குழந்தையின் பீடிகை

இடது பீடிகையின் பொருத்திலும், மேகனம் வலது கம் சத்தின் எதிரிலுமிருக்கும். இடுப்பெலும்புகள் வலது சாய்ந்த குறுக்களவாக இருக்கும். உச்சி நிலைகளைப் போலவே முதலாம் - மூன்றாம் - நிலைகள் மிகவுஞ் சாதாரணமானவைகள்.

பிரசவத்தீரம் - முதல்தலை.—குழந்தையினது கூபகத்தின் பீடிகையிலிருந்து மேகன எலும்பின் குறுக்களவுதலின் கூபகத்தின் வலது சாய்ந்த குறுக்களவில் இருக்கும். பீடிகை யெலும்பு இடது கம்சத்தின் பின்புறமாவும், மேகன எலும்பு வலது பீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்துக் கெதிராகவுமிருக்கும். இடுப்பெலும்புகள் இடது சாய்ந்த குறுக்களவிலிருக்கும். எதிரான. எலும்பு-அதாவது-இடது இடுப்பெலும்பு கூபகத்தின் அடியிலிருக்கும். விரலாத் பரிசோதித்தால் இடது ஆசன எலும்பின் மேடு விரலுக்குக் கென்படும். இடுப்பெலும்பின் மத்தியிலுள்ள பள்ளமானது வலது சாய்ந்த குறுக்களவாக ஓடும். அதின் எதிரிலிருந்து பின்புறபுச்சமும், ஆசனமும், ஜனன உறுப்புகளும் தென்படுபிரசவ கோய் அதிகப்பட்டு வர வர, சிசு இரங்கத்தொடங்கும். அந்தகோம் இடுப்பு கூபகத்தின் தளத்தவந்து பொறுத்துநிற்கவே, சுழற்சியுண்டாகும். வலது கம்சத்திலிருந்து இடுப்பு எதிராகச்செல்லும், அதோரம் வலது இடுப்பு பீடிகையின் பள்ளத்திற்கு பின்னு செல்லும். இப்பொழுது இடது இடுப்பு மேகன வலது வின்னீழ் உறுதிபாய் கிலைகொள்ள, உச்சி உதயத்தி விசாலிப்புண்டாகிறதுபோல, விசாலிக்குத் தன் னையுண்டாகும். அவசயமாவிருக்கின்ற இடது இடுப்பை வலது இடுப்புசுற்றி, விடபத்தை வர வர விசாலிக்கப் பண்ணி, தான் முதல் வெளியே தள்ளப்படும். அந்தகோ இடது இடுப்பு சீக்கிரம் அதைப் பின்புறொடர்ந்து வெளிப்படும். சிசுவின் வயிற்றின்மேல் கால்கள் முழுதும் நீட்டப்பட்டிருக்கிறதால், இடுப்புகள் வெளிப்படாமலாகவும் நழுவி வெளிப்படும்.

இப்பொழுது கூபக்கூழியிலிருக்குஞ் சிசுவின் கெஞ்சு இரங்கும்பொழுது, புஜங்கள் கூபகத்தின் இடது சாய்ந்த குறுக்கனவுக்கூடாய்வரும். புஜம் மேகனவளைவின் பின்னால் நின்று சுழன்று அந்த வளைவில்வரவே ஒரோ நிலையாய் சிற்கும். அந்நேரம் வலதுபுஜம் விடபத்தைத் துடைத்தக்கொண்டு முதலாக வெளியில்வரும் - சிசுவின் கைகள் சாதாரணமாய் அதின் நெஞ்சில் அமர்ந்திருக்கும். இவைகள் புஜங்கள் வெளியில்வருமுன்னே உதயமாகிவிடும். சிலவேளைகளில் கைகள் தலைப்பக்கமாய் நீட்டப்பட்டிருக்கும். பிரசவநோய் இல்லாதவேளையில் குழந்தையை இழுத்தெடுக்கப் பிரயாசப்படுவதால் இவ்விதங் கைகள் நீட்டப்பட்டிருக்கும்; ஏனென்றால், இயல்பா யுண்டாகும் பிரசவநோயால் பிரசவம் முழுதும் நடத்தேறும்வேளைகளில் இப்படி நீட்டப்பட்டதாகக் காணப்படுவது மிகவும் அருமை. என்கள் தலைப்பக்கமாய் நீட்டப்பட்டிருப்பது அபாயத்திக்கொண்டிருக்கும். ஏனெனில் இது தலை உதயம் பண்ணுவதைத் தாமதப்படுத்தும்.

புஜங்கள் புறவெளியாகிய கீழ்வெளிக்கூடாய்ச்செல்லும்போது, தலை கூப்பத்தின் வலதுசாய்ந்த பூக்கள் வாக, பிடரி இடதுகம்சத்திலும், முகம் வலதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்தைப்பார்த்தாற்போலும், துழையும். அந்நேரம் ஒரு சுழற்சியுண்டாகும்; எப்படியெனில், பிடரி எதிராகவும் மேகனவளைவுக்கு வலதுபுறமாகவுஞ்செல்ல, முகம் பீடிகை எலும்பின் பள்ளத்திற்கு பின்னாகத்திரும்பும். இப்பொழுது பிடரி மேகனவளைவுக்குக் கீழாக ஒரோரிடையிலேயே, வாய், மூக்கு, நெற்றி, உச்சி இவைகள் பீடிகையின்பள்ளத்தையும் விடப்பத்தையுந் தடைத்துக்கொண்டு ஒன்றின்பின்னொன்றாய் வெளிப்பட, தலை யிவைகள் பின்னாற்செல்லும். தலை கர்ப்பாசயக்குழியிலிருந்தால் கர்ப்பாசயத்தின் தாக்கத்தை நஞ்சவழியாய்மாத் திரம் பெறக்கூடியதாயிருக்கும்மாயால், அப்படியான தருணங்களில் தலை யுதய

மாக கர்ப்பாசயத்தாக்கம் போதாதகால் சாதாரணமாப் பத் தாமதமுண்டாகின்றது.

இரண்டாம்நிலை அல்லது இடதுபுறமாகச் சாய்ந்த முதுகு எதிராயிருப்பது.—குழந்தையின் கூபகபீடிகை இடுப்பெலும்பின் குறுக்களவு, இடதுசாய்ந்த குறுக்களவாகவும், பீடிகையெலும்பு வலதுகம்சத்திற்குப்பின்னும், மேகனம் இடதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலுமிருக்கும். இப்பொழுது இடுப்பு வலதுசாய்ந்த குறுக்களவாக இருக்கும். வலது ஆசன எலும்பின்மேலே மிக அடியிலிருக்கும். சுழற்சி இடதுபுறம்மின்று வலதுபுறமாயுண்டாகும். அப்பொழுது இடுப்பின் இடதுபுறம் விடப்பத்தைத் துடைத்துக்கொண்டு முதன்முதல் உதிக்கும். குழந்தையின்வயிறு தாயின் இடதுதொடைக்கெதிராக இருக்கும். புஜங்கள் வலதுசாய்ந்த குறுக்களவாக நுழைந்து இடுப்பைப்போலவே சுழலும். பிரிவலதுகம்சத்தின் பின்னாலிருக்கத்தக்கதாய், தலை இடதுசாய்ந்த குறுக்களவிலேசென்று, மேகனவளைவுக் கெதிற்சுழன்று, முதல்நிலையிற் பிறப்பதுபோலவேபிறக்கும்.

மூன்றாம்நிலை அல்லது வலதுசாய்ந்த முதுகு எதிராயிருப்பது.—இதில் குழந்தையின் கூபகத்தின் பீடிகைமேகனக்குறுக்களவு, தாயின் பீடிகை இடுப்பெலும்புப்பொருத்துக்கெதிராகவும், மேகனம் இடதுகம்சத்தின் பின்னாலுமிருக்கத்தக்கதாய் வலதுசாய்ந்த குறுக்களவிலிருக்கும், வலது இடுப்பு பீழையிருக்கும். சுழற்சியுண்டானபிறகு, இடது இடுப்பு விடப்பத்தைத்துடைத்துக் கொண்டு முதல்பிறக்கும். புஜங்கள் அந்தவழியையேதொழும். பிடரி வலதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின் பொருத்திலும், முகம் இடதுகம்சத்திலும் இருக்கத்தக்கதாய் தலை யெப்பொழுதும் வலப்புறமாய்ச்சாய்ந்த குறுக்களவில் னுழையும். பிடரி எதிராய்ச் சென்று மேகனவளைவுக்குள் னுழைவ

தால், உச்சியுதயத்தின் மூன்றாம்நிலையிற் சம்பவிப்பதுபோல, ஒருவிட்டத்தின் மூன்றிலொருபங்களுக்கு ஒரு சுழற்சியுண்டாகி, அதன்பின் தலையுதயமாகும். சில வேளைகளில் அங்கத்தின் சுழற்சிவழக்கத்திற்கு அதிகமாயுண்டாகும். அப்பொழுது பிடரி வலதுகம்சத்திலிருக்கத்தக்கதாய் தலை இடதுசாய்ந்த குறுக்களவாய் கூபகத்தில் னுழையும்.

நான்காம்நிலை, அல்லது, இடதுசாய்ந்தமுதுகு பின்னாயிருப்பது.—குழந்தையின் கூபகத்தின்முன்பின்னான குறுக்களவு இடதுசாய்ந்த குறுக்களவிலும், பீடிகை இடதுபீடிகை இடுப்பெலும்பின்பொருத்துக்கெதிராகவும், மேகனம் வலதுகம்சத்தின் எதிராகவுமிருக்கும். இடுப்புகள் வலதுசாய்ந்த குறுக்களவாக இருக்கும். இடதுபுற இடுப்பு கீழாக இருக்கும். சுழற்சியுண்டானபின் வலது இடுப்பு விடப்பத்தைத் துடைத்துக்கொண்டு முதல்பிறக்கும். புஜங்கள் அந்தக்குறுக்களவிலேயேசென்று அந்தவழியையே பின்பற்றும். பிடரி பின்னாக இருக்கத்தக்கதாய் தலை வழக்கமாய் இடதுசாய்ந்த குறுக்களவாக கூபகத்துக்குள் னுழையும். இடதுபுற வலதுபுறமாய்ச் சுழற்சியுண்டானவுடன் மற்றும் நிலைகளில் பிறப்பதுபோலத் தலைபிறக்கும். சிற்சிலவேளைகளில் பிடரி பின்னாலிருக்கத் தலை வலதுகுறுக்களவுக்குள் செல்லுவதுமுண்டு.

விசேஷ உதய அறிதிறிகள் (Diagnosis).—புட்டம்தவிர சிசுவின் வேமெந்தப்பகுதியும் முகமென்று பிரமிக்க எதுவாயிராது. புட்டமென்று அறிந்துகொள்ளுவதற்கு விகற்பித்துக்காட்டுகின்றநாலு அம்சங்களுண்டு. அவையாவெனில், பீடிகை - இதுதன்னைத் தனது கரடுமுரடான முள்ளுகளைப்போலொத்த பொருட்டுகளாற் காட்டும். ஆசனத்துவாரம் - இது சுருங்கியிருப்பதாலும், வாயிற்காணப்படும் நாக்கும் உரப்பான ஈறும் இதற்கு இல்லாதிருப்பதாலும் இதை யறிந்துகொள்ள

லாம். ஆசன எலும்பின் தடிப்பும், ஜனன உறுப்புக்
களும் இலேசாய் ஸ்பரிசித்தநிற்குகொள்ளக்கூடியவை.

சிசுவின் இரத்தாசயத்துடிப்பு நாபிக்கொடியிருக்கும்
மட்டத்தில் அல்லது அதற்குமேலாகக்கேட்கும் மெனி
வான தேகத்தையுடைய பெண்களில் சிசுவின் உரப்பா
னதலை கர்ப்பாசயத்தின் அடியில் இருக்கிறதாய் ஸ்பரிசி
த்தறியலாம். புட்டத்தைப்புஜமென்று தப்பிதமாயெ
ண்ணநேரும். புட்டம் புஜத்தைப்பார்க்கப்பெரிதும்
வட்டமானதாயிருப்பதாலும், விரலை மேலாகக்கொ
ண்டுபோனால், இடுப்பின் அமைடிப்பு தென்படுவதா
லும் புயமல்லவென்றறியலாம். பரிசோதனைபண்ணும்
விரல்கள் சாதாரணமாய்ச் சிசுவின் காட்மெலத்தால்
அசுசிப்படுவதுண்டு.

பரிசீலிக்கும்வகை.—கவிழ்ந்த பிரசவங்களில் பரிகரித்
தும்வித மெப்படியெனில் - வழிகளை விசாலமாகப்பண்
னுவதற்காயும், இரண்டாம்பாதத்தைத் தீவரிக்கப்பண்
னுவதற்காயும், முதற்பாதத்தைத்தாமதப்படுத்துவதே,
கூடியமட்டும் பனிநீர்க்குடம் உடைபட்டாமலிருக்கப் பா
ர்க்கவேண்டும். பனிநீர்க்குடம் தற்செயலாய் உடைந்து
போகாதபடிக்கும், சிசுவின் ஜனனஉறுப்புகள் உறு
ய்ந்து வீங்காதபடிக்கும், அடிக்கடி பரிசோதனைபண்
ணப்படாது. கூபகம் உதயமாகுமென்று ஒருமுறை
நிதானித்துக்கொண்டதன்பின் புட்டம் உதயமாகும்
வரையில் ஒன்றுஞ்செய்யப்படாது. புட்டம் உதயமா
கும்பொழுது அதைக்கையிலேந்தித் தாங்கிக்கொள்ள
வேண்டும். விடபம் இப்பொழுது தள்ளிக்கொண்டிரு
ப்பதால், முழங்கால்கள் அல்லது கால்கள் சடுதியாய்வெ
ளியில் தள்ளப்பட்டால், விடபங்கிழிபடக்கூடும். இப்
படிச் சம்பவிக்காதபடிக்குப் புட்டம் உதயமானவுடன்
கூபகத்துக்குமேலாய் முதுகை வலதுகையால் பற்றிப்பி
டித்துக்கொண்டு, விடபத்துக்குஞ் சிசுவின் அங்கங்களுக்
கும் இடையில் இடதுகையைச்செலுத்தி, மெதுவாய் அ

ங்கங்களை வலதுகையில் பிரித்துக்கொண்டெவரவேண்டும்.
குழந்தையானது நாபிவரைக்கும் வெளிகண்டுவிட்டிரு
ப்பதால், அதற்கு அபாயங்களும் இனி ஆரம்பிக்கும்.
எனெனில், இப்போது அதின் சரீரத்திற்கும் கூபகமுக
ட்டிற்கும் நடுவில் நாபிக்கொடியிடுகி நகங்குண்ண ஆஸ்
பதியிருப்பதாலென்க. இந்த அபாயத்தைக் கூடியமட்
டுத்திடுப்பதற்கு நாபிக்கொடியின் ஓர்முழலை கீழ்க்கிழு
த்து, கூபகத்தில் எங்கே இடமிருக்குமோ அங்கே-அந்
வது - சாதாரணமாய் இடம் விசாலமாயிருக்கும் வலது
அல்லது இடதுபீடிகையிடுப்பெலும்புக்குளதிரில்-அதை
க்கொண்டுபோகவேண்டும். நாபிக்கொடி தாழ்விருப்ப
தால், அதின் நாடித்துடிப்பை நீ நிதானித்துப்பார்க்கக்
கூடியவளாவாய். இதுடன், நாபியின்மேல் அக்கொடி
உறைய்ந்துகொண்டுபோகாமலும் தடுக்கப்படும். மே
லும், ஒரு உதவியாள் கர்ப்பாசயத்தின்மேல் அழுக்கின
வண்ணமாயிருக்கவேண்டும். இப்படிச்செய்வதால் சிசு
வின்னகைகள் தப்பித்தவறி சிக்கிக்கொள்வதற்குறிய சந்த
ர்ப்பங்கள் குறைவுபடும். நாபிக்கொடியில் நாடித்துடி
ப்பு தாட்டியாயிருக்கையில், ஒன்றுஞ்செய்யாமல்விட்டு
விடவேண்டும்; எனெனில், அப்போது சிசுவிற்கு யா
தொரு அபாயமும் இல்லையென்று நமக்குத்தெரிந்திருப்
பதினாலென்க. ஆகிலும் காலதாமசம்செய்தால் நாடி
யின் அடித்துடிப்பு பலநீன்பட்டிப்போம். அப்போது
வைத்திய உதவி தேவையாகும். உன் ஒருகையின்பெ
ருவிரலுக்கும் மற்றவிரல்களுக்கும் நடுவில் சிசுவின்னகை
க்காலைப்பற்றி, இருகாலையும் பிடித்துக்கொண்டு, (அவ
சியமானால்) மற்றொருகையால் சிசுவின் உடம்பைப்பிடி
த்துக்கொண்டு, கூபகவிரிம்புக்குள் அதின்புஜங்களை
துழையச்செய்வதற்காக அதன் உடம்பை பக்குவமாய்
பின்னுக்கு இழுத்துக்கொள்ளலாம்.

அநேகபிரசவங்களில் இச்சமயத்தில் கைகள் தப்பித்
தவறி சிக்கிக்கொள்வதுமுண்டு. பிரசவ நிர்வகிப்பில்
பிரசவ இல்லாமற்போனபோதிலும், இப்படி நேரிடுவ

152

III. கிரமாதீத பிரசவம்.

துண்டு, இப்படி சிக்கிக்கொண்ட கைகளை விடுதலை செய்யவேண்டும். பீடிகையெலும்புண்டை இடம் விசாவமயிருப்பதால் முன்கையை முதலில் விடுவிக்கவேண்டும்: எப்படியெனில், தாயின் அடிவயிற்றின் முன்புறமாய் குழந்தையை பக்குவமாய் இழுத்து, பிறகு அதன் முதுகுபக்கமாய் கழுத்தெலும்புக்குமேல் விரல்களைச் செலுத்தி, தோள்முட்டியின் சாதாரண மடிப்பிருக்கும் குழந்தையின் முகத்திற்கு முன்புறமாய் அதின் கையை பக்குவமாய் அழுக்கித்தள்ளி, முழங்கைவளைவிற்குக்கீழ், விரல்களை நழுவிட்டு, அக்கையைக் கீழுக்கிழுத்து, அதின் முன்புஜத்தின் பக்கமாய் மறுபடியும் விரல்களைச் சருக்கிணற்போல் தளரவிட்டு, அஸ்தந்தை கீழ்க்கிரக்கிக்கொண்டுவா, பிறகு அல்குல்பக்கம் இருக்கும்கையை இதேபிரகாரம் விடுவிக்கவேண்டும். ஆனால், சிசுவின் உடம்பை பின்னுக்குக்கொண்டுவந்து, இடம் உண்டாக்கி சாத்தியப்பட்டவரைக்கும் அதின் கையைக்கீழுக்குக் கொண்டுவரவேண்டும்.

சிக்குண்ட கைகளை இவ்வாறு விடுதலைசெய்ததும், இச்சமயம் செயற்கை உதவி ஏற்குதையை எப்போதும் தேவையாகும். சிரோதயமாக மெத்ததாமசமாகும்பட்சத்தில், கிரசுக்கும் யோனிச்சுவர்களுக்கும் மத்தியில் நாபிக்கொடி சிக்கி நசுங்குண்டு சிசுமாய்ந்துபோகும். இது வெருவாய் நிச்சயமென்க. ஒரு உதவியுமின்றி தோள்கள் உதயமாய், நாபிக்கொடியின் நாடித்துடிப்பும் பலமாயிருக்கும்பட்சத்தில், நாம் சற்றுநிதானித்துப் பார்க்கலாம்; ஆனால், அதேசமயத்தில் காப்பாசயத்திற் மாத்திரம் விடாமல் அழுக்கிக்கொண்டிருக்கவேண்டும். ஆகிலும் சிசுவை “வெளிக்கிழுத்திடுதல்” அவசியமாகும். அது எப்படியென்னில், வலதுகை விரல்களை கழுத்துப் பிடரியில்மாட்டி, இடதுகையால் கணுக்கால்களைப் பிடித்துக்கொண்டு, இவ்விரண்டிக்கும் நடுவில் கைகுட்டையொன்றை வைத்து, கிரசு கருக்குழியில் நன்றாய் பிரவேசிக்குமளவும் குழந்தையை பக்குவ

மாய்ப்பு னுக்கு-அதாவது-கூபகவிளிம்பின் துருவத்திலு-இழுத்து, பிறகு முகமும் நெற்றியும் கூபகவிளிம்பை வழித்தாற்போல் போவதற்குக்கூடியதாய் கீழுக்கும் முன்னுக்கும் அதை இழுத்துவிடுவதுதான். இந்தச்சமயத்தில் காப்பாசயத்தின்மேல் பலமாய் அழுக்கல்வேண்டும்.

சிசுவானது வெருவாய் முச்சொடுங்கி பிறக்குமாதலால், அது பிறப்பதற்குமுதலே சுஜலமும் குளிர்ந்த ஜலமும் அப்படியே குழந்தையை உயிர்ப்பிக்கவல்ல மற்ற சாதனங்களையும் சமீபத்தில் எவ்வேளையிலும் சித்தமாய் வைத்திருக்கவேண்டும்.

மருத்துவச்சியானவள் வைத்திய (டாக்டர்) ஒருவரை அழைப்பிக்கவேண்டுமென்பதை காப்பினியின் பாகியஸ்தருக்கு கண்டிப்பாய்ச்சொல்லவேண்டும். அப்படி வைத்தியர் ஒருவரும் தடஸ்தமாய்க்கிடைக்காதபட்சத்தில்மாத்திரம், வைத்தியப்பொறுப்பைத்தான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கடவள்.

கூப்பா மன புட்டவதயம்.—இந்த “புட்டவதய” பிரசவத்திற் முக்கியமான நிலைகள் இரண்டு உண்டு. அவற்றுள் பிரசவம் தடைபட்டுகிற்கும், அல்லது பிரயாசகரமாகவிருக்கும். குழந்தையின் பாதங்களிருக்கும் நிலைக்குத்தக்கபடி இவ்வாறு ஆகின்றது. முதல்நிலையில் கால்கள் தொடைகளமீதும், பாதங்கள் ஆசனபீடிகையெலும்புக்கு அடுத்து விட்டத்திற்குச்சமீபத்திலும் அமர்ந்திருக்கின்றன. “புட்டவதய”த்தில் ஆப்பைப்போன்ற ஒருவருவம் காணும்: அதின் உச்சி சிசுவின் புட்டத்தையும், அதில் அடிப்பாகம் சிசுவின் மார்பு, தோள், புஜம், கலை, முதுங்கால்களையும் காட்டும். இந்த ஆப்பை உருமாய்த்தால், நாம் பிரசவகஷ்டத்தை வென்றுவிடலாம். சிசுவின் ஒருகாலே வெளிக்கிழுக்க, ஆப்பு உருவழியும். அல்குலுக்கு அடுத்திருக்கும் கால் எதுவோ அதையே கண்டிழுக்கவேண்டும். இரண்டாம்நிலையில்

சிசுவின் கால்கள் தாயின் அடிவயிற்றின்மீது படிந்திருக்கும். பாதங்களோ கர்ப்பாசய அடிப்புறத்தில் சிசுவின் தலைக்குச் சமீபத்திலிருக்கும். இந்த இரண்டாம் நிலையிலும் ஓர் ஆப்புருவங்காணும். அதின் உச்சியோ சிசுவின் புட்டத்திற்கும், அதின் அடிப்பாகம் சிசுவின் மார்பு, புஜம், கால், தலை - இவற்றிற்கும் - நேர் நேராக விருக்கும். இந்தப் பிரசவம் அழிகஷ்டமான ஓர் கிரியாவிசேஷந்தால் நிரவகிக்கப்படும். ஒரு பாதத்தைப்பற்றி யிழுக்க கைமுழுதும் செலுத்தவேண்டி யிருப்பதால் லென்க. இடதுகையை கர்ப்பாசயத்துக்குள் விட்டு குழந்தையின்பாதம் எட்டுகிறவனும் அதின் அடிவயிற்றின் பக்கமாய் உள்ளங்கையை செலுத்தி, அதேகாலத்தில் வலதுகையால் கர்ப்பாசய அடிவாரத்தை தாங்கிக் கொண்டு, பிறகு புறங்கால் (instep) மீது ஒரு விரலை மாட்டிக்கொள்ளவேண்டும். (முன்புறத்திலிருக்கும் பாதத்தான் இதற்கு மிகவுசிதமானது). கால் தொடைமீதும் டங்கும்படி பாதத்தைச் சாய்லாய் கீழுக்கு இழுக்கவேண்டும். பாதத்தைப்பிடித்து கர்ப்பாசயத்துக்கு வெளியே யிழுத்துவிடுவாயாக. இவ்விரண்டி கிரியாவிசேஷங்களிலும் “க்ளோறபாறம்” என்னும் மயக்கமருந்து கொடுக்கவேண்டியிருக்கும். கஷ்ட பிரசவமென்று கிரிந்தவுடன், வைத்திய (டாக்டர்) ரை அழைப்பிக்கவேண்டும்.

14 - ம் அதிகாரம்.

III. கிரமாதீத பிரசவம்—(தொடர்ச்சி).

PRETERNATURAL LABOUR.

(பிரிட்டர் நாட்சரால் லேபர்.)

முழங்கால் உதயங்களைத் துதிக்கால், புஜங்கள் அல்லது முழங்கை உதயங்களோடானது பிரமிக்க வினாவாகும். முழங்காலானது இரண்டு முட்டிகளும் மத்தியில் பள்ளமும் உடைத்தாயிருப்பதைக்கொண்டு தெரிந்துகொள்ளப்படும். (பின்னாகுதல் முழங்கால்சீப்பி உருப்படாமலிருப்பதால்) முட்டி ஒன்று பிராமல் இரண்டாயிருப்பதால் கணுக்கால் அல்லது முழங்கால்தானென்றும் தெரிந்துகொள்ளத்தக்கது. பின்னும் பரிசோதிக்கப்படும் பக்கங்களும், விரல்களும் தென்படுவதாலும் முழங்கால் அல்லவென்று அறியலாம். முழங்கை இரண்டுமூட்டுகளும் இவைகளின்மத்தியில் ஒரு மூட்டும் உடையதாய் திரண்ட முழங்காலுக்குத் திகியாசப்படும். புஜம் திரண்டும், பள்ளமில்லாமலும் இருக்கும். பரிசோதிக்கும்விரலை, இன்னும் சற்றுமேலே செலுத்தி அதை சுற்றி ஆராய்ந்தால், புஜத்தின் செட்டைப்புறமாய் முதுகெலும்பும், விலா எலும்புகளும் தென்படும். முழங்கால் உதயங்களில், நாபிக்கொடி வெளிகாணுதலுக்கு மெத்த இடமுண்டு. (சிசு பிரசவிக்கும்படியான) மார்க்கங்கள் அகல்மாகாமலும் உதயமாகும்பாகம் சரியானபடி நெருக்காததாலும், பிரசவகால இரண்டாம்பாதம் நாமதப்படுவதாலும், புட்ட உதயத்தைப் பார்க்கிலும் இதுகுழந்தைக்கு அனுகூலமட்டானது. இதை புட்ட உதயங்களைப்போலவே நிர்வகிக்கவேண்டியது. பிரசவகால முதல்பாதத்தைத் தாமசிக்கும்பொருட்டு பனிக்குடம் உடையாமலிருக்கப் பார்க்கவேண்டியது. கர்ப்பாசய வாயானது அகண்டபி

றகு பிரசவதாமதம் உண்டாகுமாகில், முழங்காலமடிப் பில் விரலிமாட்டி பின்னாக இருந்து புட்ட உதயங்களைப் போலவே பிறப்பிக்கவேண்டுமெ.

பாத உதயங்கள்—இவை புட்ட உதயத்தைப்பார்க்கக் குழந்தைக்கு மெத்த மோசமானவை, ஏனெனில் மெதுவாய்திறக்கும் கர்ப்பாசயவாய் போதுமான அளவு நெட்டித்தள்ளாமையாலும் சரியானகாலத்திற்கு முந்தி பனிக்குடம் உடைந்து தலை பிறப்பதில் தாமதத்தை உண்டாக்குவதினாலும்தான். இப்போது நாம் பலவினமாயிருக்கும். பிரசவம் நீடிக்கிறது. பாதமானது கையென்று தப்பிதமாய் என்ன எதுவாயிருக்கும். பின் வருவன பாதமென்பதற்கு குழந்தைகள் :—காலவிரல்கள் குட்டையாகவும், ஏறக்குறைய ஒரேநீளமாகவும், பாதத்தின்பேரில் மடக்கக்கூடாதவையாயிருக்கும். பாதத்தின் பெருவிரல் மற்றவிரல்களுடன் ஒரேவரிசையாக இருக்கும். பாதம் தடிப்பாகவும் பெரிதாக இருக்கும். உள் ஓரம் வெளி ஓரத்தைப்பார்க்க தடிப்பு இருக்கும். கால், பாதத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். பாதத்தின்பின்னால் உள்ளங்கால் தென்படும். பாத உதயப்பிரசவங்களை கிரவகிப்பதில் கூடுமானபடியில் பனிக்குடத்தை உடைக்காமல் வைக்கவேண்டும். கர்ப்பாசயவாய் நன்றாய் அகண்டபிறகு, ஏதேனும் ஒருதாமதம் உண்டாகுமாகில் ஒருகாலேப்பிடித்துக் கீழாக இழுத்து புட்டப்பிரசவமாய் மாற்றிக்கொள்ளவும். இது நல்லயோசனை. ஏனெனில் மற்றப்பாதம் நாபிக்கொடியை நெருக்குணைமல் கர்ப்பாற்றும்.

(b) குறுக்குப் பிரசவம்.—சாதாரணமாய் குறுக்குப் பிரசவங்களில் இயற்கை உதவியால் பிரசவமாதல் அசாத்தியம். மேலும் சமயோசித உதவி உண்டானால் தவிர தாயின் உயிருக்கும் சிசுவின் உயிருக்கும் அபாயம் சம்பவிக்கும். சிசு கர்ப்பாசயத்தில் குறுக்காயிருப்பதற்கு


பதிலாக சாய்ந்திருப்பதால், குறுக்குப் பிரசவங்களில் தலை அல்லது புஜம் ஆரம்பத்தில் உதயமாகும், அல்லது கர்ப்பாசயமே சாய்ந்திருக்கலாம். ஏதோவொரு தடையினால் தலை கூபகவிளிம்பில் இரங்காமல் தடைப்பட்டு கர்ப்பாசயச்செய்கையினால் முதல் ஒருபக்கமாக சாய்ந்த பிறகு வரவர இடுப்பெலும்பின் பள்ளத்தில் குறுக்காக ஆப்புக்கடாவியதுபோல் பாயும். அப்போது அத்தலையின் ஸ்தானத்தில் புஜம்வந்து, கூபகத்தின் அடியில் இரங்குவதால், கை முன்வெளிப்படும். ஆகையால் பிரசவநேரம் சற்றுநேரம் அதிகரித்தபிறகு, சிசுவைக் குறுக்குநிலையில் வரச்செய்யவேண்டியது.

புஜ - உதயங்களுக்கு நேரதுவென்று அதி சாதாரணமாகச் சொல்லப்படும் காரணங்களாவன :—காலத்திற்கு முந்தி பிறத்தல், அபரிமித பனிநீர், கர்ப்பாசயச் சாய்வு, நஞ்சதாழ்வாக இருத்தல் - முதலிய - இவைகளே. புஜ உதயங்களில் நான்கு நிலைகளுண்டு. ஒவ்வொரு நிலையும், உச்சி உதயத்தில் தலையின் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான நிலைக்குத்தக்கதாயிருக்கும்.

முதலில் அல்லது வலப்புறமுது எதிராயிருப்பது. இதில் குழந்தையின் முதலு எதிராயிருக்க, வலது புஜம் கூபகவிளிம்பிலிருக்கும். தலை இடது இடுப்பெலும்பின் பள்ளத்திலும், புட்டம் கர்ப்பாசய அடியில் வலதுபக்கமாய் தாயின் முள்ளந்தண்டுக்கு நேராகவும், கால் கைகள் மற்றப்புறத்திலும் இருக்கும். கை வெளியானால், கையின்பின்புறம் சிசுவின் முள்ளந்தண்டின்பக்கமாயிருக்க முன்புறம் எதிராயிருக்கும்; பெருவிரல் தலையிலிருக்கும் இடதுபக்கத்தைக் காட்டும். ஆனால் இதில் கை முறுக்கிக்கொண்டு வராமல், நேராக நீட்டப்பட்டு வந்ததோவென்பதை நன்றாய் கவனித்தறியவேண்டும். இந்த நிலையானது உச்சிநிலையின் முதல் நிலையிப்போலவே அதிக சாமானியமானது. இது அந்த உச்சி உதயத்தின் மாறுதல்.

பத்னோரம் படம்.

FIG. 11



இது முதல்நிலை அல்லது வலப்புறமுதகு எதிராக இருக்கையில் சிசு இருக்கும் நிலையைக்காட்டுகிறது.


இரண்டாம்நிலை அல்லது இடதுபுறமான முதகு எதிராய் நுப்பது.—இதில் இடதுபுறம் கூபகத்தில் இருக்கும், குழந்தையின்முதகு எதிராக இருக்கும், தலையானது வலது இடுப்பின் பள்ளத்தில் இருக்கும். புட்டமானது கர்ப்பாசயத்தின் அடியில் இடதுபுறமாய் இருக்கும். வெளிகண்ட கையின் பின்புறம் எதிராக இருக்கும். தலையிருக்கும் இடத்தை பெருவிரல்காட்டும். இது உச்சி உதயத்தின் இரண்டாம் நிலைமாறுதல்.

மூன்றாம்நிலை அல்லது வலதுபுறமான முதகு பின்புறம் நுப்பது.—தலை வலது இடுப்பெலும்பின் பள்ளத்திலிருக்கத் தக்கதாய், வலதுபுறம் கூபகத்திலிருக்கும். குழந்தையின் அடிவயிறு எதிராக இருக்கும். புட்டம் கர்ப்பாசயத்தின் அடியில் அதிகமாய் இடதுபுறமாகவே இருக்கும்.

வெளிகண்ட கையின் உள்ளங்கை எதிராகத் திரும்பி யிருக்கும், பெருவிரல் வலதுபக்கமாய்த் தலையிருக்கும் இடத்தைக்காட்டும்.

பன்விரண்டாம் படம்.

FIG. 12



இது மூன்றாம் நிலையை அல்லது வலப்புறமுதகு பின்புறம் இருக்கையில் சிசுவின் நிலையைக்காட்டுகிறது.

இது உச்சி உதயத்தின் மூன்றாம்நிலை மாறுதல்.

நான்காம்நிலை அல்லது இடதுபுற முதகு பிக்குனிநுப்பது.—பிள்ளையின் அடிவயிறு எதிராக இருக்க இடதுபுறம் கூபகத்தின் விளிம்பிலும், தலை இடது இடுப்பெலும்பின்பள்ளத்திலும், புட்டம் கர்ப்பாசய அடியின் வலதுபக்கமாயும் இருக்கும். வெளிகண்ட கையின் உள்ளங்கை எதிராகவும், பெருவிரல் இடதுபுறமாகவும் இருக்கும். இது உச்சி உதயத்தின் நான்காம்நிலைமாறுதல்.

குறிகள்.—புஜம் யாதொரு பள்ளமின்றி கிரண்டிருப்பதாலும், மேலாக அகைச்சுற்றிலும் விரலைச்செலுத்தும்போது, புஜத்தின்செட்டையும், விரா எலும்புகளும் தென்படுவதாலும் அறியப்படும்.

குழந்தையின் நிலையை அறியும்பொருட்டு அதின் தலையின் நிலையை முதலில் அறியவேண்டும். 1-வயிற்றின் பக்கங்களைத் தொட்டுப்பார்த்தால், தலையின் நிலையை அறிந்துகொள்ளலாம். 2-கைக்குழி அல்லது கழுக்கட்டு எப்போதும் பாதத்திற்குநேராக இருக்கும் என்பதை ஞாபகத்திலவைக்கவேண்டும். அது இடதுபுறமாயிருந்தால், தலை வலதுபுறமாயிருக்கும். தோள்செட்டைகள் பிள்ளையின் பின்புறத்தைக்காட்டுவதால், பிள்ளையின் நிலையை அறிந்துகொள்ளலாம்.

விரல்கள் நீளமாகவும், பெரியதாகவும், சினைதாகவும் உள்ளங்கையில மடங்கியிருப்பதாலும், மற்ற விரல்களிலிருந்து பெரு விரல் பிரிக்கிருப்பதாலும், கையின் இரண்டு ஓரங்களும் ஒரே தடிப்பா யிருப்பதாலும், கைமுன்னங்கையுடன் ஒன்றாய்ச் சேர்ந்திருப்பதாலும், கையின் நிலையை அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

எந்தக்கை வெளிகண்டதென்பதை நிச்சயிக்க, “கைகொடுப்பதுபோல்” (shaking hands, ஷேக்கிங் ஹாண்ட்ஸ்) உன் கையால் பிடி. அப்பொழுது இருகைகளின் பெரும்விரல்களும் ஒன்றாகச்சேர்வதிலும், வலதுகைப் பெருவிரல் வலதுகைப் பெருவிரலோடும், இடதுகைப் பெருவிரல் இடதுகைப்பெரு விரலோடும் வருவதாலும் அறிந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

குறிகள்.—உதயமாகும் பாகம் உயரத்தென்படும். போதுமான நெருக்கமில்லாததால் கர்ப்பாசயவாய் மெதுவாக அகண்டு பனிக்குடமானது கைப்போர்வையின் (glove) விரலை நீட்டினாற்போல் நீண்டிருக்கும்.


பிண்டத்தின் இரத்தாசயத்துடிப்பு, பின் நாபியண்டை அல்லது அதற்குமேல் கேட்கும். அடிவயிற்றின் வடிவம் ஒழுங்கினமாகவும், தலையானது இரண்டிலொரு இடுப்பெலும்பின் பள்ளத்திலும் இருக்கும். இடுப்புநோய் சாதாரணமாய் பலவீனமாயிருக்கும். பிரசவநோய் அதிகப்பட்டுவரவர, புஜம் கூபகத்தில் இரங்கும். கர்ப்பாசயவாய் கொஞ்சம் அகலும். பனிக்குடம் உடைந்து கை வெளியாகும். வெளியாகும் அங்கத்தைப்பற்றி எதேனும்சந்தேகமுண்டாகுமாயில், அதைக் கீழாக இழுத்து பரிசோதிக்கவும். அது பாதமானால் யாதொரு மோசமில்லை. ஒரு கையானால் அது சரியான கிரவகிப்பைக் குறிக்கும்.

புஜ உதயங்களுக்கு அநேகமாய் உதவி தேவையாய் இருந்தாலும், இயற்கை உதவியின்றி பிரசவத்தை உண்டாக்குவது மிகவும் அரிது. இரண்டு சாத்தியமான வகைகளுண்டு. இவைகள் “தனக்குத்தானே கவிழ்தல்” (ஸ்பான்ட்டேனியஸ் வெர்ஷன்) “தனக்குத்தானே சுழலுதல்” (ஸ்பான்ட்டேனியஸ் இலோலாஷன்) என்று சொல்லப்படும். “தனக்குத்தானே கவிழ்தல்” வில் அதற்கு அதுகூலமான முக்கிய நிலைகளை—பிள்ளை உயிராயிருக்கவேண்டியது, அல்லது, அப்போது செத்தாயிருக்கவேண்டும். அதினால் முள்ளந்தண்டு வழக்கம்போலத் துவண்டதுபோலிருக்கும். கொஞ்சம் அசைவும் கர்ப்பாசயச்செய்கையும் இருக்கும். “தனக்குத்தானேவிரிதல்” என்பது உதயமாகும் புஜத்திற்கு ப்ப்திலாக, புட்டமாவது தலையாவது உதயமாதலே. புட்டம் “தனக்குத்தானே திரும்பு” வதால் உதயமாகும் புஜமானது கூபகத்திலிருந்து வெளியே கொஞ்சம்கொஞ்சமாய் எழும்பும். அந்நோய் புட்டம் கூபகவிளிம்பில் பிரவேசிக்க, அதை முண்டம் பின்தொடர்ந்து சுழன்று உதிக்கும். கடைசியில் தலை உதிக்கும். சிலசமயங்களில் புஜமிருக்கும் இடத்தில் தலைவந்து சாதாரண விதமாய் உதிக்கும். “தனக்குத்தானே திரும்புவது” தில்,

பிள்ளை சாதாரணமாய் பிரசவகாலத்திற்கு முன்பே செத்திருக்கும். இதனால் அதின் முள்ளந்தண்டு அழைப்பாயிராது; குழந்தையும் மடங்கினும்போல் பிறக்கும்.

பதினேழன்றும் படம்.

FIG. 13



“தனக்குத்தானாய் சுழல” வில் குழந்தையின் உடம்பு வளைந்திருப்பதைக்காட்டுகிறது.

உதயமாகும் புறம் கூபகத்தில் உறுதியாய் ஊன்றியிருக்க, முண்டம் அதின் பக்கவாட்டாய் மடங்கி, மார்புமுன் தள்ளி, முண்டத்தின்பக்கமும் புட்டமும் பிடிக்கெனும்பின் பள்ளத்தை அடைத்தாற்போல வந்து, பிறகு, காலும், அதன்பின்பு தலையும் உதிக்கும். முதல் முதல் தலை கூபகத்தைக் குறுக்கிடுவதால், “தனக்குத் தானே கவிழ்தல்” சம்பவிப்பது அருமை. பிள்ளை சின்னநாயிருந்தால்மாதிரி இவ்விதமாய்கவியும்.

புஜ உதயங்களின் நிர்வகித்தலைப்பற்றிய “திருப்புதல்” (டர்னிக்) என்பதைப்பார்க்கவும்.

உடம்பின் உதயங்கள்.—முதுகின் உதயமானது முள்ளந்தண்டின் கூர்மையான பொகுட்டுகளாலும் விலா எலும்பின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தினாலும் அறியப்படும். இந்த உதயம் மிகவும் அரிது. மார்பெலும்பின் உதயம் இதிலும் அரிதாய், நீட்டெலும்போடும், விலா எலும்பின் ஜல்வம், அதின் பக்கங்களில் தென்படும். அடிவயிறு உதயம், நாபிக்குழியில் நாபிக்கொடி இணைக்கப்பட்டிருப்பதினால் தெரியவரும். பக்கஉதயங்கள் விலா எலும்புகளாலும், அவற்றின் மத்தியிலுள்ள இடங்களாலும் அறியப்படும். அவையாவன:—இரண்டு இடைகனம் ஒரு உரத்த அழுத்தமான எலும்போரமுமாம். இந்த உதயங்கள் எல்லாம் அபூர்வமானவைகள். நிர்வகிப்பைக்குறித்து, “திருப்புதல்” என்றபாகத்தில் பார்க்கவும்.

(c) நோந்த பிரசவம்.—அதிக சாதாரணமானது தலையும், கையும்; இருகைகளும் உதயமாகுதல் அரிது. சில சமயங்களில் தலையும் பாதமும் அல்லது பாதங்களும்; புட்டமும் பாதங்களும், கையும் பாதமும் உதயமாகும்.

நிர்வகிப்பைப்பற்றி “திருப்புதல்” என்றபாகத்தில் பார்க்கவும்.

15 - ம் அதிகாரம்.

IV. சிக்கான பிரசவம்.

COMPLEX LABOUR (காம்பிளெக்ஸ் லேபர்).

இந்த வகுப்பு பிரசவத்தில் மருத்துவச்சியானவன், வைத்தியர் உதவியை எப்போதும் அடையவேண்டிய தென்று தெரிந்துகொண்டு, அவர் உதவி அகப்படாத பகுத்திலுமாதிரிதான் தான் அந்தப்பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டியது.

பலபிள்ளைப்பேறு.

MULTIPLE PREGNANCY.
(மல்டிபிள் ப்ரெக்னென்சி.)

இரட்டைப்பிள்ளைப்பேறு, ஏறக்குறைய 90 பிரசவங்களுக்கு ஒன்றுண்டாம். முப்பிள்ளைப்பேறு அதிக அபாயம். ஏறக்குறைய 8,000 பிரசவங்களில் ஒன்று சம்பவிக்கும். நான்கு அல்லது அதற்கு அதிகமான பிள்ளைப்பேறு ஒரேகாலத்தில் சம்பவிப்பது இன்னும் அதிக அபாயம். இரட்டைப்பிள்ளைப் பிரசவத்திலும் பெரியதாகவும், அதிகமாய் அகண்டங்களின்மையாகவும், சிலசமயங்களில் இரண்டுபிண்டங்களின் மத்தியில் ஒருவித சாய்ந்தபள்ளமுள்ளதாகவும் இருக்கும். உதாரணமாக “ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை” வைத்துக் கேட்க, இரண்டுபிள்ளைகளும் உயிராயிருக்கும்பகுத்தில், ஒன்றுக்கொன்று தூரத்தில் இரண்டு சிசு இருதயத் துடிப்பின் சத்தம்கேட்கும். ஒன்று கேட்டாலும், இரட்டைப்பிள்ளைகளாக இருக்கலாம்; எனினில் ஒரேபிள்ளைமாதிரியும் உயிராயிருக்கலாம்; அல்லது இருதயத்தொனி ஒன்றுமாதிரியும் கேட்கும்: காரணம் இரண்டு பிண்டங்களும் கர்ப்பாசயத்தில் இருக்கும் கிளைகளை, கர்ப்பகாலக் கடைசிமாதங்களில் தொட்டுப்பார்த்து இரட்டைப் பிள்ளைகளிருப்பதை அறியலாம். இரண்டு சிசுத்தலைகளையும், வெவ்வேறான

முண்டங்களையும் இவ்விதமாய் அறிந்துகொள்ளலாம். இத்துடன் இரண்டு வெவ்வேறான இரத்தாசயத் துடிப்பின் தொனிகேட்பது - இரட்டைப்பிள்ளைகளைப்பதை சிச்சயப்படுத்தும்.

தாயிக்கு உண்டாகும் அபாயங்கள் மூன்றுவகை:—

1 - கர்ப்பாசயமானது - அதிகமாய் அகண்டிருப்பதாலும் மாயை ஒட்டியிருக்கும் இடம் பெரியதாயிருப்பதாலும் கர்ப்பாசயத்தை பலவீனக் கருங்கவொட்டாமல் உதிரப்பிரவாகம் அதிகமாடுதல்; 2 - அடிவயிற்றின் பெரிய இரத்த நரம்புகளின் பேரிவிருந்த நெருக்கமானது திடீரென்று கீழ்க் இரத்தாசயம் சற்றுநேரம் வெறுமையாயிருப்பதால் பலஹீனச்சோர்வுண்டாகுதல். இது முக்கியமாய் இரண்டாம்பிள்ளை அடுத்துப்பிறந்தால் உண்டாகும். 3 - கர்ப்பாசயத்தில் உதிர்க்கட்டிகள்தங்கி அழுகி வினாவாய் உடம்பில் ஊறுகிறதிலுமும், கர்ப்பாசயம் தளர்ந்திருப்பதிலுமும், பிரசவஜாரம் அடிக்கடிவருதல் - பருவத்திற்குமுன் மாயை அறுபடுதலாலும், ஒருபக்கமாய் கர்ப்பாசயம் சுருங்குவதாலும், மாயையின் இரத்த ஒட்டம் தடுக்கப்பட்டு, இரண்டாம் குழந்தைக்கு வருத்தம்நேரிட எதுவிருக்கும்.

பல பிள்ளைப்பேற்றில் பிரசவம் ஒருசாய் கஷ்டமாகும். எனினில் கர்ப்பாசயம் மிகமாய் அகண்டிருப்பதால் பலவினமாகி, கர்ப்பாசய வாயிலிருக்கும் குழந்தையைத் தள்ளும்சக்தி குறைவாயிருக்கும். இரட்டைப்பிறப்புகளில் சாதாரணமாய் ஒன்று ஆணாகவும் மற்றது பெண்ணாகவும் இருக்கும். ஆனால் அநேக பிரசவங்களில் இரண்டும் ஆணாகவேனும் பெண்ணாகவேனும் பிறப்பதுண்டு. ஒவ்வொரு பிண்டத்தோடும் சாதாரணமாய் அதனதன் பனிக்குடமும், நஞ்சும் பொருந்தியிருக்கும். சிலசமயங்களில் இரண்டு பிள்ளைகளும் ஒரேநஞ்சு இருப்பதுமுண்டு. அருபொருளாய் இரண்டு பிள்ளைகளும் ஒரே கருப்பையிலிருப்பதுமுண்டு. அப்படியிருக்குமானால் கஷ்டந்தோனாலும். இரட்டைப் பிள்ளைகள் ஏறக்குறைய எப்பொழுதும் காலத்

திற்குமுந்தி பிறப்பதால் சிறியவையாயிருக்கும். மூன்று பிள்ளைப்பேற்றில் குழந்தைகள் இன்னும் சிள்ளைகளாயிருக்கும்.

நீர்வகித்தும் வகை.—பிரசவத்தினதன்மை இன்னதென்று அறிந்தவுடன் இடுப்பை இறுக்கிக்கட்டி (பயிண்டர்போட்டு) முதல்பிள்ளை பிறக்கும்பரியந்தம் பிரசவந்தனக்குத்தானே நடந்தேற விட்டுவிடவேண்டியது. ஆனால் நாபிக்கொடியை அறுக்குமுன் இரண்டு இடங்களில் ஜாக்ஹதையாய் அதைக் கட்டவேண்டியது, அநேக பிரசவங்களில் முதல்பிள்ளை பிறந்தவுடன் இடுப்புநோய் சற்று ஓயும். அது திரும்பவும் தொடங்கி 20 நிமிஷங்களுக்குள்வரும். அந்நேரம் சிக்கிரத்தில் இரண்டாம்பிள்ளை வெளியில் தள்ளுண்ணும். ஏனெனில் தாயின் மிருதுவானபாகங்கள் நன்றாய் அகன்றுருப்பதால் அதுபிறக்கயாதொரு தடையுமிராது. இவ்வேளைகளில் அடுத்தநேரம் வருவதற்குமுந்தி பிரசவம் வெகுநேரம் நீடிக்கும். ஒருபிள்ளை பிறந்த சிலநாள்பொறுத்து மற்றொருபிள்ளை பிறந்தபிரசவங்களும் உண்டென சில நூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. முதல்குழந்தை பிறந்தபிறகு அடிவயிறு ஏறக்குறைய முன்போலவே பெரியதாகும், பரிசோதித்தால் இரண்டாம்பிள்ளையின் பனிக்ருவானது கர்ப்பாசயத்தின் வாயிவிருக்கிறதாகவும் காணப்படும். உதயமாயி நோய்த்தையும் இரத்தாசயத் துடிப்பையும் அறிந்து நிதானிக்கவேண்டும். தலை உதயமானால் வயிற்றை இறுக்கிக்கட்டி “எர்கட்டு” திராவகத்தில் (liquid extract of ergot) ஒரு தேயிலைக்கரண்டி யளவு கொடுக்கவேண்டியது. நோய் எழும்பியவுடனே, பனிக்ருடத்தை உடைக்கவேண்டும். இதன்பிறகு (ஸ்டெத்தஸ்கோப்பால்) அடிக்கடி குழந்தையின் இரத்தாசயத்துடிப்பை (பீட்டல் ஹார்ட்) பார்த்து, பல க்ஷயப்படுமொகில் பிரசவம் விரைவிலுண்டாக உதவிசெய்யவேண்டும். சமீபத்தில் வைத்தியர் இவ்வாவிட்டால் மருத்துவச்சி சிகாவைத் திருப்பிப்பிறப்பிக்கலாம், சிகவின் இரத்தாசயத்துடிப்பு பல

மாயிருந்தால், “எர்கட்டு” திராவகத்தை திரும்பவும் கொடுத்து, முதற்பிள்ளை பிறந்தகாலந்தொடங்கி ஒருமணிநேரம்வகைக்கும் பொறுத்து தாமதித்து அதன்பின்பு பிரசவிப்பிக்கலாம். புஜம் அல்லது கை உதயமாகும், தருணங்களில், பனிக்ருடம் உடைப்பதற்கும், எர்கட்டு திராவகம் கொடுப்பதற்கும் முந்தி, இருகால்பற்றித் திருப்புதல் (bi-polar turn) உத்தமம். மூன்றுபிள்ளைப் பிரசவத்தையும் நிர்வகித்தல் இவ்வாறே.

உதிரப்பிரவாகம் அல்லவென்பது.

HEMORRHAGE (ஹமொரேஜ).

கர்ப்பமாயிருக்கும்போதாவது, அல்லது பிரசவநேரத்திலாவது உதிரப்பிரவாகம் உண்டாகக்கூடும். இதை அதிகவலையோடு கவனிக்கவேண்டும். உதிரப்பிரவாகம் திடீரென்றும் ஏராளமாகவும் உண்டாகும்போது, கர்ப்பினியானவள் உடம்பைக் கவனிக்கப்பட்டு, யாதொரு உதவியும் அடையுமுன் இறந்துபோகக்கூடும். அல்லது இதைத்தடுத்தால் அவள்தேகம் இளைத்து அநேகமாதங்களுக்கு அல்லது வருஷங்களுக்கு வெளிர்த்து, இரத்தங்குறைத்து, பலவீனப்பட்டு யாதொரு வியாதியையும் தாங்க சக்தியில்லாதிருப்பாள். பெரும்பாட்டினால் வருந்தினவர்களுக்குப் பெரும்பாட்டுச்சகரம் அல்லது பிரசவகாரமும், பலவகையான அவ்வித வியாதிகளும் உண்டாகும்.

உதிரநஷ்டத்தின் சாதாரண அறிகுறிகளாவன :— மூர்ச்சைபோதல், வெளுவெளுப்பு (blanching), ஓய்வில்லாமை, தோல்குளிர்த்து பிசுபிசுத்துமிருத்தல், நாடித் துடிப்பின் பலவீனம், முகவாட்டம் இவைகளே. நோயாளிக்கு காற்றில்லையென்றும், சுவாசிக்கக் கூடவில்லையென்றும், காதுக்குள் இரைச்சல் கேட்கிறதென்றும், அறையை இருட்டிவிட்டாற்போல பார்வை மங்கிப்போச்சுதேயென்றும் முறையிடுவாள். அவள்தன் சிநேகிதரைக்கூட அடையாளங் கண்டுபிடிக்கமாட்

டான். கொடுக்கும் கஞ்சியாகாரத்தை வாயிலிட்டுக் குடிப்பிக்கவேண்டும் - இல்லாவிடில் அதை விழுங்குவது கஷ்டம். தன்னை தனித்து இருக்கவிடச் சொல்லி, பேச்சினால் அல்லது சைகையினால் கெஞ்சிக்கேட்பான்.

இந்த பிரமாதக்குறிகள், தோற்றத்திற்கும் விசேஷமானவைகளாயிருந்தாலும் இன்னும் உதிரப்பிரவாகம் (பெரும்பாடு) காணாமலிருந்து சந்தேபலம் வருமானால் நோயாளி ஒருவேளை சாஸ்தப்படக் கூடியதாகும். அதுகூலமான அறிகுறி எவையெனில் - தேகத்திற்கு உண்டாதல், சாப்பாட்டில் பிரியப்படுதல், மணிக்கட்டில் நாடித்துடிப்பு தாட்டியாயிருத்தல், அதிக அமைதியாய் முச்சுவிடல், சுற்றியிருக்கும் எல்லாவற்றையும் தெளிவாய் உணர்தல் இவைகளே. பிரதிகூலமான குறிகள் யாவெனில் - கேவல ஒடுக்கம், முகவாட்டி, இருத்திருந்து முச்சுத்தமாடுதல் அல்லது மேல்மூச்சுவாசாதாரணமாய் மாணத்தகு சற்றுமுன்காணும் கொறுகருவலி - ஆகிய - இவைகளே.

கர்ப்பினியாயிருக்கும்போது உண்டாகும் “கர்ப்பப்பெரும்பாடு” என்றும், பிரசவவேளையில் அல்லது பிரசவத்தின்பின் உண்டாகும் “பிரசவப்பெரும்பாடு” என்றும் இருவகையான பெரும்பாடுகளுண்டு. பின்வரும் மூன்று பிரதான பிரிவுகள் முதலாவதைப் பெரும்பாடுக்குரியவையாம்:—


1. கர்ப்பநஷ்டப் பெரும்பாடு.
2. மாயைவெளிகாண பெரும்பாடு.
3. அகனமாத்நான பெரும்பாடு.

1. கர்ப்பநஷ்டப்பெரும்பாட்டைப்பற்றி முன்னமே சொல்லியிருக்கிறது.

2. மாயைவெளிகாணபெரும்பாடு - மாயை அல்லது தடுக்கற்றியபெரும்பாடு இதை நன்றாய் அறிந்துகொள்ளவேண்டுமாயின், நஞ்சு ஒட்டிக்கொள்ளக்கூடிய கர்ப்பாசய உறுப்புகள் பலவற்றையும் விவரித்துக் காட்டவேண்டியது ஆவசியகம். கர்ப்பாசயத்தின் உட்புறம்

இரண்டு வட்டங்களால் மூன்று பிரதேசங்கள் அல்லது மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேல் வட்டத்திற்குமேல் இருக்கும் பாகம் கர்ப்பாசய அடிப்பிரதேசம்; இது மாயைக்கு அதிகதாரண இருப்பிடமாம். இது பிரபாய “மாயாக்கி” என்றும் எண்ணப்படுகிறது; ஏனெனில் இங்கே, மாயைக்கு அகால இடப்பெயர்ச்சிக்கு எதுவில்லாமையாலென்க.

பதினாண்டாம் படம்.



(பார்வெல் பண்டிதர் கொள்கையின்படி.)
(இதில், கர்ப்பாசயம், சக்கரங்களாக பிரித்துக்காட்டியிருக்கிறது.)

இந்த இரண்டு வட்டங்களுக்கும் நடுவில் மத்தியமண்டலம் இருக்கின்றது. மாயை முந்தி யொரு பெயர்ச்சிக்கும் உட்படாதபடியால் இவ்விடத்திலும் பெரும்பாடு நேரிட இடமில்லை. ஆனால் பிரசவத்தின் பிற்பாடு உண்டாகுதல் அசாதாரணம்; கர்ப்பாசயம் சாய்ந்துகிடப்பதும், பிரசவரேய் தங்கித்தங்கிவருவதும், பிள்ளை நிலைமாறி கிடப்பதும் அடிக்கடி நேரிடாத காரியங்களல்ல. மத்திய சக்கரத்திற்குமே இருப்பது கர்ப்பாசயகண்ட சக்கரம். இக்கே மாயை இருப்பது அபாயமானது. கர்ப்பாசயத்தின் இந்தப்பாதியில் மாயையானது முழுதுமாகிலும், சிறிதுபாகமாகிலும் ஒட்டிக்கொண்டிருக்காமாகில் சிசு பிரசவிக்குமுன் அந்தப்பகுதி அப்படியே பெயர்ந்துபோகவேண்டியது. கர்ப்பாசய வாயானது சிசு பிரவேசிக்கும்படி அகலவேண்டியது. இப்படியாவதில் மாயைதான் ஒடியிருக்கும்ஸ்தானத்தினிருந்து பெயரவேண்டியதாகும்; அதினால் உதிரப்பிரவாகம் சம்பவிக்கும். குழந்தை பிரவேசிக்கக்கூடிய அளவுகர்ப்பாசய கண்டத்வாரம்விரிந்து அந்த கண்டப்பிரகேசத்தின் ஆதியில் ஒடிக்கொண்டிருந்த மாயையின் அந்த பாகம் எல்லாம் அதுபட்டபோது, மாயை அடியில் ஒட்டியிருந்ததால் உண்டான கஷ்டத்திலிருந்தும் பிரசவநோய் நீங்கும். அப்புறம் பிரசவம் எல்லாவிதத்திலும் கிரமப்பிரசவத்தைப்போல் ஆகும். ஆகையால் “முன்தோன்” “placenta praevia”, அல்லது, “தடுக்கக்கூடாப் பெரும்பாடு” என்பது மாயை கர்ப்பாசயக் கழுத்துவட்டத்தில் இருக்கையில் அதின் அகாலப் பெயர்ச்சி காரணமாக கர்ப்ப அல்லது பிரசவகாலத்தில் காணும் பெரும்பாடாம். இந்த வட்டமுழுதும் அல்லது அதின் எந்த பாகமாகிலும் மாயையால் மூடப்பட்டிருக்கும். கர்ப்பாசயவாயின் ஓரத்தில் அது இரங்கியிருக்கும்பொழுது மாத்திரம், “சிறிது முன்தோன்று மாயை” என்று (partial placenta previa) சொல்லப்படும். அது “கர்ப்பாசயவாயின் உள்பகுதி” யை

முழுதும் மூடுகையில் அது “மத்தியை” அல்லது “முழுது முன்தோன்று மாயை” என்று சொல்லப்படும். இவ்விதமானவை கர்ப்பமுண்டான 5-ம் மாத அந்தியத்திற்குமுந்தி பெரும்பான்மை புலப்படா. ஆனால் அனேக கர்ப்ப கஷ்டங்களுக்கு கர்ப்பாசய - கண்டசக்கரத்தில் மாயை தங்கியிருப்பதே காரணமென்று நம்புகிற நற்கு வியாயமுண்டு.

போக்கும் குறிகளும்.—“முன்தோன்று” மாயையை “காட்டெங்குறிகளில், முன்ஜட்டை ஒன்றும் காணாமலும் சாதாரணமாய் யாதொரு காரணமின்றியும், கர்ப்பம் தரித்த ஐந்தாம்மாதத்தின் முடிவில் அல்லது அதற்குப் பின் திடீம்பிரவேசமாய்வரும் பெரும்பாடு” என்று கல்புரியாம்—வெளிப்படும் உதிரம் நல்ல சிவப்புநிறத்தது. கர்ப்பம் தரியாத காலத்தில் மாத விடாய்வரும் காலமே அது சாதாரணமாய் உண்டாகும் காலமாயிருக்கும். சிலரில் முதன்முறை உண்டாகும் பெரும்பாடு அற்பமும் சீக்கிரம் நிறுத்தக்கூடியதுமாயிருந்து, திரும்பி சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்குப்பின் முன்போலவே திடீரென்று காணும். இப்படிப்பட்ட உதிரப்பெருக்குகள் பிரசவத்துடன் சம்பந்தப்படாதுமிருக்கலாம். ஆயினும் அகிரதாரணமாய் அகாலபிரசவவேதனை தானாய் உண்டாகும். எழாம், எட்டாம் மாதங்கள்அதி அபாயகரமான மாதங்கள். முன்னே மாயை பிரிந்துபோனதும் கர்ப்பாசயத்தின் உட்சுவருக்கிடையில் தங்கியிருந்த உதிரக்கட்டிகள் கடினப்பட்டக் கூடியவைகளாகி அன்னிய சரீரங்களைப்போல் தாக்கிகர்ப்பாசயத்தின் சுருங்கலைக் கிளரீவிடும். பிரசவவேதனை காலத்தில் பிரதியிடுப்புநோய்க்கும் மாயையில் ஒரு புது துண்டு இற்றுவிழும். இச்சமயம் உதிரம் அடிக்கடி பெருந்திரளாய்க் கழிந்துபோம். ஆனால், கர்ப்பாசயச் சுருங்கற் செய்கை முந்தியே உள்ளே நரம்புகளா லூற்றப்பட்ட உதிரத்தைவெளியே தள்ளிவிடுவதால், மத்தியே மத்தியே இரக்தப்போக்கு உண்டாகின்றது.

முந்திரிகள்.—அதிகமான உதிரநஷ்டமும் அதனால் தேகத்துக்கு உண்டான நாக்கமுமே தாய்க்கு உடனே அபாயத்தை விளைவிக்கும். உதிரப்பிரவாகம் அதிகமாகவும் வேகமுள்ளதுமாயிருந்தால், பிரசவம் சீக்கிரம் ஆகுமென்பதை அது தெளிவாய் காட்டுகின்றது. உதிரம்போவது மிதமாயும், கர்ப்பாசயவாய் விரியாமலும், இடுப்புநோய் உபாயமாயும் இருந்தால், கர்ப்பிணியை கொஞ்சகாலம் தொங்கிவைத்தல் சம்மா. விட்டுவிட்டு வேண்டும். சிசுவிற்கு நேரிடும் அபாயம் இருவகைப்பட்டதாகும். முதல்பிரசவம் ஏறக்குறைய எப்போதும் அகாலத்தில்வரும். “முழுதுமுன் தோன்று” மாயையினைக்கும் எல்லா பிரசவத்திலும் மாயை அகாலத்தில் இடத்திலிட்டுப் பெயர்ந்து, அதின் இரத்த ஓடும் அதிகமாய் தடைப்படும். அதனால் சிசு மூச்சுடங்கியிருக்கும். உயிருடன் பிறக்கும் பிள்ளைகள் மிகச்சாற்பம்.

சிகிச்சை.—பிரசவத்திற்குமுன்காணும் பயலேறுதலான பெரும்பாடு எல்லாவற்றிலும், பனிநீர்க்குடத்தைக்கீறி வெளிப்படுத்துவதே முதற்செய்யவேண்டிய காரியம். முழுமாயோதய பிரசவமானால், கர்ப்பாசயத்தில் எந்தப்புறத்தில் அது கொஞ்சமாக ஒட்டியிருக்கின்றதோ அந்த புறத்திற்கும் மாயைக்கும் மத்தியில் விரலைச்செலுத்தி, ஜவ்வுகளை ஓரத்தினின்றும் கிழித்து மாயையின் முன்னுணையை கர்ப்பாசயவாயினிடம் கொண்டுவருவதே புத்தி. இப்படிச் செய்வது கூடாதிருந்தால் மாயைக்குவியலுக்குள் விரலைச்செலுத்தி போதிய அளவு பெரிய துவாரமுண்டாக்கலாம். பனிநீர் நீக்கவும் கர்ப்பாசயம் தன் தொழிலை பலமாய் செய்யும். சிசுவின் உதயபாகமானது கர்ப்பாசயகண்டத்தின்மேல் ஒட்டித்தள்ளப்படுவதால் அது ஓர் உள்ளடைப்புபோல் இருந்து உதிரப்பிரவாகத்தை குறைக்கும் அல்லது நிறுத்தும். இதன்பிறகு வயிற்றை இறுக்கிக்கட்டவேண்டியது. அதினால் கர்ப்பாசயச்செய்கை அதிகமாகி உதிரப்பிரவாகம் மட்டுப்படும். உதிரம் பெருகிக்கொண்டிருக்க கர்ப்பாசயவாய் அகலாமல் இருந்தால், கர்ப்பாசயவாயை ஒரு துண்டென்பன் லினாலவது அல்லது லின்டெ துணியினாலவது இறுக அடைத்துவிடு. (அதை எடுக்கக் கூடமானதாய் அதற்கு ஓர் கயிறு கட்டவேண்டும்.) பிறகு யோனிமார்க்கத்தை மெல்லிய சணற்பை நாரினால் (ட்டோ) அல்லது ஏதாவது மிருதுவான வஸ்துவினால் அடைக்கவேண்டும். அதன்பிறகு என்னசம்பவிக்குமென்று ஜாக்கிரதையாய் பார்க்கவேண்டும். இவ்விதமாய் அடைப்பதால் கர்ப்பாசயவாய் அகண்டு உதிரப்பிரவாகம் தடைப்படும்.

ஒருமணிநேரமானபிறகு அடைப்பை எடுத்துவிட்டு, கர்ப்பாசயவாய் அகலாமலும், உதிரப்பிரவாகம் பெருகிக்கொண்டும் இருந்தால், திரும்பவும் அப்படியே அடைத்துவிடு. ஆகிலும் உதிரப்பிரவாகம் நின்று கர்ப்பாசயவாய் அகலுமானால், பிரசவம் யாதொரு உதவியில்லாமலே அதுகூலமாகும். ஆனால் சிலசமயங்களில் கர்ப்பாசயவாயானது ஒருவாறு அகண்டாலும், உதிரப்பிரவாகம் இருக்கும் நேரம் கர்ப்பாசயவாயை செயற்கை உதவியால் ஏதாவது பார்ன்ஸ்பாக் (Barnes' bag) என்னும் பையால் அகலச்செய்யவேண்டியது. இதற்கும் கொஞ்சநேரம்பிடிக்கும். ஆகையால் உதிரப்பிரவாகம் ஏராளமாயிருக்குமானால் அதை தடுக்க ஏதாவது செய்யவேண்டியது. இவ்வித பிரசவம் விருத்தியாவது செய்யவேண்டியது. இவ்வித பிரசவம் விருத்தியாகிக்கொண்டேயிருக்கும்போது உதிரம்போகுதல் தாதுக நின்றுபோகிற ஒரு நேரமுண்டு. அது கர்ப்பாசயத்தின் முத்தின் சக்கரத்தில் ஒட்டியிருக்கும் மாயை வேறுபடும் சமயமே. ஆகையினாலே இனி இயல்பாய் என்னசம்பவிக்குமென்பதை முன்னறிக்கிடும். கர்ப்பாசயவாயண்டையிலுள்ள மாயையினை எல்லாப்பாகத்தையும் அதினின்றும் நீக்கிவிடுவதினால் அபாயமுண்டாகும்காலம் அதிசீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்குவரும். அதினால் கர்ப்பாசயவாய் அகண்டு சிசுவை வெளியிடுவதற்காய் முந்தி இத்தபாகம் முழுவதும் வேரூக்கப்படவேண்டியது. கர்ப்ப

பாய்வாய்க்குள் இரண்டொரு விரல்களைவிட்டு, மாயையைக் கண்டுபிடித்து, உபாயமாக அதற்கும் கர்ப்பாச உச்சவருக்கும் இடையில் விரல்களைச் செலுத்தி, எட்டிமவ்வாயிலும் சக்கராகரமாக அவ்விரல்களைச் சுழற்றி வழித்து, கூடுமானவரையில் மாயையை வேறுக்கி, அந்நபிற் கு உதயமாகும்பாகத்தைக் கண்டுபிடிக்கவேண்டியது. இப்போது கர்ப்பாசயவாய் மாயையின் சேர்க்கையைவிட்டு நீங்குவதனால், அது சேக்கிரமாய் விரியும், அப்போது பிரசவம் வெகுவாய் இயற்கைபலத்தால் முற்றுப்பெறும். கர்ப்பாசயச் செய்கை பலவீனமடைந்து, கர்ப்பாசயவாய் சேக்கிரமாய் அகலாவிட்டால் எர்கட்டு திராவகம் கொடுத்து நீள்தல் குறுகுதல் தன்மையுடைய நீர்ப்பைகளை (elastic water bags) உட்செலுத்தவேண்டும். கர்ப்பாசயவாய் அளவாய் அளவாய் இன்னும் தடைப்பட்டால், பிள்ளையை திருப்பி பிறப்பிக்கவேண்டியது. கர்ப்பாசயவாய் வெகு இலேசாய் ஒழிப்பது மாதலால், சிசுவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மெதுவாக இழுத்துப் பிரசவமாக்கச் செய்யவேண்டியது. சிசு பிறந்தபிற்பாடு தாய் பிரசவ அகிர்ச்சியினின்றும் சமாளித்து, களைதீர்த்தபிற்பாடு சில நிமிஷம்பொறுத்து, மாயையை வெளிப்படுத்தி, அல்லது, அவசியமானால், அதை கையால் எடுத்துவிட்டு, “மாயை முன்தோன்றும்” பிரசவங்களில் - முக்கியமாய் முழுமாயை உதயத்தில் பிள்ளைபெற்றபிறகு, கர்ப்பாசயகண்டப்பிரதேசத்திற்கு அயத்திராவகம் பூசுதல் உத்தமம். மாயையை பார்வையிட்டால் அதில் ஒருபகுதி கறுத்துப்போயிருக்கும்; இதனால் அது காலத்திற்குமுன் பெயர்ந்ததென்று தெரியும். அதோடு ஜவ்வானது ஓரத்தில் அறுத்தும் இருக்கும்.

இனி சிசிச்சையை யெல்லாந் திரட்டிச் சொல்வோம்: ஏழாம் மாதத்திற்குமுன் உதிரப்பிரவாகம் உண்டாகும். அது மிக அதிகமாயிராவிட்டால், கர்ப்பாசயச் செய்கையையும், உதிரத்தையும் தடுக்கவேண்டிய உபாயம் செய்யலாம். அதாவது - கர்ப்பஸ்திரீயை அசையாமல் படு

கையின்பேரில் படுக்கச்செய்து, அபிவிசம்பந்தமான ஏதாவது ஒருமருந்துகொடுக்கலாம். ஏழாம் மாதத்திற்குப் பிறகு, உதிரமுண்டானால், இனி அதிகமாய்க்கர்ப்பமாயிருக்கவிடாமல் பனிக்குடத்தை உடைத்து வயிற்றை இறுக்கிக்கட்டவேண்டும். உதிரம் கின்று விட்டால் பிரசவம் இயல்பாய் நடந்தேறிவிடலாம். உதிரம்போய்க்கொண்டேயிருந்து, பிள்ளையை திருப்பப் போதுமானவளவு கர்ப்பாசயவாய் அகலாவிட்டால், கர்ப்பாசயவாயையும் யோனியையும் அடைத்து, எர்கட்டு திராவகம் கொடுக்கவும். இந்த அடைப்பை எடுக்கும்போது கர்ப்பாசயவாய் போதுமான அளவாய் அளவாய், கர்ப்பினியின் தேகசகம் நன்றாகவும் இருந்தால் பிள்ளையை இருகாலைப் பிடித்திழுத்துத் திருப்பிப் பிறப்பிக்கலாம். கர்ப்பாசயவாய்போதிய அளவு அகலாவிட்டால், நீள்தல் குறுகுதல் தன்மையுடைய நீர்ப்பையால் அகலச்செய்யலாம். அதுவே அடைப்பாகவும் இருக்கும். பெரும்பாடு மிக அதிகமாயும், கர்ப்பினியானவள் பிள்ளையைத் திருப்பிப் பிறப்பிப்பதை தாக்கக்கூடாத அவ்வளவு பலவீனமுள்ளவளாகவும் இருந்தால் மாயையை கர்ப்பாசயக்கழுந்தினின்று நீக்கவேண்டியது.

3. அகல்மாதத்தான் உதிரப்பிரவாகம். - விவரம் - கர்ப்பமாயிருக்கும்பொழுதானாலும், அல்லது பிரசவத்திலானாலும் பெரும்பாடு உண்டானால் கர்ப்பாசய அடிப்பக்கத்தில், அல்லது கர்ப்பாசயத்தின் மத்தியசக்கரத்தில் மாயையிருந்து காலத்திற்குமுன்பெயர்ந்தால் அதுவே அந்த பெரும்பாடு உண்டாகக் காரணமாகும். கர்ப்பமாயிருக்கும் கடைசி 3 மாதங்களில் கருக் காலத்திற்குமுந்திப் பெயர்ந்துபோகுதல் சாதாரணமானதல்ல. ஆனால் அநேகம் பிள்ளைகளைப் பெற்ற அல்லது பரிபட்டினி, விவாக இவைகளால் தேகசகம் கெட்ட ஸ்திரீகளுக்கு இது சாதாரணமாயுண்டாகும். சிலவகையான சரீரக்கூறுகள் அல்லது கிளைகள் பெரும்பாட்டைக்கொண்டெவரும். அவை உடம்புவிக்கம் (அல்பூமினாரியா) அதிக இரத்தக்

குறைவு அதிகமாய் அதிகமாய் - மாயையை அடுத்தவியாதி இவைகளே இதற்குக்காரணங்களாம். இவ்வகை உதிரப்பிரவாகத்தின் அபாயம் மிகவும் பெரியது. உதிரம் முழுமையும் அல்லது ஒருபாகம், கர்ப்பாசய ஜவ்வுகளுக்கும் அதின் உட்புற ஜவ்வுகளுக்கும் மத்தியில் சென்று, கர்ப்பாசயவாயின் வழியாக வெளியாகும். இல்லாவிட்டால் உதிரம் வெளியில்லா வழியில்லாமல் உள்ளே சேர்ந்து அதிக அபாயமுண்டாக்கும். வியாதி இன்னதென்று சரியாய் அறந்தகொள்வதற்குமுன் உயிர்த்தொழில் உண்டாக்கப்படும். இவ்விதம் கர்ப்பாசய மத்தியசக்கரத்தில் மாயை இருக்கும்போது, அது பெயர்ந்தபோது கப்பண்ணும் காரணங்கள் - கர்ப்பமாயிருக்கும் பின்மாதங்களில் கர்ப்பாசயம் அதிகமாய் கருங்குதல், அகஸ்மாத்தான மனஎழுச்சியால் கர்ப்பாசயத்தின் உதிரம் அதிகமாய் செல்லுதல், குத்து அடி முதலிய இயிதையால் அல்லது வாதியால் உண்டாகும் தேக அகிரச்சி, மலவிசர்ஜனகாலத்தில் முக்குதல், இருமுதல், பாரமுள்ள எதையும் துக்குதல் - ஆகிய இவைகளே. மாயையை நிலைபெயரும்படிபண்ணப் போதுமான அளவு கர்ப்பாசயச்சுருங்குதலை பிண்டசனமானது வரப்பண்ணுவதாய்த் தெரியவருகின்றது.

குறிகள்.—முக்கியமான குறிகள் - கர்ப்பாசய அடிப்புறத்தில், எதேனும் ஓரிடத்தில் நோய் உண்டாதல், மாயை இருக்கும் இடத்தில் கர்ப்பாசய அடிப்புறம் அனைத்தல், உதிரநஷ்டமுண்டாகுதல், ஒடுங்குதல் - இவைகளே. கர்ப்பாசய அடிப்புறம் அதிகமாய்ப்பருகி உருமாறிப்போகும். இந்தப்பாகத்தில் பிண்டத்தின் வடிவம் குறைவுள்ளதாய் பிசைந்த கோதுமைமாக்கட்டிபோல கைக்குத்தப்பெய்யும். கர்ப்பாசயம் கெட்டியாய் இருக்கும். இவைபெல்லாம் இருந்தாலும் கர்ப்பாசயக்கிரியைமாதிரி இராது. முன்சொல்லியபடி உதிரம் வெளியில் தெரியாது. மாயையானது மத்தியில்மாதிரி அந்துப்போகும். ஓரங்கள் இருந்தபிர

காரமாய் இருப்பதால், மாயைக்கும் கர்ப்பாசயத்திற்கும் மத்தியில் உதிரம் சேர்க்கிருக்கும்; அல்லது, ஓரங்கள் ஒதுங்கி வழிவிட்டால் பிள்ளையின் உதயபாகம் கர்ப்பாசயவாயை நெருக்குவதால் அவ்வுதிரத்தை வெளிப்படவொட்டாமல் தடுக்கும். இதுமறைந்த அகஸ்மாத்தான உதிரப்பிரவாகம். மாயை வெளிப்படுத்தப்பட்டபின் பரிசோதித்துப்பார்த்தால், சந்தே புறங்கவிழ்ந்ததாய் ரூபத்தற்குப்பதியாய் பொத்தாயும், உதிரக்கட்டிகள் இருப்பதாகவும் காணப்படும். “மறைந்த உள் உதிரப்பிரவாக” திற்கு அதி முக்கியமான குறிகளாவன:— உடம்பு நடுங்குதல், நாடி வேகம் அதிகரித்து ஹீஸஸ்வரப்பட்டு வரவர அடங்கிப்போகுதல், களைமூடிக்கொள்ளல் ஆகியவைகளே. வெளிப்புற உதிரப்பெருக்கின் அளவினால் கண்டறியக்கூடியதைப்பார்க்கிலும் தேகத்தினைவிட கண்டறியக்கூடியவைகளால் விசேஷம் அறியலாமென்பதைக் கவனித்தால் சரியான ரோககிதானம் நமக்குசித்திக்கும். கர்ப்பாசய அடிப்பக்கத்திலுண்டாகும் கொடியநோய் கர்ப்பாசயத்தைக்கிழித்தி அல்லது நீட்டுகிற தன்மையையுடையதென்று சாதாரணமாய்ச் சொல்லப்படுகிறது. இந்த நோய் கர்ப்பாசயத்திற்குள்ளிருக்கும் உதிரக்கட்டிகள் கர்ப்பாசயத்தை அகலச் செய்வதால் உண்டாகின்றது.

ரோகநிதானக்குறிகள்.—(Prognosis) இந்தவகையான உதிரப்பெருக்கு வழக்கமாய் பலரின் ஸ்திரீகளுக்குக் காணுவதாலும், அது சாதாரணமாய் மறைந்த பெரும்பாடாயிருப்பதாலும், அதை நிதானித்து அறியும்குறிகள் எப்போதும் பிரதிகூலமானவையாய் இருக்கவேண்டும். அதிக தவக்கப்பட்டு சொற்பமாய் வெளிகாணும் பெரும்பாட்டின் குறிகள் கர்ப்பாசயக்கிழிவுகாலத்தில் காணும் குறிகளைப்போன்று இருக்கின்றன.

சிகிச்சை.—உடனே பனிக்குடத்தைச்சிதைத்து, (சாதாரணமாய்க் காணப்படும் கர்ப்பாசயஇளக்க மிகுந்

யால் கர்ப்பிணிகட்டு தாங்கக்கூடாமவிரூப்பதால்), தாங்கக்கூடாமானால் அடிவயிற்றை இறுக்கி ஒரு கட்டிகட்டவும். ஸ்திரீக்கு பலவீனம் இல்லாதிருந்தால், “எர்கட்டு” திராவகம் கொடுக்கவும். ஸ்திரீ அதிக பலவீனையாயிருந்தால், “எர்கட்டு” த்திராவகம் வாந்தியை உண்டாக்கும், அதினால் சோகமும் உண்டாக்கும்; அல்லது மருந்து தேகத்திலூழி பலவீனமாயிருக்கவும் கூடும். பனிநீரை வெளியாக்குவதால், கர்ப்பாசயச்செய்கை வியும். அல்லது உச்சாகத்தைக் கொடுக்கத்தக்க எதையும் தாராளமாயும், அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாயும், சூடாகவும் கொடுக்க வேண்டியது. கைகால்களை குடுபிறக்கத்தேய்ப்பதும் சுகங்கொடுக்கும். ஸ்திரீயின் பலவீனத்தினிமித்தம் பிரசவத்திற்கு சாதாரணமாயுதவி. தேவையாயிருக்கும். ஆகையால் கர்ப்பாசயக்கழுத்தை அகலச் செய்யவேண்டும். ஸ்திரீயின் பின்புலம் இடங்கொடுக்குமாகில், சிசுவை திருப்பி பிறப்பிக்கவேண்டியது. ஸ்திரீயின் பலத்துக்கு தக்கதாய் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யவேண்டுமென்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு மெத்த ஜாக்கிரதையாயிருக்கவேண்டும். சிசுவைப் பிறப்பிக்கவேண்டுமென்று ஆத்திரப்பட்டால், அப்படி பிறப்பிப்பதால் தேகத்தக் குண்டாகும் அதிர்ச்சியே ஸ்திரீக்கு அபாயமாகக்கூடும். இவ்விதமான வேளைகளில், பிள்ளையை பெறுவக்க முயற்சிபண்ணுவதற்குமுன், ஸ்திரீயின் களையைத்தீர்க்க, உச்சாகத்தைக்கொடுக்கும் எதையும் கொடுத்து, குடுண்டாக்குவது உத்தமம். பிள்ளையோ சாதாரணமாய் மூச்சொடுங்கி பிறக்கும். பிறந்தவுடன் தாயைக் களை யாதும்படி சற்றுநேரம் விட்டுவிடவேண்டும். சில நிமிஷங்கள் சென்றபின் கையால் வயிற்றை பிசைந்தாவது அல்லது கர்ப்பாசயத்திற்குள் கையைச் செலுத்தியாவது கஞ்சை வெளியாக்கவேண்டும். கர்ப்பாசயம் தளர்கிற ஜாடையிருந்தால் இன்னும் அதிக உதிரநஷ்டம் உண்டாகாதுபடி தடுக்க, கர்ப்பாசயத்தில் தப்பா

மல் பலத்திருக்குதல் உண்டாகும்படி பிச்சாக்குழலால் அக்கர்ப்பாசயக்குழிக்குள் (perchloride of iron) அயத் திராவகத்தைப் பாய்ச்சுவது உத்தமம்

16 - ம் அதிகாரம்.

சிக்கான் பிரசவம்—தொடர்ச்சி.

COMPLEX LABOUR (கம்பிளெக்ஸ் லேபர்).

உதிரப்பெருக்கு.—தொடர்ச்சி.

HEMORRHAGE (ஹிமெரோஜ்).

பிரசவத்திற்குப்பிந்திய உதிரப்பெருக்கு.—(போஸ்டொபர்ட்டம் ஹிமெரோஜ்)—இது பிள்ளைபிறந்தபின்பும், மூலையெவளியாகுமுன்னும் பின்னும் சம்பவிக்கும் - பிள்ளைப்பேறுகளில் அகஸ்மாத்தாய்ச் சம்பவிக்கும் அதிகஷ்டமான அபாயங்களுள், இவ்வித உதிரப்பெருக்கும் ஒன்று. பிரசவத்தின்பின் எதிர்ப்பார்க்காது சடுதியாய் சம்பவிக்கும் உதிரப்பெருக்கு சுமாய்முடிவதாய்ச் காண்கிறது. சில சீமிக்ந்துக்குள்ளாக மகா ஆபத்தில் இருக்கும் கர்ப்பினியைப் படுத்தும்பாடானது தாழியை தாதுகலக்கி இன்னதுசெய்யவேண்டுமென்று தோன்றலொடாமற்செய்வதால் அவள் இவ்வுதிரப்பெருக்கிற்கு உரிய காரணங்களையும், அது வராமல் தடுக்கும் பரிகரிப்பையும், வந்தாலதை மாற்றும்வகையையும் அறிந்திருக்கவேண்டுமென்பது கட்டாயம். இது நமது அதிகுஷ்டம் ஒரு தடுக்கக்கூடிய விபத்தாக்கும்! பிரசவத்தின் மூன்றும்பாதம் கிரமமாய் நிர்வகிக்கப்படில், உதிரப்பெருக்கு நெருங்கிவிட்டால் எப்படியோ அப்படி ஒவ்வொரு பிரசவத்தையும் எண்ணி நடத்திவந்தால், இவ்விபத்து இப்பொழுது காண்பதுபோல் அவ்வளவு சாதாரணமாய் காணப்படமாட்டாது.

பிரசவத்துக்குப்பிந்திய உதிரப்பெருக்கு;—

(a) “மாயை உள்தங்கும் உதிரப் பெருக்கு” என்றும்.

(b) மாயையை அகற்றியபின், “விடாதுகாலும் உதிரப்பெருக்கு” என்றும் சென்கரியப்பட தாம்பிரிக்கப்படும்.

(a) மாயைதங்கும், உதிரப்பெருக்கு.—மாயையை வெளியே தள்ளக்காணும் கர்ப்பாசயச்சுருங்குக்கு முன், பிள்ளைபிறப்பதும் பின்பு உடனே கர்ப்பாசயவியாபாரம் ஒய்வதும் சாதாரணம். சிசு ஜனனத்தை உண்டாக்கும் இடுப்புநோயால் மாயை வெருவாய்ப் பெயர்ந்து தீபாவதுவழக்கம். உடனே கர்ப்பாசயவியாபாரம் திருப்பி ஆரம்பித்ததும், மாயையின்பெயராத் மற்றப்பகுதியும் பெயர்ந்து வெளியேயிருக்கின்றது. பிரசவ இரண்டாம் பாதத்தில் பிரசவக் தாமதப்படுமாயின், பிரசவ மூன்றாம் பாதத்திலும் கர்ப்பாசயவியாபாரம் வலிவற்ற காரியுக்கும். இகினிமித்தம் மாயை வெளிப்படக்கூடாமல் உள்ளேதங்கும். மாயை இப்படி உள்தங்குவதற்குக்காரணம் கர்ப்பாசயச்செய்கைக்குறைவு ஒன்று மாதிரிமல்ல; அது கிரமந்தப்பிச்சுருங்குதலும், மாயை நைந்துபோய் ஒட்டிக்கொண்டிருத்தலுமாகிய வேறு காரணங்களும் உண்டு.

இத்தியாதி நியாயங்களால் பிரசவத்தின்பின் கர்ப்பாசயம் இயக்கமற்றுக்கிடப்பதே “பிரசவத்திற்குப் பிந்திய உதிரப்பெருக்கு” கிற்குரிய அதிகாநாரண காரணங்களில் ஒன்றென்று தெரியவருகிறது. சிசுவை வெளியேதள்ளுவதற்குரிய முயற்சியால் கர்ப்பாசயம் தேய்ந்துபோவதினால் சிசுவெளிப்பட்டவுடன் அது இளைத்துத் தளர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றது. அதினால் பெரும்பாடு உண்டாகின்றது. கர்ப்பாசயம் மட்டுக்கதிகமாய்ப் பெருத்திருந்தாலும், பிள்ளைபிறந்தவுடன் தளர்ந்த நிலையில் வருகின்றது. ஆகையால்தான் ஒன்றக்கதிகரித்த கர்ப்பசமயத்திலும் அல்லது கர்ப்பாசயத்துக்கதிகமாய்ப் பளிசீர் இருந்தாலும், பெரும்பாடு உண்டாவது மிகவும் சாதாரணம். மாயை முழுதும் பிரிவதற்குப் போதியநேரம் விடாமல் கர்ப்பாசயத்திலிருந்து பிள்ளை சிக்கரத்தில் வெளிப்படுவதாலும் பலமுறை அவ்வாறே பெரும்பாடுண்டாகின்றது. பல பின்

னைகளைப்பெற்ற ஸ்திரீகளுக்கே பெரும்பாடு சாதாரண மாய் உண்டாகக்காணலாம். முதல் இரண்டொருபேள் னைப்பெற்றிலது காணப்படுவது அரிது.

ஒழுங்கினமாய் கர்ப்பாசயம் சுருங்குவதினாலே அரி தைசை நாகளின் ஒருபாகம் பருங்கி இன்னொருபாக தளர்ந்திருக்கும். தளர்ந்திருக்கும் பாகமே பெரும்பா ன்மை மாயைக்கிருப்பிடம். கர்ப்பாசயக்கழுத்து வலிப் பில் சுருங்குவதுபோல் சுருங்கி, மாயையை தளர்த்துள் அடைத்து வைத்துக்கொள்ளும்; இல்லாவிடில், கர்ப்பா சயக் கழுத்தின் வாய்க்காலும் முண்டமும் அடிப்பாக மும் சோர்ந்து இருக்கும்போது, கர்ப்பாசயக் கழுத்தி னிசினிப்பிற் சுருங்குவதுபோலச் சுருங்கியிருக்கக்கூடு ம். இதை கடிக்காரம் அல்லது மணல்உடுக்கை வடிவம் போல் சுருங்கல் “ஆவரீனொல் கண்டிராக்ஷன்” என்று சொல்லலாம், ஏனெனில் மாயை கர்ப்பாசயமாய் கர்ப்பாசயத்தின் மேல்புறத்தில் நீர்க்குயிரியைப்போல கட்டி யிருக்கும். கையை கர்ப்பாசயத்திற்குள் செலுத்தி னால் அதுதளர்ந்திருக்கும். கர்ப்பாசயம் அதின் மார்க்க மாக சுருங்கி உள்வாயடை வருகிறவகையில் செல் லும். இந்த உள்வாயை ஊடுருவினாற்போல் காபிக் கொடி சென்றிருக்கும். இன்னொருவகை ஒழுங்கின கர்ப்பாசயச்சுருங்கலில் அதின் வட்டமான தசைநா ள் சுருங்கும். கர்ப்பாசயம் கீட்சியையும்பெறும். மாயைவாராமல் உள் தங்கச்செய்த இந்தக் காரணங்கள் எற் றீட்டுத் திராவகப் பிரயோகம் அல்லது நாபிக்கொடியை ப்பற்றி யிழுத்தல்-ஆகிய - இவற்றின்பலன்களாம்.

குறிக்க.—குழந்தை பிறந்தஉடனே உதிரப்போக்கு உண்டாகும். சற்று பொறுத்தல்-அது திடவொன்று வது கொஞ்சம்கொஞ்சமாயாவது-துவக்கமாகும். அது திடவொன்று உண்டானால் உதிரம் பிரிப்பொயும். மிக கொடிய பெரும்பாட்டில் படுக்கையும் படுக்கைத் துணி முதலானதுகளும் தோய்ந்து நனைத்துப்போகும்படி உதி

ரம்பாயும். உதிரப்போக்கு கொஞ்சமாயிருந்தால், அல் லது உடனே அதை நாம் அடக்கக்கூடுமானால், பிரமாத அபாய ஒன்றும் நேரிடாது. ஆனால் அது அதிகமாய்க் காணப்பட்டாலும், அல்லது நம்மால் நிறுத்தக்கூடாத தாயிருந்தாலும், அதிக அபாயம் சம்பவிற்கும்.

சிக்ஷை.—பிரசவம் எவ்வளவுதான் இயற்கையான தாயிருந்தபோதிலும் “பிரசவத்திற்குப் பிந்திய உதிரப் பிரவாக”த்தைத் தடுக்கச்செய்யும் சிநிச்சையை ஜாக்கிர தையாய் கையாடவேண்டியது. முந்தின பிரசவங்க ளை உதிரப்பெருக் குண்டாயிருந்ததினாலோ, அல்லது இத்தப் பிரசவத்தின் இரண்டாம்பாதத்திலுண்டான தா மதத்தினாலோ, இப்பொழுது உதிரப்பெருக்குண்டாகு மென்று பயப்பட இடமுண்டானால், சிகளின் தலைவெ ளிப்பட்டபின், ஸ்டீசி அளவு எர்கட் திராவகம்கொடுத்து கிச வெளியே ளுண்ணும்பொழுது, கர்ப்பாசயத் தை கையால் பின்பற்றிக்கொண்டுபோக முக்கியநீர்த் தை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். சுருங்கிய கர்ப்பாச யத்தின்மேல் வைத்த கையை யெடுக்காமல், அளவுக் குமிஞ்சி அது தளர்ச்சியடைவர்தபடி அதை உள்ளங் கையால் பற்றிப்பிடித்தவண்ணமா யிருக்கவேண்டும். இந்த முறைமையைக் கண்டிதமாய்க் கையாடிவந்தால் பிள்ளைபிறந்தபின் உண்டாகும் உதிரப்பிரவாகம் மிக சொற்பமாயிருக்கும். கர்ப்பாசயமானது சுப்பகமத்திய பாகத்தோடு அதுக்வதொந்தமுள்ளதாயும், அதற்கு அதிகமாய் வசப்பட்டதாயும் அமைபத்தக்கதாய், கர்ப்பி னியை மல்லாந்துபடுக்கச்செய்யவேண்டும். கர்ப்பாச யம் தளர்ச்சியடைந்திருப்பதாய்க் காணப்பட்டால், கர்ப்பாசயத்தை இலேசாய்ப்பிசைத்து மாயையை வெளி யிலதள்ளும்படியாய் அதின் சுருங்குஞ்செய்கையை ஓய வெட்டால் தூண்டிக்கொண்டே யிருக்கவேண்டும் மேற்சொல்லியபடி செய்தும் கர்ப்பாசயம் மாயையை வெளியேதள்ளாத பிரசவங்களில், கையைக் கர்ப்பாசய

த்துக்குட் செலுத்தி, அதை வெளியாக்கவேண்டும். இத் தகை முன்பு வலதுகையால் கர்ப்பாசயத்தைப் பலமாய்த்தாய்க்கக்கொண்டு, அதேநேரத்தில் அதைக் கீழ்ப்புறமாகவும் பின்புறமாகவும் தள்ளிக்கொண்டு, பின்பு இடதுகையை நாடிக் கொடிவழியாய் கர்ப்பாசயக்குழிக்குள்ளேவிட்டு, மாயை ஒட்டுவிடப்பட்ட இடத்தைத் தடவி யறிந்தபின் அதற்குடாய்விடல்களை மெதுவாய்ச் செலுத்தவேண்டும். இப்படிச் செலுத்தும்போது விரல்கள் நீட்டப்பட்டும் ஒன்றோடொன்று நெருங்கியிருக்க, கர்ப்பாசயச்சுவருக்கும் மாயைக்கும் நடுவில் அவைகளைக்கொண்டுபோய்கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ச் செலுத்திவிட்டு மாயையைப் பிரிக்கவேண்டும். ஆனால் அவையடிப்பதுபோல் இலேசாய் கையை அசைத்து கர்ப்பாசயத்தை வெளியிலிருக்குங்கையால் ஜாக்நிரதையாய் தாங்கிக்கொண்டிருக்க ஏமாறக்கூடாது. மாயை பெயர்ந்தவுடன் அதைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு, கையையும் மாயையும் கர்ப்பாசயம் இறுகி இறுகித்தானே ஒன்றாய் வெளியில் தள்ளத்தக்கதாய் அதை வெளிப்புறம் அமுக்கவேண்டும்.

மாயை வெளியில்வந்தபின் கர்ப்பாசயத்தில் உதிரக் கட்டிகளிருந்தால் அவைகளை யகற்றிவிட்டு, அதின் மேலேகையைவைத்து இரண்டெண்ணிரேரம் அழுக்கிக் கொண்டிருக்கவேண்டும். அதன்பின் உதிரம் காணாவிட்டால் வயிற்றை நெருங்கும்படியாய் கட்டலாம். அப்போதைக்கப்போது எரக்கட்டுத் திராவகத்தைக்கொடுப்பது பெரும்பான்மை அவசியமாய் காணப்படும்.

கர்ப்பாசயம் மாயையைத் தன் அடிப்பாகத்தில் அடக்கிவைத்துக்கொண்டு ஒழுக்கினமாய் சுருங்கியிருக்கும் பொழுது, அந்த மாயையை வெளியாக்குவது சா. மாய் அதிகக்ஷடமாக்கும். இந்த இசுவை நிவர்த்திப்பதற்கு நாற்பது மினிம் அளவு “லாடனம்” என்னும் அபிந்திராவகத்தை முள்ளே ஒரோமுறையாய்க் கொடு

த்துக் க. ல்மணநேரம் பொறுத்து, நாடிக் கொடிவழியே சுருங்கியிருக்கும் கர்ப்பாசயவாய்க்குள் ஒருமுறைக் கொல்வொருவிரலாக விரல்களிரண்டையுஞ் செலுத்தி மற்ற் கையால் கர்ப்பாசயத்தின் அடிப்பக்கத்தைக் கீழாச் அழுக்கிக் கொள்ளவேண்டும். சற்றுநேரம் பொறுமையாயிருந்தால், இந்த இசுவை நீ தீர்க்கக்கூடும். முறட்டுத்தனமாய் ஒன்றுஞ்செய்யப்பட்டது. விரல்கள் ஒருவேளைசிக்கி நெருக்குண்டாலும் விடாமுயற்சியாயிருக்கவேண்டும்-இல்லாவிடில் திரும்பவும் விரலையுட் செலுத்தவேண்டியவரும். கர்ப்பாசயவாய் போதுமான அளவுவிரிந்தபின் மாயையை கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் அமுக்கி உள்ளங்கையில் வரப்பண்ணவேண்டும் - கையைக் கீழ் உள்ளங்கையில் வரப்பண்ணவேண்டும் - கையை வெளியில் இழுக்கும்பொழுது சோரவிடாமல் கர்ப்பாசயத்தை அழுக்கிக்கொண்டேயிருக்கவேண்டும். அப்போது சமநிலையான சுருங்கல்திரும்பி உண்டாகும். இப்படியான ஒரு நேரங்களில் மாயை கைந்துபோய் அதிகபாகம் அல்லது கொஞ்சம் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதாய்க் காணப்படும்.

நைந்து ஒட்டிக்கொள்ளுதல் (மார்பிட் அட்மிஷன்) -- மாயை வியாதியால் கைந்து ஒட்டிக்கொள்ளும் பிரசவங்களுமுண்டு. ஆகிலும் அவை அருபொருளாய் வருவது கேவலம் அதிர்ஷ்டவசம். இவற்றைப் பரிசரிப்பதற்கு மெத்தப்பொறுமைவேண்டும். கர்ப்பாசயச்சுவரில் மாயை ஒருபாகம் ஒட்டிக்கொள்ளல் பெரும்பாட்டுக்கு ஆஸ்பதம். அது முழுதும் ஒட்டிக்கொள்ளாமல் பிரித்தெடுக்கவேண்டியதாய்வந்தால் உதிரப்பெருக்கு முக்கியம் உண்டாகும்.

அரிதூறிகள் (வரிடம்ஸ்).—இப்படி ஒட்டிக்கொள்வது மூலக்காரணம் முந்தியபிரசவங்களில் பெரும்பான்மை மாயை பிரித்தெடுப்பதில் கஷ்டம் இருந்திருப்பதாய்க் காணப்படும். கர்ப்பாசயம் இருந்து இருந்து சுருங்கும். சுருங்கும் ஒவ்வொருமுறையும் கொஞ்சம் உதி

ரமும்காணும். கர்ப்பாசயமோ பெருத்திருக்கும். அழுக்குவதால் மாயை வெளிப்படாது. கர்ப்பாசயம் பலமாய்ச்சுருங்கினாலும் மாயை வெளியில் தள்ளப்படமாட்டாது. நாபிக்கொடிவழியாய் விரலைக்கொண்டுபோய் மாயையைத்தொட்டால் இயக்கமற்றுக்கிடக்கும். கர்ப்பாசயத்தின்வடிவம் வினோதமாயிருக்கும்: அதாவது அது உருட்சியாகிராமல் ஒருபுறத்தில் சாதாரணமாய் உப்பலாய் இருக்கும்.

பரிசீப்பு.—சாதாரணமாய் தங்கிவிட்ட மாயையை வெளிப்படுத்துவதைவிட நோயால்வந்து ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் மாயையை வெளியாக்குவது அதிகக்ஷட்டம். மாயையைக் “கோதல்” செய்யும்போது கர்ப்பாசயவறுப்பை நகங்களால் வருத்தாப்படிக்குக் கவனமாயும் கைப்பதறமும் விரல்களை ஒரோசிதானத்தில் வைத்து காரியம் நடத்தவேண்டும். மாயை இருக்குமிடத்தை நாபிக்கொடி கைக்குக் காட்டிக்கொடுக்கும்; அப்போது விரல்களை மாயையின் மூலைக்கொடிக்கும் கர்ப்பாசயச்சுவற்றுக்கும் இடையில் மிகவும் மெதுவாயும் பதமாயும் உட்செலுத்தவேண்டும். ஒரு பருதிமுந்தியே பிரித்திருக்கக்கண்டால், அதில் கின்றும் மிச்சத்தையும் உரித்துக்கொண்டுபோகலாம். இது மாயை இது கர்ப்பாசயமென்று பகுத்தறிந்துகொள்ளுவது சுலபமானகாரியமல்ல; ஆகையால் மிகவும் எச்சரிப்புடன் ஆரம்பித்து, கூடியமட்டுக் கவனமும் பத்திரமாய் வேலையை நடத்தவேண்டும். மாயை யொருவேளை துண்டெண்டாய்விடுந்து கர்ப்பாசயத்தின் மேற்பரப்பை ஒழுங்கற்ற கட்டிமுட்டியாக விடுவதுமுண்டு. எல்லாக்கட்டிகளையும் வெளியாக்குவது கூடியதாயினும் கொஞ்சமேனும் அது இலேசானகாரியமல்ல. மாயையில் ஏதேனும் ஒருபகுதி வெளிவராமல் தங்கிவிட்டாலும், அதினால் பிரமாத அபாயங்களுண்டாகும். மேலே அல்லது சிலநாட் சென்றாயினும் பெரும்பாடுண்டாகும். அது அழுகித் தேகத்திலாவதுவதால் பிரசவ

கரமுண்டாகும். கர்ப்பாசயமும் அழற்சிகொள்வதுண்டு. வெளிவராமல் தங்கிவிட்ட மாயையானது அபாயமானது வெளியாக்கக்கூடாத அல்லவது கெட்டியாய்ச்சி சமயம் ஒட்டிக்கொள்ளுவதுமுண்டு. ஆகையால் மாயையை அப்படிநெடுநாள் தங்கவிடுவது தாதி அதிகமனக்கூடலென்கொள்ளத்தக்க ஓர் விஷயமாக இருக்கவேண்டியது. இதில் தாதி செய்யவேண்டியதென்னவென்றால் அபாயமுண்டாகாமல் எவ்வளவு மாயையை அகற்றக்கூடியதோ அவ்வளவையுந் தேலையான பிரயாசத்துடன் அகற்றவேண்டும். ஒருமிக்க அதிகமுயற்சிசெலுத்துவதைவிடக் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய்ச் செய்வது நாய்க்கு அபாயம்நேரிடப்பண்ணாது. தாதி தன் பெயரைக் கெடுத்துக்கொள்ளாதபடி, நோயின் தன்மை இப்படிப்பட்டதென்று நன்றாய் விளங்க விவரித்துச் சொல்லவேண்டும். அபாயம்வராமல் அகற்றக்கூடிய தெவ்வளவோ அவ்வளவு மாயையை அகற்றியபின்னும் உதிரம்பெருகிக்கொண்டிருந்தால் கர்ப்பாசயத்துக்குள்ளே பீச்சங்குமுலால் அயத்திராவகத்தை (neutral solution of perchloride of iron) செலுத்தவேண்டும். உதிரப்பெருக்கில்லாவிட்டால் கர்ப்பாசயத்தை சிலநாட்கள் அடிக்கடி டிஸ் இன்பெக்டன்டு லோஷன் (disinfectant lotion) என்னும் “நிர்மல உதக” ததால் கழுவுவது உத்தமம். இது பிரசவகர ஆபத்தைக்குறைக்கும்; ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் மாயைத்துண்டுகளும் சில நாட்களில் கழன்று வெளியேவந்துவிடும்.

“பிரசவத்திற்குப்பிந்திய பெரும்பாடு” சிலவேளைகளில் கர்ப்பாசய மத்தியவெளியில் அல்லது சுவர்களில் காணும் கட்டிகளாலுஞ்சம்பவிக்கும்.

பரிசீப்பு.—ஏர்கட் திராவகத்தால் குளிர்ச்சியாய் வெளிப்புறமும் உள்புறமும் கழுவுதல், அவசியமானால் கர்ப்பாசயக் குழிக்குள் அயத்திராவகத்தைச் செலுத்தல் ஆகிய இவைகளே.

கர்ப்பாசயம் “கவிழ்கை”யே சிலவேளைகளில் உதி
ரப்பெருக்கிற்குக் காரணமாகின்றது. இது கருவா
ய்ப் பிராணபத்தான - மிக அவசரமரணக்குக் களோடு
வரும் - பிரமாத விபத்தாக்கும். ஆரினும் பிப்படிசம்
பவித்தல் மெத்த அருமை. உப்பிய அல்லது காலியான
கர்ப்பாசயம் “கவிழ்கை” யாவது - கர்ப்பாசயத்தின்
உள்பக்கம் முழுவதும் அல்லது அதிலொருபக்கம் வெளி
யாகுவதே. இதுபல அளவுகளாய்ச்சம்பவிக்கும். அவை
களில் மூன்றுமாதத்திற் சாதாரணமாய் விவரித்துக்
கூறப்படுவதுண்டு. 1 - வது கர்ப்பாசயத்தின் அடிப்
பாகம் அமுங்கிமாதிரி இருக்கும். 2 - வது அமுங்கி
யபாகம் கர்ப்பாசயவாயில் தட்டிப்படும். 3 - வது கர்ப்
பாசயமுழுதும் வெளியில்தோன்றும். மாயை ஒன்று
கவிழ்ந்த கர்ப்பாசயத்தில் ஒட்டிக்கொண்டு இருக்கும்;
அல்லது இந்த ஆபத்து சம்பவிப்பதற்கு முந்தியே விழ்
ந்துபோயிருக்கவேண்டும்.

அறிதற்கள்.—திடுக்கிடுதல், அறிவுமயங்கி மூர்ச்சித்
தல், நாடியோட்டம் விரைவும் குறுகியதுமாயிருத்தல்
இவைகளையன்றிச் சில வேளைகளில் வலி வலித்தல்
வாந்தியாதல், உடம்பு குளிர்ந்து பிசுபிசுப்பான கசிவு
கொள்ளுதலும் உண்டு. இவற்றோடு அதிகப்பங்கா
த்தைக்கொடுக்கத்தக்க ஆளவாய் பெரும்பாடும் அடிக்க
டிதொடர்ந்து வருவதுண்டு. அடிவயிற்றின் அடிப்பக்
கத்தில் மிகுந்த கோயும் அதனுடன் பிரசவத்தின்பொரு
ட்டு முக்குகையும் காணப்படும்.

பரிசீலிப்பு.—கர்ப்பாசயம் கவிழ்ந்திருக்கும் சங்கதியை
ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடித்திருந்தாலும், கர்ப்பாசய
க்கழுத்துதளர்ந்து மாயையின்னும் ஒட்டிக்கொண்டிருப்
பதாய்த்தெரிந்தாலும், கைமூஷ்டியால் (closed fist) மா
யையை பிடிக்கக்குழிப்பக்கமாய் பின்புறம் அமுக்கித்
தள்ளவேண்டும். அப்புறம் கர்ப்பாசயவிளிம்பின் துரு
வத்திலும் பிடிக்கமுனையை நெருங்காதபடி ஒருபக்க

மாய் மேல்புறமாகவும் எதிராகவுக் தள்ளவேண்டும்.
அதேசமயத்தில் மேகனபொருத்தை அமுக்கவேண்டி
யது. இதிலும் கர்ப்பாசயவாய் குருங்கியிருந்தால் அதை
உள்ளே தள்ளுவதற்குமுன் மாயையை நீக்கவேண்டி
யது. அப்போது உள்ளேதள்ளக்கூடியதாய் சிறுத்திரு
க்கும் மகையின் ஓரத்தை தடவிப்பார்த்து அதை கர்
ப்பாசய உருவாக்கினதும் உரித்து பிறகு உள்ளே
தள்ளவும். உள்ளே தள்ளினபிறகு கையை எடுத்து
முன் கர்ப்பாசயக்குமூல் (பூடினாண்டிபூப்) மூலமாய்
அயத்திராலகத்தை உட்செலுத்தவும். “சிக்கான பிர
சவ”த்தின் தலைப்பில்வரும் இதுவும் மற்ற இதைப்
போலொத்த பிரசவங்களிலும் வயித்தியர் அகப்படாத
பகூத்தில் மாத்திரம், இவைகளை நிர்வகிக்கும் பொறுப்
பை மருத்துவச்சியானவள் தாளே தன்பேரில் எடுத்
துக்கொள்ளவேண்டியதென்று அறியவேண்டியது.

17-ம் அதிகாரம்.

சிக்கான பிரசவம்—தொடர்ச்சி.

COMPLEX LABOUR (காம்பிளெக்ஸ் லேபர்)

உதிரப்பிரவாகம்—தொடர்ச்சி.

HEMORRHAGE (ஹிமோஜ்)

(b) மாயையை நீக்கிப்பிறகு உண்டாகும் உதிரப்பிரவாகம்.—இது இரண்டு காரணங்களினாலுண்டாகும்: மாயை ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஸ்கானத்தின் இரத்த நரம்புகளிலிருந்தோ அல்லது கர்ப்பாசயக்கழுத்தாவது ஜனன பாதையின் எந்தப்பாகமாவது கிழிதலாலோ உண்டாகும். பின்சொன்ன காரணமாயிருந்தால் பிரகாசத்தோடு விளங்கும் உதிரம் பிரிட்டுக்கொண்டு, அல்லது சொட்டுசொட்டென்று வரும். கர்ப்பாசயமும் நன்றாகச் சுருங்கி இருப்பதாகக்காணப்படும். விரலால் பரிசோதிக்க நிஜஸ்திதி அறியப்படும். இந்த ஆபத்தானது பலாத்கார பிரசவத்திற்குப்பின்பு அல்லது பட்டபட்டத்த கர்ப்பவேதனைக்குப்பின்பு மிகவும் சாதாரணமாய்சம்பவிக்கும். கிழிவுண்ட ஓரங்களுக்கு அயத்திராவகம் தடவ, உதிரம் சாதாரணமாய் நிற்கும்.

பிரசவத்திற்குப்பிந்திய பெரும்பாட்டைப்பற்றி இன்னும் விசேஷம் எழுதவதற்குமுன், கர்ப்பாசய உதிரப்பெருக்கைத் தடுப்பதற்கு உடம்பில் தற்செயலாய் உண்டாகும் பரிதாரங்களெவையோ அவற்றைப்பற்றிப்பேசுவது ஆவசியகம். முதலாவதும் மிகவும் கைகண்டது மான பரிகாரம் கர்ப்பாசய நரம்புச்சுவர்கள் மிக சுறுக்காய்ச் சுருங்குதலாம். இது மாயாஸ்தான இரத்த நரம்புகளின் மாயை தூலால் கட்டியதுபோன்று இருக்கும். இதுக்கமான சுருங்குதல் இருக்குப்டும், கர்ப்பாசயத்தின் உள்ளிருந்து உதிரம் போகாது. இரண்டாவது, இரத்த நரம்புகளுக்கு தம்மொழி உருப்பிக்கொள்ளும் தன்மையுமுண்டு. அவைகள் உள் சுருங்க

குவதின்னல் அவற்றின் வாய்கள் நெருங்கி இரத்தம் உறைந்து கட்டிக்கொவதற்கு அதுகூலஞ்செய்கின்றன. மூன்றாவது, இரத்த நரம்புகளிலோடும் உதிரம் கொஞ்சகேரம் நிறுத்தப்பட்டால் அதனால் கர்ப்பாசயத்தில் கொஞ்சம் ஓடு உண்டாகும். அப்போது இரத்த நரம்புகளில் உட்கக்கட்டிகள் உண்டாக அவகாசமிருக்கும்.

குறிக்க.—உதிரப்பிரவாகத்திற்கு முதல் குறியாவது நோயாளி தன்னிலிருந்து உதிரம் ஒடுகிறதேயென்று முறையிடுவான். இதை ஒருபேராகும் அலகியம் செய்யாதே. உடனே துணியையும் படுக்கைத் துணிகளையும் பரிசோதிக்கவும். ஒருவித வெளிர் சிவப்பான உதிரம் சொட்டுசொட்டென்று வடிந்திருப்பதை பலதரம் காணலாம். இது கொஞ்சமாயிருப்பதுபோல் தோன்றும். ஆனால் இப்படி கொஞ்சமும் இருக்கப்படாது. இந்தத்தண்ணீர்போன்ற சிவந்த உதிரதாரை அதிக உதிர நஷ்டத்துக்கும் கர்ப்பாசயத்தை உதிரத்தால் நிரப்பி, அதைப் விரியச்செய்வதற்கும் அடையாளமாம். கர்ப்பாசயத்தைப் பரிசோதித்தால் அது சாதாரணமாயிருப்பதைப்பார்க்கப் பெரியதாகவும் இளக்கமாகவும் அல்லது ஒரு முறை சுருங்கியும் மற்றொருமுறை ஓய்ந்துமிருப்பதாய்க் காணப்படும். கர்ப்பாசயம் இளக்கமாயிருக்கும் சிலசமயங்களில் அதின் வடிவத்தை கண்டறிவது கஷ்டமாயிருக்கும். அமுக்குவதால் உதிரத்தையும் உதிரக்கட்டிகளையும் வெளியாக்கலாம். அப்போது கர்ப்பாசயமும் சின்னதாகும். நிரும்பவும் உதிரம் சேர்ந்து கர்ப்பாசயம் பூரிக்கக்கூடும். சாதாரண அடையாளங்கள் அவ்வளவு பிரபலமானவையுமல்ல, அவசரமானவையுமல்ல. உதிரப்போக்கு பலமுறைமய்தெரியாமலே தீபாய்க்கொண்டிருக்கும். கர்ப்பினி அதைப்பற்றி நிறைபட்டும்மாட்டாள். ஆனாலும் அதிமுக்கியமாய் வளங்கு கண்கள் இருநவதாயும் காதுகளில் ஓரம் விபரீத ஓசையும் பாட்டும் கேட்பதாயும் சான்றும். படுக்கையில் அமுங்கிப்போயிருக்கிராத்

போல் அவளுக்குத்தோன்றவும் உதிரப்பிரவாகத்தின் கெட்ட குறிகள் ஆரம்பிக்கும். அவன் தன்னை ஒண்டியாய் விட்டுவிடவும் ஒரு தொந்திரவுஞ் செய்யாமல் தன்னை மரிக்கவிடவுங்கேட்டுக்கொள்வான். இதற்குப் பின் ஏதாவது புதிய உதிரப்போக்கில்லாவியிடால் இந்த அபாய ஸ்திதியிலிருந்தும் பிழைப்பான்; அல்லது சக்தியெல்லாம் ஒடுங்க அவன் சிலசமயம் உயிர் பிழைக்காமல் மரிப்பான்.

பரிசீலிப்பு.—பிரசவத்திற்கு பிந்திய உதிரப்பிரவாகத்தை நிர்வகிப்பதில் இரண்டொரு விதிகளை கவனிக்கவேண்டியது. முதலாவது, நோயாளியை மல்லாக்கக்கிடத்து. இந்த நிலைமை கூபகத்தில் கர்ப்பாசயம் இரங்கவும், கையினால் பிடிக்கக்கூடாதுமானதுமாயிருக்க பிசுவும் அவசியமானது. அதினால் முகத்தைப்பார்க்கவும் நோயாளி சுத்தவாயுவை உட்கொள்ளவும் கூடியதாயிருக்கும். உற்சாகங்கொடுக்கும் பதார்த்தங்கள், மருந்து, உணவு இவைகள் கொடுக்கவுங்கூடும். நன்றாய் சுவாசிக்கக்கூடியதாய் மார்பின் பக்கங்கள் விரிவாகும். இரண்டாவது, மூத்திரக்குழலைச் செலுத்தவும். நிறைந்த மூத்திரப்பை கர்ப்பாசயம் சரிவர சுருங்கவெர்ட்டாமலும், பிடித்தாளவொட்டாமலும் தடுக்கும்.

மாயை வெளிப்படுத்தப்பட்ட பின்பு உதிரப்பிரவாகம் கண்டால் கர்ப்பாசயத்தின் சுருங்கும் செய்கையைத் தூண்டிவிடுவது நமது கருத்தாயிருக்கவேண்டியது. தாராளமாய் ஒருமுறைகொடுக்கக்கூடிய அளவு எற்கட்டிராவகங்கொடுக்கவும். எகஸ்டிராக்ட் எற்கட்டிராவகத்தில் ஒரு தேயிலைக்கரண்டி அல்லது 30 கிராமின் (அல்லது குண்மெணி) நியாயுள்ள எற்கட்டை இடித்து, 1 அவுன்ஸ் சுடுநீரில் 15 நிமிஷம் உலரவைத்து, மருந்தோடு சாப்பிடவேண்டும். குளிர்ச்சியானது கர்ப்பாசயம் சுருங்கும்படி செய்ய மெத்த அளவுகூலமானது. அதைப் பிரயோகிப்பதில் பணிக்கட்டி போட்ட தண்ணீரில் கையைத்தோய்த்து வயிற்றினுள்ளேயே வைக்கவேண்டும்.

கலாம்; அல்லது கர்ப்பாசயத்தின் பேரில் பணிக்கட்டித்தண்ணீரை அடிக்கடி விசையாய் அடிக்கலாம்; அல்லது ஒரு பெரியதுண்பெணிக்கட்டியை வயிற்றினுள் பிடித்து சின்னசின்ன துண்டுகளோ யோனிக்குள் செலுத்தலாம். மலக்குடலுக்குள்ளும் பணிக்கட்டித்தண்ணீரைச் செலுத்தலாம். அதே சமயத்திலேயே கர்ப்பாசயத்தை கைவாட்டமாய் பிடித்திருக்கவேண்டும். உதிரம்போய்க்கொண்டேயிருந்து கர்ப்பாசயமும் பெரியதாகத் தோற்றினால், கர்ப்பாசயக்குழியில் கையைச் செலுத்தி உதிரக்கட்டிகளை நிவர்த்திசெய்யவேண்டியது. இது நல்லயோசனை. கர்ப்பாசயம் பெரியதாக இருந்து, உதிரம் சாயும்போதெல்லாம் இப்படிச் செய்யவேண்டியது. அனேக பிரசவங்களில் இந்தசிகிச்சை உதிரப்பிரவாகத்திற்கு காரணமானதெனினும் அதை நீக்கினதால், செய்யவேண்டிய சிகிச்சை இதுவே. கர்ப்பாசயத்தை நன்றாய் பிசைவதே சிலசமயங்களில் அதன்சுருங்கல்செய்கையைத் தூண்டிவிடவுதவும். கர்ப்பினியின் பக்கத்தில் நின்றுகொண்டு உன்தேக பளுவையுன்கையின்பேரில்தாங்கி அமுக்கலாம். கர்ப்பாசயத்திற்குள் வெந்நீரைப்பாய்ச்சுவதும் கர்ப்பாசய வியாபாரத்தை வற்புறுத்த பலத்தவுபாயமாகும். இது எர்கட்டெம் மற்றும் அனேகவித மருந்துகளைப் பயன்படுத்தப்போது, குணம்செய்ததாகும். அந்த உத்தின் சிதோஷண நிலைமை (டெம்போசர்) “பெரெஸ்ஸியிட்” தெர்ம்மாயிற்றிரிப்படி, 100 முதல் 120 டிகிரிவரையில் இருக்கவேண்டியது. அதின் ஒருகுணம் யாதெனில் - கர்ப்பாசயத்தில் ஏதாவது உதிரக்கட்டிகள் தங்கியிருந்தால் அவற்றைக் கடிவித்தாளி உதிரப்பிரவாகத்திற்குக் காரணத்தை நிவர்த்தியாக்குவதே. கர்ப்பாசயம் விட்டுவிட்டு இதுகுளும் ஓய்வதாயிருக்கின்ற “சொற்ப்பெபெரெஸ்ஸியிட்” இதுவே உதிரப்போக்கைத் தடுப்பதே, கர்ப்பினி கோமமாய்த்தேறி யெழுந்திருக்கத்த

க்க மெத்த பக்குவநிலைமையில் அவளை அமர்த்தக்கூடிய நிர்ப்பயமான கைகண்டசிகிச்சையாம்.

மேற்கூறிய பரிஹாரமுறைகளெல்லாவற்றிலும் நாம் நாடியிருந்த காரியம் கர்ப்பாசயத்தின் “கருங்கல்” செய்கையாக்கும். கர்ப்பிணிக்குப் போதுமான அளவு பலம் இருக்குமட்டும் கர்ப்பாசயம் செய்யும்சிகிச்சையின் உரப்பைத் தாங்கும். ஆனால் உரப்போக்கினால் விசேஷ பலகூடியம்கேரீடில் இச்சிகிச்சைகள் அப்பிரயோசனமாவதோடு தீங்கு விளைப்பனவுமாகும். இச்சமயம் கர்ப்பாசயச்சுருங்கலால் உதிரப்போக்கைத் தடுக்கலாமென்று இருக்கக்கூடாது. உதிரம்வரும் இடத்தில் துவர்ப்பான மருந்தை (ஸ்டிப்டிக்) தடவுகையே இரத்த நரம்புகளின் வாயிலில் உதிரக்கட்டிகளை உண்டாக்கி உதிரத்தைத் தடுப்பதற்குரிய ஒரே ஒரு உபாயம். (நியூட்ரல் ஸொல்பூஷன் அப் பெற்களோரைட் அப் ஐரன்) என்னும் தனி அயத்திராவகம் ஒன்றையே முக்கியமாய் கொடுக்கவேண்டியது. அயத்திராவகத்தை பிரயோகிக்குமுன் கர்ப்பாசயத்திற்குள்ளிருக்கும் எல்லா உதிரக் கட்டிகளையும் ஒழித்துப்போட வேண்டியது. அப்போதுதான் கர்ப்பாசயச்சுவர்களில் இந்தமருந்து ஏறும். ஒருசட்டியில் அல்லது வாய்க்கன்ற ஒரு பெரும் புட்டியில் ஒருபங்கு வேகமான அயத்திராவகத்தோடு 1 அல்லது 6 பாகம் நண்ணீர்சேர்த்த கூட்டுமருந்தில் சுமார் 16 அவுன்ஸ் நீரை வார்க்கவும்.* அதைப் பிரயோகிக்கும்விதம் - ஒரு “இக்கின்சன்” பீச்சிற்கும்

* இந்த அயத்திராவகம் (நியூட்ரல் ஸொல்பூஷன் அப் பெற்களோரைட் அப் ஐரன்) அதற்கென்று மருந்துஷாப்பில் செய்யச் சொல்லிவாங்கி சித்தமாயவைத்துக்கொள்ளலாம். இப்படிச் செய்துவைத்திருக்கும் மருந்தானது “ஸ்டிப்டிக் பார்ம்கோபியா” என்னும் இங்கிலிஷ் “ஒளஷன் சர்வீஸ்” த்தில்கண்ட சாதாரண “லிஃவிட் பெரி” திராவகத்திற்கும் சிறுந்தென்பதற்கு நியாயங்கள் பல உண்டு.

லையும் கர்ப்பாசயக்குழலையும் எடுத்துநீண்டான் ஒன்றைமாட்டிப் பூட்டியபின், அதற்குள் இருக்குங்காற் றெல்லாம் வெளிப்படும்படியாக, கிராவகம் தாராளமாய் எரிவருமட்டும், காற்றைக் குழல்வழியாய் இரண்மென்றுவிசை இழுத்தெடுத்து வெளியில்விட. மருந்தை உறிஞ்செடுக்கும் அப்பீச்சுக்குழலின் அடிப்பக்கம் அதற்குள் வெளிக்காற்று துழையாதபடி மருந்துச்சட்டியில் அடிபடிந்திருக்கிறதாவென்று ஜாக்ரதையாய்ப் பார்க்கவேண்டும். பீன்பு இடதுகை விரல்களை யோலிக்குள் செலுத்தி, அந்த விரல்கள் செல்லும்வழியாய்க் குழலை கர்ப்பாசயவாய்வழியாய் “கர்ப்பாசய அடிவாரம்” வரைக்குஞ்செலுத்தி, மெதுவாகவும் இடைவிடாது கிதானமாகவும் மருந்தை உள்ளேபாய்ச்சவேண்டும். உள்ளேசெல்லும் நீர் வெளிவரும்போது கருகிறமாகவும் இரத்தக்கட்டிகளுடன் கலந்தும் வெளிப்படும். உதிரப்பெருக்கும் நின்றபோகும். அயத்திராவகம் இரத்த நரம்புகளின்வாயில் வழியும்உதிரத்தைக்கட்டியாக்கி, கர்ப்பாசய உள்பந்திப்புஜவ்விலே கருங்கலுண்டாக்கி, சாதாரணமாய் கர்ப்பாசயச் செய்கையையுஞ்சற்றே எழுப்பிவிடும். உள்ளே மருந்தெலுத்தினபிதகு உதிரம் திரும்பிக்காண்பது அரிது. காணாமாயில் பீச்சுக்குழலால் மருந்தை மறுபடியும் உட்செலுத்தவேண்டியது. இந்தப்பரீகரிப்பைச் செய்தபிதகு கர்ப்பாசயத்தைக் பிசைவதை நிறுத்தவேண்டியது; ஏனென்றால் இப்போது இரத்த நரம்புகள் தாமாய் அடைப்பட்டு உதிரப்பிரவாகத்தைத் தடுக்கும்படி முழுதும் கம்பிவிடப்பட்டிருக்கிறதினாலென்க. அன்றியும் அழுக்குதல் இடத்தக்கட்டிகளைப்பெயர்க்கும் அல்லது குழையச்செய்யும். மனோம்ச ஹகரபானங்களும், போஜனமும் குடாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவும் கொடுப்பது அவசியமாகும். பால், மாட்டுமோமிசரசபானம், பிராந்தி, தண்ணீர்-இவ்வ-மெத்த சிரோஷ்டமானவை. அதிபலவொடுக்கமாயிருந்தால், பிராந்தியை வெந்நீரில்கலந்து

கொஞ்சம் குடாய் கொடுக்கவேண்டும். கைகல்களுக்கு உஷ்ணமுண்டாகத் தேய்ப்பது பிரயோஜனமாயாம். கர்ப்பிணி ஆகாரத்தைவிழுங்க அல்லது விழுங்குததைத் தங்கப்பண்ணிக்கொள்ள அசுத்தையாயிருந்தால் ஆகாரத்தை ஆசனவழியாய் பிச்சங்குழலால் உட்செலுத்தி அவளைப் போஷிக்கவேண்டும். இரண்டொருமணி நேரம் பொதுத்து கர்ப்பாசயம் தன்இறுகும் சக்தியை மீண்டும் பெறத்தக்கதாய் இடுப்புக்கட்டுப் பிண்டர் கட்டவேண்டியது.

இரண்டாம்நாள் உதிரப்பிரவாகம் (சக்கண்டெரி ஹெமொஜ்).—இது மாயையின் துண்டுகளாவது, ஜவ்வுகள் அல்லது உதிரக்கட்டிகளாவது உள்தங்கிவிடுவதால் அதிகதாரணமாய் உண்டாகும். வேறுகாரணங்களுமுண்டு: அவை கர்ப்பாசயம் பின்பக்கம்புளால், கர்ப்பாசயக்கழுத்துவிழிபடுதல், முதலானவையாம். பிரசவத்திற்குப்பின்பு சிலமணிநேரங்களுக்குள் அல்லது இரண்டு மூன்று வாரத்துக்குள், இந்த இரண்டாமுறை உதிரப்பிரவாகம்” உண்டாக இடமுண்டு. கர்ப்பாசயம் பெரியதாயிருப்பதோடு அழுக்கினால் மிருதவாகவுமிருக்கும்; பலமுறைகளில் நாற்றமுள்ளீரும், பெரும்பாடும் மாறிமாறியுண்டாகும். இவ்வித உதிரப்பிரவாகம் உண்டாகும்காலம் சாதாரணமாய் ஏழாம்நாள் அல்லது எட்டாம்நாள். பரிசோதித்தால் கர்ப்பாசயவாய் திறந்தவண்ணமாகக் காணப்படும். இரண்டு விரல்கள் உட்செல்லும். விரல்களை வெளிவாங்குகையில் அவைகளின்பேரில் ஓர்வித நாற்றமுள்ள சீழ் நீர் படிந்திருக்கும்.

பரிசீலிப்பு.—கர்ப்பாசயத்திற்கு யாதொரு காயமுமுண்டாகாமல் உதிரக்கட்டிகளையும் மாயையின் துண்டுகளையும் வெளிப்படுத்துவதாம். கர்ப்பாசயக்கழுத்து தாராளமாய்த் திறந்துபோய், அதிலுள்ள கலமிஷங்கள் ஒழிந்தபிறகும் உதிரப்பிரவாகம் போய்க்கொண்டேயிரு

தால் வேகம்குறைந்த அயத்திராவகத்தை (weak solution of iron) பிச்சங்குழலால் உட்செலுத்தவேண்டும். இது சாத்தியப்படாவிட்டால், கர்ப்பாசயமத்திய வெளியில் அயத்திராவகம் தடவவேண்டும். கர்ப்பாசயம் புரண்டு அதனால் உதிரப்பிரவாகமாகாதுமாயில் அதைத்திருத்தவேண்டியது.

18 - ம் அதிகாரம்.

சிக்கான பிரசவம்—தொடர்ச்சி.

COMPLEX LABOUR (காம்பிளெக்ஸ் லேபர்).

கர்ப்பாசயமும் யோனியும் சிழிபதேல்.

RUPTURE OF THE UTERUS AND VAGINA.
(ரப்சூர் ஆப் தி யூடிரஸ் அண்ட் வஜினா.)

கர்ப்பிணிக்கு நேரிடக்கூடிய அதிகபயங்கர பிராணத்தான அபாயங்களில் இதுவும் ஒன்று. இது நேரிடுவது ஏறா குறைய எப்போதும் பிரசவவேதனைக்காலத்திலேயே.

இவ்வித சிழிவுபாடு கர்ப்பாசயத்தின் எந்தப்பாகத்திலாகலும் உண்டாகும்; ஆகிலும் இதின் அடி சாதாரணமான ஸ்தானம் - கர்ப்பாசயக்கழுத்து, அல்லது, கிட்டத்தட்ட அது யோனியிலுள்ளதானபொருளும் - இடமாம். இந்தக்கிழிவு கர்ப்பாசய அடிவாரத்திலாவது, அதின்காத்திரத்திலாவது, அல்லது, அந்த அவயவசமுலத்திற்குமாவது, உண்டாகலாம்.

கர்ப்பாசயத்தின் அல்லது யோனியின் சிழிவுபாட்டிற்குக் காரணங்களாவன - பலத்த கர்ப்பாசயச்செய்கை பின்தொடர, சிசுவின் ஸ்தானபேதம், கூபக விருபம், பிண்டரீர்க்கோர்வை முதலியவற்றால் சிசுவின் சஞ்சாரமார்க்கங்களில் உண்டாகும்-தடைப்பாடுகளாம். இவ்வாறு சில சமயங்களில் அதிதீவிர பிரசவவேதனையிலும் சம்பவிப்பதுண்டு.

இந்த அபாயம் சாதாரணமாய் அநேகம் பிள்ளைகளைப்பெற்ற - அல்லது - தேக்கக்கட்டுடைந்த பலவீன - எதிர்களுக்கு மிக அடிக்கடி உண்டாகும்.

நூற்கள்.—கர்ப்பாசயம் சிழிந்ததும், அதைக்காட்டுங்குறிகள் பெரும்பான்மை மிகத் தெளிவானவை, திடீரென்று

ன்று சருக்கு சருக்கென்று குத்துவது போன்ற தாங்கமுடியாத நோய் காண்பது வழக்கம். கர்ப்பிணி எதோ அறுபட்டாற்போலிருப்பதாக முறையிலெவன், சில சமயங்களில் பிறிதொன்று தெளிவான ஓர் சத்தம்கேட்கும். உதயமான சிசுவின் பாகம் மறுபடியும் உய்வே போகும். சிழிவு பெரிதாயிருக்கும்பொழுத்தில் சிசு கர்ப்பாசயத்திலிருந்து முழுதும் வழுவி அடிவாரத்துக்குநிழிவ்ரெல்லும். அநேக வயிற்றின்சுவர்கள்வழியாய் அது கைக்குத்தென்பது இதுவன்றி மற்றொரு சிக்கான உபத்திரவம் தோன்றும்; அதாவது: குடவின் சுருள்கள் சிழிப்பட்ட கர்ப்பாசயத்தின்வழியாய் கழுவி யோனி நிலவிலும்; அல்லது மர்மஸ்தானவாயிலாய் முன்போகக் கித் தொகும். சாதாரணமாய் யோனியிலிருந்து ஓர் உதிர்ப்பாய்ச்சல் காணும்; அழற்சி, சாம், இவற்றோடு ஒடுங்கும் குறிகளும் வரும்.

முன்னோக்கிய பிடிக்கேமேல்முனையோடு உதயமாகும் நீடித்தபிரசவத்தில் கர்ப்பாசயத்தின் கீழ்ப்பாகம் அல்லது யோனிச்சுவர்சிசுவின் தலைக்கும் எதிர்மேட்டிற்கும் மத்தியில் சிக்கி நகங்குணழையும். இப்படி நகங்குணைட தைசுகள் புண்ணாகி, அல்லது கழன்றுவிழும், குடலுக்கும் யோனிக்கும் அல்லது யோனிக்கும் மூத்திரப்பைக்கும் வழியுண்டாக்கிடும்.

சிகிச்சை.—கர்ப்பக்குழிக்குள்ளே சிக வழுவிப்போய் விடுமாதில், “வயிற்றைக்கீறுதல்” (காஸ்டிடிசாட்டொமியி) என்ற “சஸ்திரசிகிச்சை” செய்யவேண்டியது. இவ்வாட்டால் இரண்டு கால்களையும் பிடித்து ஜாக்கிரதையாய் இழுக்கவேண்டியது. கோவைத் தீர்ப்பதற்கும் அழற்சியைத் தணிப்பதற்கும் உற்சாகபானங்களும் சமயத்துக்கேற்ற அளவாய் ஒருமணிநேரத்திற்கு ஒரு முறையாவது அல்லது இரண்டுமணிநேரத்திற்கு ஒரு முறையாவது 20 குனி (minims) அபினிசிராவகமும் (லாடனம்) கொடுக்கவேண்டியது. மாயையும் அவ்வா

200

சிக்கான பிரசவம்.

மே சிசுவும் வயிற்றுக்குள் இரங்கிவிடாமையால் பிள்ளை பெரும்பான்மையும் பச்சமூச்சில்லாதிருக்கும்.

பிரசவ இழப்பு அல்லது வலி.

PURPERAL CONVULSIONS (பூர்பிரல் கன்வல்ஷன்ஸ்).

இது பிரசவத்திற்கு முந்தியாவது, பிரசவநேரத்திலாவது, பிரசவமான உடனேயாவது கர்ப்பிணியைப் பிடித்துக்கொள்ளும் ஒரு வித வலியும். இந்த வலி இரண்டு மூன்று நிமிஷம் இருந்துபோய்விடும். இதின் ஜாடை காக்கைவலி போன்றிருக்கும்.

இதன் முற்குறிகளாவன:—தலைநோய், பார்வைதடுமாற்றம், சிவசமயங்களில் இரைப்பைக்குழியில் உபாதை, காலும் பாதங்களும் வீங்குதல், அல்லது உடம்பெல்லாம் ஊதிப்போதலுமாம். இவ்வலி காணும்போது லாயில் துரைதள்ளி, கண்விழிகள் சுழன்று, நாக்கு பிதுங்கி தேகமெல்லாம் கடுவலி வலித்து, முகம்கறுத்து, ஸ்திரீமூற்றிலும் பிரக்கிளையற்றவளாவாள். சிலநிமிஷங்கள் செல்ல இந்தவலி நீங்கி அதிகமயக்கமுண்டாகும். சுரணையற்ற பெருந்தூக்கமும் மூளையில் இரத்தச்சுரப்புகண்டு பிராணாயாமமாய்முடியும்.* சுவாசம்விடுகை கஷ்டதரமாயிருக்கும். * அது அரிகமாகவும் சிறு இறைச்சலாகவுமிருக்கும். வலிநீங்கி நோயாளி கொஞ்சம் அல்லது முழுதும் பிரக்கிளையடைந்தாலும், தனக்கு வலிவந்தது நினைவிற்கு வராது. வலி அநேகமுறைவரும். வலி அதிகரிக்க அதிகரிக்க அபாயமும் அதிகரிக்கும். தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் அபாயம் அதிகம். இவ்வகை நோய்கண்ட பிரதி மூன்று அல்லது நாலு பேருக்குள் ஒருத்தி சாவாள் - குழந்தைகளின் மாணக்கணக்கும் கிட்டத்தட்ட அப்படியேதான்.

முக்கியமாய் கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு நேரிடுகிற குண்டிக்காய்ச் செய்கைக் குறைவால், சிறுநீரினிருக்கும் பதார்த்தங்கள் உதிரத்தில் தங்கி உதிரம் விஷமித்துப்போவதே இவ்வியாதிக்குக் காரணமாம். சிறுநீரில்

முட்டையின் வெள்ளைக்கரு (ஸ்பூமன்) இருக்கின்றது. கொஞ்சம் சிறுநீரை ஒரு தேயிலைக்காண்டியில் ஊற்றி (ஸ்பிரிட்லாம்ப்) “சாராயதிப” த்தில் காய்ச்சினால் முட்டையின் வெள்ளைக்கருவைப்போன்ற - தடிப்பான - வெள்ளைபதார்த்தம் அடியில் காணப்படும்.

பரிசீலிப்பு.—கர்ப்பிணி தன்னை காயப்படுத்திக்கொள்ளாதபடி தடுப்பதொன்றுதவிர தாதி செய்யக்கூடியது யாதொன்றுமில்லை. அவள் உடுப்பைத்தளர்த்தி, நாகைக்கடித்துக்கொள்ளாதபடி வாயில் எதையேனுந்திணித்துவைக்கவேண்டியது. சிலநாள்க்கு மலசுத்தியாகாவிட்டால் பேதிமருந்தைப் பிச்சுக்குமுலால் ஆசனத்தில் செலுத்துதல் பிரயோசனகரமாயிருக்கும். கர்ப்பாசயலாய் திறந்தவண்ணமிருந்தால் பணிக்குடத்தை உடைத்து வைத்தியரைவாவழை. பரிஹார முறமை-வலியைத் தடுக்க அல்லது மட்டுப்படுத்த, க்ளோரபாரம் (chloroform) என்னும் மயக்கமருந்தையும், நாடிகடை வினாவாகவும் திடமாகவுமிருந்தால், இரத்தநரம்புகளின் பிசுவைத்தளர்த்த, ஸிடொட்ரம் விரடி (Tinct. Veratrum Viride) திராவகந்தையும் கொடுப்பது அவசியமானால், “பார்ன்ஸ்” நீர்ப்பையால் கர்ப்பாசயலாயை விரியச் செய்து செயற்கைப்பிரசவம் செய்வதுமாம். நோயாளி சோர்ந்துபோயிருந்தால், போஷிப்போடு பிராந்தி முதலான பலமேற்றும் பதார்த்தங்களும் கொடுக்கவேண்டியது. விழுங்க அசுத்தையாயிருந்தால் நாசித்துவாரத்தால் கொடுக்கவேண்டியது. பிரசவத்திற்குப் பிந்தி (டையோபிரிடிக்) வெயர்வையுண்டாக்கும் மருந்துகளோடு க்ளோரல் ஹைட்ரேட், போட்டாஷியம்ப்ரோமைட்டம் (chloral hydrate and bromide of potassium with diaphoretics) கொடுப்பது பிரயோஜனகரமாகும்.

நாபிக்கொடி கீழாங்கல்.

DESCENT OF THE FUNIS (டிசென்ட் ஆப் தி ப்யூனிஸ்).

நாபிக்கொடி ஒவ்வோர்காலத்தில் பிரசவ ஆரம்பத்தில் உதயமாகும், அல்லது தானாக விழுந்துபோகும்;

அல்லது சிசுவின் கைப் புட்டம், தலை, அல்லது, உதயமாகும் அதின் மறுதொந்தராகத்தோடாவது கீழே இரங்கும். அப்படி இரங்கும்போது நாபிக்கொடியின் பிசுங்கல் பாகம் உதயபாகமாகிருவதால் அழுக்குண்டு, நாபிக்கொடியின் இரத்தவோட்டம் பின்று, சிசுவின் பிராணனுக்கு மலந்தான். அபாயமுண்டாகும். சிசு இவ்வாறு நாடி ஒடுங்கலாலோ முச்சுத்தினராலாலோ மாணசமீபதிசையில் இருக்கின்றது.

இந்த அபாயம் சிசவுக்கே உரியதாகுந்தால் பனிக்குடம் உடைந்ததும், வெருவாய் அபாயமும் தொடங்கும்.

காரணங்கள்.—சிசுவின் கிலைமாலுதலால் அதின் கை முழங்காடி அல்லது பாதங்கள் உதயமாதல், அபரிமித பனிநீர், மிதமிஞ்சின நாபிக்கொடிநீர், பனிநீர் திரவென வெளியாதல், மாயை கீழிரங்கியிருத்தல், உதயபாகம் விளிம்பில் பொருந்தவொட்டாத கூபகவிருபம்—அகிய-இவைகளே.

பரிசீப்பு.—பனிக்குடம் உடையாதிருந்தால், ஸ்திரீயை முழங்கால்களையும், முழங்கைகளையும் ஊன்றிக் குனிந்தாற்போலிருக்கச் செய்யும் பொஸ்துதல் மெதட் (postural method) “குனிவுமுறை” யை உடனே கையாடு. இப்படிச் செய்வது கர்ப்பாசய அடிவாரத்தை கூபகத்திற்கும் கீழ்மட்டத்தில் வரச்செய்து, நாபிக்கொடியை அக்கர்ப்பாசய அடிவாரத்தை நோக்கிச் செல்லவும்பண்ணும். ஸ்திரீயை இந்த நிலைமையில் ஒவ்வொரு தடவையும் 15 அல்லது 20 நிமிஷம் இருக்கச் செய்யலாம். பனிநீர் வெளியாகி, தேய் பரியாயமாட்டிருந்து, தலை கூபகத்தில் ஆழிராங்குதுமிருந்தால், உள்விரல்களால் பிதுங்கிய நாபிக்கொடியைத் தூக்கி, கர்ப்பாசயச் செய்கையில்லாத வேளையில் அதை உதயமாகும் பாகத்திற்குமேலாகக் கொண்டுபோய், கூமொனால் ஒற்றைப்பாதத்திலாகிலும், முழங்காலிலாகிலும் மாட்டி அங்கேயே இருக்கச் செய்யவும். “குனிவுநிலை” யில்

அகிலபமாய் இவ்வாறு செய்யலாம். பாத உதயப்பிரசவங்களில் நாபிக்கொடியை மேலேதூக்கி, பாதத்தைக் கீழே கொண்டுவரவும். இராபெர்ட்டின் பண்டிதரால் உண்டான (Robertson's funis repulsor) “நாபித்தாங்கி” என்னும் ஆயுதம் சில சமயம் பிரயோஜனகரமாகும். அந்த ஆயுதமானது ஓர் கம்பியோடுகூடிய 15 அங்குல நீளமுள்ள லோலாஞ்சேந்த மழமழப்பான இங்கியா ரப்பர்குழல். அதின்முடியுள்ள குணையில் ஒரு துளைக்கண் இருக்குது (இதுபோலவே சாதாரண “கம்பி இலாஸ்டிக் காத்திட்டரு” ம் இதே காரியத்திற்கு உதவும்). ஒருமடிப்பு பட்டுதூலை அல்லது கம்பினிதூலை அக்குழல்வழியாய் நுழைத்து, துளைக்கண்வழியாய் வெளிக்கிழுத்து, நாபிக்கொடியைச்சுற்றி பட்டுதூல்மடிப்பை மாட்டி ஆயுதத்தின்பேரில் தொங்கவைக்கவும்—இப்படி நாபிக்கொடியைத்தாங்கி, சிசுவின் உதயபாகத்திற்கப்பால் கர்ப்பாசய அடிவாரம்வரைக்கும் (அதாவது—நாபிக்கொடி அக்கர்ப்பாசயத்தில் சீராய்ப் படிமானமாகுவரைக்கும்) குழலாயுதத்தை அதின் கம்பியினாலுடையது எழுப்பவும். பின்பு கம்பியை இழுத்தெடுத்துவிட, குழல் தன்யஸ்தானத்தில் வந்துவிடும். அந்தக்குழலானது மிருவியிருப்பதால் பிரசவத்திற்குத் தடையொன்றும் செய்வதில்லை. இன்னுமொரு வகையுண்டு. அது என்னவெனில்—அடைத்த கம்பியினமூலமாய் துளைக்கண்மாரக்கமாக நுழைச்செலுத்தி, குழலுக்குவெளியாய்க்கொண்டுவந்து பிடித்துக்கொண்டு, இரண்டு அங்குல நீளத்துக்கு உட்கருக்குதூல் தொங்கவிடுகையாம். இந்துலை நாபிக்கொடியின் சுற்றிலுள்ளுமேலுத்தி, குழல் ஆயுதத்தின் துணியில் உட்கருக்கி வெதுண்டு, நாபிக்கொடியோ திரும்பித் தள்ளிலையில் வந்தவுடன் கம்பியடைப்பையெடுக்க, அது ஒன்றிலும் கட்டுப்படாமல் சுமமாயிருக்கும்.

19 - ம் அதிகாரம்.

நிலைமாற்றல் அல்லது திருப்பல்.

VERSION OR TURNING (வெர்ஷன் ஆர் டட்டர்னிங்).

“நிலைமாற்றல்” என்பதற்கு சிசு கிடக்கும் நிலையை மாற்றி பிரசவத்திற்கு மெத்த அறுகூலமாயிருக்கும் வேறொரு பாகத்தை யகிணித்திற்குக் கொண்டுவருதல் என்று அர்த்தமாம். வயித்தியர் உதவி அகப்படாத பகலத்தில் மாத்திரம் இந்த கிரியாபிசேஷத்தைத் தான் செய்யவேண்டுமென்பது மருத்துவசிகிக்கு ஸ்பஷ்டமாய் தெரியவேண்டியது.

“திருப்பல்” இரண்டுவகைமாம்—1-வது “தலைத் திருப்பல்” இதில், குழந்தையின் மற்ற எந்த பாகத்திற்கும் பதிலாக தலையையே தனித்து உகிக்கச்செய்வித்த வாம். 2-வது “பாதத்திருப்பல்” இதில், உதயமாகும் மற்ற எந்த பாகத்திற்கும் கிரோஷ்டமாகக்கொண்டு, பாதங்களை முதலில் பிரசவிக்கச்செய்தலாம்.

1-வது.—தலைத் திருப்பல்.—கர்ப்பாசய ஒஞ்சரிப்புச்சமயங்களிலும், பணிக்குடம் உயராதபோதும், உடைந்தாலும் குழந்தைக்கு விசேஷ சலனாக் கியிருக்கையிலும் ஆகும்புஜவுதயங்களிலும், முக-புருவ-உதயங்களிலும், கையிரக்கத்திலும், அல்லது தலைப்பக்கமாகிக்கொடியிரக்கத்திலும், “தலைத்திருப்பல்” செய்யப்படும். முதல் மூன்று சந்தர்ப்பங்களில்—அதாவது—கர்ப்பாசயம் பிண்டம் இவற்றின் ஒஞ்சரிப்பிலும், புஜ உதயத்திலும் சிசு அசையக்கூடியதாயிருப்பதால், கர்ப்பாசயம் சரிசெய்தாய்க்கானும் பக்கத்திற்கு எதிர்ப்பக்கமாக ஸ்திரீயை படுக்கவைத்து பிண்டநிலை மாற்றப்படும். எப்படியெனில்—தலையானது இடது இடுப்பெலும்புக்கு நேராகவும் கர்ப்பாசய அடியானது புட்டத்தோடு தாயின் வலது முள்ளந்தண்டிற்கு நேராகவும் இருந்தால், ஸ்திரீயை இடதுபக்கம் படுக்கவைப்பதால் கர்ப்பாசய அடிப்

புறம் அந்தப்பக்கமாக சாயும். அப்போது தலையானது உயரக்கினம்புவதோடு கூபகவிளிம்புக்குசலபமாக திரும்பிவரும் சக்தியையும் அடையும். தலை ஒருதரம் கூபகவிளிம்பில் இருக்குமாகில் பணிக்குடத்தை உடைத்து, இடுப்பை இறுக்கிக்கட்டவும்.

வெளிப்புறமாக ஒரு கையால் பிடரியை அமுக்கி இன்னொருகையால் முகவாய்க்கட்டையையும் நெற்றியையும் உயர்த்துதலினால் முக - நெற்றி - உதயங்கள் சீர்த்திருத்தப்படும்.

தலைப்பக்கமாக கை யிறங்குவதை அவசியம் செய்தால் தலை கூபகவிளிம்பைவிட்டு ஒதுக்குண்டு அதினால் புஜ உதயத்துக்கு ஏதுவாகும். ஆனபடியினாலே அதை முன்னே கண்டபிடிக்கவேண்டியது ஆவசியகமாம். உதயமாகும் கையை மேலேதள்ளி, அதே சமயத்தில் வெளிக்கையால் கூபகவிளிம்புக்காய் தலையை கீழுக்கு அமுக்கவும். கூபகவிளிம்பில் ஒருதரம் தலை இறங்கிவிட்டால், கையானது மதுபடியும் கீழே இறங்கமாட்டாது.

2-வது.—பாதங்களைத் திருப்பல்.—தலைத் திருப்பம் சாத்தியமாகாத பிரேமயந்தரில் பாதத்திருப்பம் செய்யப்படும். புஜ உதயங்களிலும் பிண்டத்தின்கால்கள் தலையையப்பார்க்கிலும் கர்ப்பாசய வாய்க்கு அருகில் இருக்கும் தருணங்களிலும் இப்படிச் செய்யப்படும். பணிக்குடம் உடையாதிருந்தாலும், அல்லது அப்போதுதான் உடைந்தாலும், கைமுழுதும் கர்ப்பாசயத்திற்குள் செலுத்தாமல் பிண்டத்தின் கூபகம் தலை ஆகிய இருகோடிகளையும் அசைத்துத் தலாம். இது “பை-போலார் பொலிக் வெர்ஷன்” என்று சொல்லப்பட்ட “இருபாதத்திருப்பம்.” தாமதப்பட்ட பிரசவங்களில் பணிநீடால் வாம்வறண்டு குழந்தையின்பேரில் கர்ப்பாசயமும் அதிமாயச் சுருங்கிச்சாய்ந்தால், பிள்ளையைத்திருப்ப கர்ப்பாசயத்திற்குள் கைமுழுதையும் உட்செலுத்தல் அவசியமாகும். இது “பூர்வகாலத் திருப்பல்முறை” யாக்கும்.

206

நிலைமாற்றல் அல்லது திருப்பல்.

(a) பை-போலார் போடாலிக் வெர்ஷன்.—பாதங்கள் அல்லது முழங்கால்கள் கர்ப்பாசய வாயண்டையிருக்கிறதுக்கியோ அல்லது பிதுங்காமலோ இருக்கும்கையுடன் ஆகும் புஜ உதயங்கிலும், முன்கை பின்கையோடாவது அக்கையை கர்ப்பாசயத்தில் தங்கவொட்டாத உதிக்கும்மற்றெந்த அலியுவித்தோடாவது சேர்க்கையாய்க்காணும் “நாபிக்கொடித்தொங்கல்” சமயங்களிலும், அக்ஸ்மாத்தான உதிரப்பிரவாகம் “முன்தோன் லுமாயை” இவ்விதகோளாறுகளால் துரிதப்பிரசவம் ஆகவேண்டிய சமயங்களிலும், கர்ப்பாசயம் கிழந்து சிசு செத்தாற் போல் கிடக்கையிலும், “இருபாதத்திருப்பம்” செய்ய வேண்டியது.

இவ்விருபாதத்திருப்பத்திற்குச் சில நிலைகள் அதுகூடலமாகிருக்கும். அவையாவன—யாதொரு காயமின்றி சிசு பிரவேசிக்கக்கூடியதான விசாலகூபகம் உடைத்தாய் இருத்தலும், (சிசு பிரவேச) மார்க்கங்கள் போதுமான அளவு அகன்று அல்லது அகலக்கூடியதாய் இருத்தலும், உதயபாகம் கூபகத்தில் ஊன்றியதாயிராமல் அசைக்கக்கூடியதாயிருத்தலும், சிசுவின் சவ்ஸ்சக்தி தடைப்படுமபடியாக முகின்பேரில் கர்ப்பாசயம் அகிகமாய்ச் சுருங்கிச்சாய்விருத்தலுமாகும்.

புஜம் அசைக்கத்தக்கது இருந்து, கைபிதுங்கித்தொங்குவதாயினும், இவ்விருபாதத்திருப்பம் கஷ்டமாயிராது. ஆனால் புஜம் கூபகத்துக்குள் புகுப்பதிலும், கர்ப்பாசயம் பலமாய்ச் சுருங்கியுமிருந்தால் இந்த சிகிச்சைக்குத் தடையுண்டாகும்; ஏனெனில் பாதத்திருப்பத்திற்குச் செய்யும் முயற்சிகளால் கர்ப்பாசயின்னம் உண்டாவதாலென்க.

பாதத்திருப்பச்செய்கை மூன்றுகிரியைகளாக வகுக்கப்படும்:

1-வது கிரியை.—உதயபாகத்தை கர்ப்பாசயவாயண்டையிருந்து நீக்கி அங்கே முழங்கால்களை இருத்தல்.

2-வது கிரியை.—ஒருமுழங்காலைப்பிடித்திழுத்தல்.

3-வது கிரியை.—முழங்காலை கீழேயிழுத்து தலையை மூண்டத்தையும் மேலேகிளப்பி, அதினால் “திருப்பல்” கிரியையை முடித்தல்.


பெரும்பாட்டின் கிமித்தமாவது சிக்கான் வேறெந்த வியாதி-கிமித்தமாவது பிரசவத்தைத் துரிதப்படுத்த ஆவசியமான கிரியையாயிராநின்ற “முழுத்திருப்புகலை” சிவரித்துக்காட்டுமபொருட்டு, உச்சியுதயத்தின் முதல் நிலையை ஒரு திருஷ்டாந்தரமாக வெடுத்துக்கொள்ளலாம். இச்செய்கையை ஆரம்பிக்குமுன் மூத்திரப்பையையும் மலக்குடலையும் வெறுமையாக்கவேண்டும்.

கர்ப்பினி இருக்கும் நிலை.—பிரசவக்கிருத்தலில் தொன்றுதொட்டு வழக்கமான நடவடிக்கைகளையல்லாமல் வித்தியாசமான புது ஏற்பாட்டினால் கர்ப்பினியையும் அவள் பந்துபித்திரர்களையும் தானு கலங்கச்செய்வது அனாவசியமும் அயுத்தமுமான காரியமாதலால், ஸ்திரீயை “மருத்துவக்கிரமநிலை” யில் படுக்கவைக்கவும், பந்துக்களிடம் பிரசவத்திற்கு உதவிதேவையென்றும் பிராணபாய பயங் கொள்ளவேண்டியதில்லையென்றும் சொல்லவேண்டியது.

ஜென்னமாரீக்க ஸ்திதி.—கர்ப்பாசயவாய் இரண்டுவிடங்களுக்குத் தாராளமாய் இடங்கொடுக்குமானால், அது சிசுவைத் திருப்புவதற்குப் போதுமானது; அல்லது சிசு விளந்தலையும் முண்டமும் சேஷ தாமதமின்றி செல்லும்படியாக (பிரசவம்) உத்தேசியகாரியமாதலால்) கர்ப்பாசயவாய் அகன்று அல்லது அகலக்கூடியதாய் இருக்கவேண்டியது. இனிக்குடம் உடையாதிருந்தால் அவ்வுளவும் காரியமாதலுமில்லாததான். ஆனால் அது உடைப்பதற்குந்தாலும் அதற்குத்தக்கபடி காரியத்தைநடத்தலாம் லித்தமாயிருக்கவேண்டியது.

இந்த சிகிச்சையை ஆரம்பிக்குமுன், சிசுத்தலையின் சரியானநிலையைக் கண்டுபிடிப்பது அவசியம். இப்போது எல்லாம் லித்தமானதால், சிகிச்சாக்கிரமத்தைச் சொல்ல ஆரம்பிப்போம்.

பதினாந்தாம் படம்.




இது இருபாதத்திருப்ப முகவந்தியைக் காட்டுகிறது.

இது கர்ப்பாசய அடிப்பாகத்தின்மேல் இருக்கும் வலதுகையானது புட்டத்தை வலப்புறமாகவும், பின்புறமாகவும் தள்ளுகிறது. தலையின் உச்சிமேலிருக்கும் இடத்தைவிரல்கள் தலையை இடது இடுப்பெலும்புக்காய் தள்ளுகின்றன. (இது ஆர். பார்னஸ்டனிடர் கொள்கை.)

உன் இடதுகையின் பின்பக்கத்திலும் மணிக்கட்டிலும் எண்ணெய்பூசி விரல்களையெல்லாம் கூச்சபோல் ஒன்றாய்க்குப்பி, பிடிக்கப்பள்ளத்தின்பக்கம் யோனிக்குள் கையைச்செலுத்து. இப்படி கையைச்செலுத்துவதற்குமுன் ஒரு இடுப்புநோய் வருகிறதாவென்று காத்கிருப்பது உத்தமம். எனினில், அப்போது அந்தபாகங்கள் தளர்ந்திருக்கும்; கையும் வெகு இலகுவாய் உட்சென்றுவிடும். அதுவுமன்றி பிரசவநோய்கைப்பிரயோகத்தால் ஜனிக்கதேயை ஒருபாகம் தோன்றாமற்செய்துவிடும். அப்புறம் நாய் தணியும்வாக்கும் பொறுத்திருந்து, உதயமாகுபாகம் முதல்கிலையில் தலையென்று நாம் வைத்துக்கொண்டதால், இரண்டுவிரல் துளிகளை கர்ப்பாசயவாய்க்குடாக அத்தலையண்டைகொண்டுபோய் இரண்டுபாதசூனாகப் பிரிக்கப்பட்ட முதற்கிரியையைத் தொடருவேண்டும். புட்டமிருக்கும் கர்ப்பாசய அடிப்பாகத்திலுமிருவலக்கையை விரித்தாற்போல் வைத்துக்கொண்டு இடதுகையின் விரல்துளிகளால் தலைமேல் மெதுவாகத்தட்டி அதை கூபகவிளிம்பின் குறுக்காகப் பிடரியிருக்கும் பக்கத்துக்கு - அதாவது இச்சமயம் இடதுபக்கத்துக்கு - தள்ளவேண்டும். அப்புறம் முதல்கிலையிலும் நான்காம் கிலையிலும் தலை இடதுபக்கமாயும், இரண்டாம் மூன்றாம் கிலைகளில் வலதுபுறமாயும் தள்ளுணை. வெளியில் இருக்கும் வலதுகை சிகவின்புட்டத்தை வலதுபுறமாயும் கீழ்க்காய் வலது இடுப்பெலும்புக்காய்க்குடாகத்தள்ளும்.

தலை கர்ப்பாசயவாயைவிட்டுப்பெயரவும், புஜம் அல்லது மார்பு அதனிடத்தில் வரவும், அதனால் பிள்ளையை ஏறக்குறைய குறுக்காகத் திருப்பவும், ஒருகிமிஷம் போதுமானது.

பதினாறாம் படம்.



இது முதல்கிரியையின் இரண்டாம்பாதத்தைக் காட்டுகிறது.


இன்னும் கர்ப்பாசய அடிப்புறத்தில் இருக்கும் வலதுகை புட்டத்தைத் தள்ளி கூப்ப விடும்பிறகு மேல் முழங்கால்களை வரச்செய்கிறது. அப்போது இடதுகை கூப்ப விளிம்பிற்குக் குறுக்காய் இடது இடுப்பெலும்பின் பள்ளத்தில் புஜத்தைத் தள்ளுகிறது. (இது ஆர். பார்னெஸ்பண்டிதர் பத்தி.)

தலையிருக்கும்பக்கமாக புஜத்தை நெட்டி முழங்கால்கள் கர்ப்பாசய வாயண்டையில் வருமளவு புட்டத்தைத் தள்ளுகிறது. இன்னும் கீழுக்கு அழுக்கித் தள்ளுவதே பிரசவ இரண்டாம்பாதமுதல் கிரியையை நீடிப்பித்தலாம்.

இரண்டாம் கிரியை.—பலிக்குடம் உடையா திருந்தால் இப்போது அதை உடைத்து, ஒரு முழங்காலைப் பிடித்துக்கொள்.

பதினேழாம் படம்.

FIG. 17



இது இரண்டாம் கிரியையைக் காட்டுகிறது.

கூப்ப விளிம்பின்பேரில் முழங்கால்கள் வானம் இருக்க, இடதுகையின் நடுவிரல் அத்தண்டை முழங்காலின் மடிப்பில் மாட்டி அதைக் கீழுக்கு இழுக்கிறது. அதேசமயத்தில் வலதுகை கர்ப்பாசய அடிப்புறத்தையும் புட்டத்தையும் விட்டு இடுப்பெலும்பிலிருக்குத் தலையீதுபோல் அதை மேலுக்குத் தள்ளுகிறது. (இது ஆர். பார்னெஸ்பண்டிதர்முறை.)

அத்தண்டையிருக்கும் முழங்காலைப் பிடித்துக்கொள்வது உத்தமம். ஏனெனில் அப்போது பிள்ளை அறிசலபாக சுழலும். முழங்காலைப் பிடித்தவுடன், வெளியில் புட்டத்தின்மேல் வைத்திருக்கும் வலதுகையை விட்டுவிட்டு, இடது இடுப்பெலும்பின் பள்ளத்தில் இருக்கும் தலையின்கீழ் உள் உள்ளங்கையைவிட்டுத் தாங்கிக்கொள்.

முன்றும் கிரியை.—இப்போது தலையை மேலேறத்தள்ளி, அதேசமயத்தில் உள் இடதுகையால் பிடித்த முழங்காலையும் காலையும் பின்புறமாக இழுக்கவும். இவ்வித

மாய் குழந்தையின் (தலைகால்) இரண்டு அந்தங்களிலும் (நள்ளை-இழுத்தல்) செய்கைகளிரண்டையும் நடத்திவர, தலை விளம்பி கர்ப்பாசய அடிவாரத்தில் சென்றுபடியும். கூபக விளிம்பிற்குள் புட்டம் இறங்கும். தாயின் கூபகத்திற்கு எதிராகக் குழந்தையின் முதுகாவரும். தலை

பத்னெட்டாம் படம்.

FIG. 18




இது நடந்துகொண்டிருக்கும் மூன்றாம்கிரியையைக் காட்டுகிறது.

வலக்கையானது தலையை இடுப்பெலும்பின் பள்ளத்திலிருந்து மேலேறத் தள்ளிக்கொண்டிருக்கிறது. இடக்கையானது அந்தண்டைக்காலேப்பிடித்து கூபகவிளிம்புக்காய் இழுக்குகிறது. இப்போது நிலைமாற்றல் ஏறக்குறைய தீர்ந்தியாய்விட்டது. (இதுவும் ஆர். பார்னெஸ் பண்டிதர்முறை.)

இருந்த இடத்தில் புட்டம் சேருவதினால் சிசுநிலைமாற்றல் தீர்ந்தது.

பத்தொன்பதாம் படம்.

FIG. 19



இது மூன்றாம்கிரியை முடிவுப்பாட்டைக் காட்டுகிறது.

கர்ப்பாசய அடிவாரத்தண்டை இப்போது சுற்றிக்கொண்டெவரப்பட்ட தலையை இன்னும் வலதுகை தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. இடதுகையானது இடதுகாலே கீழ்ப்புறமாக கூபக திருவத்திற்கு இழுக்கிறது. நிலைமாற்றல் முடிந்துபோயிற்று. குழந்தை அதின் நீண்ட திருவத்தில் சுழல ஆரம்பித்து, புட்டம் கூபகத்தில் பிரவேசிக்க, முதுகு முன்னுக்கு வருகிறது. (இதுவும் ஆர். பார்னெஸ் பண்டிதர்முறை.)

214 நிலைமாற்றல் அல்லது திருப்பல்.

இடுப்புநோய் பலமாய் இருந்தால் யாதொன்றுஞ் செய்யாமல் பிரசவம் நடந்தேற விட்டுவிடலாம். ஆனால் புட்ட உதயத்தின் தீர்வகிப்பிலெப்படியோ அப்படி சில சமயம் சிசுவை இழுத்தல் அவசியமாகில், வைத்தியர் உதவியும் அவசியமே.

(b) பூர்வவழக்கப்படி சிசுவைத் திருப்பல்.—கர்ப்பாசயத்தில் சிறிது பணிநீர் இருக்கும்படியந்த இருபாதம் பிடித்துத் திருப்புகல் சாத்தியமானது. ஆனால் சற்று நேரம் பணிக்குடம் உடைப்பட்டு கர்ப்பாசயத்தில் பணிநீர் இல்லாமற்போகும் புற உதயங்களில் அக்கர்ப்பாசயம் சுருங்கி குழந்தையின்பேரில் சாய்வதால், கைமுழுவதையும் கர்ப்பாசயத்திற்குள் செலுத்தினால்தான் “திருப்பஞ்செய்தல்” ஆகும்.

எந்தக்கையை உபயோகிப்பது விதி என்றால்—“முதுகு எதிர்ப்புறமிருக்கும்”. எல்லா நிலைகளிலும் கர்ப்பிணியை இடதுபக்கம் ஒஞ்சரிக்கச் செய்து கர்ப்பாசயத்திற்குள் பிடிக்க எலும்புக்குநேராய் இடதுகையைச் செலுத்தி, கர்ப்பாசய அடிவாரத்தை வெளிப்புறம் வலதுகையால் தாங்குவதேயாம். “வயிறு எதிர்ப்புறமிருக்கும்” நிலைகளில் கர்ப்பிணியை மல்லாக்கக்கிடத்தி இரண்டுகைகளில் எதேனும் ஒன்றைப் பிரயோகி.

முதுகு எதிர்ப்புறமானநிலை (டார்ஸோ - ஆன்டிரியர் பொசிஷன்).—வெளிகண்ட கையின் உள் ஓரமாய் உள் இடதுகையை யோனாக்குள் செலுத்து. சிசுவின் புறமானது கூபக்விளிம்பை அடைத்துக்கொண்டிருப்பதால் கையை உட்செலுத்தக் கஷ்டமாயிருக்கும்; இடுப்பு நோய்வரும்போது நிறுத்தி கையை இலேசாகக் கொண்டு வந்து, புறத்திற்கு கீழாக அறைச்சத்தில் வெளிப்புறமாக இருக்கும்கையை செலுத்துவதால் புறத்தை மேலெழுகனக்கலாம். கூபக்விளிம்பைக்கடந்தபிறகு கர்ப்பாசயக்குழிக்குள் கையைச் செலுத்து. இதனால் கை விரைத்துக்கொண்டு வலிப்பெடுக்கும்படியான சுருங்கு

தல் உண்டாகும். ஆகிலும் ஜாக்மிரதையாய் சிசுவின் பேரில் படிந்தாற்போல் விரல்களைப் பரப்பி இடுப்பு நோவு திருத்தவனாயில் காத்திருக்கவேண்டியது.

இப்போது கை நாபியண்டை யிருப்பதினால் நாபிக் கொடித்துடிக்கிறதாலென்று நீ தொட்டறிய நல்லதருணங்கிடைக்கும. சிசு ஜீவித்திருக்கிறதாலென்று அறியவும்படும். நாபியண்டையில் முழங்கால்களிருக்கும்; அந்தண்டைய முழங்காலை அதன்மடிப்பில் ஓர் விரல்விட்டு பிடித்துக்கொண்டு ஒரோநிதானமாய்க் கீழுக்கிழுத்து, வெளியிருக்கும்கையால் சிசுவின் தலையை களைப்பவேண்டியது.

வயிறு எதிரான் நிலை (அப்டாமினோ - ஆன்டிரியர் பொசிஷன்).—கர்ப்பிணியை மல்லாக்கக்கிடத்தி (அவளுக்கு இடதுபக்கத்தில் மருத்துவச்சி இருந்துகொண்டு) தன் இடதுகையை மேகனவெலும்புக்குப் பின்புறமாக உயர்த்திக் கர்ப்பாசயக்குழிக்குள் செலுத்தி அந்த ண்டைமுழங்காலைப் பிடித்துக்கொள்ளலாம். வலது கையைச் செலுத்துவது நலமாயிருந்தால் மருத்துவச்சி கர்ப்பிணியின் வலதுபக்கத்தில் இருக்கவேண்டியது.

கை பின்னுக்கு புரண்டுபோதல்.

DORSAL DISPLACEMENT OF THE ARM.

(டார்சல் டிஸ்பிளேமெண்ட் ஆப் தி ஆரம்.)

கவிழ்ந்த பிரசவத்தில் ஒவ்வோர் காலத்தில், முண்டம் வெளிகண்டபிறகு ஒரு கையை யோ அல்லது கைகளை இரண்டையுமோ விடுவித்தல் அதிபிரயாசங்கொடுக்கும். பெரும்பான்மையான பிரசவங்களில் காணும் இவ்வாபத்து சிசுவைப் பாதம்பிடித்துத் திருப்பினபிறகு உண்டாகும் - இது பெரும்பான்மையும் பிரசவ தீர்வாகக் குறைவின் பலனும். அக்கையைத் தலைக்குமேல்தா

க்கி, பிறகு அதை கழுத்திற்கு பின்புறமாய் தாண்டுவிக்
கலாம் - அப்புறம் பிண்டநிலைக்கு ஏற்றபடி மேலிருந்து
கீழாகவும், முன்புறமிருந்து பின்புறமாகவும் கையைத்
தாண்டுவிக் கலாம். இரண்டாவது, கையை பிண்டமு
துகின்மேல் கிளப்பி கீழேயிருந்து மேல்நோக்கி பிடரிக்கு
அடியில்லிதுத்தி அதைத் தாண்டுவிக் கலாம். கைகளின்
இயற்கைஸ்தானம் மார்பின்பக்கங்களாய் ஆனால், புட்
டம் உதயமாகும் பிரசவங்களில் அல்லது சிசுவைத்
திருப்பும் பிரசவங்களில் முண்டம் மார்பின்புறம்
அனுவசிய சிசிச்சைக்குப் பிரவேசிப்போமாகில், முக்கி
யம் அதன் சுழற்சிக்கு உதவிபுரிய முண்டம் மார்த்திரம்
அசையும்; கையோ பின்தங்கி - அங்கே நோக்கி எலும்
புப்பொருத்தில் சிக்கிக்கொண்டு, கழுத்திற்கு அருகில்
அழுக்கும்வரைக்கும் அங்கேயே நின்றுவிடும்.

இந்தக் கஷ்டத்தை வெல்லுவதற்கு இடுப்புக்கு
மேல் சிசுவின் உடம்பை இருகையாலும் பிடித்து, முது
கைச்சந்திரை இடப்புறமாய்க் கொண்டுவரத்தக்க ஒரு
சுழற்சியுண்டாக்க உடம்பை அசைப்பாயாக.

சுழற்சி விஸ்தரித்துவேண்டுவதில்லை, ஒரு வட்ட
த்தில் எட்டில் ஒருபங்கு சாதாரணமாய் போதுமான
து - இதனால் கையானது முகத்திற்கு நோக்கிக்கொண்
டவரப்பட்டு எளிதில் விடுவதாயும்.

20 - ம் அதிகாரம்.

நீண்ட குறடுகள்.

THE LONG FORCES (வாங்க் பார்ஸெஸ்).

இந்தக்குறடுகளைப் பிரயோகிக்கும் வகையை யெடுத்
துக்கவதற்கு முன் (பூடோசியா) "சாதாரண" அல்
லது "சுலப" நிலைமம் இன்னதென்றும் (டிஸ்டோ
சியா) கஷ்டப் பிரசவம் இன்னதென்றும் தெரிந்துகொ
ள்வது அவசியமாகும். பிரசவ நோக்கத்தை நிதானிக்
கையில் கவனிக்கத்தக்க அமிசங்கள் மூன்று உள்ளன :
1-வது.—பிரசவ நிலைப்பு; 2-வது.—பிரசவவேத
னையின் கூறு; 3-வது.—கர்ப்பினி அதனால் அடையும்
குணகுணங்கள். இந்த அமிசங்கள் மூன்றையும் உற்
றுப்பார்ப்பதால் பிரசவம் கஷ்டமானதா அல்லவாவென்
று கண்டறியலாம். உட்புறப்பரிசோதனையால் பிரச
வகஷ்டத்திற்குக் காரணம் இன்னதென்று வெளிப்படுவ
தோடு, அதைப் பரிசுத்தரிக்கும் உபாயமெதுவோ அது
வும் புலப்படும்.

பிரசவநோய் ஒங்குகைக்குரிய முக்கிய லட்சணங்
கள் மூன்று : 1-வது.—வெளிகாணவேண்டிய சிசுவின்
சரிசும் அதாவது பிண்டம்; 2-வது.—சிசு தள்ளுண்டு
வரவேண்டிய கூபக வெலும்போடும் மிருது மாமிசங்க
ளோடுக்கூடிய யோனிமார்த்தம் (இக்கூபகவெலும்பு
மிருதுபாகங்களாகிய இரண்டும் சேர்ந்து சிசுவை யெ
திர்த்தாக்கித் தடைப்படுத்தும், இத்தடைப்பாட்டை
சுமர்த்திக்கவேண்டியிருக்கிறது); 3-வது.—கர்ப்பாசய
த்துக்கும்வயிற்று நரம்புகளுக்குமுள்ள விசர்ஜனை சக்தி.
கூபப்பிரசவஞ் செய்விக்கவேண்டுமாயில், இவையெல்
லாக் குணமிசங்களையும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதியா
து பொருந்தும்படி நீர்வகிக்கவேண்டியது. இந்த அமி
சங்கள் எதிலேனும் பிசுதிருந்தால், பிரசவம் தடைப்ப
ட்டு நிற்கும்.

(lock) பூட்டிற்ும் மத்தியில் அப்பூட்டு மர்மஸ்தானத் தில் படாமலும் விடப்பத்தைச் சேதப்படுத்தாமலும் செ ல்லத்தக்கதாய், தன் ஜதையான மற்றக்காம்பிற்கு ரே ராய் ஒரு நெட்டைக் காம்பு இருக்கவேண்டும். “பர் னேஸ்” குறடுகளில் ஒரு காம்பு (ஷான்க) மற்றக் காம்பு டன் சேர்த்துப்பூட்ட, ஓர் வளையமாகும். அர்த்தசக் கிராகார வில்லினால் இன்னும் அதிகம் நீட்டும். இதின் ஒரு கைப்பிடியைப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கவும், மற்றொரு கைவிரலுக்குப் பிடிப்புதருவதே இக்காம்பின் பிரயோஜனமென்க. “சிம்சன்” (குறடு) ஆயுசத்தில் ஒவ்வொரு கைப்பிடியின் உச்சியிலும் குடைந்த டொங் கான புஜம்போன்ற தொன்றிருக்கிறது: அதுவும் அ தேவகையான காரியத்திற்கே உதவும். பூட்டு திறக் கச் சுலபமாயும் கொஞ்சம் தளர்ச்சியாய் இருக்கவேண் டும். கைப்பிடிகள் ஐந்து அங்குல நீளத்திற்குக் குறை யாம இருக்கவேண்டும். அவைகள் பிடிக்க நல்ல வாட் டமாயிருக்கவேண்டும்.

நீண்ட குறடுகளைப் பிரபோகிக்கும் விதம்.


கர்ப்பினி இருக்கவேண்டிய நிலை.—அவள் மருத்துவ த்துக்கிசைந்த (obstetric) நிலையில் இருக்கவேண்டும்.

அலகுகளை உட்சேலுத்தும் விதம்.—அலகுகளைத் தெரி ந்தெடுக்கை. அவைகளை வெந்நீரில் தோய்த்து உலரத் துடைத்து, மெருகிடவும். அலகுகளை ஒன்றாக இணை த்து, குறட்டின் கூபக வளைவுக்குழியில் குறட்டையும், கூபகத்தில் அலகுகள் அடையவேண்டிய நிலையில் அவ குகளையும் முன்னோக்கிவரப்பிடித்துக்கொண்டு, இட துபக்கத்தில் அல்லது கீழ்ப்பக்கத்தில் கிடக்கவேண்டிய அலகை முன்னே எடு. “முதல் நிலை”—விடபத்தி லும் கர்ப்பாசயக்கூழ்த்து - சிசுவின் தலை - இவற்றின் மத் தியிலும் உன் இடதுகையின்—இரண்டொருவிரலை—உள் னே செலுத்து. பின்பு குறடுகள் ஒன்றோடொன்று தொடுத்திருக்கின்ற நிலைகளையும் சிசுவின் தலையையும் கூபகப் பாதையையும் ஞாபகத்தில் படியை க்குத்துக்கொ

டு, ஏறக்குறைய நேர் பின்புறமாக பிடிக்கைக்குழி யை நோக்கி உள்விரல்களின் உள்ளங்கைப்பக்கம் அவ ளின் ஹனியைச் செலுத்து.

இருபதாம் படம்.

FIG. 20.




இது “முதல் அல” கைச் செலுத்தும் முதல்நிலையைக் காட்டுகிறது.

இரண்டாம் பாதம்.—சிசுவின் தலைக்கு இடதுபாரிசத் தின்மீது அவகின் ஹனியிறங்கிச் செல்லத்தக்கதாய் குற ட்டின் பிடியை இப்பொழுது உயர்த்தவேண்டும். தலை யைச்சுற்றிச் செல்லும்படியாகவும், கூபகவிளிம்பைக் கட்டுவதற்கு (Varus' curve) பிடரிவளைவின் பக்கம் மு ன்னோக்கி மேலே அம்படியாகவும், அலகின் ஹனியான து ஓர் இரட்டை அல்லது தொந்தவளைவுவரையவே ண்டியிருப்பதால், ஆயுதத்தின்பிடி ஒரு சிறிது தன் னுருவத்தில் சுழலும்.

இருவத்தோன்றும் படம்.

FIG. 21.



இது குறட்டின் முதல் அல்லது இடது அலகைச் செலுத்தும் விதத்தைக்காட்டுகிறது.

1, முதல்நிலை: A - கைப்பிடியானது அப்புறம் குறுக்கே கொண்டோராய் உயர்த்தப்பட்டு, சற்று அதின் தருவத்திலிருந்து திறகு B-யின் பக்கமாய் சுழற்றப்படும். 2, இரண்டாம்நிலை - அதாவது - அலகானது தலையைச் சுற்றிக்கொண்டு இடது இடது பெலம்புக்கு மேலாகச் செல்லுதல். 3, மூன்றாம்நிலை: B-என்னும் கைப்பிடியானது B O - யிருக்கும் பக்கமாய்ச் சென்று C - இடத்தில் அது தன்னிலையில் திற்கும்வரையில் உபாயமாய்ச் சுழன்றுகொண்டிருக்கும். (இது ஆர். பார்டென்ஸ் பண்டிதர் பத்தி.)


மூன்றாம் நிலை - அலகின் துனியானது தலையைச் சுற்றியும் இடது இடதுபெலம்பைத் தாவிநீர் தான்செல்ல வேண்டிய விடமெல்லாஞ்சென்று முடிக்கும்வண்ணம், தின்னுக்கும் கீழுக்கும் அது இப்போது கொண்டோராகப்பட்டவேண்டும். இதற்கு இலேசாய் அழுக்குதலே போதுமானதாயிருக்கவேண்டும். இது அலகிற்குச்சலனத்தைத்தரும். பீடிகை எலும்புக்கும் தலைக்குமிருக்கும் சம்பந்தமே அலகைச் சரியானபக்கம்நடத்தும். அலகு இப்போது அதின் யதாஸ்தானத்திலிருக்கும். ஆயுதத்தைப்பிரயோகிக்கும்வர் இரண்டாம் அலகை உள்ளேசெலுத்துகையில், இது புறங்கையால் புச்சு எலும்பின்மீது குறட்டின்காம்பை அழுக்கவேண்டும்.

இரண்டாவது அலகைப்பிரயோகித்தல். முதல் நிலை - விடபத்திப்படாமல் முதல்அலகைப் புறங்கையால் தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் இடது கைவிரல்களிரண்டு கூபகவாய்க்கும் வலது இடதுபெலம்புக்கு அதிசயிப்பத்திலுள்ள தலையின்மீதுசத்துக்கும் மூலில் கூபகத்திற்குள் செலுத்தப்படும்.

வலதுகையில் பிடித்த ஆயுதமானது தாயின் இடது தொடைக்குக் கிட்டத்தட சட்டமாய்க்கிடக்கும். இரண்டாம் அலகின் முனையோ முதல் அலகின்காம்பைத்தாண்டி விடபத்திற்குள் புருந்து பீடிகைக்குழிக்காய் விரல்களின் உள்ளங்கைப்பக்கமாய் யோனிக்குள் வழுவிவிழும். இரண்டாவது நிலை - தலையைச் சுற்றிவந்து (Carus' curve) பிடரி வளைவுபுக்கம் முன்னோக்கிச்செல்லும்பொருட்டு அலகின்முனை ஓர்வளைவு வரையவேண்டியிருப்பதால், இப்போது கைப்பிடியை அழுக்கி அலகு வலது இடதுபெலம்பில் வந்து படியும்வரைக்கும் அதைப்பின்புறம் கொண்டோராகவேண்டியது. பிடி இந்த நிலைக்குவந்ததும் அதுமுதல் அலகிற்கு சற்றேறக்குறைய எதிர்த்துக்காய்வு புச்சு எலும்புக்குச் சமீபமாகவுயிருக்கக்காற்றலாம்.

இருபத்திரண்டாம் படம்.

FIG. 22.



இது நீண்டகுறடுகளின் இரண்டாவது அதாவது வலது அலகைப் பிரயோகிக்கும் விதத்தைக் காட்டுகின்றது.

1, இரண்டாவது அலகின் முதல் நிலை. 2, அலகின் இரண்டாம் நிலை. X குறப்பிட்ட முதல் அலகைத் தாண்டி, பிடிக்கக் குழியில் விடப்படுகின்றது. C - என்னும் அலகின் முனைக்குச் செல்லுகிற சருணத்தில் A - கைப்பிடியிருக்கும் நிலையாம் அப்பறம் கைப்பிடியானது விழுந்து விழாறாய் B - ஸ்தானத்திற்காய்ப்போய்ச் செலும். D - யானது வலம்வந்து கூபகமுக்கட்டுத்துருவத்தின் பக்கமாய் வலது இடுப்பெலும்புக்குள் D - யிடத்திற்குச் செல்லும்.

பூட்டுதல். - பொருந்தும்படி குறடுகளை இலேசாய் அசைத் தசைத்துப்பார்ப்பதால் இந்தப்பூட்டுதல் நிறைவேறும். கைக்கு ஒரு பிடியாய் இருபிடிக்கையும் பிடித்துக்கொள்ளவேண்டும். முதல் அலகின் பிடியை இரண்டாம் அலகின் பிடிக்குச் சிறிது முன்னுக்குக் கொண்டு வரவும். ஒரு அலகைக்காட்டிலும் மற்றொரு அலகு கூபகத்தில் சற்று ஆழ்த்திருக்குமாயில் சரியாக பூட்டு விழும்படியும் அவற்றில் ஒன்றை வெளிக் கிழுத்துவிடவாவது வேண்டும் அவ்வது மற்றொன்றை உள்ளுக்குத் தள்ளிவிடவாவது வேண்டும். புச்சளலும்பின்மேல் தாக்குமபடி பிடிகளிரண்டையும் பின்னுக்கு அழுக்குவதால் இக்காரியம் சாதாரணமாய் எளிதில் முடியும். இந்த (பூட்டுதல்) இப்பக்கமானதுதான் இடுப்பெலும்புகளில் அலகுகளை நன்றாய்த் தள்ளி, பிடிகள் சரியான நிலையில் படியுமாறு அவற்றைச் சற்று சுழலச்செய்யும்.

சரியாய்ப் பூட்டு விழுதல் சாதாரணமாய் அலகுகள் தலைக்குச் சரியாய் பொருந்தியிருக்கிற தென்பதற்கும், கூபகம் அதுகூட ஆயுதப் பிரயோகத்திற்கு இசைந்ததாயிருக்கிற தென்பதற்கும் அத்தாட்சியாம். இதுவிற்க, பூட்டு விழாமைப் பாவெனில் அலகுகள் சரியாய்ச் செலுத்தப்படவில்லையென்பதற்கோ அல்லது அவற்றைச் செலுத்துவதற்கு கூபகம் இசையவில்லையென்பதற்கோ திருஷ்டாந்தமாம். முதலாவது - அலகுகள் சரியாய்ச் செலுத்தப்படாதபட்சத்தில் கூபகத்தின் அதே குறுக்களவில் - அதாவது - கூபகக் குறுக்களவின் ஒரு முனைக் கெதிரில் - இடது இடுப்பெலும்பில் முதல் அலகு பிரயோகிக்கப்படுமாயில் இரண்டாம் அலகு அதின் மற்றொரு முனையில் தங்கிக்கிடக்காதபடி முதல் அலகுக்கு நேர் எதிரில் இரண்டாம் அலகைச் செலுத்தத்தவறிப்போவதே - பூட்டு விழாமைக்குப் பெரும்பான்மையும் காரணமாம். இந்தத் தப்பைத் திருத்தவேண்டுமாயில் அலகுகளை ஒரு பகுதியாவது முழுதமாவது வெளிக் கிழுத்து மறுபடியும் சரிப்படுத்தவேண்டியது. இரண்டாம்

இருபத்துநூற்றும் படம்.

FIG. 23.



இது நீண்ட குறடுகளைப் பூட்டி இருகையாலும் பிடித்திருப்பதைக் காட்டுகின்றது. — தலைக் கட்டகவீழிம்பி வீருக்கவும் பின்னுக்கு இழுக்கலாயிற்று. (இது, ஆர். பார்னெஸ் பண்ணுதல் முறை.)


வது - கூபகத்தின் இசைவின்மை சமயத்தில், அலகுக் கிரண்டும் ஒரே குறுக்களவில் ஒன்றுக்கொன்று எதிரொராய்க் கிடக்க இடம்பெறுதபடி, கூபகக் குறுக்களவுகளைக் கோணல்மாணலசெய்யும் மேட்டுமுனையால் அல்லது வேறு அங்கவீனத்தினால் பூட்டுவிழாமல் தடைப்படும. அங்கவீனமானால் அலகுள் பக்கத்துக்கொன்றாய் அம்மேட்டு முனையின் பக்கங்களில் செல்லுவதாய்க்காண்பது சாதாரணம். அப்போது அலகுகளின் உட்புறமானவை ஒன்றுக்கொன்று எதிர் முகமாகிராமல் அலகு படியக்கூடாததானது அவாவட்டத்தை நோக்கினவன்

ணமாயிருக்கும். இப்படி சம்பவிக்கக் காண்பாயாகில் நெடுங் குறடுகளைப் பிரயோகிக்கும் எத்தனத்தை விட்டு விட்டு வேண்டும். அவசியமாகில் கூபகத்தில் கையைச் சிசுலுத்தி அதின் பரிமாணத்தை யும் ஆகாரத்தையும் ஆக்கிரதையாய்ப் பரிசோதித்து அறிந்துகொள். “பலவந்தமின்றி குறடுகள் பூட்டப்படுமாயில் அது இவ்வாயுதப் பிரயோக சோதனைக்குத் தக்க பிரசவமென நியாயமாய் உறுவிக்கலாம்” என்பதை மருத்துவநூலில் ஓர் விதியாய் வைத்துக்கொள்ளலாம். சிசுவைத் திருப்புவதற்கோ (அதின் தலையில்) இரந்திரஞ் செய்வதற்கோ பிரவேசிப்பதற்கு முந்தி அவ்வாயுத உதவிகொண்டு பிரசவிப்பிக்க யுக்தமான பிரயத்தினத்தைச் செய்யவேண்டும்.

இழத்தெடுத்தல் (extraction - எக்ஸ்டிராக்ஷன்). — கார்பிணியின் வலது இடுப்பை அழுக்கி முதுகைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கும்படி தாதிக்குச் சொல்லவும். உதவிக்கு ஒரு ஆள்கிடைத்தால் அவனை வலது தொடையைத் தாக்கிப்பிடித்திருக்கச் செய்யலாம். ஒரு கையால் குறடுகளின் பிடினைப் பிடித்துக்கொண்டு மற்றொரு கையின் விரல்களை பூட்டின்வளையத்தில் கோர்த்துக் கொண்டு, இடுப்புநோயிருந்தால் அந்நோய்க்காலத்தில் சிசுவை முதலில் கூபக நுழுவத்திலேயே பின்புறமாக இழுக்கவும். இடுப்புநோயில்லையாகில், ஒவ்வோர் நிமிஷம்பொறுத்து இழுக்கவும் - இப்படி இழுப்பதற்கு அநுகுணமாய்ச் சொற்பலுசலாட்டம் அல்லது எற்றம் அசைதல் போல் பிடினை இந்தணடையும் அந்தணடையும் மெதுவாயும் இலேசாயும் அசைக்கலாம். ஆனால் இவ்வாறு அசைவை உண்டாக்கையில் அலகின்காம்புகள் கூபகச்சுவர்களின்மேல் மோதித்தாக்காதபடி யெப்போதும் எச்சரிக்கையாய்ப் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். பிரதியவரும் அதன் ஜதையலகிற்கு (சமநிறைத் திராசு) குண்டுபோன்றதாம். விரலானது சிசுவின் தலை எவ்வளவுதாரம் முன்னோக்கி வந்ததென்பதை அப்பொதைக்கப்போது கண்ணாடிபோல் காட்டும். சிசுவை பிழித்

தெடுக்கையில் காப்பாசயத்தைத் தாங்கி அதன் அடிப் புறத்தை அழுக்குதல் பிரயோஜனகரமாகும். இப்படிச் செய்வதால் காப்பாசயத்துருவமும், சிசுவின் தருவமும் கூபகத்துருவத்திற்கு நன்றாய்ப் பொருத்திவருதற்கு இனமாகும். பின் புறமிருந்து இவ்வாறு நீதரும் ஆதரணையின் அளவுக்குத்தக்கபடி சிசுவை வெளிக்கிழுத்தெடுப்பதற்கு நீ உபயோகிக்கவேண்டிய பலத்தாக்கத்தின் அளவும் குறையும். பின்வரும் அமிசங்களால் சிசுவின் சிரோதய விருத்தியை அளவிட்டறியலாம்.—முதலாவது மேகனவெலும்புகளுக்குக்கீழும் பின்னும் ஓர்விரலைச் செலுத்தி பிடரிமேகன வில்வளைவைச் சமீபித்ததாலென்றுதொட்டறி. இரண்டாவது, கூபகவீளிம்பின் சுற்றளவை நாற்புறம் விரலால் வழித்தாற்போல் தடவி சிசுவின் மத்தியகோகை அவ்வீளிம்பின் மார்க்கமாய் அழுக்கிப் பிறங்குகிறதாவென்று உணர்ந்தறி. மூன்றாவது, உச்சியின் பொருத்து திரும்பிவிருக்கும் பக்கத்தைத் தொட்டுப்பார்த்து, அது கூபகத்துக்கு விட்டத்துக்கு நேர்நேராய் வரக்காண்பாய்கில், நிலை பிறங்கிவருகிறதென்று நீ நிச்சயித்துக்கொள்ளலாம். இன்னும் வேறு அத் தாட்சி வேண்மொகில் குறடுகளின் சுழற்சியில் கண்டு கொள்க. சிரசானது பிடரிபாரிசமான உச்சித்துருவத்தில் சுழல்கையில் அது பிதேசமயம் கூபகத்தில் இறங்காமல் சுழல்வது தூர்வம். ஆகவே, குறட்டிப்பிடிக்களைச் சுழலக்கண்டால், இச்சுழற்சிசிரசின் காரியமாதல்கொண்டு அதாவும் சிரசின் உதயகதி விருத்திக்கு அத்நாட்சி பென்றுகொள்ளவும். அன்றியும், சிரசு இறங்கிவர குறட்டிகள் காம்புகளும் அவருகளும் அதிகம் அதிகமாய்க் கண்ணுக்குப் புலப்பட்டுவரும். ஆகிலும் அவைவழிவிநிறைவு உளளுக்குப்போவதுபற்றி சிரசின் இறக்க அளவுகணக்கில் கொஞ்சம் தள்ளுபடியுஞ் செய்யவேண்டியிருக்கும். தாயின் கூபகத்தாலும் அதின் பிறகு தாய்மிச பாகங்களாலும் அவருகள் சிரசிற்ரு மெத்த நெருக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருப்பதால் சிரசு நன்றாய் கூபகக்

FIG. 24.



இது சிசுவை இழுத்தெடுக்கையின் கடைசி நிலையைக் காட்டுகின்றது.

கடைசியாக அடிவயிற்றைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கும்படியாய் A யிலிருந்து B வரைக்கும் பிடிகள் போயிருக்கின்றன. புள்ளி வரியானது பிடிகள் போயிருக்கும் மார்க்கத்தையும் நிலை இறங்குகையில் இயற்றிய சொற்ப ஊசல் அசைவையும் காட்டுகின்றது. (இது ஆர். பார்னெஸ் பண்டிதர்ப்பத்தி.)

குழியில் வந்ததும், அவருகள் இந்த வெளிப்புற ஆதரவில் சிறிதுபாகத்தை இழந்தவீடும், இது சிரசு நிதம்பப்பிரதேசத்தினின்றும் சிறிது வெளிகண்டதும் மிகத்தெளிவாய் விளங்கும். இச்சமயம் அவருகள் பூரணமாய்க்கழன்று விழுந்தபோவதுமுண்டு. பிடிப்புவிட்

பெப்போகாதபடிக்கு குறடுகளின் பிடினை விசேஷம் அமுக்கவேண்டியது ஆவசியகமாம். நான்காவது, கூபகத்தனாமட்டத்திற்கும் உச்சிக்கும் இடையிலுள்ள இடத்தை அல்லது இறுக்கத்தின் அளவை இரண்டு மூன்று விரல்களால் அளந்து நிதானிக்கலாம். முதல்முதல் விரல்களுக்கு இடம் விசாலத்துக்கானும்; வரவர உச்சியானது விரல்களுக்கு இடம் விடாதென்க. அப்பிறம் முன்னேகைசெய்யும் உச்சியினால் மிருதுவான கூபகத்தனமும் விடபமும் விரிவடைந்து உப்பும். விடபமானது இப்போது விரியும்படி பிசியப்பட்டிருக்கும். உச்சி கூபகத்தை யெட்டினதும் குறடுகளின் பிடிகள் தம் அருவத்தின்மீது சிறிது சுழன்று கூபகத்தின் குறுக்களவை மிகக் கிட்டியிருக்கக்காணலாம். இது தலைச்சுழற்சியின்பலனாம். குறடுகளின் கம்புகள் விடபத்தைவிரியவொட்டாது தடுப்பதால், சிசுவை யிழுத்தெடுக்கும்காலத்தில் பிடிகளை இன்னும் முன்னுக்குச்செலுத்தலாம். பிடரிமேகன வளைவின்சிறு பூரணமாய் வருமளவும் பிடிகள் இப்படி முன்னோக்கிச்செல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

சிசுவை யிழுத்தெடுக்கையில் சிற்சில சமயங்களில் அலகுகள் பிடிப்பிழந்தும், பிடிகள் எதிர்ப்புறம் திறுகி அதனால் பூட்டு கழன்றுமேராவதுமுண்டு. இது சாதாரணமாய் பிடிகளை மிக முன்னடி முன்னுக்குத் தள்ளிக் கொண்டுபோவதின் பலனாம். இதனால் அலகுகள் தலையைவிட்டு விலகி முகத்தின்மீது விழுந்துபோம். பிரதிபிடியையும் விடபத்தின் பக்கம் நன்றாய்த் திருப்பிக்கொண்டுபோவதே இதற்கு பரிஹாரமாம். ஏனெனில் அப்போது அவை பிரண்டுபிடிக்கும் திரும்பிப் பூட்டிக் கொள்ளுவதாலென்க. சிரசானது ஜனன வுறுப்பின் சந்தில் வந்து, போதுமான கார்ப்பாசய வியாபாரமும் இருந்தால், அலகுகள் யெடுத்துவட்டத் தொடங்கலாம்.

அலகுகளை நீக்கிவிடுதல் (ரிமூவல் ஆப் பிளேட்டஸ்).—சிரசு தள்ளுண்டு வராவதில் நீ ஒருகைச்சமர்த்தால்

அது தள்ளுண்டைக்கு உதவி புரியலாம். அக்கைச்சமர்த்தை நீ தெரிந்துவைத்திருப்பது உத்தமம். சிரசிஸில் பிடிபட்டிருக்கும் விடபத்தில் ஒருபக்கம் அல்லது இருபக்கமும், அப்படியே பின்புறமும், உன் உள்ளங்கைகளை பிடினையும் செலுத்தி, அதைச் சுற்றே பின்னுக்கு ஓதும்படி அமுக்கிக்கொண்டு, சிரசு மேகனவளைவின் பக்கமாய் முன்னுக்குத் தள்ளுண்டையில் தன் விரிகைக் குரிய அசைவை நிறைவேற்றவேண்டியிருப்பதால், அது (சிரசு) தோல் உரிபட்டதுபோல் காணும். ஓர் உதவியாளிருந்து கார்ப்பாசய அடிவாரத்தை விடாது அமுக்கிக் கொண்டிருந்தால், இந்த அசைவிற்கு அது மெத்தசென கரியமாகவிருக்கும். இன்னுமொரு உபாயமுண்டு: அதுவும் சிற்சிலசமயங்களில் பிரயோஜனகரமானது. ஆசனமார்க்கமாய் விரல் ஒன்றைச் செலுத்தி, நெற்றியின்மீதுதாக்கி, அமுக்குவதற்கு ஓர் இலக்கையடைந்து, சிரசின்மீதுகைச் சலனத்தைத் தொடங்கிவிடுகையான் அக்கைச் சுமர்த்தென்க. அலகுகள் சரிப்பட்டுப்போனதே அதை கூபகத்தின் சுழற்சிக்களவில் சரியாய் இருக்காமல், காணலான நடுநிலைப்பட்ட ஓர் குறுக்களவில் வந்திருக்கும். தலை கோணலாய்ப் பிடிப்படும். முதலாவது - நாலாவது நிலைகளில் வலதுபுறவமும் பிடரியின் இடதுபக்கமும், இரண்டாவது முன்றாவது நிலைகளில் இடது புறவமும், பிடரியின்வலதுபக்கமும் பிடிப்படும். இது அலகுகளின் தலைக்கண்கள் கபாலத்தின்மீது வலாயும் வடிவுகளால் பரிஷ்காரமாய் நிரூபகமாகும்.

இழுத்தெடுக்கைக்கு வேண்டிய காலம்.—தள்ளுஞ் செய்கைக் குறைவுபாட்டால் சிரசானது கூபாகக் குழியிளிருந்து கிளம்பத் தாமதப்படுமாகிச், அதை இலேசாய் இழுத்து சில நிமிஷம் ஊதல் அசைவாய் அசைத்தலே சாதாரணமாய்ப் போதுமானது. குறடுகளினால் தலை கிளப்பப்பட்டவுடனே, கார்ப்பாசயம் தன் வேலையைத் தான் துவக்கி சிசுச்சகனுக்கு ஒத்தாசைபுரியும். பிரசவமும் சிக்கிரம் ஆகும். கார்ப்பாசயத்தின் எதிர்தட்டி

னுடையவும் விடப்பதினுடையவும் ஒற்றைக்கதவுகளில் சிரசின் சஞ்சார மார்க்கம் தடையுறுமாதில் கொஞ்சம் நேரமும் ஜாக்கிரதையும் தேவையாகும்.

ஒய்ச்சலினுண்டான காலதாமஸத்தைப் பின்பு பகவிளிம்பண்டை சிரசைப் பிடிக்கவேண்டுமாதில், கர்ப்பினியை மல்லாக்கக்கிடத்தி, ஓர் உதவியாளர்கொண்டுகைலாகு கொடுப்பித்தோ அல்லது இடுப்புக்கட்டொன்று கட்டியோ கர்ப்பாசயம் முள்ளந்தண்டின் பேரில் உறுத்தாநபடி தாங்குவதால், வெகுவாய் காலம் கூடிவரும். இதனால், சிரசின் பிரவேசிப்பு மிகவும் செளகரியப்படுவதோடு கர்ப்பாசய வியாபாரமுள் கிண்டிவிடப்படும். கூபக் இறுக்காட்டத்தினாலோ மிருதுபாகம் களின் விரிகைக் குறைவாலோ தடைப்பாடு ஒன்றுமில்லாதிருக்குமாதில் (சிரசை) பத்துநிமிஷகாலம் இவ்வாசய இழுத்தாலும் ஊசலாட்டி அசைத்தாலும்; சிரசும் பெருமபான்மை தீர்ந்துவிடும்.

இதுவிற்க, கூபக் இறுக்கிப் பட்டம் அல்லது மிருதுபாக விரிகைக் குறைவு இருக்குமாதில், அவகாசம் கொடுக்கை ஆவசியமான காரியமாகும். சிரசை உருப்படுத்துகை - நீர்விக்கை முதலியவற்றிற்குரிய செயலை படிப்படியாயத்தான் இயற்றக்கூடும். சிரசை ஊசல் அல்லது ஏற்றம்போல் அசைக்கவேண்டில், அதிஜாக்கிரதையாய் அசைக்கவேண்டும். இப்படிச்செய்கைக்குள்ளே தேவையென்னில், விடாது நிதானமாய் சிரசை அழுக்கி இழுத்துக்கொண்டேயிருப்பதேயாம்; ஆனால் மத்தியே மத்தியே முப்பதுநிமிஷத்திற்கு அதிகம் - அல்லது - ஒரு மணிநேரங்கூட - நிதானமாய் ஒய்வுக்கும் இடஞ்செய்யவேண்டும். அந்தகாலத்திற்குள் சிரசானது கூபகவீளிம்பில் பிரவேசிக்க முற்பட்டதாக புலப்படாவிட்டாலும், குறடுகளின் பிடிசுப்படியாமல் ஏற்றத் தாழ்வையே பிரபலமாய்க் காட்டிக்கொண்டிருந்தாலும், சிசுவைத் திருப்பி யெடுப்பதற்கு அல்லது அதன் தலையைத் துளைத்தோ

டுப்பதற்கு குறடுகளை யெடுத்துப்போடக்கூடாதாவென்ற அபிசத்தையோ சிக்கவேண்டியிருக்கிறது.

.அதாங்க சிகிச்சை (Low operation).—சிரசு கூபகத்திலுள்ள இறங்கியிருக்கையில் குறட்டின் பிரயோகம் அதிகஸம்பென்க. தலையும் கூபகமும் பொருந்தக்கூடாத ஏற்றக்குறைவு இராமலிருந்தால், சிசுவை வெளித்தள்ளுந் சக்திக்குறைவைப் பூர்த்திசெய்வதற்கு அதைக் கொஞ்சம் இலேசாய் இழுத்தலே போதும். இவ்விதச் சமயங்களில் சிகிச்சையானது தாய் - சிசு இருதிறத்தார்க்கும் பூரணமாய் நிர்ப்பயமானதென்க.

ஊர்த்வாங்க சிகிச்சை (High operation).—சிரசு கூபகவிளிம்பிலோ அதற்கு மேலையோ இருக்கும்போது உதயபாக உயர்த்தியினாலும் அலகுகள் செல்லவேண்டிய தூரத்தினாலும் சிற்சில சமயங்களில் அவைகள் சரியாய்ப் பெர்ருந்திப்போவதை குந்தகப்படுத்தும். சிரசின் சவனசக்தியாலும் அவைகளைச் செலுத்துவது விசேஷக்ஷடதமாய்க் காணும். அகிலும் (அலகு) பிரயோகக் கிரமங்களும் (சிசுவைப் பிடிக்கும் கிரமங்களும் ஒரே விதமானவை, சிரசு கூபக் விளிம்பில் பிரவேசிப்பதற்கு முந்தியே இச்சிகிச்சையைத் தகையாட எத்தனித்தால் அடிவயிற்றை அழுக்கி, கூடுமான அளவு சிரசை ஒரு நிலையில் நிறுத்தவேண்டும். அலகுகளை சிரசுக்காய் நடத்துகையில் முக்கியம் கர்ப்பாசய வாய் முழுதும் கைக்கு எட்டாத தூரத்திலிருந்தால், மிருதுபாகங்களுக்குப் பழுதுவரவொட்டாமல் விசேஷ ஜாக்கிரதையாய் நடத்தவேண்டும். இதன்பொருட்டு இடதுகை முழுதையும் ஒரு வழிக்காட்டியாக உட்செலுத்தி ஆயுதக்கூர்லாம் பட்டு கூபகவாயைக் காயப்படுத்த வேறுதவிலல்லாமற் செய்வது யுத்தமாம்.

அலகுகளின் கூர்கள் இப்பொழுது கூபகக்குழியில் வந்திருப்பதால் அவற்றைப் பூட்டுகையில் கொஞ்சம் பந்தப்பி முறட்டுத்தனமாய்க் கையாடினும், இலே

சில் பிரமாத திங்கு வினையக்கமொதலால், அவ்வாறு செய்யாது ஜாக்கிரகையாய் காரியம் நடத்தவேண்டும். ஏதேனும் சங்கடம் தடஸ்தமாணல் பலாத்காரப்பிரயோகஞ்செய்வதைவிட்டு, அவசுகளில் ஒன்றை கழற்றியெடுத்து எந்தப்பக்கம் மெத்த சௌகரியமோ அதை அந்த பக்கம் மறுபடியுஞ் செலுத்தவேண்டும்.

அவசுகள் இணைந்தபின், கூபகவிளிம்பின், துருவத்திலேயே முதல் முதல் “இழுத்தல்” செய்யவேண்டும். இப்படிச்செய்வதற்கு பிடிக்களை விடபத்திற்குப் பின்புறமாய் நன்றாய் அழுக்குதல்வேண்டும். சிரசானது இறங்கிவருகையில் சிகிச்சுகரின் முயற்சி யொன்றுமில்லாமலேயே வெகுவாய்த்தானே தன் வழக்கப்படி இறங்கும். இழுத்தலின் வேககதியை வெளித்துவர துருவத்தின் பக்கமாய்த் திருப்பி படிப்படியாய் மாற்றிவிடலாம். இப்படிபோய் பலமாயும் காலோசிதமாயும் வந்து, பிரசவம் உடனேயாகிற ஜாடைகளில்லாமலிருந்தால், சிரசு விடபத்தின்மீது வந்ததும் குறிகளை யெடுத்துப்போட்டு பிரசவம் தற்செயலாய் தலை வெட்டிவிடலாம். மிருதுபாகங்கள் வழக்கத்துக்கு மிஞ்சி டிபுண்டிருக்குமாகில், இந்த உபாயத்தைக் கைக்கொள்ளுதல் யுத்தமென்க. ஆகிலும் குறிகளை யெடுத்துவிடாமலே பிரசவத்தை முடித்துவிடுவது பெரும்பான்மையும் உத்தமம். பிரசவ மூன்றாவது நாலாவது நிலைகளிலுங்கூட சிரசை ஒஞ்சரிப்பாய்ப் பிடித்துக்கொள்வதுண்டு; அன்றியும் அது கூபகக்குழியில் பிரவேசிக்கையில் சாதாரணமாய் பிடரியைப்பற்றிக்கொண்டு அல்குலைநோக்கி ஓர் சுழற்சியுண்டாகும். பிடரி பின்னுக்காய்ச் சுழன்று முகம் அல்குலுக்குப் பின்புறம் வந்தபின் தலையானது பெரும்பாலும் அதன் குறுக்களவில் பிடிப்படும். இவ்வாறு கூபகக்குழியில் சிக்குண்ட சிரசானது பெருகுதலுக்குரிய சாதாரண சலனத்தால் பிறக்கசத்தாரமற்று இருக்கும். இளகலை விருத்திசெய்து அசைத்தால்தான் இந்தக்கஷ்டம்

நிலாரணமாகும். மூக்குத்தண்டு அல்லது நெற்றியானது சுழற்சிக்குமையமாக மேகனவெலும்பிற்குப் பின் புறம் படிந்திருக்கும்; அப்போது மண்டைக்கவசவளைவு கூபகத்தையீதும் வெளித்துவாராமார்க்கமாயும் உருள்விடம்பெறும்.

அல்குலோச் செலுத்தவேண்டியது கூடகப் பக்கவாட்டங்களிலாக்கும் சிரசு இறங்குகையில் கடைசிகாலவரைக்குங்கூட பிடரிமுன்னோக்கி வருவதுண்டு. அப்போது குறிகள் தம் துருவத்தில் சுழன்றுகொண்டிருப்பதாகத் தட்டுப்படும். ஆகிலும் பெரும்பான்மையான பிரசவங்களில் பிடரிமுன்னோக்கிவராதிருத்தலுமுண்டு. இவ்விதபிரசவத்தில் விடபம் விசேஷம் விரிய ஆஸ்பதமிருப்பதால் சிகிச்சைக்கும் ஜாக்கிரதை விசேஷமேவேண்டும். இப்போது குறிகளின் பிடிகள் தாயின் அடிவயிற்றுப்பக்கம் உறுத்தும்படி அவசரம் அவசரமாய் முன்னடிகொண்டு போகப்படாது. அப்படிச் செய்தால் அவசுகள் கழன்று விழுந்துவிடும்.

“முகோத” துருத்தி அலசுகள் சிட்டத்தட்ட குறுக்களில் தலையைப்பிறந்துக்கொள்ளும். “முதலாவது அலசு” என்னும் “பிடிக்கையலகை” பிடிக்கையிடுப்பெலும்பின் பொருத்திற்கும் குறுக்களவின் இடது கோடிக்கும் நடுவில் கூபக இடப்புறத்தின்மேல் செலுத்தவேண்டும். “இரண்டாவது அலசு” என்னும் “மேகன அலகை” கூபகத்தின் எதிர்த்தட்டில் அதாவது - அண்டகோளத்துவாரத்திற்கும் குறுக்களவின் வலதுகோடிக்கும் நடுவில் - செலுத்தவும், முகவாய்க்கட்டையைக் கூபகவளைவிற்குச் செம்மையாய் வரப்பண்ணும்பொருட்டு முதல்முதல் அதோ - (கீழ்) முகமாய் சிசுவை இழுப்பாயாக. அப்புறம் மண்டைக்கவசவளைவை கூபகத்திலின்றும் வெளிக்கிக்கொண்டுவரத்தக்கதாய் போகப்போக முன்னுக்கும் மேலுக்கும் சிசுவைக் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் நகுத்திரிழுக்கவேண்டும். சிர

சின் முன்தட்டுப் பிரதேசமானது விடபத்தை விசேஷம் விரிதலடையச்செய்யும்; இதனால் இழுத்தெடுக்குஞ் செய்கையை மெத்த ஜாக்கிரதையாய் இயற்றவேண்டும். விடபம் விரிதலுக்கு அவகாசங்கொடுத்து சிசுவைப்பதமாய் இழுத்தெடுப்பாயாக.

பின் உதிக்தலைக்கு குறிகளைப்பிரயோகித்தல்.—அதாவது—“புட்டவுதய,” “பாதவுதய,” “நிலைமாற்றல்” முதலிய பிரசவங்களில் முண்டம் (உடல்) பிறக்கதின் சிரோதயம் தாமதப்பட்டால் குறிகளைப் பிரயோகித்தலாம். சிரசு கூபகவிளிம்பில் பிடியுண்டு வெருவாய் நாபிக்கொடியை இறுக்குகையில் சிசுவின்நிலை உள்ளபடி அபாயகரமே. திடுமிடுக்காய் பிரசவிக்ஞ்செய்தல் ஒன்றே ஸித்தமாய் மாணத்தினின்றும் சிசுவைத்தப்புவிக்கும். கைகளாலாவது குறிகளாலாவது நாம் சிசுவை யிழுத்தெடுக்கலாம். வெரு பிரசவங்களில் கைகளாலேயே நிராடங்கமாய்ப் பிள்ளைபெறுவிக்கப்படுவதுண்டு. ஆகிலும் குறிகள் பயன்படும் பிரசவங்களும் சம்பவித்துக் கொண்டொளிந்துகொண்டன. குறிகளைப் பிரயோகிக்கையில் நாபிக்கொடியை பிடிப்பின்மேலே உராய்வொட்டாமல் மெதுவாய் கீழுக்குழுத்து கூபகவிளிம்பைத் தாண்டுகிற அன்பாகத்தை முகம்தென்படுகிற பக்கம் எடுத்துவைப்பாயாக. அப்புறம் தாயின் அடிவயிறுக்கு முன்புறமாய் சிசுவின் முண்டத்தைக் கொண்டிபோய், அவ்விடத்தில் உதவியாள் ஒருத்தியைக்கொண்டு அதைப்பிடித்துக்கொள்ளச்செய். கர்ப்பாசயக்கழுத்திற்கும் சிரசிற்கும் நடுவில் கூபகத்தின் இடதுபக்கத்தில் சிரசின்மேல் விரல்களிருக்க, யோனிமார்க்கத்தில் உள் இடதுகையைச்செலுத்தி சிரசின்மேலிருக்கும் விரல்களின் உள்ளங்கைப்பக்கமாய் அவகை நழுவுக. இவ்வாறே வலதுபக்கத்திலும் மேலண்டை-அல்லது-வலது அலகைச்செலுத்தி அலகுகளைப்பூட்டினதும், கூபகவிளிம்பின் துருவமார்க்கமாய் சிரசை கூபகத்திற்குள் இழுத்துவிடு. சிரசு கூபகக்குழியில் துழைந்தவுடனே அவ

குளைக்கழுத்திப்போட்டு உன்கைகளாலேயே பிரசவிப்பை முடி. அலகுகளாலேயே சிசுவை இழுத்தெடுப்பது உத்தமமென்று கொண்டாயாகில், பிடிக்கையெலும்புக்குரியின்பக்கமாய் முகம் திரும்பிக்கிடக்குமதைக் கவனி. அல்குல் ஸ்லோவுக்குள் பிடரி தோன்றுமாகில் பிடிக்கை நன்றாய் முன்னுக்குக் கொண்டிபோய் கூடிய வரையில் கொஞ்சமும் உராய்வொட்டாமல் முகத்தை விடபத்தின்மேல் வரச்செய்.

இச்சித்திரையில் வரக்கூடிய அபாயங்கள்.—அஜாக்கிரதையான ஆயுதப்பிரயோகத்தால் அங்கபின்னங்களும் (laceration) அவைபோன்ற வேறு அபாயங்களும் நேரிடுவதுண்டு. இது ஓர்புறமிருக்க, இச்சித்திரைமேல் வந்தவையென்னப்பட்ட கெடுதிகள் - நீடித்த பிரசவமே, நேயாலும் கூபகத்திற்குள்ளிருக்கும் மிருதுமாமிசபாகங்கள் கெட்டுள்ளனவாய் அமுக்குண்டதனால் நேரிட்ட அழற்சி, சதைபிற்றுவிழ்தல், முதலியவற்றாலும் உண்டானவையாகக்காணலாம்.

சுகுழிக்குரிய அபாயங்கள்-பிரகாரமாய் உச்சிக்குழி நெற்றியிலுள்ள ருமடங்கிப்பெறும், முகமஉராய்க்குபோதலும், முககரம்புக்கு அலகு அமுக்குண்கையால் தாத்தகாலிகமாய் முகம உள் ஒருபகுதி பட்சவாயுவுக்குள்ளாதலும், தலையெலும்புகள் அமுக்குண்ணல் அல்லது முறிபடுதலும், அளவுக்குமிஞ்சி அல்குள் உறுதுவதால் மூளைக்கு உண்டாம் காயமுமே. இப்படி சம்பவிப்பது அருபொருள்; ஆகிலும் சம்பவித்தால் அவற்றைப் பெரும்பான்மையும் சிகிச்சையைச்சரியாய் நடத்தாமையின்பலனென்று கொள்ளவேண்டும். உச்சிமீன்மேல் தோல் உபாயமாய் வழுண்டுபோதல் அல்லது முகம் பாரிசவாயுவுக்குள்ளாதல் இவைபோன்ற சிகிச்சா தோஷங்கள் பெரும்பான்மை உபாயமானவையாய்வி, உண்மையில் விசேஷதீங்கு விளைப்பனவன்றும்.

21-ம் அதிகாரம்.

பிரசவத்தில் பிரக்கிணையற்றுக்கிடக்கை.

ANÆSTHESIA IN LABOUR (அநஸ்தீசியா இன் லேபர்).

குளோறல் அயிட்ரஸ் (Chloral Hydras).—“குளோறபாரம்” என்னும் மயக்கமருந்தை சாதாரணமாய்ப் பிரயோகிக்கக்கூடாத பிரசவாபக்காலத்தில் கிர்ப்பயமாய் கொடுக்கக்கூடியதே இந்த (குளோறல் அயிட்ரஸ்) மூலிகை மருந்துக்குரிய பெருமையாக்கும். “குளோறபாரம்” நோவைச் சமனம்பண்ணின்போதிலும், கர்ப்பாசயச் சுருங்கற்செய்கையைக் குறைத்து, பிரசவத்தை இங்கு வொட்டாமல் தடைப்படுத்த வெகுவாய் இயல்புசெய்கிறது. “குளோறல்” மருந்தோடு மென்மையான கர்ப்பாசயச் செய்கையைக் குறைக்காது, உணர்ச்சியின்மையை மாத்திரம் உண்டாக்கும்; ஆகிலும் இது நோவைத்தணிப்பதில் “குளோறபார”த்தைப்போல் அவ்வளவு விரியமுள்ளதல்ல. ஆனால் கர்ப்பிணிக்கு நோவானது முன்போல அத்தனை உரமையாய்த் தோன்றாதிருக்கும் படியான பூர்வத உறக்கத்தைக்கொடுக்கும். பிரசவ ஆரம்பதசையில் கர்ப்பாசயக்கழுத்து விரிகையின்போது, அறுதது கொந்தித்தள்ளுவதுபோல் நோவெடுக்கையில்தான் இம்மருந்து அத்தியந்த உபகாரமாகவிருக்கும். நோவு கூர்மையாயும், சுருக்காயும், பலமுறை காண்பதாயும், பிரசவ விருத்திக்கு உதவாததுமாய் அத்தனை நடுக்கமும் பூத்தனமுமான தேக்கமுடைய தலைச்சன் பிள்ளைத் தாய்ச்சிகளுக்கு இது முக்கியமாய் எடுத்த மூலிகையென்க. இவ்வித தலைச்சன்பிள்ளைத் தாய்ச்சிகளின் கர்ப்பாசயவாய் பெரும்பான்மை நுண்ணியதாயும், உரப்பாயும், இடுப்புநோவிலல்லாதகாலதில்கூட பனிக் குடம் கொஞ்சமோ அதிகமோ விளைத்துக்கொண்டிருப்பதாயும், காணப்படும். இந்த “குளோறல்” மருந்து

தின் வல்லமையால் இடுப்புநோய் போகப்போகக் கிரமப்பட்டுபெலமாய்வரும். உபாதையும் குறைந்துபோம். இரத்தகொதிப்பும் அடங்கிப்போம். பிரசவமும் சீக்கிரம் திருப்திகரமாய் முடியும்.

இம்மருந்தைப் பிரயோகிப்பதின் சுருத்து கர்ப்பிணிக்கு மயக்கம் அல்லது தூக்கம்வரச்செய்து, அதைக்கடுமானவரைக்கும் நீடிக்கச்செய்வதே. பிரதி 20 நிமிஷத்திற்கு 15 குன் நிமணி யெடைவீதம் மூன்று ஆவர்த்தி இம்மருந்தைக்கொடுக்க, நாம் கோரின குணத்தைச் சாதாரணமாய்க் காட்டும். கர்ப்பிணி இடுப்புநோய் காணாதபோதெல்லாம் உறங்கிக்கிடந்து, பிரதி கர்ப்பாசயச் சுருங்கலின்போதெல்லாம் விழித்துக்கொள்வன். நாலாவது ஆவர்த்தி மருந்துகொடுப்பதற்கு அவசியமிருப்பது அருபொருள். பிரசவகாலமுழுதிற்கும் இம்மருந்தில் ஒரு திராமு (draum) க்கிசும் கொடுப்பது அரிது. இந்த சிவ்ஸையில் ஓர் அதுகூலமுண்டு: அது என்ன வெனில் “குளோறபார” அளித்தப்பிரயோகமும் ஆவசியகமாத்தோன்றி, பிரயோகித்தாலும் மற்மக்காலங்களில்கொடுக்கும் அளவிற்குக்குறை தாமத்திரம் கொடுக்கில், இந்த (பிரக்ரூநாசகாரி) மருந்து பாசகஞ்செய்யாது - என்பதே.

பிரசவ இரண்டாம்பாதம் நன்றாய்த் தொடங்கி (பிண்ட) விசர்ஜன சக்கியுடன் (இடுப்பு) உயர் காணும்வரையில், “குளோறபாரம்” சாதாரணமாய்க் கொடுக்கப்படுவதில்லை. இம்மருந்து விட்டுவிட்டுக்கொடுக்கப்படவேண்டுமென்றி, ஒருக்காலும் அடாக்கொடுக்கப்படாது. ஒரு ஆவர்த்தி நோவெடுத்ததும் ஒரு கைக்குட்டையைச் சுருட்டி மீடவடிவாய்க் கூச்சாக்கி, அதில் இம்மருந்திற்சிலதுளி தெளித்து, அதை நாசித்து வார்த்துண்டை பிடிக்கவும். நோவின் உக்கிரத்தில் கர்ப்பிணி இதைத் தாராளமாய் முகர்ந்து உரிஞ்சுவாளாகில், உடனே உபாதை மிகவும் நிவர்த்தியானதாக உணர்வான். நோவு மறைந்துபோனதே அந்தக்குட்டையை

யெடுத்துவிட்டு வேண்டும். இருந்திருந்து எதிக்கும் இமி
ப்புநோவிதது நடுவே நடுவே, மயக்கமருந்தின் வேகம்
குறைந்துபோய்; ஆனதுபற்றி அதிக அளவு மருந்தைக்
கொடுத்து அதிக பிரக்ஞாபங்கத்தை ஒருபோதும் உண்
டாக்கக்கூடாது. இவ்வாறு பொறுத்து பொறுத்துக்
கொடுப்பது தான் பிரசவத்தில் இந்த “குளோறபார”
த்தை நிர்ப்பயமாய்க் கையாடுவதற்கு நேறுவாச்சுது.
இது இடப்புநோவிற்குச்செய்த குணந்தானென்னவெ
ன்று ஜாக்கிரதையாய் நிதானிக்கவேண்டும். நோவின்
மும்மாமும் அது அடாவருகையும் விசேஷம் குறைவு
படுமாயின், சிறிதநேரம் மருந்தை நிறுத்தி, அது பல
த்துவருகையில் திரும்பிக்கொடுக்கத்தொடங்குவது ஆவ
சியகமாம். சிரசு விடபத்தை விரியச்செய்து, நோவு
மிகவும் பலத்ததாயும் வற்புறுத்துவதாயும் வருமாதலால்
குழந்தை பிறப்பதற்குச் சற்று முந்திகூட பூரண பிரக்
ஞாபங்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அளவு மருந்தைத்
தாராளமாய்க் கொடுக்கலாம்.

“குளோறபார”த்திற்கு கர்ப்பாசயச்சய்கையை
ஒய்ச்சுந்தன்மை உள்ளதென்று நினைப்பின்மேல் வந்துக்கொ
ண்டு, அதைத் தாராளமாய்க் கொடுக்கப்பெற்ற ஸ்திரீ
களுக்கு பிரசவத்துக்குப் பிந்திய பெரும்பாடு” (post-
partum hemorrhage) வராதபடி விசேஷ முன்ஜாக்கிர
தையுடன் தடுக்கவேண்டும்.

ஆயுதசிகிச்சை தேவையான பிரசவங்களில் பூரண
பிரக்ஞாபங்கத்தை புண்டாக்கும் அளவாய் இம்மருந்து
பலகால் கொடுக்கப்படுவதுண்டு. இவ்வித-பிரசவங்
களியாவற்றிலும் ஆயுதசிகிச்சை தாமே மருந்தைக்
கொடுக்காமல், வேறொரு வைத்தியரைக்கொண்டு கொ
டுப்பிக்கவேண்டும்; ஏனெனில்-ஆயுதசிகிச்சைக்கு வே
ண்டிய அளவு மருந்தைக் கொடுக்கவேண்டுமெனில் அவர்
பல சிந்தையின்மீது இந்த வொன்றையே கவனிக்கவேண்
டியது அவசியமாகையாலென்தது.

22 - ம் அதிகாரம்.

பிரசவ சுரம்.

PUERPERAL FEVER (பிபூர்பிதல் பீவர்).

இது - பிரசவித்துப்படுக்கையிலிருக்கும் ஸ்திரீகளுக்கு
கேடரியவியாதியென்றும் அநேகரில் உள்ளபடி ஓவீத்
இரத்தவிஷமிப்பு (septicæmia) ரோகமென்றும் விசேஷ
தொற்றுவியாதியென்றும் - அறியப்படும். இந்த சுரம்
சாதாரணமாய் தேகத்தில் எங்கேயோ ஓரிடத்தில் இர
ண அழற்சியினிமித்தம் காணும். இதனை குணங்களும் உ
க்கிரமும் சரீரக்கூறுக்குத்தக்கபடி விசேஷம் பேதப்பட்
டிருக்கும். சிலருக்கு “கர்ப்பாசய அழற்சி” (metritis)
இருக்கும். சிலருக்கு கர்ப்பாசயத்திற்குச் சுற்றிலுமிருந்
துகொண்டு மூத்திரப்பையையும் அதற்கடுத்த அங்கங்
களையும், நீதித்துக்கொண்டிருக்கிற நரம்புகளானது அழ
ற்சியுண்டாகும்: இது (pelvic cellulitis) “கூபகஜல்
வழற்சி” - உட்கவரலப்படுமே வேறு சிலர்க்கு அடி
வயற்றின் உட்கவரலவுவப்புரை நுட்கியம் இரணமாகிற
துண்டு: இது (peritonitis) “அந்தரவேஷை ஜல்வழ
ற்சி” எனப்படும். விசேஷத்தொற்றுவியாதியும் மர
ணஸ்பதமுமான சில பிரசவசுரங்களில் அழற்சியைக்கூ
டவும் ஜாடைகள் ஒன்றுமீரா; நோயாளிகள் இரகீத்
விஷமிப்பின்கொடுமெயால் சீக்கிரம் மூர்ச்சை அடை
வார்கள்.

பிரசவசுரகாரணங்கள் “ஸ்வகதம்” (auto-genetic)
“ஹீகதம்” (hetero-genetic) என இருவகைப்படும்:—

“ஸ்வகத” பிரசவசுரத்தில் விஷம் பிள்ளைததாய்ச்சி
யின் தேகத்திலேயே தோன்றி பரவுகின்றது. இதற்கு
எதுக்கள்-படும் அழுக்கு அழுங்கப்போதல், கர்ப்பாசயத்
தில் தங்கிவிட்ட அழுக்கையிடைத்தினால் பின்னப்பட்ட
மாயையின துண்டுகள் அல்லது உதிரக்கட்டிகளுமே.

நீடித்த பிரசவங்களில் மிருதுபாகங்கள் அழுதிப்போமா
கூல், தூசு நந்தகல்மஷங்கள் ஊறி ஸ்திரீயின் தே முழு
தும் வியாதித்து இரத்தங்கெட்டுப்போம். அவ்நேரங்களி
யம் அதிபரிசுத்தமாயவைக்க ஜாக்விதைப் படாமற்போ
னால், சதபேதியோ அல்லது அக்சாசாமோ தொற்றுவி
யாதியைப்போல் தொடரநேரும். ஜனனப் பிரதேச
ததிலோ அல்லது அதற்குச்சமீபத்திலோ ஓர் இரண்
மோ கீறுகாயமோ இருந்தால், அதுவே அழுகைநஞ்சை
தேக்கத்தில் வயாங்கக்கச்செய்வதற்கு மார்க்கமாகிறது.
நோயாளியின் அல்லது மருத்துவசகியின் அஜாக்விதை
யால் பிரசவசுரகாலத்தில் அழற்சியுண்டாகக்கூடும்.
இவ்வாறு அஜாக்விதையால் காலத்திற்குமுந்தி பிள்
ள ததாய்ச்சி படுக்கையைவிட்டெழுந்து நடையாடுவ
தே “சுபகஜவவழற்சி” க்குக்காரணமாம். மனக்கிள
ர்ச்சி மனக்கவலைமுதலியனவும் இச்சுரத்திற்குக்கொழு
த்த காரணங்களாம்.

“விகத” (hetero-genetic) சுரத்தில் வலம் பகிர்
முதமாய உட்கையாக வெளிப்புறயிருந்தே நோயாளி
க்குவரும். பிச்சவித்துப் படுக்கையிருக்கும் ஸ்திரீ
க்கு அழுதியபண்டம் ஏதேனும் எதிர்ப்படமாகில், அது
வே அவள் இரத்தவலம்ப்பிற்குக் காரணமாகும்.
இதற்குத்தொண்டாந்தரம்-வோயு (Vienna) நகரபிரசவ
வலம்வந்தசாலையில் “சுவச்சேத சோதனைக்கருவ”த்தி
யிருந்த வலம்வந்தயமானுக்கர்கள் பிரசவஅமைகளுக்குப்
பேரய பிரசவசுர சித்தாரன் கர்ப்பிணிகளின் தேகஸ்தி
தியைக்கண்டறிந்து பிரசவக்கச்செய்யுமபடி அனுப்பப்
பட்டார்கள். இப்படி இவர்கள்வந்து, பிரசவித்த மாந்
ரகள் சராசரி பத்துக்கு ஒருவர்வீதம் வல்குரத்தால் மா
ண்டதே இதன்பலவென்க. இம்மரணத்திற்குக்கார
ணம் அமுமாலுக்களின் கைகளிலிருந்த பிரோதவல்குரத்த
முதலியசத்துக்கள் பிரசவசயல்த் தவ்ருந்த ஸ்திரீகளின்
ஜன்னலுறுபுகளில் நோயாய்த்தொற்று உட்புகுந்தமை
யே. மற்றபிள்ளைந்தாய்ச்சிக்கு உபசரிப்பதற்கு

முந்தி ஜாக்விதைபுடன் தக்க ஏற்பாடுகள் செய்து மா
லுக்களையும் வற்புருத்தி தங்கள் கைகளில்களைச் சுத்
திசெய்து வரச்செய்தபின் மரணக்கணக்கு குறைந்து
வந்தது. பிரசவசுரத்திற்கு சர்மத்தில் உண்டாகும்
(erysipelas) “அக்கி” போன்ற கஞ்சிக்கொப்புளங்க
ளும் பலதரம் காரணமாகும். (scarlet fever) “மஞ்சக
சுர”மும் “பெரியம்மை” அல்லது “வைசூரி” (small
pox) யும் “சங்கிபாதசுர” (typhoid) மும் பிரசவசுரத்
திற்கு வெகுவாய் ஏதுக்களாம்.

கர்ப்பிணியின் படுக்கையறைக்காற்றும் தொற்றுவி
யாதிக்குக் காரணமாகவிருக்கலாம். மூடியகதவுகளும்
ஜன்னல்களுமுள்ளவாய் பெருங்கும்புகூடியுள்ள நோ
யாளிகளின் படுக்கைக்கொட்டாரங்களுளவை தொற்று
ரோகங்களுக்குப் பலத்த ஆதாரங்களாம்.

பிரசவசுர விஷசத்தானது முக்கியமாய் படுக்கை வ
ஸ்திரமூலியவற்றின் மூலமாய் ஒருநோயாளியிடமிரு
ந்து மற்றொரு நோயாளிக்குத் தொற்றிக்கொள்ளும்.
இது பிச்சவலைத்தியசாலைகளில் இத்தொற்றுச்சுரம்
நடமாடுங்காலத்தில் நமக்கு பிரத்தியட்ச அதுபவவரித்த
ந்தானே.

வீட்டிற்குவந்து வகாந்தமாய் பிள்ளைப்பேறு பார்
க்கும் மருத்துவசிகளமூலமாயும் இவ்விஷசத்தானது
ஒரு கர்ப்பிணியினின்றும் மற்றொரு கர்ப்பிணிக்குத்தொ
டருவதுண்டு. இத்தொற்றுவியாதிவினையுடைய ஓர்ஸ்தி
ரீக்கு உபயோகித்த மலினமடைந்த நீருருஞ்சி(Sponges)
துணிமுதலியவற்றாலும் இவ்விஷசத்து மற்றொருஸ்திரீ
க்குத் தொற்றிக்கொள்ளும்.

விஷத்தொற்றுத்திறங்கள்.—பிரசவமான இரண்டு மூன்
றுதினங்களுக்குள் அல்லது சாதாரணமாய் ஐந்தாம்கா
ளுக்குமுந்தி விஷத்தொற்றுக்குறிகள் புலப்படுவது வழ
க்கம். ஐந்தாம் அல்லது ஆறாம்காளுக்குப்பிறம் இவ்வி

ரக்தவிஷமிப்பு நேரிடுவது மெத்த அரிது; ஏனெனில் இதற்குள் கர்ப்பாசயம் நன்றாய் இறுகி யிருதுபாகங்கூறி விருந்த காயம், புண்முதலியன ஆயிபுலர்ந்து, விஷசத்துக்கள் ஊறி தேகத்தில் வியாபிக்க வேறுவான சரமில் லாமையாவென்க. உடம்பில் குளிர்த்தடுவது பெரும் பான்மை முதற்குறியாம். தேகம் கட்டைபோல் விரை துக்கொள்வதுமுண்டு. துடிப்பு 110 முதல் 140 வரைபுமரிக, காடி வேகமாகவிருக்கும். (பாடுவென்றுரை “தெர்மாமிற்ற” ரின்படி) சீதோஷண ஸ்திதி 102 அல்லது 104 அளவுமட்டும் ஏறிவிடும். சூதக்கல்லமவும் சொற்பமும் தூக்கந்தமுள்ளதமாகி கசியும், இல்லது கசியாமல் முற்றிலும் நின்றபோவதுமுண்டு. “பால் சரப்பு” அடங்கிவிடும். முகவிலாசம் மனோவியாகூல த்தைக்காட்டும். வெகுவாய் வாந்தியும் கிராணியும் இருக்கக்காணலாம். வாந்தியான திரவியம் (coffee-grounds) காப்பிக்கொட்டைத் திப்பியைப்போல் கரு நிறத்தாய்விளங்கும். சுவாசம் ஓர்விதமாகுரிபு பரிமள மவீசம். சுவாசம்பல்கால் வேகப்படும். துரையிரல்வெ குவாய்தோஷித்திருக்கும். நாவறண்டு மாபிடிந்து வெ ளிர்ந்திருக்கும். வியாதி மும்மரமாகியகாலத்தில் நாக்கு பழுப்புநிறங்கொள்ளும். இக்குறிகள் சிலநாள்கீழ்க்கும். நோயாளி இரவில் பித்தமும் பித்தம்லுமாகவிருந்து, பல குசோர்ந்து ஓடுங்குவான். இவ்விஷகரத்துக்குள்ளான வர்கள் பலர்க்கு “அந்தரவேஷண ஜவ்வழற்சி” க்குறி கள் இருக்கக்காணலாம். அடிவயிறு விசேஷமெல்லிய தும் விடாத நேரவோடுகூடியதாயிருக்கும். நோய் வரலா விருத்தியாகும். அடிவயிறு வாய்வுசேர்ந்து உப் பிக்கொண்டு இருக்கும். பலம் ஒய்ந்து, பினியாளிசோ ரந்துபோவான். மறறொரு “இரக்த விஷமிப்பு” உ ண்டு. அது கிரமக்கிரமமாயவரும். கீல்களிலும், உட் புற இராஜவறுப்புகளிலும் பருக்கன்கட்டிகள் காணுத லே இதற்கு முக்கிய அடையாளங்களாம். இவ்வித ரோகங்கண்ட ஸ்திரீ மீள்வது துர்லபம்.

சிகிச்சை.—புதுநஞ்சு தேகத்தில் தாக்கி ஊறுதபடி தடுப்பதும், கூடுமானால் அப்படி தாக்குண்டிருக்கும்கா லத்தில் நோயாளியைப் போஷித்தலுமே டர் சிகிச்சை யென்க. கர்ப்பாசயத்தில் கிடந்து தீங்கை விளைப்பன வர்ன கலம்ஷங்களாயவும் வெளிப்படுத்தப்படவேண் டும். (8-வது “அதிகார”த்தில் கற்பித்திருக்கிறபடி.) கர்ப்பாசய உட்புறத்தை நீர்பாய்ச்சி அலம்பவேண்டும். இந்தசிகிச்சையை ஆரம்பத்திலேயேசெய்தால் நாடி புத ட்டியும் தேக அனலும் சிலமணிநேரத்தில் வெகுவாய் இறங்கி, விசேஷ சுருணங்காட்டும். “அந்தரவேஷண ஜவ்வழற்சி” இருக்குமாயில், 15 அல்லது 20 துளி “அ பினித்திராவகம்” (laudanum) சேர்த்த 5 அல்லது 10 குன்றிமணியெடைவளவாய் கொய்னன் (quinine) மரு ந்தைத் தினம் இரண்டாவர்த்தி கொடுக்கலாம். கற்பூர ததயிலம்பூசி ஒத்தட (turpentine stupes)ம் கொடுத்தல், பந்து (poultices) போடுதல் முதலியவைகளால் வெகு வாய் நோய்சமனமாகும்.

பிரசவகரத்துக்கேளும் அல்லது மற்றெந்த தொற்று ரோகத்துக்கேளும் ஓரிடத்தில் வைத்தியம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் மருத்துவச்சியானவள் வேறு தூதன் கர்ப்பினிகளுக்கு அல்லது பிராவித்த ஸ்திரீகளுக்கு வைத்தியஞ் செய்யப்போகக்கூடாது. முந்தியபிரசவ நோயாளியைப் பார்த்துவிட்டபின், குறைந்தது ஒருவா ரம்-பத்துநாள் பொறுத்தே புதுப்பிரசவநோயாளிகளை ப்பார்க்கவேண்டும். இப்படி ஓர் வீட்டுவைத்தியம்மு டிரந்ததும், மருத்துவச்சி வியாதிப்பற்று ஒழிய, தம் உ டைகளைபெல்லாம் ஜாக்கிரதையாய்த் தோய்த்துச் சுத்தி கரித்துக்கொள்ளவேண்டும். அவ்வாறே வெந்நீர் ஸ்நா னத்தால் தன்னையும் பரிசுத்தையாக்கிக்கொள்ளவேண் டும். அவள் தன்விரல்ககக்கார்களைச் சீவியெடுத்துப் போட்டு, ஓர் (nail-brush) நகக்குச்சா (பிரஷா)லும்— (60-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த) “காற்பாலிக் ஆஸிட்” (carbolic acid) மருந்து அல்லது (Condy's fluid) “கொ

ண்டி.” யென்பவரின் திராவகத்தாலும் ஜாக்ஹாதையாய்
த்தேயத்துக்கழுவி சுத்திசெய்துகொள்வது யுத்தமென்க.

மருகதுச்சி இம்முன்ஜாக்ஹாதைக் கிரமங்களை கை
க்கொண்டு நடந்தானாகில், தான் பிறகு பிறர்விட்டுவை
த்தியங்களுக்கு நிரப்பயமாய்ப்போகலாம்.

PHLEGMASIA DOLENS, OR WHITE LEG.

பிரசவ அதைப்பு அல்லது வெண்கால்.

இவ்வியாதி பிரசவகாலமுள்ள மாதர்களின் ஓர்வித இரக்
தநிலையால் உண்டாகுங்குணமாம். தொடையின் முன்
புறப்பக்கமாய் அடிவயிற்றுக்குள் செல்லாநின்ற பெரு
நரம்பில இரத்தம் கட்டியாக உருப்படுதலால் இது முக்
கியம் உண்டாகின்றது. பிரசவ ஸ்திரீகளுக்கு இது
மிக அசாதாரணமாய் வரக்காணலாம். கர்ப்பினிகளால்
லாத ஸ்திரீகளுக்கும்-அவ்வாறே புருஷர்களுக்குக்கூட-
இது சம்பவிப்பதுண்டு.

ஓரோகாலத்தில் இரண்டுகால்களும் அதைப்பு
துண்டு. ஆகிலும் பெரும்பான்மை ஒருகாலத்தின் அதை
க்கும். சிலர்க்கு இந்தரோகம் விசேஷம் உரித்தானதா
கத்தோற்றுகிறது: இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இது பல
ஆவர்த்தி காண்பதுண்டு.

முதல்முதற்காலங்குறிகள் நடுக்கமும் சுரமும். அ
தைத்த கால் அளல்கொண்டுநோகும் நோய் காலின்
கண்டைச்சுதையிலோ அல்லது அடிவயிற்றின் அடிப்ப
குதியிலோ துவக்கி, அவ்வுறுப்பின் மற்றப்பாகங்களுக்
குப்பரவும்; வீங்கினகால் ஓர் விசேஷ நிறத்தினதாக
விருக்கின்றது. மேனி (ஐரோப்பிய ஸ்திரீகளில் இன்
னும் அதிகமாய்) வெளுத்து தேஜஸுடன் விளங்கும்.
விரலால் அழுத்திப்பார்க்கையில் பாண்டிரோகத்தில் கா
ண்பதுபோல் பள்ளம்விழுவமாட்டாது. கால்வடிவு
படியவுமாட்டாது. காலின்பெருநரம்புகள் உறைந்து
கட்டியான இரத்தம்கிறைந்து, கைக்கு கயிறறைப்போல்

கடினமாய்த்தட்டுப்படும். அமையில் நெறிகள் கட்டி
க்கொண்டு எரிச்சலுக்குத்தல குடைச்சலுமாயிருப்ப
தோடு, சிலசமயங்களில் சீழ்ப்பிடித்துமிருக்கும்.

வியாதியோ சாதாரணமாய் ஒருபக்கம் (பதினைந்து
நாள்) பொறுத்து தணிய ஆரம்பிக்கும். ஆகிலும் வீக்க
ம்வாங்குவதோ எப்போதும் மெதுவிலாகும்ஓர் காரி
யமென்க. கால் தன் மதாரூபத்தையடைய சிலவாரங்
கள் - அல்லது - மாதங்கள்கூடப்பிடிக்கும்.

நோயாளி கிரமக்கிரமமாய்த் தேறிவருவது இயல்பு;
ஆகிலும், சில சமயங்களில் கட்டி (விப்புருதி) கள் புறப்
பட்டு, பலகூயத்தாலோ இரத்தவிஷம்ப்பாலோ, அவள்
இறந்துபோவதுமுண்டு. சில சமயங்களில் நரம்பிலுள்
ள உதிரக்கட்டி புண்டுபோய், அதின் துண்டு ஒன்று இ
ரத்தத்தில் பிரவேசித்துச் சஞ்சரிப்பதால், மரணம்சம்ப
விக்கும். இது இருதயத்தில்தங்கி, அதின் வியாபாரத்
தைத்தடுத்து நிறுத்திவிடும்; அல்லது, இருதயத்தின்
மார்க்கமாய்ச்சென்று துராயிரவி (சுவாசகோசத்தி)ல்
இரத்தநாளங்களில் அடைத்துக்கொண்டு, மரணத்தை
யுண்டாக்கும். பிரசவகாலத்தில் திடீரென மரண
முண்டாதல் இவ்வாறுதானென்க. நோயாளி சொஸ்த
மாயிருப்பதுபோல்தோன்றி, திடீரென மூச்சு ஓட்ட
ஒடுக்க ஜாடைகள் காணப்படும். சுவாசகோச இரக்
தநாளங்கள் அடைப்படுங்காலத்தில் இரத்தக்குறிகள் இ
ன்னும் அதிகவேகமாய்க்காட்டி, சாதாரணமாய் சில
நிமிஷங்களுக்கெல்லாம் மரணம் சம்பவிக்கும்.

“வெண்கால்” நோயுடைய யாங்களும் மற்ற அபிசங்
களில் செளக்கியவதிக்களாயிருந்தாலும், வீக்கம் சுத்தமாய்
வாங்கிவிடுமெனவும் படுத்தபடியேயிருக்கவேண்டும். வீ
ங்கியுள்ளகாலுக்கு துணி அல்லது கம்பினியைச்சுற்றி
வைக்கவேண்டும். பிரஸவத்திற்குப்பின் அகஸ்மாத்தா
னமரணம் உண்டாவதற்கு - உதிரப்போக்கால் பலஹீ
னர்களான ஸ்திரீகளுக்கே பெரும்பான்மை நரம்பில்

உதிரங்கட்டிவிடுதலும் சொற்பசரீரமுயற்சிக்கே இருதயவியாபாரம் சட்டென்று நின்றுவிடுதலுமே - காரணமென்று ஞாபகத்திவ்வைக்கவேண்டும். இவ்வித ஸ்திரீகளை அகாலத்தில் - அதாவது - தேகத்திற்கு போதுமானபலம்வராததற்குமுந்தி - வேலைசெய்யவொட்டாமல் தடுத்து, படுக்கையிலேயிருக்கும்படி ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

23 - ம் அதிகாரம்.

பிரசவத்தில் மாமிச அழுகல் அகற்றி.

ANTISEPTICS IN MIDWIFERY.

(ஆண்டிசெப்டிக்ஸ் இன் மிட்வொய்பறி.)

பின்னாத்தாய்ச்சிகளுக்கு (தொற்றுரோகவிஷத்தாக கத்தால்) மாமிசம் அழுகல் (septicemia) நேரிடும்காலே, வீசெத்தி வஸ்திரசுத்தி முதலியசுகதிகளை ஜாக்கிரதை யாய்ச்செய்துகொண்டு வில்லவாரணி என்னும் அழுகலக ற்றி (antiseptics) மருந்துகளையும் தூக்கித்தமகற்றி (disinfectants) மருந்துகளையும் கையாவதால் அல்விஷத்தா க்க அழுகல் விசேஷம் குறைவுபட்டுப்போயிருக்கிறது. ஆனதுபற்றியே, பிரசவவைத்தியத்துக்குப் போகையில் இவ்விஷபத்தில் கண்டிதமாய் முன்ஜாக்கிரதை எடுத்து க்கொள்ளவேண்டியது கேவல ஆவசியகமென்க. வைத்தியன் மருத்துவச்சி இருவரும் கைகங்களை ஒட்டச் சீவி எடுத்துவிட்டு (சோப்பு) சவுக்காரம் தண்ணீர் இவற்றாலும் (நைல்-புஷ்) நகக்குச்சாலும் நன்றாய்த் தேய்த்து கைகளையும் நகங்களையும் பூரணமாய்க்கழுவி சுத்திசெய்துகொள்ளவேண்டியது. பிறகு (சோப்பு) சவுக் காரப்பற்றமவுக்கழுவிக்கொண்டு ஆயிரத்துக்கொருபங்காய்க்கட்டிய “இரசசத்து” (perchloride of mercury) அல்லது சல்வீர (corrosive sublimate) கிராவகத்தில் ஒரு நிமிஷம் கைகளைவைத்திருக்கவேண்டும். மறுபடியும் அப்போதைக்கப்போது கைகளைத் தேய்த்து சுத்திசெய்துகொள்வதற்காக அந்திராவகம் விட்ட ஓர்பாத்திரத்தை பிரசவஸ்திரீயின் படுக்கைப் பக்கத்தில் வைத்திருக்கவேண்டும். பிரசவத்தின்பின் ஜனன உறுப்புகளை பிரதியாவர்த்தி சுத்திகரிப்பதற்கு முந்தி, தாதி அதேபிரகாரம் முன்ஜாக்கிரதைகளைக் கைக்கொள்ளவேண்டும். முத்திரக்துழல் (catheter) ஒன்று ஆவசியகமாயிருந்தால், அதையுங்கழுவி சுத்திகரிக்க அவ்

வளவுவலிவுள்ள திராவகத்தை உபயோகிக்கவேண்டும். குமுகளையும் மற்ற எழுகாயுதங்களையும் பூணமாய்த் தேய்த்துக் கழுவினபின்னர் காற்பகுக்கு ஒருபங்காய்க்கூட்டிய காற்பாஸிக் ஆஸிட் லோஷ் (carbolic-acid lotion) னில் சிறிதுநேரம் தேயுத்துவைப்பதே அவற்றைப்பரிஷ்காரமாய் சுகதிகரித்துவிடும். “காற்பாஸிக் ஆஸிட்” மருந்தொன்றுதவிர மற்ற சுத்திகரிப்புமருந்துகளில் பெரும்பான்மையானவற்றிற்கு (சோப்பு) சவுக்காரம் விசோதமானதென்பதையும் “காற்பாஸிக் ஆஸிட் லோஷன்” (carbolic acid lotion) “சவ்வீர” (corrosive sublimate) உதை நிர்வீரமாக்குமென்பதையுக்கூட ஞாபகத்திலுள்ளிக்கவேண்டும். பிரசவ ஆரம்பத்தில் ஜன்ன உறுப்புக்களின் மேற்பாகத்தை சவுக்காரத் (soap) தாலும் ஜலத்தாலும் அலம்புதல்வேண்டும். சமயப்பட்டால் பிரசவ ஆரம்பத்தின் பின் 2000-க்கு ஒருபங்குவிதம் சேர்த்த “சவ்வீரதிராவக” (corrosive sublimate) த்தை மர்மதானத்துக்குள் பாய்ச்சி அலம்புதல் யுக்தமாம். பிரசவ இரண்டாம்பாதம் வழக்கத்துக்கடிகம் நீடித்தாலும், முக்கியமாய் பனிநீர் கெட்டுப்போய் பிரசவநீடிப்புக்குறிகள் காணப்பட்டாலும், இவ்வாறுசெய்வது அவசியமாம். பிரசவத்தின்பின், 4000-க்கு ஒருபங்காய்க்கூட்டின வலிவுகுறைந்த “சவ்வீரதிராவக” (corrosive sublimate) த்தை உபயோகிக்கலாம். ஜன்ன உறுப்புகளை அலம்புவதற்கும் அவ்வித வலிவுகுறைந்த திராவகத்தையே உபயோகிக்கவேண்டும். “கர்ப்ப அழுகு” (lochia) தூக்கந்தமாகவிருந்தால், இன்னும் வலிவான (அதாவது 2000-க்கு ஒருபங்காய்க்கூட்டின) தாய் திராவகமிருக்கவேண்டியதாகும். பிரசவம் ஆனதும் இம்மருந்து வெகுவாய் உடம்பில் ஊறிப்போவது முண்டு. இம்மருந்து உள்தங்காமல் தாாளமாய் வெளிகாணும்படி செய்வதில் விசேஷஜாக்கிராதேவேண்டும். இவ்வாவிடிலோ விஷயிப்புக்குறிகள் காணும்வாய்ப்பிடிப்பில் காருகிறதபோல் வாயில் நீர்காருதலும்

தபேதி அல்லது அதிகாரபேதியும் வயிற்றுக்கெடுப்புமே யுக்குறிகளென்க. பிரசவவைத்திய அதுபவத்தில் மெத்தவும் கைகண்ட (antiseptic) “அழுகல் அகற்றி” மருந்தாகிய சவ்வீரமல்லாமலும், ஒருபயிண்ட்ஜலம்சேர்த்த இரண்டு தேயிலைக்கண்ணடி போரிகிக் ஆஸிட் (Boric acid), 20 அல்லது 30-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த காண்டி லிசுயிட் (Condy's fluid), 50 அல்லது 60-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த (chlorinated soda solution) துளோரினட் சோடா சோலியூஷன், 80 அல்லது 100-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த (carbolic lotion) காற்பாஸிக் லோஷன் ஆகிய இவைபோன்ற மற்ற (antiseptics) அழுகல் அகற்றி மருந்துகளையும் உபயோகிக்கலாம்.

50-க்கு ஒருபங்காய்க்கூட்டியதானில் (corrosive sublimate) சவ்வீரமென்னும் அழுகல் அகற்றி (antiseptics) மருந்தை சுலபமாய் கையில்கொண்டு போகலாம். இதில் 20-க்கு ஒருபங்கு அதாவது ஒரு அவுன்ஸுக்கு 20 அவுன்ஸுகொண்ட ஒரு பயிண்ட்ஜலம்சேர்க்க, 1000-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த திராவகத்தின் வலிவுடையதாகும். தப்புசெய்யாமல் உடனே கண்டெடுக்கும்பொருட்டு, இம்மருந்தை (cochineal) கச்சினியல் அல்லது (carmine) காமயின் என்னும் மருந்தால் செங்கிறப்படுத்திவைத்துக்கொள்வது உத்தமம். இந்தத்திராவகத்துக்குப் பதிலாக 10 தானியமணி “சவ்வீர”ச் சூரணமும் (corrosive sublimate powders) ஒரு தானியமணி “கச்சினியல்” மருந்தும்கலந்த பொட்டலங்கள் கையில்கொண்டுபோகலாம். இதை ஒருபெட்டியிலிட்டு, அப்பெட்டியின் மேற்புறத்தில் (Corrosive Sublimate Powders' Poison) “சவ்வீரத்தூண்பொட்டலங்கள்-பாஷாணம்” என்று ஒரு சீட்டு எழுதி ஒட்டவேண்டும். இத்திராவகம்செய்யமுறை: ஒரு பொட்டலத்தைபெடுத்து (சுயமுதவியலோ ஊத்தால் ஓரம்பற்றவைக்காக) ஓர் சுத்தபாத்திரத்தில் போட்டு, 20 அவுன்ஸுகொண்ட ஒருபயிண்ட் வெந்நீர் அதிலேவிட்டு, அது பூணமாய்க்கறை

ந்து ஒன்றாகும் எனவும் அதைவிரலால் கலக்கிக்கொண்டிருப்பதே. இந்தத்திராவகத்திற்கு 1000-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த மருந்தின்வலிவிருக்கும்.

முன் ஜாக் கிரதையுடன் அதி ஆவசியகமாகச் செய்ய வேண்டிய வேறொரு முயற்சியுண்டு. குழந்தையின் கிரசு வெளிகாலைகளில், (தாய்க்கு) மலமும் வெளிகாணவொட்டாது தடுப்பதற்கு, பிரசவ ஆரம்பத்திலேயே மலக்குடவி உள்ள இவையெல்லாம் நன்றாய்க்கழித்து விடுதல்வேண்டும். இதற்குத்தான் எப்போதும் பிரசவத் தொடக்கத்திலேயே கர்ப்பிணிக்கு ஆசனக்குழி (enema) லால் தாராளமலப்பிரவர்த்திசெய்து வைக்க வேண்டும்.

பின்வரும்விதிகள் ஜாக் கிரதையாய் அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டும்:—

1. வைத்தியரும் மருத்துவச்சியும் தம் தம் கைகளை கைச்சீனி யெடுத்துவிடவேண்டும்.

2. ஜனன உறுப்புகளைப் பரிசுத்தப்படுத்தி அல்லது தெரிவதற்குமுந்தி சவுக்கா (சோப்பு) மும் ஜலமும் கொண்டு கைகளையும் மணிக்கட்டுகளையும் தேயத்துக் கழுவி (nail-brush) நகக்குச்சால் நகங்களைச் சுத்திசெய்யவேண்டும். அப்புறம் அந்த (soap) சோப்பு (சவுக்கா) ப்பற்றும்போகக் கைகளைச் சுத்தமாய் அலம்பிவிட்டு 1000 - க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த (antiseptics) அழுகல் அகற்றி த்திராவகத்தில் ஓர் முழுநிமிஷம் ஊறவைக்கவேண்டும். பரிசுத்த ஆரம்பிக்கும்வரையில் கைகளைத் துடைத்தல்கூடாது.

3. பரிசுத்தமானபிறகு நகங்களை மறுபடியும் (soap) சோப்பும் தண்ணீரும் கொண்டு தேயத்துக்கழுவி (antiseptics) அழுகல் அகற்றி த்திராவகத்தில் தேயத்துவைக்கவேண்டும்.

4. பிரசவத்தின்பின் 2000 - க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த (antiseptics) அழுகல் அகற்றி த்திராவகத்தில் (ஜனன உறுப்பின்) மேற்பாகத்தைக்கழுவி சுத்திசெய்யவேண்டும்.

5. பிரசவமானதுமுதல் 6 - நாள் வரைக்கும் 2000 - க்கு ஒரு பங்காய்க்கூடியதின் வலிவுடைய அரைக்கால் (quart) கால்லன் (அதாவது 24 அவுன்சு) அழுகல் அகற்றி (antiseptics) திராவகத்தால் மர்மஸ்தானத்தை தினம் இரண்டு ஆவர்த்தி சுத்திசெய்யவேண்டும்.

6. மூத்திரம் இறக்கும் குழல் (catheter) கண்ணாடிக்குழலாயிருந்தால், அதை உபயோகிப்பதற்கு முந்தி 1000 - க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த (antiseptic solution) அழுகல் அகற்றி த்திராவகத்தில் ஒரு முழுநிமிஷம் தேய வைக்கவேண்டும். பித்தளை முதலியலோகத்தால் செய்ய்த குழலாயிருக்குமாகில், 40 க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த “கார்பாலிக் ஆலிட் லோஷ்” (carbolic acid lotion) னை உபயோகிக்கவேண்டும். அதற்கு “டெரிபின் ஆயில்” (Terebene oil) பூசவேண்டுமாயில், 4-க்கு ஒருபங்காய்க்கூட்டி உபயோகித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

7. அநேகநாட்டில் சாதாரண (diapers) பிட்டு வான பின்னல்துவால்களுக்குப் பதிலாக “தூரகந்திச்சீலைகள்” (sanitary towels) கிடைக்கக்கூடும். சவ்விசம் (corrosive sublimate) அல்லது கார்பாலிக் ஆலிட் (carbolic acid) தெளித்த “தூரகந்திச்சீலைகள்” என்ன உபயோகத்தைக் கூடுமானவரையில் அபிவிருத்தி செய்யவேண்டும். ஏனெனில், அச்சீலைகள் சாதாரணமாய் சொற்பவிலைக்குக் கிடைக்கக்கூடியவைகளாயும் மற்ற சீலைகளிலும் கிறப்பயமாய் உபயோகிக்கத்தக்கினவைகளாயும், உபயோகித்தானபின்பு (எனினில்) கிழித்தெறி யக்கூடியவைகளாயும் இருப்பதாலென்க.

8. கிசவித்குக்கண்ணோய் (sore-eyes) வரவொட்டாமல் தடுப்பதற்கு அதின் கிரசு உதயமானதே, கூடுமா

னால் அது கண்டறிப்பதற்குமுந்தி, மிருதுவான ஓர் சிறு சலவைக் கைக்குட்டையால் அதின்கண்ணிமைகளை ஜாக் கிரதையாய்த் துடைத்து, பிரதிகண்ணிலும் 6000-க்கு ஒருபங்காய்ச்சேர்த்த (corrosive sublimate) “சல்வீரத்திராவக” த்தில் 3 அல்லது 5 துளி விடவேண்டும்.

9. பிரசவசுர “விஸ்ரம்” அல்லது “மாமிஸ அருகல்” (septicæmia) அல்லது தொற்றுரோகமென்று தெரிந்த வேறெந்தநோயையேனும் போய்ப்பார்த்துவந்த மருத்துவச்சியானவள குறைந்தது 10 - நாள்வரைக்கும் நூதன அல்லது இரபிரசவம் பார்க்கப்போகப்படாது. இதன்மத்தியில் தன்னையும் தன் உடைகளையும் தொற்றுப்பற்றற பூரணமாய் சுத்திகரித்துக்கொண்டும், கூடுமானவரை சில் வெளிக்காற்றில் உலாவுதல் முதலிய சரீரசுக அபாயாசங்களைச் செய்யவேண்டும். வெளிமருத்துவத்துக்குப் போருங்கால் பருத்திவஸ்திரம் அல்லது தோய்க்கத்தக்க உடைகளைத் தரிப்பது உசிதமென்க.

10. மருத்துவச்சிகள் தங்களையும் தங்கள் பார்வையினருக்கும் நோயாளிகளையும் சுசி - சுத்திபெய்தல்தில் கண்ணாடிகளுக்குத் துமாயிருந்து கண்டிதமாய் நடத்திவருகிறார்களென்று வைத்துக்கொள்வோம். தேக செளக்கியமும் சுசியும் உள்ள மருத்துவச்சிகளினிடம் வைத்தியம் பார்த்துக்கொள்ளுமவர்களும் செனக்கியவதிகளே யாவர்.

குறிப்பு:—இதனுடன் 7-வது “அங்கார” த்தையும் அதின் அதுபந்தத்தையும் சேர்த்து வாசிக்கவும்.

GLOSSARY.

(ANGLO-TAMIL.)

அரும்பத அகராதி.

A

Abdominal muscles	..	..	அடிவயிற்றின்தசைநார்.
Abdominal or ventral gestation	..	..	அடிவயிற்றில் கருதரித்தல்; குமபிகர்ப்பாதாரணம்.
Abdomen	..	..	சரிந்த அடிவயிறு.
Abdomino-anterior position	..	..	வயிறு எதிரான நிலை.
Abnormal pregnancy	..	..	விபரீத கருதரித்தல்.
Abortion	..	..	கருநீழிவு; கர்ப்பநஷ்டம்; கர்ப்பநீளம்.
Abscess	..	..	பெருக்கடி; விப்புருதி.
Acetabulum	..	..	கம்சு; எலும்புக்குழி.
After-birth	..	..	நஞ்சு மாயை.
After-pains	..	..	பிரசவத்த பின்வரும் உர்ப்பவேதனை.
Ala	..	..	இடுப்பென்பின் சிறகுபோன்ற பாகம்.
Albumen	..	..	முட்டையின் வெள்ளைக்கரு.
Albumenuria	..	..	உடம்புவிக்கம்; பாண்டொரோகம்.
Aloes	..	..	மூசாம்பரம்; கற்றாழை.
Alum	..	..	பழகாரம்.
Alveolar ridges	..	..	பல்லீறு மேடுகள்.
Ammonia	..	..	நவசாரம்.
Amnion	..	..	கருவின் உட்புறஜவ்வுப் போர்வை.
Anatomy	..	..	அங்காதிபாதசாஸ்திரம்; அங்கத்தாவம்.
Anæmia	..	..	இரத்தக்குறைவு; சோகை.
Anchylolosis	..	..	பீடிகைப் புச்சுவென்பின் வன்மையானபொருத்து.

Anæsthesia ..	பிரக்கிணையற்றுக்கிடக்கை.
Anterior commissure ..	யோனி உதகைள் தேழுக்கடும்.
Antiseptics ..	அழகலகற்றி.
Antiversion ..	முன்னுக்கு வளைதல்.
Anus ..	அபானதுவாரம்.
Appetite, capricious ..	அகால கள்ளப்பசி.
Arbor vitæ ..	ஜீவவிருட்சம்.
Arch of pubis ..	மேகனவளைவு.
Areola ..	ஸ்தனக்காம்பைச் சுற்றியவட்டம்; ஸ்தனமண்டலம்.
Areola, secondary ..	தொடர்ஸ்தனவட்டம்.
Aromatic chalk powder ..	சுகந்த சுண்ணாம்பம்.
Artery ..	பெருநரம்பு; நாடி.
Articulations ..	பொருத்துகள்; கணுக்கள்.
Asafoetida ..	பெருங்காயம்.
Asthma ..	சுளை; காசம்.
Audible signs ..	காதால் அநிகுறிகள்.
Auto-genetic ..	விகதமான; தனக்குள்ளிலிருந்துதோன்றுகிற.
Axis ..	அருவம்.
Axis of the pelvis ..	கப்பகத்துருவம்.

B

Ballottement or re-percussion. ..	பிண்ட ஏற்ற இறக்க சோதனை.
Basin ..	அகன்ற ஆழமானபாத்திரம்.
Barren ..	மலடான.
Binder ..	இடுப்புக்கட்டு.
Bi-polar turning ..	இருகால்பற்றித்திருப்புதல்.
Blades ..	அலகுகள்; சிறுபலகைகள்.
" pubic ..	மேகன அலகு.
" sacral ..	பீடிகை அலகு.
Blanching ..	வெளுவெளுப்பு.
Bladder ..	ஜலப்பை; மூத்திரப்பை; மூத்திரகோசம்.
Bones ..	எலும்புகள்.
Bones, cranial ..	க்பால எலும்புகள்.
Bones, frontal ..	நெற்றி எலும்புகள்.
Bones, parietal ..	பித்திகை எலும்புகள்.

Bones, occipital ..	பிடரி எலும்புகள்.
Borax ..	வெண்காரம்.
Bowels ..	குடல்கள்.
Breasts ..	ஸ்தனங்கள்.
Bridge of the nose ..	மூக்குத்தண்டு; நாசிகை.
Bronchitis ..	சுவாசப்பை வீங்குதல்; நீர்கோர்த்துக்கொள்ளுதல்.

C

Can ..	ஜலயந்திரம்; தொட்டி.
Caput succedaneum ..	சிசுத்தலையில் காணும் புராகுழப்போன்ற கட்டி; உபசிசு.
Cartilage ..	தடித்த ஜவ்வு; ஜவ்வு.
Carus curve ..	பிடிவளைவு.
Catamenia ..	மார்விடாய்; தீட்டு.
Catamenia, suspension of. ..	தீட்டுவராமல் திங்குதல்.
Catheter ..	சிறுநீரிறக்குங்குழல்; மூத்திரக்குழல்.
Cavity ..	கப்பகத்தின் மத்தியவெளி; குழி.
Cellular tissue ..	சன்னல்பின்னலான மெல்லிய ஜவ்வு.
Cervix uteri ..	கர்ப்பாசயக்கழுத்து குவ்வொள்ளுதல்.
Chorion ..	பிண்டக்கவசம்.
Circulation ..	இரத்த ஓட்டம்.
Cistic disease ..	நீர்வியாதி.
Clitoris ..	சுமரி; காமமூளை.
Clot ..	கட்டி.
Coccyx ..	புச்ச எலும்பு.
Coffee grounds ..	காப்பிக்கொட்டைத்திப்பி.
Collar bone ..	காதை எலும்பு.
Colostrum ..	கரும்புப்பால்; சும்பால்.
Commissure ..	விடபக்கடிவாளம்.
Conjugate ..	குறுகியவட்டம்.
Conjugate diameter ..	தலைமையம்.
Conjunctivitis ..	கண்ணிலுண்டாகும் ஓர் நோய்.
Constipation ..	மலக்கட்டு; மலச்சிக்கி.
Convex ..	வெளிப்புறம் குவிந்த; மொட்டுப்போன்ற.
Convulsion ..	வலி; வலிப்பு.

Convulsion, puerperal ..	பிரசவவலி; ஜன்னிவலி.
Corrosive sublimate ..	சவ்வீரம்.
Cranial bow ..	கபோல வில்வளைவு.
Curve of carus ..	பிடரிவளைவு.
Cystic or vesicular mole ..	கருவின் மேற்போர்வை; கொப் புளப்பிண்டம்.

D

Debris ..	ஜவ்வுத்துண்டுகள்.
Decidua ..	எபிஜவ்வு.
Decidua reflexa ..	எறிஜவ்வு கவசம்.
Decidua vera ..	சய எறிஜவ்வு.
Decidua scrotina ..	எறிஜவ்வு பீட்டம்.
Diameter ..	குறுக்களவு; விட்டம்.
Diameter, bi-parietal ..	இரண்டு பித்திகை எலும்புக்கு முள்ள குறுக்களவு.
Diameter, fronto-mental ..	எதற்றி எலும்புக்கும் முகவாய்க் கட்டைக்குமுள்ள குறுக்களவு.
Diameter, oblique ..	சாய்ந்த குறுக்களவு.
Diameter, occipito-frontal ..	பிடரிக்கும் முகவாய்க்கட்டைக் குமுள்ள குறுக்களவு.
Drapers ..	பின்னல் துவால்கள்.
Diaphragm ..	துளை நரல் தாங்கி.
Diaphoretics ..	வெயர்வையுண்டாக்கும் மருந் துதள்.
Diarrhoea ..	வயிற்றுக்கழிச்சல்; பேதி; கிரா ணி; அதிகாரம்.
Diet ..	பத்திய ஆகாரம்.
Digital examination ..	விரலால் பரிசோதனைசெய்தல்.
Dilatation ..	விரிதல்.
Disinfectants ..	அர்க்கந்தமகற்றி; தொற்றகற்றி மருந்துகள்.
Displacement of uterus ..	கர்ப்பாசய நிலைகுலைவு.
Dissecting room ..	சவச்சே; சோதனைக்குறும்.
Distension of uterus ..	கர்ப்பாசய அடைப்பு.
Dorso-anterior position ..	முதுகு நிரிப்புறமான நிலை.
Dropsy ..	நீர்க்கோர்வை; வீக்கம்.
Duration of pregnancy ..	கர்ப்பகால நீடிப்பு.
Dysentery ..	சேபேதி; வயிற்றுநிலை.
Dysmenorrhœa ..	நோயுடன்காணும் மாதவாய்.

Dyspepsia ..	குன்மம்; அஜீரணம்.
Dyspnoea ..	கஷ்டசுவாசம்; மூச்சுவிடப் பிர யாசப்படுதல்.
Dystochia ..	கஷ்டப்பிரசவம்.
Dysuria ..	நீர்கடுப்பு; நீர்சுருக்கு.

E

Embryo ..	முற்றாதபிண்டம்; இளங்கரு.
Enemata or enema ..	ஆசனக்குழல்; மலக்குழல்.
Enasiform cartilage ..	நெஞ்செழும்பின் கடைசிறுநத் பெண்பு.
Enteritis ..	குடல் அழற்சி; குடல்தாபிதம்.
Epidemic ..	பெருவாரி; கொள்ளைநோய்.
Epilepsy ..	காக்கைவலி.
Erysipelas ..	அக்கி; தோல்வெதுப்பம்; தோ ல் அழற்சி.
Eutocia ..	சிரமப்பிரசவம்.
Examining fluid ..	பரிட்சா இராவகம்.
Excretion ..	மலம்.
Expulsion ..	தள்ளுதல்; முக்குதல்.
Extraction ..	இழுத்தெடுக்கை.
Extra-uterine gestation ..	கர்ப்பாசயத்தைவிட்டு வேறிடத் தில் கர்ப்பமுண்டாகுதல்; அ திகர்ப்பாதாரணம்.

F

Fetus ..	பிண்டம்.
Fetus, hydrocephalic ..	தலையில் நீர்கோர்த்தபிண்டம்.
Fallopian tube ..	கிளைப்பாதை; நாதக்குழல்.
False pains ..	பொய்நோய்.
False waters ..	பொய்நீர்; பொலிநீர்.
Feeble fluttering ..	மந்தகமனம்; அற்ப அசைவு.
Fenestrum of forceps ..	குறட்டின் இடைவெளி விரிவு.
Fever ..	சுரம்; காய்ச்சல்.
Fever, milk ..	முலையில் பால்கட்டிய சுரம்.
Fever, puerperal ..	பிரசவசுரம்; ஜன்னிக்காய்ச்சல்.
Fever, scarlet ..	மஞ்சக்கசுரம்.
Fever, typhoid ..	சனலிபாதசுரம்.

Fimbria	விரல்போன்ற சுருங்கல்கள்.
Fissures of the nipples	ஸ்தனக்காம்பின் வெடிப்புகள்.
Fibres	தும்புபோன்ற நரம்புகள்; ஜல் வி நரம்புகள்.
Fleshy mole	சதைப்பிண்டம்.
Flexion	மடங்கல்; மடிப்பு.
Follicles	கிணைப்பைக்குள்ளிருக்கும் நுண் ணிய ஜவவுப்பைகள்; இலை போன்ற தழும்புகள்.
Fontanella	உச்சி.
Fontanella, anterior	எதிர் உச்சி; முன்னுச்சி.
Fontanella, posterior	பின்னுச்சி.
Foramen ovale	அண்டவிர்த்தத் துவாரம்.
Forceps, large	நீண்ட குறடுகள்.
Fourchette	விடபக்கடிவாளம்.
Fulcrum	சமநிலைத்திராசுருண்டு.
Funis	நாபிக்கொடி.
Funis, descent of	நாபிக்கொடி இறக்கம்.
Funis-repositor	நாபித்தாங்கி.

G

Gas	வாய்வு.
Gastric sympathy	வயிற்றின் ஒத்தணர்ச்சி.
Gastrotomy	அடிவயிற்றைக்கீறித்திறக்குதல்.
Genitals	ஜனனேந்திரியங்கள்.
Gestation	கர்ப்பமாயிருத்தல்; கர்ப்பாதார ணம்.
Gestation, extra uterine	அதிகர்ப்பாதாரணம்.
Gestation, abdominal or ventral, ...	கும்பி கர்ப்பாதாரணம்.
Gestation, ovarian	அண்ட கர்ப்பாதாரணம்.
Glairy mucus	வழுவழப்பு.
Glands	கோளங்கள்.
Glands, enlarged	நெற்குங்கோளங்கள்.
Glands, utricular	கர்ப்பாசு கோளங்கள்.
Glass nipple shields	கண்ணாடி "ஸ்தனக்காப்பு" கவ சம்.
Graafian vesicles or follicles, ...	சிறுநொய்போன்ற கிணை

Greenwaters	பச்சைநிறமான நீர்.
Groins	தொடைச்சந்து.
Gudary	குதிரி; குல்டு; டோட்டு.

H

Hæmorrhoids	இரத்தமூலம்.
Hæmorrhage	இரத்தப்பெருக்கு; பெரும்பாடு.
Hæmorrhage, abortion	கருவழிவிலவரும் உதிரப்பெருக் கு.
Hæmorrhage, accidental.	அகஸமர்த்தான உதிரப்பெருக் கு.
Hæmorrhage, post-partum.	பிரசவத்திற்குப் பிந்திய உதிரப் பெருக்கு.
Hæmorrhage, secondary.	இரண்டாந்தரமான உதிரப்பெ ருக்கு.
Hæmorrhage, unavoidable	தடுக்கக்கூடாத உதிரப்பெருக்கு.
Hæmorrhagic fever	பெரும்பாட்டுச்சூரம்.
Heart	இரத்தாசயம்; இருதயம்.
Hip bath	இடுப்பு ஸ்நானம்.
Hetero-genitic	விகத; வெளியிலிருந்துவருகிற.
Hour-glass contraction	உடுக்கைபோல் சுருங்குதல்.
Hydrocephalic foetus	நீர்க் கோர்த்துக்கொண்டிருக்கு ம் பிண்டம்.
Hymen	பிறைச்சவவு.
Hysteria	சூதகஜனனி.
Hysterical excitement	சூதகஜனனி சேஷடை.

I

Ilium	இடுப்பெலும்பு.
Imaginary line	உத்தேசக்கோடு.
Impaction	கூபகத்துள் தலைபோறுத்தல்.
Imperforate anus	துவாரயில்லாத அபானம்.
Imperforate urethra	துவாரயில்லாத நீர்த்தாணா
Inclined planes	சாய்ந்த மட்டங்கள்; சாய்ந்த தளங்கள்.
Inflammation	தாபிதம்; அழற்சி.
Instep	புறங்காஸ.

Integument	தோல்.
Irritation	எரிச்சல்; அருவற்பு.
Ischium	ஆசனவெலுமபு.

J

Jaundice	மஞ்சட்காமாலை.
Junction	பொருந்தமிடம்.

K

Kidney	குண்டிக்காய்.
--------------	---------------

L

Labia majora	யோனியின் பெரிய உதடுகள்.
Labia minora	யோனியின் சிறு உதடுகள்.
Labour	பிரசவவேதனை.
Labour, complex	சிக்கரான பிரசவம்.
Labour, compound	கலப்பான பிரசவம்.
Labour, difficult	கஷ்டப்பிரசவம்.
Labour, inverted	கவிழ்ந்த பிரசவம்.
Labour, laborious	வருத்தமான பிரசவம்.
Labour, missed	கண்டு மறைந்த பிரசவம்.
Labour, natural	இரமப்பிரசவம்; சாதாரணப்பிரசவம்.
Labour, premature	அகாலப்பிரசவம்.
Labour, premonitory signs of	பிரசவ எச்சரிப்புக்குறிக்
Labour, preternatural	கிரமாதீதப்பிரசவம்.
Labour, stages of	பிரசவபாதங்கள்.
Labour, tedious	தாமதப்பிரசவம்.
Labour, transverse	குறுக்கான பிரசவம்.
Laceration of perineum	விடப்பங்கிழிதல்.
Lactation, period of	பால்குரக்குகாலம்.
Lateral plane	சரிவுமட்டம்.
Laudanum	அபின் திரவம்.
Layers	புனாகம்.
Leech	அட்டை.
Leverage motion	ஏற்றத்தின் அகைவு.

Ligament	தசைநார்.
Lip	மடல்; உதடு; இதழ்.
Ligature	தூல்போன்ற தரம்பு.
Lining membranes	உள் ஓர பந்திப்புதல்கள்; பாசக்கட்டிதல்கள்.
Lint	பஞ்சுத் துணி.
Liquor amnii	பனிநீர்.
Liquor ferri perchloride	அயத்திராவகம்.
Liver	கல்லீரல்.
Lobes	மடல்கள்.
Lochial discharge	அழுக்குப்பதெல்.
Lock-jaw	பல்கட்டுதலுன்னி.
Longings	மசக்கை; அவா.
Lotions, disinfectant	நிர்மலஉதகம்.
Lubricate	எண்ணெய்பூசுதல்.
Lumbar region	இடுப்பைச்சுற்றியபகுதி.
Lungs	துரைநரல்; சுவாசப்பை.
Lymphatic glands	நீர்க்குண்ட விசைநரம்புகள்.

M

Malformation	விருபம்; விகாரம்; பழுதான உருவம்.
Malposition	நிலைமாறியிருத்தல்; சரியற்ற நிலை.
Mammary symptoms	ஸ்தனியின்னங்கள்; பால்குரப்புக்குறிகள்.
Manoeuvre	கைச்சமர்த்து; அஸ்தவாகவம்.
Measure glass	மருந்து அளக்கும் திளாஸ்.
Meatus urinarius	ஜலத்துவாரம்; நீர்த்தாரை.
Mechanism of labour	பிரசவகுத்திரம்.
Meconium	காட்டுமலம்.
Membrane	பனிநீர்க்குடம்; ஜவவு.
Menorrhagia	பெரும்பாடு.
Menses	மாதவிடாய்.
Menstruation	மாததுரம்.
Mental despondency	மனோவியாகுலம்.
Metritis	கர்ப்பாசயஅழற்சி.
Midwife	மருத்துவச்சி.
Minim measure	துளிஅளவு.
Mole, fatty	கொழுப்புஅடை; பிண்டம்.

Mole, fleshy	சதைப்பிண்டம்.
Mole, vesicular	கொப்புளப்பிண்டம்.
Mons veneris	காமக்குன்று; அல்குல்.
Morbid adhesion	நைந்து ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல்.
Morning sickness	காலையாந்தி; குமட்டல்.
Moulding of the foetal head	பிண்டசிரசு உருப்படுகை.
Mucus	சளிபோன்ற நீர்.

N

Napkin	பிரசவித்தவளுக்கு அனாயில்சுட்.
Nausea	மெ முக்கோணச்சீலை.
Navel string	குமட்டல்.
Nerves	நாபிக்கொடி.
Nerves, reflex	சிறுநரம்புகள்.
Nipples	ஸுமரணைநரம்புகள்.
Nymphæ	ஸ்தனக்காம்புகள்.
	அல்குலின் உள் ளுநடுகள்.

O

Oblique	சாய்ந்த அல்லது சீதச்சரிப்பான.
Obstetrics	மருத்துவமுறை.
Obstetric position	மருத்துவக்கிரமநிலை.
Obturator foramen	குந்தகத்துவாரம்.
Occiput	பிடரி.
Occipito-anterior position	பிடரிமுன் ஓட்டு.
Occipito-posterior position	பிடரியின் ஓட்டு.
Operation	கிரியாவிசேஷம்; ஆயுதகிசுச்சு.
Operation, high	ஊர்த்துவாங்க கிசுச்சு.
Operation, low	அதாங்க கிசுச்சு.
Orbital ridges	கண்குழி நரங்கள்.
Os	கெட்டியெலும்பு.
Os innominatum	ஆசனச்சந்தெலும்பு.
Oscillation	ஊசல் அசைவு.
Ovaries	கிணைப்பைகள்.
Ovule, excitement of	கிணைகளின் கிளர்ச்சி.
Ovum	கரு, கிணைமட்டை.

P

Pad	சிறுபஞ்சணை.
Pains	இடுப்புநோய்.
Pains, bearing down	கீழ்நோக்கிவரும் இடுப்புநோய்.
Pains, cutting	அறுத்துத்தள்ளுவதுபோல் எடுக்கும் நோய்.
Pains, grinding	கொந்தித்தள்ளுகிறதோய்.
Presentation of knee	முழங்கால் உதயம்.
Presentation of elbow	முழங்கை உதயம்.
Presentation of shoulder	புய உதயம்.
Presentation of breech	புட்ட உதயம்.
Presentation of feet	பாத உதயம்.
Presentation of brow	நெற்றி உதயம்.
Process	பொருட்டு.
Prognosis	முன்கூறுகள்.
Prolapse of funis	நாபிக்கொடிதொங்குதல்.
Phthisis	கூயரோகம்.
Pubes	அல்குலின்மேடு; காமமேடு.
Puberty	பருவமடைதல்.
Pulse	நாடிதடை; நாடியோட்டம்.
Pyriform	பம்பரவடிவு.



Q

பிண்டசலனம்; கிசுவியற்றல் அடித்தல்.

R

Ramus	கிளை.
Rectum	அபானம்.
Reflex	எதிர்த்தாக்கம்.
Reproduction	திரும்புபெருக்கம்.
Respiration	சுவாசம்.
Restitution	திரும்பச்சுழல்.
Resuscitation	உயிர்ப்பித்தல்.
Retention of urine	நீர்கட்டு.
Retroversion of uterus	கர்ப்பாசயம் பின் ளுக்குவளைதல்.
Rigidity	கடினத்தன்மை.

Rigour	தேகம் விவாத்துக்கொள்ளுதல்;
Rotation	நடுக்கம்.
Rupture	சுழல்; சுழற்சி.
Rupture, membranous	கிழிபடுதல்.
Rupture of vagina	பனிநீர்க்குடம் உடைதல்.
	யோனிச்சிதைவு.

S

Sacral promontory	பீடிகைமேல்முனே.
Sacro-coccygeal ligament.. .. .	பீடிகைப்புச்ச அஸ்திபந்தனம்.
Salvolatile	நவசாரப் பரிமாண திராவகம்.
Sacro-iliac synchondrosis.. .. .	பீடிகை இடுப்பெலும்பின்பொரு
	த்து.
Sacro-ischiatic ligament.. .. .	பீடிகை ஆசன அஸ்திபந்தனம்.
Sacro-sciatic	பீடிகை ஆசனத்தசைநார்கள்.
Sacrum	பீடிகை எலும்பு.
Sagittal suture	வில்விலிம்பு; கபால ஒட்டின்
	பொருத்து.
Saline purgative	உப்புபேதி.
Saliva	உமிழ்நீர்.
Sanitary towels	தூரசுத்திச்சீலைகள்; துடைமத்
	துணி.
Scrofula	கண்டமாலை.
Seatangle tents	குச்சுகள்.
Secundines	நஞ்சும் அதைச்சேர்ந்த சி
	ஜவ்வும்.
Senna, confection of	நிலவாவிலைவேகம்.
Septicæmia	இரத்தவிஷமிப்பு; விஸ்வரோகம்.
Shank	அலகின்காம்பு.
Show	பிரசவாரம்பமுட்குறி; சுரோணி
	தம்.
Signs	குறிகள்.
Signs, abdominal	அடிவயிறுபின் குறிகள்.
Signs, audible	காதால் கேட்டறியக்கூடிய குறி
	கள்.
Signs, ballottement	பிண்டம்மிதக்குங்குறிகள்.
Signs, mammary	ஸ்தனக்குறிகள்.
Signs, palpable	தொட்டறியக்கூடிய குறிகள்.
Signs, vaginal	யோனிக்குறிகள்.
Signs, visible	கண்ணுக்குத்தோற்றுங்குறிகள்.

Slough	அழுகல்.
Small-pox	வைகூரி; பெரியம்மை.
Sore eyes	கண்ணோய்
Sore nipples	ஸ்தனக்காம்புகளின் புண்.
Spindle shape	கதிர்க்கம்பி வடிவம்.
Spine	முதுகு எலும்பு.
Spirit-lamp	சாராயதீபம்.
Sponge	நீருரிஞ்சி.
Stage of labour	பிரசவபாதம்.
Stethoscope	வியாதியை சுவாச ஒசையாலறி
	யுங் கருவி.
Still-born	செத்தப்பிறந்த.
Stiletto	அடைப்புக்குச்சி.
Stimulants	எழுப்புதலைக்கொடுக்கும் மருந்
	துகள்; உத்ஸாகபானங்கள்.
Straining	முக்குதல்.
Stripes	ஒற்றடம்; காப்படம்.
Styptic	பெரும்பாட்டை மாற்றும் மரு
	ந்த.
Subsidence of abdomen	அடிவயிறு வாடுதல்.
Super-foetation	காப்பத்தின் மேல்காப்பமாகுதல்.
Suppuration	கிழிப்பிடித்தல்.
Suture	கோவை; வெட்டு அல்லது கிழிவு
	காயங்களைத் தைத்து இணை
	தல்.
Suture, conchal	லலாடகோவை.
Superficial	நெற்றிகோவை.
Supra-pubic	வில்கோவை.
Symptoms of pubes	மேகன எலும்பின் பொருத்து.
Synchronous	உடநிகழ்வது.
Syncope	மூர்ச்சை - மயக்கம்.
Syphilis	மேகசம்பந்தமான வியாதி.

T

Temperament	தேகக்கூறு.
Temperature	கீதோஷண நிலை.
Thrombus	இரத்த ஓட்டம் தடுக்கும் இரத்
	தக்கட்டி.
Thrush	வாய் புண்ணுருதல்; வாய்க்கிர
	ந்தி.

Tow	சணற்பைநார்.
Transverse	குறுக்களவு.
Trickling	சொட்டுசொட்டு என்று விழுதல்.
Triplets	மூன்றுபிள்ளைகள்.
Tubal gestation	நாதக்குழலில் கர்ப்பந்தரித்தல்.
Tubercles	பொருட்டுகள்.
Tuberosity	மூட்டு.
Tumour	புரைகுழல்.
Turpentine	கம்பூரத்திராவகம்.
Twins	இரட்டைப்பிள்ளைகள்.
Typhoid fever	சன்னிபாதசரம்.

U

Umbilical cord	நாபிக்கொடி.
Urethra	நீர்த்தானா.
Uterine souffle	கர்ப்பாசய உதிரப்பாய்ச்சல்.
Uterine enlargement	கர்ப்பாசயப்பெருக்கம்.
Uterus	கர்ப்பாசயம்.
Uterus, antiflexion of	கர்ப்பாசயம் முன்னுக்கு வளைதல்.
Uterus, body of	கர்ப்பாசய காதிரம்.
Uterus, cervix of	கர்ப்பாசயக்கழுத்து.
Uterus, contraction of	கர்ப்பாசயம் சுருங்குதல்.
Uterus, fundus of	கர்ப்பாசய அடிவரம்.
Uterus, inertia of	கர்ப்பாசய பலவீனம்.
Uterus, inversion of	கர்ப்பாசயம் கவிழ்தல்.
Uterus, retroversion of	கர்ப்பாசயம் பின்னாக்கவீனத்தல்.
Uterus, rupture of	கர்ப்பாசயம் கிழிபடுதல்.
Uterus, os of	கர்ப்பாசயவாய்.
Utosia	சாதாரண அல்லது சுலபப் பிரசவம்.

V

Vagina	யோனி; சிசு வெளிப்படும் துவாரம்.
Veins	நரம்புகள்; நாளங்கள்.
Vernix caseosa	சிசுவின்மேல் படர்ந்திருக்கும் மாவு.

Vertebrae	முள்ளந்தண்டுக் கோர்வை எலும்பு.
Vestibule	யோனியில் முக்கோணமான பாகம்.
Vertex	உச்சி.
Version	சிசுவைத் திருப்ப்தல்.
Version, bi-polar	இருபாகம்பிடித்துத் திருப்ப்தல்.
Version, cephalic	தலே திருப்ப்தல்.
Version, spontaneous	தானே சுழல்தல்.
Version, podalic	பாதத் திருப்ப்தல்.
Viable	சுயஜீவியாயிருத்தல்.
Villi	சுருக்கவச சுணை.
Vomiting	வாந்தி.
Vomiting, obstinate	ஓயாத வாந்தி.
Vulva	மர்மஸ்தானம்; பெண்குயி.

W

Wards	வைத்தியசாலையில் நோயாளிகளிருக்கும் அறைகள், கொட்டாரங்கள்.
Warm bath	வெந்நீர் ஸ்நானம்.
Wedge	ஆப்புக்கிடாவுதல்.
Wet nurse	கைத்தாய்; பால்தாடி.
Womb	கர்ப்பாசயம்.
Womb, faking of	கர்ப்பாசயச்சரிவு.

Z

Zones	சக்கரங்கள்; மண்டலங்கள்.
Zones, fundal	கர்ப்பாசய அடிச்சக்கரம்.
Zones, equatorial	மத்தியமண்டலம்.
Zones, cervical	கர்ப்பாசயக் கண்டச்சக்கரம்.

GLOSSARY.

(TAMIL)

அரும்பத அகராதி.

அ

அகஸ்மாத்தான	...	...	திடீரென்று வருகிற
அகற்றுவது	...	...	போக்குவது; நீக்குவது.
அங்கலிகாரம்	...	...	அங்குலீனம்; குருபம்.
அசுகெள்	...	...	கல்மஷங்கள்; அழுக்குகள்.
அசட்டை	...	...	அலகியம்.
அசந்தர்ப்பம்	...	...	அசௌக்கியம்; சங்கடம்.
அசாத்தியம்	...	...	கூடாதகாரியம்.
அசாதாரணம்	...	...	அதிகசாதாரணம்.
அத்தாட்சி	...	...	சாக்ஷி, திருஷ்டாந்தம்.
அத்தியந்த	...	...	மிருந்த.
அத்துகள்	...	...	எல்லைகள்.
அதாங்குகிச்சிசை	...	...	அடிப்புறம் செய்யும் அயத்தி.
அதிர்ஷ்டம்	...	...	கிச்சை.
அதிகாரத்தில்	...	...	பாக்கியம்.
அந்தங்கள்	...	...	பிரிவில்.
அந்தக்கேடு	...	...	கோடிகள்.
அந்தியத்திற்கு	...	...	ஒழுங்கினம்.
அந்தரவேஷணஜவ்வு	...	...	முடிவுக்கு.
அநிச்சயத்தையுண்டாக்கும்.	...	...	உட்கவச ஜவ்வு.
அதுருணமாய்	...	...	சந்தேகத்திலுண்டி.
அதுமானித்து	...	...	அதுகூலமாய்.
அதுபவவித்தம்	...	...	யோசித்து; ஊகித்து.
அதுஷ்டிக்க	...	...	கைகண்டி.
அதுபந்தம்	...	...	அப்பியசிக்க.
அதுகூலியாயும்	...	...	தொடர்ச்சி.
அண்டம்	...	...	அதுகூலம் செய்யவல்லதாயும்.
அப்பியசிக்கலாம்	...	...	முட்டை; கோளம்.
	...	...	வழக்கத்துக்குக் கொண்டுவரலாம்.

அரும்பத அகராதி.

271

அப்பிரயோஜனம்	...	...	பயனற்றது.
அபிநயித்து	...	...	நடித்துக்காட்டி.
அபிவிர்ந்தி	...	...	விஸ்தரிக்க.
அடித்தட்டில்	...	...	அடிவிட்டத்தில்.
அபரிமித	...	...	மிதமிஞ்சின.
அபானவழியாய்	...	...	ஆசனமார்க்கமாய்.
அபூர்வம்	...	...	அருபொருள்.
அம்மணமாக்காமல்	...	...	நிர்வாணமாக்காமல்.
அமரும்	...	...	படியும்.
அமிசங்கள்	...	...	விஷயங்கள்.
அயத்திராவகம்	...	...	இரும்புத்திராவகம்.
அருகு	...	...	சம்பம்.
அருவருப்பான	...	...	வெறுப்பான; வெறுக்கத்தக்க; சலிக்கக்கூடாத.
அயுத்தமுமான	...	...	புத்திக்கு ஒத்ததும்ல்லாத.
அண உட்காரலாய்	...	...	புட்டம்படித்ததும் படியாததுமாய்.
அனுவசியமாய்	...	...	அவசியமில்லாமல்.
அலகுல்	...	...	யோனியின் வெளிப்பாகம்.
அவகாசமிருக்கும்	...	...	நேதவாகும்.
அவசரம்	...	...	அவசியதை; சீக்கிரம்.
அரவலும்	...	...	உறப்பு; அங்கம்.
அரபமாய்	...	...	கொஞ்சமாய்.
அருகவகற்றி	...	...	மாம்ஸம் அருகிலைத்தெக்கும் மருந்து.
அஸ்தம்	...	...	ஸக.
அஸ்திபந்தனம்	...	...	எலும்புப்பந்திப்பு.

ஆ

ஆகாரம்	...	...	உணவு; சாப்பாடு; உருவம்.
ஆத்திரம்	...	...	அவா; ஆசை.
ஆதரண	...	...	தாக்குரை.
ஆதியில்	...	...	பூர்வத்தில்; முதலில்.
ஆப்புக்கடாவிவதுபோல்	...	...	ஆப்பு அடித்ததுபோல்.
ஆயத்தங்கள்	...	...	பிரயத்தினைகள்.
ஆயாஸம்	...	...	விடாய்.
ஆரோக்கியம்	...	...	சௌக்கியம்.
ஆவர்த்தி	...	...	தாம்; தடவை.
ஆற்றவேளை	...	...	இளைப்பாறினவேளை.
ஆறி	...	...	தணிந்த.
ஆஸ்பதஞ்செய்தல்	...	...	இடஞ்செய்தல்.

இ

இசைவின்மைச்சமயத்தில் ...	படிய இடங்கொடுக்காதகாலத்தில்.
இடையில் ...	மத்தியில்.
இடையூறாகும் ...	தடையாகும்.
இடைவெளிவிரிவு ...	நடுவிலுள்ள இடத்தின் அளவு.
இயக்கம் ...	அசைவு.
இயற்றக்கூடும் ...	செய்யக்கூடும்.
இரத்தநாளங்கள் ...	இரத்தநாம்புகள்.
இரத்த விஷமிப்பு ...	இரத்தம் நஞ்சேறிக்கெட்டுப் போதல்.
இரத்தாசயம் ...	இரத்தப்பை.
இரந்திரம் ...	துளை.
இரணங்கள் ...	விரணங்கள்; புண்கள்.
இராஜ உறுப்புகள் ...	பிரதான அங்கங்கள்.
இலக்கு ...	லட்சியம்; குறி.
இலகுவடையும் ...	செளக்கியமாகும்.
இலாகியற்ற ...	போதையற்ற; மயக்கமுற்ற.
இளகிப்போதல் ...	துவண்டுபோதல்.
இற்றுப்போதல் ...	அற்றுவிழுதல்.
இனமாகும் ...	இசைவுபடும்; இசைவாகும்.

ஈ

ஈயந்து கொடுக்குந்தன்மையுள்ள.	ஈய்தல் குறுகுதல் தன்மையுடைய; நெகிழ்த்தக்க.
ஈரலிப்பு ...	குளிர்ச்சி; ஈரத்தடிகை.
ஈறுகளாலும் ...	அண்ணல்களாலும்; பல்லடிவாரங்களாலும்.

உ

உசிதமானது ...	தக்கது.
உத்தேசியகாரியம் ...	நினைத்தகாரியம்.
உத்பாதசிக்கன் ...	மனுஷ்ய இயற்கையில் சேரா குழந்தைகள்.
உதாரணங்கள் ...	நிரூஷ்டாந்தங்கள்.
உதிக்கும் ...	உதயமாகும்; பிறக்கும்.

உதிரதானா ...	இரத்தப்போக்கு.
உட்சுருக்கு ...	இது "உச்சுலுக்கு" என்று வழங்குகிறது.
உடை ...	துணி; உடுப்பு.
உணாதல் ...	அறிதல்.
உபசிரசு ...	சிரசைச்சேர்ந்த கூட்டுப்பிழைமூலம்.
உபத்திரவமான ...	சங்கடமான.
உபாபை ...	நோய்; அவஸ்தை.
உபாயமாய் ...	பட்டதும்படாததுமாய்.
உயிர்ப்பிக்கவல்ல ...	பிழைப்பிக்கக்கூடிய.
உருப்படுவது ...	உருவாகுதல்.
உள்ளன் ...	இருக்கின்றன.
உளைக்காமல் ...	அலட்டாமல்; அருட்டாமல்; சிரமப்படுத்தாமல்.
உளைச்சல் ...	நோகுதல்.
உற்சாகம் ...	சந்தோஷம்.
உற்று ...	நிதானித்து.

ஊ

ஊக்கலாம் ...	கண்டுபிடிக்கலாம்; கிரகிக்கலாம்.
ஊசலாட்டம் ...	இது - "ஊஞ்சலாட்டம்" என்று வழங்கிவருகிறது.
ஊடுருவ ...	நடுவிறச்செல்ல.
ஊரத்துவாங்க சிசிச்சை ...	மேற்புறம் செய்யும் ஆயுதசிசிச்சை.

ஈ

ஈதிர்முக்கமாய் ...	ஈதிர்ப்பக்கமாய்.
ஈதிரிடையாய் ...	ஈதிர்த்தட்டாய்.
ஈண்ணெய்ப்பட்டால் ...	ஈண்ணெயில்தோய்ந்த பட்டுத்துணியால்.
ஈன்பு ...	ஈழம்பு; அஸ்தி.
ஈன்றாலும் ...	ஈகிலும்.
ஈழகு ...	ஈக்கு; ஓர்வித இரும்பு.
ஈழப்புதல்செய்து ...	உஷ்ணம்கொடுத்துத் துண்டி.
ஈறிஜவ்வு ...	ஈடுத்து ஈறிந்துவிடும்ஜவ்வு.

ஏ	
ஏராளம் ...	பெருக்கம்; அதிகம்.
ஏற்றமசைதல் ...	தண்ணீர் இறைக்கும் ஏற்றத் தின் அசைவு.
ஏற்றப்பிரகாரம் ...	தக்கப்.

ஒ	
ஒட்டுக்கும் ...	முழுதும்.
ஒத்துணர்ச்சி ...	உடனிகழ்ச்சி.

ஓ	
ஓய்ச்சம் ...	ஓயச்செய்யும்.
ஓங்குகைக்குரிய ...	விருத்தியாவதற்கு மேதவா ன்.

ஓள	
ஓளத்தாஸ்திரம் ...	மருந்துமுறைகளும் தூல்.

க	
கசக்கப்படுமேயாகில் ...	நசுக்கப்படுமேயாகில்; பிசிய ப்படுமேயாகில்.
கசடு ...	கலம்ஷம்; அழுக்கு.
கதிர்கம்பி ...	நெற்கதிர் போன்ற கம்பி.
கட்டாயஞ்செய்ய ...	வற்புறுத்த.
கண்டமாலை ...	கழுத்தில்காணும் மேகக்கட் டிகள்.
கண்டிகமாய் ...	திர்த்தாட்சணியமாய்; சோர் வில்லாமல்.
கண்டோக்கம் ...	பார்வை.
கபாலம்; கபோலம் ...	மண்டை.
கபிலிறமாய் ...	கூதாழிறமாய்; செங்கல்மங்க லாய்.
கழுக்கட்டு ...	அக்குள்; சுட்சம்; கக்கம்.
கர்ப்பமின்மைக்கு ...	கர்ப்பம் தரியாமைக்கு.
கர்ப்பப்பை ...	கர்ப்பாசயம்.
கரிப்பு ...	எரிச்சல்; திணவு.
கருவழிவு ...	கர்ப்பநஷ்டம்.
கலம்ஷங்கள் ...	அழுக்குகள்; மலினங்கள்.

கலக்கி ...	கலக்கச்செய்து.
கவசம் ...	போர்வை.
கழன்று ...	பிரிந்த.
காலமுகர் ...	தோயால்குன்றியும்; புண்ணு ளியும்.

கா

காத் திரத்திலாவது ...	உடம்பிலாவது.
காடினயம் ...	கடினமாயிருத்தல்; கெட்டி யாயிருத்தல்.
காட்டுமலம் ...	கர்ப்பத்திலுள்ளபோது கிள வினவயிற்றில் தங்கியமலம்.
காலநிஷ்கர்ஷை ...	காலக்கிரமம்.
காலமுறையாய் ...	கால ஒழுங்காபி.

கி

கிரமாதீத ...	கிரமத்துக்கும் இன
கிராணி ...	கழிச்சல்.
கிரியை ...	வியாபாரம்; செய்கை.
கிரியாவிசேஷம் ...	சிறந்தசெய்கை.
கிருஷி ...	முயற்சி.
கிளர்ச்சி ...	அண்டுகை; பொங்குகை.
கிளறிவடம் ...	தூண்டிவடம்.

கீ

கீதுதல் ...	கிழித்தல்.
-------------	------------

கு

குசேஷடை ...	கோளாறு.
குணக்கேடு ...	கெட்டகுணம்; தோஷம்.
குசிரி (gudary) ...	மெல்லியமெத்தை; டொட்டு.
கும்பி ...	அடிவயிறு.
குருபம் ...	அங்கவீனம்.
குலப்பன் ...	நடுக்கம்.
குவிதல் ...	சுருங்குதல்; இறுகுதல்.
குழல்கள் ...	தவாரமுள்ளவைகள்.
குழறப்பண்ணும் ...	பிதற்றப்பண்ணும்.
குறடுகள் ...	இடுக்கிகள்.
குனிவுமுறை ...	குனியவைக்கும்முறை.

கூபகம் பெண்ணுரிக்கு ஆதாரமாயிடு
கூறப்படுவது க்கும் எலும்புக்கூறல்
சொல்லப்படுவது சொல்லப்படுவது.

கே

கேவலஒடுக்கம் சுத்த ஒடுக்கம்; மெத்த ஒடுக்
கம்.
கேவலஸ்திதி சூர்பலமான நிலைமை.

கை

கைகண்டது அறுபவசித்தமானது.
சமர்த்து அஸ்தலாகவம்; கைத்திறம்.
கைமுஷ்டி மூடினகை.
கைவண்டியது உபயோகிக்கவேண்டியது.
கையை இடவருகிலும் கையைச் செலுத்தக்கூடமொ
னபோகிலும்.

கொ

கொட்டாரங்கள் படுக்கை அறைச்சாலைகள்.
கொள்கை முறை; கோட்பாடு.
கொழுத்தகாரணம் பலத்தகாரணம்.

கோ

கோர பயங்கரமான.
கோழை கபம்.
கோளவடிவம் உருண்டை வடிவம்.
கோளாறு சேஷடை; வடாகூடம்.

ச

சக்கராகாரமாக சக்கரவடிவமாக.
சகஜம் வழக்கம்; இயல்பு.

சஞ்சாரமார்க்கம் உலாவும் வழி.
சத்தகாரம் பலம்; வலிவு.
சத்தா சாரம்.
சந்தர்ப்பங்கள் விதங்கள்.
சந்தோஷ சித்தையாஸ் சந்தோஷமுள்ள மனதையு
டையவளாய்; உளமகிழ்ச்
சியுடையவளாய்.

சமநிறையான சம அளவான.
சமமாய் நேர்நேராய்; ஒரோமடத்தில்.
சமயோகித சமயத்துக்குத்தக்க.
சமர்த்திக்க நிர்வகிக்க; நடந்தி.
சமனம் சாந்தி; தணிவு.
சமாளித்து நிர்வகித்து.
சம்பவம் நேரிடுகிறகாரியம்.
சமாசாரம் செய்தி; சங்கதி.
சமூலத்திற்கும் முழுதுக்கும்.
சவம் பிரோதம்; பிணம்.
சயனம் படுக்கை.
சராசரி ஏறக்குறைய; ஒருநிலை.
சரிசுக அப்பியாசங்கள் செளக்கியத்தைத்தரும் தேக
முயற்சிகள்.

சருமம் தோல்.
சலசலக்கி அசையும்சக்கி.
சஸ்திர சிகிச்சை சூயதப்பிரயோகத்தால்செய்
யும் பரிகாரம்; அறுத்துக்
குணப்படுத்துகை.

சா

சாசனிகப்பட்டன எழுதிவைக்கப்பட்டன.
சாத்தியப்பட்ட கூடிய.
சாதனங்கள் முயற்சிகள்.
சாந்திரமாசம் பெனரணமிதொடங்கி பெள
ர்ணமிக்குமுந்திய நாளமு
டிகிற மாசம்.
சாமலியமானது சாதாரணமானது

சி

சிக்கானபிசவம் பல அசந்தர்ப்பங்களோடு
தொந்தப்பட்ட பிரசவம்.

சிவச்சகன்	வைத்தியன்; சஸ்திர வைத்தி யன்; இரணவைத்தியன்.
சித்தப்பெத்தி	ஆயத்தப்பெத்தி.
சித்திபெறுவிட்டால்	காரியம் அறுபட்டிருக்காவிட்டால்.
சிந்தை	கருத்து; கிரககிரகை.
சினனம்	லக்ஷணம்; குறி.
சிரோதயமாக	தலையாக.
சிறுநீர்	மூத்திரம்.

சே

சேதோஷண நிலை	குடிச்சி - குடி இவற்றின் தன்மை.
சேம்பால்	குடிமேம்பால்.
சேத்திருத்தப்படும்	ஒழுங்குபடுத்தப்படும்.

சு

சுத்தத்தைப்பற்றி	சுகிரமாயிருப்பதைக் குறித்து.
சுதேச ஸ்திரீ; சுமரி	இந்திராதிப்பெண்.
சுவாசகோசம்	செற்றன்பத்திற்கு காதாரான யோனிமலர்.
சுவாசிக்க	குணாயிரல்; மூச்சுத்துருத்தி.
சுயஜீவியல்ல	மூச்சுவிட.
சுழலுகை	நாளேபிழைக்க அசக்தமானது.
சுழலுகை	சுற்றுக்கை.

சூ

சூசிப்பிக்கும்	குறித்துக்காட்டும்.
சூதகம்	மாதவிடாய்.
சூட்சுமமான	சூட்சுமமான.

செ

செங்கல்மங்கலாய்	சிலந்தும் மங்கலமானது.
செயற்கை	கவிவிறுமாய்.
செயற்கை	மனிதச் செயல்கையினாலாகிய.

சே

சேகரித்து	திரட்டி; சேர்த்து.
சேஷர்கள்	செய்கைகள்; கோளாறுகள்.

சொ

சொருசாய்	ஒழுங்காய்; பக்குவமாய்.
சொற்ப நேரத்ததும்	சிறிதநேரமிருப்பதும்.

சோ

சோகமும்	மூர்ச்சையும்; இளைப்பும்.
----------------	--------------------------

சௌ

சௌக்கியவதிகள்	சரீரசௌக்கியமுள்ள ஸ்திரீகள்.
சௌகரியப்படி	எப்படி அதுகூலமோ அப்படி - சந்தர்ப்பத்துக்குத் தக்கபடி.

சூ

சூபகம்	நினைவு.
---------------	---------

த

தடஸ்தமாய்	நேரில்.
தடுக்கற்கரிய	நிபந்தமுடியாத.
தடைப்பாடுகள்	தடைகள்; இடையூறுகள்.
தருணங்களில்	சமயங்களில்.
தலையிடுவது அவசியமல்ல	பிரவேசிப்பது அவசியமல்ல.
தலைப்பின்பீழ்	மருடத்தின் கீழ்; விஷயத்தின் கீழ்.
தலைப்பை	தலைப்பக்கத்தை.
தலைமையத்தை	நடுத்தலையை.
தவிர்ந்துக்கொள்ளுதல்	தப்பித்துக்கொள்ளுதல்.
தளம்	தட்டு; அடிவாரம்.
தற்சனம்	தக்கனம்; உடனே.
தற்செயலாய்	தானே; இயல்பாய்.

தா

காக்கம்	...	...	மோதுதல்.
தாந்தாலிகமாய்	...	...	கொஞ்சகாலம்வளாதல்.
தாதுகலக்கி	...	...	அதைரிப்படுத்தி.
தாவுள்ள	...	...	இடமுள்ள.

தி

திணரும்	...	...	தடைப்படும்.
திரளும்	...	...	சேரும்.
திருப்புஞ்செய்தல்	...	...	திருப்புதல்.

தி

திட்டு	...	...	அழுக்கு.
திவரிக்க	...	...	சீக்கிரம்முடிய.

து

துயர்	...	...	விசனம்; சஞ்சலம்; துக்கம்
துரத்தம்	...	...	நீயநாற்றம்; கெட்டநாற்றம்
துரமனம்	...	...	அதிகமாய்வளர்த்த மாம்ஸம்
துரன்	...	...	அருமை.
துலம்	...	...	சுழற்சி நஸ்தானம்.
துலம்பாமாய்	...	...	தெளிவாய்.
துவக்கம்	...	...	ஆரம்பம்.
துவண்டது	...	...	தொங்கியது; இளைக்கிறது.
துவர்ப்பான	...	...	தொகுரான.
துவாரம்	...	...	தளை.

து

துரம்	...	...	மாதவிடாய்.
-------	-----	-----	------------

தெ

தெரிதற்கரிய	...	...	அறிவதற்குக் கஷ்டமான.
தெளிவற்றதாயும்	...	...	விவரமில்லாததாயும்.

தே

தேகக்கூறு	...	...	உடம்பின்தன்மை.
தேகத்தி	...	...	தேகத்தழைப்பு.
தேகத்துவம்	...	...	தேகக்கூறு.
தேசஸ்டர்	...	...	காந்தியுடன்.

தொ

தொங்கல்	...	...	முந்தானை.
தொல்லை	...	...	சங்கடம்.
தொன்றுதொட்டு	...	...	பூர்வகாலந்தொடங்கி.

தோ

தோஷங்கள்	...	...	குற்றங்கள்.
தோஷித்திருக்கும்	...	...	நோய்கொண்டிருக்கும்.

ந

நசித்துப்போய்	...	...	செத்துப்போய்.
நஞ்சு	...	...	விஷம்; மாயை.

நா

நாசித்துவாரம்	...	...	மூக்குத்தலை.
நாதாசயம்	...	...	நாதக்குழல்.
நாபித்தாங்கி	...	...	நாபியைத்தாங்குமாறுதம்.

நி

நிதம்பம்	...	...	அல்குல்.
நிர்ப்பாதிதமாய்	...	...	உபாபையில்லாமல்.
நிர்வீரமாகும்	...	...	வலிவற்றதாகும்.
நிரபாயமாயாகிருமை	...	...	மாயை அபாயமின்றி தங்குமிடம்.

நிராடங்கமாய்	...	...	தடையில்லாமல்.
நிர்மலம்	...	...	பரிசுத்தம்.
நிலைப்பட	...	...	நிலைநிறுத்த; ஸ்தாபிக்க.
நிலைமாறி	...	...	இடந்தப்பி.
நிவர்த்து	...	...	நிறத்தையுடையது.
நிறத்தியாக்க	...	...	விதெலைசெய்ய.

நீ	
நீட்சி ...	நீடிப்பு; நீளம்.
நீர்முட்டிய ...	நீர்நிறைந்த.
நீர்ப்பாறை ...	நீர்த்தாண்டா.
நீராகாரம் ...	தஞ்சிவனகைகள்.

நு

நுட்பமான ...	வெகு சிறியதான.
நுண்ணியதாயும் ...	சன்னமாயும்.
நுனிப்பகுதி ...	நுனிப்பாகம்.

நெ

நெஞ்ச இடிப்பு ...	இருதயத் தடிப்பு.
நெஞ்சுறிகள் ...	நீண்டகுறிகள்.
நெட்டெச்சகி ...	தள்ளும் சக்தி.

ப

பகிர்முகமாய் ...	வெளிப்பக்கமாய்.
படியுமாறு ...	படியும்படியாக.
பண்டிதர் ...	ஸவத்தியர்; புலவர்.
பத்தி ...	முறை.
பத்திர ...	தடிப்பது.
பந்தப்பட்டிரா ...	சேர்ந்திருக்கமாட்டாது.
பந்திப்பு இவ்வு ...	கட்டிப்பிடித்திருக்கும் இவ்வு.
பரிமாணம் ...	வாசனை; கருந்தம்.
பயனேதுவான ...	பயத்தைத்தரத்தக்க.
பரிசுதவ ...	பரிசுத்தமானவன்.
பராமரிப்பு ...	நிர்வகிப்பு; நடத்தல்.
பல்காலம் ...	பலதடவையும்.
பருமை ...	பருமன்.
பரிமாணம் ...	அளவு.
பலபிள்ளைப்பேறு ...	பல பிள்ளைகளைப்பெறுகை.
பலன் ...	பிரயோஜனம்.
பலவந்தம் ...	கட்டாயம்.
பருத்திவஸ்திரம் ...	பஞ்சாத்தெய்த வஸ்திரம்.
பலோற்காரம் ...	பலர்த்காரம்; கட்டாயம்.
பற்றற்று ...	சம்பந்தமற்று.

பற்றாய் ...	முக்கியமாய்.
பசுங்கம் ...	பதினேந்திராள்; பக்கம்.
பசுவாடி ...	பாசிசவாய்வு.

பா

பாசக்கடிகைகள் ...	பத்திப்பு இவ்வுகள்.
பாண்டு ...	இரத்தம்செந்து நீராகும் வி யாதி; வீக்கம்.
பாதிக்கப்படும் ...	வருந்தும்; பீடிக்கப்படும்.
பார்வைமங்கி ...	பார்வைமழுங்கி.
பாரிசம் ...	பக்கம்.
பாலஸ்திரீ ...	இளந்தைப்பெண்.
பாலாடை ...	பால் ஏடுபோன்ற கொழுப்பு.

பி

பிதியுப்பட்டு ...	அழுத்தப்பட்டு.
பிண்டநாசம் ...	கரு அழிதல்.
பிணி ...	தோய்; வியாதி.
பிராணசேதம் ...	உயிர் தஷ்டம்.
பிராயத்தில ...	வயதில்.
பிரசுத்தாநாசகாரி ...	பிரக்ஞையைக்கெடுக்கும் மரு ந்து.
பிரக்ஞாபங்கம் ...	அறிவுசேதி; மறிமயக்கம்.
பிரக்கினை ...	உணர்ச்சி.
பிரபலமன்ன ...	விசேஷமான.
பிரத்தியட்ச ...	சன்னனுக்குத்தோற்றம்.
பிரமாதமான ...	விபரீதமான; பயங்கரமான.
பிரமிக்க ...	மயங்க.
பிரவாகம் ...	வெள்ளம்.
பிரவேசிக்கும் ...	சூழையும்.
பிரசவபாதங்கள் ...	பிரசவகாலப்பிரிவுகள்.
பிரசுத்தி ...	பின்பாகம்.
பின்னங்கள் ...	சினதவுகள்; பழுதுகள்.
பின்வருமானு ...	பின்சொல்லுகிற பிரகாரம்.

பீ

பீடிகையல்கு ...	பீடிகையெம்பில்படியும் அல கு.
பீடிதராள ...	பீடிக்கப்பட்டவராள.

பு

புலப்படா ...	...	கண்ணுக்குத்தோன்றா; கண்ணுக்குத்தெரியா.
புறப்பேச்சு ...	...	பித்துரை; பொருந்தாப் பேச்சு.
புறம்பாக்காதபடி ...	...	வெளிப்படுத்தாதபடி.

பூ

பூத்தனம் ...	...	சுருமாரம்; பூத்தன்மையுடைய.
பூரிக்கக்கூடும் ...	...	உபபக்கூடும்.
பூரணநிலையை ...	...	பூரணபருவத்தை.

பெ

பெருக்கியெடுத்தரம்போல ...	...	துடைத்தாரம்போல.
பெரும்பாடு ...	...	உதிரம்சாயும்போகம்.

பொ

பொருட்டுகள் ...	...	குருத்தெலும்புகள்.
பொந்தாயும் ...	...	குழலாயும்; துவாரமாயும்.
பொசியும் ...	...	கசியும்.
பொருத்துகள் ...	...	பூட்டுகள்; கணுக்கள்; தையல்கள்.
பொருத்த ...	...	ஸம்பந்தித்த.
பொருமல் ...	...	உபாதை; நோய்.
பொறுப்பில் ...	...	சுவாதினத்தில்.

போ

போக்கும் ...	...	போகும்வழிகள்; போகும் இடங்கள்.
போதிய ...	...	போதுமான.
போர்வை ...	...	கவசம்.

பொலிக்கூபகம் ...	...	கூபகத்தைப்போன்றது; பொய்க்கூபகம்.
பெய்விதீர் ...	...	நிர்போனைதது.

ம

மகத்தாசு ...	...	பெரிய; கொடிய.
மஞ்சகசுரம் ...	...	இரத்தஞ்சுரிகையென்னும் ஓர் விதசுரம்.
மணலுடிகளை ...	...	அளவு.
மணலுடிகளை ...	...	மணலநிரப்பிய உடுக்கைபோன்ற பூர்வகாலத்து கடிசாரம்.
மடலாக ...	...	இதழாக.
மந்தகமனம் ...	...	மெதுவான நடை.
மர்மஸ்தானம் ...	...	குறியும்; சூய்யம்; பெண்குறி.
மலபந்தம் ...	...	மலச்சிக்கல்.
மலப்பிரவர்த்தி ...	...	மலங்கழித்தல்.
மலினம் ...	...	அழுக்கு.
மலேநாடு ...	...	பருவதப்பிரதேசம்.
மனோசாக கரபானங்கள் ...	...	மனதுக்கு மகிழ்ச்சிக்காரிகளும் சாராயவகைகள்.

மா

மாதவிடாய் ...	...	தாரம்.
மாதிரிய ...	...	கித்திப்பான.
மாதிரி ...	...	வழக்கம்.
மாயை ஒட்டில் அப்பட்ட ...	...	மாயையின் சம்பந்தம்நீங்கிய.
மாய்ந்து ...	...	இறந்து; செத்து.
மாறுபடும் ...	...	வேற்றுருவம்.

மி

மிச்சம் ...	...	மிகுதி.
-------------	-----	---------

மீ

மீண்டு ...	...	மறுபடியும்.
மீள்வது ...	...	தேறுவது.

மு

முகடு ...	...	துவாரம்; வா.
முகவாய்க்கட்டை ...	...	இது "மோவாக்கட்டை" என்று வழங்குகிறது.
முகவிலாசம் ...	...	முகவிலக்கம்.
முப்பிள்ளைப்பேறு ...	...	மூன்று பிள்ளைப்பேறுதல்.
முகவுரை ...	...	கிருதால்; சிறப்பு; மூன்று மடங்கை.
முழுக்கூறும் ...	...	முழுதம்.
முள்ளந்தண்டு ...	...	முதுகெலும்பு.
முற்பட்டதாக ...	...	முந்திக்கொண்டதாக.
முற்றிய ...	...	முதிர்ந்த.
முற்கூறில் ...	...	முந்தியநிலையில்.
முற்றுபெறுவதற்கு ...	...	முடிவாவதற்கு.

மு

முகக்குத்தண்டு ...	...	நாகினை; முக்குமேடு.
--------------------	-----	---------------------

மெ

மெருகிடவும் ...	...	மேனியிடவும்.
மெலவியதாயும் ...	...	சன்னமாயும்.

மே

மேகனவெலும்பு ...	...	அல்குலிச்சேர்ந்தவெலும்பு.
மேலெழ ...	...	மேலே ஏற.
மேற்கொள்ள ...	...	தப்பித்துக்கொள்ள; நாண்ட.

யோ

யோனி ...	...	மர்மஸ்தானம்; குறியம்; பெண்குறி.
----------	-----	---------------------------------

ர

ரப்பர் ...	...	இங்கிலீஷில் "Rubber" என்ற பெயர் இதுவே.
------------	-----	--

ல

லக்ஷணங்கள் ...	...	குறிகள்; சின்னங்கள்.
----------------	-----	----------------------

லோ

லோஹம் ...	...	பொன் வெள்ளி செம்பு இரு ம்பு பித்தளை யெனலும் கனி வர்க்கங்கள்.
-----------	-----	--

வ

வகிவிரகார ...	...	கோணல்மானாரான.
வசப்பட்டதாயும் ...	...	ஐக்கிப்பட்டதாயும்; சுவாதினப்பட்டதாயும்.
வடுக்கள் ...	...	அடைபிள்ளைகள்.
வயிற் கொண்டிருக்குதல் ...	...	உறுதியுயிருத்தல்.
வயிற்றுக்குடு ...	...	காப்ப உஷணம்.
வரம்புகள் ...	...	அத்துகள்; எல்லைகள்.
வரையவேண்டி ...	...	எழுதவேண்டி.
வற்புறுத்துவது ...	...	உணப்படுத்துவது.
வலஞ்சாய்ந்த ...	...	வலதுபக்கஞ்சாய்ந்த.
வன்மை ...	...	கடினம்.

வா

வாய்க்காமல் ...	...	கிட்டாமல்; பலிக்காமல்.
வாய்க்கொந்தி ...	...	வாய்ப்புண்.
வாய்ப்பிடிப்பு ...	...	வாயில் இரணங்காணல்.
வாய்வுகண்டன ...	...	வாயுவைக்கண்டிக்கும்.

வி

வித்தம் ...	...	வெளியில் இருந்த தோன்றல்.
விகற்பித்து ...	...	கிறவை.
	...	வேறுபட்ட.

விகற்பங்கள் ...	...	மாறுதல்கள்.
விகாசமாய் ...	...	சோபையாய்; விளக்கடாய்.
விநாயகனை ...	...	மாறுதல்களை.
விநாயகனசந்தி ...	...	தள்ளுஞ்சுத்தி.
விடம் ...	...	குறுக்களவு.
விடபம் ...	...	யோனி இதழ்கள்.
விடுவத்தல் ...	...	பிரித்தல்.
விபத்து ...	...	ஆபத்து.
விபரீதம் ...	...	வழக்கவிரோதம்.
விம்மியிருப்பதால் ...	...	வீங்கியிருப்பதால்.
வியாபாரம் ...	...	செய்கை; தொழில்.
விருத்தி ...	...	ஒங்குமை.
விருதாவேற்று ...	...	வீண என்று.
விருபங்கள் ...	...	அங்கவீணங்கள்; தபாதங்

விளங்க ...	...	கள்.
விளவிக்கும் ...	...	தெரிய.
விசுமித்து ...	...	உண்டாக்கும்.
விசுமித்து ...	...	பஞ்சாய்; விஷமா.
விசுமித்து ...	...	அதிகமாக.
விசுமித்து ...	...	மாம்ஸ அழகுதலையகற்றும்
விசுமித்து ...	...	மருந்த.

வீ

வீறிமம் ...	...	கிளம்பும்; உக்கிரமாய்வரும்.
-------------	-----	-----------------------------

வெ

வெதுவெதுப்பான ...	...	கொஞ்சம்சூடான.
வெறுமை ...	...	ஜலம்வடிந்துவிட; காலியாக.
வெறுமையாசை ...	...	பாலசுரப்பில்லாதனங்களே.
வென்றுவிடலாம் ...	...	ஜெயித்துவிடலாம்.

ஜ

ஜை ...	...	ஈடு; தீரடி; இணை.
ஜகதோஷம் ...	...	ஜலப்பு.
ஜலப்பை ...	...	மூத்திரப்பை.
ஜலபாதிரம் ...	...	நீர்பாய்ச்சும்தொட்டி.
ஜவ்வகவசம் ...	...	ஜவ்வுபோர்வை.

ஜா

ஜி

ஜீவதசையில் ...	...	ஜீவகாலத்தில்.
----------------	-----	---------------

ஜி

ஸஞ்சாரம் ...	...	பாவுகை; போக்குவருத்துச் செய்கை.
--------------	-----	---------------------------------

ஸ

ஸகந்தம் ...	...	ஒய்ச்சலுக்குரியவை.
ஸதனப்பூரிப்பு ...	...	ஸதனம் பூரித்திருக்க.
ஸபஷ்டமாய் ...	...	தெளிவாய்; பரமாய்.
ஸவகதம் ...	...	தனக்குள் தோண்டிவை.

ஹீ

ஹீனஸம்பாட்டு ...	...	தொனிகுறைவுபட்டு.
------------------	-----	------------------

ஹே

ஹேது ...	...	காரணம்.
----------	-----	---------