

T. D. R. C. 962

R. R. 62/1-1905

செக்கெட்டு: ரூ. 996




M

L-3
NO 4
118521

62

1-1905

தேகதத்துவ சாஸ்திரம்.



இஃது

சென்னப்பட்டணம் ஹைதேர்தி கக்கில்

எஸ். எஸ். வெங்கடரமண ஐயர், பி.எ., பி.எல்.


அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.

MADRAS:

PRINTED AT THE M. E. PRESS, MOUNT ROAD.

1904.

விலை ரூ. 2-8-0. All Rights Reserved. Price Rs. 2-8-0.



L:3
N.94



INTRODUCTION.

Experience is the mother of science. Fail in Alchemy and become a Physician, is a Tamil Proverb. A broken apothecary, a new doctor. The art of healing was purely empirical, here and elsewhere. Here medical lore was mystified, and the art was in the hands only of the initiated few. This state of affairs precluded the art from being reduced to an exact science. We had nevertheless treatises on Materia Medica, Medicine and Pharmacy. Some of our Vaidyans can very successfully diagnose by feeling the pulse, and even fix pretty approximately the time when their patients will expire. Their number is growing less. We know and we hear frequently that some of our Vaidyans are in possession of certain sovereign remedies, whose wonderful virtues puzzle and tantalize even European doctors of high culture and ripe experience.

In Jivaka, one of the Tibetan tales, we read that the skull of Prince Bimbisara was opened for healing a brain disease, and closed again, and reduced to the normal state in a few hours with the help of a miraculous foment. The Tamils have also current among them a similar anecdote of Teraiyar. This may mean that our ancient physicians had a knowledge of surgery. In some of our medical books we find frequent mention of bleeding and other operations. We do not find any regular work on Physiology and Anatomy. The butcher was perhaps the demonstrator of our old physicians. Barbers are village surgeons even now in some places, and barbers' wives are the midwives everywhere in India. Potters are allowed to set right broken bones, dislocated joints, and sprains.

The maker of mechanical instruments is not a mechanic, nor is a mechanic an engineer. A druggist is not a

INTRODUCTION.

compounder, nor is a compounder a physician. Most, if not all, of our Vaidyans are only druggists and compounders. That they should dub themselves physicians, in these days of Physiology and Anatomy, Biology and Bacteriology, without any certificate or diploma from any Medical Board, is a matter for regret and serious consideration. It is not desirable that we should allow the ignorant masses to be under the sway of quackdom. Our Vaidyans and Hakeems must be compelled to obtain certificates from medical authorities that they have at least an elementary knowledge of Physiology and its sister sciences. There can be no other way of breaking up the legion of these Vaidyans and Hakeems, a pill from some of whose hands is a ready passport to Heaven.

A study of the mechanism of man is an indispensable preliminary to the healing art. It is a consolation that our Vaidyans were doing much in the days when Physiology was not even in its embryo in Europe. But that is no plea why we should not be abreast of the times. The late Dr. Jagannadam Naidu published among other books a catechism of Physiology in Tamil. Dr. Varadappa Naidu published a treatise on Midwifery in Telugu and Tamil. I have also seen other translations in Tamil of English works on Anatomy and Midwifery. A regular up-to-date treatise on Physiology we had not in Tamil till now. The gap it is the peculiar fortune of Mr. S. S. Venkataramana Aiyar to fill up. A perusal of this book convinces me that he has to a considerable extent successfully performed his self-imposed task. Wherever possible, Tamil and Sanskrit terms are freely made use of. He seems to have spared no pains in consulting some Sanskrit works, and also available translations from English. In unavoidable cases, English terms are transliterated, and some ordinary popular Tamil terms are made to serve his purpose. The translation is very simple as it should be. The illustrations are very clear.

INTRODUCTION.

The Vaidyans and others can, with some help here and there from any Medical or Biology student, easily understand the structure and functions of the various organs of the human body. With the help of this and similar translations, the National Indian Association cannot have much difficulty in training those, who have not had the advantage of an expensive and elaborate English education, into hospital assistants and nurses and midwives.

By translating and publishing this work, Mr. S. S. Venkataramana Aiyar has done a public service of no small value. It is hoped that the public will welcome this publication, and hasten to patronise it. This is the best means of rousing others from apathy and encouraging them to do similar work.

T. CHELVAKESAVARAYA MUDALIAR, M. A.,

Pachaiyappa's College.

PERAMBORE,
13th September, 1904. }

மு க வு ரை .

உடலுக்குப் பிணிகள் வந்தடைவதால் வேதனைப்பட்டு கஷ்டத் துக்குள்ளாகி, வாழ்நாளின் சுகங்கையிழந்து சீக்கிரத்தில் சிவனை யும் இழக்கவேண்டிவருமென்னும் உண்மை எல்லாருக்கும் தெரி ந்தவிஷயமே. முற்காலத்தில் இந்தியதேசத்தில் பல இருடிகள் ஹிமாலய பருவத்தில் ஒருங்குடடி, நோய்கள் மனிதன் சுகந்தைக் கெடுத்து அவனுக்குக் கஷ்டத்தை உண்டிபண்ணுவதும்ல்லாமல் தங்க ளுடைய தவத்துக்கும் நித்திய கர்மானுஷ்டானங்களுக்கும் ஹானியை யுண்டாக்குந் தன்மையையுடையனவையாகையால் மனிதனுக்குள்ள முக்கிய விரோதி அந்நோய்களென்று தேர்ந்து, அவற்றை ஜெயிக்கு மெண்ணத்துடன் தங்களில் ஒருவராகிய பாரத்வாஜரை வைத்திய சாஸ்திரம் கற்றுக்கொண்டுவர இந்நிராமிடமனுப்பி அவர் கற்று வந்து, பிறகு சில சீடர்களுக்குபதேசிக்க, அவர்கள் கற்று விபாதிக்கிற வென்று வந்ததாகவும், அவ்விதம் கஷ்டப்பட்டு அடைந்து அனுபவித்துவந்த வைத்திய சாஸ்திரத்தைப்பற்றி சரகர், சுஸ்ருதர் என்னும் பெரியோர் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் வரைந்துவைத்தார்கள் என்றும் சொல்லி வருகிறார்கள். அவர்களுள் சரகர் முக்கியமாய் வைத்தியபாகத்தைப் பற்றி எழுதியிருப்பதாயும், சுஸ்ருதர் உடற்கூறிலக்கணத்தையும் படிப் பது மிக்க அவசியமென்று நினைத்து தமது வைத்திய புஸ்தகத்தில் அவ்விலக்கணத்தைப்பற்றி தமக்குத் தெரிந்தவரையில் கூறியிருப்பதா கவும் தெரியவருகிறது. ஆனால் அநேகம் நூற்றாண்டுகளாக வைத் தியப் பயிற்சி செய்துவரும் வைத்திய ரத்தினங்கள் பல காரணங்களால் வைத்தியபாகத்தையே கற்றுக்கொண்டு வைத்தியம் செய்து வந் தார்களென்றும் தெரியவருகிறது. மற்றும் இந்தியாவின் பழைய மகி மைகள் எக்காரணங்களால் மறைந்தனவோ அக்காரணங்களாலேயே சம்ஸ்கிருதப்பாஷைப் பயிற்சியும், அப்பாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் மேற்கூறிய வைத்திய நூல்களும் படிப்பவர்களில்லாமல் பராமுகப்பட் டிப் பாழாயின. ஆனால் தமிழ்காட்டில் அரஸ்தியர் முதலிய பெரி யோர் அந்நூற்களிலிருக்கும் வைத்திய பாகங்களை யெடுத்து தமிழ்ப் பாஷையிற் காவியமாக அநேக வட்சம் பாடல்களாய் பல புஸ்தகங் கள் எழுதியிருக்கிறார்கள். இவ்வகை புஸ்தகங்களையே தமிழ் நாட் டில் அநேகர் படித்து மனிதர்களின் பிணியைத்தீர்க்க அச்சாஸ்திரப் புத்தகங்களிற் சொல்லியிருக்கும் அடையாளங்களாகிய ஊன்றுகோல், பிரம்பு முதலியவற்றைக் கையிற் பிடித்துக்கொண்டு கட்கத்தில் வாச

டப் பையையுங்கொண்டு திரிகிறார்கள். இவர்களில் அநேகர் தாம் மேற்கொண்ட சாஸ்திரங்களில் அன்புள்ளவர்களாகவும், சீவன்களிடத்தில் அகநெகிழ்த்த சீவகாருணியமுடையவர்களாயும் இருப்பவர்களாகையால் தமது தொழிலைப்பற்றிய சகல்வித விஷயங்களையுத் தெரிந்துகொண்டு, வியாதிக்காரன் பணக்காரன அல்லவா என்பதை கிஞ்சித்தேனும் யோசியாமல் வைத்தியம் செய்யவேண்டுமெனும் வீருப்பமுடையவர்களாயிருக்கிறார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நல்ல வைத்தியர்களின் இலட்சணம் அப்படிப்பட்டதென்பதற்கும் ஐயமுண்டோ? அகஸ்தியரும் வைத்திய தருமத்தைப்பற்றி தமது பரிபூரணத்தில் அவ்வாறே உரைத்திருக்கின்றனர் :

“அரசரென்றால் பொருள்கொடுத்து நோய்தீர்த்துக்கொள்வாரதனாலே யுத்தனுக்குத் தருமமில்லை
நீசரென்ற லெளயோர்க்கு வைத்தியஞ்செய்ய
நிலையான தர்மமது நிலைக்குமென்று
பரிசுமுடனென்றரு வேதியர்தான்சொன்னார்
பின்னையென்று புலத்தியனே யுனக்குச்சொன்னேன்
பரிசனமாய் மனதில்வைத்தால் முத்திசேர்வாய்
பாலகனே யிதைமறந்தால் பலித்திடாதே”

“பலித்திடவே வேணுமென்றால் புலத்தியனே ஐயா
பாரிலுள்ள உயிரெல்லாம் தன்னுயிர்போலெண்ணி
சலித்திடா யொருபோதந் தருமஞ்செய்யச்
சந்தயங்கள் செய்யாதே சதிசெய்யாதே
சலித்திடவே கருமத்தால் பிறவிகிடும்
தருமத்தால் சாயுச்சு பதவிகிடும்
சலித்திடாய் சற்குருவை யடுத்தாக்காரு
சதாநாலஞ் சதாசிவனைப் போற்றிப்பாரே.”

ஆனால் அகஸ்தியர் முதலியோர் எழுதியிருக்கும் கிரந்தங்கள் வியாதிக்குரிய பற்பல மருந்துகளை யெடுத்துரைத்திருக்கின்றனவேயல்லாது, வியாதிக்கிருப்பிடமாகிய தேகத்தின் இலட்சணத்தைப் பற்றியாவது, வியாதியின் இலட்சணங்களைப்பற்றியாவது விவரித்துரைத்திருப்பதாகத் தெரியப்படவில்லை.

உதாரணமாக:—அகஸ்திய முனிவர் அருளிச்செய்திருக்கும் வைத்தியரத்தினச் சுருக்கத்துள் அவர் எடுத்துரைத்திருக்கும் விஷயங்களை அந்த நூலின் காப்பினிற்றியலாம். அவை எவையெனில்:—

பூரணமாய் நிறைந்தருளு மரைதான் போற்றிப்
புகலுகிறேன் வைத்தியரத்தினச் சுருக்கத்தனை
வாரணமாமுகத்தோனைப் பணிந்து வாழ்த்தி
வைத்தியர்தான் மூத்தாற்றோ டறுபதுக்குள்
காரணமாஞ் செத்தாரம் பற்பலேகியக்
கருவான் தயிலபொடு கிருதமெண்ணெய்
சூரணமாங் கிராணமொடு கலிக்கமாத்திரை
சுருவாக நாடிமுதற் சொன்னோம் பாரே.”

என்றெடுத்துரைத்திருப்பதாம்.

வைத்தியர்தம்மொழியில் நிபுணராகி, சீவகாருணியத்துடன் ஆன்மாக்களுக்குமும் தேகப்பிணிகளைத் தீர்த்து இரட்சிக்கும் மேம்பாட்டையடைவதற்கு உடற்கூறிலக்கணம் அறிவதவசியமென்பதற்கும் சந்தேகமுண்டோ. தேகத்தின் உறுப்புகள் சுபாவமாய் சவுக்கிய ஸ்திதியிலிருக்கும்பொழுது அவற்றின் இலட்சணங்களையறிந்தாற்றான், அவ்வுறுப்புகள் பிணிபடுங்காலத்தில் அவைகளுக்குண்டாகும் மாறுபாடுகள் என்னவென்பதை நன்றாய் பகுத்தறிந்துகொண்டு அந்த விகாரங்களுக்குத் தக்க மருந்துகள் செய்து பிணிகளைப்பதது சுலபமாயிருக்கும். இவ்விஷயத்திலும் யாதொரு சந்தேகமும் இடையாதது. ஆனால் நாட்டு கிரந்தங்களில் உடற்கூறிலக்கணத்தையறிந்து தெரியுமெண்ணம். தெளிவாய் வரித்து எடுத்துரைத்துள்ளது இல்லையாகையால், நாட்டிலுள்ள வைத்தியர்கள் உடற்கூறிலக்கணம் அறிந்துகொள்ள வசதியில்லாமல் அவ்விஷயத்தைப்பற்றி யாதும் தெரியாதவர்களாயிருக்கிறார்கள். அகஸ்தியர் முதலியோர் “நாடி” விஷயமாய்ச் சொல்லியிருப்பது வைத்தியர்களுக்குத் தகுமான ஞானத்தை உண்டாக்குமோ வென்பது மிக்க சந்தேகமாயிருக்கின்றது.

அகஸ்தியர், உடற்கூறையும் வியாதி வருக்காரணத்தையும் தமது கண்மகாண்டத்தில் பின்வருமாறு கண்டிருக்கின்றனர்.

“பூரணமாய் மூல்முதலாறுதாரம்
பிரியவந்தந்தச வாய்வுநாடி மூன்று
காரணமாயிடையின்யும் சுழிமுனையுமாகிச்
சுலந்துகின்ற வாதபித்த சிலேத்துமமாகி
மாரணமாய் சடத்தினுள்ளே தத்துவங்கள்
மனம் புத்தியாங்காரஞ் சித்தத்தாலே
வாரணமாய் நடந்தொலித்த கர்மத்தாலே
வந்ததடா கோய்களெல்லா மனிதர்க்காமே.”

தவிர, இவர் தமது வைத்தியரத்தின சுருக்கத்துட் சொல்லிய விஷயங்கள் இன்னவென்று காப்பிற்கூறி, பிறகு நாடி நிதானத்தைப் பன்னிரண்டு செய்யுட்களிற்கூறி, நாடிபார்க்குக்காலத்திற் கொரு பாட்டும் சொல்லி, நாடி யிலக்கணத்தைப்பற்றி 16 செய்யுட்களையும், ஸ்திரீ புருடர்களுக்கு நாடிபார்க்கும் வகையைப்பற்றி ஒரு செய்யுளையும், நாடி டார்க்கும் மாதவரையைப்பற்றி இரண்டு செய்யுட்களையும் செய்திருக்கின்றனர். வைத்தியம் செய்பவர்களுக்குத் தெரிவது அவ சியமென்று இவ்வாறு எடுத்துக்கூறிய பாடல்களைப் டார்த்தால் இவ் விடத்தில் நாம் சொல்லும் விஷயம் நன்கு விளங்கும். அவை யாவன :—

நாடி ந்தானம்.

அறுசீர்க்கழிநெடுலடியாசிரிய விருத்தம்.

1. கரிமுக னடியைவாழ்த்திக் கைதனி னாடிபார்க்கில் பெருவிர லங்குலத்திற் பிடித்தடி நடுவேதொட்டால் ஒருவிர லோடிவாத மூயர்நடு விரலிற்பித்தந் திருவிரன் மூன்றிலோடிற் சேத்தும நாடியாமே.
2. ஆகிய நாடிமூன்றும் படபடென் றோடிற்சன்னி வாகினி லன்னங்கோழி மயிலென நடக்கும்வாதம் எகிய வானம்பட்டை யிவையென நடக்கும்பித்தம் போகிய தவளைபாம்பு போலவாஞ் சேத்துமந்தானே.
3. சேத்தும மெழுந்திருக்கிற் றித்திப்பு நாவிலேறும் ஏற்றிய கசப்புமீறி லெழுப்பிடும் பித்தமாகும் மாற்றிய புளிப்புமீறில் வந்திடும் வாதமாகும் சேத்துமந் தன்னிற்பித்தந் தீக்காற்று வாதமானே.
4. வாதத்தில் வாதமாகில் வளர்ந்திடு மன்னம்போலே நீதுய்த்த வுடலினோந்து நெகிழ்ச்சியாய் சுருக்கும்வாங்கும் ஆதற்றப் பதறுமேனி யசனமு மற்பமாகும் ஏதுற்ற தனத்தின்மின்னே யெண்ணியே யறிந்துசொல்லே.
5. வாதத்திற் பித்தமாகில் வாயது குழறிப்பேசும் பேதித்துத் தலையிடித்துப் பிணங்கிய குணங்கள்வெறய்த் தாதுற்ற புத்திதானுந் தடைப்படுந் தடங்கண்மாதே கோதுற்ற வயிறுவிமிடிக் குடறிணப் புறட்டுந்தானே.
6. வாதத்திற் சேத்துமாகில் வலியொடு வீக்கமுண்டாம் பேதித்துத் தலையிடித்துப் பிணங்கிய குணங்கள்வெறய்த்

தீதுற்ற மெய்வெளுத்துத் திடமுட னசனஞ்செல்லா பேதித்து நாவும்பேசும் பெருகவே வீக்கமுண்டாம்.

7. பித்தத்திற் பித்தமாகிற் பிதற்றிடுந் கிறுகிறக்கும் சத்தியு மதிசமாகுஞ் சீரரத்தி லிளைப்புமுண்டாம். அத்தியா யுலருமேனி யாகமும் வேறதாகும் வற்றியே வெளுத்துக்காயம் வறண்டுபின் வீக்கமுண்டாம்.
8. பித்தத்தில் வாதமாகிற் பிடரியுந் காலுக்கையுந் குத்தத்துப் போலேயாருந் குறுகிமெய் பதறுப்பின்னே அத்தியா யுலருமேனி யாகமும் வேறதாகும் புத்தியு மடியுமிக்கப் பொறுமைபோய்க் கோபமாமே.
9. பித்தத்திற் சேத்துமாகிற் பிதற்றுவாய் குழறுமிக்கச் சத்தியும் வாய்நீர்தானுந் தானறி யாமலோடும் சுற்றிடும் பேய்கள்போலச் சுழற்றியே வயிற்றுநோவாம் பித்தமு மெடுத்தாக்கொட்டிப் பிடரியில் கோவதாமே.
10. வாட்டிடுஞ் சேத்துமத்தில் வந்திடு வாதமாகில் நாட்டிய கால்கள்போல கரம்பெலாம் வலித்துகிற்கும் கூட்டிய பிடரிதானுந் குன்றவே டலிக்குமாகில் நாட்டிய விழியுமெல்லாம் நாக்குவாய் குழறுந்தானே.
11. சீர்பெறு சேதம்பித்தந் தின்பது கசப்புண்டாகும் பார்பெறு நாவுதன்னிற் பலவித புளிப்பினிப்பாய் சேர்பது பேசமாறுந் திடமில்லை கோழையாகும் சார்பது காணாமல்பினை சாரும்பின் சத்தம்பேறும்.
12. சேத்துமத்திற் சேத்துமாகிற் றியிர்தமா யறியுஞ்சொன்னோம் ஆத்தும நல்லதல்ல வழிவது மெய்கண்டாயே கூற்றவன்வந் திடுவதாகுந் குறுவிழி வட்டக்கொன்றும் சாத்திர மறிந்துசொன்னோம் யாத் திரை நாடிதானே.
13. காலமே சேத்துமாகடி கட்டுச்சிப் பித்தநாடி மாலையில் வாதநாடி வகைதப்பப் பதறிநினால் ஏலவோ யிவர்கட்டுகெல்லா பியம்பினு ரிதுதானென்று காளஞ்சின் மரணமென்று கண்முனி யருளிச்செய்தார்.

நாடி இலக்கணம்.

1. போற்றிய நாடிதானும் போத்துபோற் புறத்துடித்தால் கீற்றுவின னுதலேபிக்க கிஞ்சக மாணேகேளாய் காத்திடுந் திங்குகொன்றிற் சுருதியே தீரவிட்டால் மாற்றிய மாதம்பத்தின் மரணமென் றுரைக்கலாமே.

2. குறித்திருஞ் சேத்துமநாடி குதிரைபோல் நியிர்ந்துநின்றால் கறுத்திடு விழியாய்ல்ல காணிகையாளே தேளாய் மறுத்திவை பேசவேண்டாம் வயதிலை முடிந்ததென்று பொறுப்பில்லை திங்களொன்றிற் புகன்றிடு மரணமாமே.
3. ஆதித்தன் சந்திரன்போ லத்தித்த நாடிதானும் பேதித்து நிற்குமாகிற் பெருக்கவே கையினுடே சோதித்துக் கண்டொடி சுரங்களிற் புக்குமாகில் வாதத்தில் வாய்வுடை வந்துற நிற்குந்தானே.
4. கடிந்ததோர் நாடிதன்னைக் கருதியே பார்க்கும்போது விழந்தபின் சேத்துமநாடி விதறியே. தொடர்ந்துநின்றால் கடிந்தது பித்தநாடி கூட்டுச்சி துடிக்குமாகில் மடிந்தது வாதநாடி மாலையில் மரணந்தானே.
5. சேத்தும நாடிதானும் தியங்கிய மஞ்ஞைபோல நடித்திய வட்டைபோல நடுங்கியே பதறியின்றால் கூட்டவே வேண்டாமேழு நாளினின் மரணங்கொள்ளும் நாட்டமாய் முனிவர்கொன்றோ நயம்படக் குறித்துப்பாரே.
6. ஏற்றியே தீபந்தன்னி லெரிசுடர் முனையைப்போலத் தோற்றிய நாடிதானும் துயரற நடக்குமாகில் கூற்றனும் கிடமுமில்லை குறைபடா மருந்துசெய்யில் மாற்றிய வாண்டானும் வளர்ந்திடுத் திண்ணந்தானே.

வேறு.

7. கண்ணும்பல்லுந் தான்கறுத்துக் கருதுமூச்சு வாய்திறந்து உண்ணுவயிற்றிற் சேத்தும முமோடிமிகவே தானடந்தால் பண்ணும்மருந்து பலியாது பண்பாய்ச் சுவாச மேல்வாங்கு மண்ணும் விண்ணுந் தானறிய மரணமாவார் கண்டரே.

வேறு.

- 8 இடைதொடை மாப்பிண்கீழே யெறிபடப் பதறியோடின முடிகிட வீக்குமாயின் மூவரி லொருவரோடில் படரவே தாகமிஞ்சிப் பஞ்சிடுங் கண்ணும்வாயின் அடரலிக் குணங்கள்கண்டா லறிந்துகொள் மரணமென்றே.

அறுசேர்கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம்.

9. எடுக்கும்படுக்கு மெழுந்திருக்கு மிளைத்தேழுச்சு சினைவாங்கும் வடுக்கணைத்த விழியிரண்டு மலரவிழிக்கும் வழிபார்க்குந் தொடுக்குந் தொடுத்த சேத்துமமுந் தொண்டைத் தன்னையடைப் மடுத்துவருவதிது கண்டா லறிவீர் மரணநிச்சயமே. [பிக்கு

10. ஊசிபோன் முகமுன்னிடு உடம்பெலா நரம்புதோன்றி பாசிபோற் கண்பஞ்சிடடுப் பரந்திருண் மூடுமாகில் பேசுநா வரண்டுபேசிப் பித்தது பித்தமமாகில் காசினி யுறியச்சொன்னோங் கண்டுகொள் மரணமென்றே.
11. நாடிதான் மூன்றோர்சொன்ன நற்குறிக் குணங்களைறு சீடிய விழியினு லு நின்றநாட் குறிப்பினுலும் வாடிய மேனியாலு மலரொடு நீரினாலுந் குடிய வியாதிதன்னைச் சுகம்பெற வறிந்துசொல்லே.
12. சுகம்பெற வங்கமெல்லாஞ் சுருங்கிய குணங்களாய்ந்து முகக்குறி நாடிமூக்குச் செவிதுத நயனநாடி அகத்துடி யடக்குநாடி யதுதிசை விடுதிநாடி உசத்துடி யுத்திநாடி யுண்மைபாய் நடைகன்பாரே.
13. பார்மனக் கவலைபற்றுப் பலபல விசாரம்விட்டுத் தேர்மனந் தெனிக் தூநீயுந் செய்குண வழியிசென்று ஊரக முந்தினன்னி லொளிபல வியாதிசெய்யும் தீபன வுண்டியாலே சேர்த்திடு கோய்கடானே.
14. சொல்லிய வந்தினன்னிற் சுழித்ததோ ரெழுத்தைப்பற்றி எல்லையிலெழுந்தநாடி யெழுபத் தீராயிரத்தில் வல்லவர் புகலுநாடி பத்ததி லேழுநீக்கி கல்லதோர் நாடிமூன்று நயந்துநீ யறிந்துபாரே.
15. தான்மிகக் குளிர்த்தொள் ளிறங்கிய நாடிவாதம் மீன்முகில் குழலாய்கெய்பா விரைச்சிக ஞ்ண்டால்வாதந் தின்மிக வருமேகோழி தின்னவர் நாடிபித்தம் லானந் கனிகடன்னே வாங்கினால் வாதமாமே.
16. வர்த்தநி லினநீர்பின்னை வாங்கினு னாடிவாதம் போமவே கோபமுள்ளே பொருமினு னாடிபித்தம் கோதேசேர் குழலாந்தன்னைக் கூடினு னாடிபித்தம் தீதிவா முனிவர்கொன்றோ திறமுட னறிந்துதானே.

ஸ்திரீ புருடிகளுக்கு நாடிபார்க்கும் வகை.

17. தானென வலகத்துள்ளே தயங்கிய நாடிபார்க்கும் வானெனு மின்னேகேளாய் வரும்புனைல் சொல்லக்கேளு நானெனும் புருடர்க்கெல்லா நாடிதான் வலக்கையாரும் தேனெனு மடமார்க்கெல்லாந் திடம்பெற விடக்கைகித்தே.

முகவுரை.

நாடிபார்க்கும் மந்தவரை.

18. சித்திரை வைகாசிக்குச் செழுங்கதி ருதயந்தன்னில்
அத்தமா மானியாடி யைப்பிசி கார்த்திகைக்கு
மத்தியா னத்திற்பார்க்க மார்கழி தையுமாசி
வித்தகன் கதிரோன்மேற்கில் விழுவின்ற நேரந்தானே.
19. தானது பங்குனிக்குச் தனதுநல் லாவணிக்கும்
மானமாம் புரட்டாசிக்கு மற்றைராத் திரியிற்பார்க்கத்
தேனென்று மூன்றுநாடித் தெளிவாகக் காணுமென்று
கானமா முனிவாசொன்ன கருத்தைநீ கண்டுபாரே.

இதுபோலவே பலவாய் சொற்களமைந்த பல செய்யுட்களால் அகஸ்தியர் தமது பரிபூரணம் முதலிய கிரந்தங்களிலும் நாடியைப்பற்றி யெழுதியிருக்கின்றார். தேகத்திற்காணும் பல வியாதிகளையும் வாத பித்த சிலேஷம்மெனும் பரிபாஷைக்குள்ளடக்கி, அவற்றை இரத்த ஓட்டத்தின் தன்மையாகிய நாடியின் தன்மை பேதங்களால் அறிந்து கொள்ளும்படி சொல்லி நாடிகளின் தன்மையை “படபடவென்றோடு தல்” அன்னம், கோழி, மயில் இவைபோல் நடத்தல், தவளை பாம்பு இவைபோல் போதல் எனப் பலவாசாகப் பேசி, வாத பித்த சிலேஷ மங்களாலும், வாதத்தில் வாதம், வாதத்தில் பித்தம், வாதத்திற் சேத்து மம், பித்தத்திற் பித்தம், பித்தத்தில் வாதம், பித்தத்திற் சேத்துமம், சேத்துமத்தில் வாதம், சேத்துமத்தில் பித்தம், சேத்துமத்திற் சேத்து மம் ஆகிய தன்மைகள் தேகத்திற்குறுமாகில் சகலவித வியாதிகளுமுண்டாகும் எனக் கண்டிருப்பதைப் படிப்பதினால் எமக்கு யாதொருவிதமான அர்த்தமும் தென்படவில்லை. அதுபோலவே நாடிபேதங்களால் சாவுக்குரிய கால நிர்ணயம் ஐந்து என்று சொல்லியிருப்பதும், போத்துப்போல் போனால் பத்து மாதத்தில் மரணமென்றும், குதிரைபோல் கிமிர்ந்துநின்றால் திங்கடொன்றில் மரணமென்றும், ஆகத்தன் சந்திரன் போலிருக்குமாகில் இன்னின்ன ரோகங்கள் உண்டாகுமென்றும் பலவாசாகப் பேசியிருப்பதற்கும் என்ன பொருளென்றறிந்தோமில்லை. மேலும் இதுபோலவே தேகத்தின் வாயுக்களையும்பற்றிச் சொல்லியிருக்கின்றார் :—

20. பூரணமா மாதாரந்தன்னினின்ற புரியட்டதசவாய்வின் பேர்
தான்கேளு
வாரணமாம் பிராணவஜோடபானன்றானும் மகத்தான உதான
னுடன் சமானன்வியானன்

முகவுரை.

காரணமா நாகனொடுகூடும்ருணும் கனமான கிருதரன்கூர்
தேவதத்தன்
ஆரணமாந் தனஞ்செயனும்பத்துமாச்ச அப்பனேஅசைவை
யினி அறைகிறேனே.

21. அறைகிறே னிடைசலையின்சுழனியாகி அலம்புடையுங்காந்
தாரி யத்தியோடு
இறையான சிருவைசங்கினியோடெண்ண இயல்புருடன்குரு
வென்பார் சோத்திரந்தான்
சிறையான நெடுந்தொக்குசட்டவோடு நேர்மையுள்ளசங்குரை
யாக் கிருணமாகும்
முறையுடனே யிவையறிந்துநிதானங்கண்டு முதன்மையுள்ள
குருநாடி யஞ்சுங்கேளே.

நமது வைத்தியர்கள் இவ்வாறு கூறிய உடற்கூறிலக்கணத் தினின்று என்னதான் தெரிந்துகொள்ளக்கூடும். தங்களுக்கும் பிறருக் கும் அர்த்தமாகாத பரிபாஷை சங்கேத பதங்களால் வியாதி லட்சணங் களையும் அவற்றின் காரணங்களையுமுரைத்துப் பேசுவருகிறார்கள். என் பதற் சந்தேசமில்லை. ஆகவே நமது நாட்டு வைத்தியர்களுக்கு உடற் கூறிலக்கணம் சரியாய்த் தெரிந்துகொள்வதற்குத் தக்க நமது நாட்டு கிரந்தங்கள் இல்லையாகையால் வேண்டிய விஷயங்களை எடுத்துக்கூறும் நூல் ஒன்று வேணுமென்பது திண்ணமாகும். உடற்கூறிலக்கணத்தை இங்கிலிஷ்பாஷையில் பிஸியாலஜி என்பார்கள். அந்த சாஸ்திர த்தை நன்றாய்ப் பரிசோதித்து மிக்க துட்பமான விஷயங்களையும் எடுத்த றுரைத்துள்ள கிரந்தங்கள் அப்பாஷையில் பல உன. கரீக், கார்பென் டர், பிரேஜர் முதலிய கனவான்களும் வைத்தியர்களும், போதகாசாரி யுர்களும் அந்த பிஸியாலஜியைப்பற்றிச் சிறந்த கிரந்தங்கள் இயற்றி யிருக்கிறார்கள். இவர்கள் புஸ்தகங்களில் கண்டிருக்கும் விஷயங்களை எம்மால் கூடியவரையில் தமிழில் எல்லோரும் அறிந்துகொள்ளும் விதமாய் எடுத்துரைத்திருக்கின்றனம். இப்புத்தகத்தின் பொருளடக் கத்தைப் பார்ப்பதினாலேயே எவ்வளவு சங்கதிகள் இதில் அமைக்கப் பட்டிருக்கிறதென்பது வெளியாகும். பெரியோர்கள் தேகத்தின் தாது க்கள் என்று எண்ணியிருந்த 1. இரசம், 2. இரத்தம், 3. சுக்லிலம், 4. மூளை, 5. தசை, 6. எலும்பு, 7. தோல் இவைகளைப்பற்றியும்; ஆறு ஆதாரங்களாகிய 1. மூலாதாரம் (குதம்), 2. சுவாதிட்டானம் (குய்யம்), 3. மணிபூரகம் (நாபி), 4. அநாகதம் (இதயம்), 5. விசுத்தி (அடிசை), 6. ஆஞ்சை (நெற்றி) இவைகளைப்பற்றியும் இன்னும் பற்பல விஷயங்

முகவுரை.

களைப்பற்றியும் கூடியவரையில் விரிவாயெடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதைப் பார்க்கலாம்.

நமது நாட்டில் சில மகான்கள் சபைகள்சேர்ந்து ஆங்கிலேய தேசத்து நவீன சாஸ்திரங்களைத் தமிழில் எழுதி தமிழ் இலக்கிய விருத்திசெய்யவேண்டுமென்கிற கொள்கையுடன் இருக்கிறார்கள் என்பது எல்லோரும் அறிந்த விஷயமே. அவ்வித உத்தேசம் சரியானதென்று தேர்ந்தவரும், சீவகாருணியங்கொண்டு ஆங்கில முறைப்படி சென்னைப்பட்டணம் கோவில்தப்ப நாயக்கர் வீதி 182-வது கதவிலக்கமிட்ட வீட்டில் வைத்தியம் செய்துவரும் எமது நண்பர் டாக்டர் டி. வெங்கீரசலம் பிள்ளையின் வேண்டுகோளின்படி நாம் இந்த துலைத் தமிழில் எழுதத்துணிந்தோம். மேற்கூறிய ஆங்கிலேய தூல் கிரந்தகர்த்தர்களுக்கு மிக்க நன்றியுறில் உள்ளவருகவிருக்கின்றோம். இப்புத்தகத்தில் அவ்வவ்விடங்களில் காட்டியிருக்கும் படங்களுக்கும் அவற்றை எவர் புஸ்தகங்களினின்று பயனுள்ளவையெனத் தெரிந்தெடுத்தோமோ அந்தநூலாசிரியர் பெயரையும் படங்களினடியில் முறையே கூறி எம் வந்தனத்தைத் தந்திருக்கின்றனம். இப்புத்தகத்தில் அநேகம் பரிபாஷைச்சொற்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றிற்கெல்லாம் அர்த்தமும் உறைத்திருக்கின்றனம். எவ்வளவு தூரம் நாம் மேற்கொண்ட வேலையைச் சரியாய்ச் செய்து முடித்தோமென்பது இனிமேல் அறியவேண்டிய விஷயமாகும். இப்புஸ்தகம் பிரசுரம் ஆவதால் இதன் குறைகளை நீக்க வித்தியார்த்திகள் இதைவிட நல்ல புஸ்தகம் எழுதிவிடுவார்களானாலும் எமக்கு மிக்க சம்மதமான காரியமாகும். நமது நாட்டார் இந்நூலின் விஷயங்களை அறிவதற்குத் தக்க புஸ்தகங்கள் அவர்களுக்குக் கிடைத்தும், இந்நூல் புகட்டும் விஷயங்களை நமது வைத்தியர்கள் தெரிந்துகொண்டு வைத்தியம் தக்கபடி செய்து சீவகாருணியர்கள் ஆகவேண்டுமென்பதே எமது கருத்து.

எஸ். எஸ். வெங்கடரமண ஐயர்.

சென்னப்பட்டணம்,
2-10-04.

பொருளடக்கம்.

பக்கம்.	
1-ம் அத்தியாயம்.	
உயிருடனிருக்கும் பிராணிகளின் விசேஷ தர்மகுணங்கள் ...	1
2-ம் அத்தியாயம்.	
ஜீவனுக்கும் மற்ற சடசக்திகளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் ...	5
3-ம் அத்தியாயம்.	
மனிதனுடலில் இருக்கும் பெளதீக வஸ்துக்கள் ...	9
தர்க்கியசமற்ற இந்திரிய உபாதான பூதங்கள் ...	12
தர்க்கியச இந்திரிய உபாதான பூதங்கள் ...	15
அனிடிரிய உபாதான பூதங்கள் ...	19
4-ம் அத்தியாயம்.	
மனித தேகத்தின் கட்டடப் பிரிவுகள் ...	20
சாலங்கள் ...	21
ஆதி மூலப்பொருள் ...	21
கருக் கொப்பிளங்கள் ...	21
சாலத்திடை வஸ்துக்கள் ...	24
நார்கள் ...	24
குழாய்க் குருக்கள் ...	24
5-ம் அத்தியாயம்.	
மூலாதார தகைப்பின்னல்களின் கட்டடம் ...	25
பரிஸ்தாபிதம் ...	25
சம்பந்தத் தகைகள் :—செலித வகை ...	29
வலை வகை ...	29
நார்வகை ...	30
கொழுப்பு வகை ...	30
முருந்து வகை ...	32
எலும்பு ...	33
பற்கள் ...	50
6-ம் அத்தியாயம்.	
இரத்தம் ...	55
இரத்தத்தின் அளவு ...	57
இரத்தம் உறைவது ...	57
இரத்தமுறைவதில் சீரேற்பாணங்களுக்குடைய தர்மம் ...	60

இரத்தத்தின் பூங்கு கட்டுப்பாடுகள் ...	61
குருதிச் சாலைகள் ...	62
செங்குருகடங்களின் சட்பூத குணங்கள் ...	63
வெண் சாலைகள் ...	65
இரத்த நீர் ...	66
இரத்த நீர் கட்டுப்பாட்டின் வேறுபாடுகள் ...	67
இரத்தக் கட்டுப்பாட்டின் வேறுபாடுகள்...	68
இரத்தத்திலுள்ள ஆவிகள் ...	69
இரத்த வளர்ச்சி ...	70
இரத்தத்தின் உபயோகம் ...	70
இரத்தச் சுழற்சி ...	71
தேசிக, புப்புச, உச்சரந்தர சுழற்சிகள் ...	73
இரத்தச் சுழற்சியைக் கண்டுபிடித்தது ...	73
இருதயம் ...	74
இருதய கபாடங்களின் கட்டடம் ...	76
இரத்தாசயத்தின் செய்கை... ...	82
இருதய கபாடங்களின் தொழில்கள் ...	82
இரத்தாசயத்தின் சத்தம் ...	89
இரத்தாசயத்தின் அடிப்பு ...	90
இரத்தாசயம் செய்வேலையின் பலமுறை வருதலும் அதன் வேகமும் ...	92
இரத்தாசய வேலையைப்பற்றி நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ளாகத்தி... ...	94
இரத்தாசயச்செயலின் பிரயோசனங்கள் ...	96
நாடிகள் ...	96
நாடிகளின் கட்டடம் ...	97
நாடிகளின் தொழில் ...	100
நாடி (கை) ...	102
ஸ்பிக்மோமிராப் கருவி ...	104
நாடிகளில் இரத்த அழுக்கம் ...	105
இரத்த நாடிகளின்மீது நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ளாகத்தி ...	106
தந்துகிகள் ...	107
தந்துகிகளின் கட்டடம் முதலியன ...	108
தந்துகிகளுள் இரத்தச் சுழற்சி ...	110
இரத்தக் குறுகலுத்துள்ளல் ...	112
நாளங்கள் ...	113
கட்டடம் ...	113
நாளங்களின் கபாடங்கள் ...	114
நாளங்களில் இரத்தச் சுழற்சி ...	114
இரத்தம் சுழல்வதில் சம்பந்தப்பட்ட கர்த்தாக்கள் ...	116

7-ம் அத்தியாயம்.

மேன் ...	117
சுரையீரல்களின் நிலையும் கட்டடமும் ...	118
சுரையீரல்களின் நிலையும் கட்டடமும் ...	122
சுரையீரல்களின் கட்டடம் ...	125
சுவாச யந்திரிகம் ...	128
சுவாச சலனம் ...	133
சுவாசலயம் ...	136
சுவாச சத்தங்கள் ...	136
கிருகவாயிலின் சுவாச சலனம் ...	136
சுவாசத்துக்கு வேண்டிய காற்றினளவு ...	137
சுவாச சக்தி... ...	138
சுவாசச்சதைகள் செய்யும் திண்சரி வேலை ...	140
சுரையீரலிலுள்ள இரத்தச் சுழற்சி... ...	141
சுவாசத்தால் காற்றுக்குண்டாகும் மாறுபாடுகள் ...	141
சுவாசத்தால் இரத்தத்திலுண்டாகும் மாறுபாடுகள் ...	145
கெட்டகாற்றின் குணங்கள்—காற்றுலாவதல் ...	146
பலவித சுவாசச்செயல்களின் யந்திரவேலை ...	147
சுவாசத்தின்பேரில் நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ளாகத்தி ...	152

8-ம் அத்தியாயம்.

பிராணிகளின் வெப்பம் ...	156
தேகத்தில் உஷ்ணம் உற்பத்தியாகும் காரணங்களும் வகையும்... ...	157
மனித தேகத்தின் சீதோஷ்ண ஸ்திதியை சீர்ப்படுத்தவகைப்பற்றி ...	158

9-ம் அத்தியாயம்.

சீரணம் ...	159
உணவு ...	159
உபவாசம் ...	163
அன்னவாசிக் குழல் வழியாய் ஆகாரம் போகுதல் ...	166
உமிழ்நீர்க்கோளங்களும் உமிழ்நீரும் ...	166
மெல்லுதல், உமிழ்நீர் விடுதல் ...	167
உமிழ்நீர் ...	169
உமிழ்நீரின் கட்டுப்பாடு ...	170
உமிழ்நீரின் பயன்... ...	172
தொண்டை... ...	173
உண்ணாக்கு கோளங்கள் ...	173
அன்னவாசிக் ...	174
விழுங்குதல் ...	174

இரைப்பையில் உணவுசேரணமடைதல் இரைப்பையின் கட்டடம்	177
ஜடமாகிவினி எங்கிற சேரண ரசத்தின் சுரப்பும் அதின் குணங்களும்	181
சேரணரசத்தின் கட்டுப்பாடுகள்	182
சேரணமாகும் விதம்	182
உப்புவாயு கலந்த உணவில் சேரண இரசத்தின் செயல்	184
இரைப்பையின் அசைவுகள்	184
வாந்தி எடுத்தல்	188
பெயும் தாகமம்	189
உதரசேரணத்தின்மேல் நரம்பு மண்டலத்திற்கிருக்கும் சக்தி	191
குடல்களிலுண்டாகும் சேரணம்	192
கிறுகுடல்களின் கட்டடமும் பொசிப்புதனம்	192
கிறுகுடலின் கோளங்கள்	194
வில்லை	195
பெருங் குடலின் கட்டடம்	196
கீணயமும் அதின் பொசிப்பும்	198
கல்லீரலின் கட்டடம்	200
பித்தப்பை	203
நரலின் தொழில்	204
பித்த நீர்	204
பிண்ட விசர்ஜன கட்டுப்பாடுகள்	210
நரலில் கிண்கோலன் சர்க்கரையுண்டாகும் தொழில்	214
உணவு கிறுகுடல்வழிப்பாகும்பொழுது அடையும் மாறுபாடுகளின் சங்கிரகம்	214
பெருங்குடலில் உண்டாகும் சேரணத்தொழிலின் சங்கிரகம்	218
மலப்பாதை	220
இரைப்பை குடல் இவைகளிலுள்ள வாயுக்கள்	221
குடல்களின் அசைவுகள்	222
குடல் சேரணத்தின்மேல் நரம்பு மண்டலத்திற்கிருக்கும் சக்தி	223

10-ம் அத்தியாயம்.

சோஷணம்	224
இரசாயனிய நிணநீர்க்குழல்களும் கோளங்களும், இவைகளின் கட்டடமும் தொழிலும்	225
நிணநீர்க்கோளங்கள்	228
நிணநீர் ஆன்னரசத்தின் குணங்கள்	229
இரசவாஹினிகளின் சோஷணம்	232
நிணநீர்த்தாரைகளின் சோஷணம்	233
இரத்தக் குழாய்களாணுண்டாகும் சோஷணம்	233

11-ம் அத்தியாயம்.

போஷிப்பும் வளர்ச்சியும்	236
போஷிப்பு	236
வளர்ச்சி	239

12-ம் அத்தியாயம்.

விசர்க்க நீர்கள்	241
பொசிப்பிக்கும் சவ்வுகள்	243
நிணநீர்ச் சவ்வு	243
சிலேஷ்மச் சவ்வு	246
விசர்க்க கோளங்கள்	250
பொசிப்புத் தொழில்	251
விசர்க்கத் தொழில்மேல் நரம்பு மண்டலத்துக்குரிய சக்தி	255

13-ம் அத்தியாயம்.

குழலற்ற கோளங்கள்	256
மண்ணீரல்	257
குழலற்ற கோளங்களின் தொழில்	259

14-ம் அத்தியாயம்.

சர்மமும் அதன் விசர்க்கங்களும்	261
சர்மத்தின் கட்டடம்	262
குவேத கோளங்கள்	266
நிணங்கோளங்கள்	267

15-ம் அத்தியாயம்.

ரோம நக கட்டடங்கள்	268
சர்மத்தின் விசர்க்கம்	270

16-ம் அத்தியாயம்.

மூத்திரக் குண்டிக்காய்களும் மூத்திரமும்	272
பிருக்கங்களின் கட்டடம்	272
மூத்திரக் குண்டிக்காய் குழல் மூத்திரப்பை இவைகளின் கட்டடம்	274
மூத்திர விசர்க்கம்	276
மூத்திரம் விடுதல்	276
மூத்திரம்; அதன் சாதாரண குணங்கள்	277
மூத்திரத்தின் பூதிகக்சுட்டுப்பாடுகள்	278

17-ம் அத்தியாயம்.

மனிததேகத்தின் வரவு செலவு கணக்கு	280
---------------------------------	-----

18-ம் அத்தியாயம்.

நரம்பு மண்டலம்	...	283
நரம்பு மண்டலத்தின் மூலக் கட்டடங்கள்	...	284
நரம்பு நரர்களின் கட்டடம்	...	284
நரம்பு முடிவுகள்...	...	286
நரம்பு நரர்களின் பிரிவுகள்	...	288
நரம்பு நரர்களின் வேகம் செல்லும் வகை, நியாயங்கள்	...	289
நரம்பு மத்தியங்களின் தொழில்கள்...	...	293
உப பிரதிகரணத்தொழில்	...	295
மூளை-முள்ளந்தண்டுக்கொடி நரம்பு மண்டலம்...	...	296
முள்ளந்தண்டுக் கொடியும் அதின் நரம்புகளும்	...	296
முள்ளந்தண்டுக்கொடியின் வெண்மை வண்டி...	...	298
முள்ளந்தண்டுக் கொடியின் தொழில்	...	298
முகுளம்	...	301
அதன் கட்டடம்	...	301
முகுளத்தின் தொழில்கள்	...	302
மூளைக்கால்கள்	...	304
நினை முடிச்சு, நினை சதுரத்த துவைய முடிச்சு, சஞ்சர் தல்பம், நினைச்சுமி...	...	305
சின்ன மூளை	...	308
சின்ன மூளையின் தொழில்கள்	...	309
பெரிய மூளை	...	310
பெரிய மூளையின் தொழில்கள்	...	311
பெரிய மூளையை பெருத்து விடுவதா ஹண்டாகும் குணங்கள்	...	312
நித்திரை	...	314
சிரசு நரம்புகள்	...	317
வாசனை நரம்பு	...	317
பார்வை நரம்பு	...	317
சஞ்சுர் சலன நரம்புகள்	...	318
நேத்திரக்கீல் முட்டிச்சதை நரம்பு...	...	318
திரியோதுவய நரம்புகள்	...	318
6-வது நரம்பு	...	320
7-வது முக நரம்பு	...	320
ஜிக்வா கண்ட நரம்பு	...	320
முள்ளந்தண்டொத்தாசை நரம்பு	...	321
ஜிக்வாந்தா நரம்பு	...	321
முள்ளந்தண்டு நரம்புகள்	...	321
ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் இலக்கண தர்மம்.	...	321
ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் தொழில்கள்	...	323

19-ம் அத்தியாயம்.

சலனமும் அதன் காரணங்களும்	...	323
சுதையின் பூதிகப் பிரிவுகள்	...	326
சுதையின் இலக்கணம்...	...	326

20-ம் அத்தியாயம்.

தொனியும் பேச்சும்	...	328
மாளிட தொனியுண்டாகும் விதம்	...	328
குரல்வளை	...	329
பாடுவதிலும் பேசுவதிலும் தொனியைத் திருப்புவது...	...	331
பேச்சு...	...	332

21-ம் அத்தியாயம்.

புலன்கள்	...	332
சாதாரண உணர்ச்சிகள்	...	333
விசேஷ உணர்ச்சிகள்	...	334
பரிசம், ஹறு	...	338
இரசம், சுவை	...	340
நாவும் அதன் நரக்கடுக்களும்	...	340
கந்தம், நாற்றம்	...	342
காது, சத்தம், ஒசை	...	345
கண்விக்கருவியின் கூற்	...	345
சுரோத்திரோந்திரியம்...	...	347
சப்பதத் தொழில்	...	348
வெளிக்காதின தொழில்	...	349
நடுக்காதின தொழில்	...	349
பிரமணத்தின் தொழில்	...	350
கண், உருவம், ஒளி	...	351
விழி	...	352
கழினை, கிருங்கை, தரிணிசம் முதலியன	...	352
கண்ணுள் வெளிச்சம் செல்லுமொழுக்கு பிரமாணங்கள்	...	356
வணம், இயவம், தரிசியம் முதலியவை	...	357
காட்சியின் தோற்றம்	...	358

22-ம் அத்தியாயம்.

ஜனனம், வளர்ச்சி, முகிர்தல்	...	359
கந்திர ஜனனேந்திரியங்கள்	...	359
கர்பம், தரியாத நாதம்	...	363
நாதம் கர்பமடைதல்	...	366
புருஷ ஜனனேந்திரியம்	...	366

தேகதத்துவ சாஸ்திரம்.

1-ம் அத்தியாயம்.

உயிருடனிருக்கும் பிராணிகளின்
விசேஷ தர்ம குணங்கள்.

மானிட தேகதத்துவம் என்னும் சாஸ்திரம் மனிதனுடைய பிராணனைக்குறித்துச் சொல்லுகிறது. அதாவது அவன் உயிருடனிருக்கு மாதிரியையும், சஞ்சரிக்கும் விதத்தையும் மற்றும்வனுக்குள்ள வாழ்க்கையையும் எடுத்துச் சொல்லும்; பிறப்பு, வளர்ச்சி, மாண முதலியவற்றைக் குறித்துக் கூற நமக்கு புத்தியைப் புகட்டுஞ் சாஸ்திரமாகும்.

இந்த நூலில் அறிந்துகொள்ளும் விஷயம் மனிதனைப் பற்றியதாகையால், நமது புலன்களுக்குத் தோற்றுஞ் சகலவித பிராணிகள், ஸ்தாவரங்கள், தாதுக்கள் முதலியவற்றின் பிராணனைப்பற்றியுள்ள பொதுவான நியாயங்களைக் கண்டறியவேண்டியது அவசியமில்லாவிடினுஞ் சிறுஷ்டியில் அமைந்திருக்குஞ் சகல வஸ்துக்களினுடையவும் பிராணனைக்குறித்த சில ஆதி நியாயங்களை வெடுத்துச் சொல்வது நலமாயிருக்கிறது.

உயிர் வாழ்வுக்குள்ள முக்கிய குணங்களாவன :—
பிறப்பு, வளர்ச்சி, முதிர்வு, இளைப்பு, சாவு என்பவையே.

இந்த வஸ்துவின் பிறப்பென்று சுட்டிக்காட்டாமல், பொதுவாகப் பிறப்பென்னும் பதத்திற்கு அர்த்தமெப்படிச் சொல்லலாம் என்றால், தாயினின்றும் விலகித் தானே பிரத்தியேகமாய் வளருஞ் சக்தியையுடைத்தாயிருத்தல் என்று சொல்லலாம். ஆகையால் பிறப்புக்குள்ள தன்மை பிதுரார்ஜிதமென்று சொல்லக்கூடும்.

வளர்ச்சி, அதாவது பரிமாணத்தில் தனக்குத்தானே அதிகரிக்குஞ் சக்தி. இந்தத் தாற்பரியம் உயிருடனிருத்தல் என்னும் எண்ணத்திலேயே அமைந்ததாயிருந்தாலும், இந்திரிய வஸ்துக்களின் வளர்ச்சிக்குமாதிரமே பொருந்திய பொருளல்ல. இந்திரிய வஸ்துக்கள் போலவே அனிந்திரிய வஸ்துக்களும் வளரும் சக்தியையுடையனவே. ஆனால் அனிந்திரிய வஸ்துக்கள் வளரும் விதம் எப்படியென்றால், வஸ்துவின் பரிமாணங்கள் அணுவிலணுவாய் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாகப் படிந்து பெரிதாகின்றன. இந்திரிய வஸ்துக்களோ அப்படியல்ல. இவைகளிலிருக்கும் அணுக்களோ அவைகளின் பரிமாணங்கள் ஒன்றின்மேல் ஒன்றாகப் படிவதுமாதிரமேயல்லாமல், அவை உள்ளிருக்கும் அணுக்களில் ஊடுறும் விருத்தியடைகின்றன. ஆகையால் அனிந்திரிய வஸ்துக்களின் வளர்ச்சி வெளிப்புறத்ததாயும், இந்திரிய வஸ்துக்களின் வளர்ச்சி ஊடுறப் பொருந்தியதாயும் இருக்கின்றது. அதுவுமல்லாமல் இந்திரிய வஸ்துக்கள் வளரும்பொழுது, அவைகளில் இருக்கும் அணுக்கள் அழிந்து புது அணுக்கள் பரிணமிக்கும். ஆகையால் வளர்ச்சியாகுங் காலத்தில் இருக்கும் அணுக்கள் சேதப்பட்டும், சேதமாகும்பொழுதே வேறு அணுக்கள் பரிணமிப்பதினால் அவைகளில் உண்டாகும் நாசஞ் சீர்பட்டும் வருகின்றது. அனிந்திரிய வஸ்துக்களிலோ இப்பேர்ப்பட்ட நாசமும், நாசத்துடன் சீர்ப்பாடும் உண்டாகிறதில்லை. இன்னும், அனிந்திரிய வஸ்துக்களில் உண்டாகும் வளர்ச்சியில் சேருகிற அணுக்கள் அப்படிச் சேருவதற்குமுன் எந்த சொரூபமாயிருந்தனவோ அதே சொரூபமாய்ச் சேர்த்தபிறகும் இருக்கின்றன. இந்திரிய வஸ்துக்களிலோ அப்படியல்ல. உதாரணமாக: ஒரு உப்புக்கல்லை விருத்தியடையச் செய்யவேண்டுமானால், தகுந்தபடி அதன் ரசம் அடங்கிய நீரில் அதைப்போட்டால் உப்புக்கல் வளரும். நீரிலிருக்கும் உப்பின் தத்துவம் நீரைவிட்டுப் பிரிந்து உப்புக்கல்லுடன் சேரும்; நீரினின்றி அப்படிப் பிரிந்து உப்புக்கல்லுடன் சேருவதினால்

அப்படிச் சேரும் உப்பின் தத்துவம் வேறுபடுகிறதில்லை. ஆனால் இந்திரிய வஸ்துவாகிய ஒரு செடியிலோ—அது வளருவதில், வெளியினின்றும் புதிய தத்துவங்களைச் சேர்த்துதான் அது விருத்தியடையவேண்டி யிருந்தபோது லுஞ் சேரும் தத்துவங்கள் சேர்த்தபிறகு சொரூப மாறியதாய்க் காணுகின்றன.—ஜீவஜெந்துக்களுந் தாங்கள் போஷிப்படையவும் வளரவுந் தங்களுடைய இரைப்பையில் உணவை யுட்கொள்ளுகின்றன. ஆனால் உட்கொண்ட வஸ்துக்கள் தேகத்தில் ஒன்றுபட்டு அமையுங்காலத்தில் அவைகளுடைய தன்மை நீங்கி வேறு தன்மையுள்ளவையாகப் போகின்றன.

எப்படி உயிருக்கு மரணம் என்கிற அளவு இருக்கிறதோ அப்படியே வளர்ச்சிக்கும் அளவு உண்டு.

உயிர்வாழ்க்கையில் தேகம் வளருவது எப்படி முக்கிய தர்மமாக இருக்கிறதோ அப்படியே தேக முதிர்வடைவது முக்கிய தர்மமாகும். வளர்ச்சியென்பது வண்ணத்தில் பெருகுந் தன்மை; முதிர்வு என்பது குணத்தில் உறுதிதொள்ளுந் தன்மை. நன்றாய்வளர்ந்த மனிதனுடைய உடல், பூதாகாரங்கொண்ட குழந்தையின் உடல் போல்வதாகமாட்டாது. அவனுடைய தசைகளும் இந்திரியங்களும் உறுப்புகளும் வண்ணத்தில் பெரியதானது மல்லாமல் அவைகள் எல்லாம் முதிர்ந்தவையாயிருக்கின்றன. அதாவது தத்தமக்குள்ள தொழில்புரியுஞ் சக்தி அதிகரித்தவையாயுந் தன்மையில் சிறப்புற்றவையாயும் இருக்கின்றன.

எப்பொழுது தேகமுதிர்ந்து இளைப்புக்கானுமென்று சொல்வது சாத்தியமானதல்ல; ஆனால் கீடனதிசை உண்டாகி நாளுக்குநாள் வறழிக் கடைசியாகத் தேகத்திற்குச் சாவு உண்டாகும்.

ஸ்தாவரங்களுக்கும் பிராணிகளுக்குமுள்ள முக்கிய வித்தியாசங்கள் சில உள். அவையாவன:—

1. செடிகள் தங்களிடத்திலிருக்குங் குளோரோபில் (Chlorophyll) என்னும் பச்சைகிற வஸ்துவினால்,

தமது இலைகளாலும், வேர்களாலும் உட்கொள்ளும் கார்பானிக் ஆஸிட் (Carbonic Acid) என்னும் கரியமலவாயு, நவாச்சாரம் (Ammonia), ஜல முதலிய வஸ்துக்களின் தன்மையை நசிப்பிக்குந் தர்மமுள்ளவைகளானபடியால் அந்தப்பிரகாரம்நசிப்பித்து உட்கொள்ளும் வஸ்துக்களைத் தங்களுக்கு ஆகாரமாய்க்கொள்ளும். இவ்விதமாக உணவை நசிப்பிப்பதற்கு ஹேதுவாகிய பூதச்செய்கை கரிய மலவாயுவைப் பற்றியவரையில் அது ரூரிய வெளிச்சத்தின் உதவியினால் உண்டாகிறதுமல்லாமல், அதன் பயன் செடியின் உட்கட்டடங்களில் கரிவஸ்துவையமர்த்திச் சுவாசவாயுவை வெளிப்படுத்துவதுமாயிருக்கிறது. பிராணிகள் அணிந்திரிய வஸ்துக்களை இந்தப்பிரகாரம் உபயோகப்படுத்துகிறதில்லை. அந்த வஸ்துக்களை உணவாய்கொள்வதில், அவைகளைப் பௌதிகப் பிரிவினைசெய்து செடிகளைப்போல பிராணிகள் சுவாசவாயுவை வெளிப்படுத்தி இரேசகத்தில் போக்குகிறதில்லை.

2. பௌதிகக் கூட்டுப்பாட்டிலும் பிராணிகளும் ஸ்தாவரங்களும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்டிருக்கின்றன. கஞ்சிவஸ்துக்களுக்குச் சேர்ந்த ஸெல்லிலோசு (cellulose) என்னும் ஒருவகைப்பொருள் ஸ்தாவரங்களில் ஏராளமாயிருக்கிறது. அது சுத்தக்கரி, ஜலவாயு, சுவாசவாயு இவை அடங்கியதாயிருக்கிறது. பிராணிகளிலோ இப்பொழுது சொன்ன பூதங்களுடன் நான்காவது தர்க்கியசம் என்னும் உப்புவாயுவும் கூடியிருக்கிறது. இந்த நான்கும் சேருவதினால் வெள்ளைக்கருச்சத்து சம்பந்தமான உபாதான பூதம் ஒன்று இவைகளிலேற்பட்டிருக்கிறது.

3. நாம் சாதாரணமாய்ப் பிராணிகளின் விசேஷத்துவங்களில் தனக்குத்தானே அசைதலுறும் சக்தி முக்கியமானதென்று எண்ணுகிறோம். ஆனால் இந்த சக்தி சில ஸ்தாவரங்களுக்குமுண்டு.

4. அன்ன வாகிக்குழுவிற்குப்பதிலும் பிராணிகளை ஸ்தாவரங்களினின்றும் பகுத்தறியலாம். ஆனால் எல்லாப் பிராணிகளுக்குமே இந்தக்குழல் கிடையாது.

2-ம் அத்தியாயம்.

ஜீவனுக்கும் மற்ற சடசக்திகளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம்.

ஜீவன் என்றால் என்ன? எத்தன்மைபுள்ளது? இந்த வஸ்து எவ்விடத்திலிருக்கின்றது? என்ன அம்சங்கள் பெற்றது? இவை முதலிய பல விஷயங்களைப்பற்றியும் இந்த அத்தியாயத்தில் எடுத்து விரிப்பது அசாத்தியமான விஷயமாயிருக்கிறது. இதைப்பற்றி பற்பல வேத வேதாந்த கிரந்தங்களும், ஆத்ம தர்மசாஸ்திரங்களும் இருக்கின்றன.

ஜீவன் என்பதற்குப் பதார்த்தம் இன்னது என்று சொல்வது மிக்க கடினமாயிருக்கிறது. ஆனால் ஜீவனின் சக்தியால்தான் சைதன்னியம் உண்டாகி, பிறப்பு, வளர்ச்சி, முதிர்வு, இளைப்பு, மரண முதலிய மாறுபாடுகள் தேகத்திற் காணுகின்றன.

ஒரு வித்திலிருந்து முளைகளிம்பி வருவதும், அண்டத்தினின்று பறவை வெளிப்படுவதும், எந்தப் பிண்டத்தினின்றும் உயிர்வந்து வெளிப்படும்பொழுதும் பிறப்பு உண்டாகிறதென்று சொல்லுகிறோம். ஆகையால் ஜீவன், வெளிக்குத் தேகத்தில் காணுமுன்பே வித்திலிருக்கிறதென்று தோற்றுகிறது. வித்து என்பது தாயினின்றும் பிரிந்து பிரத்யேக சைதன்னியமடையுஞ் சக்தியுடையதாயிருக்கின்றது. அது உற்பவித்து வளருவதில் தாய் போன்ற உருவமைந்து வளரும் குணத்தையுமுடையதாயிருக்கின்றது. தாயினின்று பிரிந்து தனியேவரும் விதமிப்படிப்பட்டது, அதைச்சேர்ந்த தர்மங்கள் இப்படிப்பட்டன என்னும் விஷயங்கள் ஜனனம் என்னும் அத்தியாயத்தில் விவரித்துரைக்கப்படும்.

சகல ஜீவராசிகளிலும் புதியதாய் உற்பவிக்கும் சைதன்னிய தேகம் தாயின்பாகமாகவிருந்தே உற்பத்தியாகிறது.

கின்றது. மனிதன் முதலிய பெரிய ஜாதி பிராணிகளில், உற்பத்திக்கு ஆண் பெண் என இரண்டு பிராணிகள் ஜனனேந்திரிய சம்பந்தமாகக் கூடிக் கலந்து புதிய குழந்தை உண்டாகவேண்டியிருக்கிறது.

ஆதிகாலத்தில் இந்தப் பிறப்பிற்கு முந்திய ஸ்திதியைப்பற்றிப்பெரியோர்கள் எண்ணியிருந்தவிஷயமென்னவென்றால், பிண்டத்தில் பிராணாவேசம் உள்ளடங்கியிருந்ததென்றும், அது பிறந்தபிறகு வெளித்தோற்றமுடையதாயிற்றென்றும் சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள். உஷ்ணம், வெளிச்சமுதலிய ஸ்தூல சக்திகளுக்குப் பிறப்பில் சம்பந்தமுண்டென்னும் தத்துவத்தையறிந்திருந்ததாகக் காணவில்லை.

உதாரணமாக ஒரு வித்தையீர்வது, முட்டையையாவது எடுத்துக்கொள்ளலாம். உஷ்ணம், வெளிச்சம் முதலிய ஆவேசங்கள் இவ்வித்தின்மேலாவது, முட்டையின் மேலாவது தாக்குவதினாலேயே அதனிலுள்ள பிராணாவேசத்தை உத்திபனஞ்செய்து ஒரு செடியாகவும், பிராணியாகவும் பரிணமிக்கச் செய்கிறதென்றுமாதிரி எண்ணக்கூடாது. இந்தச் சக்திகள் வித்திலும் அண்டத்திலும் சென்று, தங்கள் சொரூபம் பெளதிகமாய் மாறப்பெறுகின்றனவென்பது இப்பொழுது தெரிந்தவிஷயமாயிருக்கின்றது.

வித்திலும் முட்டையிலுமிருக்கிற பிண்டசக்தி மேற் சொன்ன சடசக்திகளுடன் சேருவதால் ஓர்வித மாறுபாடடைந்து, நாம் சாதாரணமாய்ப் பேசுவதில் சொல்லுகிற பிராணன் என்கிற ஜீவசக்தியாக மாறுதல் அடைகின்றது. பிண்டத்தின் சக்தியும் வளர்ச்சி அடைவதற்கு வெளிப்புறத்தினின்று போஷிப்பைப் பெறவேண்டியிருக்கிறது. அந்தப் போஷிப்பை வெப்பம், ஒளி முதலிய சக்திகளால் அடைகின்றது. போஷிப்பை வெளியினின்று மடையாமல் எப்படி சைதன்ரியம் உண்டாவது அசாத்தியமோ, அப்படியே மேற்சொன்ன சடசக்திகளில்லாமலும் பிராணனுண்டாவது அசாத்தியம்.

இதுபோலவே கருப்பிண்டத்திற்கும் அதைச்சுற்றியிருக்கும் போஷிப்புக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களினாலேயே வளருஞ் சக்தி வரமாட்டாது. பெளதிக மாறுபாடுகளை சடசக்திகளால் பெறவேண்டியிருக்கிறது. பிஜ வித்தே இந்த சடசக்திகளைப் பிராணசக்தியாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்றது. அப்படி மாறுபாடுகளைடைவதினால் போஷிப்பு வஸ்துக்களைப் பிராணனுக்கு வேண்டிய பிரகாரம் ஐக்கியப்படுத்திக்கொண்டுஞ்சைதன்ரியமுள்ள வஸ்துக்களாக மாறுபாடடையச் செய்துகொண்டும் வருகின்றது.

உள்ளடங்கியிருக்கும் பிராணசக்தி என்பதற்கு வெப்பம், உஷ்ணமுதலிய சடசக்திகளை வளரும் தன்மையுள்ள வேறுவித சக்தியாக மாற்றிக்கொள்ளும் திறமுடைய இந்திரிய வஸ்துவென்று சொல்லலாம்.

இத்தன்மையுள்ள ஜீவசக்தி வெளித்தோற்றவீக்கும் விதங்களில் சிலவற்றில் சடசக்திகளையொத்தும், மற்ற விஷயங்களிலவைகளின் தோற்றங்களுக்கு மாறுபட்டுக்காணும். ஆகையினாலேதான் ஜீவனின் சொரூப மித்தன்மைத்தென்று சொல்லுவது கஷ்டமாயிருக்கிறது.

இந்திரிய வஸ்துக்களாலமைந்த யந்திரத்தில் உற்பவிக்கும் பயன்களை அணிந்திரிய வஸ்துக்களால் உண்டாகக்கூடிய பயன்களுடன் சீர்தூக்கிப்பார்க்குமளவில் சிலவற்றில் பேதமற்றும், மற்றவைகளில் ஒற்றுமையற்றும் காணுகின்றன.

உயிர்வாழ்க்கையின் தோற்றங்களாகிய பிறப்பு, வளர்ச்சி, முதிர்வு, இளைப்பு, சாவு என்னும் விஷயங்களுக்கும், இவைகளில் காண்பதுபோல உயிரற்ற வஸ்துக்களில் காணும் மாறுபாடுகளுக்குமுள்ள ஒற்றுமைகளில் சிலவற்றை இதுவரையிலேயே யெடுத்துக் காட்டினோம். ஆயினும் உயிர்ச்சக்தி மற்ற சடசக்திகளினின்றும் வேறுபட்டிருக்கும் அம்சங்கள் சிலவற்றை இங்கெடுத்துரைப்போம்.

வளருவதில் பெரியவடிவடைவது உயிர்ச்சக்திக்கு உரித்தாய முக்கிய அம்சமல்ல. அணிந்திரிய வஸ்துக்களும்

அதுபோலவே வளர்ச்சியடையுஞ் சக்தியுடைத்தாயிருக்கின்றன. இந்திரிய அம்சமாய்த் தேகத்திலிருக்கும் சரலம் என்னும் ஒரு சிறியபையும், ஸ்தாவரங்களின் பையானும் சரி, உற்பத்தியாவதில் உயிர்ச்சக்தியின் விசேஷ அம்சத்தாலேயே தூதன சம்பவமாக வளருகின்றது. அனிந்திரியவஸ்துக்கள் அதிகரிப்பதில் இவ்வித தூதன சம்பவங் கிடையாது. அவைகளில் ஆதியிலிருக்குஞ் சேர்க்கை வஸ்துக்கள் மாத்திரம் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து பெரிதாகின்றன. ஆனால் இந்திரிய வஸ்து விருத்தியடைவதில், அதன் கட்டடங்களில் தன்மை பேதஞ் சம்பவிக்கின்றது. இவைகள் வளருவதில் ஒரு வடிவையடைவதற்கு வேண்டிய சக்தி இவைகளினுள்ளிருக்கின்றது. இதன் தன்மையைப்பற்றி நமக்கு யாதொன்றுந் தெரியமாட்டாது. இத்தன்மை அனிந்திரிய வஸ்துக்களில் கிடையாது.

தேகத்தின் பல உறுப்புகளின் தொழில்களினால் ஜீவசக்தி வெளியாகின்றது. இத்தொழில்களினால் அசைவு என்னுங் குணமும் வெளிப்படுகிறது. ஆனால் அசைவை அனிந்திரிய வஸ்துக்களிலும் சடசக்திகளாற் காணலாம். ஆகையால் அது பிரணசக்திக்கு மாத்திரம் உள்ள குணமாகமாட்டாது. சடசக்திகளால் உஷ்ணத்தை சட அசைவாக மாறுபாடடையச் செய்யக்கூடுமானதாயிருக்கிறது. இத்தொழில், அனிந்திரிய வஸ்துக்களால் நிர்மாணஞ்செய்யப்பட்ட யந்திரத்தினாலும் உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாயுமிருக்கின்றது. ஆனால் அசைவு எனும் வெளித்தோற்றம் பிரணிகளிலும், ஸ்தாவரங்களிலும் எந்த உறுப்புகளால் உண்டாக்கப்படுகிறதென்பதும், எவ்விதமா யுண்டாகிறதென்பதும் விசேஷமான விஷயங்களென்றும், இவை போன்றவை அனிந்திரியவஸ்து யந்திரங்களில் கிடையாதென்றும் தெரிகின்றது. ஆனால் பலவே ஒரே விதமானதாயிருக்கிறது. மனிதனும் அசைவு என்னும் சலனத்தை உடையவனாயிருக்கிறான். நீராவியந்திரமுஞ் சலனமுடையதாக விருக்கிறது. நீராவியந்திரத்தில் சலனத்

துக்குள்ள ஹேதுக்களின் ஒவ்வொன்று அம்சமும் நமக்கு வெளிப்படையா யறியக்கூடியதாயிருக்கிறது. பிரணசக்தியாலுண்டாகுஞ் சலன ஹேதுக்களைப்பற்றி நமக்கு ஒன்றுந் தெரியவில்லை. இதுவும் ஸ்லாமல் சதைகள் அடையுஞ் சுருக்கத்தால் தேகத்திற் சலனமுண்டாவதுபோலவே, சக்தியின் வேறுபாடுகளினாலேதான் சித்தம் புத்தி இவைகளும் வெளித்தோற்றமாகின்றன. இவைகள் நரம்பு சக்தியாலுண்டாகிறதென்றும் தோன்றுகிறது. பிரணனால் உண்டாக்கப்படுஞ் சக்தியின் இவ்வித உருவெளித்தோற்றங்களுக்கு உள்ள ஹேதுக்கள் எத்தன்மையன? எப்படி யுண்டாகின்றன? இவைகளின் அம்சங்கள் என்ன? இவ்வித விஷயங்கள் அற்புதங்களாகவும், பரம இரகசயங்களாகவுமிருக்கின்றன.

பிரணசக்தி வெளித்தோற்றிப் பலவித சைதன்னியங்களுண்டாக சடசக்திகள் வெளியிடுகிறது சேரவேண்டியிருந்தபோதிலும், பிரணசக்தியால் தேகம் வளருவதையும் முதிர்வடைவதையும் சாவதையுங் குணங்களாகக் கொண்டதும் ஸ்லாமல், புருஷனிலிருந்து பீஜம் பிரத்தியேகப்பட்டு வெளிவந்து வேறு புருஷனாக உருவடையுஞ் சக்தியையும் உடைத்தாயிருத்தல் மிக்க விரிதையாகவிருக்கின்றது. பலவித இந்திரிய வஸ்துக்கள் உற்பவித்து வளருவதும், மற்ற மாறுதல்களடைவதும் எக்காரணத்தால் என்று சொல்வது அசாத்தியம். அவைகள் எல்லாஞ் சகல பராக்கிரமமுடைய சன் செயலாம்.

3-ம் அத்தியாயம்.

மனிதனுடலில் இருக்கும் பெளதிக வஸ்துக்கள்.

மனிதனுடலே பூதங்களாகக் கூறுபாடுசெய்வதில் பின்வரு மூலவஸ்துக்களைக் கண்டறியலாம். அவையாவன:—

10	தேகத்திற்கானும் பூதவஸ்துக்கள்.	[3-ம்]
Oxygen	சுவாசவாயு, தகனாவாயு, அமிலகரம், அமி	
Hydrogen	ஜலவாயு, ஜலாகரம், நீரசம், சலதம். [லதம்.	
Nitrogen	உப்புலாயு, தார்க்கியசம், தார்க்கியசரம், உரு	
Carbon	சுத்தக்கரி, இருந்தை. [சகதம்.	
Sulphur	கந்தகம்.	
Phosphorous	நிபாக்கினி.	
Silicon	திக்கல்.	
Chlorine	பச்சைநிறவாயு.	
Fluorine	பச்சைநிறவாயுவிலும், சுவாசவாயுவிலும் பொதுவாயுக் காணப்படும் பிரத்தியே கமாயகப்பட்டாததுமான புளுரைன் என் னும் ஒருவாயு.	
Potassium	மரவுப்புச்சத்து.	
Sodium	சுவட்டுப்புச்சத்து.	
Calcium	சுண்ணாம்புச்சத்து.	
Magnesium	காந்தமண் சத்து.	
Iron	அயம்.	

இதுவுமல்லாமல் சில சமயங்களில் இவைகளை ஒட்டி

Aluminium	படிக்காரச்சத்து.
Manganese	மாங்கனீஸ்.
Copper	செம்பு.
Lead	நயம்.
Lithium	லிதியம், இலிதம் இவைகளை யுள் காணலாம்.

தற்காலம் அறிவுக்கெட்டியவரையில் சோதித்துக்
கண்டுபிடித்திருக்கும் சுமார் அறுபத்துமூன்று பூதங்
களில் ஏறக்குறைய நாலில் ஒரு பங்குக்குமேல் உள்ள பூத
வஸ்துக்கள் மனித தேகத்தில் இருக்கின்றன.

இவைகள் இருக்கும் அளவின் விவரம் பின்வருமாறு
காண்க :—

சுவாசவாயு	72.0
கரியமலவாயு	13.5
ஜலவாயு	9.1

அத்தி.] தேகத்திற்கானும் பூதவஸ்துக்கள்.

11

உப்புலாயு	2.5
சுண்ணாம்புச்சத்து	1.3
நிபாக்கினி	1.15
கந்தகம்	1.476
சுவட்டுப்புச்சத்து	1
பச்சைநிறவாயு	0.85
புளுரைன்	0.8
மரவுப்புச்சத்து	0.26
அயம்	0.01
காந்தமண் சத்து	0.012
திக்கல்	0.002

100.

இந்தப் பூதங்களில் மூன்று மாதிரி மற்ருவகளு
டன் சம்பந்தப்பட்டாமல் அதிக சூஷ்மமாய்கப்படும்.
அவை சுவாசவாயு, தார்க்கியசம் என்னும் உப்புலாயு, ஜல
வாயு ஆகியவைகளேயாம். சுவாசவாயு இரத்தத்தில்
அதிக கொஞ்சமளவாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த வாயு
வின் ஏராளமான பாகம் இரத்த அணுவான ஹீமோ
குளோபின் (Haemoglobin) என்னும் சோணித பதார்த்
தத்துடன் பெளதிகமாகக் கலந்திருக்கும். தார்க்கியசம்
என்னும் உப்புலாயு தேகத்திலிருக்கும் இரத்தத்திலும்
இன்னும் மற்ற ஜலங்களிலுமிருக்கிறது. ஜலவாயுவும்,
சுவாசவாயுவும், உப்புலாயுவும் குடல்வழியிலிருக்கின்றன.
இந்த வஸ்துக்கள் வெவ்வேறு மாறுபாடுகளோடு தேக
மெங்கும் ஏராளமாயிருக்கின்றன.

பூதங்கள் வெவ்வேறு விதங்களாய் ஒன்றோடொன்று
கூடியிருக்கும் பல மூலப்பொருள்களுக்கு உபாதான
பூதங்களென்று சொல்லலாம். இவ்வுபாதான பூதங்கள்
இந்திரிய உபாதான பூதங்களென்றும், அனிக்திரிய உபா
தான பூதங்களென்றும் இருவகைப்படும்.

மனித தேகத்தில் இருக்கும் இந்திரிய உபாதான
பூதங்களை தார்க்கியசமற்ற இந்திரிய உபாதான பூதங்க

ளென்றும், தர்க்கியசமாதிய உப்புவாயு கலந்த இந்திரிய உபாதான பூதங்களென்றும் பிரிக்கப்படும்.

தர்க்கியசமற்ற இந்திரிய உபாதான பூதங்களை மூன்று வகுப்பாகப் பிரிக்கலாம். அவைகள் :—

1. கொழுப்புகளும், எண்ணெய்களும், 2. கஞ்சிகளும், 3. சில புளிப்புசூடுமேயாம்.

1. எண்ணெய்களும், கொழுப்புகளும் : இவை முக்கியமாகத் தேகத்தில் கொழுப்புச் சதைகளில் இருக்கின்றவை. இவைகளுக்கு இங்கிலீஷில், ஸ்டியரின் (stearin), பால்மிடின் (palmitin), ஒலின் (olin) என்று சொல்லுவார்கள். இவைகளுக்கு முறையே நிணமிலதம், தூர்யாமிலதம், தைலோமாதூர்யாமிலதம் என்று சொல்லலாம். இவை சவர்க்காரமாகக் கூடிய கொழுப்புகள். இவை ஒன்றுடனொன்று சேருவதினால் மஞ்சள் நிறமுள்ள தெளிவான எண்ணெயாகும். இவை சுவல்ப உஷ்ணத்தினாலே உருகுமாகையால், தேகத்திலிருந்துக் கொழுப்புச் சதை முதலானவைகளிலே அனுமாத்திரமாயிருக்கும்படியான அநேக சிறிய பைகளில் திரவமாகவே யிருக்கின்றன.

தேகத்திலிருந்துக் கொழுப்புச் சத்தானது முக்கியமாய்த் தீனியிலிருந்துக் கொழுப்பினின்றும் மனிதனுடைய குடல்களில் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது. ஆனால் தீனியின் மற்ற அம்சங்களிலிருந்தும், அதாவது சர்க்கரைச் சத்துக்களிலிருந்தும், உப்புச் சத்துக்களிலிருந்தும், அந்தந்தச் சத்துக்கள் தேகத்தில் பெளதிக வேறுபாடுகளை அடையுங்காலத்தில் கொழுப்பு உற்பத்தியாகிறது மூண்டு.

தேகத்தில் எந்த இடங்களில் அனுப்பிரமாணப் பைகள் உற்பத்தியாகின்றனவோ அவ்விடங்களிலெல்லாம் கொழுப்பு தப்பாமல் இருக்கின்றபடியால் அதை மனிதனுடைய வளர்ச்சியிலும் உடல் வேறுபாட்டைவெல்லும்

அதிக முக்கிய சாதனமென்றறிந்து கொள்ளவேண்டியது. அதுவுமல்லாமல் தேகத்திலிருக்கும் வைர வஸ்துக்களிலும் திரவ வஸ்துக்களிலும் அது ஏராளமாய்க் கலந்திருக்கின்றது. மற்றத் தகனிய வஸ்துக்கள்போல, கொழுப்பானது மலமுதலான கழிவு பதார்த்தங்களில் எப்பொழுதுங் காணப்படுகிறதில்லை. அதன் பூதங்கள் தேகத்தை விட்டு கரியமலவாயு ரூபமாகவுந் தண்ணீர் ரூபமாகவும் வெளியே போகின்றன.

சவர்க்காரம் (சோப்) ஆகக்கூடாத பித்தங்கட்டியம்சம் என்று அர்த்தம் தரும் கோலஸ்டரின் (cholesterin) என்று பெயர் வழங்கும் ஒருவகைக் கட்டியான கொழுப்புச் சத்துஞ் சுவல்பமாக இரத்தத்திலும், பித்தத்திலும், நரம்புச் சத்துக்களிலும் இருக்கின்றது. இந்தக் கொழுப்பு தேகத்தில் வரும் சில புண்களை கத்திசெய்யுங்குணமுள்ளது. இந்தக்கொழுப்பே சற்று பேதப்பட்டு மலத்துடன் வருவதைக் கண்டிப்பத்திருக்கிறார்கள். அந்தற்கு ஸ்டெர்கோரின் (stercorin) என்று பெயர். மலத்தில் எக்ஸ்கிரீடின் (excretin) என்கிற மற்றொருவிதக் கொழுப்பையுங் கண்டிப்பித்திருக்கிறார்கள்.

2. கஞ்சிவஸ்துகள் : இதன்கீழ் கஞ்சியுஞ் சர்க்கரையும் சேரும். கொழுப்பிலிருப்பதுபோலவே இவைகளிலும், சுத்தக்கரி, ஜலவாயு, சுவாசவாயு கலந்திருக்கின்றன. ஆனால் சுவாசவாயு அதிகமாயிருக்கின்றது. சுவாசவாயுவும் ஜலவாயுவும் தண்ணீராக எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவிலிருக்கின்றன.

கஞ்சிவஸ்துக்கள் பின்வறுமாறு பல பொருள்களாகத் தேகத்திற் காணப்படுகின்றன.

காஞ்சிகம் : (கிளோகோஜின் glycogen) காஞ்சிகம் என்று பெயர் வழங்கக்கூடிய இந்த வஸ்துவில் கஞ்சிப்பசையில் சேரும் வஸ்துக்களை சேர்த்திருக்கின்றன. கஞ்சிப்பசைபோலவே இதைப் புளிக்கவைத்தால் சர்க்கரையாய்விடும். இது அநேக இளைமைத் தசைகளின் சூல்கள்

லும் அனுமாத் திரமான பைகள் நூதனமாய் உற்பத்தியாகுமிடங்களிலுங் காணப்படும், கருக்குழியில் பிண்டத்தைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்குந் தொப்புள் கொடிப்பையிலுங் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஜனித்தபிறகு அது கரு ஈரலிலும் பேசிகளிலுமே முக்கியமாய் காணப்படுகிறது. காஞ்சிகம் என்பது நமது ஆகாரத்திலிருக்குஞ் சர்க்கரை வஸ்துக்களினாலே உற்பத்தியாகின்றது. உணவில் அதிகமாய்ச் சர்க்கரையுங் கஞ்சியுஞ் சேர்ந்தால், தேகத்தில் இந்த வஸ்து அதிகமாய்க் காணப்பட்டபோதிலும் இவைகளினின்றும் மாத்திரமேயல்ல இது உற்பத்தியாவது. ஆகார மாமிசமாத்திரமாயிருந்தாலும் அதிலுள்ள உப்பு வஸ்து அழிவுபடுவதினால் காஞ்சிகமும், மூத்திரவாயுவும் உண்டாகிறதுபோலவுங் காணுகிறது.

கோஸ்தாலியம் (குளுகோஸ் glucose) என்னுந் திராக்ஷ சர்க்கரை இரத்தத்திலுங் கரு ஈரலிலும் அதிகக் கொஞ்சமளவில் காணப்படுகிறது. தேகத்தின் மற்ற பாகங்களிலும் எப்போதாவது காணும். இது உணவிலிருக்குங் கஞ்சிகளிலிருந்துஞ் சர்க்கரைகளிலிருந்தும் நேராகவே உற்பத்தியாவதுமல்லாமல், அவைகளினின்றும் உண்டாகிய காஞ்சிகச் சர்க்கரையினின்றும் உற்பத்தியாகின்றது. இது எப்படி உற்பத்தியானபோதிலும் இரத்தத்தில் சுவாசவாயுவுடன் கூடுவதினால் அதிகக்கிரத்தில் எரிந்து போகின்றது. அப்படி யெரிந்துபோவதினால் தேகத்தின் வெப்பத்தைத் தாங்குகிறது. மற்றக் கஞ்சி சத்துக்கள்போலவே, இவைகளினின்றும் கொழுப்பு உண்டாகின்றது. சஞ்சிவனம் (லாக்டோஸ் lactose) அல்லது பாலின் சர்க்கரை-பெண்களின் முலைக்கோளங்கள் தேக தர்மத்தை அனுசரிக்கும்பொழுது இந்த வஸ்து அதிகமாக உற்பத்தியாகின்றது. பெண்கள்பாலில் 100-க்கு 5 அல்லது 6 பாகம் இந்த வஸ்து இருக்கின்றது. மற்ற சர்க்கரைகள்மாதிரியே இதுவும் போஷிப்பைத் தர வெகு உபயோகமான வஸ்து வாகையால் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றவேண்டிய தருணங்களில் தேகத்தினின்று வெளிப்படுகின்றது.

இனொசைட் (inosite) என்னும் ஒருவிதச் சர்க்கரைச் சத்தும் ஊனில் கொஞ்சம் அகப்படுகிறது. இது உற்பத்தியிலும் உபயோகத்திலும் காஞ்சிகமாதிரியேயன்றே தோற்றுகிறது.

3. உருசகதமற்ற (உப்புவாயு சம்பந்தமற்ற) இந்திரியாமிலங்கள் தேகத்தில் பிரத்தியேகமாக வேறுபட்டிருக்கிறதில்லை. இவைகளில் சற்றேறக்குறைய எல்லாம் ஒன்றுடன ஒன்று கலந்தே காணப்படும். கரீராமிலம் என்னும் புளிப்பு ஜடாராக்கினியில் உண்டாகும் புளிப்பு ரஸத்திலும் பேசிகளிலுமிருக்கிறது. ஏறும்புப்புளி, காடிப்புளி, வெண்ணெய்ப்புளி முதலிய புளிப்புகள் வேர்வையிலுள்ள குருவஸ்துக்களில் கலந்து காணும்.

உருசகதேந்திரியோபாதான பூதங்கள் :—

உப்புவாயுசம்பந்த உபாதான பூதங்கள் வெவ்வேறு வகைப்பட்டனவாய், பூதங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பெளதிகமாய்க் கலந்தவையாமிருக்கின்றன. அவைகளில் சுத்தக்கரி, ஜலவாயு சுவாசவாயுவுடன் தர்க்கியசமென்னும் உப்புவாயுவுங் கலந்திருக்கும். அநேக வஸ்துக்களால் சேர்க்கப்பட்ட இவ்வபாதான பூதங்கள் சிலவற்றினுள் அதிக துட்பமாய்க் கந்தகமும் கலந்திருக்கும். இவைகளில் ஒன்றிரண்டினுள் நிபாக்கினியுங் கலந்திருக்கிறது.

இவைகளை ஒருவாறாக பின்வருமாறு வகுத்துப் பேசலாம்.

1. அண்டசிதம் (புரோட்டீன் அல்லது அல்புமினாய்ட்ஸ் proteids or albuminoids), 2. செலிதம் (ஜிலட்டினஸ் சப்ஸ்டென்ஸஸ் gelatinous substances), 3. புளிப்புகள் (பெர்மென்ட்ஸ் ferments), 4. வர்ணவஸ்துக்கள் (கலரிங் மாட்டர்ஸ் colouring matters).

1. அண்டசிதம் (புரோட்டீன் அல்லது அல்புமினாய்ட்ஸ்) என்னுஞ் சத்துக்கள் முட்டையின் வெண்கருவின் சத்துக்கள்போலதாகும். தேகத்தில் காணுந் தர்க்கியசமாதிரி உப்புவாயு வஸ்துக்கள் அதிகமாகக் கொடுக்கப்படும்.

கருவின் சத்தை உடையதாயிருக்கின்றன. இவைகளில் முக்கியமானவை அண்டயம் (ஆல்புமின் albumine), இரத்தாணுவயம் (குளோபிலின் globuline), இரத்தநார் வஸ்து (பைபிரின் fibrine), பாலேட்டு சத்து (கேசின் casein) என்பவை தேகத்திலிருக்கும் உப்புவாயு சத்துக்களில் பெரும்பான்மையவாகி அண்டசிதமென்னும் வெண்கருசு சத்து இனத்தைச் சேர்ந்தவையாயிருக்கின்றன. ஜீவ தசைகள் அனைவற்றிலும் இவைகளில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது இரண்டு சத்துக்கள் முக்கிய பாசகங்களாகச் சேர்ந்திருக்கின்றன. நினரீரிலும் வயிற்றிலுண்டாகும் அன்ன ரசத்திலும் இரத்தத்திலும் இவை ஏராளமாயிருக்கின்றன. வேவ்வேக் கருச்சத்தை பெளதிகப் பிரிவாகப் பிரித்தால் ஒவ்வொரு 100 பாகத்துக்கும் பூதங்கள் பின்வருமாறு இருக்கும்.

சுத்தக்கரி	53.5
ஜலவாயு	7.0
உப்புவாயு	15.5
சுவாசவாயு	22.0
கந்தகம்	1.6
நீபாக்கினி	.4

100.0

ஆல்புமினுய்ட்ஸ் என்னும் வெண்கருசு சத்துக்கள் தேகத்தில் எத்தவிதங்களில காணப்பட்டபோகிலுமே கண்ணம் புடனும் உப்புடனும் இன்னும் மற்ற தாதுகளுடனும் கலந்திருக்கின்றன. இவைகள் உணவிலிருக்கும் வெள்ளைக்கருசு சத்துக்களினின்றும் ஸ்வீகரிக்கப்பட்டவைகளாயிருக்கின்றன. ஆகையாலே தேகத்தினுள் புதிதாய் உண்டானவைகளாகமட்டாது.

செலித வஸ்துக்கள் : செலிதம் (ஜிலின் gelatine) என்னும் பாசுபோன்ற இங்கிரியவஸ்து இவ்வருப்பு வஸ்துக்குப் பேர்தரும் வஸ்துவாக இருக்கிறது. இந்தப் பாசுபோன்ற பசையைக் கொதிக்குந் தண்ணீரில் எலி

ம்புகளை ஒன்றோடொன்றாய்ச் சேர்க்கும் தசைகளை வேகவைப்பதினால் ஏராளமாயெடுக்கலாம். அப்படியெடுக்கும் வஸ்து உஷ்ணமாயிருக்கிறவரையில் திரவருபமாயிருக்கும். குளிர்த்துபோனபொழுது உறைந்து பாசுபோலாய் விடும்.

செலிதப்பசையிலே பெளதிகப்பிரிவினை செய்வதால் கானும் வஸ்துக்கள் :—

சுத்தக்கரி	50.16
ஜலவாயு	6.6
உப்புவாயு	18.3
சுவாசவாயு	24.8
கந்தகம்	.14
	100.00

குருகிதம், தசையிதம், கோட்டிதம் என்னுயிவ்வஸ்துக்களும் தேகத்தில் கானுஞ் செலிதவகை வஸ்துக்களாகும்.

குருகிதம் (காண்டிரின் chondrine) என்பதை முருந்துகளினின்று எடுக்கலாம்.

தசையிதம் (இலாஸ்டின் elastine) என்பதை மஞ்சள் நிறமான நெகிழ்ந்துமுடித்தக்க தசைகளினின்று கொதிக்கும் தண்ணீரில் அவைகளை வேகவைத்து எடுக்கலாம்.

கோட்டிதம் (கிராடின் keratin) என்பதைத் தோலினின்றும் அதைச் சேர்ந்த மயிர் நகங்களினின்றும் எடுக்கலாம்.

3. புளிப்புகள் (ferments) :

சில உரசகத (உப்புவாயு கலந்த) வஸ்துக்களுக்குப் புளிப்புகள் காரிகள் என்று சொல்லலாம். இவைகள் முக்கியமாக ஆகாரக்குழலில் உற்பத்தியாய்க்கசியும் பல திரவங்களாகிய, உமிழ்நீர், அன்னாசயத்திலுண்டாகும் பாசகநீர், குடல்களில் உற்பத்தியாகும் நீர்கள் ஆகிய இவைகளில் இருக்கின்றன. இவைகளின் தொழில் என்ன

வென்றால், உணவாய் உட்கொள்ளும் பல பதார்த்தங்களையும் கரைத்து இரத்தத்துடன் அவைகளை ஐக்கியம் செய்வதே. உதாரணமாக சள்ள மிலம் (டியாலின் ptyalin) என்னும் புளிப்பு உமிழ்நீரில் இருப்பது. இதனாலேயே உணவிலிருக்கும் கஞ்சி வஸ்துக்கள் கோஸ்தானியம் என்னும் சர்க்கரையாக மாறுகின்றன. செரிப்ப மிலம் (பெப்சின் pepsin) என்பது பாசக நீரின் புளிப்பு. இதின்மீதும் வெள்ளைக் கருச்சத்துச் சம்பந்தமான வஸ்துக்களைச் சீக்கிரம் கரைக்கும்படியான செரிப்போன் (பெப்டோன் peptone) என்னும் வஸ்து உண்டாகின்றது.

4. வர்ண வஸ்துக்கள் (colouring matters): மனித தேகத்திலிருக்கும் இரத்த அணு அல்லது சோணிதம் (ஹீமோகுளோபின் haemoglobin) என்னும் வஸ்துவே வர்ணவஸ்துக்களுள் முக்கியமானது. அதுவுமல்லாமல் தேகத்தில் காலும் மற்ற வர்ண வஸ்துக்களெல்லாம். இத்தினின்றும் உண்டானவையென்றே தோன்றுகிறது. பித்த நீரிலும் மூத்திரத்திலும் வர்ண வஸ்துக்களிருக்கின்றன. தோலிலும் கண்விழிதிலும் மற்ற பஞ்சேந்திரியங்களிலும் கூட இந்தவஸ்துக்களிருக்கின்றன.

5. இதற்குமுன் சொல்லிய வருப்புகளிலடங்காத உரசுகத வஸ்துக்கள் :

எந்தத் தசைகளில் மேற்கூறிய உரசுகத வஸ்துக்கள் காண்கின்றனவோ அந்தத் தசைகளிலேயே முக்கிய பாகமாயிருக்கும் வேறு சில உரசுகத வஸ்துக்களின்னுமிருக்கின்றன. மூளைய மிலவஸ்து (செரிபிரின் cerebrin), லெஸிதின் (lecithin) இவைகளொன்றாகச் சேர்வதினாலுண்டாகும் புரோடகான் (protogon) என்னுமிந்தவஸ்துக்களும், மியலின் (meyline), செரிபிரிக் ஆஸிட் (cerebric acid) என்பவைகளுமிந்த வருப்பைச் சேர்ந்தவைகள். புரோடகானென்பது நரம்புத் தசைகளில் ஏராளமாயிருக்கின்றது. இவைகளனைவற்றிலுஞ் சுத்தக்கரி, ஜலவாயு, உப்புவாயு, சுவாசவாயுவுடன் கிபாக்கியியுங் கலந்திருக்கின்றது.

இவையல்லாமல் உணவிலுந் தசைகளிலும் உப்பு வாயு சம்பந்தப்பட்ட வஸ்துக்கள் பூதிகக்கூறும்பி யிரிவதி லுற்பத்தியாகுஞ் சிலவஸ்துக்கள் தேகத்திற்கு ஸ்திரமாய்ச் சேர்ந்தவையல்லாதவையானாலுந் தேகம் உயிருடனிருத் தற்பொருட்டுண்டாகும் மாறுபாடுகளினால் எப்பொழுதும், அதில் காணப்படும். உதாரணம் மூத்திரச்சத்து (யூரியா urea), மூத்திர மிலம் (யூரிக் ஆஸிட் uric acid), பரிமூத்திர மிலம் (ஹிப்பூரிக் ஆஸிட் hippuric acid), கிரியேடின் (creatin), லியூசின் (leusin), டைரோசின் (tyrosin) முதலிய வஸ்துக்களேயாம்.

மனித சரீரயிப்பொழுது சொல்லிமுடித்த இந்திரிய வஸ்துக்களினாலே ஏற்படுந் தேகமாகும். ஆனாலிந்தத் தத்துவங்கள் பூதிக சுப்பரமாயிருக்கிறதென்றெண்ணக் கூடாது. தேகத்திலிருக்குந் திரவங்களுந் தசைகளு மிந்தத் தத்துவங்களி லநேகங்களுடன் சில உப்பு வஸ்துக்களையுங் கொண்டிருக்கின்றன.

அனிந்திரிய உபாதான பூதங்கள்.

தேகத்தில் அனிந்திரிய உபாதான பூதங்களநேகமிருக்கின்றன. அவைகளில் அநேகம் முக்கியமாய்ச் சாப்பாட்டினாலும் பானங்களினாலுந் தேகத்துக்குள் யாகொரு மாறுபாடுகளையு மடையாமலே செல்லுகின்றன.

அவைகளிலுஞ் சில பெளதிகக் கூறுபாடாகிச் சாப்பிடும் உப்பில் ஐந்தில் நாலுபாகந்தான் தேகத்துட்சென்ற பிரகாரமே மலத்தில் வெளியாகின்றன.

அவைகளில் வேறு சில வஸ்துக்கள் தேகத்தில் நாதனமாய் உற்பத்தியாகின்றவைகளாகும். சில நீர்களும், சில உப்புக்களும், சில பஸ்மங்களும் இப்படி உற்பத்தியாகும் வஸ்துக்கள். தேகத்திற்காணப்படும் அனிந்திரிய உப்பு வஸ்துக்கள் அதன்மைப்புக்கவசியமானதாயிருக்கின்றன. வெள்ளைக் கருச்சத்து முதலிய இந்திரிய உபாதான பூதங்களெப்படி யவசியமோ அப்படியே இவைகளும்வசியமாம். இவைகளிலொருபாகம் வஸ்துக்களையுருக்கிக் கரை

த்து ஐக்கியப்படுத்தும் ஜட் வியாபாரங்களுக்கவசியமான தாயிருக்கின்றது. இன்னுஞ் சில பாகம் உபயோகப்பட்ட பிறகு மலத்திற் கழிந்துபோகின்றன.

படிக்கராச்சத்து, மாங்கனிச், செம்பு, ஈயம் இவைகள் தேகத்துக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களல்லவாயினும், உணவுகளினால் அனுப்பிரமாணமாயுட்சென்று உடனே மலத்தில் வெளிவராமல் தேகத்தில் தங்கி யேதாவதொரு அங்கத்திலோ தசையிலோ படிந்து நின்றுபோகின்றன. இதேமாதிரியாகவே வெள்ளைப் பாஷாணமும் தேகத்திலூறிக் கல்லீரல் முதலிய பாகங்களிற் படிந்து நின்று போகும்.

4-ம் அத்தியாயம்.

மனிததேகத்தின் கட்டடப் பிரிவுகள்.

சத்திரப் பிரயோகஞ்செய்து மனிததேகத்தைக் கண்டித்துப் பார்க்குமளவில் அதிலொன்றினின்றும் ஒன்று வேறுபட்டுள்ள பல பாகங்களிருக்கிறதைப் பார்க்கலாம். அவை எலும்புகள், பேசிகள், மூளை, இருதயம், ஸுரையீரல், குடல்கள் முதலியவைகளாகும். இன்னுமதிகுட்பமாய்ப் பார்க்குமளவில் இவைகள் பலவிதத் தசைகளாலுண்டானவைகளென்று காணும். அவையாவன, ஒன்றுடனொன்று யிணைக்கச் சம்பந்தத்தசைகளும், பரிஸ்தாபிதத்தசைகளும், நரம்புத்தசைகளும், பேசித்தசைகளுமிவைபோன்ற மற்றவைகளுமாகும்.

பிண்ட சாஸ்திரத்தை யனுசரித்துப் பார்க்குமளவில், இந்தக் கலப்பான் சரீரக்கட்டுப்பாடானது அணுதரிசினிக் கருவியால்மட்டுங் காணக்கூடிய (ஒவம் ovum) என்னும் ஒரு மிகச் சிறிய நாதவஸ்துவினின்றும் வளரப்பட்டதென்று காணும். ஒவ்வொரு தசையும் நாதத்தை யொத்த மிகச் சிறிய வஸ்துக்களாலமைந்திருக்கின்றது. இச்சிறிய வஸ்துக்களை செல்ஸ் (cells) என்று சொல்லுவர்.

வார்கள். செல்ஸ் என்றும் சிறிய அறையென்றார்த்தந்தரும். பைகளென்றுஞ் சொல்லலாம்; சாலங்களென்றுஞ் சொல்லலாம். இந்தப்பைகளி லவைகளைவிடச் சிறிய கருக்கொப்பிளங்களையுங் காணலாம். இச்சாலங்கள் அல்லது செல்சு என்னும் பைகளே. அதாவது அணுவின்னுமாதிரிமான இப்பிஜ வித்துக்களே உயிர்த்தேகத்தின் ஆதிமூலப்பொருளாகும். இவைகளுக்கே புரோடபிளாசம் (protoplasm) என்று சாஸ்திரிகள் பெயர் வழங்குகிறார்கள். இதன் பரிமாணம் 3,000த்தில் 1 பங்கு அங்குலக்குறுக்களவுள்ளதாயிருக்கிறது. ஜடமாய்ப் பார்க்குமளவில் ஒட்டிக்கொண்டு நெகிழ்ந்தன்மையுடன் பாகுபோலிருக்கும். பௌதிசமாய்ப் பார்க்குமளவில் வெள்ளைக் கருச்சத்தையொத்த சத்தாகவும் ஜலத்திற் கரையாததாகவும், ஆனால் ஜலத்திலாவதுவிடச் செலிதம் என்னும் பசைபோல நெகிழ்ந்துறழத்தக்க வஸ்துவாகவுமிருக்கிறது. வாகடரீதியாய்ப் பகுத்தறிவதில் புரோடபிளாச பைக்கும் வெள்ளைக்கருச்சத்துக்கும் வித்தியாசம் யாதொன்றுங் காணப்படுகிறதில்லை. ஆனாபைகள் வளர்ச்சி, முதிர்நல் முதலிய குணங்களுடையனவாயிருக்கின்றன.

புரோடபிளாசமென்பது தனக்குத்தானே அசையுஞ் சக்தியையுடைத்தாயிரா னென்றது. அதாவது இடைவிடாமல் பலவிதங்களாகக் குறுகிநீளுஞ் சக்தியையுடைத்தாயிருக்கின்றது. ஈவமல்லாமல் விரைக்கெல்லாது போஷணையுடையனவானே பலவாகப் பெருகும். ஒரு அணுவின் பல பைகள் ஜனித்துப் பெருகுவதொருவிதம். ஒரு பையே துண்டுகளாகப் பிரித்துப் பெருகுவது மற்றொருவிதம்.

குருதிச்சாலங்கள்; இரத்தத்திலுள்ள சாலங்கள் மேற்சொல்லியபடி ஒன்று பலவாகப் பெருகுகிறதை அணு தரிசினிக் கருவியினுதவியாற் காணலாம். ஒரு சாலம் கொஞ்சம் நீண்டு மத்தியிற்றுண்டாகி யிரண்டுமூன்று சாலங்களாகிவிடுகிறது சகஜமாய்த் தெரியும்.

முருந்துகளிலுள்ள சாலங்கள்; முருந்துகளிலும் சாலங்கள் துண்டித்து விருத்தியடைவதைக் காணலாம். ஆனால் சிலசமயங்களிற் சாலங்களெல்லாம் எப்படியேனினும் ஜனிக்கின்றனவோ அதற்குச் சுற்றியிருக்கும் போர்வைக்குள்ளாகவே நிற்கும்.

சாலங்கள் பிரிந்து பெருகுவது அதிக சீக்கிரத்தில் நடப்பதாற் காணுவதரிதாகும். சாலங்களின் நெழில்கள் பலவிதமாயிருக்கின்றன. தேகத்தினுள் சாஸ்னா முழுவதுஞ் சாலங்களின் பலவிதத்தொழில்களைப் பொருத்தினதாயிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் கருவியையுமெடுத்துப் பேசுமிடத்து அநிலுள்ள சாலங்களின் நெழில் களையுமெடுத்துக் கூடியவனாயிற் சொல்லப்படும்.

பைகளினியிலுஞ் சாவும்: சாலங்களின் உயிர்வாழ்வெல்லாம் மிகச்சிறிய காலமேதான். இவைகளொன்றின்மேலொன்றுறைவதாலும், பெளதிக வேறுபாடுகளடைவதாலும் நசித்துப்போகின்றன. உடம்பிலிருக்கும் பலவித மீத்தோல்களிலுஞ் சாலங்களொன்றின்மேலொன்றுறைந்து நசித்துப்போவதைக் காணலாம். சாலங்கள், வேறு சாலங்களுற்பத்தியாகி அவைகளிருக்குமிடத்தை ஆக்கிரமித்துக்கொள்ளுவதினால் முன்னுக்கு உந்தப்பட்டு வெளிப்புறத்தை நோக்கிவருகின்றன. அப்படி வரும்பொழுது வடிவம் மட்டையாகி மிருத்துவங் குறைந்து செக்கன்மையாகித்து வருவதுமல்லாமற் கடைசி மட்டை தேகத்தைச் சீதையட்பதாயே அச்சு சாலங்கள் உதிர்ந்தும் போய்விடுகின்றன.

இதுபோலவே பரிஸ்தாபிதம் (எபிதிலியம் epithelium) என்ன மீத்தோல்களின் சாலங்களுநிரந்துபோகிற படியாற்றான் வாயிலுறிவருஞ் சிலேஷ்மத்திலும், குடல் உபஸ்தோ-மூத்திர பிரதேசங்களிலுற்பத்தியாகுஞ் சிலேஷ்ம நீரிலும் உதிர்ந்த சாலங்களைக் காணலாம்.

பூதிக வேறுபாட்டாலுஞ் சாலங்களினுசஞ் சம்பவிக்கின்றது. இவ்விஷயத்தில் சாலத்துள்ளிருக்கும் வஸ்

துக்களழிந்து வேறு விதங்களாகி வெளிவருகின்றன. உதாரணமாக: (1) ஊறிவரு முலைப்பாலிலிருக்கு மெண்ணெய்த்திவிலைகளான கொழுப்பு வஸ்துவாகவும், பின்டம் ஜனனமானபிறகு கருக்குழியிலிருக்குஞ் சதை நார்களின் கொழுப்புச் சத்தாகவும் மாறிக் காலுமின்றன. (2) நுரையிரல் சுவாசப்பை யிவைகளிலமைந்திருக்கும் வர்ண வஸ்துக்களாகவு மாறுகின்றன. (3) முருந்துகளின் கொம்புத் தன்மையடைந்த வஸ்துக்களாகவு மாறுகின்றன.

சாலங்களின் வடிவங்கள் பலவிதப்படுகின்றன, சாதாரணமாகக் கோளவடிவாயிருக்கும். ஆனால் ஒன்றின்மேலொன்றுறைந்துகொண்டு நெருங்கி யிருக்கும்பொழுது பல பக்கங்களை யுடைய வடிவாகவுங் காணும்.

பிம்பாகாரச சாலங்கள் இரத்தத்திலும் செதிள்போன்றவைகள் மீத்தோலின் மேற்புறத்திலுங் காணும். குடல் முதலிய சிலேஷ்ம பரிஸ்தாபிதங்களில் இச்சாலங்கள் ஸ்தம்பாகரமாயிருக்கும். பல துணிகளையுடைய நகரத்திரம்போன்றவைகளை, முள்ளந்தண்டுக் கொடியின் நரம்புச் சாலங்களிலும், சம்பந்தத் தசைச் சாலங்களிலுங் காணலாம்.

சாலங்களைப் பலவிதமாய் வகுத்துப் பேசலாம். வடிவினால் கோளேவும் என்றும், பலபக்கமுடையவையென்றும், இழையொத்தவையென்றும், தட்டை என்றும், செதிள்போன்றவையென்றும், ஸ்தம்பாகரமானவையென்றும், நகரத்திரம்போன்றவை யென்றும் இவைபோல பலவகையாகச் சொல்லப்படும். அவைகளிருக்கும் ஸ்தானத்தைப் பொருத்தி, இரத்தச் சாலங்களென்றும், கோளச் சாலங்களென்றும், சம்பந்தத் தசைச்சாலங்களென்றும், இவைமுதலியனவாகப் பலவிதமாய்ச் சொல்லலாம். அவையுள்ளிருக்கும் வஸ்துக்களைக்கொண்டு செழுச்சாலங்கள் (கொழுப்புச் சாலங்கள்) என்றும், கெழுச்சாலங்கள் (வாண வஸ்துக்களை யடக்கிக்கொண்டிருக்குஞ் சாலங்கள்) என்றும், தொழில் புரிவதைப்பற்றி பேரசியச்செய்யுஞ்

சாலங்களென்றும், காப்பாற்றுகுஞ் சாலங்களென்றும், சுருங்குஞ் சாலங்களென்று மிவைபோல பலவிதமாகவும் பகுத்துச் சொல்லலாம்.

இச்சாலங்கள் ஒன்றுடனொன்று சேர்க்கப்பட்டிருப்பதற்கு வேண்டிய (இடையில்) இணைக்கும் வஸ்துக்களைப்பற்றி யிப்பொழுது சொல்லுவோம். இவைகள் சாலத்திடை வஸ்துக்களாகும். இவைகள் மாறுபாடடைவதால் நாள்களாயும், குழாய்க் குஞ்சுகளாயுமாகின்றனவென்று யிரித்துச் சொல்லலாம். இவைகளெல்லாஞ் சாலங்களின் பேதங்களென்றே காணுகின்றன.

சாலங்கள் ஒன்றுடனொன்று சம்பந்தமடைந்திருக்கும் விதத்திலுஞ் சில பேதங்களுண்டு.

(1) சாலத்திடை வஸ்துக்களால் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது சாதாரணவிதமாகும். ஸ்தம்பாகாரப் பைகளாலாய எபித்தீலிய பரிஸ்தாபிதத்தில் அதாவது உட்புற மீத்தோலில் இவை அதிகமாயிருக்கின்றன. முருந்துகளிலு மிவை விசேஷமாயகப்படும்; சாலங்களோ இவ்வஸ்துக்களிற்பதிக்கப்பட்டதுபோலத்தான் காணும். (2) இப்பைகளோ ஒன்றுடனொன்றாய் நெருங்கி ஒன்றுக்கொன்று வாய்வைத்துக்கொண்டு சம்பந்தமுள்ளவைகளாயுஞ் சிலவிடங்களில் காணும். நண் சுக்ல மண்டலத்திலிருக்கும் நகைத்திரிகச்சாலங்க ளிவைபோன்றவை. சாலங்களிப்படியொன்றுகூடுவதாலவைக ளொவ்வொன்றுக்குமுள்ள சொரூபம் நாசமாகி வலைபோலக்காணும். நிணநீர்க்கோளங்களிடகோதை யிதற்குதாரணமாகக் காட்டலாம். இப்படி பல வலைக்கண்ணுருவமைந்த சாலக்கூட்டங்கள் ஒன்றுடனொன்றாய் நாள்களாலிணைக்கப்பட்டிருக்கும். முள்ளந்தண்டிக் கொடியின் நரம்புப்பைகளிந்த விதமானவைகள்.

சாலங்கள், சாலத்திடை வஸ்துக்கள், நாள்கள், குழாய்க்குஞ்சுகள் ஆகிய இவ்வித சாதாரண அம்சங்களைக் கொண்டு தேகத்தின் சகல பாகங்களும்மைக்கப் பெற்றிருக்கின்றன. இவைகள் பலவிதமாய்ச் சேர்க்கப்பட்டே

தேகத்திலுள்ள பல உபாதான மூலவஸ்துக்களுங் காணும். மீத்தோலு மதன் மாறுபாடுகளும், சம்பந்தத் தசைகளும், கொழுப்புத் தசைகளும், முருந்தும், எலும்பும், பேசிகளின் நாள்களும், நரம்புகளின் நாள்களும் இவைமுதலியவைகளெல்லா மவைகளா லுண்டாயிருக்கின்றன. இவைகள் முன்சொல்லிய சாதாரண அம்சங்களுடன் கூடியே நாடிகளாகவும், நாளங்களாகவும், நிணநீர்த்தாரைகளாகவும் பொருள்குங் கோளங்களாகவும், குழாய்தன்மையமைந்த கோளங்களாகவும், துரையிரல்களாகவும், இரத்தாசியமாகவும், கல்லிரலாகவும், தேகத்தின் மற்ற பாகங்களாகவும் அமைந்திருக்கின்றன.

5-ம் அத்தியாயம்.

மூலதாரத் தசைப்பின்னல்களின் கட்டடம்.

இந்த அத்தியாயத்தில் தசைப்பின்னல்களின் விரண்டு விதப்பொரியகூட்டங்களின் முக்கியமான தன்மைகளையும் அவைகளிலிருக்கும் முக்கிய மாறுபாடுகளையுஞ் சுருக்கமாயெடுத்துச் சொல்லுவோம். இவ்விரண்டு வகைகளுக்கும் இங்ஙிலீஷில் எபித்தீலியல் டிஷ்யூ (epithelial tissue) என்றும் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ (connective tissue) என்றும் பெயர். நாம் பரிஸ்தாபிதத் தசைகளென்றுஞ் சம்பந்தத் தசைகளென்றுஞ் சொல்வோம்.

பரிஸ்தாபிதம்.

பரிஸ்தாபிதமென்பது பல வடிவுகளான சாலங்கள் கொஞ்சமளவு சாலத்திடைவஸ்துக்களால் இணைக்கப் பட்டுண்டாயிருப்பதாகும். பரிஸ்தாபிதமென்பது தேகத்தின் வெளிப்பாக் முழுவதையும் போர்வைபோலப் போர்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதுவே பரிசர்மம். அல்லது மீத்தோலாகும் (பெபிடெர்மிஸ் epidermis); இசற்கு பாங்கமாக நகங்களையும் மயிர்களுயுமுடைத்தாயிருக்கும். இதுவே தேகத்திலிருக்கும் முக்கிய துவாரங்களிடத்தில்

அதாவது மூக்கு, வாய், குதம், முத்திரமார்க்கம் முதலிய விடங்களினுட்புறத்திலொட்டி ஆவை நின்று மகாசர்ப்போக்குவழிகளிலும் ஜனனேந்திரிய முந்திரப் போக்குவழிகளிலுமிருக்கும் பரிஸ்தாபிதத்துடன் சேர்ந்தொன்றுபட்டிருக்கிறது. முனையிலிருக்கும் குழிகளிலும், முள்ளந்தண்டின் மத்திய துவாரத்திலும், நிணநீர்ச் சவ்வுகளிலும், நித்தாசில்லிகளிலும், இரத்தமோடும் சகலவித நாடிநாளங்கள் முதலியவற்றினுட்புறங்களிலும், ஆசயனியுட்புறங்களிலும் பரிஸ்தாபிதமொட்டிபுறக்கிறது.

சாதாரண பரிஸ்தாபிதமென்பது, உதாரணமாக வயிற்றில்லாகாரப்பையிலிருந்து குதம்வரையிலிருக்கும் குடல் வழிக் கோழைச்சவ்வின்மேல் ஏகாண்டமாய்ப் படிந்திருப்பதே. புரப்பரிஸ்தாபிதமென்பது மீத்தோலையாகும். அதன்னவு முழுவதும் செதின்போன்றதாய் ஒன்றின் மேலொன்றாய்ச் சாலங்கள் படிந்திருக்கின்றன.

பரிஸ்தாபிதம் இவ்வாறெந்தவகைச் சாலங்களாலேற்பட்டிருக்கின்றனவோ அந்தச்சாலங்களின் வகைகளைப்பொருத்திய பல பெயர்களையே பெற்றிருக்கின்றன. ஆகையால் பரிஸ்தாபிதங்கள் (1) செதின்போன்றதென்றும், (2) கோளேவமானவைபென்றும், (3) ஸ்தம்பாகாரமானவைபென்றும், (4) முன்னோக்கி யடிக்கடி யசையுந் தொழிலுடைய மெல்லிழை யொத்தவை பென்றும் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

செதின்போன்றவை ஒன்றின்மேலொன்றாகப் படிந்த சாலவகைஞ்ஞடையதாய் சர்மம் முழுதையும் வியாபித்திருக்கின்றன. அவைகளுக்கு மீத்தோலென்று பெயர். வாயினுட்பக்கத்திலும், தொண்டையுட்பக்கத்திலும், அன்னவாறியுட்பக்கத்திலும், கண் ஜவ்விலும், நிதம்பங்களிலும், முத்திரத்தாரை வழி வாசல்களிலுமிருப்பவை யெல்லாமிவையே.

கோளேவமானவை தேகத்திற் பலநிரவங்களைப் பொசிக்குங் கோளங்களிலிருக்கின்றன. அதனாலேயே இந்தப்

அத்தி. பரிஸ்தாபிதத்தின் உபயோகங்கள்.

பரிஸ்தாபிதங்களுக்குக் கோளாகாரமென்ற பெயரும் வழங்குகிறது. பிருக்கம் (kidney), வாய் இவைகளின் திரவம் கசிப்பிக்கும் கோளங்களைப்பார்த்தால் நன்றாய் விளங்கும்.

ஸ்தம்பாகாரம் என்பவை இரைப்பை குடல் இவைகளின் சிலேஷ்மச் சவ்வின்மேல் படிந்திருக்கும்.

மெல்லிழையொத்தவை என்பவைகள் சுவாசத்துவாரங்கண் முழுவதிலுமிருக்கின்றன. புருஷர்களுடைய பிஜலிரையைச் சுற்றிக்கொண்டும் பெண்களினிதம்பங்ககளிலும் கர்ப்பக்குழியிலும் அதையொட்டியே யதற்கிரு புறமிருக்கும் நாதவாடுகளிலுமிருக்கின்றன.

பரிஸ்தாபிதத்தின் உபயோகங்கள்.

(1) ரக்ஷணை—உதாரணம் : சர்மம், வாய், இரத்தமோடுங் கருவிகள் இவை முதலியவைகளில்.

(2) ரக்ஷணைக்காகவும் நகந்துவதற்காகவும் — மேற் சொல்லிய சலனமுடையவையென்று சொன்னவையையே உதாரணமாகக்கொள்ளலாம்.

(3) திரவம் பொசிக்க—கோள வகைகள் என்று சொன்னவை. பிஜலிரையிற் சேர்ந்திருக்குஞ் சக்திலத்திலுள்ள விந்துக் கிரிமியை வெளியாக்குவதையுங் காண்க.

(4) ரக்ஷணையும் திரவம் பொசித்தலும்—குடலினுள்ளவை யிந்த சக்திகளுடையவை.

(5) பஞ்சேந்திரியங்களைப் பொருந்தினவை—மூச்சினுள் வாசனைக்குரிய சாலங்களைத் திருஷ்டாந்தமாய்க் கொள்ளலாம்.

தேகமுழுவதையுங் கவசம்போற் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் பரிஸ்தாபிதமென்னும் போர்வை மிருதுவானதாக விருக்கின்றது. ஆனால் வெளிப்புறத்தில் வேறு வஸ்துக்களடிக்கடி தாக்கக்கூடியவிடங்களிற் கெட்டியாகிக் கொம்புத்தன்மை கொண்ட தசையாமிருக்கின்றதுமல்லாமலுபாங்கமாக மயிர், நகம் முதலியவற்றையுமுடையதா

யிருக்கின்றது. கண், காது, மூக்கு, வாய் இவைகளினிற் திரிய வியாபாரானுசாரமாய் இவைகளினுட் பரிஸ்தாபிதமிருக்கின்றது. இதன்மூலமாயே வெளியிலிருந்து வரு மொவ்வொருணர்ச்சி புண்டாக்கு மழுத்தமும், அல்லது பதிப்பும் அதிதூட்டமாகிய நரம்பு றுணிகளிற்குக்கி அவைகளினால் மூளைக்குக்கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கப்படுகிறபடியால், சங்கதிகளின் ஞானோதயம் மவதில் உண்டாகும்படி செய்ய உதவுகின்றது.

சுவாசத் துவாரங்களிலிருக்குஞ் சலனச்சால்ங்களைப் பொருந்திய பரிஸ்தாபிதம்.—அது எந்த வஸ்துக்களின்மேற் படிந்திருக்கின்றதோ அந்த வஸ்துக்களைக் காப்பாற்றுவதுமல்லாமலதின் சால்ங்களின் சலனத்தினால் திரவவஸ்துக்களையு மதிக தூட்பமான ஜடவஸ்துக்களையுந் தேகத்தினின்றும் வெளியே தள்ளுவதிலுதவியாக விருக்கின்றது. நாதவாகியிலிருந்து நாதத்தை கற்பக்குழிக்குத் தள்ளிவிடுவதிலு மிந்தப் பரிஸ்தாபிதமே புதவிசெய்கின்றது.

திரவங்களைப் பொசியச்செய்யுங் கோளங்களிலிருக்கின்ற பரிஸ்தாபிதத்தினற்றான் குடலில் திரவம் பொசிந்து இரத்தத்திற்குவேண்டிய சில வஸ்துக்களை பூதிகவிசுற்பு மடையச் செய்கின்றது.

வஸ்துக்களை ஒரு பக்கமிருந்து மற்றப்பக்கத்திற்கு கசிப்பித்துக்கொள்ளவும், பரவச்செய்யவும் ஐக்கியப்படுத்திக்கொள்ளவு முதவுகிறதும் பரிஸ்தாபிதமே.

மேற்புறமாயிருக்கிறவை சதா அழிந்து உதிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதேகாலத்தில் அதற்கடியில் புதிய பரிஸ்தாபிதங்க ஞற்பத்தியாய்க்கொண்டிருக்கின்றன.

சம்பந்தத் தசைகள்.

சம்பந்தத் தசைகள்: இந்த வகுப்பிற்சேர்ந்த தசைகள் எலும்புக்கடும்அதைச் சேர்ந்தவைகளான எலும்புகள், குருத்தெலும்புகள், பந்தன நார் முதலியவையாகும். நரம்பு, மாம்சம், கோளம் இவைகளைச்சேர்ந்த தசைகளால்

ஏற்பட்டிருக்கும் பல உருப்புகளுக்குக் கவசமாகவும், காங்குவதற்குரிய சட்டமிட்ட வேலையாகவுமிருக்கின்றன.

இதன் முக்கியத்தொழில் தாங்குந் தொழிலாகையால் தேகத்திலிருக்குஞ் சகலக் கட்டுப்பாடுகளுடனும் பின்னியிருக்கின்றது. ஆகையால் மற்றெல்லாத் தசைகளையு மெடுத்துவிட்டாலு மிச்சம்பந்தத் தசையை மாத்திரம் பார்த்தால் தேக சர்வாங்கங்கனினுடைய கட்டடப்போலிக்கையை யனுவளவும் பிசகில்லாமற் காணலாம்.

சம்பந்தத் தசையை பின் வருமாறு வகுத்துப் பேசலாம்:—

1. செலித வகை.
2. வலை வகை.
3. நார் வகை.
4. கொழுப்பு வகை.
5. முருந்து வகை.
6. எலும்பு வகை.

இவற்றுள் நார்போன்றவை வெண்மை நிறமானதும், மஞ்சள் நிறமானதும், முலைக்காம்பைச் சுற்றியிருக்கும் வர்ணம் போன்றதுமாகப் பிரிக்கலாம்.

1. செலிதவகைப் பந்தத்தசை ஜெல்லி பிஷ் (jelly fish) என்னும் வஸ்துவில் காணலாம். மனிதனுடைய கருப்பிண்டத்தில் அநேகவிடங்களிலுமிதைக் காணலாம். ஆனால் வளர்ந்தபிறகிதைக் கண்ணின் பிற்புறத்திலிருக்கும் படிக்கச்சுவச்சமென்பதில் மாத்திரங் காணக்கூடுமாயினும், தொப்புட் கொடியினுள்ளும் வளரும் பற்களிற்பற்சிகரத்தைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் வஸ்துவிலும் நன்றாய்க் காணலாம்.

2. வலைவகைச் சம்பந்தத்தசை மண்ணீரலிலும், நிணநீர் பொசியுங் கோளங்களிலுங் காணப்படுகின்றது. மூளை முள்ளந்தண்டு விழி இவைகளைச் சுற்றியும் முலைக்காம்பைச் சுற்றிக்காணும் வர்ணவகைப் பந்தத்தசை யொன்றிருக்கின்றது.

3. நார்வகைச் சம்பந்தத் தசைகள்: எலும்புகளைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்குஞ் சவ்வுகளாகவும், முருந்துகளைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்குஞ் சவ்வுகளாகவும், வயிற்றிலுந் துடையிலுமிருக்குஞ் சில நரம்புத்தசைகளாகவு, மிந்த வகுப்புத் தசைகளிருக்கின்றன. நினைநீர்ச்சவ்வு சிலேஷ். மச் சவ்வு இவைகளுமிந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தவை யாகும்.

இந்த நார் வகைத் தசைகள் பல நீட்டிப்போக்கி லொன்றுடனொன்றுக் கட்டப்பட்டுப் பெரிய தசை நாராகும்.

கொழுப்பு வகைத் தசைகள்: கொழுப்பு வகைத் தசைகள் தேகத்திற் சர்வாங்கங்களிலு. மேற்குறையக் காணப் படுகின்றனவாகையா விவையில்லாத விடங்களை யெடுத்துச் சொல்வோம். கண்ணிமைச் சர்மத்தடித் தசையிலும், பிரஜாபதியிலும், பிஜத்திலும் சந்திர நாடியிலுமில்லை. கொழுப்புத்தசைகள் சில வறுப்புகளின் கட்டடவஸ்துக்களிலுங் கிடையா. துரையிரல், கல்லீரல் இவைகளைப் பார்த்தால் கொழுப்புத்தசை இல்லையென்பது தெரியும்.

தவிரப் பிரத்தியேகமாகத் தசைச் சம்பந்தமில்லாமல் கொழுப்பு மாத்திரம் தேகத்தில் விசாலமாய்ப் பரவியிருக்கிறது. கல்லீரல் மூளைகளிலும் இரத்தம் அன்ன ரசம் இவைகளிலு மிப்படியிருக்கிறதைக் காணலாம்.

இந்த வகை தசைச்சாலங்களிலிருக்கும் எண்ணெய் வஸ்துக்கள் எண்ணெயிலிருக்கும் மாதூர்ய வஸ்துவங் கொழுப்புப் புளிப்புகளுஞ் சேருகிறதினாலுண்டாகும். தைலோமாதூர்பாமிலதம், நிணமிலதம், தாலியாமிலதம் என்னும் வஸ்துக்களைப் பொருந்தினவையாயிருக்கின்றன.

கொழுப்பின் உபயோகமென்னவென்றால்:—

1. இவைகளில் சிக்கிரமெரியும்படியான வஸ்துக்கள் சேகரமாகி இரத்தத்தில் வேண்டும்பொழுதெல்லாங்

கலந்து எரியட்டு தேகத்தின் உஷ்ணத்தைக் காப்பாற்ற உதவுகின்றது.

2. சர்மத்திற்கடியிலிருக்குங் கொழுப்பானது, அது வெப்பத்தை வெளியிட்டு சூடுதிறத்தாகையால் தேகத்தின் மேற்புறமாக தேக உஷ்ணம் அனுவசியமாய் வெளிக்கிளம்பி நாசமடைபரிமற்றிடை செய்ய உதவும்.

3. தேகத்தில் அங்கங்கங்கள் மத்தியிலிருக்கும் வெற்றிடங்களில் நிறைந்துகொண்டும் மெல்லியதாயும் இளமையாயிருக்குங் கட்டடங்களைச் சுற்றியுமிருந்துகொண்டுத் தனது வழுவழுப்பினால் அவைகளைக் காப்பாற்றுவதற்கு ஹேதுவாகவுமிருக்கின்றது. உள்ளங்கையிலும் உள்ளங்காளிலுமிந்த உபயோகத்தை யுடையதாகிருக்கின்றது.

4. நீண்ட எலும்புகளிலிருக்குங் கொழுப்பு நாகுக்கு மச்சை என்று பெயர். இது எலும்புகளினுட்புறமிருக்குந் துவாரத்தை நிரப்பிக்கொண்டிருக்கிறது. தவிர எலும்பின் வஸ்துக்களுக்குப்போகும் இரத்த நாடிகளுக்குபயோகமுள்ளதாயு மிருக்கிறது.

முருந்து—முருந்தென்னு மிளவெலும்புகள் மனித தேகத்தி லநேகவிதமாய்க் காணப்படுகின்றன. இவைகளிருவகைப்படும். ஸ்திரமான முருந்தென்றுஞ் சொற்ப காலத்துக்குரிய முருந்தென்றுஞ் சொல்லலாம்.

கருப்பிண்டங்களிலுஞ் சிறு குழந்தைகளிலுமிருக்கு முருந்துகள் நாட்பட வயது விருத்தியாகும்பொழுது சுண்ணாம்பு படிப்படியா யதிகரிப்பதினாலவைகளுக்கு வரை மேறி யெலும்பாகி விடுகின்றன. ஸ்திரமான முருந்துகள் எலும்புகள் சந்திக்கும் துனிகளிலும் விலாவெலும்புகளையடுத்தும், முக்கிலும், பிடரியிலுமிருக்கின்றன. சுவாசக் குழல்களிலுமிருக்கின்றன. முருந்துகள் மச்சை (மாடிரிக்ஸ் matrix) என்னும் வஸ்துவினுட் சாலங்களை யடக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

மஞ்சள் நிறமுள்ள நார் முருந்துகள் செவியின் வெளிப்புறத்திலும், சுவாசக்குழியைடைக்குள் சவ்வினும் கண்ணிமையிலுமிருக்கின்றன.

வெள்ளை நிற நார் முருந்துகள் தேகமுழுவதிலு மதிகமாய் வியாபித்திருக்கின்றன.

முருந்துகள் உபயோகங்கள்: கணுக்களில் எலும்புகள் ஒன்றுடன் மற்றொன்றுவைதற்கு வேண்டிய மிருதுத்துவத்தைத் தருவதற்கும், எலும்புகளை ஒன்றுடன் மற்றொன்றை முடியவும், முள்ளந்தண்டில் எலும்புகள் கொஞ்சம் அசையும்வண்ணமிடங்கொடுக்கவும், இரத்தக் கவும், திருடமான கட்டட வேலையாக இருந்தபோதிலும் விரைத்துப்போகாமலும் அதிக பாரமில்லாமலும் இருக்கும் வண்ணம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. காதின் துவாரத்தருகிலும், சுவாசக்குழியின் துனியிலும், மார்பின்பக்கத்திலுமிருக்கிற முருந்துகளால் இவை வெளியாகும். பல எலும்புகளிலிருக்குங் குழிகளை ஆழப்படுத்துவது மிதின்தொழிலாகும். இடுப்பெலும்புருக்குங் கிண்ணி போன்ற குழியினுலிதையறியலாம். ஆயினுமிதிருக்குமெலும்புகளுடைய சலனத்தை மட்டுப்படுத்தமாட்டாது. முருந்துகள் உறுதியாயும், முறியாததாயும் வளையத்தக்கதாயும், நெகிழ்ந்துழத்தக்கதாயும், வலிவையுடையதாயும், பலவிதமாயிருக்கின்றன. எந்தவிடங்களிலெந்தக்குணமுள்ளது வேணுமோ அந்தவிடங்களில் தகுந்தவிதமான முருந்துகளை யமைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. முருந்துகள் மச்சையென்னுந்தசையில் சாலங்களுடனிருக்கின்றவை யென்று முன்னமே சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த மச்சை என்பது கண்ணாடிப் பொடிகளைப்போல் தானியங்களை யடுக்கிவைத்ததையொத்த தோற்றமுடையனவாயினும் மனிதனுடலிலிவகளுக்கு இந்தத் தோற்றமில்லாமல் ஒரே தோல்போற்காணுமாயினும் மச்சைத்துண்டின்னை வெந்நீரிலறைத்துப்பார்த்தால் சாலங்கள் வெங்காய இதழ்கள்போல ஒன்றின்மேலொன்றாய்ப் படிந்திருக்கும்

ஆகையினாலேகப்பிரமாணமான தோற்றத்தையுடையதாயிருந்தபோதிலும், மனிதனுடலிலிருந்து மச்சைகளுஞ் சாலங்களொன்றுடனொன்று சேர்ந்து ஒரே தோற்றமுடையதாய்க் காணும்படி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதென்று வெளியாகின்றது. மச்சையிருக்கும் பள்ளங்களிற் சாலங்களிலிருக்கின்றன. இந்தப் பள்ளங்கள் பல துவாரங்களாற் கலக்கப்பெற்றுமிருக்கின்றன. இந்தத் துவாரங்கள் வழியாகவே தான் தசையுட்புறங்களுக்குத் திரவங்கள் போய்ச் சேருகின்றன. முருந்துகளுக்கு நரம்பின் சந்தம்மில்லாமையு.

என்புகள்.

எலும்புகள் இந்திரிய வஸ்துக்களும் அனரிந்திரிய வஸ்துக்களுஞ் சேர்ந்து உண்டாகிவைகளாம். நூற்றில் அறுபத்தேழுபாகம் முன்சொன்ன வஸ்துவும் மூப்பத்து மூன்று பாகம் பின்சொன்ன வஸ்துவும், அனரிந்திரிய வஸ்துவாறிய மண்ணைச்சேர்ந்த வஸ்துவோ நிபாக்கினியுஞ் சுண்ணாம்பு வஸ்துவஞ்சேர்ந்த (calcium-phosphate) வஸ்துவாகும். 67 பங்கு இந்திரிய வஸ்துக்களிலுங்கூட மண்ணைச்சேர்ந்த வஸ்துக்கள் 11 பங்கும், சுண்ணாம்பு கரிச்சத்துக்களும், நிபாக்கினியுடன் கலந்த கார்த மண்சத்துமிருக்கின்றன. வேகவைப்பதின லெலும்புகளிலிருக்குமிந்திரிய வஸ்து செலிதப்பசையாகக் காணுகிறது.

எலும்பிற்சேருமிந்திரிய வஸ்துக்களும் மண்வஸ்துக்களுமொன்றுடனொன்று கலந்து ஐக்கியப்பட்டிருக்கும். இவைகளைப் பிரிக்கவேண்டுமானால் பூதிகச் செய்கையினாலேயாகுமல்லாமல் வேறுமார்க்கமில்லை.

எலும்பை திராவிடத்தில் போட்டு உறைவைத்தால் அதிலிருக்கும் சுண்ணாம்பு நீங்கி பசைமாத்திரம் நிற்கும்; அக்கினியிலிட்டெரித்தால் இந்திரிய வஸ்து எரிந்துபோய் மண்வஸ்து மாத்திரம் நிற்கும்.

இந்த வஸ்துக்கள் அதிகமாக ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறதென்னும் விஷயந் திராவகமூலமாய் மாறுவதிலேந்திரிய வஸ்து நின்றபோதிலும் அக்கினிமூலமாய் மாறுவதில்

மண் வஸ்து நின்றபோதிலும் எலும்பின் வடிவழியாமலிருக்கிறதிலேயே யறிந்துகொள்ளலாம்.

எலும்புகளை வெறுங்கண்ணாற் பார்த்தால் இருவிதக் கட்டடங்களுள் ஒன்று வைரமான பாகமாயும், மற்றொன்று கடற்பஞ்சுபோன்ற பாகமாயுங்காணும். ஓர் நீண்டவெலும்பை நீளத்தின்பிளந்தால் இவ்விருபாகமும் புலப்படும். அதுவுமல்லாமல் வைரம்போன்ற பாகத்தினுள் மத்தியத்தில் ஒரு துவாரமுங்காணும். இந்தத் துவாரத்திற்கு மச்சைத்துவாரம் (medullary cavity) என்று பெயர். ஏனெனில் அந்தத் துவாரத்திலெலும்பின் மச்சையிருக்கின்றது.

எலும்பின் மேற்புறத்தில் அது அசையும் இருதுணிகளும் முருந்தாகி இலேசான எலும்பு ஒடுகளின் உட்புறம் நிற்கும்; மற்றவிடங்களி லுறுதியானவும் நார்போன்றவுமான சவ்வினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கு எலும்பின் மேற்சவ்வென்றத்தமாகும் (பெரியாஸ்டியம் periostium) என்று பெயர். அஸ்திக்கவிப்பு என்றுஞ் சவ்வியக்கவிப்பு என்றுஞ் சொல்லலாம். இந்தச் சவ்வுகளிலிருக்கும் இரத்தநாடிகளாற்றான் வைரவஸ்துவுக்கு வேண்டிய போஷிப்புட்செல்லுகின்றது. சவ்வின் துட்பவிரத்தக்கால்சுகள் எலும்பின்மேலிருக்கும் அதிதுட்பவோட்டைகளின் வழியாய் போஷிப்பைக்கொண்டு சென்று, எலும்பினுள்ளிருக்கும் ஹாவர்சியன் கால்வாய் (haversian canal) என்று சொல்லுந் துவாரங்களிற் சேர்ப்பிக்கின்றன.

எலும்பாகும்விதம்—முருந்துகளில் சுண்ணாம்புபடிவதினால் வைரமேறி எலும்பாகின்றன. புஜவென்பு (பூமரஸ் humerus), தொடையென்பு (பீமர் femur) இவைகள் இந்தமாதிரி வளரும். ரிஸிலிருக்கும் பித்திகையென்பு (பெரைடல் போன் parietal bone), நெற்றியென்பு அல்லது லலாட ஹஸ்தி (பிரான்டல் போன் frontal bone), மண்டையில் விலவளேவான கட்டடவென்புகளுமாகிய இவைகள் சவ்வினேயே சுண்ணாம்பேறி எலும்பாகிறவைகள்.

எலும்புகளின் தொழில்கள்:—சரீரத்திலெலும்புகளொருவித அஸ்திவாரமாயிருக்கின்றன. வைரமாயுமுறுதியாய் மிருப்பதுமன்றி அதிக பளுவிலலாமலிருப்பதிலுலிந்த அம்சம் சரியாய் நிறைவேறிவரும். தலையிலுமுண்டிலுமுள்ள மூளை, இருதயம், புப்புசம் முதலிய வுறுப்புக்களுக்கப்பாயம் நேரிடாமல் இரகூதிக்கின்றன. ஸ்க்காலவயவங்களில் தசைகளினுதவியாலுரொபணமாக வுபயோகப்படுகின்றன. வைரம்போன்றவைகளானபோதிலு மவைகளில் நெகிழ்ந்துமுத்தக்க வம்சங் கொஞ்சக்கிழுக்கிறபடியால் அவைகளொடிந்துபோகாமற் பல சமயங்களிற் காப்பாற்றப்படுகின்றன.

அஸ்தி பஞ்சரம்.


ஆடு, மாடு, குதிரை முதலிய மிருகங்களிலும் மனிதனிலுமெலும்புகள் சதைகளுக்குள்ளிருக்கின்றன. நத்தை இருல் நண்டு முதலிய ஜந்துக்களில் உறுப்புகளுக்கு வெளியிலோடாடுக்காணும். ஆமை முதலியவைகளிலெலும்புகள் வெளியிலு முட்பாகத்திலுமிருக்கும்.

தேகத்திலெலும்புகளிருக்குங் கோர்வைக்கு அஸ்தி க்குடென்று பெயர். எலும்புக்கோர்வை, கங்காளம், சவ்வியகடமென்று சொல்வதுமுண்டு.

மானிட தேகத்திற் சுமார் 208-எலும்புகளுண்டு. எலும்பின் துண்டுகள் காலத்துக்குக்காலம் மாறுபாடடைவதால் எண்ணத்திற் பேதமுண்டாகிறதுண்டு. உதாரணமாக—நெஞ்சென்பு குழந்தைப்பருவத்தி லெட்டுத்துண்டாகவும், வாஸிபத்தில் முன்றுதுண்டாகவும் முதுமையிலோரெலும்பாகவும் மாறுகின்றது.

தேகத்திலுள்ள எலும்புகளினுருவும் பலவிதப்படுகின்றன. தலை இடுப்பிவைகளில் தட்டையாயும், புஜம், முன்கை, தொடை, காலிவைகளில் நீண்டும், முள்ளந்தண்டு, கணுக்கை, கணுக்காலிவைகளில் விருபமாயுமிருக்கும்.

1-ம் படம்.



1-ம் படம்.—கங்காந்தின் முன்பக்கம்: 1, 1, முள்ளந்தண்டு. 2, தலையோடி. 3, கீழ்க் கணுவுண்டு. 4, கெஞ்சென்று. 5, பழு. 6, 6, அலையின் முழுந்துப்பகுதி. 7, காறையென்று. 8, புயலென்று. 9, தோன்பொருத்து. 10, குறையென்று. 11, இரத்திலி யென்று. 12, முழங்கை. 13, கைக்குளசி. 14, கை. 15, சுந்தென்று. 16, பிடிக்கையென்று. 17, தொடைச்சுந்துப் பொருத்து. 18, தொடையென்று. 19, முழந்தாட்கின். 20, முழங்கால் பொருத்து. 21, சரவென்று. 22, களகவென்று. 23, காற்குளசி. 24, பாதம். 25, 26, காறையென்றையும் பழுக்கையும் கெஞ்சென்போடே தொடுக்கும் விசை. 27, 28, 29, தோன், முழங்கை, கைக்குளசி என்னும் பொருத்துகளின் விசைகள். 30, உற்காயத்தின் பெருகாடி. 32, தொடையின் பெருகாடி. 33, காலிச் பெருகாடி. 34, 35, 36, சுந்துப்பொருத்து, முழந்தான், காற்குளசிகளின் விசைகள்.—கீழின்.


எலும்புகளை நான்குபாகமாகப் பிரித்துப்பேசலாம்.

1. தலையெலும்புகள். 2. முண்டவெலும்புகள். 3. உற்காயவெலும்புகள். 4. அதக்காயவெலும்புகள் என்பவையாம்.

1. தலையெலும்புகள்:—இவைகளை கபால மூக்கு செவி எலும்புகளென்று பிரிக்கலாம். கபாலத்தில் எட்டெலும்புகளிருக்கின்றன. இவைகள் கரேகையென்னும் கருக்கு விவரிப்புக்களாலிசைந்நிருக்கின்றன. அதாவது சிரசில் எலும்புகளென்றோடொன்று சேருகிறவிடங்களில் தையலைப்போலக் காணப்படுகிற இவைகளுக்கு ரேகைகள் என்று பெயர். அவைகளை, விதியைக்காட்டும் பிரமனெழுத்து அல்லது பிரம்ம லிபி யென்பது வழக்கம். ஆனால் ரேகைகள் எலும்புகளை இசைக்குஞ் சந்திகளேயாம். அடிபடுவதால் தலையெலும்பில் விடவுகாணில் அதை யதிகமாய்ப் பரவவொட்டாது கபால ரேகைகள் தடுக்க உதவுகின்றன. சிரத்தில் நாலு ரேகைகளுண்டு. கபாலத்தின் முன்புறத்திற் குறுக்காக ஒருபக்கமிருந்து மற்றொருபக்கத்திற்கு உச்சிமார்க்கமாயேடுகிற ரேகைக்கு மூர்த்தரேகை (கரோனல் சூசர் coronal suture) என்று பெயர். உச்சியில் நீண்டதாகி முன்னிருந்து பின்னுக்கொன்றுபோகும். அதற்குச் சரோரேகை (சாஜிடல் சூசர் sajital suture) என்று பெயர். இது, சிலர் நெற்றியென்பு மடுவிலேயேடுவதுமுண்டு. கபாலத்தின் பின்புறத்தில் குறுக்காயொன்றேடுகிறது. அதற்கு அட்சரேகை (லாம்ப்டாயிட் சூசர் lambdoid suture) என்று பெயர். காதென்பின் மேற்புறத்தைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் இன்னுமொரு ரேகைக்கு சகளரேகை (ஸ்க்வேமஸ் சூசர் squamous suture) என்று பெயர்.

குழந்தைகளுக்கு உச்சியிலெண்டி ரண்டு ரத்திரங்களுண்டு. அவைகட்குப் பிரமரந்திரம் அல்லது உச்சித்துஷாரம் என்று சொல்வார்கள். சிரசெலும்புகள் பிரத்தியேகப் பட்டிருக்கிறமாதலால் பிரசவகாலத்திற் குறிவினிடக்குழி

2-ம் படம்.



2-ம் படம்—1, நெற்றியென்பு. 2, பித்திகையென்பு. 3, கேளாவென்பு. 4, பிடரென்பு. 5, நாகியென்பு. 6, கவுளென்பு. 7, மேற்றூடையென்பு. 8, குவளையென்பு. 9, கீழ்த்தாடையென்பு. இப்படத்தின் எலும்புகளும், அவற்றின் கருக்கு விளிம்புகளும் ஒன்றுக்கொன்று சந்திக்கும் அளவற்றவிட்டிருக்கின்றன.—கீழ்க்கண்ட.

யில் சிசு அந்தந்த ஸ்தானத்துக்குத்தக்கபடி அமையும் வண்ணம் தலையோடுகளொன்றின்மேலொன்றேறி சிசு சிவத்து துவாரத்தின்வழியே வெளிவர உபயோகப்படுகிறது. சிசு தாயின் கருப்பையிலிருக்கிறபோது இவைகளின் வழியாயாகாரம் உள்நுக்கிற்குகிறதென்றெண்ணுவது சரியல்ல.

தலையெலும்புகளாவன:—1. நெற்றியென்பு. 2. பித்திகையென்பு. 3. கேளாவென்பு. 4. பிடரென்பு. 5. நாகியென்பு. 6. கவுளென்பு. 7. மேற்றூடையென்பு. 8. குவளையென்பு. 9. கீழ்த்தாடையென்பு என்பவைகளாகும்.

நெற்றியென்பு—கபாலத்தின் முன்புறத்திலிருக்குமெலும்புக்கு நெற்றியெலும்பென்று பெயர். இது இரண்டு துண்டுகளாயிருப்பதுமுண்டு. நெற்றியினிருப்புறமிருக்கும்

மேடுகளுக்கு நெற்றிமேடுகளென்றும், இவைகளுக்கிடையிலே நாகிக்கு ஊர்த்தமுகமாயிருப்பதற்கு நாகிகாபிடமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். நாகிகாபிடத்திற்குள் அறைகளாயிருக்கும். நெற்றியென்புக்கடியில் பின்னுக்குப் பிதுங்கி சன்னமாயும் தட்டையாயுமிருக்கும் பிதுக்கங்களிரண்டுக்கும் கண்கூட்டுத் தட்டையெலும்புகளென்று பெயர். நெற்றியென்புக்குட்புறத்தின் மத்தியத்தில் ஓர் நீண்ட வரம்பிருக்கின்றது. அதில் முனையின் சவ்வு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்.

பித்திகையென்பு — கபாலத்தில் பக்கத்துக்கொன்றாக இரண்டு பித்திகையென்புகளிருக்கின்றன. இவை உச்சந்தலையிற் சேர்ந்திருக்கும். எலும்பின் வெளிப்புறம் குவிப்பாயிருக்கும். அதற்கு பித்திகை மேடு (பெரைடல் எமினென்ஸ் parietal eminence) என்று பெயர். எலும்பினகம்பள்ளமா யதிற் கால்வாய்கள் காணுகின்றன. அவைகளில் நாடி நரம்புகளோடுகின்றன.

கேளாவென்பு (டெம்பொரல் போன் temporal bone) — இதற்கு கன்னப்பொரி யெலும்பு, அள்ளென்பு, கா தெலும்பு என்றும் சொல்லலாம்.

பக்கத்துக் கொன்றாயிரண்டு காதென்புகளுண்டு. அவையொவ்வொன்றிலும் முன்று பிரிவுகளிருக்கின்றன. சன்னமாய் முன்புறமிருப்பதற்குச் சுகளம் (ஸ்க்வேமஸ் squamous) என்றும், முலைக்காம்புருவாய் பின்னிருப்பதற்கு நகிலம் (மாஸ்டாய்டு mastoid) என்றும் பெயர். மற்றொன்று மிக்க உறுதியாயிருக்கும். முச்சுவுக்கம்போலமிருக்கும். அதற்கு பாரையென்பென்று பெயர் (பிட்ரஸ் petrous). சுகளத்தடியிலிருந்து முன்னுக்குச்சென்று கன்னத்தெலும்போடு கூடியிருக்கிற மெல்லிய பிதுக்கத்துக்குச் செவிப்பிதுக்கு (ஜைகோமா zygoma) என்று சொல்லலாம்.

நகிலப்பிதுக்கத்துக்கு முன்பாக ஓர் துவாரங்காணும். அதே, கேள்விப்புறத்துவாரமாகும். ஏனெனின

லதன்வழியாகத்தான் சப்தம் செவியுட் செல்லுகின்றது. பாறைப்பிதுக்கமோ மிகவுமழுத்தமாய், குவிந்த வுருவுட னுள்ளுக்குப் பிழுவேசித்திருக்கும். இதற்கு முன்பின் அடியென மூன்றுபக்கங்களிருக்கின்றன. பின்புக்கத்திலோர் துவாரமிருக்கிறது. அதுதான் கேள்வியுள் துவாரமாம். அதன் வழியாகவே கேள்வி நரம்பு செவியுட் பிரவேசிக்கின்றது. பாறைக்கடியி லெழுத்தாணிபோலிண்டு கூர்மையாயொரு முளையுண்டு. அதற் கெழுத்தாணி முளை (ஸ்டைலாயிட் பிரோஸஸ் styloid process) யென்று சொல்லலாம். அம்முளைக்கு முனி ஓர் பள்ளமிருக்கிறது. அதற்குக்கிடங்குபள்ளம் (கிளினாயிட் காவிடி glenoid cavity) எனலாம். அதிற் கீழ்த்தாடையெலும்பின் மூட்டு முடி பொருந்தியிருக்கும். எழுத்தாணி முளை துணிநிலோர் வட்டத்துவாரமுண்டு. அதின் வழியாகத்தான் கண்ட நாடியுள்ளே பிரவேசிக்கின்றது. தவிர கேநாரவென்பில் சகையொட்ட மேடுபள்ளங்களும் நரம்புகளோட துவாரங்களுமிருக்கின்றன.

பிடரென்பு—(ஆக்ஸிடிடல் போன் occi-pital bone) இந்த யெலும்பு தலையின் பின்புறத்திலிருக்கிறது. இதில் அண்ட வடிவாகப் பெரியதுவாரமொன்றுண்டு. அதற்குக் கபர்ல மூலதுவாரம் (பொரோமன் மர்க்னம் foramen magnum) எனலாம். அதனுடே முளைக்கொடி வெளியாகின்றது. தவிர நரம்புகளும் வெளியாகும் வழியதுவே யாம். இரத்தக்கால்களு முள்ளுக்குச் செல்வதன்வழியேதான். அத்துவாரத்திருபுறத்திலும் பிதுக்கங்களுண்டு. அவைகட்கு மூட்டு முடிகள் (காண்டைல்ஸ் condyles) எனலாம். அவை சேடனென்புடன் சேர்ந்து தலையை முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் அசையச் செய்யும். கபால மூலத்துவாரத்திற்கு முன்பாக ஒரு தளமான பிதுக்கமுண்டு. அதற்கடிவாரச்செயல் (பேஸிலார் புரோஸஸ் basilar process) எனலாம். அதனுட்புறங் குடைவாயிருக்கும். அக்குடைவில் முள்ளந்தண்டுக் கொடிச்சிகர

மடங்கியிருக்கின்றது. பிடரென்பு உட்புறத்தில் குலார்த்தம்போல் ஓர் வரம்பிருக்கின்றது. அதிற்றான் மூளையின் சவ்வொட்டிக்கொண்டிருக்கும்.

நாசியென்புகள்—மூக்கெலும்புகள் (நேசல் போன்ஸ் nasal-bones) இவையிரண்டு. இவ்விரண்டு மூக்கின் மேற்புறமாயமைந்திருக்கின்றன.

கவுளென்புகள் (மேலார் போன்ஸ் malar bones)—இவை தட்டையாயும் உறுதியாயுமிருக்கும். கன்னமேடு கலையுண்டாக்கி கட்டுழிகளினேற்பாட்டிற் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன.

மேற்றுடையென்புகள் (சுபிரியர் மாக்ஸிலேரி போன்ஸ் superior maxillary bones)—இவை மேற்றுடையிலிரண்டாம். இவை சேர்ந்தே கட்டுழி, மூக்கு இவைகளினேற்பாட்டிற் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. எனும்பொவ்வொன்றிலுமொரு குழியிருக்கின்றது. அதற்கு கெபியமென்று பெயர். எனும்புக்கடியிலு மென்குழிகள் காணும். அவைகளொவ்வொன்றும் பற்களமைவதற்குதவுகின்றன.

குவளையென்பிரண்டாகும்—இவ்விரண்டும் கட்டுழிக் ககத்தில் முன்பாகவருகின்றன. எனும்பின் வெளிப்புறத்தில் நீண்ட பள்ளங்காணும். அதிற் கண்ணீர்ச் சவ்வுப்பையமைந்திருக்கும்.


அண்ணவென்பிரண்டாகும்—அவைகள் மூக்கின் பின்புறத்திலிருக்கின்றன. அண்ணங் கட்டுழி மூக்கின் பக்கங்களாகிய இவைகளினேற்பாட்டி லமைந்திருக்கின்றன.

கலப்பையென்பு—நாசிமத்தியில் சன்னமாய் தட்டையாய் நாற்சதுரமாயிருக்குமெலும்பாகும். இது நாசித்துவாரங்களை இரண்டாய்ப் பிரிக்கின்றது.

கீழ்த்தாடையென்பு—இம் மோவாய்க்கட்டையெலும்பு விற்போல் வளைந்திருக்கும். இதற் பற்கள் புதைய 16 குழிகளிருக்கின்றன. முன்னுக்குக் கொஞ்சம் பிதுக்கியிருக்கும் பாகத்திற்கு மோவாய்க்கட்டையென்றும், பின்புறம்

தட்டையாய் நர்ச்சுரமாய் வளர்ந்திருப்பதற்குக் கிளை யென்றும் பெயர். மேற்புறத்திற் கூர்மையாயிருப்பதற்கு கிரீடபாகமென்றும் மழுமழவென்றுருண்டு நீண்டிருப்ப வைகட்டு மூட்டு முடிபாகங்களென்றும், இவை மத்தியிலு ள்ள பள்ளத்திற்கு லகரபள்ளமென்றுஞ் சொல்லலாம்.

3-ம் படம்.



3-ம் படம்.—சூரபாண தேகத்திலே ரெஞ்சுறையிலும் இடுப்பிலு முள்ள எலும்புகளுக்கும் விதம்.—கிரீன்.

முண்டவென்புகள்.

முண்டவென்புகளெவையெனில், முள்ளந் தண்டி லுள்ள முள்ளெலும்புகளும், விலாவின் பழுவெலும்புக ளும், நெஞ்செலும்பும், கூபகவெலும்புகளுமேயாம். ஆயி னும் நாவடியிலிருக்குந் தலுவென்பும் இப்பகுதியிற்ருன் சேரும்.

சிரசுக்கடியிலிருந்து கீழுக்கிறங்குகிற துண்டெலும்பு களின் கோர்வைக்கு முள்ளந்தண்டென்று பெயர். இதி டிருக்கு மெலும்பொவ்வொன்றிற்கும் முள்ளெலும்பு என்று பெயர். முள்ளெலும்புகளினிடையில் குறுத் தெலும்பிருக்கின்றது. அதற்கு முள்ளெலும்பு மத் திய முருந்தென்று பெயர். இவைகள் முள்ளெலும்பு

களை யொன்றோடொன்று சேர்த்துப் பொருந்தும் படி அவை பெற்றிருக்கிறபடியால் அவைகளை நாலு பக் கங்களிலும் சுலபமாய் அசைவிக்கும்படி செய்கின்றன. முள்ளெலும்பொவ்வொன்றிலும் ஒரு பெரிய துவார முண்டு. எல்லா முள்ளெலும்புகளினுடைய இப்பெரிய துவாரங்கள் ஒன்றோடொன்று நேராய் இசைந்திருப்பதி னால் அவைகளுக்கு நடுவே முள்ளந்தண்டு நெடுக வோர் துவார முண்டாகின்றது. அதிலொரு கொடி யோடி யிருக்கின்றது. முள்ளந்தண்டு வலதுபக்கம் இடதுபக்க மிவைகளிற் சாய்வற்றிருந்தபோதிலும் முன்று வளைவுக் ளுடனிருக்கின்றது. கழுத்திலு மிடுப்பிலுமிருக்கிற வளை வுகள் முன்னுக்கு வளைந்து பின்னுக்குக் கவிழ்ந்திருக் கும். முதுகிலிருப்பதோ முன்னுக்குக் கவிழ்ந்து பின் னுக்கு வளைந்திருக்கும். மூளை குறுங்கி அதிரவொட்டாம லின்ற வளைவுக ளோர்விதமாய்த் தடுக்கும்.

முள்ளெலும்புகளை மூன்றுபிரிவாகப் பிரித்திருக்கி றார்கள். கழுத்து, முதுகு, இடுப்பு ஆகிய இவைகளைச் சேர்ந்தனவென்றும்.

கழுத்து முள்ளெலும்புகள் 7. முதுகு முள்ளெலும் புகள் 12. இடுப்பு முள்ளெலும்புகள் 5 ஆகும்.

கழுத்திலிருக்கும் முதல் முள்ளெலும்புக்கு சேட னென்பென்று பெயர் சொன்னோம். அதற்கடியிலிருக்கு மிரண்டாம் முள்ளெலும்புக்கு உருவாணியெனலாம்.

கூபகமென்னும் எலும்புக்கூடு முள்ளந்தண்டுக்கடி யில் முக்கோண ரூபமாயிருக்கும். இதற்குக் குண்டியென் பென்று சொல்வார்கள். இது நாவெலும்புகள் சேர்வ தினாலாகின்றது. குழந்தைகளில் இவ்வெலும்புகள் பல வாகி முருந்துகளாலிணைக்கப்பட்டிருக்கும். வளரும் பொழுதிவைகள் கூடி யொன்றாகப் பொருந்தும். கூப கத்தின் முன்பக்கத்துக்கு மேலாக ஒரு முளை யிருக் கின்றது. அம்முளை யுதிகமாய்ப் பிதுங்கியிருந்தால் பிரச வகாலத்திற் சிசுவின் தலை கீழுக்கிறங்க இடமில்லாமல்

சிக்லிக்கொண்டு தாயாருக்கு வேதனையுண்டாக்கும். கூபகம் முள்ளந்தண்டைத் தாங்கிக்கொண்டு தொடை யெலும்புகளிலே பொருந்தியிருக்கின்றது.

கூபகத்தின் கீழ் மூக்குப்போல வளைந்திருக்கு மெலும்புக்கு குயில் மூக்கெலும்பென்று பெயர் வழங்கலாம்.

பழுவுவெண்பு முண்டத்தின் பக்கத்திற்கு 12 ஆக இருக்கின்றன. இவைகளெல்லாம் முள்ளந்தண்டினைச் சந்திருக்கின்றன. பழுவின் மேற்புறமுள்ள 7 எலும்புகள் நெஞ்செலும்புடனே முருந்தினுவினைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அவையடியிலிருக்கும் 5 பழுக்கள் நெஞ்சென்புடனினையாமலிருக்கின்றன. இவைகளின் மேற்புறம் மூன்று பழுக்கள் முருந்தினுவினைக்கப்பட்டிருக்கும். அடியிலிருக்குமிரண்டு பழுக்கள் தனித்தனியாயிருக்கும்.

முள்ளந்தண்டு, பழு, நெஞ்சென்பு இவைகள்கூடில்தாலாகும். நெஞ்சறைக்குள் துரையீரலும் இரத்தாசயமும், நாடி நாளங்களுமிருக்கின்றன. முண்டத்தின் மேல்பாகமாகிய நெஞ்சறை அடி விசாவித்து துனியொடுங்கி பொருட்டுவடிவாயிருக்கின்றது.

உற்காயவெண்புகள்.

கையிலிருக்கும் எலும்புகளுக்கு உற்காயவென்பென்று பெயர். அவைகளை விவரித்துக் குறிப்பதற்காக, தோள், புயம், முன்கையென்ப பகுக்கலாம்.

தோளிலே காரையென்பு, பட்டையென்பென விசாரிப்பதுருக்கின்றன. காரையென்புக்கு புரையென்பென்பு ஒரு சொல்லலாம். அதன் ஒரு தலைப்பு நெஞ்சென்பிலும் மற்றது தோட்பட்டையிலுந் தொடுத்திருக்கின்றது. பட்டையென்பென்பது நெஞ்சறையின்மேல் பின்பக்கமாக முக்கோணவடிவமாயுள்ள வோர் தகட்டெலும்பு.


புயத்திலேயிருக்கும் நீண்ட தனிமை யெலும்புக்குப் புயவென்பு என்று பெயர்.

முன்கையிலே இரண்டெலும்புகளிருக்கின்றன. அவைகளில் பெருவிரம்பக்கமாய் புறத்திலிருக்கும் எலும்பு

ம்புக்கு ஆரையென்பென்றும், மற்றது அகத்திலிருப்பதற்கு இரத்தினி யென்றும் பெயர்.

4-ம் படம்.

5-ம் படம்.




4-ம் படம்.—புயவென்பு: 1, அதின் காண்டம். 2, அதின் குமிழ். 3, 4, பேசிகள் தொடுத்திருக்கும் பூசிகள். 5, புறப்பக்கம் என்னும் முனை. 6, அகப்பக்கம். 7, இரத்தினி யென்பபாடே பொருந்தும் முகப்பு.—கீழின்.

5-ம் படம்.—முன்கையிலுள்ள ஆரையென்பும், இரத்தினியென்பும்: 1, இரத்தினியின் காண்டம். 2, ஆரையின் காண்டம். 3, இரத்தினி ஆரையென்புகளின்மேலத்தம் பொருந்துவது. 4, புயவென்போடே பொருந்தும் பள்ளம். 5, முழங்கை கனியாகிய சுரப்பரமுனை. 6, சவ்விஞல் அடைபட்டிருக்கும் எலும்புக்கிடையென. 7, இரத்தினியின் லேகினிமுனை. 8, கிணத்த எலும்புகளோடு பொருந்தும் முகப்பு. 9, ஆரையின் லேகினிமுனை.—கீழின்.

கையை கைக்குளசென்றும் கைவிரலென்றும் பிரிக்கலாம். கைக்குளசிலே எட்டுச் சிறிய வெலும்புகளிருக்கின்றன. மணிக்கட்டிலிருந்து உள்ளங்கை வரையிலேவை குறுக்கில் இருமிறையாயிருக்கின்றன.

ருட்டு காலையும், தொடை, கால், பாதம் என மூன்று பகுப்புகளாகப் பிரித்துப் பேசுவது நலம்.

10-ம் படம்.




10-ம் படம்.—பாத எலும்புகளின் மேற்பக்கம்: 1, காற்றுகளில் சேரும் சாரியென்பின் பெருந்திடம். 2, சாரியென்பின் காண்டம். 3, குதியென்பு. 4, கவ்வென்பு. 5, 6, 7, ஆப்பென்புகள். 8, கனவென்பு. 9, பாகுற்பகவென்புகள். 10, பெருவிரலின் முதலெலும்பு. 11, அதின் இரண்டாம் எலும்பு. 12, 13, 14, கால்விரலின் எலும்புகளின் நிரைகள்.—கிரீன்.

தொடையில் ஓர் எலும்புதானிருக்கின்றது. அதற்குத் தொடையென்பென்று பெயர். இது தேகத்திலுள்ள மற்றெல்லாவெலும்புகளையும்விட நீளமாயிருக்கும். இது ஊடைய குமிழ் பந்துபோல வடிவடையதாயிருக்கின்றது. இந்த எலும்பு அதற்குமேலிருக்கு முண்டம் தலை முதலியவைகளின் பாரத்தைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது.

முழங்காலில் ஒரு சிறிய வெலும்பிருக்கின்றது. அதற்கு முழந்தாட்டில் என்று பெயர். முழந்தாளுக்குக் கீழ் கணுக்கால்வரையிலுமுள்ள காலில் இரண்டெலும்புகளிருக்கின்றன. அவைகளிற் பெரியதாயிருப்பதற்கு நளக


மென்று பெயர் சிறியதாயிருப்பதற்கு சரவென்பென்று பெயர். சரவென்பு நளகத்திற்கு சற்று பின்புறத்திலிருக்கின்றது.

11-ம் படம்.



11-ம் படம்.—பெருவிரலின் அணிதலுங்கி, குதிக்கிடாக வலது பாத எலும்புகளின் அகப்பக்கத்தின் பாவனை: 1, நளகவென்பின் கீழ் அந்தம். 2, சாரியென்பு. 3, குதியென்பு. 4, கவ்வென்பு. 5, ஆப்பென்பு. 6, பாகுற்பகவென்பு. 7, 8, பெருவிரலின் எலும்புகள். இவ்வெலும்புகள் இணைந்திருக்கிற விதத்தினாலும், பாதத்தின் விஸ்தரிப்பினாலும் பாதம் பெருபெலும்பு இவ்விடங்களிலுள்ளது.—கிரீன்.

12-ம் படம்.



12-ம் படம்.—பொருத்தியெயுள்ள எலும்பு, முருந்து, நித்தாளில்லிகை அடித்திருக்கும் விதம்: 1, 1, பொருந்தும் எலும்பு இரண்டின் தலைப்புகள். 2, 2, அத்தலைப்புகளை மூடும் முருந்து. 3, 3, 3, 3, நித்தாளில்லிகை. இது முருந்தை மூடிமடக்கி ஒன்றிவிடுகின்றது. புவிக்கோவை வரிதான் அதின் அடுக்கைக் காட்டுகின்றது.—கிரீன்.


பாதத்திலே 26 எலும்புகளிருக்கின்றன. இவைகள் பின்பாதத்தில் 7-ம் நடுப்பாதத்தில் 5-ம் முனிப்பாதத்திலிருக்கும் விரலெலும்புகள் 14-மாம். இவையல்லாமல் விர

ற்சில்லிகள் 8-ம் இன்னும் சில வன்னகைகளில் 8 முதல் 12 வரை சிறு சில்லெலும்புகளுமிருக்கின்றன.

காற்குளசில் கணுக்கால் முதல் விரல்வரையில் சாரியென்பு, பாகுற்பகவென்புகள் ஆகிய இவைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாகவிருக்கின்றன. கால் விரல்களிலும் எலும்பு நிரைகள் கைவிரல்மாதிரியே யிருக்கின்றன.

காற்குளசிலேலும்புகள் மேற்பக்கம் குவிவாயும் கீழ்ப்பக்கம் கவிவாயும் வில்வடிவமா யிசைந்திருப்பதினால்தாமதிக பெலனுமிசிவுமுள்ளதாகும்.

13-ம் படம்.



13-ம் படம்.—மேல்வாய் ஒரு பக்கத்திலும் கீழ்வாய் ஒரு பக்கத்திலும் உள்ள பற்கள் எட்டு.—கீரீன்

பற்கள்.

ஒரு பல்லுக்கு, பற்சிலாம் (கிவவுன் crown), கழுத்து (கெக் neck), வேர் (பாங்கு fang), அல்லது (ரூட் root) என்னும் பல பாகங்களுண்டென்று சொல்லலாம். ஈரின்மட்டத்திற்கு வெளியே புடைத்து வந்திருக்கும் பாகம் பற்சிகரமாம். அதற்கடியிலிருக்குஞ் சுருங்கிய ஸ்தானத்துக்குக் கழுத்தென்று பெயர். இதைச்சுற்றிலும் ஈரின் ஓரங்களிருக்கின்றன. இதற்கடியிலிருக்கும் பற்

அத்தி.]

பற்கள்.

51

குழி யுட்பாகத்துக்கு தந்தமூலமாகிய வேரென்று பெயர். ஒரு பல்லின்மத்தியில் நீளத்திற் பிளந்துபார்த்தால் அதில் தந்தம்போல் கடினமானவஸ்து வென்று காணுகிறது. அதற்குத் தந்தம் (ஐவரி ivory) என்று பெயர். இக்கடினமான வஸ்துவின் மத்தியில் ஒரு பள்ளம் குழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பள்ளம் பல்லின்வடிவை உடைத்தானது. இதற்குப் பல்லின் சவ்வுப்பள்ளம் அல்லது வழக்கைப்பள்ளம் (பல்ப் காவிடி pulp cavity) என்று பெயர். இப்பள்ளத்தில் தசைநார்களும், இரத்தநார்களும், நரம்புகளுமடங்கிய சவ்வுகளிருக்கின்றன. இதற்கு பல்வழக்கை என்று பெயர் (நீத் பல்ப் tooth pulp).

இச்சவ்வுக்கு இந்திரிய ஞான உற்பத்தியெய்யும் சக்தியுண்டு. தந்தமூல முனையில் ஒரு துவாரமுண்டு. அது வழியாய் நரம்புகளும் இரத்தநார்களும் பல்லுக்குட் பிரவேசிக்கின்றன. ஈரின்மட்டத்துக்குமேல் வந்திருக்கும் பற்சிகரத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு உறுதியாயும் வெள்ளையாயுமிருக்கிற பதார்த்தத்துக்கு வைரம் (enamel) என்று பெயர். ஈரின்மட்டத்துக்கடியில் பல்லின்மேல் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் வஸ்து எலும்பினோடாகுஞ் சாந்து (cement) என்று பெயர்.

பல்லின் கழுத்தண்டை வரைமுஞ்சாந்தும் ஒன்றையொன்று சந்திக்கிறது. தந்தம் என்னும் ஐவரியானது பூதிக கூட்டுப்பாட்டில் எலும்பை அனுசரித்திருக்கின்றது. ஆனாலில் இந்திரிய வஸ்து குறையும். தூரில் இருபத்தெட்டுப் பாகந்தான் இந்திரியவஸ்துவாயும் மற்ற எழுபத்திரண்டுபாகம் மண்வஸ்துவாகவுமிருக்கின்றது. இதிலிருக்குமிந்திரிய வஸ்துஎலும்பினிந்திரியவஸ்துப்போலவே வேகவைப்பதினால் செலிதப் பாகாவினிடம்.

இதின் மண்வஸ்துவில் நிபாக்னிகலந்த கண்ணாம்பு சத்தும் கொஞ்சமளவு சுத்தாக்கரிச் சத்தும் நிபாக்னிகலந்த கார்தமண்சத்துமகப்படுமீ. பூதக்கண்ணாடியின் உதவியினால் பார்த்தாற் றந்தத்திலகித் துட்பமான அகேகங் குழ

ல்களுடையதாய்க்காணும். இக்குழல்களினுட்பக்க துணி பல்ப்காவிடியென்னும் தந்தவழங்கைக்குழியில் போய்ச் சேருகிறது. வெளிப்பக்க துணி விரைமச்சாந்து இவைகளைத் தொக்கியிருக்கிறது. சிலசமயங்களில் இவைகளினுள்ளே யுங் கொஞ்சந்தூரம் ஊடுருவியுயிருக்கின்றது. தந்தத்தின் உட்குழல்கள் ஓங்குலத்தில் நாலாயிரத்து ஐந்தாறுபா கத்தில் ஒருபாகம் குறுக்களவுள்ளதாயிருக்கிறது. இவை களினுள் தந்தவழங்கையினின்று அதிகநுட்பமான பாக ங்கள் புகுந்திருக்கிறபடியால் இவைகட்குக் கூசுந்தன்மை யிருக்கின்றன. இவைகளே பல்வின் போஷிப்புக்கு ஆதா ரமாயிருக்கிறவைகள்.

பல்லில் அதிக விரைம்பொருந்தி மிகவும் கடினமான பாகமானது விரைம் என்று சொல்லிய பாகமாகும். புதி க்கூட்டுப்பாட்டில் இதுவும் தந்தம், யென்பு இவைகள் போலவே அந்நிரியவஸ்துக்கள் அதிகமுள்ளதாயும், இந் திரிய வஸ்துக்கள் அதிக சொற்பமாயுள்ளதாயிருக்கிறது. இதுவே தேகத்திலுள்ளவைகளிலெல்லான்றையும் விட அதிக கடினமானது. இவ்விரைத்திற்கும் சுண்ணாம்பு தன் மையடைந்த ஒரு சவ்வு கவசமாசயிருக்கிறது. அதற்கு விரை கவசம் என்று சொல்லுவார்கள். (cuticle of the enamel)

சாந்து என்பது ஏறக்குறைய எலும்பைப்போன்ற தையாகும்.

பல் வளர்ச்சி.

வாயினுட்பக்கத்தில் நாடையினோரத்தின் மேற்படிந் திருக்கும் பரிஸ்தாபிதம் முதலிறந்திந்து அதற்கடியிலிருக் கும் தசையில் ஆழமற்ற பள்ளமுண்டாக்கும். தடித்த பரிஸ்தாபிதத்தினடிப்பாகம் உட்பக்கமாய் வளரும். அப் படி வளருவதினால் அதற்கடியிலிருக்கும் சவ்வினுட்புகும். அடியிலிருந்து வளர்ந்துவரும் மேடிட்ட வஸ்துக்கள் (papilla) இதிற்சந்தித்து குழியையுண்டாக்கும். மேடி போல வளருவது வளரவளர தடித்த பரிஸ்தாபிதத்துட்

சவ்வினுள் ஊடுறப்புகுவதினால் நாளளவில் தந்தமேட்டு க்கு சவ்வொரு குல்லாய்போலாகும். பிறகு இளம்பல் தந்தப்பையில் முழுவதும் அடைபடும்.

தந்தமேடுகளும் அதைச்சுற்றியிருக்கும் தந்தப்பை யும் இரத்தநார்களால் போஷிக்கப்படுகின்றன. இப்படி யுற்பவிக்கும் விரைமோ பரிஸ்தாபிதத்தினின்றும் பிரிந்தி ருந்தபோதிலும் அதைச்சேர்ந்த வஸ்துவென்று இரத்த நார்த் தன்மையினாலேயே யறியலாம்.

தந்தமேடானது இனிமேல் முளைத்துவரும் பல்வினு டைய பற்சிகர உருவமாயமைந்து தந்தவஸ்துவின் குல் லாயும் அதன்மேற்படியும், அது ஓரத்தில் புதிய வஸ்துக் கள் சேர்ந்து நீளமாயும், உட்பக்கத்தில் புதிய வஸ்துக்கள் சேர்ந்து பருமனாயுமாகும். தந்தமேட்டின் சத்து அற்றுப் புறமுள்ளவை வளரும்பொழுது, இதுமாதிரியும் நாளள வில் கரைந்து கடைசியாக சிலபாகம் நன்றாய் வளர்ந்தப ல்வின் தந்தவழங்கையாக நின்றுபோய்விடுகிறது. தந்த குல்லாய்க்கித்திருக்கும் விரை சத்துச் சுண்ணாம்பு அதிக ரிப்பதினால் விரைமாக மாறிவிடுகிறது.

இந்தப்பிரகாரம் பால் பற்கள் என்னும் முதற்பற்க ளின் வரிசை யுற்பத்தியாகின்றன. ஒவ்வொருபல்லும் கிரமேண விருத்தியடைந்து அதை முடிக்கொண்டிருக் கும் பையைமுட்டி அப்படி முட்டுவதினால் அப்பையின் சத்தை தனக்குள் ஐக்கியப்படுத்திக்கொண்டு பல் வெளிப் படுகிறது. அதாவது பல் முளைக்கின்றது. பல் மேலேமுளை த்துப் பெரிதாகும்பொழுது பல்லின்வேறும் கிரமேண சுண்ணாம்பேறி வருகின்றது. "தந்தப்பையின்" உட்புறத்தி லிருந்து சாந்து என்பதும் அதன்மேல் படிந்துவிடுகிறது.

முதல்முதல் முளைக்கிற பற்களுக்கு பால் பற்கள் (milk teeth) என்று பெயர். அவைகள் சொ ர்பகாலந்தானிருக்கும். அவைகள் விழுந்து இரண்டாந்த ரம் முளைக்கிறவைகளுக்கு ஸ்திரீபற்கள் (பெர்மனெண்ட் டித் permanent teeth) என்று பெயர். இந்தப் பற்கள்

அடியிலிருந்து மேலே உந்திக்கொண்டு வரும்பொழுது ஒவ்வொரு பல்வினுடைய வேரையும் தங்களுக்குள் ஐக்கியப்படுத்திக்கொள்ளுகின்றன. கடைசியில் மாதிரம் கொஞ்சஞ் சக்கையாக நிற்கும். ஸ்திரமான பற்கள் வெளிக்கிளம்புவதற்காக இச்சக்கையும் உதிர்த்துபோய்விடும்.

பால் பற்கள் ஒவ்வொரு தாடையிலும் பத்து இருக்கின்றன. அவைகளாவன: நாலு முற்பற்கள், இரண்டு கோரைப்பற்கள், நாலு கடைவாய்ப்பற்கள். இவைகளிருக்கும்ிடத்தில் பத்து ஸ்திரபற்கள் முளைக்கின்றன. இவைகளில் ஒவ்வொன்றும் தனக்கு முந்தியிருந்த பால் பல்வினுடைய பையின் சேஷப்பையிலிருந்து முளைக்கிறதென்று சொல்லலாம். அதற்கு (காவிடி ஆப் ரிசர்வ் cavity of reserve) என்று பெயர். ஆனால் ஸ்திரபற்கள் எண்ணிக்கையில் ஒவ்வொரு தாடையிலும் மூன்று அதிகமாய் வளருவதினால் பதினாறு ஆகின்றன.

பற்கள் ஒரே நிதானமாய் முளைக்கிறதில்லை. சிலருக்கு சீக்கிரத்திலும் சிலருக்கு தாமசமாயும் முளைக்கும். பால் பற்களும் ஸ்திரபற்களும் முளைக்குங் காலக்கிரமம் பின்வருமாறு காண்க. ஆனால் இவ்விருவகை பற்களிலும் மேற்றாடையில் ஒவ்வொரு பல்லும் அதற்கு ஜவாபாயிருக்கும் கீழ்த்தாடைப்புல் முளைத்தபிறகே முளைக்கும்.

பால் பற்கள் முளைத்தும் காலக்கிரமம்.

7-ம் மாதம் மத்திய முற்பற்கள் 2 முளைக்கும்.

9-ம் மாதம் பக்கத்து முற்பற்கள் 2 முளைக்கும்.

12-ம் மாதம் கடைவாய்ச் சிறியமுற்பற்கள் முளைக்கும்.

18-ம் மாதம் கோரைப்பற்கள் முளைக்கும்.

24-ம் மாதம் கடைவாய்ச் சிறியபற்கள் 2 முளைக்கும்.

ஸ்திரபற்கள் முளைக்கிற காலக்கிரமம்.

6-ம் வயதில் கடைவாய்ப் பெரிய முற்பற்கள் முளைக்கும்.

7-ம் வயதில் மத்தியத்துள்ள பற்கள் 2 முளைக்கும்.

8-ம் வயதில் பக்கத்து முற்பற்கள் 2 முளைக்கும்.

9-ம் வயதில் கடைவாய்ச் சிறியமுற்பற்கள் முளைக்கும்.

11 முதல் 12-ம் வயதில் கோரைப்பற்கள் முளைக்கும்.

12 முதல் 13-ம் வயதில் கடைவாயிற் பெரிய இரண்டாவது பற்கள் முளைக்கும்.

17 முதல் 25-ம் வயதுக்குள் கடைவாயில் கடைப்பற்கள் முளைக்கும்.

மேற்கூறியபடி பல்முளைக்கும் காலங்கள் உத்தேசத்தின்மேல் சொல்லப்பட்டவையே. சில குழந்தைகளுக்கு முதற்பற்கள் 6 மாதத்திலேயே புறப்படும் சிலருக்கு 12 மாதமானாலுமாகும். அநேகமாய் எல்லாருக்கும் கீழ்த்தாடை மத்திய முற்பற்கள் இரண்டு முதலில் முளைக்கும். இதற்கு சிலநாளைக்குப்பிறகு மேற்றாடை நாலுமுற்பற்கள் முளைக்கும். இதன்பிறகு கீழ்த்தாடை பக்கத்துமுற்பற்கள் இரண்டு முளைக்கும். இந்தப்பிரகாரமே இரண்டு வயதாவதற்குள் மேற்சொல்லியபடி பால் பற்கள் எல்லாம் முளைக்கும். பால் பற்கள் இரண்டுவயதுமுதல் ஐந்தரை வயதுவரையில் உபயோகத்திலிருக்கிறது. இந்தக்காலத்தில் முதலில் ஸ்திரக்கடைவாய் பற்கள் நான்கும் பாற்கடைவாய் பற்களின் பின்னே தோற்றுகின்றன. கொஞ்சகாலம் குழந்தைகளுக்கு நான்கு ஸ்திரபற்களும் இருபது பால் பற்களும் இருக்கின்றன.

ஐந்துவயது முதற்கொண்டு முதற் பாற்பல் விழும்வரையில் குழந்தைக்கு நாற்பத்தெட்டு பற்களிருக்கின்றன. அவை இருபது பால் பற்களும் இருபத்தெட்டு ஸ்திரபற்களும்.

6-ம் அத்தியாயம்.

இரத்தம்.

உயிருடனிருக்குந் தேகத்திலிருந்து இரத்தம் வெளியே வரும்பொழுது, அது, கண்ணுக்குக் கொஞ்சம் கட்டியானதும் பளுவானதுமான திரவமாகக் காணுகி

றதும்ல்லாமல், நாடிகளிலிருந்து வரும்பொழுது சிவந்த வருணமுள்ளதாயும், நாளங்களிலிருந்து வரும்பொழுது கருமை நிறமுள்ளதாயும் தோற்றுகிறது. வெறுங் கண்ணுக்கிரத்த முழுவதும் வருணமுடையதாகக் காணப்பட்ட போதிலும் பூதக்கண்ணாடியினால் பார்க்கும்பொழுது அது வருணமற்ற திரவமாகவே காணும். ஆலைதினுள் வருணங்களையுடைய சிறிய சாலங்கள் காணப்படும். அவைகளுக்குக் குறுகடம் (கார்பஸில்ஸ் corpuscles) என்று பெயர். இந்தச் சாலங்களைக் கூட்டமாயிருக்கும்பொழுது பார்த்தால் சிவந்த நிறமாயிருக்கிறபடியால், இவைகளே வெறுங் கண்ணுக்கு இரத்தமுழுவதும் வருணமுடையதுபோலக் காட்டுவதற்காஸ்பதமாயிருக்கின்றன. இரத்தத்தின் வருணமற்ற திரவபாகத்திற்கு ரத்தநீர் (லிகர் ஸரன்சுவினிஸ் liquor sanguinis) என்றும், வருணமுடைய பைகளுக்கு குருதிச்சாலங்களென்றும் (பிளட் செல்லஸ் blood cells), குருதிக் குறுகடம் (பிளட் கார்பஸில்ஸ் blood corpuscles) என்றும் பெயர். மிகவும் இலேசான படையிற் பார்த்தபோதிலும் இரத்தம் காட்சிக்கு மந்தமானதாகக் காணும். இரத்த நீரினின்றி குறுகடத்திலிருக்கும் வருணத்தை சில வஸ்துக்களினுதவியைக்கொண்டு நீக்கி விட்டால் அது தெளிவடைந்து ஒளியூடுமும்படியானதாய்த் தோற்றும். இரத்தத்தின் வெப்பம் தேகத்தின் பல பாகங்களிற் சற்று வேறுபட்டிருந்தபோதிலும் சாதாரணமாக சீதோஷ்ணமனக்குங் கருவியில் 100 டிகிரியுள்ளதாகக் காணும்.

புதியதாயெடுத்த இரத்தத்தினின்றிண்டாகும் நீராவியால் குருதி நாற்றத்தைக் காணலாம். சரியளவு ஜலத்தையும் கந்தக திராவகத்தையும் அத்துடன் கலந்தால் அதின் நாற்றமற்றுப்போம். எத்தேகத்தினின்றி வந்த இரத்தமோ அத்தேக நாற்றமும் அவ்விரத்த நாற்றமும் ஒரோ மாநிரியானதென்றும், ஆகையினால் இரத்தத்தை முகர்ந்து பார்த்தே இந்த மிருகத்தின் இரத்தமென்று சொல்லக்

கூடுமென்றுஞ் சொல்லுகிறார்கள். பன்றியினுடைய அல்லது பூனையினுடைய அதிக நாற்றமும், பசுவினுடைய பால் மாநிரி வாசனையும் சுருஷில் அறியக் கூடியவைகளாம்.

இரத்தத்தின் அளவு.

ஒரு மிருகத்தை அதிக சீக்கிரத்தில் இரத்தத்தை யெடுத்துக் கொல்லும்பொழுது அதினின்றி வெளிப்படும் இரத்த அளவைக்கொண்டு மிருகத்துக்கிருக்கும் இரத்த அளவு அவ்வளவுதான் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில் எப்பொழுதும் இரத்தநாடி முதலியவைகளிற் கொஞ்சமிரத்தம் நீன்றுபோகின்றது. நிகானமாய் இரத்தத்தை வெளியிட்டு மிருகத்தைக்கொன்றால் ஜீவனதிக காலமிருக்கிறபடியால், தேகத்திலிருக்குஞ் சில திரவங்களும் குருதியுடன் சேர்ந்து வெளியே வருமாகையால் படி வெளிவருமிரத்தம் முழுமையும் உடலிலிருக்குமிரத்தத்தைவிட அதிகமாகவிருக்கும். ஆகையால் இரத்தத்தினளவைக் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமாயிருக்கிறது. ஆயினும் இரத்தத்தின் அளவை நிர்தாரணை செய்யவேற்படுத்திய பல உபாயங்களாலும் தெரியவருகிறதென்னவென்றால், மனிதனில் மனிதனுடனுக்கும் இரத்த அளவுக்கு முள்ள தாம் 8க்கு 1 அல்லது 10க்கு 1 ஆகும் என்பதே.


ஆனால் ஒரு மிருகத்திலிருக்கும் இரத்த அளவு பல காலங்களிற் பலவிதமாய் மாறுபடும். கொல்வதற்கு முந்தித் தின்றிருக்குந் தினியின் நிறையையும் பொருந்தியிருக்கும். வயிறு நிறையுதின்றிருக்கும்பொழுது கொன்றால் வெளிவரும் இரத்தத்திற் பாதிகூட பட்டினியாபிருக்கும் பொழுது கொன்று பார்த்தார் காணாது. ஆகையால் மேலே சொன்ன அளவையுங்கூட உத்தேச அளவாகத் தான் கொள்ளவேண்டியது.

இரத்தம் உறைவது.

இரத்தத்தைத் தேகத்தினின்றி வெளிப்படுத்தினால் சில நிமிஷங்களினுறைந்துவிடும். இரத்தம் உறையும்பொ

முது, இரத்த வஸ்துக்கள் முழுவதும் ஒரு பசையினாலுக்கப்பட்டுப் பாகுபோலாகிவிடும். அதாவது பசையானது இரத்தவணுக்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளும். அதற்குக் கட்டி (கிளட் clot) என்று பெயர். இப்படியுண்டாகும் கட்டி முதலில் இரத்தம்போலவே வருணத்தில் தோற்றப் படுமாயினால் உண்டாயிருக்கும் வித்தியாசமெல்லாம் திரவரூபமாயிருந்தது பாகுபோலாயிற்றென்பதே. ஆனால் சீக்கிரத்தில் கட்டியின் மேற்புறத்தில் மஞ்சள்நிற நீர்த்துளிகள் கசியவாரம்பிக்கும். இந்த நீர் தெளிவானதாயும் ஒளியூடுறக் கூடியதாயுமிருக்கும். பிரமமாக இவைகள் முதலில் கட்டிகளின் மேற்பக்கத்திலும், பிறகு சுற்றிலும் கலப்பதினால்கட்டிகள் முன்னிலும்திக் கட்டியாயுறைந்து, கலந்து செரும் நீரில் மிதக்கும். இந்த மஞ்சள்நிற நீருக்கு ஊனம் என்று பெயர். கட்டியிலுள்ள திரவம் பொசிந்து கொண்டே யிருப்பதினால் ஊனத்தினாலு நிதானமாய்திக் கரித்துக்கொண்டே யிருக்கும். இரத்தமுறைந்த பிறகு இருபத்துநாலுமணி காலமுதல் நாற்பத்தெட்டுமணி காலவரையில் இந்தமாதிரி யதிகரிக்கும். உறைந்த இரத்தமாகிய குருதிக்கட்டியானது பைபிரின் (fibrin) என்று பெயர் வழங்கும் ஒரு நார்போன்றவஸ்துவின் வலைகளில் செங்குறுகும் (ரெட் கார்பஸ்ஸஸ் red corpuscles) என்று சொல்லும் சிவந்த அணுக்களடங்கியதாகும். சோரிநார் என்பது இரத்தம் உறைய ஆரம்பித்தகாலத்தில் இரத்தநீரில் (liquor sanguinis) ஏற்படும் வஸ்துவாகும். இரத்தத்தை ஒருவாறாகப் பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்.

இரத்தம்.



கட்டி : (கிளட் clot) இதிலுள் கொஞ்சம் ஊனம் உண்டு.

இரத்தநீரினுலேயே சோரிநார் உண்டாகிறதென்று விளக்கக்கூடும். இரத்தம் உறைவதற்கு முந்தியே இரத்தநீரையும் இரத்த அணுக்களையும் பிரிக்கவேண்டிய உபாயங்களைச் செய்வதினால் மிருகங்களின் இரத்தத்தில் (உதாரணமாக தவளைபின் இரத்தத்தில் இரத்த அணுக்கள் பெரியதாகையினாலே) இரத்தத்தை வடிகட்டியே பிப்படி பிரித்துவிடலாம். அப்படிப் பிரித்தால் இரத்தவணுக்கள் வடிகட்டும் கருவியில் நின்றுபோகின்றன. கீழேயிறங்கும் வருணமற்ற நீரில் காருண்டாகும். முலையுண்ணும் ஜீவ வர்க்கங்களின் இரத்தத்தை (F. 32°) 32 டிகிரியுள்ள குளிரில் வைத்தால் இரத்தமுறையாமல் நின்றுபோகும். இரத்தவணுக்கள் கீழேபடிய சாவகாசமிருப்பதால்வைகள் கீழேபடிந்து, அவைமேல் இரத்தநீர் தெளிந்து நிற்கும். பிறகு குளிரை நீக்கி வெப்பமதிகமாகும்படி செய்தால் இந்த நீருமுறையும். இதற்கு வருணமுமிருக்கமாட்டாது.

ஆயினும் சாதாரணமாக செங்குறுகட்கள் கீழே படிவதற்குமுந்தியே இரத்தம் உறைந்துபோகிறபடியால் சோரியினுடைய நார்வலைகளில் இவைகளாகப்பட்டுக்கொள்ளுகின்றன. அது நிமித்தியமே கட்டியானது கொஞ்சங்கறுத்த சிகப்பு வருணத்துடன் காணுகின்றது. எந்த காரணத்தினாலேயாவது செங்குறுகட்கள் சீக்கிரம் கீழே படிந்தாலாவது, அல்லது சோரி நார்கள் நிதானமாய்ச் சுருங்கினாலாவது, இரத்தநீர் திரவரூபமாயிருக்கும்பொழுதே சிவந்தவணுக்களை பிரத்தியேகமாகக் காணலாம். இவைகள் மாத்திரம் அத்தருணங்களிற் கீழே படியும். இவைகளுக்கு மேலிருக்கும் வரிசைகள் கொஞ்சம் சாம்பல் வருணமுடையதாய்க் காணும். இவைகள் சிவந்த அணுக்களில்லாமலே உறையும். உறைவதினாலுண்டாகும் கட்டியில் வருணமற்ற அல்லது சாம்பல்வருணமுடைய அணுக்களாகக்காணும். இவைகளில் சோரிநார் இருக்கின்றன, சோரிநாருடன் வெண்சாலங்களும் கலந்திருக்க

கும். வெண்குறுகடங்கள் அதாவது வெண்சரலங்கள் அதிக இலேசானதாகையால் மேலுக்கு மிகக்குந்தன்மையுள்ளவைகள். இந்தமாதிரி அடியில் சோரிநார் படிந்து சுருங்கும்பொழுது சிவந்த அணுக்கள் இறுக்கிக்கொள்வதினால் வருணமுடைய வஸ்துக்களும் அதின்மேல் வருணமற்ற சோரிநாரும் படிந்திருக்கும். மேற்புறமிருப்பதற்கு நரையேடு (பப்பி கோட் buffy coat) என்று பெயர்.

தேகத்தின் வீங்கியிருக்கும் பாகங்களிலிருந்து வந்த இரத்தமானால், அதிலுள்ள செங்குறுகடங்கள் சீக்கிரம் கீழே படிந்துவிடும். அதுவுமல்லாமலந்த இரத்தம் உறைவதற்குத் தாமதப்படும். ஆகையால் அந்தச் சமயங்களிலும் நரையேட்டை நன்றாய்க் காணலாம். சோரிநார் என்பது அதன் ஸ்திதியிலேயே இரத்தத்திலிருக்கிற வஸ்துவல்ல. இரத்தம் தேகத்தில் ஓட்டத்திலிருக்கும்பொழுது அதிலிரண்டுவித வெள்ளைக்கருச் சத்துகள் பிரத்தியேகமாயிருக்கின்றன. இவைகள் இரத்தமுறையும்பொழுது ஒன்றுடன் மற்றொன்று கலப்பதால் சோரிநாராகின்றது.

இரத்தம் உறைவதில் சீதஉஷ்ணங்களுக்குடைய தாமதம்,

இரத்தம் பின்வருங் காரணங்களாற் சீக்கிரமுறையும்.

1. மிதமான வெப்பம்—100° to 120° F.

2. இரத்தம் சுருங்குவதற்குக் கலனமற்றிருத்தல் அனுகூலமாயிருக்கும். ஒரு பர்த்திரத்தில் இரத்தத்தை நிறைத்து மூடிய பிறகு அடிக்கடியசைத்துக்கொண்டிருந்தால் அதிக நிரானமாய்த்தானுறையும். நன்றாயும் உறைய மாட்டாது.

3. வேறு வஸ்துக்கள் இரத்தத்தைத்தொட்டாலும் விசேஷமாக அப்படி இரத்தத்திற் பல இடங்களில் நொடும்படி செய்தாலும் இரத்தம் சீக்கிரமுறையும். கிறிய சமித்துகளை இரத்தத்தினிடடாட்டினால் குச்சிகளினமேலுறைந்த சோரிநார்கள் சீக்கிரத்திற் சுற்றிக்கொள்ளும். உயிருடனிருக்கும் தேகத்திலுங்கூடக் கடினப்பதார்த்தம்

கள் பட்டால் உறைந்துபோகும். உதாரணமாக நூல்களை அவையுடே செலுத்திவைத்தாலுங் காணலாம்.

4. காற்றுப்படுவதினால்.

5. ஆமமற்ற அகலப் பாத்நிரங்களிலிரத்தஞ் சீக்கிரமுறையும். நீளமான அகலமற்ற பாத்நிரங்களில் அவ்வளவு சீக்கிரம் உறையமாட்டாது.

6. அறினளவுக்கு இரண்டு பங்குக்குக் குறையாத தண்ணீர் சேர்ப்பதினால்.

குறிப்பு:—முதலில் வரும் இரத்தத்தைவிட பித்தி வரும் இரத்தம் சீக்கிரம் உறையும்.

பின்வரும் காரணங்களால் இரத்தமுறைவது நிதானப்படும்.

1. சீதமுறைவதை நிதானப்படுத்தும், 40 டிகிரி (F)க்குக் கீழுள்ள சீதளத்திலிரத்தத்தை வைத்தால் உறையவே உறையாது.

2. இரத்தத்தின் அளவுக்கு இரண்டு மடங்குக்கு அதிகமான ஜலத்தைச் சேர்ப்பதினால்.

3. உயிருடனிருக்குந் தசைகளிற் படுவதினால், முக்கியமாக இரத்த நரம்புகளினுட்பகாத்திற் பட்டால் உறைவது நிதானப்பட்டுப்போகும்.

4. சுண்ணாம்பினுப்புகளும் மண்ணினுப்புகளும் படுவதினாலும் நிதானப்படும்.

5. காத்துப்படாமலிருத்தல்: உதாரணமாக சுவாசப் பந்தத்தினால் செத்துப்போனவர்களினிட தேகவிரத்தத்தைப் பார்த்தால் தெரியும்.

6. தேகத்தில் வீக்கங்களிருந்தால் நிதானமாயுறையும்; ஆனால் கட்டியாயுறையும்.

இரத்தத்தின் பூதிக கூட்டுப்பாடுகள்.

இரத்தத்தை ஆயிரம் பங்காகப் பிரித்தால் அதில் சேர்ந்தவைகள் பின்வருமாறு இருக்கின்றன:—

ஜலம்				784
(ஊனத்திலிருக்கும்) வெள்ளைக்கருவஸ்து				70
சோரிநார்				2.2
செங்குறுகடங்கள்				130
கொழுப்பு வஸ்துக்கள்				1.4
அமிந்திரிய உப்புக்கள், பச்சை நிறவாயு				
கலந்த சவிட்டுப்புச் சத்து				3.6
மாவுப்புச் சத்து				0.35
நிபாக்கினிகலந்த சவிட்டுப்பு				0.2
சவிட்டுப்புக்கரிச்சத்து				0.28
கந்தகங்கலந்த சவிட்டுப்பு				0.28
நிபாக்கினி கலந்த சுண்ணாம்பு, காந்தமண் சத்து				0.25
நிபாக்கினி கலந்த அயமும், சுவாசவாயுகலந்த				
அயமும்				0.5
வருணவஸ்துமுதலிய சிவ்லரைவஸ்துக்கள்				6.40

ஒரு மாட்டின் காய்ந்த இரத்தத்தின் பூதிககலப்பின் விவரம்.

சுத்தநீர்	57.9
ஜலவஸ்து	7.1
உப்புக்கள்	17.4
சுவாசவாயு	1.92
சுரப்பலங்கள்	4.4

மாட்டின் மாம்சத்திலும் இந்த பூதங்கள் இதேபடி தராதம்மியப்பட்டிருக்கிறதென்று சொல்கிறார்கள். ஆகையால் தேகத்துக்கு வேண்டிய வஸ்துக்கள் இரத்தத்திலிருக்கிறதென்றும், வேண்டிய அளவின்படி இரத்தத்திலிருந்து உள்ளுக்குச் செருகிறதென்றும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

குருதிச்சாலங்கள்.

(Blood corpuscles or blood cells) இரத்த நாடியில் குருதிச்சாலங்கள் கொஞ்சம் இரத்த நீரில் சேரிகார் கருடனிருக்கிறதென்று தெரிந்துகொண்டிருக்கிறோம்.

இக்குறுகடங்களிருவகைப்படும். இவைகளை சாதாரண மாய் வர்ணமுள்ளவைகளென்றும் வர்ணமற்றவைகளென்றும் சொல்லப்படும். அவைகளை செங்குருதிச்சாலங்களென்றும் வெண்குருதிச் சாலங்களென்றும் சொல்லலாம். இரத்தம் சீக்கிரத்திலுறைந்துவிட்டால் இவ்விருவிதச் சாலங்களும் இரத்தக்கட்டியில் ஒன்றுடனொன்று கலந்துகாணும். உறைவது நிதானமாயாகுமாயின் செங்குருதிச்சாலங்கள் இரத்தத்திலிருக்கும் வஸ்துக்களிலெல்லாம் பருவானதாகையாலே அடியிற்படிந்துவிடுகிறது. இதற்குக் காரணம் பூமியின் கவர்ச்சியே. வெண்குருதிச்சாலங்கள் வெள்ளை இரத்தப்பைகள் அதிக இலேசான படியால் மேற்புறத்தில் நின்றுபோய் நரையேடு என்பதை உண்டாக்குகின்றன. ஈரமாயிருக்கும்பொழுது இரத்தத்தில் 100ல் 45 பங்கு பருவு செங்குறுகடங்களுடையதாயிருக்கும்.

செங்குறுகடங்களின் சட்பூத குணங்கள்.

மனித தேகத்தைச்சேர்ந்த செங்குறுகடம் உருவில் உருண்டு நாணயங்கள்போல தட்டையாயிருக்கும் பிம்பமாகும். குருக்களில் $\frac{1}{3000}$ விருந்து $\frac{1}{4000}$ அங்குல அளவுள்ளவைகளாகவும் வண்ணத்தில் $\frac{1}{10000}$ அங்குலமுள்ளதாகவுமிருக்கின்றது. தட்டையாகி ஒன்றின் ஓரம் மற்றொன்றாக அடுக்கினால் ஒரு சதுர அங்குல பூமியில் பத்துலட்சங்களைப் பரப்பலாம். அவைகளினோடுகள் உருண்டிருக்கின்றன. சாதாரண காலங்களில் அவைகளின் மேற்புறம் கொஞ்சம் உட்கவிந்திருக்கும்.

இரத்த நீர் உறைந்திருப்பதை திரவப்படுத்தினால் அவைகள் நீரைக்கொண்டு அவைகளின் மேற்புறம் சமமாய் தட்டையாகவும் அல்லது மத்தியில் கொஞ்சம் உட்பியும் புறங் கவிந்ததாயும் காணும். ஒன்றைமாதிரம் பார்த்தால் கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறமானதாகக் காணும். இரத்தத்துக்குள்ள நல்ல சிவப்பு வர்ணம் இவைகளில் அகேகத்தை ஒரே காலத்திற்குண்டால் அவைகளின் காணலாம். அவை

களோ வருணமற்ற வேறெதினுடனுஞ்சேர்ந்த கட்டுப்பாடுகளில்லாமல் ஒளியூட்டறக்கடியதாய் வழவழப்பான அஸ்திவாரத்துடன் கூடியவை. இவைகளினுள் சோணிதம் என்கிற வருணவஸ்துவையும் உடைத்தானவைகள். இந்த வஸ்துவானது கடினமாயும் நிகழ்ந்துழத்தக்கதாயிருக்கிறபடியால், குருதிச்சரலங்கள் இரத்தத்துடன் தேகத்திற் சுற்றிவருங்காலத்தில் சமயம் வந்தபொழுது நீண்டு கொண்டு, மற்றெந்த மாதிரியாய் மாறவேணுமோ அந்த மாதிரியாக ஒவ்வொரு இரத்த நாடிகளிலும் மாறி பந்தம் விடுபட்டவுடனே தமது சுய சொருபமடையும்.

இந்த வஸ்து எதினால் ஏற்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த வஸ்து வருண வஸ்துவை நத்தியிடுவதி போர்வை போல் முடிக்கொண்டிருக்கின்றவையல்ல. வருண வஸ்து வானது எதில் ஏற்பட்டிருக்கின்றதோ, அது அந்த வஸ்துவின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஊடுறுவி யிருக்கின்றது. பூதக்கண்ணாடியின், உதாரணமாக செங்குறுக்டங்களில் அநேகத்தை பரிசுத்து செய்துபார்த்தால் அவைகளெல்லாம் ஒரிடத்திலிருந்தே எடுக்கப்பட்டவைகளாயிருந்த போதிலும் அவைகளில் சில ஒன்றுக்கொன்று சில வேற்றுமைகளை உடையவைவாய்க்கூறும். ஆயினும் பெரும் பான்மையாய் அவைகளெல்லாம் ஒருமாதிரியாயிருக்கும். அவற்றுள் சிலது மற்றவைகளைவிடப் பெரிதாயிருக்கும். அப்படிப் பெரியதாயிருப்பவைகள் சிறியவற்றைவிட வெளுத்தும் உருவத்திலும் உருட்சியற்றும் காணும். அவற்றின் மேற்பக்கமும் அதிகமாய் தட்டையாகவாவது அல்லது நடுக்குழிந்தாவது காணும். அவற்றின் மத்தியில் அதிகச் சிறிய பளபளப்புடைய குத்து ஒன்று காணும். மற்ற சரலங்களைவிட அதிக இலேசாகவும் இருக்கும். தண்ணீரில் போட்டால் அதிகமாய் மேலுக்கும் மிதக்கும்.

செங்குறுக்டங்களின் திசேஷ குணமொன்றை இரத்தம் கொதிப்படைந்திருக்கும்காலத்தில் நன்றாய்க் காணலாம். அதை இப்பொழுது எடுத்துக் கூறுவோம்.

இவைகள் பந்தி பந்தியாயாவது சுருள் சுருளாகவாவது நாணயங்களை அடுக்கிவைத்ததுபோல ஒன்றையொன்று ஒட்டி நிற்குத் தன்மையை உடையவைகளாம். இந்தச் சுருள்கள் அதிகச்சிகரித்தில் ஒன்று மற்றொன்றை ஒட்டி நிற்கும். இரத்தத்தை ஒரு கண்ணாடியின்மேல் இலேசாகப் பரப்பிப் பார்த்தால் இப்படி ஒட்டி நிற்கும் செங்குறுக்டச் சுருள்கள் வலைபோலக் காணும்*. அப்படிப்பட்ட இலேசான படை இரத்தத்தில் ஏற்படுங் கட்டி, காட்சிக்கு வெண்மைத் தரையின்மேல் வர்ணப்பொட்டுகள் பற்பல விழுந்திருப்பதுபோல் காணும். இரத்தம் இலேசான படையில்லாமல் கனத்திருக்குமேயானால் குறுக்டங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி சுருள்களாய் ஆனபிறகு (அதாவது இரத்தத்தை வெளியிலெடுத்த இரண்டு முனறுகிமிஷங்களுக்குப் பிறகு) அதிக சிக்கிரமாய்க் கீழே ஆழ்ந்துவிடும். அப்படி ஆழ்ந்துபோவதினால் அவற்றின்மேல் இரத்தநீர் படை நிற்கும். இந்த இரத்தநீர் தோய்விடுதல் முன்சொன்னபிரகாரம் நரையேடு உண்டாகின்றது. இந்த நரையேட்டின் பரிமாணம் வெண்குறுக்டங்கள் சேர்வதால் அதிகரித்துக் காணும். வெண்குறுக்டங்களோ செங்குறுக்டங்களுடன் சேருந்தன்மையில்லாதவைகளாயிருக்கின்றன. செங்குறுக்டங்களைவிட பருவில் இலேசாகையால் அவற்றின் மேற்புறத்தில் வெண்குறுக்டங்கள் நின்றபொழுதும்.

பூதிக குணங்கள்.—இரத்தத்தில் இருக்கும்பொழுது வருணக் குறுக்டங்கள் அவற்றின் முக்கார்ப்பங்கு பருவுக்கு தண்ணிரையுடைத்தாயிருக்கும். தண்ணீரற்ற கோதின்பாகமோ, இரத்தாணுவயம், புரோட்கான், கொழுப்பு வஸ்துக்கள், பித்தக்கட்டியம்சம், இன்னும் உப்புலகைகளில் சிலவற்றையும் உடைத்தாயிருக்கும். முன்சொன்னபடி கோதின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் சோணிதம் என்

* இதை விளக்கும் படம் இப்புத்தகத்தின் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

னும் வருணவஸ்து ஊடுற்றிருக்கின்றது. வருணக் குறுகடங்களின் கூட்டுப்பாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் வஸ்துக்களில் எல்லாவற்றையும்விட அதிகமாயிருக்கும். இந்தச் சோணித்தத்தின் கூட்டுப்பாடு பின்வருமாறு காணும்:—

கரி	54.0
ஜலவாயு	7.25
உப்புவாயு	16.25
பிராணவாயு	21.45
கந்தகம்	0.63
இரும்பு	0.42
	100.00

வெண் கருச்சத்து இனத்தைச் சேர்ந்ததாயினும் சோணிதம் அவ்வினத்தின் குணங்களினின்றும் பல விதங்களில் பேதப்பட்டிருக்கின்றது. சாரீர சாஸ்திர ரீதியில் சோணித்தத்தின் முக்கியமான குணம் என்னவெனில், அதற்கும் சுவாசவாயுவுக்கும் இன்னம் சில வாயுக்களுக்கும் உள்ள கவர்ச்சி சக்தியேயாம். துரையீரலில் இரத்தம் சஞ்சரிக்கும்பொழுது சுவாசவாயு கலந்த சோணிதம் இடைவிடாமல் ஏற்பட்டுவரும். தேகிக தந்துகிகளில் இரத்தம் சஞ்சரிக்கும்பொழுது மற்ற கவர்ச்சிகளுக்கு உட்பட்டு சோணிதம் சுவாச வாயுவை அழி சுருவில் கக்கிவிடும். ஆகையால் செங்குறுகடங்கள் அவற்றின் வருண வஸ்துவின் குணத்தால் சுவாசவாயுவைக் கவரவும் கக்கவும் சக்தியுடையனவாறி அவ்வாயுவை இரத்தத்தில் கொண்டுபோக வுதவுகின்றன. சோணிதம் சுவாசவாயுவைப் பெறுவதாலும் விடுவதாலும் உண்டாகும் பூதிக வேறுபாட்டாலேயே நாடி நாளங்கள்வழியே செல்லும் இரத்தத்தின் வருணபேதத்தை விளக்க வேண்டியிருக்கின்றது.

இரத்தத்திலிருந்தும் வெண்குறுகடங்கள் அல்லது தந்தி வெண்மை வஸ்து.

இரத்தத்திலிருக்கும் வெண்மை அல்லது வருணமற்ற குறுகடங்கள் நிணநீர்க் குறுகடங்கள் போன்றவைகளேயாம். இவைகள் இரத்தத்தில் செங்குறுகடங்களைவிட மிக்கக் குறைந்துகாணும். சராசரியில் ஒவ்வொரு 400 அல்லது 500 செங்குறுகடங்களுக்கு ஒரு வெண்குறுகடம் இருக்கும். ஆனால் வியாதியாயிருக்கும்பொழுது, இவைகள் 10 க்கு ஒன்றாகவும் இன்னம் அதிகமாகவும் காணலாம். செளக்கியஸ்திநிலங்கூட இவற்றின் தராதரம் ஒரேநாளில் பலவிதமாய்ப் பலகாலங்களில் மாறியுந் காணும். இவ்விதமாய்க் காணும் மாறுதல்களுக்குக் காரணம் திண்மம் தீனியாயிருக்கக்கூடுமென்று சொல்லலாம். ஏனெனில் சரப்பிடுவதினால் வெண்மை வஸ்து அதிகப்படுவதும், பட்டினியிருப்பதால் அவைகள் குறைவதும் சகஜமாம். தவிர சிறிய வயதினர்களிலும், கர்ப்பகாலத்திலும், இரத்தம் அதிகமாய் நஷ்டமான காலங்களிலும் வருணமற்ற இரத்தக் குறுகடங்கள் அதிகமாய்க் காணும். ஆனால் மூப்புப் பருவத்தில் அவை குறைந்து இருக்கின்றன.

இவைகள் செவ்வினத்தைவிட அதிகமான உருவபேதங்கள் உடைத்தரளவைகளாம்.* ஆனால் ஓர் உருவக் குறுகடமே பலவடிவுடையவைகளாக மாறுகின்றனவெனக் காண்கின்றது. சாதாரணமாய் இவைகள் ஒவ்வொன்றும் வட்டமாயும் குறுக்களவில் 3:2 அங்குலமுடையதாய் இருக்கின்றன. அவைகள் பார்வைக்குச் சாம்பல் பூத்து முத்து வருணம் உடையதுபேரலக் காண்கின்றன. இவற்றுள் அனுமாத்திரமாய் ஆதிமூலப் பொருட்பொடிகள் இருக்கின்றன. இக்குறுகடங்களுக்கு சாலத்தைப் போற்றிக்கொள்ளும் சுவர்கிஷ்டயாதெனக் காண்கிறது. சிலவற்றுள் அதிக அபுரூபமாக சாலசச்சவ்வு ஒன்று காணும்.

* இதை விளக்கும் படம் இப்புத்தகத்தின் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மேற்சொல்லியபடி ஆதிமூலப்பொருள் இவற்றுள் இருப்பதினால்தான் இக்குறுகடங்கள் பலவுருவங்களாக தமக்குத்தாமே மாறுகின்றனவெனத் தோற்றுகின்றது.

இரத்தத்தில் செங்குறுகடம் வெண்குறுகடம் ஆகிய இவ்விரண்டு இனங்களுந்தவிர, அதிக அட்பமாகிய வேறு சில அணுக்கூட்டங்களும் பூதண்ணாடியினாகவிரொண்டு பார்க்கும்பொழுது காணும். இவைகளில் சில கொழுப்புட்கொண்டவைகளாம்; மற்றவை அண்டசித வகையைச் சேர்ந்தனவாம். சாதாரணமாக ஆகாரம் ஜீரணமாகுங்காலத்தில் கொழுப்பணுக்கள் அநேகம் இரத்தத்திற்கு காணும்.

இரத்த நீர்

இரத்தநாள் உறைந்த பிறகு மேலுக்கு நிற்கும் திரவத்திற்கு இரத்தநீர் என்று பெயர். சாதாரணமாகக் குருதி கட்டியாவதில் இரத்தநீரின் ஒர்பாகம் கட்டியில் நின்றும், மற்றது கட்டி கருங்குவதற்காகித்து அதைச் சுற்றியுங்கிடக்கும். கட்டியைச் சுற்றி நிற்கும் இரத்தநீரின் அளவு அது இரத்தத்தில் இருந்த அளவையும் கட்டிச் சுருங்கிய நிதானத்தையும் பொருந்தியிருக்கும். கட்டிச் சீக்கிரம் உறைந்தால் அதன் சுருக்கம் மட்டுப்பட்டிருக்கும். அப்பொழுது இரத்த நீர் குறையும். தவிர கட்டி முப்பத்தின்கு மணிரேவரையில் சுருங்கிக்கொண்டிருக்குமாயால் இரத்தத்திலுள்ள இரத்த நீரின் அளவை அவ்வளவு காலம் வரையில் நிர்தாரணை செய்வது கூடாததாகும்.

இரத்தநீர் மஞ்சள்நிறமான காரநீராகும். அதின் முக்கியமானபாகம் தண்ணீராகவருக்கின்றது. அதில் இரத்தத்திலுள்ள பூதிவஸ்துக்களுள் குறுகடங்களும் குருதிநாரும் தவிர மற்றெல்லாவஸ்துக்களும் கரைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (61-ம் பக்கம்பார்க்க.)

தேகம் சௌக்கியமாயிருக்கும்பொழுது இரத்தத்தின் கூட்டுப்பாடுகள் பின்வருங் காரணங்களால் வித்தியாசப்

படம். அவையாவன : ஆண் பெண் வித்தியாசங்களாலும், பெண்ணுனால் கர்ப்பத்தாலும், ஆளின் வயதிலும், குணத்தியங்களாலும் வித்தியாசப்படக்கூடும். உட்கொள்ளும் ஆகார வகைகளாலும் இரத்தத்தின் கூட்டுப்பாடுகளில் வித்தியாசங்களுண்டாகின்றன.

தேகத்தின் பல பாகங்களிலுள்ள இரத்தமும் ஒன்றுக்கொன்று கூட்டுப்பாட்டிற் பேதப்பட்டுக்காணும். நாடியிலிருக்கும் இரத்தம் நாளத்திலிருக்கும் இரத்தத்தினின்று அதிக வித்தியாசமுள்ளதாகவருக்கின்றது. தேகிக நாடிகளிலுள்ள இரத்தம் ஏறக்குறைய ஒரேமாதிரியானதானாலும் தேகிக நாளங்களில் உள்ள இரத்தம் பற்பல விடங்களில் பேதங்களுடையதாகவருக்கின்றது.

நாடி நாளங்களின் இரத்த பேதங்களை இரண்டு பிரிவாகப் பிரிக்கக்கூடியதாயிருக்கின்றது. 1. வருணத்தில் பேதம்; 2. சாதாரண கூட்டுப்பாட்டில் பேதம்; ஆக இருவகையாக்கக்கூடியதாயிருக்கின்றது. நாளங்கள் சில வற்றிலுள்ள இருக்கும் இரத்தம் மற்றவைகளிலுள்ள இரத்தத்தினின்று பேதப்பட்டிருப்பதைக் காணவேனுமானால் பின்வரும் நாளங்களின் இரத்தத்தைப் பார்த்தால் காணலாம். அவையாவன : உதரநாளம் (போர்டல் வெயின் portal vein), காலேய நாளம் (ஹிபாடிக் வெயின் hepatic vein), பிரீகநாளம் (ஸ்பிளீனிக் வெயின் splenic vein) முதலியவற்றை நோக்குக.

இரத்தம் தேகத்துட் சஞ்சரித்து வரும்பொழுது அவ் வவ்விடங்களுக்கு வேண்டியவற்றைக்கொடுத்தும், அவ்வவ்விடங்களில் கழிக்கப்பட்டவைகளை உட்கொண்டும் வருகிறபடியால், அது தன் கூட்டுப்பாட்டிலும் பற்பலவிடங்களில் பலவிதம் மாறுபட்டே காணவேண்டியதாயிருக்கின்றது.

இரத்தத்திலுள்ள ஆவிகள்.

இரத்தத்திலிருக்கும் ஆவிகளாவன : சுவாசவாயு, கரியமலவாயு, உப்புவாயு ஆகியவைகளாம். இரத்தத்தின்

100 பங்கில். இந்த ஆயிகள் எல்லாம் 50 பங்கு இருக்கின்றன. நாடி இரத்தத்தில் நான் இரத்தத்தையிட அதிக மளவு சுவாசவாயு இருக்கின்றது. ஆயினும் இவ்விருவகை இரத்தத்திலும் சுவாசவாயுவைவிட கரியமலவாயு வே அதிகமாயிருக்கின்றது. உப்புவாயுமட்டும் மற்றவைகளைவிட அதிகமாய்க் குறைந்து காண்கின்றது. சுவாசவாயு செருகுபுகடங்களின் சோணிதவஸ்துவில் பூதிகமாய்க்கலந்துகாணும். கரியமலவாயு கொஞ்சமளவு சுயமாயும் மற்றவை கொஞ்சம் பூதிகவிகற்பமடைந்துங் காணும்.

இரத்தத்தின் உபயோகங்கள்.

1. வெளியுலகத்தினின்று தேகத்தைச் சேரும் அன்னபான வாயுவாதிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும், சேகரம் செய்யவும், அவற்றை தேகத்தின் மற்ற பாகங்களுக்கெல்லாம் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கவும் ஓர் உபகரணமாயிருக்கின்றது.

2. தேகத்தின் பற்பல தசைகள் தத்தம் போஷிப்புக்கும் ஆகாவுக்கும் வேண்டிய வஸ்துக்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் ஊற்றாகவும், விசர்க்கக் கருவிகள் கழிக்கும் விசர்க்கங்களைக் கொண்டுபோகும் கழிவுகாலாகவும் உதவுகின்றது.

3. சத்துவசக்தியை (potential energy)க் கொண்ட பண்டசாலையாகி அதைச் சிலவழிப்பதால் தேக அனலைக் காப்பாற்றிக்கொண்டு வருகின்றது. அப்படி நடத்தலால் தான் ஜீவசக்தி முதலியவை வெளித்தோற்றுக்கின்றன.


4. எல்லாத்தசைகளினின்று வரும் கழிவுபதார்த்தங்களை சோஷணம் செய்யும் உபகரணமாயிருப்பதினால் அவற்றைப் பெற்றுக்கொண்டு, எந்தக்கருவிகளால் தேகத்தை விட்டு அவைகளை முறையே கழிக்கக்கூடுமோ அந்தந்த கருவிகளுக்கு அவைகளைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்க உதவுகின்றது.

5. தேகத்தை வெப்பப்படுத்தவும் பசையுள்ளதாகச் செய்யவும் உதவுகின்றது.

இரத்தச் சுழற்சி.

இரத்தம் இரத்தாசயத்தினின்று நாடிகளால் (ஆர்டரீஸ் arteries) வெளியே கொண்டுபோகப்படுகின்றது.


14-ம் படம்.



14-ம் படம்.—இரத்தாசயத்திலேயே இரத்தம் சுழலும் விதம்.—டால்டன். மறுபடியும் நாளங்களால் (வெயின்ஸ் veins) அதற்கு திரும்பிக் கொண்டுவரப்படுகின்றது. நாடி நாளங்கள் ஓர்புறம் இரத்தாசயத்தாலும், மற்றப்புறம் தந்துகிகள் (காபிலேரீஸ் capillaries) என்று சொல்லும் நுண்ணிய இரத்தக்கால்களாலாய் வலைகளாலும் ஒன்றையொன்று தொடரப்பெற்றிருக்கின்றன. ஆகையால், போக்கில் இரத்தம் முதலில் நாடிகளில் பிரவேசித்துப் பிறகு தந்துகிகட்குச் செல்லுகின்றது. தடைசியாக நாளங்களுட்கென்று அவை நின்றும் மறுபடியும் இரத்தாசயத்திற்குத் திரும்பிவருகின்றது. இம்மாதிரி சுற்றிவருகிறபடியால் இதற்குச் சுழற்சி (circulation சர்க்குலேஷன்) யென்று பெயர் தரப்பெற்றிருக்கின்றது. சாதாரணமாய் இரத்தச் சுழற்சி இருவகைப்படமென்பார்கள். ஒன்று சிறிய சுழற்சி; அதாவது இரத்

தாசயத்தினின்று துரையிரல்களுக்கும் மறுபடி அவைரினும் இரத்தாசயத்துக்கும் இரத்தம் செல்வதாகும். மற்றது பெரிய சுழற்சி; அதாவது இரத்தாசயத்தினின்று தேகத்தின் சகல பாகங்களுக்குஞ்சென்று மறுபடி திரும்பிவருவதாகும். ஆனால் கண்டிப்பாய்ப் பேசுமிடத்தில் இரத்தச்சுழற்சி ஒன்றேயாகும். அதை அடுத்த படத்தில் ஒருவாறு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படத்தில் அம்புபோகும் போக்கில் இரத்தம் சுற்றிப்போவதாகக்கொண்டால் சிறிய சுழலும் பெரிய சுழலுங்காணும். இவ்விரண்டுமே இரத்தாசய மூலமாய்ச் செல்லுகின்றன. ஆயினும் இவை ஒன்றினின்றும் ஒன்று பேதப்பட்டதல்ல. ஏனெனில் இரத்த

15-ம் படம்.



15-ம் படம். -- இரத்தச் சுழற்சியை விளக்கும் படம். -- சுற்றிப் போக்கில் எப்பொழுதாவது ஒரு சமயத்தில் அது துரையிரல்கள் மூலமாய் போகவேண்டியதாகும். இவ்விருவகை

ச்சுழற்சிகளுக்கு புப்புச்சுழற்சி (பல்மொனெரி சர்குலேஷன் Pulmonary circulation) என்றும், தேகிகச்சுழற்சி (சிஸ்டமிக் சர்குலேஷன் Systemic circulation) என்றும் முறையே பெயர்களுண்டு. இவையிரண்டுமல்லாமல் இரத்தம் உதரப்பிரதேசங்களுக்குப் பிரிந்துபோகும்பொழுது, குடல்வழிக் கால்வாயிலுள்ள தந்துகிகளில் பிரிந்து புதுந்து மறுபடி ஒன்றுகூடி, பிறகு கல்லீரலில் இன்னொருதரம் பிரிந்து கூடியமேற்றான் இரத்தாசயத்தைச் சேர்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஆகையால் இப்படிப் பிரிந்துபோய்ப் பிறகு சேரும் இரத்தக்கால் சுழற்சிக்கு உதாரந்தாச்சுழற்சியென்று (போர்டல் சர்குலேஷன் portal circulation) வேறொரு சிறிய சுழற்சியும் உண்டென்று சொல்லலாம்.

இவ்விதம் தேகத்தில் இரத்தச் சுழற்சியிருக்கிறதென்பது 17-ம் துற்றாண்டின் முதல் பாகத்தில் ஹார்வி என்பவரால் முதற் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சுழற்சியின் போக்கில் இரத்தத்தை இடைவிடாது உந்திக்கொண்டிருப்பதற்கு முக்கிய விசை இரத்தாசயத்தின் பேசிகளால் உண்டாக்கப்படுகின்றது. இதுவுமல்லாமல் நாடிகளின் பித்திகைப் பேசிகள் இசிப்புள்ளவையாகையாலும், காளங்களைப் பேசிகள் அமுத்துவதாலும், கவாசர் விடுவதினால் மார்பின் பித்திகை அசைவதினாலும் இரத்தச் சுழற்சிக்கு ஆதரவுண்டாகின்றது. ஜீரணமாகும் சமயத்தில் தந்துகிப் பிரதேசங்களில் இரத்தத்திற்கும் தசைகளுக்கும் ஏற்படும் பரஸ்பர வியவகாரங்களாலும் சுழற்சிக்கு ஆதரவு ஏற்படுமென்றும் காண்கின்றது.


இரத்தப்போக்கைச் சரியாய் நிர்தாரணை செய்ய இருதய கபாடங்கள் உதவுகின்றன. இக்கபாடங்கள் இரத்தப் போக்கை அனுசரித்து இரத்தத்தைப் போகவிடவும் அதற்கு எதிர்ப்புறமாக எக்காரணத்தாலாவது இரத்தம் உந்தப்பட்டால் அந்தப்போக்கில் அதைப் போகவொட்டாமல் வழியை மூடிக்கொள்ளவும் அவைகள் உதவுகின்றன.

இவ்வோயா ஒட்டம் அனுபாலனமாய் வரும் கருத் தை முன் அத்தியாயத்தில் இரத்தத்தின் உபயோகங்களைக் குறித்த விஷயங்களிற் காணலாம்.

இருதயம்.

இருதயம் அல்லது இரத்தாசயம் என்னுங் கருவி பே சிகளாலாய் சுரைக்கருவியாகும். இதன் உட்புறத்தில் இர

16-ம் படம்.




16-ம் படம்.—பெஞ்சுறைக்குள் இரத்தாசயம் இருக்கும் விதம்.—
கீழே.

ண்டு அறைகள் அல்லது குழிகள் உண்டாகும்வண்ணம் பேசிகளால் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வலதுபுறம் ஒரு அறையும் இடதுபுறம் ஒரு அறையுமிருக்கின்றது. இவ்வறை ஒவ்வொன்றும் மேற்புறம் அடிப்புறம் என்று சொல்லும்படி மறுபடியும் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்புறத்து குழிகளுக்கு சிரவங்கள் என்றும், அடிப்புறத்திலிருக்கும் குழிகளுக்குச் சடரங்கள் என்றும் பெயர். சிரவங்களினின்று சடரங்களுக்கு இரத்தம்போகத் துவாரங்கள் இருக்கின்றன. இத்துவாரங்கள்வழியே இரத்தம் சடரங்களிலிருந்து சிரவங்களுக்குப்போகாமல் தடுப்பதற்கு இந்தத் துவாரங்களில் கபாடங்களிருக்கின்றன. ஆகவே இரத்தாசயத்தில் நான்கு குழிகள் இருக்கின்றன. இரண்டு

சிரவங்களும் இரண்டு சடரங்களும்மாம். ஒப்புறமிருக்கும் சிரவமும் சடரமும் மற்றப்புறமிருக்கும் சிரவசடரத்துடன் கொஞ்சமேனும் சம்பந்தமற்றிருக்கும்.

17-ம் படம்.

18-ம் படம்.



17-ம் படம்.—இரிகப் பேசிகளாகும் அவற்றின் குறுக்கிழைகளும்.—
கொல்லிக்.

18-ம் படம்.—மனிதனுடைய இரிகப் பேசிகளாகும் அவற்றின் கணுக்களும் பேசிக்காலங்களும்.—வீதிக்கீ ஸ்டீல்.

இருதய கபாடங்களின் ஒழுங்கோ இரத்தத்தை ஓர்புறத்தில் மாத்திரம் போகவிடும்.

வலச்சிரவத்தினின்று வலச்சடரத்தில் இரத்தம்புகும். அவ்விடமிருந்து புப்புசகாடிக்குட்செல்லும். புப்புசகாடியினால் துரையிலுள்ள தந்துகிக்கு இரத்தம் செலுத்தப்படும். துரையிலுள்ள இரத்தம் சுத்தமாக்கப்பெற்று கிறமாரி புப்புசகாளங்களிற் சேர்ந்து இடச்சிரவத்துக்குக் கொண்டுவரப்படும். இடச்சிரவத்திலிருந்து இடச்சடரத்துக்கு இரத்தஞ்சென்று அவ்விடமிருந்து பெருநாடிக்குச்சென்று அந்த நாடியினின்று தேகத்தின் ஒவ்வொருபாகத்திலுள்ள தந்துகிகளுக்கும் செல்லுகின்றது. கண்டரையின் கிளைகள் தேகமெங்கும் பரவி

யிருக்கிறபடியால் அவைகட்கு தேகிகநாடிகளென்று பெயர். இத்தேகிகநாடிகளினின்று தேகிக தந்துகிகளுட் சென்ற இரத்தம் அவ்விடங்களில் கறுத்து அசுத்தமாகி தேகிகநாளங்களின் கிளைகளிற் செல்லுகின்றது. இந்த நாளங்களின் கிளைகளொன்றாய்ச் சேர்ந்து இரண்டு பிரிவுகளாகின்றன. இப்பிரிவுகளுக்கு ஊர்த்தபிரஹன் நாளம் (சுபிரியர் வீனகேவ superior venacava) என்றும், அதோ பிரஹன் நாளம் (இன்பிரியர் வீனகேவ inferior vena cava) என்றும் பெயர். இவைகள் இரத்தத்தை வலது சிரவத்தில் மறுபடியும் கொண்டுவந்து சேர்க்கின்றன.


இருதய கபாடங்களின் கட்டடம்.

இருதய கபாடங்கள் நெகிழ்ந்துரழத்தக்க தசைகளாலும் சம்மந்தத் தசைகளாலும் அதிக துட்பமாயும் கன்றாயும் பின்னப்பட்டுத் தடித்த பிறைகள்போலிருக்கும். இருதயத்தினுட்புற சுவசமாகிய (endocardium) எண்டோகார்டியத்தில் பரிஸ்தாபிதத்தையும் அதிக துட்பமாய் அமையப்பெற்றுள்ளது. இருதயத்தினுட்பக்கத்தில் இரண்டு ஜதைக் கபாடங்கள் இருக்கின்றன. (1) சிரவச் சடர கபாடங்கள். (2) நாடிக்கபாடமாகிய பிறைக்கபாடங்கள்.

வலது சிரவத்திற்கும் சடரத்திற்கும் மத்தியிலிருக்கும் கபாடத்திற்கு முப்பிறைக் கோட்டுக்கபாடங்கள், திரி கபாடங்களென்று பெயர். ஏனெனில் அதை நோக்கினால் அதன் புரைகள் மூன்று பாகமாகப் பிரிந்து மூன்று பிறைக்கோடுகள்போல விபாகித்தாற்போலக் காணுகிறது. இடது சிரவத்திற்கும் சடரத்திற்கும் மத்தியிலிருப்பதற்கு இருபிறைக் கோட்டுக் கபாடங்கள், இவைய கபாடங்கள் என்று பெயர். ஏனெனில் இதின் புரைகள் இரண்டு பாகமாக விபாகித்தாற்போல் பிரிந்து இரண்டு பிறைக்கோடுகள்போல் காணுகிறது.

இந்த இரண்டு கபாடங்களிலும் ஊடே சிறிய கபாடங்களுமிருக்கின்றபடியால் சரியான கணக்கிற்கு ஒன்

19-ம் படம்.




19-ம் படம்.—இடது சிரவத்தையும் சடரத்தையும் பிளந்து அவற்றின் பின்புற இடது சுவர்களை நீக்கி அவற்றின் உட்புறத்தைக் காட்டும் படம். 1.—கண்டரை தெரியும்படி புப்புச நாடியை வெட்டியிருக்கின்றது. 1, வலப் புப்புச நாளங்கள் இரண்டையும் அடியோடே வெட்டப்பட்டிருக்கின்றது. சிரவத்தின் அவற்றின் வாய் தெரிகின்றது. 2, சிரவச் சடரத் தவாரத்தில் அவற்றின் பித்திகையின் பாகம் சோஞ்சமனவு காணும். 3, 3' சடரப் பித்திகையின் பாகம் வலவ மெலித்த 3' இரிகறளியை நோக்கிப் போகும். 4, இடது சடர பின்புற பித்திகையின் பாகமும் பின்புற மாம்ச ஸ்தம்பங்களும் மாம்ச முனைகளும். 5, 5', மாம்ச முனைகள். 6, 6' மிரி கபாடம். 7, அது கண்டரையிலிருக்கும் விதம். 7' கண்டரை பாகம்; 8, புப்புச நாடியின் அடிப்பாகமும் அதைச் சேர்ந்த ஹ்ருத்தசந்திர கபாடங்களும். 10, கண்டரையின் வகைவினியு நாடிகள் ஊலிக்கும் விதம்.—அவலன் நாய்சன்.

தில் ஆறாம் மற்றொன்றில் நான்குமிருக்கிறதைப் பாரக்
லாம். ஒவ்வொரு பாகமும் முக்கோண வடிவையுடைய
தாய் உச்சியும் பக்கங்களும் சடரக்குழியில் கட்டுப்பட்டு
மல் விழுந்துகிடக்கும். அதன் அடிப்பறம் மாத்திரம் அதற்
கடுத்த பாகங்களின் அடிப்பறங்களுடன் ஒன்றாகச்சேர்
ந்து சிரவச்சடரத் துவாரத்தைச் சுற்றி மோதிரம்போல
வளைந்துகொண்டிருக்கின்றது. இவ்வளைவு அச்சிரவச்சட
ரத் துவாரத்தைச் சுற்றியுள்ள தசைநார் மோதிரத்தில்
நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதில் அவ்விரண்டு உறு
ப்புகளின் ஊன் நார்கள் பிடிந்துமிருக்கின்றன. முக்கியமா
யுள்ள ஒவ்வொரு பிறைக்கோட்டிலும் ஒரு மத்தியத்துண்
டும் இருக்கின்றது. அது அடியிலிருந்து உச்சிவரையி
லும் செல்லுகின்றது. ஆனால் அதிள்ளவுமாத்திரம் பிறை
கோட்டின் அரை பங்குக்குமேல் குறைந்து இருக்கும்.
அதின் நடுப்பறம் தடித்துமிருக்கின்றது.

கபாடங்களின் அடிப்பாகங்கள் தசைநார் மோதிரங்க
ளில் கட்டுப்பட்டிருக்க, அவைகளின் சடரத்தை ஒட்டியிரு
க்கும் பரப்பும் ஓரங்களும் சடரச் சுவர்களில் அதிக துட்ப
மான தசைநார்களால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நார்க
ளுக்கு வன்னசை நார் (கார்டியே டெண்டினே chordae
tendinae) என்று பெயர். இவைகளின் மாம்ச நார்கள் நீள
த்தீர் கட்டிய நத்தைகள் போன்றவைகளாய் சடரக் குழிக
ளில் கீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. இவைகளுக்கு இரிகக்க
த்தைகள் (காலம்னே கார்னியே columnae carnae) என்று
பெயர். இந்த நீண்ட கட்டுகளை மாம்ச ஸ்தம்பம் என்று
சொல்லலாம். இந்த இரிகஸ்தம்பங்கள் எல்லாம் ஒரேமாதிரி
யானவைகளல்ல. இவைகளில் சில ஒருபக்கமுமாவதும்
அடுத்த பித்திகையில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. அவை
களின் முனைகளும் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. சிலவற்
திற்கு முனைகள் மாத்திரம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். வேறு
சில ஸ்தம்பங்களின் ஒரு முனைமாத்திரம் சடரங்களின்
சுவர்களில் ஒட்டிக்கொண்டு மற்றொரு முனை சடரக்குழி

20-ம் படம்.



20-ம் படம்.—வலது சிரவத்தையும் சடரத்தையும் பிளந்து அவற்றின்
பின்புற வலச்சுவர்களை நீக்கி அவற்றின் உட்புறத்தைக் காட்டும் படம்.
1, ஊர்த்த பிரஹன் நாளம்; 2, அதோ பிரஹன் நாளம்; 2', காலேய
நாளங்கள் ஒட்டி வட்டுண்டிருக்கின்றன; 3, வலச்சிரவம்; 4, வலச்சடரக்
குழி; 4', பெருத்த இரிகக் தத்தைகள் அல்லது மாம்ச ஸ்தம்பங்கள்;
5, 5', 5'', திரிகபாடம்; 6, அது புப்புசநாடியுள்ளிருக்கும் விதம்; 8, சிரவ
தனியும் புப்புசநாடியும் கண்டறவளைவை முட்டியிடம்; 10, இடச்சிரவம்;
11, இடச்சடரவெளிப்பாகம்.—அலன் தாம்சன்.

யில் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இவைகளுக்கு மஸ்குலை பேபிலாரிஸ் Musculie pappilaris என்று பெயர். நீண்டு நிற்கும் மாம்சம் என்று அர்த்தம். தரும் மாம்சமுனை எனலாம்.


திரி கபாடம், துவய கபாடம், இவ்விரண்டுவகைக் கபாடங்களும் இப்பொழுது சொல்லியவண்ணமே யிருக்கின்றன. துவய கபாடம் திரிகபாடத்தைவிட அதிக பலமுள்ளது. அதற்கு அதிக பலமும் வேண்டியதாகவேதானிருக்கிறதென்று பின்னாற்றெரியவரும்.

சடரங்களினின்று சிரவங்களுக்கு ஒரு புறத்தில் வழியிருப்பதுபோலவே, மற்றொரு புறத்தில், இரத்தாசயத்திலிருந்து இரத்தத்தை வெளியே கொண்டபோகும் பெரிய நாடிகளுக்கு அவை நின்றும், வழியிருக்கிறதென்று முன்னமேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; வலது சடரத்தினின்று துரை யிரலுக்கு இரத்தத்தைக்கொண்டபோகும் புப்புசநாடியுடனும், இடது சடரத்தினின்று தேசமுழுமைக்கும் இரத்தத்தைச் செலுத்தும் பெரு நாடியுடனும் கலந்திருக்கின்றது. எப்படி சிரவச்சடரத் துவாரங்களுக்குக் கபாடங்களிருக்கின்றனவோ, அப்படியே புப்புசநாடி பெருநாடி இவைகளின் வாய்களிலும் கபாடங்கள் இருக்கின்றன.

இந்த நாடிகளின் முகத்துவாரத்தைக் காப்பதற்குக் கபாடங்கள் மூன்று ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கின்றன. இவைகளுக்குப் பிறைக்கபாடங்கள் என்று பெயர். அர்த்த சந்திரகபாடங்கள் (செமிலூனார் வால்வஸ் semi lunar valves) என்றும் சொல்லலாம். சிரவச்சடர கபாடங்களும் மாதிரியே இவைகளும் நெகிழ்ந்துரழத்தக்கத் தசைகளாலும் தசை நாரங்களாலும் சமைக்கப்பட்டவை. இவைகள் மேல் இரத்தாசயத்தின் உட்புறகவசம் அதிக நுட்பமாய்ப் பரவியிருக்கின்றது. இரத்தாசயத்தின் இருபுறத்திலும் இவைகள் ஒரே மாதிரியாகத்தானிருக்கின்றன. ஆனால் பெருநாடியில் இவைகள் புப்புசநாடியில் இருப்பதை

தைவிட அதிக கனதிபுள்ளவைகளாகவும் அதிக வலிவுடன் கட்டப்பட்டவைகளாகவுமிருக்கின்றன. இப்படி அதிக பலமாயிருத்தலுக்குக் காரணமென்னவென்றால், இவைகள் அதிக உதைப்பைத் தாங்கவேண்டியிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கபாடமும் அர்த்தசந்திரன் மாதிரி வடிவுடையதாயிருக்கின்றது. நாடி சடரத்துடன் சேருமிடத்தில் தசைநாரினால் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு வளையத்தில் புறங்கவிந்துள்ள கபாடத்தின் மேற்பக்கம் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. கவிவான மற்ற பாகங்கள் பந்தப்படாமலிருக்கிற படியால் ஒவ்வொரு கபாடமும் ஒரு சிறிய பைபோலாய் விடுகின்றது. இது சொக்காயில் கடிக்காரம்வைத்துக்கொள்வதற்குச் செய்துகொள்ளும் பைகளைப்போல். ஒத்ததாகும். கபாடத்தில் நார்த்தசையால் செய்யப்பட்ட நுட்பமான கயிறுமிருக்கின்றது. அதின் பந்தமற்ற இருபுறமத்தியிலும் ஒரு நுட்பமான நார்முடிப்பும் இருக்கின்றது. இதற்கு கார்பஸ் ஆரண்டை (corpus arantii) என்று பெயர். இதினின்றும் கட்டுப்பட்டிருக்கும் ஓரத்தினின் தும் அதிக நுட்பமான நார்கள் கபாடத்தின் முத்தியிருக்கும் வஸ்துவின் ஒவ்வொரு பாகத்திலுஞ் செல்லுகின்றன. முடிப்பின் இருபக்கத்திலும் கொஞ்சமிடத்திற்கு மாத்திரம் இந்த நார்கள் வருகிறதில்லை. இப்படி நார்கள் வராமலிருக்குமிடம் மிகவும் மெலியதாயும், பிறைச் சந்திரனுருவு போன்றதாயுமிருக்கின்றது. இவ்வண்ணமாகக் கட்டடங்களைப்பெற்றும், ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிற பிறைக்கபாடங்கள் மூன்றும் ஒன்றின் பக்கம் ஒன்றாக ஒவ்வொரு சடரத்திற்குடுத்த நாடித்துவாரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவை, மூன்று சிறிய பைகள் போன்றவையாகும். சடரத்தினின்றும் இரத்தம் நாடிகளில் வரும்பொழுது இந்தப் பைகள் தட்டையாய்க் கீழே படுத்துப்போகும். ஆனால் போன இரத்தம் திரும்பி வராமல் தடுத்துக்கொள்வதற்காக உடனே உப்பி நிற்கும். இதைப்பற்றி யின்னம் கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் சொல்லப்படும்.

21-ம் படம்.



21-ம் படம்.—இரத்தாசயமும், நரையீரல்களும் அவையிருக்கும் ஸ்தானத்தில் காட்டும் காட்சி, மார்பு பித்திகையின் முன்பாகவும் இரிகப்போர்வையின் வெளிப்பாக இதழ்களும் எடுத்துவிடப்பட்டிருக்கின்றன. நரையீரல்கள் கொஞ்சமளவு சுருங்கிக் கிடக்கின்றன.—தரீக்.

இரத்தாசயத்தின் செய்கை.

இரத்தாசயம், தன்னுடைய இரண்டு சிரவங்களினுடையவும் இரண்டு சடரங்களினுடையவும் தசைச்சுவர்கள் விடாமல் மாறிமாறி குறுகி விரிவதினால் தன்னிடத்திலிருந்து இரத்தத்தை உந்தித்தள்ளுகின்றது. சிரவங்கள் ஒரே காலத்தில் குறுகும். இவை குறுகினவுடனே சடரங்களிரண்டும் குறுகும். இரத்தாசயத்தின் செய்கையை விவரிப்பதில், அது மார்பின்மேல் அடிக்குமுன் இருக்கும் ஸ்திதியில் ஆரம்பிப்போம். ஏனெனில் அந்தக்காலத்தில் இரத்தாசயமுழுவதும் நுங்கியவண்ணம் செயலற்ற ஸ்திதியிலிருக்கும். சிரவங்களினுடையவும் சடரங்களினுடையவும் சுவர்கள் தளர்ந்து அயர்வுற்றிருக்கும். அவைகளின் குழிகளும் விரிந்திருக்கும். நாளங்களினின்று இரத்தம் கிரமேணபாய்ந்து சிரவங்கள் நிறைந்து கொண்டுவரும்.

கும். இந்த இரத்தத்திற் கொஞ்சம் உடனே சடரங்களுக்கும் போய்விடும். ஏனெனில் அந்த செயலற்ற சமயத்தில் சிரவக்குழிகளும் அவைகளைச்சேர்ந்த சடரக் குழிகளும் மத்தியிலிருக்கும் வழிதிறந்து செயலற்றிருக்கும். சிரவங்களில் அதிக இரத்தம் படிவதினால் செயலற்ற சமயார்த்தத்தில் அவைகள் பூரணமாய் நிரம்புகின்றது. அதற்குப்பிறகு அவைகள் சுருங்கி அவைகளிலுள்ள இரத்தத்தை சடரங்களுக்குள் தள்ளுகின்றன. சிரவங்களுடைய சுருக்கம் சமீபியாயும் அதிசீக்கிரமாயும் இருக்கும். பெரிய நாளங்கள் அவைகளைச் சேருமிடத்திலிருந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கின்றன. அவ்விடமிருந்து சிரவச் சடரத்துவாரமிருக்குமிடம் வரை சுருங்கிக்கொண்டேபோகும். ஆனால் கடைசியாகச் சுருங்குவது சிரவத்தின் மேற்பாகமாகவும் முன்புறமாகவும் இருக்கும் சிரவானுபந்தம் (ஆரிகுலர் அப்பெண்டிக்ஸ் auricular appendix) என்பதேயாம். சிரவங்கள் இந்த மாதிரி சுருங்குவதின் பயன், அவை நின்று சடரங்களுக்குப்போகும் இரத்தத்தைச் சீக்கிரம் போகும்படி செய்வதேயாகும். சாதாரண சமயங்களில் இவைகள் சுருங்குவதினால், இரத்தத்தை அது வந்த நாளங்களுக்கு மடக்கி ஓட்ட சக்தியற்றநாகனிருக்கின்றது. இரத்தம் மடங்கி நாளங்களுள் புகாதவண்ணம் அவைகளிலுள்ள இரத்தப்பெருக்கமும், அந்த இரத்தம் சிரவங்களில் பாயும் வேகமும் தடுப்பதுமன்றி, சிரவங்களுடன்பெரிய நாளங்கள் சேருமிடத்தில் அவைகளினுடைய சதைகளும் அதே காலத்தில் சுருங்குவதினாலும் தடைப்படுகின்றது. வலது சிரவத்தினின்று ஏதாவது கொஞ்சம் இரத்தம் பின் உதைந்து வருமானால், அது, தோள், நாளங்களும் கழுத்து நாளங்களும் சேருமிடத்திலிருக்கும் கபாடங்களால் அதிச்சீக்கிரமீக்காமல் நிறுத்தப்படும். இரத்தாசயத்தின் வஸ்துவில் ஊடே சென்றுவரும் இரத்தக் குழலாகிய காரனெரி வெயின் என்னும் இரிக நாளமானது வலது சிரவத்துக்கு இரத்தத்தைக் கொண்டுவருகிறது. இதற்கும் ஒரு கபாடமிருக்கிறபடியால் பின்தாங்கிய இரத்தம் இதிலும்

பிரவேசிக்க விடமில்லை. சிரவச்சுருக்கத்தில், சடரத்துள் தள்ளிய இரத்தத்தின் வேகம் பலதிக்குகளிலும் பரவுகின்றது. ஆனால் அப்பிறைக்கபாடங்களைத் திறக்க சக்தியற்றதானபடியால் கிரமேண சிரவச்சடரகபாடங்களைத் தூக்கிவிட்டு மூடிக்கொள்ளும்படி செய்கின்றது. சிரவச்சுருக்கத்தினால் தள்ளப்பட்ட இரத்தம் சடரத்தில் முதலில் வந்த இரத்தத்துடன் கலப்பதினால் சடரம் நிறைந்து உப்புக்கின்றது. இப்படி சடரவிரிவு முடிவுபெறுகின்றது. விரிந்தவுடன் சடரங்கள் சுருங்கும். அதிவிரைவில் சுருங்குவதினால் சிரவத்தின் சுருக்கத்துடன் சோந்த சுருக்கம் போலவே காணும். சடரங்கள் சிரவங்களைவிட கொஞ்சம் நிகராமாய்ச் சுருங்கும். ஆகையினால் சடரங்களில் சுருங்கிய பிறகு கொஞ்சம் இரத்தம் தங்கியிருக்கும். சடரத்தின் உட்புறச்சுவற்றிலிருக்கும் மாமிச ஸ்தம்பங்களும், அவைகளின் வடிவுகளும் சடரம் சுருங்கினால் உள்ளே கொஞ்சங்கூட பள்ளங்களில்லாமல் துத்துக்கொள்ளும் படியிருக்கிறபடியால் இரத்தம் அணுவளவும் தங்குகிறதில்லை.

சடரங்கள் தங்களுக்குள் இரத்தம் இருக்கும்பொழுது சுருங்குவதினால் அவைகளினுட்பக்கத்தில் எல்லாவிடங்களிலும் வேகம் தாக்குகின்றது; இரண்டி சதைக் கபாடங்களின்மேலும் வேகம் தாக்குகின்றது. ஆனால் அத்தாக்குதலின் குணம் அவைகளில் ஒன்றினின்று மற்றொன்று வேறுபடுகிறது.

சிரவச் சடரகபாடங்கள் ஒன்றுடனொன்று அழுக்கப் பெற்று கட்டியாய் மூடிக்கொண்டு, இரத்தம் சிரவத்தினுட்போகாமல் வழியை அடைத்துவிடுகின்றன. சடரங்கள் சுருங்கியபிறகு, வழியை அடைத்துக்கொண்டிருக்கிற பிறைக்கபாடங்களோ அதே வேகத்தினால் திறக்கப்படுகின்றன. ஆகையினால் சுருங்கும் சடரங்களின் சக்தியெல்லாம் இரத்தத்தை அவைகளிலின்புறம் பெருநாடி புப்புச நாடிவழியாய் தள்ள உதவுகின்றது. சிரவச் சடரகபாடங்கள் இந்த உதைப்பினால் சிரவத்துக்குள் மடிந்துபோகா

மல், அவைகளை ஒட்டி சடரத்திலிருக்கும் நார்போன்ற கயிறுகளும் சுருங்குவதினால் தடுத்துவிடுகின்றன.

இரத்தாசயத்தின் இருபக்கத்திலும் உள்ள சிரவச் சடரகபாடங்கள் இத்தன்மைத்தானவேயாம். ஆனால் திரிகபாடங்கள் சிலசமயங்களில் அவ்வளவு பூர்த்தியாக மூடிக்கொண்டிருக்கின்றன. அதினால் அச்சமயங்களில் கொஞ்சம் இரத்தம் சிரவத்தினுள் திரும்பிவருகின்றது. இப்படியாகிறது எப்பொழுதென்றால்: சடரங்கள் சுருங்கும்பொழுது நாரையீரல் நிறைந்திருந்தால் இந்தப்படியாகும். உதாரணமாக: சில புப்புச வியாதிகளிலும், அதிக சுறுசுறுப்பாய் வேலைசெய்யும்பொழுதும், தேகத்தினால் பெருமூயற்சிகள் செய்யும்பொழுதும் இந்தப்பிரகாரம் ஆகும். இக்காலங்களில் திரிகபாடம் பூரணமாய் மூடாமல் இரத்தம் பின் உதைந்துவருவதை கண்ட நாளங்களும் கண்ட நாடிகளும் துடிப்பதினால் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

கபாடங்களாகிய பிறைக்கபாடங்கள் வெளியே ஓடும் இரத்தத்தால் திறக்கப்படும் நாடிகளின் பக்கங்களை விரியச் செய்கின்றது. நாடிகள் விரிவதினால் கபாடங்களின் வேலைத்தன்மை வெளியாகின்றது. பிறைக்கபாடங்களின் கிழப்புற ஓரங்களின் தசைநார் வளையத்தின் உட்புறத்தில் பிணைக்கப்படுகிறதாமல்லாமல், சடரத்தின் தசைநார்களுக்கும், நாடியின் நெகிழ்ந்துழைத்தக்க நார்களுள் மத்தியிலும், நாடியின் முகத்துவாரத்திலும் இருக்கின்றது. இந்த வளையத்தின் தசைகள் உறுதியானவைகள். கபாடங்களும் நார்த்தசைகளாலும் கயிறுகளாலும் பின்னப்பட்டு, இரத்தாசய உட்புற கவசத்தினாலும் மூடப்பட்டவைகளாகையால் இதைப்போலவே உறுதியானவைகளாயிருக்கின்றன. ஆகையினால் சடரங்கள் தமது துவாரங்கள் வழியாய் இரத்தத்தை நாடிக்கால்வாயில் தள்ளும்பொழுது இரத்தத்தின் பக்க உதைப்பினால் நாடியின் சுவர்கள் விரிகின்றன. ஆனால் இந்த வேகம் உறுதியாயுள்ள கபாடங்

னையும் அவைகளின் வளையத்தையும் உதைந்துள்ள சக்தியற்றிருக்கின்றது. ஆகையினால் சடரம் சுருங்கும்பொழுதெல்லாம் நாடியின் ஆரம்பமாகச் சுவர்கள் விரிந்து, கபாடத்திற்கும் விரிந்த பாகத்திற்கும் மத்தியில் பைகள் போலாகின்றன. இப்படி மூன்று சிறு பைகள் ஆகின்றன. கபாடங்களின் கட்டுப்படாத ஓரங்கள் நாடிக்குள் சுவற்றையடுத்துக்கிடந்ததானவைகள் இப்போது ஒன்றுடன் ஒன்று கூடி நாடிநடுவில் நின்றுவிடுகின்றன.

இந்தமாதிரியாக நாடி சுவர்களும் கபாடங்களும் இவைகளின் நடுவில் இடம் உடையனவையெல்லாம் சடரச் சுருக்கம் இருக்கிறவரையிலிருக்கின்றன. ஆனால் அது விரியத்துடங்கி, உடனே விரிந்த நாடியின் சுவர்கள் முன்னிருந்த ஸ்திதிக்கு வந்துவிடுகின்றன. ஏனெனில் அவைகளில் நெகிழ்ந்தாழத்தக்கத் தசைகளிருக்கின்றன. இப்படி எதாஸ்திதிக்கு வருகிறபடியால் இரத்தத்தை அவ்விடமிருந்து தள்ளுகின்றன. தள்ளிய இரத்தம் கால்வாய்வழியாக இரத்தப்போக்கை அனுசரித்துச் செல்லும். சொச்சம் இரத்தம் பின்னுக்குச் சென்றால் நாடிச்சுவர்களுக்கும் கபாடங்களுக்கும் மத்தியிலுண்டாகும் சிறு பைகளில் நின்றுவிடுகின்றது. இரத்தம் இப்படித் தங்குவதினால் கபாடங்களினிதழ்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு, அவைகளின் பிறைபோன்ற ஓரங்கள் மூன்று தீந்துகளாகக் காணும்.

இந்தப்பிரகாரம் கபாடங்கள் சேர்வதும் நாடி முகத்துவாரம் பூர்த்தியாயடைப்போவதும் கபாடங்களினிடைய ஓரங்களின் கட்டுபட்டத் தன்மையாலேயாம்.

கபாட வஸ்துக்களில் நெய்யப்பட்டிருக்கும் நார்த்தகயிறுகளுள் இரண்டு மற்றவைகளேவிட அதிக பலமானவைகளாகவும் அதைப்புள்ளவைகளாகவும் இருக்கின்றன. அவைகளில் ஒன்று ஒவ்வொரு கபாடத்தின் கட்டுப்படாத ஓரங்களிலும், மற்றொன்று அவ்வோரங்களின் அடியில்

தோரணம்போலவுமிருக்கின்றன. இந்தக் கயிறுகளில் ஒரு துணி கபாடத்தின் துணிக்குக் கட்டப்பட்டும், மற்ற துணி கபாடமத்தியிலிருக்கும் கார்பஸ் ஆரன்டை என்பதிலும் பந்தப்பட்டுமிருக்கின்றன. இந்தக் கபாடங்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று உதைவதினாலமாதிரிமேயல்ல, இந்தக் கயிறுகளினாலும் இந்தக் கயிறுகளின் இடையிலிருக்கும் அதிதுட்பத தசைகளாலும் நாடிகளின் முகத்துவாரம் முடிப்போகின்றது. அவைகளின் உதைப்பு அதிகமானால் அதிக பிசுவாய் மூடும். இரத்தம் பின்னோட்டமடையாமல் தடுப்பதற்கு இந்தக் கபாடங்கள் மாதிரிமே உதவுகின்றவைகள் அல்ல. தூதனமாய் சில பரீட்சைகள் செய்ததில் சடரங்களின் வெளித்தசைகளும் பின்னோட்டத்தைத் தடுக்க உதவுகின்றனவென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

சிரவங்கள் சுருங்கியானவுடன் விரியத் துவங்குகின்றன. விரிவதினால் பெரிய நாளக்கால்களினின்றும் இடைவிடாதுவரும் இரத்தத்தால் நிறையப்படுகின்றன. சடரங்கள் சுருங்கிக்கொண்டிருக்கும் காலமுழுவதிலும் அவைகள் நிறைந்துகொண்டிருக்கின்றன. சடரங்கள் சுருங்கி முடிந்தவுடன் அவைகளும் விரிகின்றன. விரிந்து சிரவங்களினின்றும் வரும் இரத்தத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுகின்றன. சடரங்களின் மூன்றில் ஒருபாகத்தில் முதல் இரண்டு பாகம்வரை நிறைந்துகொண்டிருக்கும்பொழுது சிரவங்கள் விரிகின்றன. இவைகள் சமீதியில் சுருங்க சடரங்கள் நிறைந்துபோகின்றன.

இரத்தம் சுற்றி ஒருதரம் வருவதற்கு ஒரு நிமிஷமாகுமென்று உத்தேசம் வைத்துக்கொண்டு, சிரவங்கள் சுருங்குவதும், சடரங்கள் சுருங்குவதும், அதற்குப்பிறகு அவைகள் வேலையற்றிருப்பதும் ஒரு நிமிஷத்திற்குக் கொஞ்சம் மேலாகுமென்றும் உத்தேச டிரீனயம் செய்து கொண்டால், பின்வருமாறு நிமிஷ தாமசத்தில் நாம் எடுத்துச்சொல்லிய சகல சங்கதிகளும் நடக்கும்.

சிரவச்சுருக்கம் 1+சிரவம்வேலையற்றிருப்பது 10=11
 சடரச்சுருக்கம் 4+சடரவேலையற்றிருப்பது 7=11
 வேலையற்றிருப்பது, சிரவங்களும்
 சடரங்களும்சுருங்
 காமலிருப்பது 6+சிரவமாவது, ஜடரமாவது

சுருங்குவது. 5=11
 11

இருதயத்தின் வேகமதிக்கப்பட்டால் இரத்தாசயச் சுழலின் விசை குறைவுபடுகிறது நிஜமே. இந்தக்குறைவினால் விரியும் காலமும் வேலையற்றிருக்கும் காலமுமே பாதகமுடைகின்றது. நாடிவேகம் எப்படியிருந்தபோதிலும் சடரச்சுருக்கம் 4/19 நிமிஷமுடைத்தானதாகவே யிருக்கும்.

மேற்சொல்லிய கணக்கில் இருதய கபாடங்களின் வேலையையும் காலமும் காணலாம். சடரச்சுருக்கக் காலத்தில் சிரவச்சடர கபாடங்கள் மூடியும், நாடி கபாடங்கள் திறந்துமிருக்கும். சடரங்கள் விரியும் காலத்தில் பின் சொன்னவை மூடி முன்சொன்னவை திறந்திருக்கும்.

இரத்தாசயமிருக்கும் பாகத்தில் காதைவைத்துக் கேட்டால் இரத்தாசயத்தின் ஒவ்வோரடிக்கும் இரண்டு சத்தங்கள் கேட்கும். இந்த இரண்டு சத்தங்களும் ஒன்றின் பின் ஒன்று வேகமாய் வரும்; அதன் பிறகு கொஞ்சநேரம் சப்தமற்று விராமமாயிருக்கும்; முதல் சத்தம் மெதுவாயும் நீண்டிருக்கும். அதின் ஆரம்பம் இரத்தாசயத்தில் அசைவாரம்பமாகும்பொழுது உண்டாகின்றது. கைமுனையில் நாடியடிப்பதற்கு சற்றுமுந்தியிருக்கும். இரண்டாவது சத்தம் சுருங்கினதாயும் உரமுள்ளதாகவுமிருக்கும். இது கைமுனையில் நாடியடித்தவுடனே கேட்கும். இந்த இரண்டு சத்தத்தின் கால அளவும், அதற்குப் பிந்திவரும் விராமகால அளவும் சரியானதாயிருக்கின்றது. ஆனால் இந்தச் சத்தங்களின் கால அளவுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்

வளவு வேறுபடுகிறதென்று சொல்வதற்குத் தெரியவில்லை. வித்தியாசமிருக்கிறதென்பது இச்சத்தங்கள் உண்டாகும் காரணங்களைப்பார்த்தால் தெரியும். ஒரு சத்தமாவதற்குக் காரணம், தசை நார்கள் பலமாயும் நிகரானமாயும் சுருங்கி அவையுள்ளிருக்கும் திரவத்தை அதிக எதிர்ப்பின்பேரில் தள்ளுகிறதினால் உண்டாவதாகும். மற்ற சத்தமோ, பலமானதும் ஆனால் கால அளவில் குறைந்ததும் சடுதியாயடிப்பதுமான பெரிய நாடிகளின் நிகழ்ந்தாலும் கவசங்களின் பின் உதைப்பாகும்.

காலக்கிரமத்தில் இச்சத்தங்களைச் சாத்துவரும் காரியங்களாவன: முதல் சத்தத்துடனும் டரங்-லின் சுருக்கமும், சிரவங்கள் விரியின் முதல்பாகமும், சிரவச் சடரகபாடங்கள் மூடிக்கொள்வதும், பிறைக்கபாடங்கள் மூடிக்கொள்வதும், நாடிகளில் இரத்தத்தை உந்தித் தள்ளுவதும் பொருந்துகின்றன. சத்தம் கேட்டபிறகு ஒரு நிமிஷத்தின் முப்பதில் ஒருபாக அளவுகாலத்தில், முதல்த் நாடிகள் அடிக்கின்றன. நிமிஷத்தின் ஆறில் ஒரு கால அளவில் கணுக்கை நாடிகள் அடிக்கின்றன. காலக்கிரமத்தில் இரண்டாவது சத்தமானது சடரங்களின் சுருக்கம் மூடிந்தவுடனுண்டாகிறது. பிறைக்கபாடங்கள் சாத்துவதும், கொஞ்சம் விரிந்த சிரவங்கள் விரிந்துமூடிவதும், சடரங்கள் விரிவதற்கு ஆரம்பிப்பதும், சிரவச்சடரகபாடங்கள் திறக்கும் காலங்களையும் பொருந்தியிருக்கும்.

இரண்டாவது சத்தத்தின் பிறகு உடனே விராமம் வருகின்றது. இந்த விராமத்தின் முதற்பாகம் சிரவங்களின் விரிதல் முடிவடைந்த காலத்துடனும், அதனிரண்டாம் பாகம் அவைகளின் சுருக்கத்துடனும் சடரங்கள் விரிவதுடனும் ஒக்கும். இந்த விராமகால முழுமையிலும் சிரவச் சடரகபாடங்கள் திறந்தும், நாடிக் கபாடங்கள் மூடியிருக்கும்.

முதல் சத்தத்தின் முந்தியகாரணம் சிரவச் சடரகபாடங்களின் அசைவினாலும், சடர கவந்துகளின் அசைவா

லும் பெருநாடி புப்புசநாடி இவைகளின் கவசங்களின் அசைவாலும் உண்டாகிறதென்று தோன்றுகிறது. ஏனெனில் சடரங்கள் சுருங்கும்பொழுது இவைகள் எல்லாம் விசையுடன் சுண்டி னுற்போலாகின்றன. தவிர சடரத்தின் தசைநார்கள் இறுகுவதிலும் இச்சத்தம் அதிகமாய்த் தொனிக்கின்றது. இரண்டாவது சத்தம் முதல் சத்தத் தைவிட அதிக சுருவாய் விளக்கத்தக்கது. பிறைக்கபாடங் கள் பெருநாடி புப்புசநாடி இவைகளின் வாயில் உறையும் பொழுது அவைகளிலுண்டாகும் அதிர்ச்சியினற்றான் உண்டாகும். இதுதான் இரண்டாவது சத்தத் து பரிசைகளால் தெரியப்படுகின்றது. அதுவும்தவிர இந்த கபாடங்களில் விபாதிபுண்டாகி இவைகள் தங்கள் கருமத்தை, சரியாய்ச்செய்யுமாற் போய்விட்டால், இந்த இரண்டாவது சத்தம் மலினமடைந தும் சில சமயங்களில் நாசமடைந்துமிருக்கின்றது.

விராமத்தின் முடிவில் சிரவங்கள் சுருங்குவதில் உண்டாகும் சத்தம் வெளியே கேட்கிறதில்லை. ஆனால் இரத்தாசயம் திறக்கப்பட்டிருந்தால் சுவாசாசய ஸ்திதி யுணர்ந்தும் கருவியாகிய (stethoscope) ஸ்திதாஸ்கோப் பை வைத்துக்கேட்டால் சடரச்சுருக்கத்தினாலுண்டாகும் சத்தத்திற்குமுந்தி கொஞ்சம் மெதுவாய் கேட்கும். இந்த சத்தம் பின்வரும் சடரச்சுருக்கத்தின் சத்தத்துடன் சேர் ந்துவிடுகிறது.

இரத்தாசயத்தின் அடிப்பு: சடரச்சுருக்கத்தின் ஆர ம்பத்தில் மார்பில் கையை வைத்துப்பார்த்தால் இரத்தா சயம் மார்பின்சுவற்றில் அடிக்கிறது தோற்றும். இதற்கு மாரடிப்பு என்றும் சாதாரணமாய் வழங்கப்படுகிறது. இத ற்கு உழப்பு (impulse இம்பல்ஸ்) என்று பெயர். இந்த அடிப்பு ஐந்தாவது விலாவெலும்புக்கும் ஆறாவது விலா வெலும்புக்கும் மத்தியிலும், மார்க்கண்ட எலும்பு (வசுஷ) க்கு இடதுபுறம் ஒரு அங்குலம் இரண்டங்குலத்துக்குள் ளாகவும் உள்ள இடத்தில் நன்றாய்த் தெரிகின்றது. அடி

ப்பின் வேகமும் அது மேற்கண்ட இடத்திற்கப்புறம் எவ்வளவு தூரத்திற் கேட்குமென்பதும் மனிதர்களில் வித்தியாசப்படுவதும்ல்லாமல் ஒரே மனிதனில் பலகாலங் களிலும் வித்தியாசப்பட்டாலும் படலாம். திருடமான கொழுத்த சரீரங்களைவிட மெலிந்துபோனவர்களில் அதி ஸ்பஷ்டமாயும் அதிக விஸ்தீரணத்திலும் கேட்கின்றது. முக்கின்வழி சுவாசத்தை உள்ளுக்கிழுக்கும்பொழுதை விட வேணுமென்று முச்சை வெளியிடுங்காலத்திலும் நன்றாய் கேட்கும். மேற்சொன்ன விஷயங்களில் ஒன் றில் இரத்தாசயத்திற்கும் மார்பின் மேல்புறத்திற்கும் மத்தியில் கொழுப்பாவது தசைகளாவது இருப்பதின லும், மற்றொன்றில் துரை யீரல் சுவாசமுட்கொண்டு உப்பி இரத்தாசயத்தின்மேல் கவிந்துகொண்டிருப்பதின லும் அடியை வெளிக்கு நன்றாய்ச் செல்லவொட்டுகிற தில்லை. இரத்தாசயம் ஊக்கத்துடன் அடித்துக்கொண் டால் முக்கியமாய் சடரங்கள் பிணியினால் பெரியதாகி யிருந்தால் அடிப்பு உறத்திருக்கும். இரத்தாசயம் சோர் வற்றிருக்கும் சமயமானாலும் சடரச்சுவர்கள் நோவினால் மெலிவுபட்டிருந்தாலும் அடிப்பு பலவீனப்பட்டிருக்கும்.

இந்த அடிப்புக்குக் காரணம் என்னவென்றால்:—

(1) இரத்தாசயத்தின் உச்சி கொஞ்சம் முன்புறம் ஒருச் சாய்வாகி மார்பினுடைய சுவற்றின்மேல் தாக்குகின் றது. இந்த தாக்குதலினால் உண்டாகும் குணம் அதிக சொல்பமேயாகும். ஆயினும் இரிக உழப்புக்கு முக்கிய காரணமாயுள்ளது (2) இரத்தாசயம் வடிவு மாறுவதே. சடரங்கள் சுருங்கும்பொழுது இரத்தாசயத்தினடி அதன் உச்சிக்குசமீபம் வருவதால் இரத்தாசயம் அதிக குண்டா மாக ஆய்விடுகிறது. அதனால் அது பருமனாகின்றது. இப்படி பருமனாவதினால் அடிப்பு உண்டாகிறதென்பது விரலை மார்பின் மேற்பக்கம் அல்லது விதானத்தின் கீழா வது வைத்துப் பார்த்தால் நன்றாய்த் தெரியும். இதுவுமல் லாமல் (3) பெருநாடியின் சடரத்தினால் தள்ளப்பட்ட இர

த்தம் நிறைந்து அதன் வளைவுமாழி விரைத்துக்கொள்வதினாலும் (4) இரத்தாசயத்தின் அடியிலிருக்கும் நெகிழ்ந்தாழத்தக்க பாகங்கள் விரைத்துக்கொள்வதினாலும் இந்த அடிப்புக்கு ஒத்தாசையிருக்குமென்றும் தோன்றுகிறது.

இரத்தாசயம் தேய்வேலையின் பலமுறை வருதலும் அதன் வேகமும்.

வியாதியற்ற மனிதனுடைய ஆயுள்பிரமாணம் மத்திய காலங்களில் இரத்தாசயம் ஒரு நிமிஷத்தில் எழுபது முதல் எழுபத்தைந்துதரம் வரையில் சுருங்கும். இது நாடிகளின் நாடியை ஒத்திருக்கிறது. ஆனால் சவுக்கியஸ்திதியிலும் கூட அநேக காரணங்களால் இந்த விகிதம் (அளவு) மாறுகின்றது. அவைகளில் முக்கியமானவைகளாவன.—வயது, குணபேதம், சாதியேதம், ஊனும் பானமும், தேகமுயற்சி, தினத்தின் வேளை தேகமிருக்கும் நிலை, ஆகச் அழுத்தத்தின் வேகம், கால நிலைமை இவைபேயாம்.

சவுக்கியமாயிருக்கும்பொழுது நாடி அடிக்கும் முறைக்கும், சுவாசத்தின் முறைக்கும் வேறுபடாத சம்மந்தமிருக்கிறதென்று காணப்படுகின்றது. இதன் அம்சம் என்னவென்றால் சராசரியாக ஒரு சுவாசத்திற்கு மூன்று அல்லது நான்கு நாடிகளிருக்கும். சவுக்கியஸ்திதியில் சாப்பாடு அல்லது தேகமுயற்சி முதலான காரணங்களால் நாடி தீவிரப்பட்டால் சுவாசமும் தீவிரப்பட்டு ஒன்றுக்கொன்று அப்பரிமாணத்திலேயே நிற்கும். ஆனால் வியாதிஸ்திதியில் அந்த விகிதம் மாறிவிடுகின்றது. நாடி அதிகப்படும் அநேக வியாதிகளில் சுவாசமும் அதிகப்படும். ஆனால் இந்தப் பரிமாண அம்சம் மாறிவிடும். அநேக வியாதிகளில் நாடி அதிகப்பட்டபோதிலும் சுவாசமதிகப்படுகிறதில்லை. இன்னம் சில வியாதிகளில் சுவாசம் அதிகப்பட்டு நாடி நிதானமாயிருத்தலும் அல்லது சாதாரணமாயிருப்பதைவிடக் குறைந்துபோவதுமுண்டு.

இரத்தாசயத்தின் இடதுசுடரம் சுருங்குவதினால் உண்டாகும் வேகம் வலதுசுடரம் சுருங்குவதினாலும்

டாகும் வேகத்திற்கு இரண்டுமடங்காகும். இதற்குக் காரணம் இடது சுடரச்சுவர்கள் வலது சுடரச்சுவர்களைவிட இரண்டுமடங்கு கனத்திருப்பதிலேயாம். இந்தக் கனம் இதற்கு வேண்டியதாகவுமிருக்கின்றது. இதிலின்றும் தேகத்தில் சுகல பாகங்களுக்கும் இரத்தம்போகிறபடியால், இந்த இரத்தப்போக்குகளின் எதிர்ப்பை பொறுத்துத் தள்ளவேண்டியதற்காக அதிக கனம் வேண்டியிருக்கிறது. வலது சுடரத்தினின்று இரத்தம் துரையீரலுக்குமாத்திரம் போகிறபடியால் அந்த இரத்தப்போக்கில் எதிர்ப்பு குறைவதினால் அங்ஙனவு வேகமாய்ச் தள்ள அவசியமற்றிருக்கின்றது.

சிரவங்கள் சுருங்குவதில் உபயோகிக்கும் வேகத்தை இதுவரையிலும் நீக்காணை செய்யப்படவில்லை. சிரவங்களாவது சுடரங்களாவது எவ்வளவு வேகத்துடன் விரிகின்றனவென்பதும் நிர்ணயமாகவில்லை.

இரண்டு சுடரங்களின் பரிமாணமும் சரியாயிருக்குமென்று காண்கிறது. இது எவ்வளவு என்று நிச்சயமாய்ச்சொல்வது கஷ்டமாயிருக்கிறது. அநேக உத்தேச அளவுகளினின்றும் சராசரி பாரக்குமிடம் சுடரங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று ஆவுள்கு இரத்தம் கொள்ளக்கூடுமென்றும் காணுகிறது. இந்த அளவு இரத்தம் முழுமையையும் அது சுருங்கும்பொழுது அதைச்சேர்ந்த நாடிகளில் தள்ளிவிடுகிறது.

சிரவங்களின் பரிமாணம் சுடரங்களின் பரிமாணத்தைவிட கொஞ்சம் குறைந்திருக்கும். அவைகளின் சுவர்களின் கனமும் அதிக குறைவாயிருக்கின்றது. பின்சொல்லிய விஷயம் அவைகளுக்குள்ள சொல்ப வேலைக்குத் தக்கபடி யிருக்கிறது. சுடரங்களில் இரத்தத்தைச் செலுத்தும் தொழிலே அவைகளுக்குள்ளது. முன்சொல்லிய விஷயம் அதாவது பரிமாணக்குறைவின் காரணம்: சிரவங்கள் சுருங்க ஆரம்பிக்கிறதற்கு முந்தியே சுடரங்

களில் இரத்தம் கொஞ்சம் சேருகிறபடியால் சிரவங்களின் பரிமாணம் குறைவாயிருக்கிறதென்று காண்கிறது.

இரத்தாசய வேலையைப்பற்றிய நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ள சக்தி.

இரத்தாசயத்தின் சுவர்களிலேயே நரம்புமுடிகளும், அணுவகளை ஒன்றுக்கொன்று சம்மந்தம் செய்யும் நரம்பு நார்தளும் இருக்கின்றன. இவைகளினால் இரத்தாசயத்தின் செயல் நடந்துகொண்டு வருகின்றது.

சாதாரண நிலைமைகளில், இரத்தாசயக் குழிகளின் உட்புற கவசத்தை இரத்தம் தொடுவதும், இரத்தாசயக் குழிகள் உடனே விரிவடைவதும் (நரம்பின் வியாபாரத்துக்கு) உத்தீபனமாய் ஆகின்றன. இரத்தாசயத்திலிருக்கும் நரம்பு வேர்கள் (காங்கியோ ganglia) மூலமாயும், நரம்பு நார்கள் (நெர்வ் பைபர்ஸ் nerve fibres) மூலமாயும் இவ்வுத்தீபனம் பிரதிகரண கிரியைப்பெற்று இரத்தாசயத்தைச் சுருங்கச் செய்கின்றது. சுருங்கின உடனே நரம்பு மாமிச உபகரணங்கள் கூணமாத்திரம் ஓய்வடைகின்றன. இப்படி ஓய்வடைவதினால், உள்ளேவரும் இரத்தத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு இரத்தாசயக் குழிகள் விரிவதற்கு வேண்டிய இளக்கம் இரத்தாசயம் பெருகின்றது. இப்படி மாமிச உபகரணக் குவதும், விரிவதும் விடாமல் ஓர் நிறைவான காலக்கிரமத்தில் திரும்பி வருகின்றன. இப்படி ஒருமுறை வருவதற்கு ஒரு நிமிஷத்திற்குக் குறைந்தகாலந்தான்செல்லும். இதற்கு ஹிருதயலயம் (இரிதம் ஆப்தி ஹார்ட் Rhythm of the Heart) என்று பெயர்.

சாதாரண நிலைமைகளில் இரத்தாசயத்திலிருக்கும் நரம்புவேர்கள் நரம்புநார்களின் செயலினாலே ஹிருதயலயம் ஏற்பட்டபோதிலும், இவைகள் தங்கள் வேலையை பார்க்கவேண்டிய சக்தியை பெரிய நரம்புவேர்களினின்று இரத்தாசயத்திற்கு வரும் சில நரம்புகளால் பெற்றுக் கொள்ளுகின்றன. அவைகள் புப்புசோதா (பியுமொகாஸ்

டிரிக் pneumogastric) நரம்புகளினுடையவும், ஒற்றுணர்வுள்ள (சிம்பதடிக் sympathetic) நரம்புகளினுடையவும் கால்களாயிருக்கின்றன.

முகுளத்தினின்று (மெடுலா ஆப்லாங்கேடா medulla oblongata) புப்புசோதா நரம்புகள்மூலமாய் இரத்தாசயத்தின் வேலை வேகத்தைக் குறைப்பதற்கு வேண்டிய சக்தி வருவதாகக் காண்கிறது. இந்த நரம்புகளைப் பிரித்து விட்டால் இரத்தாசயத்தின் அடிப்புகள் அதிக நீவிர முள்ளவைகளாகின்றன. இந்த நரம்புகளை உத்தீபனம் செய்தால் இரத்தாசயத்தின் அடிப்புகள் குறைந்துபோகின்றன. அதிகமாய் உத்தீபனம்செய்தால் இரத்தாசயம் அடியாமலும் நின்றுபோகின்றது.

இப்படித் தடுக்கும் சக்தி முகுளத்திலேயே உற்பத்தியாகிறதுண்டு. இல்லாவிடில் முகுளமூலமாய் பிரதிகரணக்கிரியைபெற்றுண்டாகிறதுமுண்டு. பிந்திய சங்கதிக்கு உதாரணமாக: குலைவயிற்றில் அடிபடுவதினால் இரத்தாசயத்துக்குண்டாகும் காரியசிக்கியால் தெரிந்துகொள்ளலாம். இரத்தாசயத்தின் செயல் நின்றுபோவதற்குக் காரணம் ஒற்றுணர்வுடைய நரம்புநார்கள் உத்தீபனத்தை முகுளத்திற்குக்கொண்டுபோய், அம்முகுளம் புப்புசோதா நரம்புநார்கள் மூலமாய்ப் பிரதிகரண கிரியாம்சமாக இரத்தாசயத்திலிருக்கும் நரம்புவேர்களில் சத்தியைக்கொண்டுவந்து சேர்ப்பதினாற்றான் என்று அறிந்துகொள்ள வேண்டியது. ஒற்றுணர்வுள்ள நரம்புகளின் சில நார்களின்மூலமாய் முகுளத்தினின்று இரத்தாசயத்தை விரைவில் நடப்பிக்கும் சக்தி வருகின்றது. இவ்வுற்சிரம நரம்புநார்கள், கண்டத்திலிருக்கும் மஜ்ஜாதந்து அல்லது முள்ளந்தண்டுக்கொடியில் உற்பத்தியாகி கண்டத்தின் கீழ்நரம்புகளின் பின்புற வேர்களிற் சென்று அவ்விடங்களிலிருந்து இரத்தாசயத்திலிருக்கும் நரம்பு வலைகளுக்குப்போய் அவைகளினும் இரத்தாசயத்தைச்சென்று அடைகின்றன. முகுளத்திற்கும் இரத்தாசயத்திற்குமுள்ள மற்ற சம்பந்த

நரம்புகளை வெட்டிப் பிரித்தபிறகு, இந்த நரம்புகளைமாதிரி உத்தீபனம்செய்தால் இரத்தாசயம் வேகமாய் நடப்பதைப்பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த உற்கிரம சக்தியுடைய நரம்புகள் புப்புசோதா நரம்புகள்மாதிரி சதா தம் தொழிலை புரிகின்றவைகளல்ல.

இரத்தாசயம் தேசத்தின் மற்ற கருவிகளுடன் நரம்பு மண்டலத்தினால்சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதென்பதும், அவைகளுக்கு இரத்தாசயத்தின்மேலிருக்குஞ் சக்தியும் வியாதியினால் நன்றாய்த் தெரிகின்றது. மனதுக்கு சுகிதியில் திகைப்புண்டாகுமானால் இரத்தாசயத்தின் செயல் நின்றது. மூளை அமர்த்தப்படுவதினால் நிதான நாடியுண்டாகின்றது. குன்மத்திலும் ஜன்னியிலும் மார்பிற்காணும் படபடப்புகளையும் மற்ற நாடி மாறுபாடுகளையும் காணலாம்.

இரத்தாசயச் செயலின் பிரயோசனங்கள்.

இரத்தாசயம் சுருங்குவதால் இரத்தம் சுற்றி வருவதற்கு வேண்டிய சக்தியைத் தருகிறதென்று பல பரீசைகளால் அறிந்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனாலும் இரத்தத்தின் வேலைக்கு அனுசாரணையாய் இன்னும் மற்ற வேறு சக்திகளும் இருக்கின்றன. அவைகளைப்பற்றி இனிசொல்லுவோம்.

நாடிகள்.

நாடிகளின் சுவர்கள் மூன்று படைகளாயிருக்கின்றன. இவைகளுக்கு மூன்று சொக்காய்கள் என்றும் சொல்லலாம். (டியூனிகா அட்வெண்டிஷியா tunica adventitia) வெளிப்புறத்ததென்றும், மத்தியிலுள்ளதென்றும் (டியூனிகா இன்டிமா tunica intima) அல்லது உட்பக்கத்தது என்றும் இவைகளின் பெயராகும். உட்பக்கத்து சொக்காயின் அடிப்புறத்தில் பரிஸ்தாபிதம் இருக்கின்றது. வெளிப்புறத்து சொக்காயானது சல்லடையொத்த தசைகளாலும் வலைபோன்ற நெகிழ்ந்துரழுத்தக்க நார்களாலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய சொக்காய்

சதைத்தசைகளாலும் நெகிழ்ந்துரழுத்தக்க தசைகளாலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதிலும் கொஞ்சம் சல்லடையொத்த தசைகளும் கலக்கின்றன. இது மற்ற சொக்காய்களைவிட கனதியாயிருக்கின்றது. நாடிச் சுவற்றின் பெரும்பாகம் இதுவேயாகும். சதைநார்கள் நாடியின் மையத்தைச்சுற்றியும் குறுக்காக அமைக்கப்பட்டும், நெகிழ்ந்துரழுத்தக்கவஸ்து குறுக்காக அமைக்கப்பட்டும், இளமையான பல கிளை நாள்களால் சதைநார்களின் பல பாகங்களில் பல நிசைகளில் ஊடுருவி பிண்பிடுகொண்டுமிருக்கிறது.

நாடியின் உட்புற சொக்காய் நெகிழ்ந்துரழுத்த தசைகளின் பல புறைகளாலாவது. நீட்டுப்போக்காக இந்த நாள்கள் செல்லுகின்றன. இவைகளில் மிகவும் மெலிந்த சவ்வும் ஒன்றிருக்கிறது. அது நெகிழ்ந்துரழுத்த தன்மையற்றது.

இதினுட்புறமாக மிகவும் மெலிவான பரிஸ்தாபிதத்தோலும் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த பரிஸ்தாபிதத்தில் துட்பமாகிய சேதில்போன்ற நீண்ட சாஸங்கள் இருக்கின்றன. இவைகள் பரிஸ்தாபிதத்தை யிருதுவாகவும் பளபளப்புடையதாகவும் செய்து திரவங்கள் ஊடுறுவிச் செல்லாமல் தடுக்கும் குணமுடையனவைகளாகவும் செய்து இரத்தத்தை கொஞ்சமாகிலும் தடுக்காமல் செல்லும்படி செய்கின்றன. நாடிச்சுவர்கள் அவைகளினால் ஓடும் இரத்தத்தால் போஷிக்கப்படுகிறதில்லை. நாடிகளை போஷிப்பதற்காகப் பிரத்தியேகமாக சிறிய நாடிகளும், தந்துகிகளும், நாளங்களும் இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு தமரீத்தமரீ (வாசாவசோரம் vasa vasorum) என்று பெயர். நரம்பு நாள்களும் நாடிச்சுவற்றிலிருக்கின்றன. ஒற்றுணர்வுள்ள நரம்புகள் நாடிகளைச்சுற்றி வலைபோலப் படிந்திருக்கின்றன. நரம்பு வேர்களும் காண்கின்றன.

நாடிகளின் செயல் இரத்தத்தை தேசத்தில் சர்வாகங்களுக்கும் கொண்டுபோய் சேர்ப்பிப்பதாய்தையால் நாடி

களில் சேர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தசையும் பிரத்தியேக உத்தேசத்துடனிருக்கின்றது.

(1) வெளிப்புறச் சொக்காய் பலமாயும் உறுதியாயுமுள்ள கவசமாகின்றது. இதற்கு நெகிழ்ந்துரழும் தன்மையிருந்தபோதிலும் நாடிகளுக்கு பலத்தைத்தரவும், இரத்தாசய வேலையினால் நாடிகள் அதிகமாய் விரிந்துபோகாமல் காத்துக்கொள்ளவும் உதவுகிறது. வறைந்து கயிற்றால் கட்டினால் நாடி துண்டித்துப்போகாமல் இதுதான் காப்பாற்றுகின்றது. உட்புறமுள்ள இரண்டு சொக்காய்களும் இப்போடப்பட்ட சமயங்களில் துண்டாகிவிடுகின்றன.

(2) நாடிகளிலிருக்கும் நெகிழ்ந்துரழும் தசைகளின் பிரயோசனம்: (a) சடரங்கள் சுருங்கும்பொழுதெல்லாம் உண்டாகும் வேகத்தைத் தாங்கி நாடிகளை இரட்சிக்கின்றன. ஒவ்வொருதரம் சுருங்கும்பொழுதும் சடரங்களிலுள்ள இரத்தம் நாடிகளினால் தள்ளப்படுகின்றது. இப்படித் தள்ளும் வேகம், நாடிகளின் இரத்தம் தந்துகிகளுக்குள் போகும் வேகத்தைவிட மீளியிருக்கின்றது. இரத்தமானது கொஞ்சநேரம் அதன் போக்கில் சரியாய்ப் போகாமல் தடைபடுகிறது. அப்பொழுது அந்த வேகத்தில் ஒரு பாகம் நாடி சுவற்றில் தாக்குகின்றது. நாடிச் சுவர்கள் நெகிழ்ந்துரழ்த்தக்கவையாகையால் அந்த வேகத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள நெகிழ்ந்துகொடுத்து இரத்தத்தை வைத்துக்கொள்ளும். இப்படிச் செய்வதினால் உந்தித்தள்ளும் இரத்தவேகத்தை முறித்துவிடுகின்றது.

சடரங்கள் சுருங்கிவிற்பிறகு அவற்றின் வேகம் நிற்கின்றது. வேகம் நின்றவுடனே நாடிகள் நெகிழ்ந்திருந்தவை தமது முன்ஸ்திதிக்கு வந்துவிடுகின்றன. அவைகளில் சேர்ந்திருக்கும் நாடிகளின் நெகிழ்ந்துரழ்த்தக்க சக்தியினால் யதாஸ்திதிக்கு வருகின்றன. இப்படி வருவதினால் இன்னமொருபயனுண்டு. (b) சடரங்கள் சுமையிருக்கும்பொழுதும் விரியும்பொழுதும் நாடிகள் அவைகளிலுள்ள இரத்தத்தின்மேல் யதாஸ்திதியடைவதினால் சரி

யான வேகத்தை அள்ளிப்பக்கங்களில் செலுத்தி இரத்த வேகத்தை சமரசப்படுத்துகின்றது. இம்மாதிரி ஏற்பாடு இல்லாவிட்டால், உதாரணமாக நாடிகள் பிசுவான குழாய்களாயிருந்தால், இரத்தம் தேகத்தில் போவதுபோல் எப்பொழுதும் செல்லாமல் சடரச்சுருக்கங்களுக்கு ஒத்தமாதிரி பிரல்பிரலாய் வரும். சடரங்கள் சுமையிருக்கும் பொழுது இரத்த ஓட்டமும் நின்றிருக்கும். ஆனால் நாடிகள் இயல்பாயிருக்கும் தன்மையில் சடரங்களின் சுருக்கம் ஒவ்வொன்றும் தனது வேகத்தில் ஒரு பாகத்தால் இரத்தத்தை உந்தித்தள்ளவும், மற்ற பாகத்தால் நாடிகளை விரிவடையச் செய்யவும் உதவுகின்றது. சடரச்சுருக்கங்களின் மத்தியகாலங்களில் விரிவடைந்த நாடிகள் மறுபடி சுருங்குவதினால் உண்டாகும் வேகம் இரத்தத்தை உந்தித்தள்ள உபயோகப்படுகின்றது. நாடி சுருங்குவதினாலுண்டாகும் வேகம் இரத்தத்தை எல்லாப் புறங்களிலும் தள்ள வேண்டியதே. ஆனால் இரத்தம் பின்னடைவதற்கு இடமில்லாமல் பிறைக்கபாடங்கள் நாடியின் முகத்துவாரத்தை அடைத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. நாடிக்குள் இரத்தம் வந்தவுடனே அது பின்னுக்குச் செல்லாமலிருப்பதற்காக கபாடங்கள் இரத்த தாரையை அடைத்துவிடுகின்றனவென்று முந்தியே கண்டிருக்கிறோம்.

நாடிகளின் நெகிழ்ந்துரழும் சக்தியினாலே சடரங்களில் உற்பத்தியான வேகமெல்லாம் இரத்தம் சுழல்வதற்கு அனுகூலமாயிருக்கின்றது. நாடிகள் விரிவதற்காக உபயோகப்படும் வேகம் நாடிகள் சுருங்குவதினால் மறுபடியும் கொடுக்கப் பெருகின்றது. ஆகையினாலே இந்த வேகத்தில் நஷ்டமாவதொன்றுமில்லை. ஆனால் இதில் வேகலாபமும் கிடையாது. நாடிகளின் நெகிழ்ந்துரழும் சக்தியினால் இரத்தத்தைத் தள்ளுவதற்கு யாதொரு வேக உற்பத்தியும் கிடையாது. அவைகள் சடரத்தினின்றும் பெற்ற வேகசக்தியை மாத்திரம் மறுபடி கொடுத்துவிடுகின்றன. சடரங்கள் சுருங்கும்பொழுது நாடிகள் பெரும் நசுக்

தியை அவைகள் சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு சடரங்கள் ஸ்திமிதமாயிருக்கும்பொழுது கொடுத்துவிடுகின்றனவென்று சொல்லலாம். நாடிகளின் ஒன்றின்பின் ஒன்றாய் வரும் பல பாகங்களிலும் இந்தமாதிரி வேகம் சமரசப்பட்டு வரும். கடைசியில், நாடியிலிருக்கும் இரத்தம் அது அடையும் வேகத்தின் பயனை மாறப்பெற்று இரத்த ஓட்டம் பிரல் பிரலாய் வராமல் ஒரு நிதானமாய் ஒடுகின்றது. தந்துகளிலும் நாளங்களிலும் இந்த ஓய்வற்ற ஒரே நிதானமான ஓட்டத்தைப் பார்த்தலாம்.

(c) நாடிகள் தங்கள் சுவற்றிலிருக்கும் நெகிழ்ந்துமடித்தக்க தசைகளினால் அதிக இரத்தம் வரும்பொழுது விரியவும், அது குறையுங்கால் குறுசவும் பெற்று இரத்தத்தைத் தருந்த வேகத்துடன் உந்த உதவுகின்றன.

(d) நாடியின் துவார அளவு யாதொரு காரணத்தினாலாவது குறையுமானாலும் இந்த நெகிழ்ந்துமடித்தக்க சுவர்களால் மறுபடியும் தன் சுய காத்திரம் அடையப் பெறுகிறது.

(e) இந்த நெகிழ்ந்துமடையும் தன்மையாலேயேதான் தேகத்தின் பல அசைவுகளில் நீளுவதற்கும் வளைவதற்கும் குறுகுவதற்கும் இசைந்து இருக்கின்றது.

தசைபாகத்தின் பிரயோசனங்களாவன:—

(a) இரத்தத்தை போக்கின் வழியில் உந்துவதில் கொஞ்சம் உதவுகின்றது.

(b) முக்கியமாய் தசைபாகத்தின் வேலையென்னவென்றால் (தேகத்தின்) ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் வேண்டிய இரத்தத்தை விடுகரிவைசெய்து அவையவைகளுக்கு வேண்டினவற்றைத் தரும்படி செய்வதேயாகும். தேகத்தின் ஒவ்வொரு சுருவியும் செய்கிற வேலை ஒரு நாளிலேயே வித்தியாசப்படுகிறது. இப்படி வித்தியாசமும் அடிக்கடி அதிகரிக்கிறதில் சம்பளிக்கின்றது. உதாரணமாக: மூளை; ஒருமணிநேரத்திற்குள்ளாகவே மனிதன் தூங்கியெழுந்த

திருந்தால், அது செய்யும் வேலை வித்தியாசப்படும். ஆகையால் அதில் ஒருபாகம் அதிக சுறுசுறுப்பாய் வேலை செய்யும்; மற்ற பாகம் வேலையற்றவாகும்.

வேலைசெய்யும்பொழுது சுறுசுறுப்பான பாகத்திற்கு அதிக இரத்தம் வேண்டியிருக்கிறது. அது, வேலையற்ற காலத்தில் எவ்வளவு இரத்தம் வேண்டுமோ அதைவிட வேலைசெய்யும் காலத்தில்தாமத வேண்டுகிறது.

இரத்தாசயமே ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் வேண்டிய அளவு இரத்தத்தை கொடுப்பது சாத்தியமல்ல. நாடிகள் ஒரேமாதிரி சுருங்குவதினாலும் இரத்தத்தினளவை நிர்தாரணை செய்துகொடுப்பது அசாத்தியமாயிருக்கிறது. ஆனால் நாடிகளில் முழுவதிலும் இத்தசைகள் இருக்கிறபடியால் இத்தசைகள் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் அங்கங்கே வேண்டிய அளவு இரத்தத்தைக் கொடுப்பதற்கு உபயோகமாயிருக்கின்றன. அதிக இரத்தம் வேண்டுமானால் தசைகள் நெகிழ்ந்து கொடுக்கும்; வேறு சமயங்களில் சுருங்கும்.

ஆங்காடி பார்க்குமளவில் சடரங்கள் ஒவ்வொரு தரம் சுருங்கும்பொழுதும், இரத்தப்போக்கில் அனுப்ப வேண்டிய இரத்தத்தின் அளவை நிச்சயித்தும், அது போகவேண்டிய வேகத்தை ஏற்படுத்தியும் தருகின்றன. பெரிய நெகிழ்ந்துமடித்தக்க நாடிகள் இரத்தத்தைப் பரவச் செய்து அதன் வேகத்தையும் சமரசப்படுத்திக்கொடுக்கும். சிறிய நாடிகள் அவைகளிலிருக்கும் சதைத்தசைகளால் ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் வேண்டிய இரத்தத்தின் அளவை நிச்சயம்செய்து வேண்டியவற்றைத்தரும்.

ஆனால் நாடிகளின் இரத்த அளவு நிர்தாரிக வேலை நரம்பு மண்டலத்தைப் பொருத்தி அதை அனுசரித்துச் செய்யும் வேலையென்பதை மறக்கக்கூடாது.

நாடிகளின் மத்திய சொக்காயிலிருக்கும் சதைத்தசைகளின் பிரயோசனம் இன்னம் ஒன்றுண்டு. அதாவது, நாடிக்குழாயின் பருமனை நாடியிலிருக்கும் இர

தத்தின் அளவுக்கேற்ற வண்ணம் செய்விப்பதே. இத வேலையை சதைத்தசைகள் நெகிழ்ந்துமூத்தக்க தசைகளுடன் சேர்ந்து செய்யும். ஏனெனில் மணிக்கி பனி இரத்தம் குழல்களில் இருக்கும் இரத்தம் அளவு வந்தி பாசப்படுகின்றது. நெகிழ்ந்துமூத்தக்க தசைகள் மாந்திரம் நாடிகள் உடையதாயிருந்தால், நாடிச் சுவர்கள் உள்ளிருக்கும் இரத்தத்தின் சில சமயங்களில் அதிகபலமாயும் சில சமயங்களில் அதிக குறைவாகவும் அழுத்தி வேகத்தைச் செலுத்தும். ஆயினும் சதைத்தசைகளிருப்பதினால் இரத்தத்தை அழுத்திச் செலுத்தும் வேகத்தை சமரசப்படுத்தும். இப்படி சமரசப்பட்ட ஒரு நிதானமாகிய மெதுவான சதைசுருக்கத்தினால்தான் இரத்தக் குழாய்களின் தன்மை நிர்வகிக்கப்படுகின்றது.

இத்தன்மை குறைவுபட்டால் மிகுதுவான இளகிய நாடிகள் காண்கின்றது. இயல்புக்கு விரோதமாக இத்தன்மை அதிகப்பட்டால் கடினமான இருகிய நாடிகள் காண்கின்றன.

நாடியின் நெகிழ்ந்துமூழும் தசைகள், சதைத் தசைகள் இவைகளிரண்டினுடைய சுருங்கும் தன்மையால் மற் றொரு குணமுண்டு. நாடி அறுபட்டால், இந்தச் சுருங்குத்கத்தினால்தான், முதலில் இரத்தம் வெளியே ஓடுவதை நிதானப்படுத்தி, பிறகு இரத்தம் வெளியே போவதைப் புரணமாய் நிறுத்துவதில் உறைந்துபோகும் பைபிரிசுதுவடன் ஒத்து வேலையைச் செய்கின்றது. நாடி சுருங்குவதினால் பைபிரின் உறைவதாலும்தான் ஒரு சிலிய காயத்தினால் உண்டாகக்கூடிய அபாயத்தினின்றும் நாம் வேதப்பிப்பிழைக்கிறோம். நாடி மூடுவதினால்தான் இரத்தத்தை வெளியே போகாமல் ஸ்திரமாயும் உறுதியாகவும் தடுக்கப்படுகின்றது.

நாடி.

இரத்தாசயம் விட்டு விட்டு வேலையைச் செய்யும் காரணத்தினால் இரத்தத்திற்குரிய பிரஸ்போன்சு தன் போக்கு நாடிக்

ளின் நெகிழ்ந்துமூத்தக்க சக்தியினால் சமரசப்பட்ட ஒழுங்கான போக்காய், சிலிய நாடிகளிலும் தந்துகிகளிலும் மாறுவதினால்தான் நாடியுண்டாகிறது. சட்டரம் உதைத்துத்தள்ளும் வேகத்துடனே இரத்தம் நாடிகளில் ஓடி, சிலிய நாடிகளும் தந்துகிகளும் செய்யும் தடங்களினால் சக்தியற்று வரும் இரத்த வேகத்தினொரு பாகம் இரத்தக் குழல்களின் சுவர்களில் மோதி அவைகளை விரியச் செய்கின்றது. இப்படிச் செய்வதினால்தான் நாடி விசை அல்லது இரத்த அழுக்கமுண்டாகிறது. இதைப்பற்றி பின்னால் விவரிப்போம்.

இரத்தாசயத்தின் அடிப்பு ஒவ்வொன்றின் பின் நேரிடும் அந்த விசையின் உச்சத்திற்கு நாடி (pulse) என்று பெயர். ஒவ்வொரு இரத்த நாடி விரிவதினால் அதன் நீளமும் குறுக்களவும் அதிகப்படுகின்றன. அப்படி நீளம் பொழுது இரத்த நாடிகளின் வடிவம் சற்று மாறுகின்றன. நீண்டிருந்தவைகள் சற்று வளைவானதாகும். அல்லது வளைவதற்குள்ள சார்புள்ளதாயிருக்கும்.

ஆனால் அவைகள் தங்களுடைய முந்திய வடிவத்தை யும் குறுக்களவைவரும், சட்டரச் சுருக்கம் விளறவுடனே திரும்ப அடையும். அவைகளின் நெகிழ்ந்துமூத்தக்க சுவர்கள் பின்னுக்கு உதைத்துக்கொள்ளும். இரத்த நாடிகள் நீளவதினால் உண்டாகும் வளைவின் வர்த்திப்பும், அதன்பின் உண்டாகும் பின் உதைப்பும் ஒரு வயதுசென்ற கிழவனுடைய கன்னப் பொறி நாடியில் மிதக்கமாயிருப்பதில் நன்றாய்க் காணலாம். இப்போடப்பட்ட விஷயத்தில் இரத்த நாடி நீளிறது வெளிப்படையாயிருக்கின்றது. விரிவதினால் உண்டாகும் உணர்ச்சியை நீண்டு வளைவதினாலுண்டாகும் உணர்ச்சியினின்றும் பேதப்படுத்தி அரிய மனதுக்கு சக்தியில்லை. விரிவதினால் அந்த இரத்த நாடியை அழுக்கி தட்டையாகும்படி செய்கிருந்தால், விரிந்து முன்னிருந்த வடிவாகிய திரண்ட வடிவக்கு வருவதாகிய விரிவை மனதினால் உண்டரியலாம்.

இரத்தாசயத்தின் ஏதாவது ஒரு அடிப்பை எடுத்துக் கொண்டு பார்த்தால், அந்த அடிப்புக்குரிய நாடி தேகத்தில் எல்லாப் பாகங்களிலிருக்கிற இரத்த நாடிகளில் ஒரே காலத்தில் காணுகிறதில்லை. உதாரணமாக—அது பெருவிரல் நாடியில் காண்பதற்கு சற்று முன்னமேயே கண்ட (கழுத்து) நாடிகளில் காணும். கால் பின்புறமுள்ள நாடியில் காண்பதற்கு சற்று முன்னமே இப்பெருவிரல் நாடியில் காணும். இந்தப் பாகங்களில் நாடியடிப்பதற்கு உண்டாகும் தாமதம் இரத்தாசயத்தினின்று அந்த பாகங்களிலிருக்கும் தூரமேயாம். ஆனால் எந்த நாடிகளிலும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்தில் நாடியடிப்புக்குள்ள காலபேதம் $\frac{1}{4}$ அல்லது $\frac{1}{2}$ நிமிஷத்திற்குமேல் செல்லமாட்டாது. ஸ்பிக்மொகிராப் (Sphygmograph) என்னும் கருவியால் நாடியைக்குறித்து அனேகவிஷயங்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

இரத்த நாடிகளில் இரத்தத்தின் அழுக்கம் அல்லது நாடி விசை, முந்திச்சொன்ன விஷயங்களினின்று நாடிகளிலிருக்கும் இரத்தம் எப்பொழுதும் அழுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றதென்பது தெரியவருகிறது. இந்த அழுக்கம் சடரம் சுருங்கும் காலங்களிலும் அவைகளின் மத்திய காலங்களிலும், அதாவது எப்பொழுதும் இருக்கின்றது. முன் சொன்ன காலத்தில், சடரம் சுருங்குவதினால் உண்டாகும் வேகமே நேராக இரத்தத்தை அழுக்குகின்றது. பின் சொன்ன காலத்தில் இரத்த நாடிகள் விரிந்த பிறகு பின்தாங்கிச் சுருங்குவதினால் உண்டாகும் வேகம் தான் அதை அழுக்குகின்றது. இந்த அழுக்கத்திற்கு முக்கியமாயும் அவசியமாயுமுள்ள இன்னம் ஒரு காரணமும் உண்டு. சிறிய நாடிகள் மூலமாயும், தந்துகிகள் மூலமாயும் இரத்தம் நாளங்களுள் செல்வதில் யேற்படும் தாமதமாம். கைமோகிராப் (Kymograph) என்னும் கருவியால் மாக நாடி விசையைப்பற்றி பலவிஷயங்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம். அனேக காரணங்களினால் இரத்த அழுக்கின்

அளவு வேறுபடுகின்றது. அவைகளில் முக்கியமானவைகள், பின்வருமாறு:—

1. இரத்தாசயத்தின் மாறிமாறி வரும் சுருக்கத்திலும் விரிவிலும் சுருங்கிக்கொண்டுவரும்பொழுது இரத்த அழுக்கம் அதிகரித்துக்கொண்டும், விரிந்துகொண்டு வரும்தொழுது குறைந்துகொண்டும் முறையே வரும். இரத்தாசயச் சுருக்கங்கள் விரைவாயதிகரித்தால் அதிகரிக்கும் மளவுக்கு இரத்த அழுக்கமும் அதிகமாயிருக்கும். சுருங்கும் பொழுது வெளியே தள்ளப்படும் இரத்தத்தின் அளவு அதிகமாயிருந்தால் அதிகரிக்கும் மளவுக்கு இரத்த அழுக்கமும் அதிகமாயிருக்கும்.

2. சுவாச அசைவுகள் : இரத்தநாடியின் விசை சுவாசத்தை உள்ளுக்குவாங்கும்பொழுது அதிகமாகியிருக்கும். சுவாசத்தை வெளியிடும்பொழுது குறையும்.

3. இரத்தநாடியின் சுவர்கள் குறுகும்பொழுது இரத்தத்தின் மேல் அழுக்கம் அதிகப்படும், அவைகள் விரியும்பொழுது அழுக்கம் குறைந்துமிருக்கிறது. சிறிய இரத்தநாடிகள் குறுகுவதில் ஏற்றக் குறைவு இருக்குமாயில் நாடிகளில் இரத்தம் தங்கி ஏறவும் இறங்கவும்ருக்கும்.

4. இரத்தத்தின் முழு அளவு அதிகப்பட்டாலும் அழுக்கமதிகப்படும்.

மேலே சொன்ன காரணங்களின் மூலமாக இவைகளை தனித்தனியாயாவது கலந்தாவது நரம்பு மண்டலம் அதிக வலிவுடன் வேலையை நடப்பிடுத்துக்கொள்ளும்.

உன்னத ஜீவனங்களில் ஓரளவில் இரத்த அழுக்கம் உயர்நிலைக்குக் காரணமாகியிருக்கிறது. இது உண்மையென்பது, நரம்பு மண்டலத்தில் சிரேஷ்டக் கருவிகளில் இந்த இரத்த அழுக்கமில்லாவிட்டால் உண்டாகும் குணங்களினால் விளங்கும். இரத்த அழுக்கத்தை ஓரளவுக்கு குறைவுபடச் செய்துவிட்டால் அக்கருவிகள் தங்களுடைய தொழில்களைப் புரியமாட்டாது. சின்கோபி (syncope) சேர

வடைவதில் மூலையைச்சேர்ந்த நாடிகளில் இரத்த அழுத்தம் குறைவுபடுகின்றன. இப்படி குறைவுபடுவது இரத்தாசயத்தின் மெலிவடைந்த செயலினாலாவது அல்லது வேறெவ்விதக் காரணத்தினாலாவது இரத்தநாடி விசை குறைந்தால் உண்டாகும். உதாரணம் (ஹெமொரேஜ் Hemorrhage) இரத்த உடைப்பு விவாதியில் காணலாம்.

இரத்தநாடிகளின்மீது நரம்பு மண்டலத்துக்குரிய சக்தி.

தேகத்தின் சகல பாகங்களிலுமுள்ள இரத்தநாடிகளுக்கு ஒற்றுணர்வுள்ள நரம்பு மண்டலத்தினின்று நரம்புநார்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தலையிலும் கழுத்திலுமிருக்கும் இரத்தக் குழல்கள் superior cervical ganglion என்னும் கழுத்துப் பெருநரம்புகளின் வேர் முடியிலிருந்து நரம்புகளைப் பெற்று இருக்கின்றன. நெஞ்சுறையிலிருப்பவைகள் கழுத்து நரம்புகளினுடையவும் மேல்பக்கத்திய முதுகு நரம்புகளின் வேர் முடிகளினின்றும் நரம்புகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. இந்த நார்கள் அடிக்கடி மூளை-முள்ளந்தண்டின் நரம்புகளிடிகொண்டனச் சேர்க்கப்பட்டு அவை நின்றும் வேறு வகையாக பிரித்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இரத்த நாடிகளின் தன்மை (tone) அதாவது இரத்தநாடிகளினுடைய கலசங்களின் சதைநார்த்தினுடைய சுருக்கம் இந்த ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் கிளைகளாகிய (வாசோமோட்டார் vasomotor) தமன்பியக்க நரம்புகளினால்தான் உண்டாகின்றன. அவைகளில் ஒன்றை உத்திப்பனப்படுத்தினால் (மின்சார சக்தியைவிடெனினால், உதாரணமாக) அந்த நரம்பின் கிளைகள் போயிருக்கும் நாடிகள் சுருக்கி அவைகளின் வழியாய்ச் செல்லும் இரத்தவெள்ளத்தைக் குறைக்கின்ற இதற்கு விரோதமாக அந்த நரம்பை பிரித்துவிட்டால் நாடிகள் நியமிடையின்றன. அதாவது அவைகள் தங்களுடைய சதையின் தன்மையை (tone) யிழந்து விரிந்துவிடுகின்றன.


தந்துகிகள்.

கோசத்தின் மேற்புறமிருக்கும் பதார்த்தமாகிய (கார்போரா காவர்னோசா corpora cavernosa) விரலகடம் என்பதிலும், கர்ப்பாசயத்தின் பிள்ளைப்பையிலும், சிலபாகங்கள் மண்ணீரலிலும், தவிர நுண்ணிய நாடிக் கிளைகளிலிருந்து நுண்ணிய நாளக்கிளைகளுக்குப்போகும் இரத்தம் அனுதரிசனிக்கருவியாலறியக்கூடிய இரத்தக்குழாய்கள் மூலமாய்ச் செல்லுகின்றது. இவைகள் வலைபோலப் பரவியிருக்கின்றன. நுண்ணிய நாடிகள் ஒன்றினின்று ஒன்றாயும் பலவாகவும் கிளைகள் போலப் பிரிந்து வலைகள் போலவாகி இவைகளும் நாளங்களின் வேர்கள் உற்பத்தியாகின்றன. சிறுவலைபோல பின்னல்களையுடையனவாய் நாடிகளாகவே ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கச்செய்யும் மத்தியிலுள்ள இந்த நுண்ணிய இரத்தக்குழல்களுக்கு தந்துகிகள் என்று பெயர். இவையிருக்கும் விதத்தை பின்வரும் படங்களில் காண்க.

22-ம் படம்.



23-ம் படம்.



22-ம் படம்.—குடல்மேடுகளிலிருக்கும் கோட்டு நாடி நாளங்களின் இடையேயுள்ள தந்துகிகள் பரவியிருக்கும் விதம்.—கற்கி.

23-ம் படம்.—தலையின் பாதத்தில் ஒரு நெய் நாடியையும் நெய் நுள்தையும் சம்மந்தப்படுத்தியும் தந்துகிகள்.—கற்கி.

துண்ணிய நாடிகள் முடிந்து துண்ணிய நாடங்கள் புறப்படும் பாகங்கள் எந்தப்பாகங்களென்று எடுத்துரைப்பது சாத்தியமில்லை. ஏனெனில் இந்த மாறுதல் கிரமேண ஆகிறபடியால்தான். ஆகிலும் தந்துகி வலையில் ஒரு விசேஷ அம்சமிருக்கின்றது, அதிலுள்ள சிறிய குழாய்கள் அடிநின்று துனிவரையிலும் ஒரே குறுக்களவுள்ளவைகளாயிருக்கின்றன. நாடிகளில் நாடங்கள்போல அடியில் குறுக்களவு அதிகமாயும் போகப்போக அக்குறுக்களவு குறைந்தும்போகிறதில்லை. அவைகளின் வலைக்கன்களும் பரிமாணத்திலும் வடிவிலும் ஒரே தன்மையுள்ளதாயும் இருக்கின்றன. துண்ணிய நாடி நாடங்கள் பிரிந்து ஒன்றினின்றும் ஒன்று வரையுடையதாய் ஏற்படுந் வலைக்கன்களோ ஒரே தன்மையுடையதானவையல்ல.

தந்துகிகளின் கட்டடம் நாடி நாடங்களின் கட்டடங்களைவிட அதிக கலப்பமானதாயிருக்கின்றது. இவைகளின் சுவர்கள் தட்டையாயும் பிஜங்களை யுடையவைகளாயுமுள்ள சாலங்களென்னும்பைகளால் ஒரே படையில் ஏற்பட்டுள்ளவைகள். இந்தச் சாலங்கள் சில நீண்டும் சில குறுகியும் இருக்கின்றன. இவைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து கெருக்கமாய் இருக்கிறபடியால் பார்வைக்கு வெளிச்சம் ஊடுறக்கூடிய சவ்வுபோல் காண்கின்றன. இவைகளுக்கு வெளிப்புறத்தில் அதிக துட்பமான துண்ணிய நாரினால் சவ்வு ஒன்றிருக்கின்றது. அந்த சவ்வினமேல்தான் இவைகள் படிந்திருக்கின்றன. தந்துகிச் சுவராகிய அந்தாஸ்தாபிதச் சாலங்கள் மூன்று நான்கு சேருமிடத்து ஒரு துவாரம் காண்கின்றது. அதற்கு இப்பைகளின் வாய் (ஸ்டோமாடா stomata) என்று பெயர்.

தந்துகிகளின் குறுக்களவு தேகத்தின் பல இடங்களில் சற்று வித்தியாசப்படுகின்றது. அதிக சாதாரணமான அளவு 3000 அங்குலமிருக்கும். இவைகளில் அதிக சிறியவைகள் முனையிலும் குடல்களின் சிலேஷ்ட சவ்வி ஊன்றும் இருக்கின்றன. இவைகளில் அதிகப் பெரிய

வைகள் சர்மத்திலும் எலும்புகளின் மத்தியிலும் இருக்கின்றன.

தந்துகிகளின் பரிமாணம் வெவ்வேறு மிருகங்களில் அவைகளின் இரத்தக் குறுகடங்களின் (corpuscles) பரிமாணத்தை யனுசரித்து வேறுபட்டிருக்கும்.

தந்துகி வலைகளின் வடிவு தேகத்தில் பல கட்டடங்களில் பலவாறாக பேதப்பட்டிருக்கின்றன. உள்ள பல வேறுபாடுகளும் இரண்டுவித வலைக்கண்களின் வித்தியாசங்களாயிருக்கின்றன. ஒன்று உருண்டும் மற்றொன்று நீண்டுமிருக்கிறது. உருண்ட வலைக்கண்களையுடைய தந்துகி வலைகள் தேகத்தில் சாதாரணமாகக் காணப்படுகிறவை. இவைகள் முக்கியமாய் நுரையீரல் கோளங்கள், சிலேஷ்ட சவ்வுகள், சர்மம் இவை முதலிய தந்துகி கட்டடம் திகமாயுள்ள பாகங்களில் காணுமின்றன. இவைகளின் வலைக்கண்கள் அதிக சக்கிரகாரமாயிராமல், கொஞ்சம் கோணங்களை யுடையவைகளாய் சில சாதாரணமாகவும், சில பலகோண வடிவையுடையதாகவும் காணும். நீண்ட வலைக்கண்களையுடைய தந்துகிகள், பேபிகள், நரம்புகள் முதலிய குழாய்க் கூட்டங்களாலும் நரர் கூட்டங்களாலும் அமையப்பெற்றவைகளில் இருக்கின்றன. இவைகளில் வலைக்கண்கள் நீண்டு நார்பக்க உருவமாய், சாதாரணமாகக் காணப்படுகின்றன. இவைகளின் குறைந்த பக்கங்கள் நீண்ட பக்கங்களைவிட எட்டு அல்லது பத்து மடங்கு குறைந்திருக்கும். நீண்ட புரம் குழாய்கள், நாரிகள் இவைகளின் நீள் போக்கின் மையத்தை அனுசரித்திருக்கும். தந்துகிகளின் எண்ணிக்கைகளாலும் வலைக்கண்களின் பரிமாணத்தாலும் அவைகளிருக்கும் பாகங்களின் குழாய் அமைந்த தன்மையின் (vascularity) அவைச் சொல்லலாம். தந்துகி வலைக்கூட்டங்கள் கெருங்கியிருக்கும் பாகங்கள், அதாவது வலைக்கண்கள் சிறியதாயிருக்கும் பாகங்கள் நுரையீரல்களிலும், கண்களின் மத்திய பாக சவ்வுகளிலும் இருக்கின்றன. மனிதனுடைய கல்

லீரலில் வலைக்கண்கள் அவைகளின் தந்துகிச் சாலங்குளின் பரிமாணமுடையவைகளாயிருக்கின்றன. மனிதனுடைய நுரையீரலில் வலைக்கண்கள் அவைகளின் தந்துகிச் சாலங்களை விடச் சிறியதாயிருக்கும். மனிதனுடைய பிருக் கத்திலும் நாயின் பிருக்கத்திலும் தந்துகிச் சாலங்கள், அவைகளின் வலைக்கண்களைவிட மூன்று, நான்கு மடங்கு சிறியதாயிருக்கும். மூளைக்கு அதிகமளவு இரத்தம் போகின்றது. ஆயினும் மூளைவஸ்துவினுடே இருக்கும் தந்துகிகள் மிகச் சிறியவைகளாகவும், ஆனால் மற்ற இடங் களைவிட கொஞ்சம் குறைந்தவைகளாயும் இருக்கின்றன.

கருவிகளின் தொழில் புரியும்வண்ணம் அதிக முயற்சிபெற்றதாயிருந்தால், எவ்வளவு முயற்சிபெற்றிருக்கிறதோ அவ்வளவு குழாய்மையும் தன்மையுடைத்தானதாகும். அதாவது தந்துகி வலைக்கட்டடம் நெருங்கியதாயிருக்குமளவுக்கு தக்கபடி இரத்தம் பெறுவது அதிகமாயிருக்கிறது. கோளாகரக் கருவிகளில் எல்லாம் சிலேஷ்ம சவ்வுகளிலும் வளரும் பாகுக்களிலும் வலைக்கண்கள் ஒடுங்கியிருக்கும். எலும்புகளிலும், பந்தன நாரர்களிலும் உறுதியாயுள்ள வேலையற்ற மற்ற நகைகளிலும் வலையின் கண்கள் விசாலமாயிருக்கும். முருந்துகளில் தந்துகிகள் கிடையவேகிடையாது. முருந்து முதலிய வஸ்துக்கள் ஏற்பட்டபிறகு இந்திரிய மாதுபாடல்கள் இல்லாமலிருக்கின்றன. இப்போது சொல்லிய விதியினின்றும் சில விலக்குகள் உண்டு. முக்கியமாக—மூளை; இதின் தந்துகிகள் அதிக சிறியதாயும் அதிக சமீபமாயும் நெருங்கி பாவாமலிருந்தபோதிலும் தனது சலனத்தின் வேகத்தினால் இவைகளினின்றே அதிக இரத்தத்தைப் பெறுகின்றது. ஒரு கருவியில் பெரிய நாடி முண்டங்கள்மாத்திரமிருந்து தந்துகிகள் வேண்டிய அளவுக்கு மட்டாக கொஞ்சமாயிருந்தால் அதன் மூலமாய்ப் போகும் இரத்தத்தின் வேகம் அதிகப்பட்டு, ஒரு கொடுத்த கால அளவில், சிறிய நாடிகளையும் அதிக தந்துகிகளையுமுடைய கருவி பெறும் இர

த்தத்தின் அளவைவிட அதிகமாயடையும். ஆனால் ஒரு கொடுத்த நிமிஷத்தில் இவை இரண்டையும் பார்த்தால் பின்சொன்னதில் இரத்தம் அதிகமாயிருக்கும்.

தந்துகிகளில் இரத்தம் சுழல்வதை உயிருடனிருக்கும் எந்தப் பிராணியிலாவது அணுதரிசுநிக்குரிய கருவியைக் கொண்டு பார்த்தால், அது ஒரே நிதானமாய் ஒடுகிறதைக் காணலாம். சிலந்த இரத்தப்பைகள் ஒன்றின்பின் ஒன்றாக அனேகமாக ஒரு வரிசைதான் இதில் போய்க் கொண்டிருக்கும். தந்துகியின் கோணல்களை ஒத்து இவைகளும் பலவிதமாய் வளைந்துபோகும். ஆனால், கொஞ்சம் விசாலமான யிடத்திற்குவந்தால் இவைகள் தங்கள் வயகுப்பமாகிவிடும்.

தந்துகிகளிற்குள் இரத்தப்போக்குக்குள்ள முக்கிய எதிர்ப்பு இருக்கின்றது. ஏனெனில் இவைகளில்தான் இரத்தம் அளவுக்கடிகமாய் பரப்பு விருத்தியில் பரவுகின்றது. அப்பரப்புகளில் படுவதினால் தேய்ப்பு உண்டாகின்றது. ஒடும் இரத்த ஒட்டத்திற்கும் தடையுண்டாகின்றது. இரத்தக்காலின் ஓரங்களில் குழல்களின் சுவற்றினருகில் அச்சுவறுகளைத் தொட்டுக்கொண்டும் இரத்த நீர் ஒரு வரிசையிருக்கின்றது. அது ஒட்டம்ற்றதாய் காணுகிறது. சிவப்பு இரத்தக் குறுகடங்கள் காலின் மத்தியபாகத்தில் போகின்றன. ஒற்றுப்பார்க்குமளவில் இவைகள் கொஞ்சம் வேகமாய் போகின்றனவென்றே சொல்லவேண்டி இருக்கிறது. வர்ணமற்ற வெண் குறுகடங்கள் குழலின் சுவற்றருகே அதைவிட கொஞ்சம் நிதானமாய்ப் போகின்றன. சுவற்றினருகே ஒளி ஊடுருக்கடிய கொஞ்சம் இடம் இருக்கின்றது. இதில்தான் திரவம் அசைவற்றிருப்பதுபோலக்காணுகின்றது. ஏதாவது இரத்தக் குறுகடங்கள் அதற்குப்பேராய் சேர்ந்துவிட்டால் அவைகளும் வேகமற்று, நிதானமாய்ச் செல்லுகின்றன. சில சமயங்களில் நகராமல் சுவற்றில் ஒட்டிக்கொள்ளுகின்றன.

இரத்தக்குறுகடத் துள்ளல்.

Diapedesis of Blood Corpuscles.

இரத்தக் குறுகடங்கள் சுழன்றுவதும் நீரையிட்டு சாதாரணமாய் விலகிவரமாட்டாதுகள் என்றும், அப்படி விலகிவரவேண்டுமானால் இரத்தக்குழலின் சுவர் அறுந்தாவது விரிந்தாவதுபோலான இரத்தப்பைகள் வெளியே வருமென்றும் எண்ணப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது சாஸ்திரிகள், காப்பபடாக்காலத்திலும் குழற்சுவற்றின் ஊடே இரத்தச் சரங்கள் வந்துவிடுகின்றன என்பதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். குழல்களில் இரத்தம் தேக்கப்பட்டால் இவ்விதமாய் வெளியேவந்து பக்கத்து தசைகளில் சேருகிறது என்பது நினைவே. இது (குகாண சாஸ்திரம்) வியாதிக்கூறுகளுக்கும் சாஸ்திரசம் பந்தமாகவே இந்த இரத்தக்குறுகடங்களின் துள்ளுதலைப் பற்றி ஊகங்களும் ஆலோசனைகளும் செய்துபார்த்து வரப்பட்டதின்மேல் ஏற்பட்ட விஷயமாகும். தசைகளைப் போலிப்பதில் எவ்வளவுதூரம் இவைகளின் தொழிலிருக்குமென்கிற சங்கதி இப்பொழுது சொல்லமுடியாது.

தந்துகளின் ஒரு பக்கம் நாடிகளும் மற்றப்பக்கம் நாளங்களிருக்கிறபடியால் தந்துகளில் இரத்த ஓட்டம் நாடி நாளங்களின் ஸ்திதியைப்பொருத்தியிருக்கும். நாடி இரத்த ஓட்டமாவது நாளங்களின் இரத்த ஓட்டமாவது, அல்லது நாடி நாளங்களிலிருக்கும் இரத்த பரிமாணமாவது வேறுபட்டால் தந்துகி இரத்தச்சுழலும் வேறுபடுகிறது.

சில உருத்தம் (irritating) வஸ்துக்களை உபயோகப்படுத்தும்பொழுதும், பயமடைந்தகாலங்களிலும் தந்துகிகள் சுருங்குவதும், புன்சிரிப்பாய் நகைப்பதில் அவைகள் விரிவடைகிறதும், இவைகளின் செயலினாலேயே என்று சொல்வதைவிட சிறிய நாடிகளின் செயலென்று சொல்லலாம். ஆனால் தந்துகிகளை உபயோக செயலற்ற

இரத்தத் துவாரங்கள் என்று எண்ணக்கூடாது. தந்துகிச் சுவர்கள் உயிருள்ளனவாயும் சுருங்கும் தன்மையுள்ளனவாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் இரத்த வெள்ளத்தின்மேல் அவைகளுக்கும் தக்க தொழில் இருக்கவேண்டுமென்று தோற்றுகிறது. இவைகள் பிணியுள்ளகாலத்திலும் பிணியற்றகாலத்திலும் செய்யும் தொழிலைப் பார்க்குமளவில், இவைகளுக்கும் இரத்தம் சுழல்வதை உதவு ஒரு சக்தியுண்டென்றே காண்கிறது. இதற்கு தந்துகி உயிர் சக்தியென்று சொல்லலாம்.

நாளங்கள்.

கட்டடத்தில், நாளங்களின் சொக்காய்கள் நாடிகளின் சொக்காய்கள் போன்றவை. ஆகையால் இவைகளிலும், வெளிப்புறத்தது, மத்திய பாகத்தது, உட்புறத்தது எனச் சொக்காய்களிருக்கின்றன. வெளிப்புறத்த சொக்காய் நாடிகளுக்குள்ளதுபோலவே வலைபோன்ற தசைகளாலானது. ஆனால் இதில் கொஞ்சம் அதிக கனதியாயிருக்கின்றது. சில நாளங்களின் வெளிப்புறச் சொக்காயில் பேசி நார்ச்சரங்களிருக்கின்றன. அவைகள் நீளத்தில் அதிக கப்பட்டிருக்கின்றன.

மத்தியச் சொக்காய் நாடியிலிருப்பதைவிட மிக்க கனமானது. இதில் வரைவரையாய்க் காண தசைநார்களும், நார்ச் சரங்களும் இருந்தபோதிலும், இவைகள் மஞ்சள் நிறநெகிழ்நிறமழத்தக்க தசைகளோடும் வெள்ளை நிற நார்த்தசைகளோடும் கலந்து இருக்கின்றன. இரத்தாசயத்திற் கருகிலிருக்கும் பெரிய நாளங்களில், அதாவது பிரஹன் நாளங்களிலும், புப்புச நாளங்களிலும் இரத்தாசயத்தினின்று கொஞ்சநூல் வரையில் இம்மத்திய சொக்காய்க்கு பதிலாக, கன்கணம்போலிக்கப்பட்ட பட்டை பட்டையான பேசி நார்கள் சிரவங்களிலுள்ளவைகளின் தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றன.

நாளத்தின் உட்புறச் சொக்காய் நாடியின் உட்புறச் சொக்காயைவிட கொஞ்சம் உடையும் தன்மை குறைந்திருக்கும், மற்ற அம்சங்களில் அதை ஒத்திருக்கும்.

இரத்தச் சுழற்சியில் நாளங்களின் முக்கிய உபயோகம் என்னவென்றால், இவைகளிலுள்ளிருக்கும் கபாடங்களே. நாளங்கள் போகும் வழியிலுள்ள தசைகள் அங்கங்கே நாளங்களை அழுக்குவதிலும் இரத்த ஓட்டம் உதவிபெறுகின்றது. இந்தக் கபாடங்களும், பெரு நாடி புப்புச நாடி இவைகளின் பிறைக்கபாடங்களின் கட்டடம் போலவே கட்டடம் பெற்றவைகளாயிருக்கின்றன. ஆனால் இவைகளில் பந்தமற்ற ஓரங்கள் எதிர்ப்புறமாய்த் திரும்பியிருக்கின்றன. அதாவது இரத்தாசயத்தை நோக்கும் பக்கத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றன. ஏன் எனில், இப்படியிருப்பதினால்தான் இரத்தம் நாளங்களில் பின்னோட்டமடையாமலிருக்கக்கூடும். இவைகள் சாதாரணமாய் சோடுசோடாயிருக்கின்றன. பல நாளங்களில் பல இடங்களில் இருக்கின்றன. சிறிய நாளங்களில் தனிக்கபாடங்களை அடிக்கடி காணலாம். மிகவும் பெரிய நாளங்களில் தோள் நாளங்களிலும், அவைகள் கண்ட நாளங்களுடன் சேருமிடத்தும் மூன்றாம் நான்கும் ஒன்றாயாவது ஒன்றின் பக்கம் ஒன்றாயாவது வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கபாடங்கள் பிறைபோலிருக்கின்றன. பந்தனப் படாத ஓரம் சிலவற்றில் கவிந்ததாயும் சிலவற்றில் நேரானதாயுமிருக்கின்றன. அவைகள் விரிவடையாத நார்த்தசைகளால் அமையப்பட்டு இருக்கின்றன. நாளங்கள் லுள்ளபடியே பரிஸ்தாபிதமும் இவைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கின்றன. நாளங்களில் கரு இரத்தம் சரியான போர்டில் போய்க்கொண்டிருக்கும்பொழுது இந்தக் கபாடங்கள் வேலையற்று நாளங்களின் உட்பக்கத்தில் விழுந்துவிடக்கும். அவைகள் தொழில்புரியும்பொழுது நாடிக் கபாடங்கள் போலவே ஒன்றாய் மூடிக்கொண்டு இரத்தம் பின்னுக்குச் செல்லாமல் பூரணமாய் தடைசெய்கின்றன. முன்னங்கையின் மேல்புறமுள்ள (புறங்கை) நாளங்களில் அவைகளிருப்பதை, இரத்தமதின் போர்க்குக்கு எதிரானால், (அதாவது முழங்கையிலிருந்து கணுக்கைவரையிலும் அவைகளை அமுத்திக்கொண்டுபோனால்) சுளுவில் கண்டு

அத்தி.]

நாள்க்கபாடங்கள்.

115

பிடிக்கக்கூடாமனதாயிருக்கின்றது. ஏன் எனில் அந்தப் பிரகாரம் அமுத்தினால் ஒவ்வொரு சோடு கபாடங்களிருக்குமிடங்களிலும் சிறிய முடிச்சுகள் காண்கின்றன. அமுத்துவதை விட்டுவிட்டால் இந்த முடிச்சுகள் மறைந்து போகின்றன.

எல்லா நாளங்களிலும் கபாடங்கள் ஒன்றுபோல திகரித்து இருக்கின்றதில்லை. சிலவற்றில் கபாடங்களே கிடையாது. தேக முனைகளிலுள்ள நாளங்களில் வெகு அதிகமாயிருக்கின்றன. அதிலும் கால்களில் கைகளிலுள்ளனவற்றைவிட அதிகமாயிருக்கின்றன. குறுக்களவு அதிகமாய் குறைந்ததாயுள்ள நாளங்களில் அவைகள் காணப்படுகிறதில்லை. தசையழுக்கமற்ற நாளங்களிலும் அவைகள் சாதாரணமாய் இருக்கிறதில்லை. உடர்த்தபிரஹன் நாளம், அதோபிரஹன் நாளம், உதர நாளம் இவற்றின் தண்டுகளிலும், கிலைகளிலும் கல்லீரல் நாளங்களிலும் பிருக்க நாளங்களிலும் புப்புச நாளங்களிலும் கபாடங்கள் கிடையாது. கபாலத்தின் உட்பக்கத்திலுள்ள நாளங்களிலும் முள்ளந்தண்டு நாளங்களிலும், எலும்புகளின் நாளங்களிலும், உந்தி நாளங்களின் தண்டுகளிலும் கிலைகளிலும் கூட கபாடங்கள் கிடையாது.

இரத்தச் சுழலுக்கு உள்ள முக்கிய தடை, இரத்தம் தந்துகினை விட்டு வந்த பிறகு மேற்கொள்ளப்பட்டு, விலகிப்போகின்றது. இரத்தாசயத்தினால் உண்டாகிய வேகம் முழுவதும் சிலவழிந்துபோகாமல் இருக்கிறபடியால் நாளங்கள் மூலமாய் இரத்தத்தை செலுத்துவதற்கு மிகுந்திருக்கும் வேகம் போதுமானதாயிருக்கின்றது.

நாளங்களைச் சுற்றியிருக்கின்ற தசைகளும் அவைகளை அழுக்குவதிலும் இரத்த ஓட்டத்திற்கு உதவியாகியிருக்கின்றது. நாளத்தின் எந்த பாகத்தையாவது அழுக்கினால் அதிலிருக்கும் இரத்தத்தின் ஓட்டம் தடைபடுகின்றது. அழுக்கின் பிடத்திற்குப் பின்புறமுள்ள பாகம் அடுத்த கபாடங்களின் சோடிருக்குமிடம் வரையில் உள்ள

நாளத்தின் பாகம் வீங்கி விரிகின்றன. இந்தக் கபாடங்கள் நெகிழ் சக்தியற்றவைகளானபடியால் நரிக் கபாடங்கள் போலவே குழாயை அடைத்துக்கொள்ளுகின்றன. நாளத்தின் அழுக்கம் இருக்கிறவரையில் இரத்தம் கபாடங்களுக்குப்பின்போக இடங்கொடாமல் அடைத்துக்கொண்டிருக்கும். ஆகையினால் தசை யழுக்கத்தினால் உண்டாகும் வேகம் இரத்தத்தை முன்னுக்குச் செலுத்தும். பின்னுக்குப் போவது கபாடங்களால் தடைபெற்று நின்றுபோகின்றன.

தசைகளின் அழுக்கத்தினால் இரத்தச் சுழலுக்கு உண்டாகும் சகாயம் எவ்வளவோ அவ்வளவு பாதகமுமிருக்கின்றது. ஆனால் இந்த பாதகம் வேறு காரணங்களால் அடிபட்டுப்போகின்றது. நாளங்கள் பலவாறாய்ப் பிரிந்து இருப்பதில் பிரியுமிடங்கள் ஒவ்வொன்றிலும், பிரியுமிடத்திலிருந்து பிரிந்த காலுக்கு வாய்க்கிருக்கிற படியாலும், ஒரு நாளம் மற்றொரு நாளத்துடன் சேருமிடத்தும் வாய்க்கிருக்கிறபடியாலும் கபாடங்கள் வழியையடைத்துக் கொள்வதினால் முன்னுக்குப்போகக்கூடாமல் இருக்குமாயினும் இரத்தமோ பந்தமடையாத வேறு கால்கள் வழியாய் இரத்தாசயத்தை நோக்கிச் செல்லும்.

இரத்தம் சுழல்வதில் சம்மந்தப்பட்ட கார்த்தங்கள்.

இரத்தம் சுழல்வதில் சம்மந்தமுடந்த கார்த்தங்கள் இவைகளில் விவரித்தோம். அவைகளை பின்வருமாறு பிரித்துச்சொல்லலாம்.

1. இரத்தாசயம், நாடிகளின் செயல்.
2. தன்னுதி உயிர்சக்தி (vital capillary force).
3. நாளங்களினருகிலிருக்கும் தசைகளால் உண்டாகக்கூடிய கொஞ்சமளவு செயல்.

மேலும் சொல்லவேண்டியதெல்லாம்: (4) இரத்தச் சுழலுக்கு சுவாச உஸ்வாச நிஸ்வாசங்களால் ஏற்படும் செய்கை.

சுவாச உஸ்வாச நிஸ்வாசங்கள் தொடர்ந்துகொண்டு வருவது இரத்தம் சுழல்வதற்கு முக்கிய ஆதாரானபோ

திலும், சுவாசம் நின்றுபோகும்படியானதில் சொல்ப நிமிஷங்களுக்கெல்லாம் இரத்தாசயச் சொல்லும் நின்றுவிடுகிறபோதிலும், அவைகளின் நேரான யாந்திரிக மாத்ரேண சக்தியால் இரத்தவெள்ளத்தின் ஓட்டத்திற்கு அவ்வளவு அனுகூலம் இடையாது.

7-ம் அத்தியாயம்.

சுவாசம்.

சுவாச வாயுவை ஸ்வீகாரம் செய்துகொண்டும் கரியமலவாயுவை விசர்ஜனம் செய்துகொண்டிருந்தால்தான் பிராணிகளின் உயிர்நிலை நிற்கும். இரத்தக் குழாய்த் தன்மையையுடைய சகலவித பிராணிகளிலும் இந்த வாயுக்களை வகிக்க ஏற்படும் உபகரண வஸ்து இரத்தமாகும். இரத்தத்தான் வெளியிலிருந்து வரும் சுவாச வாயுவை உட்கொண்டு தேகத்தில் சகல அங்கங்களுக்கும் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கின்றது. இரத்தத்தினாலேதான், தேகத்திலிருந்து வரும் கரியமல வாயுவை எந்த அங்கங்களிலிருந்து தேகத்தைவிட்டு வெளிப்பட்டுப்போகுமோ அந்த அங்கங்களுக்கு அதைக்கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கின்றது. இந்த இரண்டு தொழில்களும், சுவாச வாயுஸ்வீகாரம், கரியமலவாயு விசர்ஜனம் ஒன்றுக்கொன்று சம்மந்தப்பட்டவைகள். இந்த இரண்டு தொழிலும் சேருவதற்குத்தான் சுவாசம் என்று பெயர். சுவாச வாயு, கரியமல வாயு அல்லாமல் மற்ற வஸ்துக்களையும் உட்கொண்டு வெளியிடுவதற்கும் இந்தப் பெயர் சில சமயங்களில் வழங்கப்படும். இந்த மாதிரி வரும் வஸ்துக்களில் முக்கியமானது நீரின் ஆவி. இது நுரை யீரலினால் உஸ்வாசத்தில் யெப்பொழுதும் வெளிக்கி வருகிறபடியால் கரியமல வாயுவுடன் இடையும் சேர்த்து உஸ்வாச விசர்ஜன வஸ்துக்களில் ஜீவஜந்துக்களால் வெளிவிடப்படுகின்றன என்றும் சொல்லலாம்.

மற்ற சகலவிதமான ஆயிரூப வஸ்துக்கள் சுவாசத்தில் கலந்திருந்தாலும் அவைகள் தேச அமைப்புக்கு அவசியமானவைகள் அல்ல.

முள்ளந்தண்டுள்ள ஜீவராசியிலும் முள்ளந்தண்டில் லாத அனேக ஜீவராசியிலும், சுவாசநிமித்தமாய் ஆகாசவாயுவையாவது அல்லது அவ்வாயுவகலந்த நீரையாவது தொக்குவதினால் சுவாசவாயுவை கவரும்பொருட்டு சில அங்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அங்கங்களிற்கு துரையீரல் அல்லது ஜில் (Gill) என்று பெயர் வழங்குவதது. முக்கியமாக துரையீரலின் கட்டடம் மெல்லியதான, ஒளி ஊடுரத்தக்க சவ்வினால் அமைக்கப்பட்டு அதின் ஒருபக்கம் ஆகாயவாயுவாவது அல்லது தண்ணீராவது ஜீவராசிக்குத்தக்க பிரகாரம் தொடவேண்டிய யேற்பாடுடன் இருக்கும். சவ்வின மற்றப்பக்கத்தில் இரத்தக்குழல்கள் வலைபோலிருக்கின்றன.

பிற ஜீவராசிகளிலும் இந்த சவ்வுபோன்ற வஸ்துக்களில் காணும் பேதங்கள், அதாவது சிலவற்றில் கலப்பற்று தனிமையாயிருப்பதும் சிலவற்றில் அதிக சிக்கலாயிருப்பதும் வஸ்துபேதமல்ல. ஆனால் அளவுபேதமாய்த்தானிருக்கிறது. ஒரு பட்சி அல்லது முலையுண்ணும் ஜீவராசிப் பிராணியின் துரையீரல் அதிக சிக்குடையதாயிருந்தபோதிலும் ஒரு சவ்வுப் பையாகமாதிரி இருக்கின்றது. இப்பையின் சுவர்கள் மடிப்புமடிப்பாய் மடிந்தும் மற்றும் பலவாறாக சுருங்குகொண்டும் இருக்கின்றது. இப்படி யிருப்பதால் ஒரு கொடித்த அளவு இடத்தினாலே சுவாசத்திற்கு வேண்டிய பரப்பு எவ்வளவதிகமாய் அடையக்கூடுமோ அவ்வளவு அதிகமாக பெற்று இருக்கின்றன. ஆகையால் இப்படியிருக்கும் துரையீரற் பையை குறுக்கே பிளந்து பார்த்தால் வெருங்கண்ணுக்கு கனமான தருவியாகக்காணும். ஒரு தவணையின் துரையீரல் அதிக மடிப்புகளும் சுருங்கல்களும் இல்லாமல் பையின் தன்மையுடையதாயிருக்கின்றது. அப்படியிருக்கும் தவணையின் துரையீரல்

லுக்கும் மேல் விவரித்த துரையீரலுக்கும் வேறு வித்தியாசம் கிடையாது. இரண்டும் சுவாசவாயுவை அடக்கிக் கொண்டிருக்கும் பைகளே.

சுவாசச் சவ்வு பலவித சிக்கல்களுடன் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதைப் பார்த்தே சுவாசப் பை ஆகாயவாயுவினின்றாவது ஜலத்தினின்றாவது சுவாசத்திற்கு வேண்டிய சக்தியை எவ்வளவில் பெறக்கூடுமென்பதை நிர்தாரணை செய்யக்கூடாது. ஏன் எனில் அதை நிர்தாரணை செய்வதற்கு புப்புசத்திலிருக்கும் இரத்தாசயத்தின் அளவும் கட்டடமும், சக்தியும் சுவாசப் பையின் அமைப்பும் அதிற் சஞ்சரிக்கும் இரத்தத்திலுள்ள செங்குறுகடல்களின் பரிமாணமும் எண்ணிக்கையும் முக்கியமான ஆம் சங்களாகும்.

துரையீரல்கள் இரத்தத்திற்கு சுவாச வாயுவைக் கொடுத்து அதினின்றும் கரியமல வாயுவை பெற்றுக் கொள்வதற்கு வேண்டிய உபகரணமாயிருக்கிறதேயல்லாமல் வேறல்ல. தேகத்தில் உண்டாகும் தகனத்தொழில் நடந்துதான் கடைசியாக கரியமல வாயு உற்பத்தியாகின்றது. இத்தொழில் புரியும் கருவியாக இதைமாதிரிப் பிரத்தியேகமாய் எடுத்துச்சொல்லக்கூடாது. ஏன் எனில், இத்தொழில் தேகத்தில் சகல பாகங்களிலும் நடந்துவருகின்றது. சில இடங்களில் அதிகமாயிருக்கின்றது. சில இடங்களில் குறைந்து இருக்கின்றது; கொஞ்சம் தசைவஸ்துக்களிலும் கொஞ்சம் தசைகளினுள்ளிருக்கும் தந்துகி இரத்தக் குழாய்களிலும் தகனம் நடக்கின்றது.

தேகத்தில் முண்டம் இரண்டு பங்காக ஈரல் தாங்கியால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேற்பாகத்திற்கு மார்பு என்று பெயர். மார்பின் உள்ளிருக்கும் இடம் சற்றேறக்குறைய முழுமையையும் வியாபித்துக்கொண்டிருப்பது துரையீரல்களே. அவைகள் கடல் துரைபோலொத்த நெகிழ்ந்துறமும் தன்மையுள்ள கட்டடமாகும். குறுக்கே அறுத்துப்பார்த்தால் வெருங்கண்ணுக்கு ஏறக்கு

றைம கனமான சுருவிபோல் காணும். அப்படிச் சுருவி போதிலும் அங்கங்கே சுவாசக் குழாய்க் கிளைகளும் (bronchii) சுவாசப்பைக் கண்ணைகளும் (air tubes) அறுந்திருக்கு மிடங்களில் அவைகளின் குழாய் போன்ற தன்மை அவற்றின் பிரிவு பரப்புகளில் காணலாம்.

வாஸ்தவத்திலோ துரையீரல்கள், சுரைக் கருவிகள். அவைகள் காற்றை அடைத்துக்கொண்டிருக்கும் இரண்டு பைகள் என்று நாம் நினைக்கவேண்டியது. அவைகளில் ஒவ்வொன்றும் பிரத்தியேகத் துவாரத்தால் ஒரு பொதுவான சுவாசக்குழாயை போய்ச் சேருகின்றன. அதற்கு தமரகம் (Trachea) என்று பெயர். தமரகத்தின் மேல் பாகத்திற்கு குரல்வளையென்று பெயர். இதன்மூலமாக வெளிப்புறமிருக்கும் அகாசத்துடன் சம்மந்தப்படுகிறது. குரல்வளையின் துவாரத்தை மூடவும் திறக்கவும் பேசிகள் இருக்கின்றன. இதை நமக்கிஷ்டம்வந்தபடி திறக்கலாம், மூடலாம். ஒவ்வொரு துரையீரலையும் சுற்றிக் கொண்டு ஒரு கித்தாசில்லி இருக்கின்றது. இப்படி மூடிக்கொண்டிருக்கும் சவ்வுக்கு பரிப்புப் பரம் என்றும் நெஞ்சறையென்றும் சொல்லலாம். இதின் ஒரு படை துரையீரலின் மேற்புறம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையினால் துரையீரலை மூடத்தகுந்த யிருதுவானதும் வழவழப்புடையதுமான போர்வைபாகும். மற்றப் படை மார்பின் சுவற்றினுட்புறத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். இந்த இரு படைகளும் ஒன்றுக்கொன்று ஒட்டி ஒன்றையிருப்பதால் இது நித்தாசில்லி பையாயிருக்கின்றது. இந்த இரண்டு படைச் சவ்வுகளும் சவுக்கியமாயிருக்கும் காலத்தில் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து ஒட்டியிருப்பதுபோலக் காணும். இவ்விருபடைகளின் மத்தியில் கொஞ்சம் நித்தை எனும் நிரவமிருக்கின்றது. இந்த நிரவமிருப்பதினால்தான் துரையீரல் மார்புச் சுவற்றின் உட்புறத்தின்மேலிருக்கும் சவ்வை தொட்டு அசைவதற்கு தகுந்த கிலையை உடைத்தா

னதாயிருக்கின்றது. சாதாரணமாய் இயல்புக்கு இயைந்த சுவாச வியாபாரங்கள் நடக்கும்பொழுது துரையீரலுக்கும் மார்பின் சுவற்றுக்கு மத்தியில் இடமிருக்கிறதென்னும் விஷயத்தை யோசிக்கவேண்டியதில்லை. ஏன் எனில் துரையீரலின் அசைவுகளுக்குத் தக்கபடி இந்த சவ்வும் அதனுடன் ஒட்டிக்கொண்டு அசைகின்றது.

ஆயினும் பரிப்புப்புச் பையில் காற்றுவது ஜலமாவது உட்செல்லும்படி ஒரு துவாரம்செய்தால், துரையீரல் தனது நெகிழ்ந்துரமும் தன்மையால் பின்னுக்கு வாங்குவதினால் மார்புச்சுவற்றிற்கும் துரையீரலுக்கும் மத்தியில் அதிக இடம் உண்டாகின்றது. அதாவது துரையீரல்களின் இயல்பான நெகிழ்ந்துரமும் தன்மை, சுவாச தண்ணிய குழல்களிலும் சுவாசச் சிறுபைகளிலும் இருக்கும் ஆகாச அமுக்கம் துரையீரலை மார்பின் உட்புறத்தை ஒட்டியிருக்கும்படி அமுத்தாவிட்டால் அந்த துரையீரலை பழுவெலும்புகளினின்றும் விலகிவரும்படி கரும்கச்செய்துவிடும்.

பரிப்புப்புச் பையில் ஆகாசவாய் உட்புகுந்தவுடன் துரையீரலின் உட்பக்கத்திலும் வெளிப்பக்கத்திலும் ஆகாச அமுக்கம் உண்டாகின்றபடியால் துரையீரல் சுருங்கிப் பின்னடைவதை தடுப்பதற்கு யாதொரு ஏதுவுமற்ற அப்போய்விடுகிறது.

பரிப்புப்புச் பையின் கட்டடம் மற்ற சகலவித நித்தாசில்லிகளால் அமைக்கப்பட்ட கட்டடங்கள்போன்றதாகின்றது. இந்த சவ்வில் பரிஸ்தாபிதச் சாலங்கள் பல பக்கங்களை யுடையனவாய் அமைந்து இருக்கின்றன.


சாதாரணமாய் இவைகள் தட்டையாகவும் செதில் போலுமிருக்கின்றன. ஆனால் அவைகளின் வடிவு துரையீரல் எவ்வளவு விரிந்திருக்கின்றதோ அந்த விரிவையனுசரித்து இருக்கும். துரையீரல் சுருங்கிப்போன பரிப்புப்புச் பையில் அவைகள் குண்டரமாயும் நீண்டும் உருண்டும் காணும். ஆனால் அந்த துரையீரலில் காற்றை

ஊதி பெருக்கச் செய்தால் இச்சிறுபைகள் மெலிந்து தட்டையாய்விடுகின்றன. இந்த வடிவு வித்தியாசங்கள் இடத்தை யடைத்துக்கொள்ளவேண்டிய மாருதல்களாய் விளங்குகின்றன. பட்டையற்ற சதைநார் கட்டுகளும் பரிப்புரத்தில் சிதறிக்விடக்கின்றன. இவைகளில் நுரையீரல் பக்கமுள்ளவைகள் தடித்து பலமானதாயிருக்கின்றன. இவைகளின் தொழில் நுரையீரலில் சுவாச வியாபாரங்களில் அதிக அசைவுடைய பாகங்களிலிருந்துகொண்டு உஸ்வாசத்திற்கு உதவும் தொழிலையுடையதாயிருக்குமென்பது திண்ணம்.


தமரகம், தமரகக்கிளைகள் இவைகளின் கட்டடம்.

தமரகம் அல்லது சுவாசக்குழாய், ஐந்தாவது கழுத்து முள்ளொலும்பு மட்டத்துக்குச் சரியாயிருக்கும் குரல்வளைமோகிர முருந்தினின்று (cricoid cartilage) முன்னுயது முதுகு முள்ளொலும்புக்கு நேரில் ஒரு அக்கிரம்வரையில்போய் அவ்விடத்தில் இரண்டு கிளைகளாகப் பிரிகின்றன. அது சுமார் 4 முதல் 4½ அங்குல நிகளமையும், ½ முதல் 1 அங்குல குறுக்களவு உள்ளதாகவும் இருக்கின்றது. தமரகம் என்பது நெகிழ்ந்தாரமும் சத்தியுடைய நராகளால் அமைந்த குழலாகும். இவைகளின் படைகளில் 16 முதல் 20 வரையில் முருந்து கங்கணங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த கங்கணங்கள் தமரகத்தின் முன்பக்கத்திலும் அள்ளைப்புறங்களிலும் மாத்திரமாகாணுகிறது. கங்கணத்தின் சுற்றளவில் முன்பில் இரண்டு பாகத்திற்குமாத்திரம் இவையிருக்கின்றன. பின்பக்கத்தில் கங்கணசொருபம் கிடையாது. இந்த பாகம்மாத்திரம் நார்ச்சுவால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நார் முருந்துக்குழாயின் உட்புறத்து பின்பாகத்தில், பட்டையற்ற சதைநார்ப்படை இருக்கின்றது. முருந்து கங்கண நுளிகளை குறுக்கில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. கங்கணங்களின் மத்திய பாகங்களுக்கு எதிரிலும் இருக்கின்றன. அவைகளின் தொழில் என்னவென்றால், இவை

24-ம் படம்.



25-ம் படம்.



24-ம் படம்.—குரல்வளை, தமரகம், தமரகக்கிளைகள் இவைகளின் முன்புறத்தோற்றம். b , கிருக கபாடத்தின் பெருங்கொம்பு. l , l_1 , கேடய முருந்தினினைப் பெரிதும் சிறிதும். tr , தமரகம், அதின் பதினாறு கங்கண முதுந்திகள். b , வலது தமரகக்கிளை. b_1 , இடது தமரகக்கிளை.—அல்லி நாய்கள்.

25-ம் படம்.—குரல்வளை, தமரகம், தமரகக்கிளைகள் இவைகளின் பின்புறத்தோற்றம். b , கிருக கபாடப் பெருங்கொம்பு. l , l_1 , கேடய முருந்தினினைப் பெரிதும் சிறிதும். e , கிருக கபாடம். tr , தமரகத்தின் பின்புறச் சுவைபாகங்கள். b , b_1 , தமரகக்கிளைகளின் வலது இடதுபாகங்கள்.—அல்லிநாய்கள்.

கள் சுருங்கினால் கங்கண நுணிகள் ஒன்றின் சமீபம் ஒன்று வரும். கங்கண நுணிகள் சமீபித்தால் தமரகத்தின்குழல் சிறிதாரும், வேண்டும்பொழுதெல்லாம் இந்த துவாரத்தை குறுக்குவதே இவைகளின் தொழிலென்று காணுகிறது. இந்த நார்த்துக்கு வெளியே நிகளத்தில் சதைநார்கட்டுகளும் கொஞ்சம் இருக்கின்றன. இவைகளும் நார்ப்புறந்து கட்டடங்களுடன் ஒட்டியிருக்கின்றன. தமரகத்தின் உட்புறத்தில் சிலேஷ்ம சவ்வு படிந்திருக்கின்றது. அதன் மேல் இருக்கும் பரிஸ்தாபிதம் ஸ்தம்பாகாரமாயும் மயிரிழைபோன்றதாயுமிருக்கும். சிலேஷ்மச் சவ்வுக்கு வெளியே அதை ஒட்டிக்கொண்டு மஞ்சளநிற நெகிழ்ந்தாரமும் தசைகள் நிகளத்திலமைந்திருக்கின்றன.

தமரகத்திலுள்ள நார்த்தடங்களிலும் அதன் வெளிப்புறத்திலும் அனேக சிலேஷ்ம கோளங்களிருக்கின்றன. இக்கோளங்கள் தமரகச் சுவற்றை ஊடுருவியும் இருக்கின்றன. இவைகள் தமரகத்தின் உட்புறமிருக்கும் சிலேஷ்ம சவ்வில் வாயுடையவைகளாய் இருக்கின்றன.

தமரகக்கிளைகளிரண்டும் தமரக மாதிரியே கட்டடங்களையும் கங்கணங்களையு முடைத்தானவைகளாயிருக்கின்றன. ஆனால் வலதுபக்கமிருப்பது இடதுபக்கமிருப்பதைவிட குள்ளமாயும் அசலமாயும் சொல்ப திகந்த சமமாயுமிருக்கின்றது. நுரையீரலின் வஸ்துவின்னுட் புருந்த பிறகு கங்கணங்கள் ஏறக்குறைய விருத்தசேதன ரூபங்களாய் சுற்றளவு முழுமையிலும் விரிபித்து இருக்கின்றன.

தமரகக்கிளைகள் நுரையீரலின் வஸ்துக்களில் பல பிரிவுகளாகவும், அப்பிரிவுகள் அனேக உட்பிரிவுகளாகவும் பலவாறாய்ப்பிரிந்து, போகப்போக அதிக துட்பகுழாய்களாகி சுருவியின் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் ஊடுறுத்து, கடைசியில் நுரையீரல்களின் அதிக துட்ப அணுமாதிரமான பாகங்களாகிய லோபியூல்ஸ் (lobules) என்று சொல்லப்படும் பாகங்களில் போய் முடிகின்றன.

இவைகளிலும் பெரிய கிளைகளின் சுவர்கள் பலமானசவ்வால் அமைக்கப்பட்டு இருப்பதுமன்றி முருந்து கங்கணங்களையும் உடைத்தானதாயிருக்கின்றன. இம்முருந்து கங்கணங்களினால்தான் இவைகளில் துவாரம் திறந்து இருக்கின்றது. இந்தச் சுவர்களிலும் படடையற்ற சதை நார்த்துக்களும், நீண்ட நெகிழ்ந்தாரமும் தசைகளும் இருக்கின்றன. இவைகளினுட்புறத்திலும் சிலேஷ்மச் சவ்வு படிந்து சவ்வின்மேல்புறத்தில் சலன பரிஸ்தாபிதமுமிருக்கின்றது. சிலேஷ்மசவ்வில் சிலேஷ்ம கோளங்கள் அனேகமிருக்கின்றன. தமரகக்கிளைகள் சிறியதாய் போகப்போக அவைகளின் சுவர்கள் மெலிவடைந்து கொண்டேவருகின்றன. முருந்து கங்கணங்கள் குறைவாகி விட்டுவிட்டு இருக்கின்றன. போகப்போக குழல்கள் அதிகச் சிறியதாய்விட்டால் முருந்து கங்கணங்களுக்குப்பதிலாக முருந்து செதில்கள்தான் காணும். இப்படிப் பல பிரிவுகளாய்ப் பிரிவதினால் குழல்கள் சிறியதாகி குழலின் சுவர்கள் ஆங்குலக் குறுக்களவாகிவிட்டால் முருந்து சம்மந்தமற்றுப்போகின்றன. பிறகு அந்தச் சுவர்கள் நெகிழ்ந்தாரமும் தசைச் சவ்வாலும் தரைவளையங்களாலும் ஆகிய சுவர்களாகிவிடும். ஆயினும் அவைகளிலும் துட்பசிலேஷ்ம சவ்வு படிந்திருக்கும். சலன பரிஸ்தாபிதமும் இருக்கும்.

நுரையீரல்களின் கட்டடம்.

ஒவ்வொரு நுரையீரலிலும் ஒவ்வொரு பாகமும் வெவ்வேறாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பிரிவுகளுக்கு இதழ்கள் (lobes) என்று சொல்லலாம். வலது நுரையீரலில் மூன்று இதழ்களும் இடது நுரையீரலில் இரண்டு இதழ்களாயிருக்கின்றன. இந்த இதழ்கள் ஒவ்வொன்றும் அனேக சிறிய (lobules) இதழ்களாலானவைகள். ஒவ்வொரு புப்புச்சிறிய இதழையும் நுரையீரலின் சிறுருவென்று எண்ணலாம். என்னில் இவைகள் ஒவ்வொன்றிலும் சுவாசக்குழாய் கிளைகளும், சுவாசப்பை

னும் (air cells), இரத்தக்குழல்களும், நரம்புசூழும், நிணங்களும், கொஞ்சம் வலைபோன்ற சவ்வும் உடையனவைகளாயிருப்பதினால்தான்.

ஒரு சிறிய இதழினுள்சென்ற பிறகு சிறிய சுவாசக்குழாய் பல பிரிவுகளாகப் பிரிவின்றது. அதன் சுவர்களும் அதிக மெல்லியதாக ஆய்விடுகின்றன. கடைசியில் அதிக துட்பமான வலைச்சவ்வும் நெகிழ்ந்தாரமும் தசையும்மாதிரிமே சுவற்றிலிருக்கின்றன. துட்ப சிலேஷம் பரிஸ்தாபிதமும் இருக்கின்றது. அதே காலத்தில் அவைகள் வடிவில் உருவம் மாறியிருக்கின்றன. முடிவுபெரும் இடங்களில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கிளைபும் வாய்களையுடைய அகன் சுவர்களும் பலவிதமாய் மடிந்து சிறிய பைகள் போல அமைந்து இருக்கின்றன. இந்தப் பைகளுக்கு காற்றுப்பை என்றுபெயர். இந்தப் பைகள் 3 முதல் 5 அங்குல குறுக்களவுள்ளவைகளாயிருக்கின்றன. இவைகளின் சுவர்கள் அதிகதுட்பமான தசைகளால் அமைந்திருக்கின்றன. பைகள் ஒவ்வொன்றிற்கு மத்தியிலுள்ள பாகங்களுக்கும் அதேமாதிரி சவ்வுபடிந்திருக்கின்றது. பைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சம்பந்தப்படும் துலாரவாயில் இந்தச் சவ்வு மடிந்திருக்கின்றது. அதே மாதிரியாகவே சுவாசக்குழாய்கள் வாயின் பக்கங்களிலும் மடிந்திருக்கின்றன. அதே நெகிழ்ந்தாரமும் நார்த்தசைகளும் பையின் மேலும் மத்தியபாகங்களிலும் பரவியிருக்கின்றன. பைகள் விரிந்த பிறகு அவைகள் சுருங்க இவைகள் மிகவும் உபயோகமாயிருக்கின்றன. சுவாசப்பைகளினுள் பரிஸ்தாபிதமிருக்கின்றது. இவைகளில் சலன பரிஸ்தாபிதமில்லை. இந்தச் சுவாசப்பைகளுக்கு வெளியே புப்புசத் தந்துகி வலைகள் அதிக நெருக்கமாய் பரவப்பட்டிருக்கின்றன. சுவாசப்பைகளிலிருக்கும் ஆகாசவாயுவுக்கும் இத்தந்துகிகளிலிருக்கும் இரத்தத்திற்கு மத்தியில் அதிக துட்பமாய் மெலிந்து இருக்கும் பைகளின் சுவர்ச்சவ்வும் தந்துகிச் சுவர்ச்சவ்வுமல்லாமல் வேறே யாதொன்றும் கிடையாது.

தவிர சுவாசப்பைகள் ஒவ்வொன்றிற்கு மத்தியிலிருக்கும் சவ்வுமடக்கங்களிலும் சுவாசப்பையின் சுவர்கள் மத்தியிலும் ஒரேபடை தந்துகி இருக்கிறபடியால் இரத்தத் தந்துகிகளிலுள்ள இரத்தம் இருபுறமும் காற்றுப்பட வசதிபெற்று இருக்கின்றது. துரையீரலின் மத்திய பாகத்துக்கருகிலிருக்கும் சுவாசப்பைகள் சுற்றளவண்டை யிருப்பதை விட அதிக சிறியவைகளாகவும் அவைகளின் தந்துகி வலைகள் அதிக நெருக்கமாகவும் இருக்கின்றன. அடுத்திருக்கும் இதழ்களின் பைகள் ஒன்றுக்கொன்று சுவாசப்போக்கு சம்பந்தமற்று இருக்கின்றன.

சுவாசக்குழலின் கிளைகளில் ஒன்றை மூடிவிட்டால் அதன்வழியாக எந்த சுவாசப்பைகளுக்கு காற்றுப்போருமோ அந்தப் பைகளுக்கு மூடிப்பிறகு காற்றுப்போகிறதில்லையாகையால், ஒரே இதழிலும்கூட ஒருகுழற் கிளைகளின் சுவாசப்பைகளுக்கும் மற்றொருகுழற் கிளைகளின் சுவாசப்பைகளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது.

துரையீரலுக்கு இரத்தம் இரண்டு ஊற்றினின்றும் வருகின்றது. அவையாவன, (1) புப்புசநாடி (2) மார்புப் பெரு நாடியின் கிளைகளில் ஒன்றாகிய தமரக்கிளைகளைச் சேர்ந்த நாடி. இதில் புப்புசநாடியால் நாள இரத்தமாகிய கரு இரத்தத்தை நாடி இரத்தமாக சுத்திசெய்த துரையீரலுக்குக் கொண்டுபோகிறபடியால் இந்த இரத்தத்தினால் அது போரும்வழியிலுள்ள புப்புசத் தசைகளைப் போஷிக்கிறதில்லை. மார்புப்பெருநாடியின் கிளையாகிய சுவாசக்குழற் கிளையின்நாடி பல பிரிவாகப்பிரிந்துக் குழல்களின் சுவர்களினுள்ளும், பெரிய புப்புசக்கருவிகளிலும், இதழ்களின் உட்பக்கமிருக்கும் தசைகளிலும் பரவி அவைகளைப் போஷிக்கின்றன. சுவாசக்குழாய்க் கிளைகளைச் சேர்ந்த இரத்தநாடியினின்று இரத்தம் அவைகளிலிருக்கும் நாளங்களாலும் புப்புசநாளங்களாலும் மறுபடி திரும்பிவருகின்றன.

துரையீரல்களில் நினைதீரும் நிணப்பைகளும் இருக்கின்றன.

துரையீரல்களில் நரம்புகளுமிருக்கின்றன. இந்த நரம்புகள் ஒற்றுணர்வுள்ள நரம்புகளினுடையவும், சுவாச நரம்புகளினுடையவும் திணைகளினால் ஆக்கப்பட்ட புப்புச நரம்பு வலைக் கூட்டத்தின் முன்பக்கம் பின்பக்கம் இவ்வி ரண்டு பக்கத்து நரம்புகளுக்குச் சேர்ந்தவையாக இருக்கின்றன. கருவிசளினுடையவும் குழல்களினுடையவும் போக்கை அனுசரித்து நரம்புகள் பரவியிருக்கின்றன. குழல்களின் சுவற்றில் ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் வேர் முடிப்புக்களையுங் காணலாம்.

சுவாசயந்திரிகம்.

சுவாச வேலையில் மார்பின் சுவர்கள் விரிவதிலும்கருங்குவதிலும்கூட ஆகாசவாயுவானது மாறிமாறி உள்நுக்கு வாங்கப்பட்டும் வெளிக்கு விடப்பட்டும் வருகின்றது. இந்த அசைவுகள் உண்டாகும் பந்திரிகத்தை சரியாய்த் தெரிந்துகொள்ளும்பொருட்டு பின்வரும் சங்கதிகளை கவனத்திற் வைக்கவேண்டும்.

துரையீரல்கள் இரண்டு தனிமையான கரைப் பைகள். இவைகள் தேகத்துக்கு வெளிப்புறத்து ஆகாசத்துடன் கலப்பதற்கு இரண்டுபைகளுக்கும் பொதுவான சுவாசக்குழாயுடன் இருக்கின்றவை. தவிர இந்தப் பைகள் மார்பின் உட்புறச்சுவர்களை ஒட்டி ஒற்றேபோல எப்பொழுதும் இருக்கின்றன. இவைகளின் அடிப்புறமோ மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் மத்தியிலிருக்கும் சதைச்சுவராகிய (Diaphragm) விதானத்துடனும் ஒட்டி ஒற்றேபோல இருக்கின்றன. துரையீரல்கள் தாம் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் படியான சகல பாகங்களின் அசைவுகளை அனுசரிக்கின்றன. இதற்கு காரணம் வெளிப்படையாயிருக்கின்றது. துரையீரற்பையின் வெளிப்பாகம் ஆகாச அமுக்கத்திற்கு உட்பட்டதல்ல. உட்பாகமோ அப்படிப்பட்ட அமுக்கத்திற்கு உட்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையினாலே தேகத்துக்கு

அத்தி.]

சுவாசயந்திரிகம்.

129

வெளிப்புறமிருந்து இதனுட்புறம் பிரவேசிக்கும் ஆகாச அமுக்கத்தின் சக்தியால் துரையீரல்கள் அவைகளைச் சுற்றி அருகிலிருக்கும் பாகங்களைச் சேர்ந்து இருக்கும்படி அமுக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றன. இப்படி அமுக்குவதினால் பரிப்புச்சங்களுக்கு இடையேயிருக்கும் சந்து அடைந்ததுபோலாகிவிடுகின்றது. வேறு யாதொரு காரணத்தினாலாவது, உதாரணமாக, மார்பின் சுவர்வழியாக ஒரு துவாரம்செய்து அதினுடே காற்று உட்புகுந்து பரிப்புச்சப் பையையும் நிறைத்துக்கொண்டு துரையீரலுக்கு இருபக்கத்திலும் ஆகாச அமுக்கமுண்டாகிவரையில் மேற்சொன்னபிரகாரமே துரையீரல்கள் அவை பக்கத்திலிருக்கும் அவயவங்களை ஒட்டி ஒற்றேபோலத்தானிருக்கவேண்டும். இனி எப்படிப்பட்ட செய்கையால் சுவாச சலனங்கள் உண்டாகின்றனவென்பதை நாம் யோசிப்போம்.

இப்பொழுது நாம்சொன்ன சங்கதிகளால், துரையீரல்களுக்குள் ஆகாசவாயு வரும்படி நிஸ்வாலிக்க, மார்பின் பக்கத்துச் சுவர்களாவது, மார்பின் உட்புறத்தரையாவது, அல்லது இவ்விரண்டுமாவது துரையீரலின் உட்புற குழாய் விரியும்படிக்கு அசைய வேண்டியதாயிருக்கின்றது. இவைகளின் அசைவால் துரையீரல் விரிந்தால் அதினுள் இருக்கும் ஆகாசவாயுவின் அமுக்கத்தின் வேகம் குறைகின்றது. இக்குறையை நீக்க அதிக ஆகாசவாயு வேண்டி வருகின்றது. வேண்டிய வாயு குரல்வளை தமரக மூலமாய் வருகின்றது. ஆகாசவாயு வெளிப்பட்டுப்போக, மார்பின் விசாலம் சுருங்கவேண்டியதாகும். இப்படிச் சுருங்குவதால் உண்டாகும் அசைவுகளால் துரையீரலில் உள்ள காற்று வெளியே தள்ளப்படும். துரையீரலினுள்ளிருக்கும் காற்று அமுக்கமதிகமாகி, அமுக்கமதிகமாயிருக்கும்வரையிலுந் காற்று வெளியேதான் போய்க்கொண்டிருக்கும். இவ்விரண்டு செயல்களிலும், அதாவது காற்று துரையீரல்களினுள்ளே புகவும், அவை நின்றும் வெளியேவரவும் உள்ள வழி தமரகமும் குரல்வளையுமே

யாகும். ஏனெனில் வேறு வழி கிடையாது. இந்தக் காரணங்களால் எப்பொழுதும் நுரையீரல் மார்பை ஒட்டியே யிருக்கின்றது. ஆனதுபற்றி மார்பு விரிகிறதென்றால் நுரையீரல் விரிகிறதென்பதோபாயம்.

நிஸ்வாஸ உஸ்வாஸங்களுக்கு, அதாவது ஆகாசவாயு உட்புகுந்து வெளிவா மார்பின்குழி ஏப்படி மார்பிமார்பி விரிந்து சுருங்குகிறதென்பதை ஆலோசிக்கலாம். நிஸ்வாஸத்தில் மார்பு விரிவது சமையின் செயலாம். நிஸ்வாஸ சதைகளினுடைய செயலின் குணம் மார்புக்குழியின் பரிமானத்தை விருத்தி செய்வதாகின்றது. இப்படி அதிகரிப்பது இருபுறமாகிருக்கின்றது. (1) லம்பன திக்கிலும் (உச்சி திக்கிலும்), (2) பார்சு திக்கிலும், முன்னுக்கும் பின்னுக்குமுள்ள குறுக்களவிலும்.

(1) விதானம் சுருங்குவதால் அது கீழுக்கு இறங்குகின்றது. அதனால் மார்பின் லம்பன திக்குக் குறுக்களவு அதிகரிக்கின்றது. விதானத்தின் இரண்டு துளிகளிலுள்ள சதைகள் அதிகமாய் கீழேநிற்குகின்றன. மத்திய பாகத்தைய அளவளவாய் அசைக்கிறதில்லை. விலா எலும்புகளிடையிலிடப்படவும், மற்றமுள்ள சதைகள் அதே காலத்தில் மார்பின் பக்கங்களை விதானம் சுருங்கும்பொழுது தன்னுடன் கீழுக்கு இழுத்துக்கொள்ளாமல் பிடித்துக்கொள்ளுகின்றன.

(2) விலா எலும்புகள் மேலுக்குப் போவதினை மார்புக்கு, பார்சுதிக்கு குறுக்களவும் முன்னுக்கும் பின்னுக்குமுள்ள குறுக்களவும் அதிகப்படுகின்றது. விலா எலும்புகளில் பெரும்பாகம், முள்ளந்தண்டிலும், (மார்பின் பக்கங்களும்) (வலம்-வலம்) அவலம்பனமாய் சாய்ந்தொல கட்டப்பட்டிருக்கின்றன.


விலா எலும்புகள் உயர்வதற்கு, அவைகளின் முன்பக்கத்திலும் அனலைப்பக்கங்களிலும் தான் அரைகின்றன. பின்பக்கத்து துளிகள் அதிக பலராய் முள்ளந்தண்

டில் கட்டப்பட்டிருக்கிறபடியால் அசைவந்து இருக்கின்றன. முன்பக்கத்திலிருக்கும் விலா எலும்பு துளிகள் அசையும்பொழுது மார்பு எலும்பும் மேலுக்குப்போகின்றன. அப்பொழுது அது முன்னுக்கும் போகின்றது.

சாதாரணமான நிதான நிலைவரல்தில் விலா எலும்புகளை உயரும்படிசெய்யும் சதைகள், விலா எலும்புகளின் இடையிலிடப்பட்ட சதைகளின் வெளிபாகமும், விலா எலும்புகளின் இடையிலிடப்பட்ட சதைகளின் உட்பாகத்தில் விலாமுருந்துகளுக்கு மத்தியிலிருக்கும் பாகங்களுமாம். இவைகளுக்கு ஒத்தாசையாக விலாத்துக்கு நகர் (levator costarum) கருக்குச்சதை முன்புறப் பெரு நகர் (serratus posticus superior) என்னும் சதைநார்களுமிருக்கின்றன. பின்புறத்தைவகளின் செயல் அதிக கலப்பமானவை. முள்ளந்தண்டில் கட்டப்பட்டு இந்த தலைநார்கள் அவலம்பன திக்கில் கீழுக்கும் முன்னுக்கும் போய் விலா எலும்புகளுடன் சேர்த்திருக்கின்றன. விலா எலும்புகள் கருங்கும்பொழுது அவைகளை மேலுக்கு இழுக்கும் சக்தியுடையவைகள்.

26-ம் படம்.

27-ம் படம்.



26-ம் படம்.—வெளிப்புற விலாவிடைத் தசைகளின் செயலை விளக்கு முபகாணப்படம்.—நகீக்.

27-ம் படம்.—உட்புற விலாவிடைத் தசைகளின் செயலை விளக்கு முபகாணப்படம்.—நகீக்.

விலா எலும்புகளிடையிடப்பட்ட சதைகளின் தொழில் அவ்வளவு சுருவாய்ச் சொல்வதற்கு. ஒவ்வொரு விலாவிலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறதாயால் இவைகளிற் முக்கும் திசையிதென்று சொல்வது கஷ்டமாயிருக்கும் ஆயினும் மேல் வரைந்திருக்கும் சிறிய உபகரணத்தினால் உதகரிக்கலாம். A. B. என்பது நிறுத்திவைத்திருக்கும் ஒரு ஸ்தம்பமாகும். இதை முள்ளந்தண்டாக் பாவித்துக்கொள்ளுங்கள். இதில் இரண்டு சட்டங்கள் G. H. M. N. என்பதைக் குறுக்கேவைத்து இருக்கிறது. இவைகளை இரண்டு விலா எலும்புகளாக் பாவித்துக்கொள்ளவேண்டும். இவைகள் முன்பக்கத்தில் இன்னொரு சட்டத்தால் ஒட்டப்பட்டதாக் பாவித்துக்கொள்ளவேண்டும். அந்தச் சட்டத்தின் ஒட்டுகள் அசையவிடும்படி மாட்டியிருப்பதாக் பாவித்துக்கொள்ளவேண்டும். அதற்கு H. N. என்று வைத்துக்கொள்ளுவோம். இவ்வித உபகரணங்களுக்கு நெகிழ்ந்தாரமும் கயர்கள் விலாவிடையுள்ள தசைகள் வெளிப்புறத்து தசைகள் மாதிரிகட்டினால், அதாவது C. D. யாக் பாவித்துக்கொள்ளலாம். இப்பொழுது C. D. யை கீழுக்கும் முன்னுக்கும் போவதுபோல வைத்துக்கொள்ளவேண்டியது. விலா எலும்புகளை அவைகள் உயர்த்தும்பொழுது P₁ D₁ இருப்பதுபோல ஆகும். அப்படியல்லாமல் அவைகள் விலாவிடையுள்ள உட்புறத்தசைகள் மாதிரிகட்டினால், அதாவது E. F. மாதிரி கீழுக்கும் பின்னுக்கும் கட்டினால் அவைகள் கீழே அமரும்பொழுது E₁ F₁ மாதிரி வந்தவிடும்.

முன்சொன்ன சங்கடிகளை சுருவில் விவரிக்கலாம். விலாவிடையுள்ள சதைகள் சுருங்கும்பொழுது மற்ற சதைகள்போலவே சுருங்குகின்றன. அதாவது அவைகள் துணிகள் எவைகளில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவைகளை ஒன்றின்பக்கம் மற்றொன்றை சமீபத்தில் வரும்படி செய்யும். இந்தமாதிரி செய்வதற்கு விலாவிடையுள்ள வெளிப்புறச் சதைகள் விலாவை உயர்த்தும். இவை

கள் கட்டப்பட்டிருக்கும் இடங்களாகிய C. D. என்பவை குத்தாய் வரைந்திருக்கும் கோடு ஸ்தானத்தில் வரும் பொழுது அவை இரண்டுமேதிக சமீபமாயிருக்கின்றது. விலாவிடையுள்ள உட்புறச் சதைநார்கள் இதற்கு விரோத திசையில் தொழில்புரிகின்றன. அவைகள் சுருங்கும்பொழுது விலாவைக் கீழுக்கு இழுக்கின்றன. அப்படி கீழுக்கு இழுத்தால்தான் E. F. பாகங்கள் ஒன்றின்பக்கம் ஒன்று வரும்.

விலாவின் முருந்துகள் அவலம்பனப்பட்டு சாய்ந்திருக்கிறபடியால், விலாவிடையுள்ள சதைகளின் முருந்து நார்கள் விலாவிடையுள்ள வெளிப்புறத்துச் சதைகளின் தொழிலையொத்துத் தொழில்புரிவதாகும்.

அமைதியான சுவாசத்தால் மார்பின் அடிப்புறம் மேற்புறத்தைவிட அதிகமாய் விரிகின்றது. வேணுமென்று நிஸ்வாஸத்தை அதிகப்படுத்தினால் மேற்புறத்தில் அதிகமான விரிதல் காணும்பொழுதுகிறது.

அசாதாரணமான அல்லது வேணுமென்று செய்யும் நிஸ்வாஸத்தில், உதாரணமாக கொடிய முயற்சிகளிலாவது அல்லது யாதுகாரணங்களாலாவது முச்சு தடைபட்டு பிரயாசத்துடன் காற்றை உள்வாங்கவேண்டுமானால், இப்பொழுது சொன்ன சதைகளல்லாமல் வேறு சதைகளும் தொழில்புரிந்து உதவவேண்டியிருக்கின்றன.*

நிஸ்வாஸத்தில் மார்பு விரிவது பல் ஜனங்களில் சில வேறுபாடுகளை யுடையதாயிருக்கின்றது. சிறிய குழந்தைகளில் முக்கியமாய் விதான அசைவால்தான் சுவாசம் போய்வரும். உஸ்வாஸத்தில் அவைகள் அதிக வளைவாகிப் பிறகு சுருங்கும்பொழுது வளைவு குறைந்து நீளமாகி கீழே போவதினால் உதாரணத்தை அமுத்தி வயிற்

* இவைகளுக்கு இங்கிலாந்து பாக்ஷில் scaleni சதைகள் sternomastoid சதைகள் serratus magnus, pectorales, trapezius என்று பெயர்களாம்.

நின் மேற்புற சுவற்றை முன்னுக்குத்தள்ளும். வயிற்றின் சுவற் அசைவது மற்ற பாகங்களைவிட நன்றாய்க் காணுவதினால் இந்த சுவாசத்திற்கு உதவாஸ்வாஸம் என்று சொல்வார்கள். (நாபிஸ்வாஸம் என்றும் சொல்லலாம்.) வயது வந்தவர்களில், விதானம் கீழேபோவதுடனும், வயிற்றின் மேற்புறச்சுவற் முன்னுக்குத் தள்ளிவருவதுடனும், நிஸ்வாஸத்தில் மார்பும் மார்பின் எலும்பும் விசாலமான அசைவுடையதாயிருக்கின்றன. பெண்களில், அசைவு அடிப்புறத்தில் அதிகக் குறைந்தும் மேற்புறத்தில் அதிக விசாலமாயும் காணும். இதற்கு விலாச்சுத்தைய சுவாசமென்று பெயர்.

நிஸ்வாஸத்திலுண்டாகும் விரிவானது மார்பும் துரையீரலும் அவைகளுக்குடைய நெகிழ்ந்தாரமும் தன் மையாலேயே சாதாரண அமைதியான உஸ்வாஸத்தில் மாறி நுண் ஸ்திதிக்குத் திரும்பிவரும்; நிஸ்வாஸத்திற்கு வேண்டிய சதைகளின் வேகம் மார்பை விரியச்செய்யவும், துரையீரல்களினுடையவும் மார்புச் சுவர்களினுடையவும் நெகிழ்ந்தாரமும் சக்தியை தள்ளுவதற்காக உபயோகப்பட்டபிறகு தளர்ச்சியடைவதினால் சதைகள் சுருங்குவது நின்று அவை விரிவதினால் உஸ்வாஸம் உண்டாகின்றது.

நெகிழ்ந்தாரமும் பின்னுக்குச்செல்லும் துரையீரலின் தன்மையே சாதாரணமாய் அமைவுடன் சுவாசம் விடுவதில் உஸ்வாஸத்திற்கு போதுமானதாயிருக்கின்றது. சதைகளின் சக்தி வேண்டியதில்லை. வேனுமென்று உஸ்வாஸத்தில் முசைவிட்டால், உதாரணமாக, பேசுவதினாலும் பாடுவதினாலும், ஊதுவதினாலும், இவைபோன்ற மற்றுமுள்ள உஸ்வாஸங்களில் இந்த நெகிழ்ந்தாரமும் சக்தியைவிட வேறுபலம் வேண்டிவருகிறது. அப்பொழுதுகளில் சரியான உஸ்வாஸத்திற்கு வேண்டிய சதைகள் தொழில்புரிகின்றன. இவைகளில் முக்கியமானது வயிற்றுச்சதைகள். இவைகள் உதாரந்தரத்தை அமு

க்குவதினால் விதானத்தாலாகிய மார்பின் தரையை மேலுக்குத் தள்ளுகின்றன. இப்படிச் செய்வதினால் துரையீரல்களுக்கு வேகம்காங்கி அவைகளிலிருக்கும் காற்றை தம் ரகம் குறல்வளை மூலமாக வெளியே தள்ளுகின்றன. ஆயினும் விலா எலும்புகளை பின்னுக்குத்தள்ளும் எஸ்வாஸசதைகளும் உஸ்வாஸத்திற்கு வேண்டிய சதைகளை அணுசரித்தே தொழில்புரிய வேண்டியிருக்கின்றன. இவைகளினால் வயிற்று சதைகளுக்கு இந்த விலாச்சதைகளும் ஒத்தாசை புரிகிறதென்றே சொல்லவேண்டியிருக்கிறது.*

உஸ்வாஸத்திற்கு வேண்டிய சதைகளின் முயற்சியால் மார்பானது தன்னுடைய சாதாரண குறுக்கானவையிடச்சிறியதாகச் சுருங்கிவழிபிறகு சதைகள் விரிவடைகின்றன. அப்பொழுது மார்பு தன்னுடைய சாதாரண அளவுக்கு தன்னுடைய நெகிழ்ந்தாரமும் தன்மையாலேயே திரும்பிவரும். இவைகளிலே மார்பின் சுவற் கட்டடங்கள் அதை அதிக மாய் விரியவொட்டாமலும் அதிகமாய் சுருங்கவொட்டாமலும் காத்துக்கொள்ள மிகவும் அற்புதமாய் அமைந்ததாகின்றது.

முந்திச் சொல்லியபிரகாரம், துரையீரல்கள், நிஸ்வாஸத்தில் விரிந்தபிறகு சுவாசப் பைகள்மேலும் அவைகளைவிடவும் உள்ள தமரகக் கிளைகளின் நெகிழ்ந்தாரமும் தசைகளாலும், இவைகளை சுற்றியிருக்கும் பரிப்புப்புச பைபின் நெகிழ்ந்தாரமும் தசைகளாலும் சுருங்குகின்றன. ஆனால் அவைகளை முழுவதும் சுருங்க ஒட்டாமல் மார்பின் சுவர்களினருகிலேயே யிருக்கும்படி துரையீரல்களிலுள்ள ஆகாச வாயு அமுக்கம் செய்கின்றன. ஆகையால் துரையீரல்கள் அசைவது மார்புச் சுவர்களின் அசைவினுடைய அளவேயாகின்றன.

* இவைகளில் முக்கியமானவை உட்புற விலாயிடைச் சதைகளும், triangularis sterni, serratus posticus interior, quadratus lumborum என்பனவுமாகும்.

சுவாசலயம்.

மார்பு விரிவதும் சுருங்குவதும் சாதாரண சமயங்களில் ஏறக்குறைய ஒரே கால அளவில் ஆகின்றன என்று காண்கிறது. பெண்களிலும் குழந்தைகளிலும் நிஸ்வாஸத்திற்கு உஸ்வாஸத்திற்கு வேண்டியதைவிடக் கொஞ்சமளவு குறைந்தகாலம் போதுமானதாயிருக்கும். உஸ்வாஸம் முடிந்து அடுத்த நிஸ்வாஸம் ஆரம்பமாவதற்குமுன் மத்தியில் கொஞ்சம் விராமகாலமுமிருக்கின்றது.

சுவாசலயத்தை பின்வருமாறு சொல்லலாம்.

நிஸ்வாசம். 6.

உஸ்வாஸம். 7 or 8.

பின் கொஞ்சம் விராமகாலம்.

சுவாச சத்தங்கள்.

மார்புச் சுவற்றின்மேல் காதை வைத்துக் கேட்டால் அல்லது சத்தத்தை தெரிவிக்கும் சுருவியைக்கொண்டு கேட்டாலும் நிஸ்வாஸ உஸ்வாஸ காலங்களில் அயர்ந்த சுவாச முறுமுறுப்பு ஒன்று கேட்கும். அதின் முன்சொன்னகாலத்தில் கேட்பது வெகு நன்றாய் கேட்கும். இந்த சத்தம் ஆகாசவாயு துரையீரலினுட் புகும்பொழுதும் வெளிவரும்பொழுதும் சுவாசக் குழாய்களின் உட்பக்கத்திலும் சுவாச பைகளின் உட்பக்கத்திலும் உரைவறியால் உண்டாகும் சத்தமாகும். இந்த சத்தம் காற்று தமராகக் கிளைகளில் செல்லும்பொழுது அதிகமாகவும் போகப் போக சத்தம் குறைந்து சுவாசப் பைகளில் வரும்பொழுது மிகக் கீணகதியடைந்துமிருக்கின்றது. இதை குழந்தைகளில் நன்றாய்க் காணலாம்.

கிருகவாயிலின் சுவாச சலனம்.

மார்புக்குள் காற்றை வாங்கும் சதைகள் தொழில்புரியும் காலத்தில், காற்று துழையும் துவாரவாயில் இருக்கும் சதைகள் வேலையற்று இருக்கிறதில்லை, அவசரத்தில்

சுவாசம் விடும்பொழுது மூக்கு இயற்கையாய் விரிவதைப் பார்க்கலாம். ஆனால் சாதாரண காலங்களில் அது காணப்படிகிறதில்லை. குரல்வளையின் மேல்பாகத்தில் இருக்கும் துவார வாய், ஒவ்வொரு நிஸ்வாஸத்திற்கும் காற்று தடையின்றி போவதற்காக விரிகின்றது. ஒவ்வொரு உஸ்வாஸத்தின் பொழுதும் கொஞ்சம் குறுகுகின்றது. இதன் தன்மை உஸ்வாஸத்தில் மார்புச் சுவர்களின் அசைவை ஒத்து இருக்கின்றன. தவிர மார்புச் சுவர்கள்போலவே, கிருகவாய் சாதாரணமாக தசை சக்தியால் விரிவதும் நெகிழ்ந்தாழும் தன்மையால் சுருங்குவதுமாகும். ஆயினும் இனிமேல் விவரிக்கப்படும். பல தருணங்களில் குரல்வளை வாயின் சுருக்கத்திற்கு அதிக சதை சக்தி வேண்டியதாகக் காணலாம்.

கிருகவாயின் அசைவுகளை புப்புசோதர நரம்பின் குரல்வளைக் கிளைகள் வியாபித்து தொழில்புரியச் செய்கின்றன. அவைகளில் உத்தமமானது உள்நோக்கிய ஸ்பரிச நரம்பாகும். அதமமானது வெளிநோக்கிய சலன நரம்பாகும். உத்தமக் குரல்வளை நரம்பு சுவாச சலனங்களை மட்டுப்படுத்தும் குணமுடையதாகக் காண்கிறது. அதை அறுத்துவிட்டு அறுத்த நுனியை உத்திபனப்படுத்தினால் நிஸ்வாஸங்கள் நிகரானித்துவருகின்றன. அதாவது எண்ணத்தில் குறைகின்றன. உத்திபனத்தை அறுப்படுத்தினால் விதானம் அசைவற்று நின்றுபோகின்றது. உஸ்வாஸச் சதைகளும் தொழில்புரிவதில் தீட்சணமுடையவைகளாகின்றன.

சுவாச(த்துக்கு வேண்டிய) காற்றினளவு சாதாரணமான அமைதியுடன் இருக்கும். ஒவ்வொரு சுவாசத்திலும் துரையீரல்களில் மாயிவரும் காற்றினளவு, நடுப்பிராயமுள்ள வியாதியற்ற ஆண்களில், 30 முதல் 35 கன அங்குலமாகும். பெண்களில் கொஞ்சம் குறையும்.

ஒரு ஆளினுடைய துரையீரல்கள் வழியாய் 24 மணிநேரத்தில் உள்ளேசென்று வெளியேவரும் காற்றின்

மொத்த அளவு சுமார் 686,000 கன அங்குலமிருக்கும். முயற்சி முதலியவைகளால் இந்த அளவு அதிகப்படும். இதேகஷ்டப்படும் வேலைக்காரன்விஷயத்தில் இதன் அளவு சுமார் 1, 568,390 கன அங்குலங்களாம்.

வழக்கமாய் ஒவ்வொருதரமும் போய் மாறுபாடடைந்துவரும் சுவாசத்துக்கு சுவாசகாத்து என்று சொல்லலாம். வேணுமென்று காற்றை சக்திக்கெட்டினமட்டில் உட்கொள்ளும் நிஸ்வாஸத்தில் வரும் காற்றில் சுவாசக் காற்றுக்கதிகப்பட்ட அளவுக்கு சம்பூரணக் காற்று என்று சொல்லலாம். இதன் அளவு வேறுபடும். இதைப் பற்றி சீக்கிரத்தில் சொல்லப்படும். சாதாரண உஸ்வாஸத்தின் பிறகு, சுவாசக்காற்று வெளிப்பட்டு துரையீரல்களில் இருக்கும் காற்றில் வேணுமென்று சக்திக்கெட்டின வரையில் வெளிப்படுத்துவதனால் வெளியே செல்லும் காற்றுக்கு அனுபந்தக் காற்று என்றும், வெளியேவராமல் துரையீரல்களில் நின்றுபோகும் காற்றுக்கு இருப்புக் காற்று என்றும் சொல்லலாம். கடைசியில் சொன்னது மார்பின் பிரமாணத்தை அனுசரித்து இருக்கும். ஆனால் உத்தேசமாக 100 கன அங்குல அளவு என்று சொல்லக்கூடும்.

மார்பின் மிகவும் அதிக சுவாச சக்தியை, தன் சக்திக்கெட்டினமட்டில் ஒரு மனிதன் சுவாசத்தை உள்ளுக்கு வாங்கிக்கொண்டு வெளிவிடுவதில் வரும் காற்றினால் வினாள் அறியலாம். இதற்கு பிராணசக்தி யென்று சொல்லலாம். ஒரு மனிதன் முயற்சிசெய்யுங்காலத்திலும், கஷ்டம் நேரிடும்காலத்திலும், வியாதியாயிருக்கும் காலத்திலும் அவனுக்கு இருக்கும் சுவாசசக்தியைக் காட்டுகிற படியால் அதற்கு அந்தப் பெயர் வழங்குகிறார்கள் சிலர்.

சவுக்கியமாயிருக்கும் மனிதர்களுடைய சுவாசசக்தி, ஆகாரம், பானம், வயது இவைகளைப் பொருந்தியிருக்கும் என்று சில பரிசோதனைகளால் காணுகின்றன.

அத்தி.] சுவாசத்திற்கும் நாடிக்குமுள்ள சம்பந்தம்.

சவுக்கியமாயிருக்கும் ஆளில் ஒரு மிமிஷத்திற்கு 14 முதல் 18 சுவாசங்களிருக்கும். குழந்தையாயிருக்கும் பொழுதும் வரலிப்பருவத்திலும் இதைவிட கொஞ்சம் அதிகமாயிருக்கும். மற்றும் பல காரணங்களால் பலவிதம் இது மாறியிருக்கின்றது. அவையாவன : தேசமுயற்சி அல்லது இளைப்பாறுதல் சவுக்கியம் அல்லது வியாதி முதலியனவாம். சுவாசத்தின் என்ன வேறுபாடுகள் சாதாரணமாக இரத்தாசயத்தின் நாடி வேறுபாடுகளுடன் ஒத்திருக்கும். சவுக்கியமாயிருக்கும் காலத்தில் இதன் விதிதம் 1-க்கு 4 அல்லது 1-க்கு 5 ஆக யிருக்கின்றது. இரத்தாசயத்தின் செயலின் வேகம் அதிகரித்தால், மார்பின் சலனவேகமும் அதிகரிக்கின்றது. ஆனால் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒரேவிதித்தில் அதிகரிப்பதில்லை. வியாதியாயிருக்கும் காலத்தில் முக்கியமாக புப்புச வியாதிகளில், சுவாசம் நாடியைவிட வேகமாய் ஓடும். மற்ற வியாதிகளில் நாடி சுவாசத்தைவிட விகிதத்தில் அதிகப்பட்டிருக்கும்.

துரையீரலில் காற்றுக்கு உண்டாகும் மாறுபாடுகள் காற்றின் தன்மையைப் பொருந்தினவைகளாக இருக்கின்றன. வாயுக்கள் பரவுவதின் நியாயத்தை அனுசரித்து காற்றுப்பைகளில் உண்டாகும் கரியமல வாயு உஸ்வாஸ சலனத்தின் உதவியில்லாமலே துரையீரல்களிடமிருந்து, ஆகாசக் காற்றில் கலந்துபோகும். ஏன் எனில், ஆகாசவாயுவில் அது குறைந்திருக்கின்றது. அதே நியாயப்பிரகாரம் ஆகாசக்காற்றிலிருக்கும் சுவாசவாயு காற்றுப்பைகளில் குறைந்திருக்கிறபடியால் அவ்விடத்தில் போயடையும். அந்தப் பைகளில் சுவாசக்குழாய்களிலிருக்கும் காற்றைவிடவும் தேகத்துக்கு வெளியேயிருக்கும் காற்றைவிடவும் சுவாசவாயு குறைந்திருக்கின்றது.

சுவாசவாயுவும் கரியமலவாயுவும் இப்படி துரையீரலுக்கு வெளியிலும் உட்புறத்திலும் ஒரேதன்மையாக கலந்துபோகும் குணமற்றிருந்தால், சுவாசத்திற்கு வேண்

மய அளவுகூர்ந்துக்குமேல் துரையீரலில் மிகுந்திருக்கும் காற்று நுரியமல்லவாய்வால் கெடுகியடைந்துவிடும். ஏன் எனில், சுவாச சலனத்தினாலேயே சுவாசப் பைகளிலுள்ள காற்றெல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறதில்லை. சுவாச சலனத்தால் பெரிய சுவாசக்குழாயிலுள்ள காற்றுமாதிரியும் ஒரு சமயம் வெளியாகக்கூடுமென்று காணுகிறது.

துரையீரல்களினுள் காற்றுக்கு உண்டாகும் மாறுபாடு அக்கருவிகளுக்கு உள்ளிலும் புறத்திலும் இருக்கப்பட்ட சீத உஷ்ண வித்தியாசங்களாலும் ஒத்தாசை பெருகின்றன. சுவாசக்குழாய்களிலிருக்கும் பிரிஸ்தாபிதத்தின் சலனச் சாலங்கள் எப்பொழுதும் அனுவதினால் நர சவ்வினமேல் ஒட்டிக்கொள்ளாமலிருக்கும்படி செய்கின்றன.

சுவாசச் சதைகள் செய்யும் தினசரிவேலை : 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாக 21 அடி-டன் வேலையை இச்சதைகள் செய்யுமென்று காணுகிறது.

சிறிய சுவாசக் குழல்களிலும் சுவாசப் பைகளிலும் இப்படி உள்ளேவந்து வெளியே மாறிமாறிப் போகும் காற்றுப் படும்படி, இரத்தம், வலது சடரத்தினின்று புப்புசத் தந்துகிள்மூலமாய் ஒரே நிதானமான வேகத்துடன் வருகின்றது. இந்தவேகம் அதிக தாமதமானது. இரத்தத்தின் ஒவ்வொருபாகமும் (கிவிலையும்) கொஞ்சநிமிஷ நேரங்களுக்கு காற்றுப்படும்படியாய் வருகின்றது. இரத்தத்திற்கும் காற்றுக்கு மத்தியில் மிகவும் துட்பமாயே சுவாசப்பைச் சவ்வும் தந்துகிச் சவ்வுமேதான் இடையிலேருப்பவை. புப்புச இரத்தச்சுழல் அதிக சுலபமாய் நடக்கும் செயல். ஏன் எனில் புப்புசநாடி சிக்குகளில்லாமல் சரியாக கிளகிளையாய்ப்பிரிகின்றது. அதன் கிளைகளும் நேர்கோடுகள் போலப் போகின்றன. தந்துகிவிலையும் சுவாசப்பைகள்மேலும் அவைகளின் இடை பக்கங்களிலும் ஒரே நிதானமாய் பரவப்பட்டிருக்கின்றது. இவைகளினின்று உண்டாகும் நாளங்களுக்கும் நாடிகள்மாதிரியே ஒழுங்கு

காகப்போகின்றன. இந்த நாளங்களைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பிரிந்தபிறகு கலக்கிறதில்லை. நாளங்களுக்கு கபாடங்களுக்கிடையாது. அப்படியேதாவது கிளைகள் பிரியுமிடத்து இருந்தால் அவைகளதிக சிறியதாயும் துவாரத்தை அடைக்க சக்தியற்றவைகளாயுமே இருக்கின்றன. இன்னம் புப்புச இரத்தச்சுல் ஆகாச அழுக்கத்தினால் வேறுபாடு அடைகிறதில்லை. இதற்குச் சதைகளின் அழுக்கமும் கிடையாது.

புப்புச நாடிகள் வழியாய் துரையீரலுக்குப்போகும் இரத்தம் தேக சர்வாங்கங்களுக்கும் போஷிப்புண்டாகும்பொருட்டு சுத்தப்படுவதற்கு தந்துகிசளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. புப்புச தந்துகிகளும் இந்த உத்தேசத்துடனேயே விரிந்திருக்கின்றன. ஆகையால் துரையீரல்களின் போஷிப்பைப்பற்றி இவைகளுக்கு யாதொரு சம்மந்தமும் கிடையாது. துரையீரல்களின் மற்ற பாகங்களை போஷிப்பிக்க (பரிப்புச்சம், இதழ்கள், மத்தியதசைகள், சுவாசக்குழாய்கள், கோளங்கள், இரத்தக்குழாய்ச் சுவர்கள் உள்பட) சுவாசக்குழாய் நாடிகள் என்று ஒன்று அல்லது இரண்டு நாடிகள்மூலமாய் இரத்தம் வருகின்றது. இவைவளின் கிளைகள் சகல பாகங்களையும் ஊடுறுகின்றன. சுவாசக்குழாய் நாடிகளின் இரத்தம் தன் போஷிப்பு வேலையைப் புரிந்தபிறகு நாள இரத்தமாகி சுவாசக்குழாய் நாளத்தின்வழியாக ஒருபாகம் சென்று வலது சிரவத்தில் விழுகின்றது. இன்னொருபாகம் புப்புசநாடியின் சிறு கிளைகளில் விழுந்து புப்புசநாடி தந்துகிகளில் புகுந்து, அவ்விடத்தில் மற்ற இரத்தங்களுடன் சுத்தியாகி புப்புச நாளங்கள்வழியாய் இரத்தாசயத்தின் இடது புரம்போய்ச் சேருகின்றது.

சுவாசத்தால் காற்றுக்கு உண்டாகும் மாறுபாடுகள்.

துரையீரல்களில் காற்றும் இரத்தமும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேருவதால் அவைகள் ஒவ்வொன்றினிடையிலும் சேர்க்கைகள் மாறுகின்றன. காற்றில் உண்டாகும் மாறு

142 சுவாசத்தால் காற்றை உண்டாக்கும் மாறுபாடுகள். [7-ம்

பாடுகள் வெளிப்படையாய் அறியலாம். அவைகளாவன: (1) ஆகாசவாயுவு வெப்பமடைகின்றது. (2) அதன் கரியமலவாயு அதிகரிக்கின்றது. (3) அதில் சுவாசவாயு குறைகின்றது. (4) அதின் நீர் ஆவி அதிகப்படுகின்றது. (5) மிகவும் சொல்ப அளவு இந்திரியவஸ்துவும் நவாசாரமும் அதற்கு சேர்க்கப்படுகிறது.

(1) உஸ்வாஸத்தில்வரும் காற்று துரையீரல்களின் உட்பக்கம் போய்வருவதால் வெப்பமடைந்து நிஸ்வாஸ காற்றைவிட உஷ்ணமாயிருக்கின்றது. அதன் வெப்பம் 97 முதல் 99½ மாத்திரை வரையிலிருக்கும். உட்கொள்ளும் காற்று எங்கே சிதற ஸ்திதியிலிருந்தபோதிலும் வெளிவரும்பொழுது இரத்தத்தின் உஷ்ணத்தைப் பொருந்தியிருக்கும்.

(2) உஸ்வாஸகாற்றில் கரியமலவாயு எப்பொழுதும் அதிகரித்திருக்கும். ஆனால் ஒரு குறித்தகாலத்தில் வெளிவரும் அளவு வேறுபட்டிருக்கின்றது.

இதற்கு அனேக காரணங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நிஸ்வாஸத்தினின்றும் சுமார் 100-க்கு 4½ பங்கு சுவாசவாயுவை நேகம் ஸ்வீகரித்துக்கொள்ளுகின்றது. அதற்குப்பின்வரக் காற்றில் அந்த அளவுக்குக் கொஞ்சம் குறைவாய் கரியமலவாயு சேருகின்றது. சாதாரண சமயங்களில் வியாதியற்ற புருஷன் 24 மணியில் உஸ்வாஸத்தில் விடும் கரியமலவாயு 1,346 கன அங்குலமிருக்கும். அல்லது 1 மணிநேரத்திற்கு 636 கிரெயின் இருக்கும். இந்த அளவின்பிரகாரம் ஒரு மணிநேரத்தில் வெளிவரும் கரியின் நிறை 173 கிரெயினாகும். 24 மணி நேரத்தில் 8 அவுன்சுக்கு மேலிருக்கும். இந்த அளவுகள் எல்லாம் உத்தேச அளவுகளே. அனேக காரணங்களால் இவைகள் வேறுபடுகின்றன. அவைகளில் முக்கியமானவைகளாவன. வயதும் ஜாதியும் சுவாச சஸ்தங்கள். வெளிப்புற ஆகாசம் வருஷத்தின் ருதுக்கள். சுவாசிக்கும் காற்றின் தன்மை ஆகாசத்தின் நிலைமைகள், நாளின் கால

அத்தி.] சுவாசத்தால் காற்றை உண்டாக்கும் மாறுபாடுகள். 143

உணவும் பானமும் தேகமூயற்சியும் நித்திரை முதலியவற்றைப் பொருந்தியதாகும்.

(3) சுவாசிக்கும் காற்றில் சுவாசித்தபிறகு சுவாசவாயு, சுவாசிப்பதற்குமுன் இருந்த அளவைவிடக் குறைந்திருக்கின்றது. அதன் குறைவும் கரியமலவாயு சேரும் அளவுக்குத் தக்கபடி அதிகமாயிருக்கும். காற்றில் வெளிவரும் கரியமலவாயுவின் அளவு ஒன்றுக்கு தேகத்தில் ஸ்வீகாரப்படும் சுவாசவாயு 1:17421 அளவுகொண்டதாயிருக்கும். ஒருமணிநேரத்தில் கரியமலவாயுவின் சராசரி 1,346 கன அங்குலமாகும்பொழுது, சுவாசவாயுவின் அளவு அதேகாலத்தில் 1,584 கன அங்குலமாகவேண்டும். அதாவது 542 கிரெயின்களாகும். சுத்தக்கரியுடன் வெளிவரும் சுவாசவாயுவைவிட தேகத்துக்குச் செல்லும் சுவாசவாயு எப்பொழுதும் அதிகமாகவே யிருக்கின்றது.

ஆகாசத்திலிருக்கும் உப்புவாயு எவ்வளவு உட்கொள்ளப்படுகிறதென்று சொல்வது சாத்தியமில்லை. ஆனால் அது அதிக சொல்பமாயிருக்கின்றது. நீண்ட பட்டினியாயிருக்கும்காலத்தில் இந்த வாயுவை கொஞ்சம் அளவு உட்கொள்ளுகிறோம்.

(4) நீர் ஆவி உஸ்வாஸத்தில் துரையீரலினின்றும் வெளியாகின்றது. வெளிப்படும் அளவு வெளிப்படும் காற்றை நனைக்கத்தக்க அளவாக இருக்கின்றது. இதன் மொத்த அளவு பின்வரும் காரணங்களால் வித்தியாசப்படுகின்றது. (1) சுவாசிக்கும் காற்றினளவு இது எவ்வளவு அதிகப்படுமோ அவ்வளவு நீராவி மிகமாகும். (2) காற்றை சுவாசிப்பதற்கு முன்பு அதில் இருக்கும் நீராவியின் அளவு. ஏன் எனில் இது எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கிறதோ அவ்வளவு சுவாசத்தை நனைப்பதற்கு வேண்டப்படுகிறதில்லை. (3) உஸ்வாஸத்தில் வரும் காற்றின் சீதோஷ்ணஸ்திதி. ஏன் எனில் உஷ்ணமதிகமாய் எவ்வளவு இருக்குமோ அவ்வளவுக்குக் காற்றை நனைக்க

திரவம்வேண்டிவரும். (4) ஒவ்வொருநடவையிலும் நின் வாஸத்தில் உள்ளேபோகும் காற்று நுரையிரல்களில் எத்தனைகாலம் நிற்கின்றதோ அதையும்பற்றி நீராவியின் அளவு வேறுபடும். ஏன் எனில் சாதாரண சுவாசத்தில் உஸ்வாஸக் காற்றில் நீராவியிருந்தபோதிலும், சுவாசம் அதிக விரைவில் உட்சென்று வெளிவந்தால் காற்றுக்கு வெப்பம்தாங்கவும் நீராவியடையவும் போதுமான காலம் கிடையாது.

24 மணிநேரத்தில் நுரையிரல்களால் வெளிவருநீரின் அளவு இப்பொழுது சொன்ன காரணங்களால் பல வேறுபாடுடையதாகையால், 6 முதல் 27 அவுன்சு வரையில் இருக்கும். சாதாரண சமயங்களில் 9 அல்லது 10 அவுன்சு இருக்கும். இந்த ஆவியில் கொஞ்சம் இரத்தத்திலுள்ள ஜவவாயும் நுரையிரல்களில் ஸ்னிகரிக்கப்பட்ட அதிக அளவு சுவாசவாயுவும் கலப்பதால் உண்டாகக்கூடியிருக்கலாம். ஆனால் இதின் பெரும்பாகம் அன்பு பசனக்குழல் வழியாய் இரத்தத்தில் ஸ்னிகரிக்கப்பட்ட தண்ணீராக இருக்கின்றது. ஏன் எனில் வெப்பமடைந்த இரத்தமுள்ள பிராணிகளின் ஈரமுள்ள சவ்வுகள் காற்றைக் குடிபட்டால் ஈரம் காற்றுடன் சேரும்.

(5) உஸ்வாஸக் காற்றில் நவாசாரம் இருக்கிறதென்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வஸ்து சுகல காலங்களிலும் காணப்படுகிறதில்லையாகையாலும் காணுங்காலத்தில் அதிக சொல்ப அளவு இருக்கிறபடியாலும், உணவின் பாகங்கள் பற்களிடையாகப்பட்டு அழுதிப்போவதினாலும், அல்லது பல்வின் ஊத்தைச் செதலைகளாலும் உண்டாகக்கூடும்மொகையால் இதை தற்கெயலாயிருப்பதென்று சொல்லவேண்டுமேயல்லாமல் உள்வாஸத்தில் சேர்ந்த வஸ்துவென்று சொல்லக்கூடாது.

இந்திரிய வஸ்துக்கள் 24 மணிநேரத்தில் 3 கிராமியின் வெளிவருமென்று எண்ணுகிறார்கள்.

சுவாசத்தால் இரத்தத்திலுண்டாகும் மாறுபாடுகள்.

புப்புசநாடியிருக்கும் இரத்தம் நுரையிரல்கள் வழிச் செல்வதில் வெளிப்படையான மாறுபாடு வர்ணபேதமாயிருக்கின்றது. நாளங்கனிலுள்ள துரியவரண (கருஞ்சிவப்பு வர்ணம்) இரத்தம் நாட்களிலுள்ள இரத்தத்தின் சிவப்புள்ள இரத்தமட்பர வர்ணமுள்ளதாக மாறுகின்றது. இதன் காரணத்தை முத்தியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2-வது இப்படி மாறுவதால் சுவாசவாயுவைப் பெறுகிறது. 3-வது கரியமலவாயுவை இழந்துபோகிறது. 4-வது சொல்ப வெப்பமடைகிறது (1° அல்லது 2° F.). 5-வது அதிகசீக்கிரத்தில் உறைவதில் கடடியாயும் உறையும். அதிக இரத்த நாரும் இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது.

நுரையிரல்களில் ஆகாசலக்ஷணினாலும் இரத்தத்தில் ஸ்னிகரிக்கப்பட்ட சுவாசவாயு செக்குதுகடங்கனிலுள்ள (Hemoglobin) இரத்தாணுவயத்தடன் புதிசமாய்க் கலக்கின்றது. இந்த ஸ்திதியில் அந்நாடி இரத்தத்துடன் தேகத்தில் சுகல இடங்களுக்கும் கொண்டுபோகப்படுகிறது. தந்துகிமண்டல மரக்கமாய் அதிநுட்பமாயுள்ள தசைகள் எல்லாவற்றிற்கும் இரத்தத்தை இதுவும் போய்ச் சேருகின்றது. இரத்தத்தசைகளிலும் இவைகளிற் சுழலும் இரத்தத்திலும், நாடி இரத்தத்திலிருக்கும் சுவாசவாயு கொஞ்சமளவு மறைந்துபோகின்றது. மறையுமளவுக்கு தக்க கரியமலவாயுவும் தண்ணீரும் உற்பத்தியாகின்றன.

புதிதாயுண்டான கரியமலவாயுவை உட்கொண்ட நாள இரத்தம் நுரையிரல்களுக்குத் திரும்பிவந்து அவ்விடத்தில் கரியமலவாயுவின் ஒருபாகம் உஸ்வாஸத்தில் வெளியாகிவிடுகின்றது. அவ்விடத்தில் மறுபடியும் சுவாசவாயுவைப் பெறுகின்றது.

சுவாசச்செயலை அடிக்கடி தகனத்திற்கு ஒப்பிடுவது வழக்கம். ஓர் அடைத்திருக்கும் இடத்தில் வத்தியை கொளுத்திவைத்தால் சுவாசவாயு குறைந்து ஆகாசவாயு (காற்று) வெப்பமடைந்து, கரியமலவாயுவையும் நீராவியையும் அதிகமாயடைந்து பளுவாகிவிடுகிறது. ஒரு பிராணியை ஓரிடத்திலடைத்துவைத்தாலும் அதேமாதிரியான விகாப்பங்கள் உண்டாகின்றது. கொஞ்சகாலத்தில் புதிதாக நல்ல காற்றை உள்ளேபோகச் செய்யாமலிருந்தால் வத்தியும் அணைந்துபோகும், பிராணியும் இறந்துபோகும். ஆனால் உவமை பொருந்தியிருந்தபோதிலும் மேற்படையான உவமையாகிறதேயல்லாமல் சரியானதல்ல. ஏன் எனில், சுவாசச்செயல் குடுக்கல் வாங்கலுள்ளதாயும், விமோசனகரணமுள்ளதாயும் (நீக்குதல்) ஸ்விகாரப்படுத்திக்கொள்ளும் தன்மையுள்ளதாயும் இருக்கின்றது. இந்தத் தொழிலில் சுவாசவாயு ஸ்விகாரம் செய்துகொண்டு, கரியமலவாயுவையும் நீராவியையும் வெப்பத்தையும் வெளிவிடுகிறதாயிருக்கிறது.

சுவாசவாயு தகனமடைவது வத்தியெரிவதற்கு ஒக்கும். ஆனால் இது தேகமுழுவதிலும் தகைகளில் நடக்கின்றது. துரையீரல்கள் சேதப்பட்டபொருள்களை கழிப்பதற்குமுந்தியே நடக்கும் செயலாகிறது.

கெட்ட காற்றின் குணங்கள்—காற்றலாவதல்.

துரையீரல்களினின்றும் வெளிவரும் காற்றில் அதிக அளவு கரியமலவாயுவும் கொஞ்சம் அளவு அழுகின இந்திரியவஸ்துக்களும் இருக்கிறதென்று கண்டுகொண்டோம். ஆகையால் அதேகாற்றை மறுபடியும் அடிக்கடி சுவாசத்தால் கரியமல வாயுவும் இந்திரியவஸ்துவும் அதிகமாய், கடைசியில் மாணம் சம்பவிக்கும். இந்த குணம் காணுவதற்குமுந்தியே தலைவலி சோபம், கொடுமையான ஒரு உணர்வு முதலிய வருத்தமான உணர்ச்சிகள் உண்டாகின்றன.

ஒரு மனிதன் அழுகின ஆகாச வாயுவிற்குக்கும் இடத்தில் போனவுடன் அதை உணருகிறான். ஆனால் அப்போர்ப்பட்ட காற்றிலிருந்து பழக்கப்பட்டுப்போனால் பிறகு அந்த உணர்வு உண்டாகிறதில்லை. ஆயினும் இப்படி, கெட்ட காற்றின் கஷ்டத்தையுணராமல் இருக்க இந்திரியங்கள் இசைவாக்கிக் கொண்டபோதிலும் ஜீவத்தொழில்கள் சோர்வடையும். ஆகையால் இந்தப் பிரகாரம் அறிக் காலம் கெட்ட காற்றிலிருந்தாலும், அல்லது அடிக்கடி கெட்ட காற்றில் இருந்தாலும் தேகசவுக்கியத்திற்கு கெடுதி நேரிடும். ஆகையினால் அடிக்கடி நல்ல காற்று ஏராளமாய் வருவதற்கு வேண்டிய யேற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.

ஒவ்வொரு ஆளுக்கு 2,000 கன அடிக்குக் குறையாமல் இடம் தாங்குமறைகளில் வேண்டியிருக்கிறது. 2,000 கன அடி சீடமிருந்தபோதிலும் ஒவ்வொரு மனிதராலத்திலும் 2,000 அல்லது 1,500 கன அடிக்கு புதிதாய் நல்ல காற்று வரும்படியான ஏற்பாடுகளும் செய்து கொண்டால்தான் சவுக்கியத்திற்கு நலம்.

பலவித சுவாசச்செயல்களின் யந்திர வேலை.

சில சுவாசச்செயல்கள் எந்த யந்திரங்கள் வேலை செய்வதால் உண்டாகின்றன யென்பதை எடுத்துச்சொல்லுவோம். மார்பின் குழியானது வயிற்றின் குழியினின்றும் விதானத்தால் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. விதானம் தொழில் புரியும்பொழுது தனது வளைவு குறைந்து கீழே இறங்கி உதராதரத்தை மேலுக்கும் முன்னுக்கும் தள்ளும். வயிற்றின் சதைகள் தொழில் புரியும்பொழுது உதராதரத்தை மேலுக்கும் பின்னுக்கும் தள்ளும்; அத்துடன் விதானத்தையும் தள்ளும். துரையீரல்கள் தேகத்துக்கு வெளிப்புறத்துடன் இருகவரையில் வழியாய் சம்பந்தமுள்ளதாயிருக்கிறது. இருகவரையிலுக்கு அப்புறத்தில் வாயின் வழியிலாவது நாசித்துவாரங்கள் வழியாலாவது, இவை இரண்டு வழிகளாலும் காற்று

வெளிப்புறத்திற்குவர வாயிறையுடையதாயிருக்கின்றது. எந்த துவாரத்தின் வழியாய் வருகிறது என்பதை கித்தா ரிளைசெய்ய (soft palate) உள்நாக்கு இருக்கின்றது. வாயிறுக்கும் தேகத்துக்கு வெளிப்புறத்திற்கும் வழியிருக்கின்றது. ஆன்வாரி, தொண்டை, வாய்மூலமாய் ஒருவழி. கிழிவடை மூத்திரப்பை நீர்த்தாரை வழியாகவும், மலக்குடல் ஆசனத்தின் வழியாகவும் வெளியுடன் சந்திக்கும். குழல் தன்மையால் உதாரந்தரம் தேகத்துக்கு வெளிப்புறத்துடன் சலக்கும். இந்த வழிகள் எல்லாம் சதைகளால் காக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தச் சதைகளுக்கு சுருங்கும் சதைகள் யென்று அர்த்தம் தரும் ஸ்பிங்டர் (sphincter)* என்று பெயர்.

பெருமூச்சு விதேல் என்பது ஒரு நிண்ட. நிஸ்வாசச் செயலாகின்றது. விதானமும் நிஸ்வாசத்தில் வேலைசெய்யும் மற்ற சதைகளும் இதில் தொழில்புரியும். காற்று சுவாசமில்லாமல் கிருகவாயில் மூலமாயுட்செல்லும். நாரியால்களுடையவும் மார்புச் சுவற்றினுடையவும் கெடுந் தாரமும் தன்மையால் பின்னடைவும் உண்டாகிறது. உதாசசுவாசமும் வேலை செய்யும். காற்று சடுதியில் உஸ்வாதத்தில் வெளியாய்விடுகிறது.

முதல் தொழிலாகிய நிஸ்வாசத்தில் விதானம் கிழே வருவதால் உதாரந்தரத்தை கிழக்கு அழுக்குகின்றது. இதனால் சிறப்பும் வழிகளிலுள்ளவைகளை வெளியே தள்ளி எதுவாகின்றது. ஆனால் அத்துவாரங்கள் சுருங்கும் சதைகளால் மூடப்பட்டிருப்பதாலும் இவைகள் யெப்பொழுதும் பிடுவாய் மூடிக்கொள்ளும் தன்மையுடையனவாகையாலும் ஒன்றும் வெளிப்படாது போகிறதில்லை. காற்றமாதிரி நாரியால்களில் துழைகின்றன. இரண்டாவது தொழிலாகிய உஸ்வாசத்திலே உதாரந்தரத்தில் அழுக்கமிருக்கின்றது. ஆனால் எதிர்ப்புறமாகியிருக்கி

* எந்த துவாரத்தைச் சுற்றியிருக்கிறதோ அந்தத் துவாரத்தை அடைக்கும் தொழிலுடைய சதைகள்.

ன்றது. வாயிறின் சுவர் பின்னுக்கடைவதினால் உண்டாகின்றது. காற்று திறந்திருக்கும் கிருகவாயில் வழியாய் வெளியே போகிறபடியால் இந்த அழுச்சம் சீக்கிரம் நின்று போகின்றது. விரிந்திருந்த விதானம் தனது இடத்திற் போய்ச்சேருகின்றது. இரைப்பை, மலக்குடல், மூத்திரப்பை இவைகளின் சுருங்கும் சதைகள் இவைகளை வழி விடவொட்டாமல் மூடிக்கொள்ளுகின்றன. நாம் புத்தியை யேதானதொரு விஷயத்தில் செலுத்தி திர்க்கமாய் லோசித்துக்கொண்டிருந்தால் உஸ்வாசம் அதிக கொஞ்சமாய் வருகின்றது. இதற்குதான் முசகவிடாமல் செய்யும் யோசனை யென்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் இசுற்ற பதிலாக அடிக்கடி பெருமூச்சுகளால் காற்றை அப்பெர்ப்பட்ட காலங்களில் உட்கொள்ளுகிறோம்.

லிச்சல் என்பதும் ஓர் நிஸ்வாசச் செயல். ஆனால் காற்றை உட்கொள்வது நிதானமாயிராமல் அதிக சடுதியாய் இருக்கின்றது. இதில் விதானம் சடுதியிலும் வலிப்புள்ளதுபோலும் தொழில்புரிகின்றது. காற்று சடுதியில் கிருகவாயில் பிளப்பில் தாங்கி தொனி தந்திகளை ஆராய்ச்செய்வதால் அதில் ஒருவித சத்தமும் பிறக்கின்றது.

இருமல், இதில் முதல் உண்டாவது நிஸ்வாசம். பிறகு வருவது உஸ்வாசம். முதலில் நிஸ்வாசந்தால் துரையிரல்கள் நிறைந்த பிறகு, சுலபமாய் காற்று கிருகவாயில் வழியாய் வெளிவர ஒட்டாமல் நிமிஷமாதிரிகாலம் தொனி தந்திகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உடமெதினால் அதன் வழியடைந்துபோகின்றது. வாயிறுச் சதைகள் பலமாய் தொழில்புரிந்து உதாரந்தரத்தை விதானத்தின்மேல் தள்ளுகின்றது. இப்படி நாரியால்களினுக்கும் காற்றை அழுக்குவதினால் வழியையடைத்துக்கொண்டிருக்கும் தொனி நார்புகளை வேகமாய்த்தள்ளிக்கொண்டு, காற்று சத்தத்துடன் வெளியே போகின்றது. இந்தமாதிரி அ. வேகம் பிடியோசப்படுகிறபடியால் கோளம் அல்லது இவ்வித வேறு வஸ்துக்கள் வெளிவரவேண்டியவைகள் துரையி

ரல்களிலாவது * தமரத்திலாவது இருந்தால் வெளிவரும் காற்றுடன் சீக்கிரமாயும் வினாவிலும் அடித்துக் கொண்டு வரப்படுகின்றன.

இருமலில் வயிற்றுச் சதைகளின் அழுக்கத்தாற்றாய்ரல்கள் வேதத்தை தாங்குவதுபோலவே உதரதாரமும் வேகத்தைப் பெறுகின்றன. ஆகையினால் துரையரல்களின் காற்று வெளிப்பக்கம் வருவதுபோலவே உதரந்தரத்தினுள் வந்துக்களும் வெளிப்படுவதற்கு ஏது ஏற்படுகின்றது. ஆனால் இயற்கையாலேயும், வேண்டுமானோர்க்கத்தாலும், சுருக்கு சதைகள் சுருங்குவதால் அவைகளால் கார்க்கப்படும் துவாரவாய்க்கள் அடைந்துள்ளும் வெளிவருகிறதில்லை. இத்தொழிலிலுண்டாகி வேகம் கிருகவாய் பிளவையில்தான் பயன் பெறுகின்றது.

இருமலுக்குச் சொன்னதெல்லாம் ஏறக்குறைய துமலுக்கும் சொல்லலாம். ஆனால் இதில் துரையரலை விட்டுவரும் காற்று கிருகவாயிற் ஸ்தம்பங்கள் * தொண்டைக்குழியிலிருக்கும் சவ்வு மடிப்புக்களாகிய ஸ்தம்பங்கள் இயற்கையாய்ச் சுருங்குவதிலும், உள்நாக்கு கீழே இறங்குவதாலும், நாசித்துவாரத்தின் வழியாய்ச் செல்லுகின்றது. வேண்டாத வஸ்துக்கள் அதன் வழியாய் அப்போது வெளிப்படும்.

பேசுவதில் வயிற்றுச் சதைகளால் உந்தப்பட்டு காற்று கிருகவாயில் வழியாய் வெளியேபோகின்றது. தொனிதந்திகள் குரல்வளையில் சரியான இடங்களில் அமைந்துகொண்டு பிகிந்து இருக்குமாகையால், காற்று அவைகளின் மேல்பட்டு வருங்காலத்தில் தந்திகளின் அசைவுகளினால் சத்தம் பிறக்கின்றது. சத்தத்தை, நாக்கு, பல், உதடுகள் முதலியன வாக்காக மாற்றுகின்றன.

பாடல் உண்டாவது பேசுவதுமாதிரி, குரல்வளைச் சதைகள் அவைகளிருக்கும் நிலையைத் தக்கபடி பலவிதம்

* Pillars of the fauces. (Fauces-gullet or wind pipe: part surrounded by rectum palati, the tonsils and the posterior part of the tongue.)

நாசத்துக் கொடுப்பதாலும், தொனி தந்திகளின் பிதுண்டியும் வேண்டிப்படி மாற்றிக்கொள்வதினாலும் பலவளில் இராகங்களை உண்டுபண்ணுகின்றன.

உறிதல். விதானமும் மற்ற நிஸ்வாசச் சதைகளும் பூஞ்சம் சீக்கிரமாக தொழில்புரிவதால் உண்டாகின்றன. வாய்முடியிருப்பதால் காற்று முழுவதும் நாலிவழிகளாக வருகின்றது. முக்கு துணி-முருத்துள்ள பாகங்களும் பூற்சையாய் விரிகின்றன.

சப்புதல். சுவாசச் செயலில் சேர்க்கப்பட்டதல்ல. மாண்டை எலும்பை (os hyoides) பின்னுக்குத் தள்ளும் பந்தங்களின் தொழிலாகும். இவைகள் நாக்கையும் அடிநாயையும் கீழுக்கும் பின்னுக்கும் தள்ளி வாயில் கொஞ்சு காற்றற்ற இடத்தை உண்டாக்குகின்றன. ஆகாச அழுக்கம் நாலு பக்கங்களிலும் உதைவதால் வாயிக்கு வளியிலும் உட்புறத்திலும் சமரசப்படுத்த முயலுகின்றன. வாயிக்கும் தொண்டைக்குமுள்ள வழிபுமைட்டிப்பேரிகின்றது. உள்நாக்குக்கு முன்பு நாக்கின் அடிபாகத்தை தெழுந்தகொள்ளுகின்றதால் இப்படி வழியடைந்துபோகிறதாக உத்தேசிக்கலாம். காற்றை சமரசப்படுத்தவேண்டுமானால் யேதாவது வாயினுள் துழையவேண்டியிருக்கின்றது.

விம்மல். தேம்பி அழுதலில் நிஸ்வாசங்கள் இழுத்து இழுத்து வரும். அப்பொழுது கிருகவாய் முடியிருக்கும் சிறித்தலில் உஸ்வாசங்கள் சுருக்கமாயும் வேகமாயும் வரும்.

கோட்டாவிலிதேல். நிஸ்வாசத்தொழில். ஆனால் இது மறக்குறைய அளிச்சாபூர்வமாய் வரும் தொழில். இது வரும்பொழுது அண்ணத்தினுடையவும் கீழ்த்தாடைவழியுடையவும் அனேக சதைகள் விதைத்துக்கொள்ளும். சார்வடைந்தவன் தனது அவயவம் வேலையற்று கொருசநேரம் இருந்தபிறகு இச்சாபூர்வமாய் அவைகளின்

152 சுவாசத்தின்பேரில் நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ள சக்தி.

சதைகளை விரித்துவிடும்படி நீட்டிமடக்கி தனது உயிர் சத்தை எப்படி நீர்த்துக்கொள்ளுகிறானோ அதுபேரிக் தொழிலாகும்.

சுவாசத்தின்பேரில் நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ள சக்தி.

உயிர்வாழ்வுக்கு முக்கியமான மற்ற எல்லா முயற்சிகள் போலவே, தேகத்திற்கு சுவாசமும் முக்கியமான அனிச்சாபூர்வமாய் இருக்கின்றது. இல்லாவிடில் உயிர்வாழ்வுக்கு அடிக்கடி மோசமவந்து சம்பவிக்கும் ஸ்திதியிலாபதம்; தவிர் தூக்கத்தில் ஞானநிதிரையும்கூட உண்டாகும் போய்விடும். ஆகிலும் சுவாசம் கொஞ்சமுள்ள மனதிற்கு உட்பட்டும் இருக்கவேண்டியிருக்கிறது. அப்படியில்லாவிட்டால் இப்பொழுது எடுத்துச் சொல்லிய சுவாசசெயல்களாகிய, பேசுதல், பாடுதல் முதலிய இச்சாபூர்வமான செயல்களை உண்டாக்குவது அசாத்தியமாய்விடும். சாதாரண சமயங்களில் அனிச்சாபூர்வமாய் ஞானத்திற்கு சம்மந்தமற்று இருக்குமளவில் சுவாச சலனங்களும் சுவாசலயமும், புப்புசோதா நரம்புகள் (Pneumogastric) உற்பத்தியாகும் ஸ்தானத்திற்கு இசைந்த முகளத்திலிருக்கும் நரம்பு மந்தியத்தின் சக்திக்கு உட்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது சலன நரம்புகளும் அவைகளையுடைய சுவாசசலனங்களில் தொழில் புரியும் சதைகளும் நரம்புமண்டலத்தில் இப்பாகத்தில் உண்டாகும் உத்திபனத்தால் தூண்டப்படுகின்றன. எவ்வளவு நரம்புமுகளம் தானாகவே தொழில்புரிகிறதென்றும், அதாவது எவ்வளவுவரையில் உத்திபனம் இதில் உற்பத்தியாகிறதென்றும், அல்லது எவ்வளவுவரையில் இது நரம்பு மந்தியமாக பிரதிகாசம் செய்கிறதென்றும் சொல்வது சாத்தியமில்லாமலிருக்கின்றது. வெகுசாய் இவ்விரு தொழில்களும் அது புரியலாம். இவ்விரு விஷயத்திலும் உத்திபனம் இரத்த நிலைமையின் பரிகார இருக்கின்றது. பின்சொல்லிய (பிரதிகாசம்) கோட்பாட்டின்படி நரம்பு மந்தியத்திற்கு வலது சிவந்தினின்று வரும் சுறுப்பு இரத்தம் துறையீரல்களில் எல்லாபாகங்களிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் புப்புசோதா நரம்புகளை உத்திபனம் செய்ய உதவுகின்றது. இவ்வுத்திபனத்தை முகுளத்துக்குக் கொண்டுபோய் சேர்த்து அவ்விடமிருந்து சுவாசத்திற்குரிய சதைகளின்மேல் பிரதிகாணப்படச் செய்கின்றது.

அசதி] சுவாசத்தின்பேரில் நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ள சக்தி. 153

முகுளம் அனிச்சாபூர்வத்தொழில் பரிவர்த்தனை சாரணம் அதில் சுழலும் இரத்தமேதான். இரத்தம் துறையீரல்களையிலிருக்கும்பொழுது அது சுழலாவிடங்களிலுள்ள ஸ்பரிசு நரம்பு-மந்தியங்களை உத்திபனம்செய்ய போதுமானதாயிருக்கின்றது. சுவாசம் செய்வின் லயவேகமோ முகுளத்தினின்றும் வருகின்றது.

இரத்தத்திலுள்ள சுவாசவாயுவிலுள்ள கரியமலவாயுவின்னையும் மாறுங்காலத்தில் சுவாச சலனங்களும் மாறுபாட்டடைகின்றன. சுவாசவாயு குறைந்தாலும், கரியமலவாயு அதிகப்பட்டாலும், சுவாசசலனம் அதிகமாகி ரத்தில் விருந்தியாகும். அப்பொழுது அப்பெருக்கத்தால் சதைகள் அதிகமாய் தொழில்புரியும். சுவாசவாயு அதிகப்பட்டு கரியமலவாயு குறைந்தால் இதற்கு விரோதமான செயல்கள் உண்டாகின்றன.

நரம்புகளால் இரத்தம் சுழலும் கருவிகள் சுவாசக் கருவிகளைவிட 4 அல்லது 5 மடங்கதகம் எப்படி தொழில் புரிவிக்கிறதென்பதைப்பற்றி இதுவரையிலும் யாரொன்றுமே தெரியவில்லை.

இரத்தாசயலயத்தை நமது இச்சாமாத்திரம் நியுத்திவது கூடாத விஷயம். ஆனால் சுவாசலயத்தை நமதுவிடப்பட்ட பிரகாரம் சொல்பகாலத்துக்கு நிறுத்திவைக்கலாம். அப்படி நிறுத்தினால் அதிகேக்கிரத்தில் சுவாசம் வேண்டுமென்ற தேவையுத்கிரித்து நமது இஷ்டத்திற்கு விரோதமாக சுவாசம் செயலுண்டாகிறது. தனது முச்சை வெளிவிடாமல் பிடித்துக்கொண்டு இறந்தவர்கள் கிடையாது. ஆனால் அப்படிச் செய்ய அனேக பிரயத்தனப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று மாத்திரம் தெரியவருகிறது.

முகுளத்திலிருக்கும் சுவாச நரம்பு மத்தியம் இரத்த நிலைமையைப்பற்றிய புப்புசோதா நரம்பின் புப்புச் பாகங்களின்களால் பெரும் உத்திபனமல்லாமல் மற்றெவ்வித பதிகங்களிலிருக்கும் அதிக உணர்ச்சியுள்ளதாக இருக்கின்றது. இதில், சுடுதியில் குளிர் உண்டாகும்படி செய்வதிலும், பலவித மனோசலனங்களாலும் சுவாசசலனங்கள் வேறுபாட்டைவது நன்றாய்த் தெரிந்த விஷயமாக்குக்கின்றது. இதற்கு இன்னும் அனேக உதாரணங்கள் உண்டு.

முகுளத்தைப்பற்றி சுவாசச் செயல் இருக்கிறதென்பதை நன்றாய்விடுமே, எப்படியெனில் நரம்பு மண்டலத்தில் மற்றெல்லா பாகங்களும், சரியாயிருந்தாலும், சுவாச நரம்பு மத்தியத்திற்கு ஏதாவது கெடுதிநேரிட்டால் சுவாச சலனம் நின்று உடனே சாவு உண்டாகின்றது. மஜ்ஜதந்து என்னும் முள்ளந்தண்டுக்கொடியை வாய் வராகப் பிரிப்பதினால் பிரிக்கும் இடத்தைப்பொருளும் சுவாசமும் வேறுபாட்டாகின்றது. இந்த விஷயம் மனிதர்களுக்கடிக்கடி உண்டாகும் ஊறுபாடுகளால் உபயோகப்படுகின்றன.*

உதாரணமாக: கழுத்து நரம்புகளிருக்குமிடத்திற் கிழபாகத்தில் இந்த மஜ்ஜதந்துவுக்கு கெடுதி சம்பந்தமாக, நிஸ்வாஸத்தை விதானத்தால்மாத்திரம் செய்யச் சாத்தியமாகின்றது. மார்பு சலனமற்றிருக்கும், ஏன் என்றோ அப்பொழுது முகுளத்திற்கும், விலா மத்திய சக்திக்கு முதலான சகல சுவாச சலன வஸ்துக்களுக்கும் இருக்கும் சம்மந்தமற்றுப்போயிருக்கின்றது. அடியின் காயம் கெட்டுச் சம்மேல்பக்கமிருந்தால், அதாவது மானஸிக நரம்பு (Phrenic Nerve)* என்னும் விதான நரம்பு உற்பத்தியானத்திற்குமேல் இருந்தால் மரணம் உடனே சம்பந்தமாகின்றது. ஏன் எனில் இந்த காயத்தால் முகுளத்திலிருந்து

* Phrenic-Diaphragm. விதானத்தின் மனதின் நிலையிருந்திருக்க முன்னர் எண்ணியிருந்தமையால் விதானத்துக்குச் செல்லும் உட்புற சுவாச நரம்புக்கு மாறலாக நரம்பு உற்பத்தியாக வந்தது.

அத்தி.] சுவாசத்தின்பேரில் நரம்புமண்டலத்துக்குள்ள சக்தி. 155
க்கும் சுவாச-மத்தியமும், விதானத்தினின்றும் பிரிவுபட்டுப்போகின்றது.

இச்சா பூர்வமான நிஸ்வாஸச் செயல்களில் முகுளத்தினால் முனையும் வேலை செய்கின்றது. முனே வேலைசெய்த போதிலும் முகுளத்தால்தான் பல சுவாசச் சதைகள் ஒன்றுக்கொன்று சமரசமாய் தொழில்புரியும்படி செய்யப்படுகின்றன.

சாதாரண விதித்தலில் சுவாசவாய் அடங்கிய இரத்தம் சுவாசமத்தியத்தை உத்திபனப்படுத்துவதுபோலவும், இந்த வாய் குறையுமுளவுக்கு தக்கபடி உத்திபனமும், அதனால் சுவாசச் சதைகளின் சலனமும் அதிகப்படுவதுபோலவும், இயற்கை விதித்தித்தித்தித்திமான அளவு சுவாசவாய் இரத்தத்தில் இருந்தால் சுவாச அசைவுகள் குறைந்தும், மிக்க இருந்தால் அக்காலத்தில் சலனமற்றும் போய்விடும். சுவாசசலனமற்றிருக்கும் நிலைமைக்கு அபனாஸா (Apnoea) என்று பெயர். இவ்விஷயத்தை பிராணிகளில் உள்ள இரத்தத்தில் சுவாச வாயுவை செயற்கையால் அதிகப்படுத்தி சுவாசசலனம் குறைவதையும் சுவாசசலனமின்றிப் போய்விடுவதையும் காண்பிக்கலாம். துளையில்களுள் காற்று வராமல் தடைபட்டுப்போனாலானது, அல்லது வரும் காற்றில் சுவாசவாயுவில்லாமற்போனாலும், சுவாசச் சதைச் சலனங்கள் அதிகப்பட்டு கஷ்ட சுவாசமுண்டாகிப் பிறகு மூச்சடைப்பு என்னும் (Asphyxia) நிலைமையுண்டாகி பிறகு மரணத்தில் முடிபும்.

மூச்சடைப்பின் குறிகள் நன்றாய்த் தெரிந்தவைகளே. சுவாசச் சதைகளின் அதிவேகம் பொருந்திய செயலால், அப்பொழுது தேகமா நியந்தமிருக்கும் சதைகளும் தொழில்புரிகின்றன.

சருமமும் மற்றுமுள்ள எல்லா இரத்தக்குழற் தலைமையாய்ந்த பாகங்களும் சுவாசத்துப்போகின்றன. நாளங்கள் விரிந்துபோகின்றன. தசைகள் இரத்தம் நிறைந்து போலக் காணுகின்றன. பிறகு கை கால்களில் வலிப்பு

தண்டு அதன்பின் உடனே உணர்ச்சியற்று மாணம் வருகின்றது.

இக்குறிதல் காண்பதுடன் தானும் நிலைமைகளாவன.

(1) புப்பு இரத்த குழல்களில் இரத்தம் ஓடாமல் தடைப்படுதல்.

(2) இரத்தாசயத்தின் வலப்புறத்திலும் தேகமாதிரதமிருக்கும் நாள்களிலும் இரத்தம் சேருதல்.

(3) அரத்த (காற்றுப்படாத) இரத்தம் தேகமெங்கும் சமூலவது.

8-ம் அத்தியாயம்.

பிராணிகளின் வெப்பம்.

மானிடதேகத்தில் சுருவில் எட்டத்தக்க உட்புறங்களாகிய வாய், குடல், குழாய் முதலிய இடங்களில் சாதாரணமான வெப்பம்: 98°5 முதல் 99°5 டிகிரிவரையிலிருக்கும். மானிடதேகத்தின் வெளிப்புறத்தில் பல இடங்களில் சீதோஷணம் ஒன்றிலின்றுமொன்று இரண்டுமூன்று டிகிரி வித்தியாசப்படும். இவ்வித்தியாசத்தின் காரணம் அவ்விடங்களுக்கு வரும் இரத்தத்தின் சீதோஷணத்தைப் பொருத்திவதாகின்றது. சீதோஷணக் கருவி (தேர்மாமீட்டர் Thermometer) வைத்துப் பார்க்க அனுகூலமாக மானிய அக்கிரிஸ் 98°6 டிகிரியிருக்கும்.

தேகத்தின் உட்புறங்களில் பல இடங்களிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு டிகிரி வித்தியாசங்கள் காணும். அதிக இரத்தமிருக்குமிடங்கள் அதிக வெப்பமாயிருக்கும். ஏன் எனில் அவ்விடங்களில் அதிகமான பூதிக மாறுபாடுகள் நடக்கின்றன. இக்காரணத்தால் கோளங்களும் சதைகளும் அதிக வெப்பமடைந்திருக்கும். அவைகளின் சீதோஷணம் நிலைமை அதிகரித்து காணும். ஆனால் சீதோஷண நிலைமையை சமர்த்துபடுத்த சில உபாயங்கள் ஏற்பட்டிரு

க்கிறபடியால் இவ்வித்தியாசங்கள் அதிக சொற்பமாய்ப் போகின்றன. பின்வரும் காரணங்களை யனுசரித்து சீதோஷண நிலை இரக்கும். அவையாவன: வயது, ஜாதி, தினத்தின் காலம், தேசமுயற்சி, இருதுக்கள், அன்னபானங்கள்.

தேகத்தில் உஷணம் உற்பத்தியாகும் காரணங்களும் வகையும்.

சுவாசச் செயலைப்பற்றி விவரித்தபொழுது அதனுண்டாகும் பூதிகச் செயலையும்பற்றி சொல்லப்பட்டது. அப்பொழுது ஆகாசக் காற்றிலிருக்கும் சுவாசவாயு இரத்தத்தில் கலக்கப்பட்டு இரத்தச் சுழலால் தேகமெங்கும் பரவி தசைகள் நகித்தும் பூதிகப் பிரிவினைகூடத்தும் உண்டாகும் கரியுடனும் ஜலவாயுவுடனும் உணவு தசையாய் மாறாமல் நின்றபேரே பாகங்களிலுமுள்ள கரியுடனும் ஜலவாயுவுடனும் கலக்கின்றது. ஆகாசக் காற்றின் சுவாசவாயுவும் இரத்தத்திலிருக்கும் கரியும் ஜலவாயுவும் பூதிகமாய் கலக்கிறதென்பதும் நிச்சயமாய்த் தெரிகின்றது. எப்படியெனில் சாதாரணமாய் போஷிப்புக்கு வேண்டிய அவ்வைவிட் அதிகமான அளவு கரியும், ஜலவாயுவும் உணவிலின்று இரத்தத்துக்குச் செல்லுவதாலும், துரைபிரல்களினின்றும் தேக பேரோஷணக்கு வேண்டிய அளவுக்கு மீய் சுவாசவாயுவும் இரத்தத்தில் சேருவதாலும், இப்படி காணப்படும் வஸ்துக்கள் ஒன்றாகக் கலந்து பிறரு கரியமலவாயுவாகவும் தண்ணீராகவும் சிசுரஜனமாகிற் தென்பது நன்றாய் விளங்குகிறது. இப்படியல்லாவிட்டால் இவ்விதிகமாயிருக்கும் வஸ்துக்கள் வேறென்னவாகிறதென்பது தெரியப்படுகிறதில்லை.

வெப்பமுண்டாகுதல் தத்தையுடைய பிராணிகளின் இரத்தம் எப்பொழுதும் கரிஜலவாயு சுவாசவாயு இவற்றை அன்னவாகிக்குழாயினின்றும் துரைபிரல்களினின்றும் தசைகளின் புதுப்பிப்புகற்குவேண்டியதை 94 அதிகமாய் பெற்றுக்கொண்டு எப்பொழுதும் கரியமலவாயுவையும், தண்ணீரையும் விசுரஜனம் செய்துகொண்டு வருகின்றன.

றது. இப்படி விசர்ஜனமாகும் வஸ்துக்கள் தேகத்தில் உற்பத்தியாவதற்கு இந்த பூதங்கள் பெளதிகமாய் ஒன்று கூடி இவைகள் உண்டாகிறதென்பதைவிட வேறு எவ்விதத்தில் உண்டாகிறதென்பது தெரியவில்லை. இப்படி ஒன்று சேருவதினால் பிராணியின் தேகத்தில் உஷ்ணம் எப்பொழுதும் ஜனித்துக்கொண்டே இருக்கின்றது. கரிய மலவாயுவையும் தண்ணீரையும் உற்பத்திசெய்கிற தேகத்திலுண்டாகும் தகன விஷயம் சொல்வதில் எவ்வளவு எளிதாயிருக்கின்றதோ அவ்வளவு சுருவாயிறிபத்தக்க விஷயமல்ல. இரத்தத்திலும் தசைகளிலும் நடக்கும் இத்திரியவுள்ளது தகனம் அதிக சிக்குள்ளதாய் பல விஷயங்களடையுதிருந்தபோதிலும் கடைசியாக உண்டாகும் பயன் தேகத்துக்கு வெளியில் உண்டாகக்கூடியதகனத்தின் பின்னப்போலவே எவ்விதில் அறிந்துகொள்ளக்கூடியதாயிருக்கின்றது. கொடுத்த அளவு சுவாச வாயுவும் கரியும் கலப்பதிலுமும், சுவாசவாயுவும் ஜலவாயுவும் கலப்பதினாலும் உண்டாகும் உஷ்ணமானது, தேகத்துக்கு வெளியில் சீக்கிரமாயும் காணும்படியாயும் நடக்கும் தகனமானாலும் சரி, அல்லது தேகத்திலுள்ள நடப்பதுபோல நிதானமாயும் கண்ணுக்குக்காணாததாயும் இருந்தபோதிலும் சரி, எப்பொழுதும் ஒரே அளவுள்ளதாசத்தானிருக்கின்றது. இப்படியுண்டாகும் உஷ்ணம் இரத்தமபோகும்பிடிமெங்கும் உண்டாகும்படியால், தேகத்தின் ஒவ்வொரு பாகமும் ஏறக்குறைய சமமாய் உஷ்ணப்பட்டிருக்கும்.

மனிக் தேகத்தின் சீதோஷ்ண ஸ்தீத்யை
சீர்ப்படுத்துவதைப்பற்றி.

தேகத்தில் உஷ்ணம் எப்பொழுதும் ஜனிக்கப்படுகிறதென்ற சொன்னோம். ஆயினும் எப்பொழுதும் நஷ்டமுமிருக்கின்றது. ஆயினும் சவுக்கியமாயுள்ள வெப்பமடைந்த இரத்தத்தை உடைய பிராணிகளில் உஷ்ணத்தை சம்பாதிப்பதும் நஷ்டமடைவதும் எப்பொழுதும் ஒன்றுக்கொன்று சரியாயிருக்கிறதாயினால் தேகத்தின் சீதோஷ்ணஸ்திதி ஏறக்குறைய ஒரேமாதிரியாக இருக்கின்றது.

தேகத்தின் மீதுவின்று கக்கல் (radiation), வாங்கல் (conduction) என்னும் சகன சாஸ்திர நியமனங்களின் படிக்கு வெளியாவதாலும் அந்தந்தப் பாகங்களினின்று சுவாச வழிகளால் நீர் ஆவி ரூபமாய் வெளிப்படுவதாலும் தேகம் உஷ்ணத்தை வெளிவிடுகின்றதென்பதைக் கண்டு கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு சுவாசசெயலிலும் நுரையீரலிலுள்ள காந்தகிருவேண்டிமளவு உஷ்ணமும் வெளியாகின்றது. உணவும் பானமும் தேகத்தைவிட குவிரந்த வஸ்துக்களாக இருந்தால் கொஞ்சமளவு உஷ்ணத்தை அவைகளும் சுவர்த்திகொள்ளுகின்றன. மூத்திரமும் மலமும் தேகத்தின் உஷ்ணத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு போகின்றன.

தேகத்தினின்றும் உஷ்ணம்போகும் விதங்களில் அதிக முக்கியமானதும் நூற்றில் சுமார் எண்பது தொண்ணூறு பங்கு உள்ளதும் காந்தகிருவேண்டிய கக்கல், வாங்கல், சுவாசவழிகளிலும் தேகத்தின் சீதோஷ்ண ஸ்திதியை சமரசப்படுத்தும் விதங்களும் ஏற்பட்டிருக்கிறதென்பதைக் கண்டுகொள்ளவேண்டியதாக இருக்கிறது.

நாம் உட்கொள்ளும் அன்னபானங்களும் அவைகளின் தன்மை இவைகளில் இருக்கும் வேறுபாடுகளும், உடுப்பு வேறுபாடுகளும், வெளியிலிருக்கும் உஷ்ண சிதளங்களற்கு தேகம்படுவதுமாகிய இந்தக்காரணங்களாலும் மேற்சொல்லிய சீதோஷ்ண சமரசம் உண்டாகின்றது.

9-ம் அத்தியாயம்.

சீரணம்.

உணவாகப்படுகிறதும்பதார்த்தங்களை பருவப்படுத்தி இரத்தத்தில் அதை கலக்கசெய்து அவ்விரத்தத்தை விருத்திசெய்யும் தொழிலுக்கு சீரணம் என்று பெயர்.

சுதந்திரமாய் நமது போஷிப்புக்கு வேண்டிய பதார்த்தங்கள் அவை.

இந்திரிய வஸ்துக்களில்

1. உப்புவாயு சம்பந்தப்பட்டவைகள்:—

வெள்ளைக் கருநீள் சம்பந்தமான ஆல்புமன், சேசன், சின்னிடோனின், குளுடன் இவைகளைச் சேர்ந்தவைகளும், ஜிலம் என்னும் வஸ்துவும், (ஜிலத்தில் சுத்தக்கரி, ஜலவாயு, சுவாசவாயு, உப்புவாயுவும், சிலவற்றில் இவைகளுடன் கொஞ்சம் செந்தக்கமும் சிபாகுகளியும்) கலந்துமிருக்கிறது.

2. உப்புவாயு சம்பந்தமற்ற சர்க்கரை வஸ்துக்கள்:—

(a) கஞ்சி, சர்க்கரை இவைகளைச் சேர்ந்தவைகள். (இவைகளில் சுத்தக்கரி, ஜலவாயு, சுவாசவாயுவும் கலந்திருக்கும்.)

(b) எண்ணெயும் கொழுப்பும் (கரி, ஜலவாயு, சுவாசவாயுவும் கலந்திருப்பவை.) ஆரினும் இவற்றில் கஞ்சி, சர்க்கரை முதலியவற்றிலிருப்பதைவிட சுவாசவாயு அதிகமாய் குறைந்திருக்கும்.

அமிந்திரிய வஸ்துக்களில்

3. தூதுவர்க்கங்களும் உப்புவஸ்துக்களும். (Chloride of Sodium, Phosphate of Calcium, &c.)

4. தண்ணீர்.

பிராணிகள் உணவாக இந்திரிய வஸ்துக்களையும் அமிந்திரிய வஸ்துக்களையும் வேண்டுகின்றன. வெளிப்படையாய் முதல் கொள்ள வஸ்துக்களினாலேயே பிராணிகள் சிலது உயிருடனிருத்தலுடன், தேக சவுக்கியத்து டலாமிருப்பதற்குக் காரணம் என்னவென்றால், இயற்கையான இந்திரிய வஸ்து உணவுகளில் அமிந்திரிய வஸ்துக்கள் கலந்து இருக்கின்றன என்பதேயாம். சுத்த பைபிரியேயும், சுத்த ஜிலடனையும் இன்னும் மற்ற இந்திரிய வஸ்துக்களையும்

துக்களையும் இவைகளில் கலந்திருக்கும் அமிந்திரிய வஸ்துக்களிலிருந்து பிரித்தபிறகு உணவாகக்கொண்டால் உயிருடன் கொஞ்சகாலத்துக்குமேலிருப்பது சாத்தியமற்றதாய்விடும்.

அதுவுமல்லாமல் போஷணைக்குரிய இந்திரிய வஸ்துக்களில் மேற்சொன்ன இந்திரிய வஸ்துக்களின் ஒருவனை இந்திரிய வஸ்துவைமாத்நிரமே உடைத்தாயிருக்கும் வஸ்துக்களை உண்பதினாலே தேகசவுக்கியத்தைகாப்பாற்றுவது கஷ்டமாம். உப்புவாயுகலந்தவும் கலக்காதவுமான இந்திரிய வஸ்துக்களைக் கலந்து அவைகளிலுள்ள அமிந்திரிய வஸ்துக்களையும் ஒன்றுபட உண்டாஸ்மாத்திரம் சுதமாய் வாழலாம். உயிருடன் இருப்பதற்கும் அவை தேவையானவை. இதனுண்மையை பல பரிட்சைகள் செய்து தெரிந்துகொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. உயிரைக் காப்பாற்றும் குணங்களையுடைய வஸ்துக்களை பூதப் பிரிவினை செய்துபார்த்தாலும் இது வெளியாகின்றது. உதாரணமாக: பாலும் முட்டைகளும்.

பாலின் கூட்டுப்பாடு.

	பெண்கள்.	பசுக்கள்.
தண்ணீர்	890	858
வைரவஸ்துக்கள்	110	142
	1,000	1,000
கேசன்	35	68
வெண்ணெய்	25	38
சர்க்கரை பதார்த்தங்கள்	48	30
உப்புகள்	2	6
	110	142

மேற்சொல்லிய ஜாபிதாவில் வெள்ளைக்கரு சத்தடங்கிய போஷணைப் பதார்த்தங்கள் பாலேட்டு சதத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எண்ணெய் வஸ்துக்கள் வெண்ணை

யிலும், திரவவஸ்துக்கள் தண்ணீரிலும், கஞ்சிபதார்த்தங்கள் பாற்சக்கரையிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பால்-உப்புக்களில் (Phosphate of calcium) கிபாகினி கலந்த சுண்ணாம்பும், சுண்ணாம்பு சத்துகளும், மற்றுமுள்ள உப்புக்களும், கொஞ்சம் அயமும் இருக்கின்றன. ஆகையால் வளரும் பிராணியின் தசைகளின் போஷிப்புக்குவேண்டிய சகல வஸ்துக்களும் இருக்கின்றனவென்று கருக்கமாய்ச்சொல்லலாம். இவைகள் பிராணியில் உள்ள வெப்பத்தையும் உண்டாக்கவேண்டியவைகளாயும் இருக்கின்றன.

முட்டையின் வெண்கருவும் மஞ்சட்கருவும் தாய் முலையுண்ணும் பிராணிகளுக்கு பாலில் எப்படி வேண்டிய சத்துக்கள் இருக்கின்றனவோ அப்படியே அண்டஜஜீவன்களின் கருக்கள் பிழைக்கவேண்டிய சத்துக்களை உடைத்தாயிருக்கின்றன. பலவித போஷணைப் பொருள்களைக் கலந்துண்ண வேனுமென்கிற ஐதீகத்தை விளக்க இன்னமொன்று உதாரணமாகவிருக்கின்றது.

கோழிமுட்டையின் கூட்டுப்பாடு.

	வெண்கரு.	மஞ்சள்கரு.
தண்ணீர்	78	52
உப்புவாயு வஸ்துக்கள்	20.4	16
கொழுப்பு வஸ்துக்கள்	...	30.7
உப்புகள்	1.6	1.3
	100.0	100.0

முழுதிலும் பிராணிவஸ்துக்கள் அடங்கிய உணவாலும், முழுதிலும் ஸ்தாவரவஸ்துக்கள் அடங்கிய உணவாலும் மனிதன் தாங்கப்பெறுகின்றான். ஆனால் இந்த உணவுகளில் இப்பொழுதுமே எடுத்துக்காட்டி சவுக்கியமான போஷிப்புக்கு வேண்டிய உப்புவாயு சம்மந்தமுடையபொருள்களும் உப்புவாயு சம்மந்தமற்ற முலப்பொருள்களும் அவைகளில் அடங்கியிருந்தால்தான் நலமாகும்.

உபவாசம்.

கொஞ்சங்கூட உணவு உட்கொள்ளாமல் பட்டினி இருப்பதால் உண்டாகும் குணங்களை பிராணிகளில் புரிசைசெய்து அறியப்பட்டிருக்கின்றன. மனிதனிலும் அடிக்கடி உதகரிக்கப்படுவதையும் பார்த்திருக்கின்றோமல்லவா?

(1) மிகவும் நன்றாய்த் தெரியும் பட்டினியின் குணம் என்னவென்றால் தேகத்தின் பளுவு குறைவதே யாம். முதலில் பளுவை அதிகமாகிழந்து பிறகு நாளுக்கு நாள் கொஞ்சமாக இருக்கும் பளுவும் இழந்துபோகிறது. பரிசைகளால், தேகத்தின் தூய்மையில் இரண்டுபங்கு பளுவு இழந்தால் மரணம் சம்பவிகிறதென்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

தேகத்தின் பல பாகங்கள் பல விகிதங்களில் பளுவை யிழக்கின்றன.

கொழுப்பு கஷ்டப்படுவது தாறுதுக்கு	93
இரத்தம்	75
மண்ணரல்	71
உதரதோளங்கள் (Pancreas)	64
கல்நரல்	52
இரத்தாசயம்	44
குடல்கள்	42
சலனசக்தியுடைய சதைகள்	42
இரைப்பை	39
தொண்டை, அன்னவாகி	34
தோல்	33
பிருக்கங்கள்	31
கவாசக்கருவிகள்	22
எலும்புகள்	16
கண்கள்	10
நரம்புமண்டலம் சுமார்	2

(2) உபவாசத்தால் பிராணிகளின் சிதோஷ்ணஸ்திதியும் மாறுபாடடைகின்றது. ஆரம்பத்தில், 5 அல்லது 6 டிகிரி நான்குநாள் வித்தியாசமாக இருந்து கடைசியில் உஷ்ணமதிசுவேகமாகக் குறைந்து 30 டிகிரிக்குமேல் இறங்கிவிட்டால் மரணம் சம்பவிக்கின்றது.

உபவாசத்தால் உண்டாகும் மரணம் குளிரால் உண்டாகிறதென்றும் சிலர் சொல்லுவார்கள். அது ஒருவிதத்தில் உண்மையாயிருக்கின்றது. ஏனெனில் உபவாசத்தினால் வரும் மரணம் எந்தக்கால அளவில் சம்பவித்தபோதிலும் கடைசியில் உஷ்ணம் குறைந்து வருவதனால், வெளியிலிருந்து உஷ்ணத்தை தேக்கலுக்கு பிரயோகிப்பதினால் உணவு கொடுப்பதைவிட, உபவாசத்தால் தேகம் குளிர்ந்து சாரும் சமயங்களில் அதிகபயன் உண்டாகி, பிராணி மறுபடியும் பிழைத்துக்கொள்ளுகிறது. என்ற வார்த்தைகளில், போஷணையில்லாமல் மெலிந்துபோகும் பிராணி உட்கொள்ளும் உணவை ஜீரணம் செய்குகொண்டு, அதைத் தன் உடல்வெப்பத்திற்கு வேண்டிய கட்டையாக உபயோகப்படுத்திக்கொள்ள சக்தியில்லாமல் இருக்கிறபடியால் வேண்டிய உஷ்ணத்தை வெளியினின்றும் பெறவேண்டியிருக்கிறது. இதைப்போலுள்ள விவரங்களை மனிதனில் மெலிவுபடுத்தும் வியாதிகளின் சிகிச்சைகளிலும் காணுகிறோம்.

(3) மனிததேகத்தில் உபவாசத்தால் உண்டாகும் அமிச்சைகளில் முக்கியமானது, பசியும் அதனுடன் இரப்பையுடன் நோவும் உண்டாகின்றது. அடங்காத தாகம் தூக்கமின்மை, பலஹீனம், வாடுதல், துரையோல்களினின்றும் சருமத்தினின்றும் வரும் விசர்ஜனங்கள் நாற்றமுடையதாகவிருக்கின்றன. இதனால் போஷிப்பற்றத்தைகள் அழுகிப்போகின்றனவென்று அறியலாம். பிறகு அஜீரணபேதி நரம்புகளின் சீரற்ற ஸ்திதிகளும் விகாஸமும், ஜன்னியும் உண்டாகி கடைசியில் மரணம் சம்பவிக்கின்றது.

(4) மனிதனில் உணவு கொஞ்சம்கூட இல்லாமல் போனபிறகு ஆறுமுதல் பத்துதினங்களில் மரணம் சாதாரணமாய் சம்பவிக்கின்றது. கொஞ்சமளவு ஆகாரம் புசித்தாலது அல்லது தண்ணீர்ப்புகழ் ததாவது இந்த கால அளவை பலதினங்களுக்கு அதிகரிக்கலாம். பட்டினியாய் பசுநாட்களும், அல்லது சில வாரங்களுமிகுந்து பிறகு பிழைத்தெழுந்ததாகச் சொல்லும் விஷயங்களில் அவை நாம் பின்னுக்கெடுத்துச்சொல்லிய காரணங்களால் உண்டாகிடுக்கவேண்டும். அல்லது தேகத்தின் உஷ்ணத்தையும் ஈரத்தையும் வெளியே போகவொட்டாமல் கார்த்துக்கொள்ளும் சில காரணங்களாலது அவற்றில் இருத்திருக்கவேண்டும். அன்ன பானங்களிலல்லாமல் பல்வார்களும் மாந்தர்களும் சத்த பட்டினியாயிருந்த பிறகு கூட பிழைக்கக்கூடியமென்று சொல்வது புத்தியற்ற அறிவீனர்களின் மனத்தோற்றமே யல்லாது வேறொன்றுமில்லை.

(5) உபவாசத்தால் இறந்தபிறகு தேகத்திற்கு காணும் தோற்றங்கள் என்னவென்று ஒரு மனிதனுடைய மூன்று ப்ப்புதும் ஆகும். மூலையில் பின் சொல்லியது அவ்வளவாக காணப்படமாட்டாது. இரைப்பையும் குடல்களும் வெறுமையாகவும் சருங்கியுமிருக்கின்றன. குடல்களின் சுவர்கள் அதிக மெலிவுற்று ஏறக்குறைய ஒரி ஊடுதகக் கூடியது போல காண்கின்றன. பலவித விசர்ஜனங்கள் சொல்பமாகவும் அல்லது பித்தத்தைவிட மற்றவைகளற்றும் இருக்கும். பித்தம் மாத்திரம் ஒன்றுகூடி பித்தப்பையில் நிறைந்திருக்கும். தேகத்தின் சகல பாகங்களும் சீக்கிரத்தில் அழுகிப்போகும்.

பிராணி வஸ்துக்களிலுலேயாவது ஸ்தாவரவஸ்துக்களிலுலேயாவது மனிதன் ஜீவிக்கலாம் என்று சொன்னோம். ஆயினும் அவன் பற்களின் சுபட்டத்தாலும் அது பவத்தாலும் இருவகை வஸ்துக்களும் கலந்த உணவு அதிக கலமாயிருக்குமென்று காணுகிறது.

சில உணவுகளின் உபயோகம்: அவைகள் ஜீரணமாகக்கூடியனவா அல்லவா என்பதைப்பற்றி மரத்திரம் யோசித்தறியக்கூடாது. அவைகளில் அடங்கியிருக்கும் மூலப்பொருள் விகிதங்களையும் யோசிக்கவேண்டும்.

ஆனால் வழக்கத்தில் உட்கொள்ளவேண்டிய உணவுகளையும் அவைகளின் அளவுகளையும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வேண்டுமென்று காலனும் மூலவஸ்துக்களை உத்தேசித்தே உட்கொள்வதினால் அதிக பயனிருக்கமாட்டாது. அது அவ்வளவு சேட்டாகவுமிருக்கமாட்டாது. ஒவ்வொருவனுடைய வழக்கங்களையும் சீரணச்சத்தியையும், விசர்ஜனக் கருவிகளின் நிலைமையையும் இன்னும் மற்ற இவைபோன்ற விஷயங்களையும் ஆலோசித்து இவைகளைப் பொருந்தியதாயிருக்கவேண்டும்.

அன்னவாசிக் குழாய்வழியாய் ஆகாரம்போதுதல்.

வாயில் உட்கொண்ட உணவு அதினின்று அன்னவாசிக் குழாய்க் குழாய்வழியாக இரைப்பைக்குப்போய்ச் சேருகின்றது. இதனினு முதலில் சிறு குடல்களுக்கும் (உருக்கு) பெருங் குடல்களுக்கும் போகின்றது. போகும்வழியில் கிரமேணபோஷணக் கூட்டுப்பாடுகளை ஐக்கியப்படுத்திக்கொள்வதாவதற்கு கொண்டுபோகிறது. மீந்துபோகும் பாகம் அதன்வழியில் அத்துடன்சேரும் சில வஸ்துக்களுடன் குடல்பையினின்று குதமார்க்கமாக வெளியே தள்ளப்படுகிறது. அன்னவாசிக் குழாய்வழியாக உணவு செல்லுமார்க்கத்தில் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் படிப்படியாய் அதற்கு ஏற்படும் விஷயங்களையும் அதாவது சீரணத்தொழில் விவரத்தை யெடுத்துரைப்போம்.

உமிழ்நீர் கோளங்களும் உமிழ்நீரும்.

அன்னவாசிக் குழாயில் உணவுக்குண்டாகும் முதல் மாறுபாடு வாயின் குழியில் உண்டாகிறது. உணவின் வைரவஸ்துக்கள் பற்களின் நெருங்கிய இடங்கு உட்படுகின்றன. இவைகளால் உணவு துண்டிப்பட்டுப் போடியாகி வாயினின்று ஊறும் திரவங்கள்சேர்ந்து பிந்துவான

வழுக்கையாகி சுஞ்வில் விழுங்கும் தன்மையுள்ளதாயாகின்றது. உணவுடன் சேரும் திரவங்கள் வாயின் உட்புறம் மேலாக இருக்கும் உமிழ்நீர்க் கோளங்களினின்றும் சிலேஷ்ம கோளங்களினின்றும் உற்பத்தியாகும் திரவமாகும்.

மெல்லுதல்.

மெல்லுதல் என்பது கடிப்பதும் கீழவரிசை பற்கள் மேல் வரிசைப் பற்களின்மேல் அறைப்படும் நயசெயலுக்குப் பெயர் ஆகின்றது. நாவும் கன்னங்களும் ஒரேகாலத்தில் அசைவதினால் உணவின் பிந்துவாகிப் பாகங்களை அண்ணத்தில் அறைப்பதினாலுங்கூட மெல்லுவதற்கு ஒத்தாசையாயிருக்கின்றது. தவறி பற்களினையினின்றும் நகங்கி வெளிவரும் பதார்த்தங்களை மறுபடியும் பற்களினையே கொண்டுபோய் அறைப்பதற்குச் சொடுக்கும் தொழிலைப்போ புரிகின்றன.

கீழ்த்தாடை மேலுக்கும் கீழ்க்கும் போய் வருவதற்கு, அதாவது அது புரியும் அசைவு தொழிலைசெய்வதற்கு உதவும் சதைகளாவன:—சங்கப்பேசி (டெம்பொரல் மசுல் Temporal muscle), சவட்டம் பேசி (மால்டர் மசுல் Masseter muscle), உட்புறச் சிறைப்பேசி (இண்டர்னல் டெரிகாய்ட் Internal Pterygoid) என்று சொல்லும் சதைகளாம். ஒரு பக்கம் இருக்கும் பேசி மற்றப் பக்கமிருக்கும் பேசியுடன் மாறிமாறித்தொழில் புரியும். வெளிப்புறச் சிறைப்பேசிகள் (எக்ஸ்டர்னல் டெரிகாய்ட்ஸ் External Pterygoids) இரண்டும் வேலை செய்யும்பொழுது கீழ்த்தாடை நேராக முன்னுக்குவந்து, அந்தாடை முன்புற பற்கள் மேற்றாடை முன்புற பற்களுடைய சம்மட்டத்திற்கு வந்து சேறுகின்றன. இதற்கு சங்கப்பேசி என்பது கன்னப்பொரி எனும்பினின்று புறப்பட்டி கீழ்த்தாடை எனும்புடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்குஞ்சுதையாம். இது கீழ்த்தாடையை மேற்புறம்முக்கும். சவட்டம் பேசியோ மெல்லுதலில் உதவிபுரியும் நூர் சதை

யாம். உட்புறச் சிறைப்பேசி சித்தின் ஆப்பென்யின் (ஸ்பீனோயிட், Sphenoid) சிறகுபோன்ற முனைகளில் ஆரம் பித்து கீழ்த்தாடை மூலை புட்புறத்தில் ஒட்டப்பட்டிருக் கும் பேசி. மேற்கூறிய முனை முக்கோண உருவமாய் ஆப் பெப்புக்கு சிறகுபோலிருப்பதால் இப்பெயர்பெற்றது. வெளிப்புறச் சிறைப்பேசி சிறைமுனை வெளிப்புறத்தில் உற்பத்தியாகி கீழ்த்தாடை மூட்டுமுடிசுகளில் அமைக்கப் பட்டிருக்கும் பேசியாகும். இவ்விருவகச் சிறைப்பேசி களும் தாடையை ஒருபக்கத்திலின்று மற்றொருபக்கத்தி ற்கு அசையச் செய்து பற்களால் சவட்டல் (மெல்லு தல்) என்னும் செயல்களை செய்கின்றன.

மெல்லுதல். தொழில் நடக்கும்பெழுது ஏராள மான உமிழ்நீர் உருவதால் அதுவும் உணவுடன் சேர் ந்து மிசையும். இப்படி வாய்நீர் சரந்து உணவுடன் கலத் தலுக்கு இன்காலிசேஷன் என்று இங்கிலீஷில் சொல் வார்கள். உமிழ்நீர் மிதில் என்று நாம் சொல்லலாம்.

மற்ற செயல்களைப்போலவே, மெல்லுதலும் ஒரு பாகம். இச்சாபூர்வமானதாகவும், மற்றொருபாகம் அனிச் சாபூர்வமானதாகவும் இருக்கின்றன. இப்போப்பட்ட உண வுச்சலனைச் செயல்களைப்பற்றி பிறகு சொல்லோம். (நாம் புமண்டல் அந்தியாயத்தைப் பாருங்கள்.) இவ்விடத்தில் இதற்கு வேண்டியதெல்லாம் என்னவென்றால் இததொழி ல்களைப்பிரியும் நரம்புகள் ஐந்தாவதினுடையவும் (glosso-pharyngeal உடையவும், உணர்வு நரம்புகளினதும் ஐதாவது ஒன்பதாவது மண்டை நரம்புகளின் (hypo-glossal cerebral nerves) சலனநரம்புகளினதும் யெ ள்வு அறிந்துகொள்வதேயாம். பிரதிகரணக்கிரியை புரி யும் நரம்பு-மத்தியம் மூலூளத்திலிருக்கின்றது. இதனால் தான் இந்தத் தொழிலைப் புரியும் சதைகள் தக்கபடி அசைகின்றன. இச்சாபூர்வமானதாக இருக்கும்பொழுது மெல்லுதலுக்கு மேற்சொல்லிய நரம்புகளுடன் (Cere-bral Hemispheres) பெரியமுறைக் கோளங்களுள் உத வுகின்றன.

நாடை-காது எலும்புகளைச் சேர்த்துக்கொண்டிருக் கும் நார்-முருந்துகளின் உட்பாகத்து அசைவினுடைய தொழிலின் பயன் என்னவென்றால், மெல்லுதலில் அதிக வேகமாகத் தொழில்புரியும் சதைகளின் சக்தியைச் சமரசப் படுத்தும்பொருட்டு நெகிழ்ந்துதரவும் தன்மைபுடையதாய் வேகத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் கமமாடி ஆகும். வெளிப் புறத்த் டெரிமாலிட் சதையால் கீழ்தாடைப்புட்டு மூடுத லும்பு பள்ளத்தைவிட்டு வரும்பொழுது இம்முருந்து நார்களும் அவைகளுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவைகளுடன் அசைந்துகொண்டு இழுத்துக்கொள்ள வசதிபுடன் கூடிய பள்ளமாகும்.

உமிழ்நீர்.

உமிழ்நீர் உற்பத்தியாகும் இடங்களில் மனிதனி லும் முலையுள்ளும் சாகிதிகளிலும் அநேகமாயிருக்கின் றன. இவைகளில் நான்கு இவககள் பெரியதாகிருக்கின் றன. சிறியவை அனேகமாகின்றன. சண்டம், தாடையடி, நாவடிக்கோள்களெனப் பெரும்பெரியவைகளுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் உதிகின்றன, கன்னங்களிலும், மிருதுவான அண்ணத்திலும் நாகரின் அடியிலும் இவைகப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளின் மட் டடங்கள் எல்லாம் ஒருநாடிரியாகவே இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றிலும் இதழ்கள் என்று பல பாகங்களிருக்கி ன்றன. இப்பாகங்கள் வலிப்போன்ற தன்மையால் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன.

ஒவ்வொரு இதழும் சிறிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப் பட்டு இருக்கின்றது. இச்சிறு பிரிவுகளுக்கு இதழ்க்குறு சென்று சொல்லலாம். இவ்விதழ்க்குறு கோமத்தைப் போலவே யிருக்கின்றது. ஒவ்வொன்றிலும் நீர்க்குழல் இருக்கின்றது. இக்கோக்குழல் பாலவாகப் பிரிந்து சிறிய சாறுகளில் முடிவுபெறுகின்றது. இதற்கு நரத்தாவை அணுவென்று சொல்லலாம். ஒவ்வொரு இதழும் தன் அங்குல குறுக்களாய் பிரிக்கும் அதிக மெலிதான சவ்வா

லமையப்பட்டு கோளவடிவுள்ள பரிஸ்தாபிதத் தோலாலும் மூடப்பட்டு இருக்கும் வெளிய்புறத்தில் தந்துகி வலையும் இருக்கின்றது.

உமிழ்நீர் சாதாரணமாய் வாயினின்றும் வருவது சிலேஷ்ம் கோளங்களின் சுரப்புகளுடனும் கலந்திருக்கின்றது. காற்றுநீர் குமிழ்களும் கலந்து இருக்கின்றன. உமிழ்நீரை வாயில்வைத்துக்கொண்டிருந்தால் அதின் பிசுபிசுப்பால் துரையாகிவிடுகின்றது.

பெரோடிட் நீர் நாரைகளினின்று வரும் உமிழ்நீரை சிலேஷ்ம் கலக்காமலிருக்கும்பொழுது அணுநரிசுனிக் கருவிகொண்டு பார்த்தால் கோளங்களினின்றும் நீர்த்தாநரங்களினின்றும் கிலகிவந்த செதில்கள் பலவை அணுமாதிரிமாய்க்காணும். கலந்த பிறகு பார்த்தால் வாய், நாவு இவைகளின் சிலேஷ்ம் சுவவுகளினின்றும் சிலேஷ்ம்பைகளும் பரிஸ்தாபிதத்தின் சிதன்களுடனும் கிந்திக்கிக்கும். உமிழ்நீரை ஆழமான பாத்திரத்தில் விட்டுவைத்தால் கொஞ்சம் காலத்துக்குப் பிறகு வெண்மையான கரடுகள் கீழேபடுந்து நெளிவான தண்ணீர் மேலேகிற்கும்.

உமிழ்நீரின் கூட்டுப்பாடு.

தண்ணீர்	994.10
லவரவஸ்து	5.90
சுண்ணிலம்	1.41
கொழுப்பு	0.07
பரிஸ்தாபிதமும் சிலேஷ்மமும்	2.18

உப்பு வகைகள்:—

Sulpho-Cyanide of Potassium	2.29
Sodium phosphate	
Calcium phosphate	
Magnesium phosphate	
Sodium chloride	
Potassium chloride	

உமிழ்நீர் சுரப்பினுடைய தரம் வேறுபட்டிருக்கின்றது. மெல்லுதலில் தொழில்புரியும் நூலும் சதைகளும் தடஸ்தமாயிருந்தாலும், வாயின் நரம்புகளும் அக்கிரமமாய் உத்தீபனமாகவிருந்தாலும் சுரக்கும் உமிழ்நீரும் சிலேஷ்மமும் வாயை ஈடிப்படுத்திவைத்துக்கொள்ளவேண்டிய அளவுக்கு மேலிருக்கமாட்டாது. மெல்லும் அசைவுகளில் சுரப்பு வேகமாய்திகழ்கின்றது. வாயில் உணவு இருந்தால் இன்னம் வேகமாய்திகழ்க்கும். உணவை கண்ணில் பார்ப்பதினால்வந்து அல்லது மனதில் எண்ணுவதினால்வது உமிழ்நீர் சுரப்பை அதிகப்படுத்தி செய்யலாம். அப்படியே இரைப்பையில் உணவைச் செலுத்தினாலும் உண்டாகிறது. ஒரு மனிதன், தொண்டையறந்து போனபிறகு கொஞ்சம் குழம்பை இரையாபைக்குள் பிச்சாங்குமுலால் செலுத்தினபொழுது வாயில் இருக்க 8 அவுன்சு உமிழ்நீர் சுரந்ததை ஒருவர் கண்டெழுதியிருக்கிறார். பல காரணங்களால் உமிழ்நீர் சுரப்பில் பல அளவுகள் சுரக்கும். ஒரு தினத்தில் ஏறக்குறைய 1 முதல் 2 அவுன்சு வரையில் சுரக்குமென்று உத்தேசப்பட்டுள்ளது.

உமிழ்நீர் கசிவது விடாமலிருக்கும் தன்மையாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் சேனைசலங்களில் வெகு அதிகமாய் சுரக்கின்றது. சேனைசலங்களின் தலைமையும் இந்த வித்தியாசத்துக்கு ஒத்திருக்கின்றது. சேனைசலத்தில் கோளங்கள் நீர் அதிகமாய் சுரக்கின்றன. மற்றக்கலங்களில் கோளங்களின் சாலங்கள் வளருகின்றன. (சித்தமும் சாலங்கள் நீரில் வருகிறதென்று முன்னமே சொல்லியிருக்கிறோம்.)

வாயில் உணவு போனவுடன் உமிழ்நீர் அதிகமாய் சுரக்கப்பட்டு வருவதின் காரணம், நரம்புகளின் பிரதிபலனாக கிரியையாகின்றது. உள்ளேபோகும், அதாவது உணர்தல் குறைமுழுள்ள காய்ப்புத்துவிகள் இவ்விஷயத்தில் தொழில்புரிகின்றன. இவைகள் பெருமுனையின் ஓர் தாவது நரம்பினுடையவும் (Glossopharyngeal) நரம்புக

வினாக்களையும் கிளைகளாம். வெளியேவருவது, அதாவது சலன் நரம்புகள் முகத்தைச் சேர்ந்ததும் ஒற்றுணர்வு நரம்புகளாகும். இதற்கு வேண்டிய நரம்பு மத்தியம் முகுளத்திலிருக்கின்றது. உணவாசையல்லாமல் மற்ற எவ்விதமான உத்திபனமிருக்குமாகில (Submaxillary) என்று சொல்லும் சித்ததாசை நரம்பு நேர்முடிப்பும் தொழில் புரிகின்றது.

உமிழ்சீரின் பயன்.

(1) சிலேஷ்மத்துடன் இது சேர்ந்து வாயை சுரம்படுத்திவைத்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால் பேசும்பொழுது நூவு அசைவதற்கு அனுகூலமாகவும், உணவை மெல்லுவதற்கும் அனுகூலமாகவுயிருக்கின்றது. (2) உருசிவற்ற வஸ்துக்களைக் கரைத்து உருசிக்குரிய நரம்புகளை உத்திபனப்படுத்தவும் உதவுகின்றது. ஆனால் அதின் முக்கியமான ஐடத்தொழில் என்னவென்றால், (3) மெல்லும் பொழுது உணவுடன் கலந்து அதை மிருதுவான வழக்குத்தொழில் செய்து விழுங்குவதற்கு தகுந்ததாகச் செய்வதேயாம். இது உபசரமாகத்திற்கு உமிழ்சீர் அளவாலும் தன்மையாலும் பொருத்தியிருக்கின்றது. பொதுவாய் பேசினால், உணவு எவ்வளவுக்கு கடினமாயும் சுரமற்றும் இருக்கின்றதோ அவ்வளவுக்கு உமிழ்சீர் அளவும் சுரக்கின்றது. உமிழ்சீரின் தன்மையும் அதை அனுசரித்தே இருக்கிறது. பலவகை புணவுகளுடனும் தண்ணீரைவிட எவ்வளவு சுருங்கில் அது கலந்துகொள்ளுகிறதென்பதை அப்போது சுருங்கியிருக்கின்றது. தவிர உணவை சுருங்கிய விழுங்கும்பொருட்டு சிலேஷ்ம முதலிய திரவங்கள் வாயையும் தொண்டையையும் சுரமாக்கி வழிவழிப்புள்ளதாகச் செய்கின்றன. அப்படிச் செய்வதால் உணவு எளிதில் உள்நுங்கு நுழைகின்றது. இவையல்லாமல் உமிழ்சீர் பூசிக் செயலையும் திரணகாலத்தில் செய்கின்றது. உமிழ்சீரையாவது அல்லது உமிழ்சீர்க் கோளத்வையாவது கஞ்சியுடன் கலந்தால் கஞ்சி சர்க்கரைப்பொ

ருளாக மாறுகின்றது. சிதனாலத்தில் உணவியிருக்குங்கஞ்சி வஸ்துக்களைக் கரைக்க அன்னபசனாரீருக்கு அவ்வளவு சக்தியில்லையாகையால் பாசக நீரில் தேகிரம் கரையும்படியான (Dexterin) அல்லது (Grape sugar) என்னும் சர்க்கரையாய் அப்பதார்த்தங்களை மாற்றுவதற்கு உமிழ்சீர் உதவுகின்றது.

குழந்தைகளின் உமிழ்சீர் 4 முதல் 6 மாதம் வரையிலும் தொழில் புரியும் தன்மையுள்ளதாக ஆகிறதெனில், ஆகையால் இது குழந்தைகளுக்கு அக்காலம் வரையில் கஞ்சி வஸ்து உணவுகளையும், காரணப்பொருட்களானவையும், இவைபோன்ற மற்ற உணவுகளையும் அவைகள் கரைத்து தேகத்தில் உரிஞ்சிக்கொள்ளும்படியாகச் செய்ய சக்தியுற்று இருக்கின்றபடியால் அப்போப்பட்ட உணவுகளை கொடுப்பதினால் கெடுதி நேரிடுகின்றது.

தொண்டை.

வாய்க்கும் அன்னவாசைக்கு மத்தியிலிருக்கும் அன்னவாசிக்குறையின் பகுதிக்குத் தொண்டையென்று பெயர். இது பட்டை பட்டையாக இருக்கும். அதன்மூலம் பத்தப்பட்ட முன்று சிறைகளை உடைத்தாளது. இவைகள் நீண்டு சுருங்கும் தன்மையுள்ளவைகள். இவைகள் வெளிப்புறம் சவ்வால் முடிபுட்பிருக்கின்றன. ஆற்றுகள் இன்னொரு சவ்வுமிருக்கிறது. இதல் வலிப்போன்ற சிலேஷ்ம குண சவ்வுமிருக்கின்றது. இச்சிலேஷ்ம சவ்வு வாயின் சவ்வுடன் ஒட்டியிருக்கின்றது.

இதற்கு சேர்ந்த புவிப்பதாரிதமுடி சிலேஷ்ம பரிஸநாபிதமாகும்.

தொண்டையில் சிலேஷ்ம கோளங்கள் வெளியேயு இருக்கின்றன.

உண்ணுக்குக் கோளங்கள்.

மிருதுவாகிய புண்ணுத்தின் முன்புக்கும் பின்னும் இருக்கும் வண்ணக் கரின மத்தியிலுள்ளவொரு பக்கத்திற்கு ஒன்றாக உண்ணுக்குக் கோளங்கள் திரண்டு இருக்கின்றன.

சன ரூபவணியில் செல்லுமென்கிற பயம் இருக்கமாட்டாது. அகோரத்தில் மிருதுவின்னம் உயர்ந்து அதன்பின்பும் ஓரம் கொண்டையின் பின்பக்கத்தைத் தொடுகிறது. அன்னவாசியின் இருபுறங்களும் ஒன்றின்பக்கம் ஒன்று வருவதால் கொண்டைவழிக்கு நேராக சாய்ந்து கொடுக்கின்றன. அதனால் கவளம் சீழே இறங்குகின்றது. அப்பொழுது கொண்டை அசைபு பெற்றுக்கொள்ள கொஞ்சம் முன்பக்கம் வருகிறது. பெற்றுக்கொண்டபிறகு சுருங்குவதனால் அன்னவாசியில் அக்கவளத்தைத் தள்ளுகின்றது.

(3) அன்னவாசி வழியாய்ச் செல்லும் உணவால் அது தோமம் அக்குழாயின் ஒவ்வொருபாகமும் தொடங்குபவன் விரித்து பிறகு சுருங்குவதால் உணவு உட்செல்லுகின்றது. புதுசிறகன் தன்னிரங்குக்கும்பொழுது அன்னவாசி நெகிழ்வு விரித்து சுருங்கிவரும் மேடுபள்ளங்களைப் போலக்கூறும். அச்சைவை நன்றாய்க்கணலாம். விழுக்கும் கவளங்கள் பெரிதாயிருந்தாலும் அல்லது விவரவாத பல கவளங்களை விழுங்கினாலும் அன்னவாசி பாகம் பாகமாகச் சுருங்குவது நிதர்ஸ்யமிவதால் வலி புண்டாகின்றது.

விழுக்குவதின் இரண்டுமுன்றும்பாகங்கள் அனிச சரோமாவைவைகள்.

விழுக்கும் பிரதிகாரணச்செவளில் ஏற்படும் நரம்புகள் பெருமூலையின் ஐந்தாவது நரம்பினுடையவும், (Glossopharyngeal) உடையவும், (pneumogastric) நரம்பினுடையவும் உணவுக்கிரகாராயிருக்கின்றன. ஏற்படும் கவளகாரண ஐந்தாவது முகத்தைச்சேர்ந்த (facial) (hypoglossal, pneumogastric spinal accessory) நரம்புகளின் கிரகாராயிருக்கின்றன.

அன்னவாசியின் உட்செல்லுது சதைகளின் சக்தியால் உணவு முழுவதும் சிவிரத்த திக்குகடை

அத்தி.]

இரைப்பையின் கட்டைப்பை உணவு உண்ணும்படி இவைகள் செல்லும். குதிரைக்குள் பிறர் மிருகங்களுக்கும் மேலிருந்து சீழே இருக்கும் திசை குறுக்கின்றன. தவிர ஜாலவித்தைக்காரர்களும் தலைமேல் நின்றுகொண்டு விழுங்குகிறார்கள்.

இரைப்பையில் உணவு உண்ணும்படி.

இரைப்பையின் கட்டைப்பை

மலிதனிலும், முலையுன்னும் பிராணிகளின் ஒரே இரைப்பையுடைய மிருகங்களிலும் இரைப்பையின் கவள நான்குசொக்காயுடையவைகளாயிருக்கின்றது. அதாவது வெளிப்புறத்தது அல்லது அடிவயிற்றகத்தை மூடிய சவவு (peritonium), சதைமாலாகிய சவவு (muscular), சிலேஷ்மசவவினடிசவவு, (sah-mucous) சிலேஷ்மசவவு (mucous), ஆகிய இவைகளுமாலாகிய சொக்காய்கள்.

வெளிப்புறத்தில் அடிவயிற்றகத்தை மூடிய சவவு இரத்தநீர் சவவுபோலிருக்கும்.

இரைப்பையின் சதை சொக்காயில் மூன்றுபடைத் தோல்கள் அல்லது மூன்றுவகை நராகள் இருக்கின்றன. இவைகள் இருக்கும் இருப்பின் திசைநோக்கி இவைகளுக்கு நீண்டநெய்யென்றும், சக்கிரம்போன்றவையென்றும், குறுக்கையிருப்பவையென்றும் பெயர் வழங்குகிறார்கள். மேலாகவிருப்பது நீண்டவைகள். இவை அன்னவாசியின் நீண்ட நரங்களுடன் ஒட்டி ஒன்றாயிருப்பவைகள். இவைகள் இரைப்பையின் பக்கங்களிலும் கடைமுனையிலும் பரவிப் பல்விதமாய் ஒடியிருக்கின்றன. இவைகள் இரைப்பையின் குடல்பக்கத் துவாரவாயில்வரையிலும் பேர்கின்றன. இரைப்பையின் கிறிய விளைவுடையபாகமாகிய மேல்பக்கத்தில் பலமான நரகட்டுகளாக நன்றாய் காணுகின்றன.

இதற்குப் பிறகு இருப்பதற்கு சக்கிரகாரமானவையென்றோம். இவை இரைப்பையைச் சுற்றி குறுக்கேபோகிறார்கள். அதன் கிளைவால் இவைகளும் கங்கணம்

களாயும் இருக்கின்றன. மனிதன் இரைப்பையில் நின்ற பிரிவு இல்லாமல் இருக்கும் குழாய்களே அதிகம்.

சீரண கோளங்களின் பரிஸ்தாபித சாலங்கள் (Epithelium cells) மூன்று வகைகளாக இருக்கின்றன என்று இப்பொழுது கண்டறியப்பட்டு இருக்கின்றன. (1) சாதாரண ஸ்தம்பாகாரச்சாலங்கள், இவைகள் கோளங்களின் மேல்பாகத்திலிருப்பவைகள். (2) சிறிய சாலங்கள் கோளவடிவவாயிருக்கும், முன் சொன்னதின் சீர்பாகத்தைப் போலத்தக்கொண்டிருக்கும். (3) பெரிய சாலங்கள், இவைகள் தானியங்களோடும் கோளவடிவவாயிருக்கின்றன. இவைகள் குழாயின் பக்கங்களில் ஒட்டியிருக்கின்றன. இவைகளுக்கு சீரணச்சலங்கள் என்று சொல்லலாம். இந்த சீரணப்பைகள் சீரண காலத்தில் பருத்துக் காணும். உபவாசமாயிருந்தால் இவைகள் கண்ணுக்குக் காண்பதேயறிது; கருங்கியிருக்கும்.

அடியோரத்தில் பிரிந்திருக்கும் கோளங்களில் சீரணச்சலங்களும் கோளவடிவச்சாலங்களும் இருக்கின்றன. பிரிவுக்கு மேற்புறத்தில் ஸ்தம்பாகாரச்சாலங்களிலிருக்கின்றன.

இக்குழாய்களை சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் பரிஸ்தாபித சாலங்களின் வித்தியாசங்கள் அங்கோளங்களினின்றும் உற்பத்தியாகும் திரவங்களின் வித்தியாசத்தை ஒத்திருக்கும். மேன்றுதோன்றுகிறது. குழாய்வடிவு பரிஸ்தாபித சாலங்கள் இரைப்பையின் மேற்புறத்திலிருப்பது மாதிரியே உற்பத்தியாகும் சிலேஷ்மத்தை பிரிக்க உதவுகிறதென்றும், பெரிய கோளவடிவச்சாலங்கள் சரியான சீரண இரசத்தை சுரக்கின்றனவென்றும் தோன்றுகிறது. குழலிவழி வாய்குடில் ஸ்தம்பாகிருத பரிஸ்தாபித சாலங்கள் மாதிரியும் இருக்கின்றன. இவைகளினின்றும் சிலேஷ்மமாதிரியும் உற்பத்தியாகுமென்று உத்தேசிக்கிறார்கள். (Lenticular Gland) அண்டாகாரகோளங்கள் சிலேஷ்மச் சவ்வின் அடியில் பூட்டியிருக்கும் நிறைநீர்ப்பைகள் அனேகமாக இருக்கின்றன. அவைகளின் எண்ணங்கள் மாறுபடுபடையவைகளாகவும்

அத்தி.] ஐடராக்கினி என்கிற சீரண ரசத்தின் சுரப்பும் உ. 181

இரைப்பையின் சிறிய வளைவுபக்கத்தில் மாதிரியும் முக்கிய மாய்க் காணுகின்றன. குடல்வழி வாய்குடிலும் இருக்கின்றன. ஆனால் கருவியின் எந்தப்பாகத்திலும் அவற்றைக் காணலாம் காணக்கூடும். இவைகள் குடலிலிருக்கும் ஏதாவது கோளங்கள் மாதிரியிருப்பவைகள். இவைகளின் தொழிலும் அவ்வேகாரத்த கோளங்களின் தொழில்போலதாகும்.

இரைப்பையின் இரத்தக்குழல்கள் சிலேஷ்மச் சவ்வின் அடிச்சவ்வில் பிரியப்பட்டு நெருக்கமாக அமிக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும். குழாய்க் கோளங்களுடே பிரிந்த கிளைகள் பரவியிருக்கின்றன. இக்கிளைகள் பலவாறாகப் பிரிந்து, பிரியும் பாகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வழியுடைய தாயுமிருக்கின்றன. இத்தந்துவி வலைகளின் கண்கள் நான்கு பக்கங்களையுடைய சதுர குபமரகவும் இருக்கின்றன. இத்தந்துகிவலைகளை ஒட்டியும் இதன்மேல் இன்னமொரு பிரிவு கொஞ்சம் பெரிய தந்துகிவலை பொன்றுபிறக்கின்றது. இவைகள் கோளக்குழாய்களின் வாய்களையும் சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன. இந்த தந்துகிவலைகள் தான் முன்கூறிய இரைப்பையினுள்ளிருக்கும் பலப்பக்கங்களுடைய குழிகளின் வரம்புக்கு அஸ்திபார கட்டடமாயிருக்கின்றன. இந்த மேல்புற வலையினின்றும் நாளங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. உற்பத்தியாகும் நாளங்கள் அடிவலையில் சம்மந்தப்படாமலே சிலேஷ்மச் சவ்வின் அடிச்சவ்வில் இருக்கும் சிறிய நாளவலையிற் போய்ச் செருகின்றன.

இரைப்பையில் மிகவும் வளர்ப்பு அடைந்த நிறைநீர் மண்டலம் இருக்கின்றது. இவைகளின் வேர்கள் சிறு குழாய்கள் மத்தியில் மேலுக்குவந்து இரைப்பை உட்படப்படிமட்டத்தை எட்டியிருக்கின்றன. பெரிய நிறைநீர் தாரைகளும் சிலேஷ்மச் சவ்வின் தரைகளிலிருக்கின்றன.

ஐடராக்கின் என்கிற சீரண ரசத்தின்

சுரப்பும் அதின் துணைகளும்.

இரைப்பையில் உணவு இல்லாமல் அது வேலைபாற்றா இருக்கும்பொழுது சீரண நீர் சுரக்கிறதில்லை. சாதாரண

சிலேஷ்மம் அல்லது கொஞ்சம் கராமாந்துகள் கலந்த சிலேஷ்மம் அதன்மேல் படிந்திருக்கின்றது. இரைப்பையில் உணவுமுதலிய வஸ்துக்கள் வந்து விழுந்தால், முன்பு மயங்கலாயிருந்த சிலேஷ்மச்சுவவு கொஞ்சம் அதைப்பு அடைந்து அதிக இரத்தம் வந்து சேருவதால் சிவத்துப் போகின்றது. சீரண கோளங்கள் சுறுசுறுப்பாய் சுரக்க ஆரம்பிக்கின்றன. புளிப்பு திரவம் கிவிலை திவிலையாய் படிந்து இவைகள் ஒன்று சேர்ந்து இரைப்பையின் கவற்றில் ஒடுகின்றன. உட்கொண்ட வஸ்துவிலும் கலந்து கொள்ளுகின்றன.

சீரண ரசத்தையும் பூதிசுப் பிரிவினைகள் செய்து பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது பின் வருமாறு காண்க.

சீரண ரசத்தின் கூட்டுப்பாடுகள்.

	மணிநுடைய ஆட்டின்	நாயின்	கரையின்
	சீரண ரசம்.	சீரண ரசம்.	சீரண ரசம்.
தண்ணீர்	994.40	986.14	971.17
வைரவகைகள்	5.59	13.85	23.82

Solids	Ferment, pepsin with a trace of ammonia	3.19	4.20	17.50
	Hydrochloric acid	0.20	1.55	2.70
	Chloride of calcium	0.06	0.11	1.66
	" of sodium	1.46	4.36	3.14
	" of Potassium	0.55	1.51	1.07
	Phosphate of calcium			
	Magnesium and iron	0.12	2.09	2.73.

இதன்கீழ்க்கும்கூட இரகம் பலவாறாக உத்தேசி தீக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இருபத்தினு மணிநேரத்தில் தேகக்கூகியமுள்ள ஆகில் பத்து முதல் இருபது பைண்டுகள் சுருங்குமென்று உத்தேசித்துக்கொள்ளக்கூடும்.

சீரணமாகும் விதம்.

உதார இரகத்தின் சீரணசக்தி அளிக்கூக்கும் (Pepsin) செரிப்பயில் என்னும் சீரண வஸ்துவாலும் புளிப்பு

லும் உண்டாகின்றது. இத்தொழில் புரிய இவ்விரண்டு பதார்த்தங்களும் வேண்டியதே. இவைகளிலொன்றுமாதிரியும் மற்றொன்று இல்லாமல் ஜீரணம் செய்யமாட்டாது. இவ்விரண்டையும் தனியாக ஒன்றுடன் ஒன்றைக் கலப்பதில் சீரண வஸ்துவாகிய, பெப்சின் பூதிசுப் பிரிவினையடைந்திருந்தாலும், அல்லது புளிப்பின் சத்துக் கெட்டிருந்தாலும் இரகத்தின் சீரணசக்தி கெட்டுப்போகின்றது. இந்த விஷயம் பரிசோதித்தறியப்பட்டிருக்கின்றது. சீரணத்தொழிலை முடிவுபெறச்செய்ய பின்வரும் நிலைமைகள் அவசியமாயிருக்கின்றன. (1) 100 டிரிரி சிதேஷ்மணஸ்திதி. (2) இரைப்பை அசைவதுபோலொத்த அசைவு. இப்படி அசைவதால் தான் உணவின் ஒவ்வொரு பாகமும் சிலேஷ்ம சன்வீஷ்மேல் தாக்கி அதிலின்று ஊரும் இரகத்தை நன்றாக சுரப்பித்து அதனுடைய கலக்கச்செய்துகொள்ளலாம். (3) சீரணமான பாகத்தை அடிக்கடி வெளியிடுத்துவது; இப்படியானால் தான் சீரணமாகாத பாகம் நன்றாய் இரகத்துடன் கலக்க மார்க்கம் உண்டாகும். (4) உட்கொள்ளும் உணவு நன்றாய் உடைந்து மசிந்து மிருதுவாயிருக்கவேண்டும். இரைப்பை சேருவதற்கு முன்பாகவே வாயில் மெல்லுதல் தொழிலால் இவ்விதமாயாகின்றது.

இரைப்பையில் உண்டாகும் சீரணத்தின் பயன் என்னவென்றால் உணவை அளவப்பசுரு (chyme) ஆக்குதலேயாம். இது உணவின் தன்மையை அனுசரித்து பல கூட்டுப்பாடுகையுடைய வஸ்துவாகும். ஆனால் எப்பொழுதும் சுட்டியசன கழாய் பாகுபதத்திலிருக்கும். இத்துடன் உணவின் சீரணமாகாதபாகம் இதைவிட அதிக திரவமான பதார்த்தத்தில் கலந்திருக்கும். பலமான அரோகிக புளிப்பின் வாசனையையும் கணவனையும் உடையதாயிருக்கின்றது. உணவில் உட்கொள்ளும் பலவிதபதார்த்தங்களும் சொரூபம் மாறி ஒன்றுபட்டு இம்மாதிரியான ஒரு வஸ்துவாகிவிடுகின்றது. சீரணத்தொழில் முடியும்

சமயத்தில் உட்கொண்ட வஸ்துக்களை வெவ்வேறாகக் காண்பதரிது.

சீரண இரசத்தின் தொழிலைப் பின்வருமாறு எடுத்துச் சொல்லலாம். (1) வெள்ளைக்கருத்துள்ள வஸ்துக்களும் மற்றவற்றின் உப்புவாயு வஸ்துக்களும் இதனால் என்னவாகிறதென்றும் (2) மற்ற ஆகாரங்களை யென்ன செய்யுமென்றும் (3) மாம்சமயூகமல் பரிகரிக்குமதன் குணமும்.


உப்புவாயு தலந்த உணவில் சீரண இரசத்தின் செயல்.

இரைப்பையில் உணவு சீரணமடைய சாதாரணமாக முன்னுமுதல் நான்கு மணிநேரம்வரையில் செல்லும். ஆனால் அதேக காரணங்களால் இந்த கால அளவு பேதமடைவதற்கும். உணவின் (1) தன்மையும் (2) அதன் எவும், (இரைப்பை சாதாரணமாக நிறையலாமேயல்லது அதிகமாய் நிறைந்து விடுவதையுட்கடாது); (3) கடைசியாக உணவை யுட்கொண்டகாலம். இந்த கால அளவு எப்படியிருக்கவேண்டுமென்றால், இரைப்பையில் ஆகாரம் பாக்கி வின்று இருக்காமலிருக்கவேண்டும். (4) உண்ணுவதற்கு முந்தியும் பித்தியும் வந்துகொள்ளும் தேகமுயற்சி. சாந்தமாய் முயற்சி சீரண அபிவிருத்திக்கு அனுகூலமாயிருக்கும். அதிக முயற்சி செடுதியைச் செய்யும் (5) மனோகுணம். சாந்தமாயிருந்தால் சிக்கிரத்திலும் சரியாகவும் சீரணமாய்விடும். (6) தேகசவுக்கியம் இவை முதலியவைகள்.

இரைப்பையின் அசைவுகள்.

சீரண ரசம் உட்கொண்ட உணவை சீரணம்செய்யும்படி செய்வதற்கு இரைப்பையின் அசைவும் அவசியமென்று இதுவரையிலேயே சொல்லப்பட்டதல்லவா. பட்சிகளில் சில தானியத்தை முழுதாக விழுங்கிவிடுகின்றன. இம்முழுதானியங்களை அரைத்துப் பொடியாகப் பட்சிகளின் இரைப்பையில் அதிகபலமான சதைகள் இருக்கின்றன. இந்தச் சதைகள் அதிக வேகமாய் சுருங்கி

28-ம் படம்.




28-ம் படம்.—அண்ணாக்கைய சிங்கம் படம். மனிதனுடைய இறுகுடல், பெருக்குடலைவிட சீரணத்தே உட்கருது, அதிர்ச்சிமாதாகும்.—கூர்ச்.

பிரிவதால் உணவு மசிக்றுவிடும். ஆனால் மனிதன், முட்டையுண்ணும் ஜீவராசிகள் இவைகளின் இரைப்பையின்பேர்த் தசைகள் அவ்வளவு பலமாக உணவை உடைக்கும் சக்தியுடையவைகளல்ல. அவ்வளவு சக்தி இரைப்பைபச்சுவதற்குச் சதைகளுக்கும் வெண்டிய அமிலமும் உடையதாய்.

ஏன்னில் மெல்லுவதினாலேயே உணவு மசித்தபிறகு தான் இரைப்பைக்கு வருகின்றது.

29-ம் படம்.



29-ம் படம்.—குட்டி அல்லது இரைப்பையினதும் துணைக்குக்கியினதும் உட்பக்கங்கள். 1. இரைக்குழியின் சீழ்தம். 2. இரைப்பைக்குள் இரை செல்லும் வாயல், இதன் பெயர் பிரப்பி. 3. இரைப்பை. 4. இரைப்பையிலிருந்து துணைக்குக்குள் இரை செல்லும் வாயல்; இதன் பெயர் வர்ச்சனி. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. துணைக்குக்கி. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. இரைப்பையின் மூன்று பக்கங்களையும் வெளி இடை உட்காணுகள்.—பிரிள்.

ஆயினும் மனிதனுடைய இரைப்பையின் சதை நார் கள் இயல்பான நொழில் புரிவதினால் மூன்றுவித குணமு டைத்தானதாகின்றது. (1) இரைப்பையினுள்ளிருக்கும் உணவுக்குத்துக்கப்படி அதைச் சுருங்கவும் விரியவும் செய் வதனால் உணவை அதன் சுவர்கள் நாலுபக்கங்களிலும் தொட்டுக்கொண்டிருக்கும்படி செய்வதுமல்லாமல் உண வையும் கொஞ்சம்முடித்தரும். (2) இரைப்பையின் இர ண்டி வழிகளையும் சிரணமுடிநிறவரையில் சுருக்கி மூடி வைக்க உதவுகின்றன. (3) சில அசைவுகளால் (இரைப் பையில் ஒருபாகத்திற்குப் பிறகு மற்றொருபாகமாக புழ வசைவு பேர்வறவை) உணவு அன்னப்பாசாய்க் கொண்டு

வருகையில் அன்னப்பாசை நொமேன குட்டில் வழி பக்கமர கத் தள்ளி கடைசியில் அவ்வழியில் தள்ளிவிடுவதற்குதவு கின்றது. இப்படிப்பட்ட அசைவுகளால் உணவும் சிரண இரசமும் நன்றாய்க் கலக்கப்படுகின்றது.

சிரணம் நடக்காமலிருக்கும்பொழுது இரைப்பை ஒரே மாதிரியாய் சுருங்கி இருக்கின்றது. அதன் வழிவாயல் கள் மற்ற பாகங்களைவிட அதிகமாய்ச் சுருங்கி இருக்கிற தில்லை. உணவு உட்சென்ற கொஞ்சகொத்திற்கெல்லாம் பார்த்தால் இரைப்பை உணவை நன்றாய் பிடிநடைகொண்டிருக்கும்; அதன் இருபுற வழிவாய்களும் பிடிந்து மூடிக்கொண்டிருக்கின்றன. இரத்தாசய வழி துவாரம் உணவை விழுங்கும்பொழுதெல்லாம் நவளம் இரைப்பைக்கு வந்து செரும்பொருட்டு திறந்துகொடுக்கும். பிறகு உடனே மூடிக்கொள்ளும். குட்டில் வழி துவாரமோ சிரணம் ஆரம்பத்தின் காலத்தில் ஆனாய் மூடிக்கொண்டிருக்கின்றது. அப்போப்பட்ட காலத்தில் குட்டிலின் வழி இரைப்பை யைப் பிரித்தாற்குட அதனுள்ளிருப்பது வெளிக்கு வருகிற தில்லை. சிரணத்தொழில் முடிவுபெறும் காலத்தில் குட்டில் வழித்துவாரம் இரைப்பையின் பதார்த்தங்கள் அதன் வழிசெல்வதற்கு அவ்வளவு தடைசெய்கின்றதில்லை. முதலில் சிரணமான பாகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வெளிப் போகவும், பிறகு சிரணமாகாத பாகங்களும் வெளியே போகவும் வழிவிட்டு விடுகின்றது.

பரிசைச் செய்து பார்த்ததில் ஒருவர் சொல்லுவ தாவது: உணவு இரைப்பையுட் சென்றவுடனே அதன் சதைச் சொக்காய் புழுவின அசைவுபோல் நெறித்து சுரு ங்க எத்தனித்து சிரணமான பாகம் குட்டில் வழி துவாரத் தைநோக்கி தள்ளப்பட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றனவென் றும், அன்னப்பாகு ஆர் ஆர் இவ் அசைவுகள் அதிக மாய் சிரணம் பூர்த்தியாகுமளவிலிருக்கின்றதென்றும் கண்டதாகச் சொல்லுகிறார்.

இப்படி குடல்வழித் துவாரத்தருகே வந்தபிறகு அத் துவாரம் திறக்கப்பட்டு அன்னப்பொருதுகளைக்குக்கியில் (Deodannum) போய் விழும்.

வாந்தியேந்தல்.

இரைப்பையில் உள்ளதை வெளியே வாந்தியில் தள்ளுவதற்கு, இருமலில் எப்படி துரையீரல் முதலியவைகளிலின்று சிலேஷ்மம் முதலானது வெளியேவர தீர்க்க நிஸ்வாசம் வேண்டுமோ அப்படியே இதற்கும் முதலில் தீர்க்க நிஸ்வாசம் உண்டாகின்றது. கிருகவாயில் பிறகு மூடிக்கொள்ளுகிறது. உடனே உதரச் சதைகள் பல மாய்த் தொழில் புரிகின்றன. இவ்விடித்தில்தான் இருமலுக்கும் வாந்திக்குமுள்ள செயல்களின் வித்தியாசம் ஆரம்பிக்கின்றது. உதரச்சதைகளின் தொழிலால் குரல் நாணிகள் பின்னடையாமல் அவைகள் பிசிவாய் துவாரத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கும். அதனால் விதானம் மேலுக்குச் செல்லக்கூடாமல் நின்றவிடுகின்றது. இரைப்பை அதைத் தள்ளுகின்றது. தள்ளியும் அது அசையாமல் நின்றபோகவே, இரத்தாசய வழி வாய்ச்சுருக்கம் நெகிழ்ந்துரழந்து போய் குடல்வழிவாய்மாந்திரம் பிசிந்திருப்பதால் இரைப்பை சுருங்கவும், உதரச் சதைகள் ஒத்தாசையடைந்து, அன்னவாதி, தொண்டை, வாய் வழியாக இரைப்பையி லிருக்கும் வஸ்துக்கள் வெளியே தள்ளப்படுகின்றன.

வாந்திகாலத்தில் முக்கியமாய்ச் சுருங்கும் சதைகள் உதரத்தின் சதைகள் ஆகும். விதானம் நிஸ்வாசத்தில் மேலுக்குப் போய் நின்றவிடுகின்றது. ஆகிலும் இந்த காலதாங்கியும் கருங்கி இதற்கும் உதரச் சதைகளுக்கு மத்தியிலிருக்கும் இரைப்பையை பிசைவதால் வாந்தி யுண்டானாலும் ஆக்கூடும்.

சில மனிதர்கள் அதிகப் பிராயசமில்லாமலே இச் சாமாத்திரம் இரைப்பையிலிருக்கும் வஸ்துக்களை வாயிக்குக் கொண்டுவந்துவிடுகிறார்கள். இந்த சக்தியில்லாதவா

களும் அப்பிரயாசத்தால் அடையலாமென்றும் காண்கிறது. அபுருபமாகச் சிலர் உண்ட உணவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வாயிக்குக் கொண்டுவந்து மாடுகள்மாதிரி அசைவுபோட்டு மென்று மதுபடியும் விழுங்குவதுமுண்டு.

வாந்தியில் எம்பெம் கரம்புத் தொழில்தனக்கு வேண்டிய கரம்பு மத்தியங்கள் முகவத்தியிருக்கின்றன.

பதியும் தாகமும்.

தேகத்திற்கு உணவில்லாமல் போனால் பசிபுண்டாகின்றது. மனதில் பசி வயிற்றிலுண்டாகிதுபோலக் காண்கிறது. பசித் தாபம் இரைப்பையில் ஆகாரம் சேர்ந்தாலும் அல்லது இரைப்பையல்லாமல் மற்றெவ்விதத்திலாவது இரத்தத்தில் உணவைச் சேர்த்ததினாலும் அடங்கிப் போகிறபடியால், இரத்தாசயத்திலேயே இத்தாபம் ஏற்படுகிறதென்கிற விதியற்றுப்போகின்றது. இரைப்பையின் நிலைமையை அறியும் புப்புசோதா கரம்பு இரண்டையும் அறுத்துவிட்டாலும் பசியின் தாப ஞானம் மனதைவிட்டகலாகியதில்லையா என்காலும் பசி இரைப்பையைய மாத்திரம் சேர்த்ததல்லவென்பது வெளியாகின்றது.

ஆனால் பசிக்கும் இரைப்பைக்கும் சம்மந்தம் இருக்கிறதென்பது மாத்திரம் கன்றாய் விளங்குகின்றது. உணவையுட்கொண்டாலும் பசி அடங்கிப்போகின்றது. உணவுக்கு உதவாத பொருள்களினால் இரைப்பையை நிறைத்தாலும் பசி தகைணம் அடங்கிவிடுகின்றது. ஆகையால் பசித் தாபத்திற்கு இரைப்பையின் நிலைமையே முக்கிய காரணமாகக்கொள்ளலாம். தேகத்தின் மற்ற பாகங்களிலும் பசிக்குவேண்டிய காரணங்கள் உண்டென்று வெளியான போதிலும் மற்ற அவயவங்களைவிட அதிகமாக இரைப்பையின் இரத்த ஓட்டம் குன்றுமளில் கரம்புகளால் அதிகமாய் பசியை மனது அறிந்துகொள்ளுகின்றது. தாகம் என்னும் தாபம் தேகத்தில் திரவம் குறைந்திருக்கிறதென்று காண்பிக்கும். இது தொண்டைக்குழியில் ஜனிக்கிறதாக

ஞானமுண்டாகின்றது. பசிமாதிரியே இதுவும் தேகமாத் தியத்தத்திற்கும் பொதுவான தாபமாயினும் இத்தங்கிருப்பி டமாக ஒரு பாகத்தை மாத்திரம் அறிகிறோம். ஏன் எனில் உலரும் தொண்டைக்குழியை சுரமாகி மாத்திரம் வைத் தால் தாகம் அடங்குகிறதில்லை. சற்று நேரத்துக்கெல் லாம் திரும்பி தாகமுண்டாய் விடுகின்றது. ஆனால் திரவ ன்களை இரத்தத்தில் சேர்ப்பித்தால், இரைப்பை வழியா லாவது, இரத்தப் பைகளில் குழாய் மூலமாய் பிச்சிபா வது, அல்லது சருமம் தனது வெளிப்பாப்பினால் திரவத் தை உறிவியாவது, அல்லது குடல்தன் திரவத்தையடை ந்தாலாவது, தாகசமனமாகின்றது. அப்பொழுது இரத்தத் தில் தண்ணீர் குறைந்துபோகின்றதோ அப்பொழுது தாக ஞானமுண்டாகும். ஆகையால் இரத்தத்தினின்றும் தண் ணீரை வெய்துவிட்டாலும் அல்லது இரத்தத்திற்கு உப்புமுதலிய வஸ்துக்கள் சேருவதால் தண்ணீர் குறைந் தாலும் தாகம் காணும். வாய் தொண்டைக்குழி இவைக ளிலிருக்கும் நரம்புகளால் தாகஞானமுண்டாகிறபடியால் இந்த நரம்புகள் தேகத்தின் மற்ற நரம்புகளைவிட இரத்த த்தின் திரவமற்றுப் போகும் தன்மையை விழைவிலறிகிற தென்று மாத்திரம் சொல்லவேண்டும். தேகமுழுவதையு ம் விவாதித்திருக்கும் சில விலைமைகளைச் சில கருவிக ளால் மாத்திரம் அறிகிறோம் ஏன்கிற விஷயம் பசிக்கும் தாகத்துக்குமேயல்ல. மூச்சுக்குக் காற்றுவேணுமென்கிற ஞானம் துறையிரலைப்பற்றியிருக்கின்றது. ஆயினும் சில பரிசுத்தங்களினால் தேகமெங்கும் பரவியிருக்கும் இரத்தத் தின் தன்மையைத் தவிர இதுவுமுணர்த்துகிறதென்று விள க்குகிறது. என் எனில் இரத்த தர்பம் ரோணிகளின் துரை யீரல்களை எடுத்தபிறகும் இருக்கின்றது. அதுமாதிரியே பசி தாகங்கள் இரைப்பையையும் தொண்டைக் குழியை யுமடங்கிக் கொண்டபோதிலும் அவைகள் இரத்தத்தின் தன்மையை உணர்த்துகின்றனவேயல்லாமல் இக்கருவிக ளில்கிலைமையமாத்திரம் உணர்த்துகிறவைகளல்ல.

அத்தி.] ரோணத்தின்மேல் நரம்பு மண்டலத்திற்குக்கும் சத்தி. 191

உதாரணத்தின்மேல் நரம்பு மண்டலத்திற்குக்கும் சத்தி.

ரோணகாலத்தினைடாகும்..... இரைப்பையின் சர தாரண அசைவுகள் அதன் சுவற்றிலுள்ள நரம்பு வலைகளி னாலும் நரம்பு வோர்களாலும் நிற்காநிலைப்படாநுகுகின் மன, அதனுள்ளிருக்கும் உணவு உத்திபனத்தையுண் டாக்கி, அது நரம்பு வோ முடிசுகளுக்குச் சென்று, அவை கின்றும் பிரதிகாராக் கிரியைபெற்று அதன் சுவற்றிலிருக் கும் சதைகளை தொழில்புரியும்படி செய்கின்றன. இது வுமல்லாமல் இரைப்பையானது பெரிய நரம்புகளாலும் புப்புசோதாக் கிரைகளாலும் ஒற்றணவு நரம்பு வலைக் ளாலும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன.

30-ம் படம்.



30-ம் படம்.—1, 1. உணவுக்குழி. 2, 2. நெருடல். 3, 3. நெருடல் மல ப்பையோடு பொருத்தது. 4, 4. சக்கம். 5, 5. அர்ப்பை. 6, 7, 8, 9. வாய் குடல் அல்லது மலப்பை. 6. உணவு எழும் பகுதி. 7. தின் குறுக்குப் பகுதி. 8. அகிக் இறக்கும் பகுதி. 9. சகம். 10. மலக்கி.—கீழின்.

குடல்களில் உண்டாகும் சீரணம்.

குடற் குழாயிருவகைப்பட்டது. இவைகளின் குறுக்கங்களின்பேரில் இவைகளுக்கு சிறுகுடல் என்றும் பெருங்குடல் என்றும் பெயர் வழங்குகின்றன. இவைகள் ஒன்றையொன்று ஒட்டியிருக்கின்றன. இவைகளில் ஒன்றிலின்று இன்னொன்றுக்குப் போகும் வழியில் ஒரு கபாடமுமிருக்கின்றது. அது சீரணத்தினை உண்டாக்கும் வஸ்துவை சிறுகுடலினின்று பெருங்குடலுக்குப் போக வழிவகிக்கும். சர்க்கரை சம்பந்தங்களில் பெருங்குடலினின்று சிறுகுடலுக்குப் போக வழிவகிப்பாட்டாது.

வளர்ந்த ஆளில் சிறுகுடல் சுமார் 20 அடி நீளமிருக்கின்றது. இதைப் பேசுவதில் எளிதாயிருக்கும்பொருட்டு மூன்று பாகமாகப் பிரித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவை யாவன: (1) துணைக்குகம் இரைப்பையின் குடல்வழிவாழினின்று எட்டு அல்லது பத்து அங்குல நீளமிருக்கின்றது. இதற்கப்புறம் இக்குடலின் ஐந்தில் இரண்டு பாகத்தை தனிமாகப் பேரிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த பாகத்திற்கு (2) பிடினம் என்று சொல்வார்கள். மத்தியச் சிறுகுடலுன்னலாம். அதற்குப் பிறகு மற்ற ஐந்தில் மூன்று பங்கு பாகக்குடல் (3) இலியமென்பார்கள். இருகுடல் எனலாம். சிறுகுடலும் இரைப்பைமாதிரியே நான்கு மூக்கிய சொக்காய்க்காலமைந்திருக்கின்றன.

(1) சித்தாசில்லி என்னும் இரத்தநீர் சவ்வுசொக்காய். இது உதாரந்தர வேஷணமென்னும் தோளுசையின் உப்புரையாலாக்கப்பட்டது.

(2) சதைச்சொக்காய் (muscular coat) இரண்டு புரைபுள்ளது உட்பக்கத்தில் கரகணம்போன்ற நராகளும் வெளிப்பக்கத்தில் நீண்ட நார்கள் அமையப்பெற்றது. உட்பக்கத்திலிருப்பது அதிக கனதியாயிருக்கும். இவ்விருவித நார்களும் சம்பந்தத் தசைகளால் இசைக்கப்பட்டவைகள். இவைகளில் சிலேஷ்ம குழாய்களினின்றும் வித்

தியாசப்பட்டுக் காணும் (Lymphatic vessels) கிணாரிக் குழாய்களும் இருக்கின்றன. இந்த இரண்டு புரைகளாகும் மத்தியில் நரம்பு வலைகளுமிருக்கின்றன. அவ்வலைகளில் அநேக நரம்பு வேர் முடிப்புக்களுமிருக்கின்றன. குடல்களில் நெளியும் அசைவை உண்டாக்கும் காரணம் இந்த நரம்பு வலைகள்தான் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

(3) சிலேஷ்ம சவ்வுக்கும் சதைச் சவ்வுக்கும் மத்தியில் சிலேஷ்ம சவ்வுக்கடிச் சவ்வுமொன்றிருக்கின்றது. இதில் அநேகம் இரத்தக்குழாய்களும் நிணநீரக குழாய்களும் பரவியிருக்கின்றன. இரைப்பையினின்று குதம் வரையில் இந்த சவ்வில் நரம்பு வலைகளும் நரம்பு வேர் முடிகளும் இருக்கின்றன. இந்த நரம்பு வலைகளிடத்திலும் இவைகளின் திசைகள் பார்ப்பும் விதத்தாலும் இவைகளே அந்தந்த ஸ்தானங்களில் குடலின் சிலேஷ்மச் சவ்வுக்கு இரத்தத்தைக் கொண்டுவரும் இரத்தக்குழலின் அளவை நிந்தாரணசெய்வதற்கும், இவைகள் புரியும் ஸவிகார விசர்ஜனத் தொழில்களை நடத்துவதற்கும் ஹேதுவாக இருக்கின்றனவென்றும் காண்கிறது.

(4) சிலேஷ்மச் சவ்வு சீரண வியாபாரத்திற்கு அதிக உபயோகமுள்ளதாயிருக்கின்றது. இச்சவ்விருக்கும் சுட்டடக்களாவன. சுபாட்சதை மடிப்புகளும், மரிர்மூன்களும், சீகரளங்களும். இரைப்பையிலிருக்கும் சிலேஷ்மச் சவ்வுமாதிரியே இந்த குடல் சவ்வுமமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரைப்பையில் குடல் வழிவாழினின்று ஒன்று அல்லது இரண்டங்குலங்களுக்குப்பிறம் இம் மடிப்புகள் ஆரம்பமாகி, பித்தக்குழல் வந்துசேரும் இடத்திற்கப்புறம் அதிக நெருக்கமாக அநேகம் மடிப்புக்குடன் குடல் மத்தியபாகமாகிய ஜெஜுனத்தில் சிறைத்திருக்கின்றன. பிறகு நிரமேண என்னத்திலும் அளவிலும் குறைந்து இலியத்தின் மத்தியபாகத்தில் பின்புபோகின்றன. இந்த மடிப்புகள் சிலேஷ்மச் சவ்வு உட்புறமாய் மடிந்து உண்டாகிவைகள். இந்த மடிப்புகள் சவ்வுகணம்போல

குழலை முழுவதும் சுற்றியிராமல் அர்த்த சந்திரவடி
மாய குழலின் பாதி அல்லது மூன்றிரண்டு பாகத்தை
மாதிரியும் சுற்றிக்கொண்ட வளைவை உடைத்தாயிருக்கிற
தன் குடம் குழாய் விரிந்தாலும் இம்மடிப்புகள் மறைக்க
படுகின்றன. இவைகளை வெருங் கண்ணால் பார்த்தால் அவ்
வடிவஸ்பந்தமாகத் தெரியமாட்டாது. இவைகளின் தெ
ழில்கள் உத்தேசத்தால் சொல்லவேண்டியதாயிருக்கி
றது. (1) ஸ்விதா விசர்ஜனங்களுக்கு அதிகமான பரி
புள்ள இடத்தைத் தருவதாகும்; (2) உதரச்சாணத்தால்
உண்டாயிருக்கும் தீர்வம் இரைப்பைபடிவின் வளைவின்
உடனே சிக்கிரம் ஒடிப்போகாமல் தடை செய்யவும்; (3)
இவைகளால் குடில் உட்புறம் மேடுபள்ளங்களாயிருக்கி
யடியால் அதற்கு வரும் தீர்வமும் குடலில் ஜனிக் கு
தீர்வமும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்கமுதலாகின்றன.

இவ்வுகுடலின் கோளங்கள் இவைகள் முன்றுவனது
பரிம. இக்கோளங்களினின்றும் பொசியும் தீர்வங்கள் ஒ
வொன்றையும் பிரத்தியேகமாய் பரிசுஷ்செய்து அதன்
தொழிலை இவைகளையிலும் அடியிலிலை. இவைகளுக்கு
இவைகளை முதலில் கண்டு எழுதினவர்களின் பெயரையே
கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

லிபர்கன் கோளங்கள் என்றும், பேயர் கோளங்கள்
என்றும், பிரன் கோளங்களென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

லிபர்கன் கோளங்கள் அநேகமாயிரமாயிருக்கின்றன
இவைகள் எண்ணிக்கையில் திரமாயும், குடலில்கிப
சந்தில் பரவியிருக்கிறபடியாலும் சிலேஷம் உற்பத்தி
யுடைய குடலை நிரமாக்கிவைக்கும் தொழிலுடன் இன்னப
ரில் தொழில்களினவர்களுக்கிருக்கவேண்டுமென்று தோ
ன்றுகின்றது. பேயர் கோளங்கள் வட்டமாயிருக்கும் இவை
கள் ஒவ்வொன்றையும் நடத்திக்கொண்டு லிபர்கன் கோ
ளங்களுக்கின்றன. இக்கோளங்களை சுற்றிக்கொண்டு கிண
ரீக் குழாய் வலைக்குமிருக்கின்றன. குடலிலிருக்கும் ரச
யனிக் குழாய்கள் இவ்வலைகளில் வந்து செருகின்றன

இக்கோளங்களின் தொழிலும் நன்றாய் கண்டறியப்பட
வில்லை. ஆனால் இவைகள் குடலில் வரும் அன்னரசு
தை உட்கொண்டு அதில் சில மாறுபாடுகளைச் செய்து
பிறகு அதை ரசாயனிக் குழல்களில் தள்ளுவின்றனவெ
ன்று கொன்றுகிறது.

அனுவமன்ஸ் இந்தக் கோளங்களுள் இரத்தக் குழாய்
கள் ஏராளமாயிருக்கின்றபடியால் இரத்தமும் கோளங்க
ளின் தீர்வமும் ஒன்றுக்கொன்று கலப்பதால் இரத்தத்
தின் சில அம்சங்களையும் கோளங்கள் பெற்று அவ்வச
னும் சில மாறுபாடுகளடைந்து பிறகு இரத்தத்தினையே
மறுபடியும் அவைகளைச் சேர்ப்பிக்கலாமென்றும் தோ
ன்றுகிறது. இவைகள் குழந்தைகளிலும் வரவிடப் பருவத்
திலும் ஏராளமாயிருக்கின்றன. வயது வந்தபிறகு இக்
கோளங்கள் காணப்படுகிறதில்லை.

பிரன் கோளங்கள் துணைக்குத்திலே மாதிரிய் காண
ப்படுகின்றன. குடலாறம்பத்திலே திரமாய் போகப்போக
குறைந்துவருகின்றன. சிலேஷம் சவ்விசுடியில் அதற்
கும் அதனடிச்சவ்விக்கும் மத்தியிலிருக்கின்றன. சில
இதற்குமுடைய கோளங்களாய் வெருங் கண்ணுக்குத்
தோற்றும்படியானவைகள் பார்த்தால் கண்ணுதலின் பாக
ங்கள் போலக் காணுகின்றன. இவைகளுக்கு தோளக் குழ
லாயிருக்கின்றன. கட்டடத்தில் எப்படி கண்ணம்போல
தாய்க் காண்கின்றதோ, அப்படியே தொழிலிலும் அதன்
தொழில்போன்றதை யுடைத்தாயிருக்கவேண்டுமென்று
உத்தேசிக்கப்படுகின்றது.

லில்லை யென்பது சிறு குடல் சிலேஷம் சவ்விசு
மாதிரிய் இருக்கும் வஸ்துக்கள். இவைகள் அதிக துடய
மான குழாய்த் தன்மையுடைய கட்டுப்பாடுகளுடையதா
யும், பாரவைக்கு மிருதுவான பட்டு கம்பளம்போன்ற
மினும்னுப்புத் தோற்றத்தைக் காட்டுகிற வஸ்துக்களாயும்
இருக்கின்றன. இவைகளையே மமர் முனைகொண்டோம்.

வில்லை ஒவ்வொன்றிலும் சிலேஷ்மச் சவ்வு கொஞ்சம் புடைத்துநிற்கும். இதனால் இரத்தக்குழல்களும், சிலேஷ்மச் சவ்வின் நார்களும் பரவியிருக்கின்றன. இவைகளுடன் ஒரு நினைகீர்த்தாரையாவது அல்லது ரசாயனக்குழலாவது இருக்கின்றது. தவிர கொழுப்புச் சாலங்களும் மற்றும் சிறிய நாளியரூபமான வஸ்துக்களுமிருக்கும்.

வில்லையின் தொழில் என்னவென்றால் குடலில் நன்றாய் செணமானபிறகு உணவினின்றி அன்னரசத்தைப் பிரித்து விரிஞ்சிக்கொண்டு ஸ்வீகாரப்படுத்திக்கொள்ளும் தொழிலாற்றுகின்றது.

பெருங்குடலின் கட்டடம்.

உணர்ந்த மனிதனில் பெருங்குடல் சுமார் 4 முதல் 6 அடி நீளமிருக்கும். இதையும் பேசுவதில்லாகுலமாயிருக்கும்பொருட்டு மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளாவன:—கீகம் என்பது சிறுகுடலடியுடன் தொடர்ச்சிருக்கும் கிரிந்த பைபோன்ற குழல் சிறுகுடலுக்கும் இதற்கும் மத்தியிலிருக்கும் கபாடந்தான் இவியோசிக கபாடம். கோலன் சிகத்தைத் தொடர்ந்து பெருங்குடலில் முக்கியபாகமாயுள்ளது. இது மூன்று பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஊர்த்தமுகமாயப் போவதற்கு அஸண்டிங் கோலன் என்றும், குறுக்காகப் போவதற்கு டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன் என்றும், கீழுக்கு இறங்குகிற பாகத்திற்கு டிஸண்டிங் கோலன் என்றும் பெயர். கெட்டம் என்னும் மலக்குடல் முதலில் விரிந்து பிறகு சுருங்கியிருக்கும். அதற்கடுத்து குதத்தின் வழியாக வெளிக்கிப்போக வழியிருக்கின்றது. சிகத்தை ஒட்டி சுருண்டு கொண்டிருப்பதற்கு நாங்குடி (வெரிமிபார்மிஸ் அப்பென்டிசு Vermiformis Appendix) என்று பெயர். இச்சுருள்கள் நாக்குப்புச்சிபோலயிருக்கும்.

சிறுகுடல் போலவே பெருங்குடலுக்கும் நான்கு சொக்காய்கள் இருக்கின்றன. இரத்த நீர் சொக்காய், சதைச்சொக்காய், சிலேஷ்மச் சொக்காயும் அதனுடிக்

சொக்காயுமாகும். இரத்த நீர் சொக்காயைப்பற்றி இவ்விடத்தில் விவரிப்பதவசியமில்லை. இதை ஒட்டி அந்த வேஷணம் என்னும் குடல் துவங்குகளின் (Peritoneum) பாகங்கள் கொழுப்பை புடைப்புவகையிருக்கின்றன. இவைகளுக்கு Appendices Epiploica என்று பெயர். சதைச்சொக்காய் சிறுகுடலிலிருப்பதுபோலவே உட்புறத்த புரை விருத்த வடிவமும் வெளிப்புறத்தப்புரை நீண்டதாயுமிருக்கின்றது. நீளத்திலிருக்கும் நான்கு சிறுகுடலிலிருப்பதுபோலவே குடல் முழுதும் பரவியிருக்கின்றதுமல்லாமல், இவைகளில் அதிகம் ஒன்றும் சேர்த்த கயர்களும் மூன்று இருக்கின்றன. இக்கயர்கள் குடலின் மற்ற எல்லாச் சவ்வுகளையும்விட சிறியதாயிருப்பினால் குடற் குழாய் கொடுக்கினதுபோல நடிந்து இருக்கும்படி பிடித்துக்கொண்டிருக்கின்றது. இந்தக் கயர்களையெடுத்துவிட்டால் குடலை நீளமா யிருக்கக்கூடும். அப்படி நீட்டிப்பார்தால் ஏகாண்டமாய் ஸ்தம்பாகாரக்குழல்போலக் காணும். மலக்குடலில் இக்கயர்கள் பிரிந்து பலநாளாய் மற்ற நாக்குடன் சேர்ந்துகொண்டிருக்கும். மலக்குடலில் இந்த கீட்பெபோக்கான கயர்கள் குடலின் மற்ற பாகங்களில் அதிகமாயிருக்கின்றன. விருத்த வடிவாகிய கதைகாரனை குடல் முழுதிலுமிருக்கின்றன. குடல் மடிப்புகள் மத்தியில் நன்றாய்க் காண்கின்றன. மலக்குடல் முடியுமிடத்தில் விருத்தகயர்கள்திரிந்து குதத்தில் அதிக பலமான தயாராக இருக்கின்றன. இதற்கு உட்புறச்சுருக்கு சதைபின்று பெயர்.

சிலேஷ்மச்சவ்வு சிறுகுடலில் உள்ளதுபோலத்தரையிருக்கின்றது. ஆனால் இந்தச் சவ்வில் சவ்வு மடிப்புகள்கிடையாது. வில்லையுமில்லாமல் வழுவுமுட்பாதிருக்கும். நரம்பு வேர் முடிகளும் நரம்பு நார்களும் சிறுகுடலிலுள்ளவைபோல இருக்கின்றன.

பெருகுடற் கோளங்கள் இவைகளிருவகையுடனும், ஸ்தம்பாகாரமாகும், கோலனமானதுமாகும்.

Ileo Cecal Valve இலீகோசிகல் வால்வு என்னும் பெருங்குடலுக்கும் சிறு குடலுக்கும் சந்திப்புஸ்தானத்தில் இருக்கும் சபாடம் பெருங்குடலினின்று சிறு குடலுக்கு வந்துக்கள் செல்லாமல் காத்துக்கொள்ளுகின்றது. இது சிலேஷ்மச் சவ்வின் திரண்டு பிரையொத்த மடிப்புகளாலானது. இதன் மேல்புறத்தில் இதற்கு உறுதியைத் தருவதற்கு குடலின் கனத்தநார்கள்ளில் கொஞ்சம் கலந்திருக்கின்றது. ஒவ்வொரு மடிப்பும் சிலேஷ்மச்சவ்வை உட்புறம் மடிவதினாலுண்டாயிருக்கிறவைகள். சிறு குடல் புரத்தில் காணும் சபாடத்தின்பகுலத்தில் வில்லிகளிருக்கின்றன. பெருங்குடல் பக்கத்தில் சபாடத்துக்கு வில்லைகளில்லை.

குடல் சுவற்றினின்று பொசிபும் திரவத்தை குடலில் வந்து விழுங்குவதற்குள்ளின்று பிரிப்பது கன்தமாயிருக்கிறபடியால் இதில் உற்பத்தியாகும் திரவத்தின் கூட்டுப்பாடுகளைச் சாண்டுபிரிப்பது அசாதாரணமாயிருக்கின்றது.

கணையழி அதின் பொசிப்பும்.

கணையமென்பது துணைக்குக்கியின்வளைவில் இருக்கின்றது. இதன் பெரிய குழல் குடலில் துணைக்குக்கிபாதத்தில் பொய்ச்சேருகின்றதுமல்லாமல் பித்தக் குழலுடன் சபாடத்துடன் அணைக்கப்பெய்துகளும். கணையத்தைப் புறம் அறிந்துபடியா ஆராய்ந்துபயந்தால் உமிழ்நீர்க்கோளங்களைப்போலதான் இருக்கின்றது. இதினின்று பொசிபும் திரவமும் உமிழ்நீர்போலவே இருக்கின்றது. இந்த திரவம் வரணமற்றதாயும் ஒளி ஊடுருக்கடியதாயும் கொஞ்சம் வழமழைப்புடையதாக இருக்கின்றது.

கணையப்பொசிப்பின் கூட்டுப்பாடு.

தண்ணீர்	980.45
வைரவஸ்து	19.55
கணையவஸ்து	12.71
அமிலத்திரிய வஸ்துக்களும் உப்புக்களும்	6.84
	19.55

அத்தி.]

கணையப்பொசிப்பின் கூட்டுப்பாடு.

199

மனிதனில் தினசரி சுமார் 12 முதல் 16 ஆவுன்சு கணையதிரவம் உருகிறதென்று உத்தேசிக்கிறார்கள். கணையத்தின் தொழில் பிள்வருமான காரணம்.

1. கஞ்சிவஸ்துக்கள் கணையதிரவத்தால் புறியுபிரிவு அடைகின்றன. அவைகளை வெக்செடெரின் என்னும் சர்க்கரையாக்கிவிடுகின்றன.

2. கொழுப்பு வஸ்துக்களைச் சீரணம் செய்வதில் இந்த திரவம்திகமாய் உபயோகப்படுகிறதென்று காணுகிறது. ஏன் எனில் கஞ்சிவஸ்துக்களை உணவாகக் கொள்ளாத சில மாயிச பக்தனை யிருசங்களிலும் கணையதிரவமிருக்கின்றது. ஆகையால் அமிலிருக்கையில் இந்தத் திரவம் இருப்பது கஞ்சியை மாற்றுவதற்கல்லவென்று புரிகிறது. ஆனால் இது கொழுப்பு வஸ்துக்களை கொழுப்பு புரிப்புகளாகவும் கிள்கிரின் அதாவது கொழப்பின் தித்திப்பு வஸ்துக்களாகவும் பிரித்துவிடுகிறது. கொழுப்பு புரிப்புகள் அவ்விடமிருக்கும் கண்ணம்புருடன் கலந்து சலித காரமாக உதவுகின்றன. அதுவுமல்லாமல் அக்கொழுப்பின் புரிப்புகளால் தண்ணீருடனும் கொஞ்சம் தித்திப்பு வஸ்துக்களுடனும் கலந்து (Emulsion) எண்ணைக்கொழம்பாகவு முதவுகின்றது. இவ்வெண்ணைக் கொழம்புகள் சராயனிகளால் ஸ்லிகரிக்கப்படுகின்றன.

கொழுப்பை எண்ணைக்கொழம்பாக்கும் சக்தி பித்த நீருக்குமிருக்கின்றது. ஆயினும் சில பரிணைகளால் கணையமும் இத்தொழில் புரிகிறதென்றறியலாம். கணையக் குழலைக் கட்டி அதன் திரவம் குடலில் வராமல் செய்து விட்டால் குடல்வழியாக கொழுப்பு ஆவனது எண்ணை வஸ்துக்கள் ஏராளமாக வெளிவிடுவதற்காக கண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பரிணைகளிலெல்லாம் கணையமே குடலில் வரவிட்டாலும் சாறுமாயலானாக இருந்ததற்குக் கானுகிறபடியால் குடலின் எண்ணை வஸ்துக்களை மாற்றுவதற்கு மற்றொரு தெரிந்த ஹைதுவாகிய பித்தநீரும் துவவஸ்துக்களுடன் கொசில்லையாயினால் எண்ணை வஸ்.

துக்கள் மாறவில்லையென்றும் எண்ணலாம். ஆனால் நசல் மாத்திரம் நோவடைந்து பித்தரீ குடலுக்கு வராமலிருக்கும்பொழுது கணையகிரவம் செருவதால் எண்ணைவஸ் துக்களழியப்பட்டுப்போவதால் விசர்ஜனத்தில் எண்ணைவஸ் துக்களகப்படாமலிருக்கிற வித்யமும் காணுகிறபடியால் கணையகிரவத்திற்கு எண்ணைவஸ் துக்களை மாற்றும் தன்மையுண்டென்றே எண்ணவேண்டும்.

3. கணையதிருவதற்கு இன்னமோர் தொழிலுமிருக்கிறது. வெள்ளைக்கரு சத்தங்களை யும் நிலநீர் பசைகளையும் கரைக்கும் சக்தி இதற்குண்டு. சீரணத்தாலுண்டாகும் பெப்டோனுக்கும் கணைய ரசத்தாலுண்டாகும் பெப்டோனுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. (பெப்டோன் என்பது செரிப்போன் என்னும் ஓர்வகை ஜீரண வஸ்து.)

உவ்வோரோர்-உட்டி.

சுதேசியன் கட்டிடம்.

கல்லீரல் என்னும் கறளை மிகவும் அதிகுட்பமான குழல்தன்மையுடைய கருவியாகும். இதற்கு இரண்டு குழல்களால் இரத்தம் வந்து சேருகின்றது. - போர்டல் வெயின் என்னும் பிணிசகுடல் காளங்கள் உற்பத்தியாகும் உதர காளமும் ஹிபாடிக் ஆர்டரி என்னும் யகிர்த்தகண்ட நாடியுமாம். இதன் சுரப்பு பித்தகீராகும். இப்பித்தகீர் சிசணசமயத்தில் யகிர்த்தகண்டக் குழலால் குடலில் போய் விழும். சீரணம் நடந்துகொண்டிராமலிருந்தால் பித்தப் பைக் குழலில் விழுந்து அகனினதும் பித்தாசயத்தில் பிர வேசித்து ஆவியித்தலை அது வேண்டும் காலமளவும் தங்கியிருக்கும். மேற்சொல்லிய உதாரணமும் யகிர்த்த கண்ட நாடியும், யகிர்த்தகண்டக் குழலும் கறளை முழுதி லும் ஒன்றின் பக்கம் ஒன்றாய்ப் பிரிந்து கிளைகளாய் ஓடி கிசறா. யகிர்த்தகண்ட காளங்களும் அவைகளின் கிளைக் கும தனியாய்ப் போகின்றன.

கறையாசனம் அடிவயிறாகத்தை முடிய
செய்ய அதாவது அந்தாவேஷனம் என்பது ஏதாக்குறைய

முடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இதன்படியில் அதிக அறப்பா
கிய சல்லடைக்கண் சவ்வு இருக்கின்றது. ஆனால் இது
அந்தர்வேஷணமில்லாத இடங்களில் அதிக கனமாயிருக்
கின்றது. இச்சல்லடைக்கண் சவ்வு குறையினிதழ்களையு
முடிக்கொண்டிருக்கிறது. குறுக்கேயிருக்கும் பிளவையி
லும் உதரநாளம் யகிர்த்த்கண்டநாடி, யகிர்த்த்கண்டக்குழல்
முதலியவற்றை சுற்றியிருக்கும் சல்லடைக்கண் சவ்வில்
ஒட்டி மறைந்துவிடுகின்றது. மேற்சொல்லிய நாடி நாளம்
குழல்கள் பல பிரிவடைந்து குறையின் வஸ்துக்களினுட்
செல்லுபிடங்களுக்கெல்லாம் இச்சவ்வும் ஊடோடியிருக்
கின்றது.

கறளை விருத்தரூபமாயும் அல்லது அண்டரூபமாய்
முள்ள சிறிய இத்தகனால ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இவை ஒவ்வொன்றும் கூட அங்குல குறுக்களவுள்ளவை
கள். இவை ஒவ்வொன்றும் உதரநாளம் யகிர்த்தகண்டநாடி
யகிர்த்தகண்டக் குழல் இவைகளின் அதிக நாடபக் கிளை
ளால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்விதமாக ஒன்றுக்
கொன்று குறளைப்பைகள் மதநிலில் இருக்கின்றன. யகிர்த்
கண்டபைகள் திரவம் பொருளும் கொள்ளுகளாகும். இவை
கள் கோளேவ வடிவமாகவும் ஒன்றன்மேல் ஒன்று அமுல்
சுவகால் பல பக்கங்களுடையதாகவும் காணும். இவைக்
ளின் குறுக்களவு பத்துமுதல் சீர அங்குல அளவுவரை
ருக்கின்றன. இவைகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு பிழை இரு
க்கின்றது. சிலவற்றில் இரண்டு பிழைகளும் இருக்கின்றன.
குறளைப்பை வஸ்துக்கள் பல கொழுப்பு அணுக்களையும்,
மங்கலான மஞ்சள்நிறமுடைய சில பித்தலாணப் பைச்
சையையும் உடைத்தானவை. குறளைபிலுள்ள இரத்தக்
குழாய்கள் பாணியிருக்கும் போகை அரிய முக்கியமாய்
முன்னமேயே முதற்கூறிய இரத்தக் குழாய்களையும் யகிர்த்
கண்ட குழாயின் போகையையும் பார்த்தல் நல்லது. முன்
னமே சொன்னபடி மூன்று குழாய்களும் சோடியாய்ப்
போகின்றன. இப்படிப் போவதற்காக யேற்படும் பன்

ளத்திற்கு யகிர்தகண்டக் காலவாயென்று சொல்லலாம். இக்காலவாயைச் சுற்றிலும் சல்லடைக்கண் சவ்வு முடியிருக்கின்றது. இதற்கு Glisson's Capsule என்று பெயர். முதலில் உதரநாளத்திற் பாரக்கலாம். இது சரலை சுற்று வதில் பல பிரிவுகளாகப் பிரிகின்றது. இப்பிரிவுகளும் அனேக கிளைகளாயும் உபகிளைகளாயும் முறையே பிரிகின்றன. இப்படிப் பிரியும் கிளைகள் இசுழுகள் ஒவ்வொன்றையும் சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன. இப்படி இசுழுகளை ஒன்றினின்றும் ஒன்றாகப் பிரிக்கிறபடியால் இவைகளுக்கு (Inter-lobular) இதழ் மத்திய நாளங்களென்று சொல்லலாம். இந்த சிறிய குழல்களினின்று உண்டாகும் நெருங்கிய தகதுகிவலை இதழின் உள்ளே பிரவேசித்திருக்கின்றது. இப்படி பிரிந்த தகதுகிகள் கிரமேன ஒன்றுடன் ஒன்று யுகக்கடி பெரிய குழல்களாகி கடைசியில் இவையெல்லாம் ஒரு சிறிய காளமாகச் சேருகின்றன. இந்த நாளம் இதழின் உட்பக்கத்திலிருக்கின்றது. ஆகையால் இதை இதழினிலுள்ளவையென்று சொல்லலாம். இச்சிறிய இதழினிலுள்ள நாளங்கள் கிரமேன பெரிய இதழ்நாளங்களில் சேர்ந்து, அவைகள் யகிர்தகண்ட நாளங்களின் பெரிய கிளைகளாகி கறையின் பின்புற ஓரத்தை விட்டு இரண்டு முன்று முண்டங்களால் அதோபிரஹன் நாளத்தில் விதானத்தை விட்டு அப்புறம் போகுமுன் போய்ச் சேருகின்றன. பெரியவிதழ் நாளங்களாகும், யகிர்தகண்ட நாளங்களுக்கும் உதரநாளங்களைப்போல சல்லடைக்கண் சவ்வு சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் இவைகளின் சொக்காய்கள் அதிக மெல்லியதாயிருக்கின்றபடியால், இக்குழாய்கள் இவைகளை சுற்றியிருக்கும் குறையவஸ்துவில் காஸவாய்கள் போலக் காணும்.

சல்லடைக்கண் சவ்வுக்கும் பித்தக்குழாய் இரத்தக்குழல்கள் இவற்றின் சுலறிற்கும், கரலின் மற்ற பாகங்களுக்கும் போஷிப்புக்கு வேண்டிய இரத்தத்தைக் கொண்டு வரும் தொழிலுடையதாய் யகிர்தகண்ட நாளமும் உதர

நாளம்போலவே பிரிந்து இருக்கின்றது. போய்ப் பரவும் இரத்தம் சிறிய கிளைகளாக உதர நாளப் பிரிவுகளிலாவது அல்லது இதழ்களிலுள்ள தகதுகி வலைகளிலாவது திரும்பிவந்து சேருகின்றது.

இதழ்மத்திய நாளங்களையும் இதழினிலுள்ள நாளங்களையும் இணைக்கும்.

யகிர்தகண்டக் குழலும் உதர நாளங்கள் யகிர்தகண்ட நாளங்கள் இவைகள் மாதிரியே பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்து இருக்கின்றன. இவைகள் முடியும் கிளைகளின் வறபாடும் இவைகளுக்கும் குறையப்பைகளுக்குமிருக்கும் சம்பந்தமும் இப்படிப்பட்டதென்று பார்த்துச் சொல்லுகிறவர்களில் அபிப்பிராய ஒற்றுமையற்றிருக்கின்றன.

கறையப்பைகளுக்கு மத்தியிலிருக்கும் பித்த தகதுகிகளுக்கு கனிமையான சுவர் ஒன்று உண்டென்றும், பித்த தகதுகிகளுக்கும் குறையப்பைகளுக்கும் மத்தியில் இரத்த தகதுகியிருக்கிறதென்றும் சிலர் அபிப்பிராயங்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

பித்தப் பை.

பித்தப்பை அடிபெருத்து அணி கூர்ச்சாத இருக்கும் பையாகும். இது சரலுக்குக் கீழே ஓட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது. அதனடியிலிருக்கும் அந்தரவேஷணத்தாலும் தாங்கப்படுகின்றது. பெரிய பக்கம், அதாவது அடிப்புறம் கொஞ்சம் கரலின் முன்பகத்துக்கு வெளியில் பிதுங்கியிருக்கின்றது. கூர்ச்சான அணி பித்தக்குழலிற் போய் முடிகின்றது.

இதன் சுவர்களை மூன்று சொக்காய்களாகப் பிரிக்கலாம். (1) வெளிப்புறத்தில் கரலுடன் ஒட்டாத பாகங்களில் நித்தாகில்விச சொக்காயாக இருக்கின்றது. அது தொடர்ச்சியாகக்கொண்டிருக்கும் அந்தரவேஷணத்தின்கட்டடத்தை உடைத்தாணாவின்றது. இதன்டியில் (2) நரசொக்காய் அல்லது சல்லடைக்கண் சொக்காய் இருக்கின்றது. இது நரசுக்காய்களாலும் கெதிழ்ந்தா

மும் தசைகளாலும் அமைக்கப்பட்டு நீளமானதாயும் கிருத்தாகாரமானதாயுமுள்ள இருவகைச் சதை நாரங்களையும் பெற்று இருக்கின்றன. சிலேஷ்மசர்வ்வின் மேற்பரப்பை வெருங்கண்ணைப் பார்த்தால் அதிக நுட்பமாயுள்ள தேன் கூட்டின் தோற்றத்தை யுடைத்தானதாயும் பல பக்கங்க ளையுடைய புள்ளங்களும் இடையே வரம்புகளும் உள்ள தாக்கானும், பித்தப்பைக் குழலில் சிலேஷ்ம சர்வ்வா னது கொஞ்சம் முன்னுக்குவந்து பிறைபோன்ற பல மடிப்புக்கள் உள்ளவைகளாயிருக்கின்றன. இம்மடிப்புக்கள் எஸ் லாம் சேர்ந்து பல படலங்களாலாய் கபாடமாகக் கா னும். சீரணகாலங்களினிடையில் பித்தரீரை பித்தப்பை யில் நிறுத்திவைக்க இக்கபாடம் உபயோகப்படுகின்றது. பித்தப்பையிலும் பெரிய பித்தக்குழல்களிலும் சிலேஷ்ம கோளங்களிருக்கின்றன. இக்கோளங்களுக்கு வாய்கள் உட்புறமிருக்கின்றன.

நரலின் தொழில்.

பித்தரீரை பொசிப்பிப்பது கறாரின் முக்கியத்தொழிலாகும். இது மிகவும் வெளிப்படையாய்க் காணுகின்றது. இதுவுமல்லாமல் கறாரைக்கு வேறு தொழில்களு முண்டென்று காணுகிறது. இக்கோளத்தின் வழி இரத்தம் செல்லுவதில் இரத்தத்தின் சில கூட்டுப்பாடுகளில் முக்கியமான வேறுபாடுகள் உண்டாகின்றன. இவ்வேறுபாடுகளடைவதிலேயே இரத்தத்தின் உபயோகமதிகமாகின்றதென்பதை இனிமேல் எடுத்துக்காட்டப்படும்.

பித்தரீர்.

பித்தரீரின் கூட்டுப்பாடு:—மஞ்சள்நிறம் அல்லது கொஞ்சம் பசுப்புக்கலந்த மஞ்சள்நிறமாக இருக்கும். இப்பித்தரீர் வழுவழப்புள்ள வஸ்து. மிகவும் சசுப்பான சுவையையுடையதாகிறது. புதிதாகிருந்தால் வாசனையற்றிருக்கிறதுபோலத் தோற்றுகிறது. இதன் வருணமும் கனமும் தேகத்தின் அசௌக்கிய ஸ்திதியைப் பொருக்காமலே வேறுபாடுடையதாகக் காணுகிறது. இவைகள்

குழலில் போகப்போக அதிக நிறமுடையதாகித் தாமலல்லாமல் பித்தப்பையிலிருக்கும்பொழுதும் நிறமதிகரிக்கும். அதுவுமல்லாமல் பித்தப்பையில் திகைக்காமிருந்தால் நிறமதிகரிக்கிறதுமல்லாமல் வழுவழப்பு அதிகமாகி நார்போலாகின்றது. நிறமும் கொஞ்சம் சுறுத்துப்போகின்றது. சுவையிலும் மிகவும் சசுப்புள்ளதாகின்றது. இதன் காரணமென்னவென்றால், பித்தம் எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்ந்து அதன் ஜலத்திற் கொஞ்சம் தேகத்தில் உரிஞ்சிக்கொள்ளப்படுவதினால்தானிப்படியாகிறதென்று காணுகிறது. சிலேஷ்மம், சேருவதாலும் பித்தரீருக்கு இக்குணங்களும் உண்டாகின்றன.

மானிட தேகத்தின் பித்தரீர் கூட்டுப்பாடு.

தண்ணீர்	859.2
வெரவஸ்துக்கள்	140.8
	1000.0
கண்ணாம்புடன் கலந்த பித்தப் புளிப்புகள்—பைலின்	91.5
கொழுப்பு	9.2
கோலஸ்டெரின்	2.6
சிலேஷ்மமும் வர்ணவஸ்துக்களும்	29.8
உப்புகள்	7.7
	140.8

கொழுப்பினின்றும் குகம்ச்செயநீரால் பைலினைப் பிரித்துப் பார்த்தால், குகவியம்போன்ற வஸ்துவாயிருக்கிறது. தண்ணீரிலும், சாராயத்தின் சாரத்திலும், உப்புக்கார திரவங்களிலும் கரையும். கரைந்த கிரவத்திற்கு பித்தரீரின் குணமும் சுவையும் இருக்கும். அது சோடாவடன் இரண்டு பிசுக்களின் புளிப்புக்கலந்துண்டாகுபு இப்புளிப்புக்கு கிரோகோகாரிக் ஆலிட் என்

றும் டாரோகாஸிக் ஆஸிட் ஏன் டம் பெயர், முதல்புளிப்பு காலிக் ஆஸிட்டிடு மினைவினும் சேர்ந்தவஸ்து. இரண்டாவது புளிப்பு மேற்கொல்லிய ஆஸிடும் டாரினும் கலந்தது.

பித்தநீரில் கொழுப்பு வஸ்துக்கள் பல விதங்களிலிருக்கின்றன. கனுவில் சவுக்காரமாகக்கூடிய கொழுப்புக்களல்லாமல் கொஞ்சமளவு கொலஸ்டெரினும் இருக்கின்றது. இவைகள் எல்லாம் டாரகோலேட், ஆப் சோடாவில் கலந்திருக்கின்றன. மலத்தில் ஸ்டிரோகோரின் என்றொரு வஸ்துவைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அது கொலஸ்டரினின் மாறுபாடாகும். கரலின் முக்கிய வேலை இரத்தத்தினின்றும் கொலஸ்டரின் பிரிப்பதாயிருந்தாலும் இது தேகத்தைவிட்டு வெளிப்படும்பொழுது ஸ்டிரோகோரின் ஆகிவிடுகிறதென்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். திசைநிபந்து பத்தரை விரோசின் மலத்தில் போகிறதென்று உத்தேசமும் செய்கிறார்கள்.

பித்தநீரிலிருக்கும் மஞ்சள் நிறமான வர்ணவஸ்துவுக்கு பிலிருபின் அல்லது பிலிபல்லின் என்று பெயர். பைச்சை விறவஸ்துவுமுண்டு. அது புற்புண்டு மேயும் பிராணிகளில் மஞ்ஞயக் காணும். அதற்கு பிலிவர்டின் என்று பெயர். பித்தப் பையில் பித்தம் அதிக நோய் நின்றவிடமால் தின்னமொரு வருண வஸ்து காணுகிறது. அதற்கு பிலிபிரோசின் என்று பெயர். பித்தநீர் வெளியே போகாமல் தடைப்பட்டால் வர்ண வஸ்துக்கள் மறுபடி தேகத்திற் சேரவுணமாயி இரத்தத்துடன் சமூகுகின்றது. அப்பொழுது தசைகளும் வர்ணமடைந்து காமாலை வர்ணம் தேகமெங்கும் காணுகின்றது. இரத்தத்தின் வருணவஸ்துவுக்கும் பித்தநீரின் வருணவஸ்துவுக்கும் மற்றும் மூத்திரத்தின் வருணவஸ்துவுக்கும் சம்பந்தமுண்டென்று தோன்றுகிறது. ஆனால் சிசு சம்பாய இவைகளின் சம்பந்தங்கள் ஆராயத்தயியப்படவில்லை.

பித்தநீரிலிருக்கும் சிலேஷ்மம் பித்தப்பைக் கொள்கலினுடையவும் யகிர்த்தண்ட குழலினுடையவும் சிலேஷ்ம சவ்விலிருந்து வருகின்றது. பித்தநீரை சாராயச் சாரத்தினால் பிரிப்பதில் மஷ்டாகி நிற்கின்றது. இதில் கலந்திருக்கும் பரிஸ்தாபிதத்தை அணுதரிசினிக் கருவியால் கண்டறியலாம். பைலின் தேகம் அமுசிப்போவதற்கு அதிலிருக்கும் சிலேஷ்மமே காரணமாகயிருக்கின்றது. சிலேஷ்மத்தைப் பிரித்தால் பிறகு பித்தநீர் வெகுநாள் தொடர்விலிருக்குமென்று ஒருவர் சொல்லுகிறார்.

உப்புக்கள் அல்லது அங்குதிரியவஸ்துக்கள் தேகத்திற் பொசியும் மற்ற பொசிப்புக்களிலிருப்பதுபோலவே பித்தநீரிலுமிருக்கின்றன. பித்தச் சாரப்பதே காணும் (Carbonate and neutral phosphate of sodium and potassium) அதைச் சுவேதாஸூண்டாகியவைகளேயல்லாமல் பித்தநீரிலுள்ளவைகளல்ல. oxide of iron பித்தச் சாரப்பதிலிருக்கிறதென்றும், தாமிரம் சவுக்கிய ஸ்திதியில் பித்தநீரிலிருக்கிறதென்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பித்தநீரை பொசிப்பிக்கும் தொழில் இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் உபவாசகாலங்களில் பிதாவமாகிறதென்றும் உணவை உட்கொண்டவுடனே அதிகரிக்கிறதென்றும் காணுகிறது.

கறவைப்பைகளில் பித்தநீர் உற்பத்தியாகின்றது. அவ்விடத்தினின்று அதிக நடப்பமான யகிர்த்தண்ட குழல்களில் விழுந்து பெரிய குழல்களுக்குப்போய், முக்கியமான யகிர்த்தண்டகுழல்வழியாய் துணைக்குக்கிக்குப் போய்ச் சேர்க்கும். ஆனால் நிரணத்தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கும்பொழுதுதான் இப்படியாகும். உபவாசகாலத்தில் ஏகோபித்த பித்தக்குழலில் பின்னுக்குத்தள்ளப்பட்டு பித்தப்பைக் குழல்வழியாய் பித்தப்பையை வந்தடைகின்றது. அவ்விடத்தில் அது பிறந்துகொண்டிருந்து அடுத்த சேரணத்தொழில் புரியும்காலத்தில் குடலில் வந்துகிடும். பித்தப்பையின் தொழில் பித்தத்தை

சோதனையை வகப்படுத்தும் இடமாகும். சீரணத்தொழில் சில கால அளவு விட்டுவிட்டு புரியப்படுவதாலும், பித்தநீர் இடைவிடாது பொசிவதாலும் இதன் பயன் நல்லது என்று கருதுகின்றது. பித்தநீரைச் சேர்த்து வேண்டும்போது தரும்.

பித்தநீர் பித்தப்பைபிற் போய்ச்சேரும் யாந்திரிக வேலை சுருவிலறியத்தகுந்தது. ஏகோபித்த பித்தக்குழல் துணைக்குக்கியில் போய்ச் சேருவதற்கு அகிலிருக்கும் னாவாவாய் குழலையிடச் சிறியதாயிருக்கின்றது. பித்தநீரை உந்தித்தள்ள சரியான வேகமில்லாவிட்டால் இந்த வாய் மூடியிருக்கிறதுபோலவும் காணுகிறது. சீரண மத்தியகாலங்களில் பொசியும் பித்தநீர் இந்த னாவாக்கை திறக்கச்செய்யும் சக்தியற்றதாயிருக்கின்றது. ஏகோபித்த குழலிலிருக்கும் பித்தநீர் வெளியில் குடலுக்கு வர வழியில்லாமல் பித்தப்பைக் குழலுக்குச்சென்று அதினின்றும் பித்தப்பையை யடைகின்றது. இந்த பின்னோக்கிப் போகும் தொழிலில் குழலின் நெளியும் தன்மையால் உறுதிபெற்றாலும் பெறக்கூடியதாயிருக்கின்றது. சிறு குடலில் உணவுவந்து சோந்தவுடனே பித்தநீர் பித்தப்பைபினின்றும் விடுபட்டு துணைக்குக்கிக்கு வந்துசேருகின்றது. இப்படிவருவதில் பித்தப்பைபின் சுவர்களும் ஏகோபித்த குழற் சுவர்களும் சுருங்குவதா லுதவிபெறுகிறது. ஏனெனில் இந்த இரண்டு சுருங்கினாலும் பட்டையிலலரக்கதைகாரகனிருக்கின்றன. துணைக்குக்கியில் உணவுவருவதினால் உத்திபனப்பட்டு அந்தச் சுவர்கள் பிரதிகாணக்கிரியையுரிந்து சுருங்குகின்றன. இந்தச் சுருக்கத்தின்வேகம் ஏகோபித்த பித்தக்குழலின் வாஸ்யத்திற்குப் போதுமாகதாக விருக்கின்றது.

இருபத்துநாலுமணி நேரத்தில் எவ்வளவு பித்தநீர் தேகத்தில் சுரக்கிறதென்று பல ஈந்தேசங்கள் செய்யப்பட்டுருக்கின்றன. ஜீரணாசம்போலவே பித்தநீரும் உண்ணும் உணவின் அளவை ஒத்து விசிறப்படி மாறியிருக்க

கும். சராசரி சுமார் முப்பதுமுதல் நாற்பது அவுன்சு இரவும் தினசரி புசியுமென்று உத்தேசிக்கலாம்.

இரத்தத்தில் பித்தநீர் பித்தநீராக உண்டாகிவருக்கிறதில்லை. இப்பொழுது சொன்னபடி அது யகித் கண்டச்சாலங்களில் உண்டாகின்றது. குடலுக்கு வராமல் பித்தநீர் தடைப்பட்டுப்போனால் (உதாரணமாக யகிர்த்தகண்டகுழல் பித்தக்—கல்லாலடைப்பட்டுப்போனால்) இரத்தத்தில் அதிகமாய்க்கலந்து அத்துடன் தேகத்தில் இரத்தம் பரவுதலால் காமாவேபென்னும் மன்றாய் விவங்கும் தோற்றத்தை உண்டாக்கும்.

பித்தநீர் சுரப்பதால் இருவகை பயனுண்டாகிறது. சீரணோத்தரரியாக உண்ணும் உணவை இச்சம் வேறு திப்பிவேறுகச் செய்யவும், மலத்தைப்போக்கவும் உதவுகின்றது.

விசர்ஜனோபசரியாத இரத்தத்திலிருந்து அதிகமாயிருக்கும் கரியையும் ஜலவாடியையும் பிரித்தெடுக்குத் தொழில் பித்தநீருடையதாயிருக்கின்றது. இந்தத் தொழிலுபுரிய அது ஏற்றதென்பதற்கு பிண்டத்தில் அதன் உற்பத்தியையும் தொழிலையும் நோக்கினால் நன்குவிளங்கும். கர்ப்பத்தில் வளருங்காலத்தில் துடையங்களும் குடல்களும் வியவஹாரமற்று இருக்கின்றன. வெளிக்காற்றை சுவாசிப்பதில்லை; உணவை சீரணம்செய்து தொழிலுமின்றி ஏனெனில் காப்பப்பைக்கு முடியிருக்கும் தோலால் பிண்டத்தின் குழல்களுக்கு வெகு கல்ல போஷிப்பு வந்துசேருகின்றது. பித்தக்காலத்தில் நால் பிறந்த பிறகு இருப்பதைவிடப் பெரிதாகி அதில் அதிக திரவம் பொசியும். பிண்டத்தின் குடலில் உணவிலையாகையால் பித்தம் உணவு சீரணத்தின்பொருட்டு உற்பத்தியாகிறதென்று சொல்லக்கூடாது. ஜனனகாலத்தில் குடற்குழாயில் தடித்த பித்தநீர் நிறைந்து குடல் பொசிப்புக்குடன கலந்திருக்கின்றது. ஏன் எனில் அபெனியம்

(மீகோனியம் meconium) என்னும் பிண்ட மலத்தில் பித்தநீரின் குணங்களெல்லாமிருக்கின்றன.

பிண்ட விசர்ஜன கூட்டுப்பாடுகள்.

பித்தப்பிசின்	15.6
சாதாரண கொழுப்பும் சோலஸ்டிரினும்	15.4
பரிஸ்தாபிதம், சிலேஷ்மம், வர்ணவஸ்து	
உப்புக்களுடன்	69.0
	100

பிண்டத்தில் பித்தநீரின் தொழில் இரத்தத்தை நேரி லேயே சுத்திசெய்வதாகும். அதாவது இரத்தத்தினின்று நிக்கிரகவஸ்துக்களைப்பிரித்து அவைகளை தேகத்தினின்று வேறு மாயப்பாடல்களில்லாமல் வெளிப்படுத்துவதாம். பிண்ட ஜனனத்தில் உற்பத்தியாகும் பித்தநீரெல்லாம் பிண்ட விசர்ஜனத்தில் சேர்ந்து வெளியே வந்துவிடுகிறது. ஆகையினால் பிண்ட ஜனனத்தில் துரையிரளின் தொழிலை பித்தநீர் ஒருவாறு புரிகிறதென்று சொல்லலாம். தவிர பிண்டத்திற்கு கற்பக்குழியை சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் நேரலினவழியாய் வரும் இரத்தமெல்லாம் சுரலிற் சென்று பிண்டபாகங்களில் பரவுகின்றது; நரி, ஜலவாயு முதலிய மூலப்பொருள்களை அது கவர்வதால் இரத்தத்தை சுத்திசெய்கின்றது. பிண்டம் பிறந்தபிறகு துரையிர லினால் எப்படி கரியமலவாயுவும் தண்ணீரும் இரத்தத்தினின்று பிரிக்கப்படுகிறதோ அனாத் ஒத்திருக்கின்றது.

பிண்டப் பித்தநீர் எப்படி மலத்தில் விசர்ஜனமாகின்றதோ அந்தப்பிரகாரமே கர்ப்போற்பத்திக்கப்படுதற்கும் ஒருவாறு பித்தநீரும் விசர்ஜனத்தில் வெளிவருமென்று உத்தேசித்தத் தகுமானதாயிருக்கிறது. ஆனால் மலத்தை பரிசுஷிக்கும்ளவில் பேதியில் விரைவாக பித்தநீர் வெளி வருகிறதெல்லாமல், குழந்தைகளிலும், வளர்ந்தவர்களிலுங்கூட அது அவ்வளவாகக் கழலப்படுகிறதில்லை. பொது

சியும் பித்தநீரில் $\frac{1}{10}$ பங்கு மலத்தில் காண்பது அரிது. இந்தபாகமும் பித்தநீரின் வர்ணவஸ்துக்களும் அதன் சில கொழுப்புவுவஸ்துக்களாயிருக்கிறதேயல்லாமல் அதன் சத்தாகிய பித்தம் மிகவும் சொல்பமேயிருக்கின்றது. இந்த பித்தச் சத்தெல்லாம் குடல்வழியாக இரத்தத்தில் உரிஞ்சிக்கொள்ளப்படுகின்றது. ஆயினும் பித்தாமலத்தை பரிசுஷிசெய்துபரத்தால் அதில் கரியும், ஜலவாயுவும் திக மாயிருக்கின்றது. இதன் காரணம் என்னவென்றால், இரத்தத்தில் சேர்ந்தபிறகு அதிலிருக்கும் சவாசவாயுச் சம் பந்தப்பட்டு தனதாய் கரியமலவாயுவாகவும் தண்ணீராகவும் விசர்ஜனமாகின்றது. பிறந்தபிறகு இப்படி அதன் தொழிலை நேராகச் செய்யாமல் வக்கிரோபாயமாய்ச் செய்வதற்கு ஒரு காரணத்தையும் கூறலாம். அது உஷ்ணத்தை உண்டாக்கும்பொருட்டென்று சொன்னாலுமமை யும், பிண்டத்தின் சிதோஷ்ணஸ்திதி தாயினால் கர்ப்பம் பற்றப்படுகின்றது. ஆகையால் பிண்டத்திற்குள்ளே உஷ்ண ஜனனம் ஆகவேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் கர்ப்போற் பத்திக்குப்பிறகு உஷ்ணத்தை ஜனிக்கக்கூடியவஸ்து தன் னமாகாமல் விசர்ஜனமானால் விசர்ஜனமாய்கும் வஸ்து முழுவதும் வீணில் நஷ்டமெல்லாமல் வேறல்ல. ஆகையால் பித்தாமலத்திலிருக்கும் கரியும், ஜலவாயுவும் மலத்தில் வெளிவராமல் மடப்படியும் இரத்தத்தில் அமைந்து சவாசவாயுவுடன் கலப்பதால் உஷ்ணம் பிறக்கவேண்டுமெ ன்கிற உத்தேச புரந்தியாகும்பொருட்டே என்றறியவும்.

தவிர சுரலுக்கு வரும் இரத்தமெல்லாம் அது வரும் விசேஷ மாதிரியால் பித்தநீருக்கு இரத்த கத்தித் தொழி லிருக்கிறதென்று காட்டுகின்றது. உதர காளத்தில் வரும் இரத்தம் ஜீரணக் கருவிகளினின்றும் பலவித வஸ்துக்க ளையும் பெற்றுக்கொண்டு அப்பொழுதுதான் சுரலில் புகு மென்றது. இவ்வஸ்துக்களில் சிலது உடனே விசர்ஜனம் செய்யவேண்டியதாயிருக்கக்கூடும். இப்பேர்ப்பட்ட வஸ்துக்கள் இரத்தத்தில் கலக்கக்கூடுமென்று சுருவிலதி

பலாம். இவ்வஸ்துக்கள் தேகபோஷணைக்கு உபயோகம் நிறுவிடுப்பதும்ல்லாமல் தேகத்திலுள்ள இரத்தத்தில் சேர்த்தால் கெடுதியையுண்டாக்கும் கனமையுள்ளதாகவுயிருக்கக்கூடும். சரலானது இரத்த ஓட்டத்தின் வழியிலிருந்துகொண்டு இரத்தத்தில் அப்பொழுதுதான் வந்தடைந்திருக்கும் கெடுதி வஸ்துக்களை மேற்செல்லாமல் தடுத்து இரத்தத்தை அவைவின்னும் தடுத்தெய்து, அவ்வஸ்துக்களை உடனே விசர்ஜனம்செய்யத் தருந்த கருவியாகவுயிருக்கின்றது. சரல் அடிக்கடி தூயபாஷாணங்களை விசர்ஜனம் செய்வதாலும், அல்லது அவைகளை இரத்தத்தில் போகவொட்டாமல் தடுத்து தனக்குள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற விஷயமும் நன்றாய்த் தெரிந்தவைகளே.

பித்தரீரின் முக்கியமான தொழில் விசர்ஜனத் தேகழிலாகியும் அது குடலிலிருக்கும்பொழுது சோணகாரி சரல் உதவுகின்றதென்றும் கொல்லணம், எல்லாப் பிராணிகளிலும் பித்தரீர் பிரத்தியேகமான விசர்ஜனக்குழாய் மூலமாகவாவது அல்லது பிரத்தியேகமான விசர்ஜனக் குழாய்மூலமாகவாவது வெளியாகிவருகின்றது. மற்ற அனேக விசர்ஜனங்களுக்கு பித்தரீரேயேக் குழாய்களும் கருவிகளாயிருக்கின்றன. பித்தரீரோ குடலில் சேருகின்றது. அவ்விடத்தில் அன்னப்பாகு இரைப்பையை விட்டுவந்ததும் அதனுடன் கலந்துகொள்ளுகின்றது. இப்படி உடனே கலப்பதற்குக் காரணம் இதுவும் சீரணத்தொழில் புரிவதற்கென்றே காண்கிறது. அதனுல்லாமல் சீரணகாலங்களில் பித்தரீர் அதிகமாய்ச்சுரந்து குடலில் விழுகின்றது இதனாலும் அறியலாம்.

சீரணத் தொழில்புரிவதில் பித்தரீர் செய்யும் வேலை பென்னவென்றால் (1) உணவிலிருக்கும் கொழுப்பு வஸ்துக்களை எண்ணெய்க்குழம்பாக்கி ரசாயினிகள் அவைகளைப் பெருமபடி செய்யும் தொழிலேதான். சில பரிசைக்களில் ஏனோபித்த பித்தக்குழைக்கட்டி பித்தம் வெளிவராமல் செய்ததில் இரைப்பையின் சீரணமாதிரிச் சரியாய் நட

ந்தபோதிலும் அன்னரசம் உண்டாகவில்லை. (Chyle) இரசாயினிக்குழல்களில் இருந்த திரவம் தெளிவான வர்ணம்ற்றதாயிருந்தது. சாதாரண அன்னரசமோ வெண்மை வாயும் கனமடைந்து ஒளி ஊடுருக்கடாததாயிருக்கும்.

(2) குடலின் கிலேஷ்மச்சவவுகள் பித்தரீரால் நனைவதால் அதன்வழி கொழுப்பு வஸ்துக்கள் ஊறிப்போவதற்கனுசூலமாகியிருக்கின்றது.

(3) சீரண ரசமாதிரியே பித்தரீருக்கும் வஸ்துக்களை அழுதிப்போகாமல் காக்கும் குணமுண்டு. அதனால் குடலில் உணவிலிருக்கும்னவும் அதை அழுதிப்போகாமல் காப்பாற்றுகின்றது. இதையும் பரிசைக்கால அறிந்திருக்கிறார்கள்.

(4) பித்தரீருக்கு விரோசன குணமுண்டு. குடற்கோளங்களில் தாக்குவதால் அக்கோளங்களை திரவம் பொசிப்பிக்கச்செய்வதினால் குடல்களை உதறிப்பெய்தி அவற்றிலுள்ள வஸ்துக்களை வெளியேதள்ளச்செய்யும். காமாஸையில் உண்டாகும் மலக்கட்டிலும், பித்தரீர் அதிகமாய் ஜனிப்பதாலுண்டாகும் அதிகாசத்தாலும், மாட்டு பித்தத்தின் (Ox-gall) விரோசன குணங்களாலும் இத்தயறியலாம்.

இரத்தத்தில் பித்தரீர் கலந்தபிறகு அடையும் மாறுபாட்களைப்பற்றி ஒன்றும் அறியப்படவில்லை. ஆனால் அது மாறுபாடல்கள் அடைகின்றதென்பது நிச்சயம் ஏன் எனில் இரத்தத்தில் அதைக் காண்பது அசாத்தியமாயிருக்கிறது.

பித்தரீரைப் பொசியச்செய்வது ஈரரின் தொழிலாக லில் ஒன்று. அதற்கு வேறு தொழில்களும்ருக்கின்றன. அதனுள் வரும் இரத்தத்தின் சில கூட்டுப்பாடுகளை இரத்தத்துடன் ஐக்கியப்பெய்படியாய்ச் செய்வதும்ல்லாமல் மற்றவைகளை சவாச்செயல்களில் விசர்ஜிக்கும்பொருட்டு தக்கபடி மாற்றும் குணமுடையதாயிருக்கின்றது. அன்னபசனக்குறவினன்று உதாரணத்துக்குவரும். (பெ

ப்டோன்) செரிப்போன் என்றும் வெள்ளைக்கருவஸ்த இரத்தத்தில் ஐக்கியப்படுவதற்குமுன் சரலின் தொழிலுக்கு உட்பட்ட வேண்டியதாயிருக்கின்றன. ஏன் எனில் அட போர்ப்பட்ட வெள்ளைக்கருச்சத்தை சண்டநாளங்களில் பீச்சினால் அது சீக்கிரத்தில் முத்திரத்தில் வந்துவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு பீச்சினால் இரத்தத்துடன் சரலின் சென்று வருவதினால் கனிமாயான வஸ்துவாக அது இரத்தத்தில் காணப்படுகிறதில்லை. இரத்தத்திலுள்ள வெள்ளைக்கருச்சத்து வஸ்துக்களைய் மாற்றிவிடுகின்றது.

பித்தநிரால் துணைக்குக்கியில் செரிப்போன்கள் தள்ளப்பட்டு விந்துவிடுகின்றன.

சரலில் கிளைகோஜன் சர்க்கரையுண்டாகும் தொழில்.

சரல் சுபாவமாகவே கிளைகோஜன் என்றும் சர்க்கரையை புண்டிபண்ணு கிறதென்னும் விஷயத்தை பார்ப்பதைகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பகுதிகளால் சரலில் இரத்தத்தின் வஸ்துக்கள் வந்தபிறகு சர்க்கரையாகிறதல்லையென்றும் அதிலேயே சர்க்கரைசத்து உற்பத்தியாகிறதென்றும் அப்படியும், சர்க்கரை அச்சத்தின் வேறுபாட்டென்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறைய சரலங்களில் சர்க்கரைசத்து சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும், அது உணவில்வரும் கஞ்சி வஸ்துக்களினாலும் என்னை வஸ்துக்களாலுமல்லாமல் வெள்ளைக்கரு வஸ்துக்களினின்றும் சர்க்கரைசத்து உற்பத்தியாகிறதென்றும் எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். வெள்ளைக்கருவஸ்துவை கிளைகோஜின் சர்க்கரையாகமாற்றி குறையப்பைகளில் சேர்த்துக்கொண்டு உபயோகம் என்றும் வஸ்துவை பிடுக்கத்தில் விசாரணை செய்வதுவிடப்படுகிறது.

உணவு சிறகுடல்வழிப் போதும்பொழுது அடையும்

மாறுபாடுகளின் கருவிகம்.

சிறகுடலில் உணவுக்கு உண்டாகும் மாறுபாடுகளை கண்ணாயிரியும்பொருட்டு இரைப்பையைவிட்டு சிறகு

குடலுக்கு அன்னப்பாருவருவதை முதலாகக்கொண்டு பார்ப்போம். அன்னவாசிவழியாய் வரும் பலவித உணவுகளையும் ஒன்றிபடச்செய்வதுமல்லாமல் இரைப்பையில் சீரணரசத்தால் உணவின் உப்புவாயு கலந்தவஸ்துக்கள் கரைந்துபோகின்றன என்று எடுத்துச்சொன்னோம். கொழப்புவஸ்துக்கள் இரைப்பையிலிருக்கும் காலத்தில் உணவின் மற்ற வஸ்துக்களுடன் நன்றாய் கலப்பதல்லாமல் தேகத்திற்கு ஐக்கியமடையச்செய்துகொள்ளும் விதிலிருக்கிறதில்லை. கஞ்சிவஸ்துக்கள் வாயிலேயே சர்க்கரையாக மாற ஆரம்பிப்பதெய்துவதற்குப்போதிலும் அத்தொழில் முடிவுபெறாமல் நின்றுபோயிருக்கின்றன. கரையும்குணமுடைய வஸ்துக்கள் இரத்தக்குழல்களினால் உறியப்பட்டு, மறைந்துபோகின்றன. திரவமாக உட்கொண்ட தண்ணீர் சாராயமுதலியவைகளும் அப்படியே மறைகின்றன.

ஆகையால் மேலவிய பசையுடைய அன்னப்பாசில் வெள்ளைக்கருச்சத்துகள் கொஞ்சம் மசிக்கும் கொஞ்சம் மசியாமலுமிருக்கின்றன. கொழப்புவஸ்துக்கள் மசியப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் கரைந்துபோகாமலிருக்கிறதில்லை. கஞ்சிவஸ்து அதிக விதானமாய் சர்க்கரையாய்க்கொண்டிருக்கிறது. இவைகளுடன் சீரணரசமும், உட்கொண்ட சீரணமாகாத வஸ்துக்களும் கலந்திருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட அன்னப்பாரு கொஞ்சம்கொஞ்சமாய் பிதுக்கப்பட்டு துணைக்குக்கியை வந்தடைகின்றது. இத்துடன் சிறகுடலினின்று சுரக்கும் முன்னமே பெய்துச்சொன்ன திரவங்கள் இத்துடன் கலக்கின்றன. இதனால் உண்டாகும் சீரணகுணங்கள் என்னவென்றால் பின்வருமாறு எடுத்துரைக்கலாம்.

(1) கொழப்பை தேகத்தில் ஐக்கியப்படுத்த தகுந்த பிரகாரம் மாற்றுவிடக்கூடிய குடலின் முக்கிய தொழிலாயிருக்கின்றது. சிறகுடலின் மேல்பாகத்திலேயே இந்த மாறுபாடு உண்டாகிறதென்பதற்கு சந்தேகமில்லை. இந்த தொ

ழிலப்பிரிவில் பித்தநீர், சுணையதிரவம், குடல் கோளங்க ளின் திரவங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி செய்யும் தொழில் தெரியவில்லை. ஆனால், கொழப்பு இருவகையில் மாறுபாட்டைகின்றது.

(1) பூதிகமாய் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு ஸ்ரங்களுடன் கலந்து ஒருவித சவுக்காரமாகின்றது. (2) அதுவுமல்லாமல் அது எண்ணைக்கொழம்பாகவும் மாறுகின்றது. அதாவது அதன் அணுக்கள் அதிசுடப்பமாய் பிரிக்கப்பட்டு கலக்கிறபடியால் அப்படி கலந்த பதார்த்தம் பால்போன்ற திரவமாகக் காணும்; அதற்குந்தான் எண்ணைக் குழம்பு என்று பெயர்.

சீரணகாலத்தில் சிறுகுடலில் வில்லைகள் இரத்தம் மிகுதியாய் வந்தடைவதால், வீங்கி புடைந்ததாகக்காணும். அவைகளின் பரிஸ்தாபிதச்சாலங்களில் உறிஞ்சும் தொழிலால் கொழப்பு அணுக்கள் நிறைந்துகொள்ளுகின்றன. அதிசுடப்பமாய் பிரிந்தபிறகு வில்லைப்பிஞ்சுக்கும் நிணநீர்த்தகையில் திரமேண ஊடுநீறு கடைசியாக மத்தியிலிருக்கும் இரசாயனப்பையில் போயடைகின்றன. அவைகளின்மூலம் சிலேஷ்மசவ்வினடிச்சவ்வினிருக்கும் இரசாயனிக் குழல்வலையில் செல்லுகின்றன. அவைகளின்மூலம் மத்தியாத் தர மணிக்குடலிலுள்ள இரசாயனிக் குழல்களில் சென்று ரசதாரையை (Thoracic duct) போய்ச் செருகின்றன. சவுக்காரமாய் மாறிய கொஞ்சம் கொழப்பைமாத் திடம் குடல்களிலுள்ள இரத்தக்குழல்கள் உறிந்துவிடுகின்றன.

பித்தநீரும் சுணையநீரும் சேர்ந்தபிறகு குடலில் இருக்கும் உணவின் எண்ணைக்குழம்புச் சூ அன்னதசம் என்று சில சமயங்களில் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அன்னதசம் என்னும் பெயர் சீரணகாலத்தில் இரசாயனிக் குழல்களிலிருக்கும் திரவத்திற்கே பொருந்தும். அக்காலத்தில் அந்த திரவத்தில் மற்றக் காலங்களிலிருக்கும் நிணநீரைவிட அதிகமான கொழப்புத்துளிகள் செந்து குடலினின்றும் உறிந்துவிடுவது வந்து இருக்கும்.

(2) இரைப்பையில் கொஞ்சம் கரைந்தும் கரையாமலுமிருக்கும் வெள்ளைக்கருச்சத்துக்கள் சீரணரத்தால் கரைக்கப்பட்டுக்கொண்டு சீரணரத்தாடன் துணைக்கு கமிக்குவாகுகின்றது. அவ்விடத்தில் கரையாததும் குடல் திரவங்களும் அதனுடன் கலந்து கரைக்கும் தொழிலுக்கு ஒத்தாசையாயிருக்கின்றன. வெள்ளைக்கருச்சத்துக்கள் பூதிகமாய் சீரணத்தொழிலால் செரிப்பொருளாகவும், செவித வஸ்துக்களாகவும் மாறி குடலிலிருக்கும் சிலேஷ்மச ரவ்வினுள்ள இரத்தக்குழல்களாலும் நிணநீர்க்குழல்களாலும் உறிந்துகொள்ளப்படுகின்றன.

(3) உணவின் கஞ்சி வஸ்துக்கள் சர்க்கரைநீராக மாறுவதில் இரைப்பையில் கொஞ்சம் உடைப்பட்டு துணைக்கு கமிக்குவந்த பிறகு சுணையதிரவம், சிறுகுடல் கோளங்களின் திரவம் இவைகளால் மற்படியும் சிக்கிரத்தில் சர்க்கரை வெள்ளைக்கருச்சம் மாறி குடலிலிருக்கும் திரவங்களுடன் கலந்துபோகின்றன. இவைகளே இரத்தக் குழல்களும் கிழியமாக உறிந்துகொள்ளுகின்றன.

(4) உப்பு வஸ்துக்களும் சர்க்கரைகளும் உமிழ்நீராலேயே கரைந்துபோகும். அப்படி கரையாமலிருந்தால் இரைப்பையில் கரைபும். அவ்விடத்திலும் கரையாமல் வந்தால் துணைக்குகளில் உடனே கரைந்துபோகின்றன. இரத்தக்குழல்களே இவைகளையும் முக்கியமாக உறிந்து கொள்ளுகின்றன.

(5) உணவாக உட்கொள்ளும் பானவகை திரவங்கள், அநீரவது தண்ணீர், காராயம், களரு, தேயிலை முதலிய வஸ்துக்கள் இரைப்பையிலேயே தேகத்தில் உறிந்துகொள்ளப்படும். அப்படியாகாமல் கொஞ்சம் நின்றால் துணைக்குகளில் வந்தவுடனே உறிந்துகொள்ளப்படுகின்றன. குடலிலிருக்கும் வஸ்துக்கள் திரவரூபமாபி ரூப்பதற்குக் காரணம் அதில் விடாயம் பொதியும் திரவங்களால்லாமல் இரைப்பையினின்று வந்த சிவமவேது அல்லது

குடலில் முதல் புசிபும் திரவங்களாவது அதிக காலம் உறிந்துகொள்ளப்படாமல் நிற்கிறதினால். இதனினும் ஏற்படும் விஷயமென்னவென்றால் குடலினின்று திரவத்தை இரத்தம் இழுத்துக்கொள்ளுகிறதும் இரத்தத்தினின்று குடற் கோளங்கள் மறுபடியும் திரவத்தைப்பெற்று பொசித்துக்கொண்டிருப்பதிலும் ஒருவித திரவச் சுழலேக் காணலாம்.

சிறுகுடலின் கடைசியிற் சேரும்பொழுது அன்னப்பாரு மெல்லியதாயும் கொழுகொழிப்புள்ளதாயுமிருக்கும். கொஞ்சம் மட்டுப்பட்ட மஞ்சள்வண்ணமாயும் நன்றாய் மலநாற்றமடைந்தும் இருக்கும். இந்த ஸ்திதியில் பெருங்குடலுக்கு இலியோசீக்ஸ் துவாரத்தின்வழியாகப் போய்ச் சேருகின்றது.

பெருங்குடலில் உண்டாகும் சீரணத்தொழிலின் சங்கீரகம்.

அன்னப்பாரு சிறுகுடல் நன்றும் பெருங்குடலுக்குப் போனபிறகு நடக்கும் சீரணத்தொழிலும் சிறுகுடலில் நடந்ததுபோன்றதாகவே இருக்கவேண்டுமென்று உத்தேசித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இக்குடலில் வில்லையிலையாகையால் கொழுப்பு வஸ்துக்களின் சீரணமாதிரி சிறுகுடலிலேயே முடிவுபெற்றிருக்கவேண்டுமென்று தெரிகின்றது. ஆயினும் பெருங்குடற் சீரணத்தில் அன்னப்பாரு வரும்தொழுது திரவமுடைய பாருபோலிருக்கிறபடியால் திரவ வஸ்துவெல்லாம் உறியப்பட்டு சீரணம் முடியவில்லையென்று மாதிரி நன்றாய்த் தெரிகின்றது. தவிர பெருங்குடல் வந்து சேர்ந்த கொஞ்சகாலத்திற்குப்பிறகு உணவு வஸ்துக்களிலோ அல்லது குடல் திரவங்களிலோ அல்லது இவ்விரண்டிலுமோ பூதிக மாறுபாடல்கள் நடக்கிறதென்றும் தெரிகின்றது. குறிப்பிடக்கூடிய தூவாசனை குடலிலிருக்கும் வஸ்துக்களுக்கு உண்டாகிறபடியால் பெருங்குடலில் விசேஷமாய் பிரத்தியேகமான சீரணத்தொழில்கள் நடக்கிறதென்பதற்கு யாதொரு காரண

அதில்.]

மலத்தின் கூட்டுப்பாடு.

219

மும் காணப்படவில்லை. சிறுகுடலில் சீரணமாவதற்கும் உறியப்படுவதற்கும் தப்பிப்போன பாகங்கள் யாதாவது இருக்குமாகில் அது இவ்விடத்தில் சீரணமடைந்து ஸ்ளீக் ரித்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. இப்படிச் செய்ய பெருங்குடலுக்கு சக்தியிருக்கிறதென்பதுமாதிரி சில பரிசைசகளால் வெளியாயிருக்கிறது. ஆயினும் சாதாரணமாகப் பெருங்குடலில் நடக்கும் சீரணத்தொழிலெல்லாம் அன்னப்பாரு மிகுந்திருக்கும் திரவத்தை முழுதும் உறிந்துகொண்டு நடந்துவந்த சீரணத்தை முடிவுபெறச்செய்வதாகும். இத்தொழில்புரிய பெருங்குடலிலும் குழாய் போன்ற கோளங்கள் பொசிவதால் திரவம் உண்டாகின்றது.

இத்தப்படி சீரண முடியவும் பெருங்குடலில் மிகுந்திருப்பவை போகப்போக கட்டியாகி அவைகளிலிருக்கும் போஷிப்பு வஸ்துக்களையும் திரவத்தையும் இழந்து, மலத்தின் நாற்றத்தையும் பிரமாணத்தையும் அடைந்து மலக்குடலுக்கு (Rectum) வந்து சேருகின்றன.

கோலன் குடலில் சிஜிமாப்டே பிலேக்கர் என்னும் வளைவான பக்கத்தில் அல்லது மலக்குடலில் சொல்பகாலமிருந்து, பிறகு குடலின் சதைச் சொக்காய் சுருங்குவதால் கடைசியாக அவைகள் வெளியே தள்ளப்பெருகின்றன. இப்படி வெளிவருவதில் சாதாரண சமயங்களில் உதரச்சதைகளும் ஒத்தாசைபுரியும்.

கட்டியான மலம் தினசரி ஒரு செளக்கியமுள்ள மனிதனினின்று வருவது சுமார் ஆறுமுதல் எட்டு அவுன்சுக்குமென்று நோந்துகிறது. இதில் ஒரு பாகம் சீரணமாகாமல் பூதிக மாறுபாடல்களுடன் கூடிய உணவும் மற்றொரு பாகம் குடல்களில் விசாரணஞ்செய்யப்பட்ட சில வஸ்துக்களுமேயாம்.

மலத்தின் கூட்டுப்பாடு.

தண்ணீர்

733.00

வைரவஸ்துக்கள்

267.00

விசேஷ விசாரணை வஸ்துக்கள்:—

(Excretin, Excretoric and Stercorin.

உப்பு வகைகள்: phosphate of magnesium, phosphate of calcium, iron soda, lime and silica.

உணவின் சீரமைப்பைப் பார்த்து வஸ்துக்கள்: முக்கியமாக கஞ்சிப்பொழிகள், மரத்தரசு, முருந்து நார்த்தரசுப் பொழிகள், சீரணமாக்காத சதை நாரர்கள், கொழுப்பு இவைபோன்ற இன்னம் சில வஸ்துக்கள் ஏதாவது உணவுடன் உட்சென்றிருக்குமாயின் அவைகளும்;

சிலேஷ்மம், பரிஸ்தாபிதம், பித்தரீரின் வர்ணவஸ்து மாறுபாட்டைத் தவறுகள், கொழுப்பு புளிப்புக்கள் &c., பித்தரீரின் மற்ற கூட்டுப்பொருள்களும் அவைகளையுண்டாக்கும் வஸ்துக்களும்)

267-00

உணவின் ஒருவகைத் தரகம் இரைப்பையினின்று அபரணத்திற்குவசிக்கெல்லாம் கால அளவு ஸ்திரமாயிரியப்படவில்லை; சிலர் உண்ணிரண்மெணி நேரத்தில் சிறு குடலிற் போகுமென்றிருக்கின்றனர். வேறுசிலர் பெருங்குடலிற் போக இருபத்தாறு மணிகேரம் முதல் முப்பது மணிகேரம் போகுமென்றிருக்கின்றனர்.

மலபாத

இச்சாபூர்வமாய் மலம் வெளியே தள்ளப்படுகிறது. குருந்தி சாதாரணமாக முதலில் இருமல், தம்பல், வாந்தி.

அத்தி.] இரைப்பை, குடல் இவைகளிலுள்ள வாயுக்கள்.

221

இவைகளில் இருப்பதுபோலவே ஒரு கிஸ்வரகம் இருக்கின்றது. கிருக டூபின் அதற்குப்பிறகு முடப்படுகிறது. விதானம், வாந்தியிலிருக்குமாதிரி கட்டுக்கொள்ளுகிறது. ஆனால் இதில் கிருகவாயில் துவாரமும் (Roma glottidis) இரைப்பையின் இரத்தாசய வழிவாயிலும் முடிக்கொள்ளப்படுகின்றன. மலக்குடலின் சுருக்குச்சுதைகள் (sphincter) விரிந்து அதிலுள்ளவைகள் வெளியப்படுகின்றன. இப்படி தள்ளப்படுவதின் விசையும் அதன் கவறியின் சுதைச்சுருக்கத்தாலும் நெகிழ்ந்தாலும் தன்மைமாலும் அதிகரித்திருக்கும். இப்பொழுது எதித்துக்கொண்டியம் மற்ற செயல்களில் உள்ளபடியே இதிலும் துவாரியால் இரைப்பை இவைகளிலுள்ளவைகளும் வெளியப்படும்படியான வேறுதல்களிருக்கின்றன. ஆயினும், சபாவமாயும் அனிச்சாபூர்வமாயும் குருந்தின் சுருக்குச்சுதைகள் விரிவதனால் வேகம் அற்றுப்போகிறபடியால் இவைகளில் உள்ளவை வெளியாகிறதில்லை.

இரைப்பை, குடல் இவைகளிலுள்ள வாயுக்கள்.

சாதாரணமாக அன்னப்பசன்குறையில் எப்பொழுதும் பெருந்த அளவு வாயுக்கள் இருக்கின்றனவென்பது தெரிந்தவிஷயமே. பிசேத பரிசுஷங்களில் குடல்களை அறுப்பதினாலும் அல்லது வாயுக்களை வெளியப்படுத்துவதாலும் குடல்கள் எவ்வளவாகச் சுருங்கிப்போகின்றனவென்பதைப் பார்த்தால் வயிற்றின் குழியை கிணறும்படிச் செய்துகொண்டிருப்பது வாயுக்களென்றறியலாம். ஆனால் இவைகளின் பயன் இன்னதென்று அறியப்படவில்லை.

வாயுக்கள் இரைப்பையிலும், குடல்களிலும் உண்டாகும் காரணங்களை ஒருவாறு யின்வருமாறு சொல்லலாம்.

1. உணவையும் உமிழ்வுகளையும் உட்சென்றும்பொழுது செல்லும் காத்து.

2. உணவு வஸ்துக்கள் அல்லது உணவுடன் கலக்கும் பொசிப்புகளும் அவைநின்ற பிரியும் விசர்ஜனங்களும் பூகிகப் பிரிவினையடைவதில் உற்பத்தியாகும் வாயுக்கள்.

3. துரையிரல்வழியாய் உட்கொள்ளும் காற்று; தவிர அன்னபசனக் குழலின் மேற்பாகத்தில் உட்கொண்ட பல வித வரசுகள் முதலியவஸ்துக்கள், அக்குழலின் அடிப்புறத்தில் வெளிவருகிறதென்றும் தோன்றுகின்றது. வரும் வழியில் வாயுரூபமாய் அவை மாறவும்கூடும்.

அன்னபசனக் குழலில் இருக்கும் வாயுக்களின் ஜாபிதா.

	எவாச உப்பு		கரி ஜல		கெந்த	
	வாயு.	வாயு.	வாயு.	வாயு.	வாயு.	வாயு.
இரைப்பை	11	71	14	4	...	...
சிறுகுடல்	...	32	30	38	...	...
பெருங்குடல்	மேல்	...	66	12	8	13
	கோலன்	...	35	57	6	8
	மலக்குடல்	...	46	43	...	11
குதத்தில் தள்ளப்படுவது	...	22	41	19	19	1

மேற்கொள்ள ஜாபிதா பல பரிசைகளின் சராசரி உத்தேசமாகும்.

குடல்களின் அசைவுகள்.

உணவும் உணவுடன் கலக்கும் பல உணற்றங்களும் குடல்வழி எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தள்ளப்பெற்று குடல்திரவங்கள் உணவின் பாகங்களை நன்றாய் பசுனம்செய்கிறதென்பதைப்பற்றிச் சொல்லுவோம். குடலின் சவுனம் ஒன்றின்பின் ஒன்றாக விருத்தத்திலசைவுடையது. அதாவது புழுநிலையசைவாகும். இது உண்டாகும் விதமென்னவென்றால், குடற் செரக்காய்கள் ஒருபாகத்தினின்பின் அதிகத் பாகமாக படிப்படியாய் தொடர்ந்து சுருங்கி விரியும் தன்மையுள்ள அசைவாகும். குடலின் ஒருபக்கத்திலுண்டாகும் சுருக்கம் கடலைகளிப்போல குடல்முழுதிலும் விரியாதிக்கும். முதலில் ஒரு கொடுத்த

டத்தில் நீளத்திலிருக்கும் குறுக்குச்சு நகர்ச்சை அடிகமாய்ச் சுருங்கும். அப்படிச் சுருங்குவதால் அந்தபாகத்தில் குடல் கொஞ்சம் மேலுக்கு முத்துக்கொள்ளப்படும். அப்பொழுது அவ்விடத்தினின்று தள்ளவேண்டிய வஸ்துக்களுக்குப்பின் அந்தபாகம் படும். பிறகு விருத்தநார்கள் படிப்படியாய் மேலின்மேல் மேலுக்கு சுருங்கும். அதாவது வஸ்துவை பின்னாக்கமிருந்து முன்னாக்குத் தள்ளும். இப்படி படிப்படியாய் தள்ளப்பட்டுவரும். இந்த அசைவுகள் அதிக நிராமாய் உண்டாகின்றன. தேகசவுக்கியகாலத்தில் மனதிரு தெரியமாட்டாது.

குடல்களினசைவு சிலசமயங்களில் பிள்ளைக்கிடபுருக்கும். சிறுகுடலின் பிள்ளைக்கிய அசைவுக்கு யாதாரு தடையும் காலுக்கிறதில்லை. ஆனால் பெரியகுடல் பிள்ளைக்கி அசைவதால் அதன் உள்வஸ்து சிறுகுடலுக்கு வராமல் இலியோசிகல் கபாடம் காத்துக்கொள்ளுகிறது.

பெரியகுடலின் தசைநார்கள் போகப்போக அதிக பலமானதாகின்றன. மலம் கட்டியதும்மளவுக்குத் தக்கது. அதைத்தள்ள இந்த நகர்த்துக்கும் பலம் வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகையால் நர்தன் கிரமேன பலமதிகமடைந்து மலக்குடலில் அதிக பலமுள்ளவைகளாயிருக்கின்றன. மலக்குடலின் முடிவில் விருத்தசுசதைநார்கள் அதிக பலமுடையவைகள். சுயர்போலிருக்கின்றன. தற்கு உட்பக்க சுருக்கச்சதை பென்றுபெயர் வெளிப்படுத்திலும் சதைநாரச் சுருக்கம் பலமானதாய் இருக்கின்றது. இது துவாரத்தை பிசுவுடன் முடிக்கொண்டிதற்கு முள்ளந்தண்டிக்கொடி நரம்பு உதவுகின்றது.

குடல் சீரணத்தின்மேல் நரம்புமகூடலத்திற்கிருக்கும் சக்தி.

அன்னவாகி இரைப்பை இவைகளின் அசைவுபோலவே குடலின் செலிவும் குடல்கவறலிலிருக்கும் நரம்பு

வேர் முதிகள் ன் இவைகளின் பிரதிபலனைச் சொல்லால் உண்டாகின்றது. அன்னப்பாகு உத்திபன காரணமாக அமைகின்றது. அன்னப்பாகறது குடல் ஒன்றுமில்லாமலிருந்தால் நெகிழ்மில்லாமலிருக்கின்றது. இரைப்பைக்கு பின்னால் செல்லும் (splachnic) நரம்பு முதலிய பெரிய நரம்பு-மத்தியங்களுடனும் குடல்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன.

ஒற்றணர்வு நரம்புகளின் திளைக்குடனும் உதாரணமாக முதலியவற்றின் வலைகளினின்றும் வரும் இரைப்பைப்பின்னரம்புகளால் குடல் அசைவு நிகழப்படும. குண்டமுடையதாயிருக்கும் இரைப்பைப்பின்னரம்பு உத்திபனமானால் அசைவு நிகழப்போகும. குடலிலிருக்கும் குழல் கோயடுத்த நரம்புகள்மாதிரியே இரைப்பைப்பின்னரம்புகளும் குடல் திசை விஷயத்தில் அதிகமாய் தொழில்புரியும் நரம்புகளாகும்.

10-ம் அத்தியாயம்.

சோஷலம்.

சோஷலத்தொழில் விளங்கும்விதம் இருவகையுடையது. உணவின்னதும் காற்றின்னதும் இன்னும் சேகத்தக்கு வெளிப்பாட்டிலாவது அல்லது உட்புறத்தின் பரப்பிலாவது எனவ இவைகள் தொடுகின்றனவேர் அவைகளினின்றும் புதிய வஸ்துக்களை இரத்தத்தில் சேர்த்துவது ஒருவகையாகும். சோஷலத்தினுலேதான் தேகத்தில் எந்த பாகங்கள் தங்கள் தொழிலை முடித்த பிறகாவது அல்லது புதுபிக்கவேண்டிய ஸ்திதியிலிருந்தாவது அப்பாகங்களை தேகத்தைவிட்டு நீக்குவதுமாகும். இதுதான் அதின் இரண்டாம்வகை. இவ்விரு தொழில்களிலும், அதாவது வெளியினின்று சோஷித்துக்கொள்வதும் உட்புறத்தினின்று சோஷித்துக்கொள்வதும் சில வேறுபாடுகளுடன் காணப்படும். இத்தொழில்புரிய

தேகத்தில் விஸ்தாரமாய் நடந்துவருகின்றது. இவ்விண்ணிலும் இருஜதைக் குழல்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். அவையாவன இரத்தக்குழல்களும் நிணநீர்க்குழல்களாகும். நிணநீர்க்குழல்களுக்குமாதிரம் சோஷனா பாதகிரங்கள் என்று பெயர்.

இசாயனிய நிணநீர்க்குழல்களும் கோளங்களும், இவைகளின் கட்டடமும் தொழிலும்.

நாடிநாளங்களும் அவைகளின் மத்தியிலிருக்கும் தற்கிகளும்ல்லாமல் மனிதனிலும் மற்றும் முள்ளத்தண்டு உடைய பிராணிகளிலும் நிணநீர்மண்டலக்குழல்களும் இருக்கின்றன. அவைகளில் உள்ள திரவத்திற்கு நிணநீர் என்று பெயர். இவ்விருவகைக்குழல்களும் சோஷனத்தில் தொழில்புரிகின்றன.

நிணநீர் மண்டலத்தின் குழல்கள் ஈட்டடத்திலும் ஈர்வாக்கும் சிறிய மெல்லிய சுவற்றையுடைய நாள்களையோலவிருக்கும். நாள்களையோலவே இவைகளினின்றும் கபாடங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு முடிவில் அவைகள் அதிக தட்பமான நிணநீர் சத்துகிகளாக தேகத்தில் கல பாகங்களினின்றும் தசைகளினின்றும் உற்பத்தியாகி, மற்ற முடிவில் அவைகள் ஒன்றுடனொன்றுச் சேர்த்து இரண்டு முண்டங்களாக கடைசியில் இரத்தாசயத்திற்குவிருக்கும் பெரிய நாளங்களின் போயச்சேருகின்றன. இக்குழலினுள் இருப்பவைகளுக்கு நிணநீர் என்றும் அன்னசம் என்றும் பெயர். இவைகள் இரத்தம் போலச் சமுலாமல் ஒரு திசைகோக்கிப்போய், அதாவது சிவ குழாய்களினின்று பெருத்த முண்டங்களில் இருந்து நாளங்களையடைகின்றன. அவ்விடத்தில் அவைகள் இரத்தத்துடன் கலந்து, இரத்தத்தின் கட்டடப்பாடாக ஆய்விடுகின்றன. நிணநீர்தாரணங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து பெரிய முண்டமாகிய ரத்தாரையில் விழுந்து அது இடதுபக்கத்திலிருக்கும் அந்தக்கண்ட நாளங்களும் தோள் நாளமும் கலக்குமிடத்தில் இவைகளுடன்

சேருகின்றது. வலதுபக்கத்தில் ஒரு சிறிய முண்டமு இருக்கின்றது. குடல் குழாய்ச் சேர்ந்த நிணநீர்த்த ரைகளுக்கு இரசாயனிகள் பென்று பெயர். இரசவாஹ்னிகளை இக்கிவிஷில் சுடராய்கினை என்பார்கள். ஏன் எனில், சிரண்காலத்தில் இவைகளிலிருக்கும் திரவம் பாலபோலத் தோற்றமுடையதாகிருக்கின்றது. இரசாயன்களில் சிரண்காலத்திலிருக்கும் நிணநீருக்கு அன்னரசம் எனும் பெயர். ஆரினும் ரசதானைகளுக்கும் நிணநீர்தானைகளுக்கும் விசேஷ விக்தியாய்வுகள் கிடையாது. நிணநீர்த்தானைகளின் போக்கில் எவ்விடத்திலாவது நிணநீர்க்கோளங்களை தாண்டிப்போகும்.

தேகத்தி னெல்லாப்பாகங்களிலும் நினைநீர்த்தாசை
கள் பாயியிருக்கின்றன. ஆனால் அவைகள் கருப்பையைச்
சுற்றியிருக்கும் Placenta பையிலும், தொப்புள் கொடி
யிலும், காதத்தின் சவ்வினும் (membranes) குழாய்ச்
சவ்வினும் உள்ள சுகங்களிலும், மேல்தோலிலும், மயிர்
களிலும், இவைபோன்றவைகளிலும் இன்னம் கண்டுபிடிக்கப்
படவில்லை.

நிணநீர் தகடுகிகள் அநிக நெருங்கமாய் அமைந்த
ருக்கும் வகைக்கட்டங்களிலும் அல்லது ஒவ்வொரு க
வியிலும் வேறு வேறு கட்டங்களின் மத்தியிலுள்ள ப
ளத்தாக்குபோன்ற இடங்களிலும் உற்பத்தியாகின்றன
அனேக தகைகளில் இப்படிப்பட்ட பள்ளத்தாக்குபோ
ன்ற இடங்களுக்குக் கிறதென்று இப்பொழுது கண்டுபிடி
திருக்கிறார்கள். இதற்கு நிணநீர்த்தாரை மண்டலமென்
னும் பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். மேற்கூரை (omentum)
(மேதோவுதரம்), மணிகுடல் மத்தியாக்ர இவை முத
லிய நிணநீர் சவ்வுகளில் இவைகள் ஒழுங்கற்ற பலவி
த்டங்களையதாக (விஸ்தீரணமுடையதாக), க்கானும்
இவைகளில் உற்பத்த தகைச் சாஸ்கள் இருக்கின்றன
இவைகளினின்றும் இன்னுமற்றனோ தகைகளினின்றும்
நிணநீர் தாரைகளுக்குப் போய் கலந்துகொள்ளுகின்றன

நினை கோளநீர் தந்துகிகளின் ஈட்டடம் இரத்தத் தந்துகி
களின் ரளங்குட்டடம்போல, தநாநிருக்கோது. அவைகளின்
சுவர்கள் புகளின் தெமெலலிபுதரிய காலங்கோடிடையனவாயிரு
க்கின்றன. வெளிப்புறப்பார்வைக்கு தனையநாப்பேரலக்கா
னும் இந் தந்தத் தந்துகிகளோட இவைகளில் குழல் துவா
ரம் அகிரைகள் பெரியதாயிருக்கும். அதுவும்ல்லாமல் இரத்
தத் தந்த காலங்குடிகளின் போகாத இடக்கவரைய நினைநீர்த்தாரை
மண்டலமாமற்றது. இவைகள் பரவியிருக்கின்றன.

நிணைநீர் முள்ள நீர் தந்துகிகளுக்கும் இரத்தநீர் தந்துகிகளுக்கும் சமமந்தப்படுத்தப் படுத்த வேறு குழாய்கள் இருக்கிறதா இல்லையா எனும் தந்தனைக்கம் நவீன பரிணைகளுள் ஏறபடும் விஷயங்க ளினின்று சிறியது பயவற்றவையாய்ப்போகின்றன. இரத்தத்தின் னுள் ப்புராவ் அம்சம் தந்துகி கலங்கவினுடே கதிந்து பக்கத் தநீர்ச் சதுத் தசைகளில் பாய்ந்து அவைகளை சுரப்படுத்துகின் ன்னர நனவென்றும், தசைகளுட் ப்பாடு மததய ஸ்தானங்களி லும் கிறைகின்றனவென்றும் ஸ்பஷ்டமாய் ஏறப்பட்டிருக்கி ன்றது. குருதிச் சூலங்களுள் இவ்வாறே சுவாகளினுடே துழைந்து வெளியில் வகுக்கின்றனவென்பதையும் இதுவ ரையிலெடுத்துக்காட்டியிருக்கிறோம். அவையால் இரத் தம் நிணநீர் தநாசை மண்டலங்களிலும் நிணநீர் சந்தாசை யின் மெலவிய சுறைநிலை தநாசையுட்பக்கத்துக்கும் பரவுகின்றதென்பது நிச்சயமாகின்றது.

இதுவரை யிலும் யாதொன்றும் உட்புக இடமுமில்
முடிய சில கருவிகள் பீதகத்திலிருக்கிறதென்று எண்ணி
யிருந்தார்கள். சில பரிசைஷகனால இக்கருவிகளுக்குள்
கிணர் செல்லக்கூடிய துவாரங்கள் இருக்கிறதென்று
இப்பொழுது கண்டிபிடித்திருக்கிறார்கள். இவைகளுக்கு
ஸ்டொமடா என்று பெயர்.

மதகிய பரிமாணமடைபவரும் பெரிபினைகளுமாயிய
மற்ற இரகவாழ்வானிகளின் குட்டிடம் நாளாகவரின் குட்டிடம்
பேலதத விருக்கின்றது இவைகளின் குறாடங்கனும்
நாளாகவரின் குறாடங்கனம் இரிகே குட்டிட முனைத்தா

னவைகள். இக்கபாடங்கள் இரத்தாசயத்தைப் பின்ன
திக்கில் துவாரங்களாக திரவம் செல்லத் திறந்
டையவற்றால் முடிக்கொள்ளும் தன்மையு
ளாகும்.

கபாடங்களின் உதவியால் நிணநீர்க்கு அடைபி
ரசவாஹினிகளும் சதை முகவியைகளின் ஈர்க்கி
னால் உள்ளிருக்கும் நீரை இரத்தாசயத்தை நோக்கி
ல்லுப்பித் தள்ளும். சிறுகுடல்களின் சுவற்றி
யினிகளும் சதைசுருக்கத்தால் அன்னரசும் ரசவா
க்கு வருகின்றது.

நிணநீர்க் கோளங்கள்.

நிணநீர்க்குழாய்களும் இரசவாஹினிகளும் முய
வழியில் எவ்விடத்திலாவது நிணநீர்க்கோளங்கள்
யாகவே செல்லவேண்டியிருக்கின்றன.

நிணநீர்க்கோளங்கள் சம்பந்தத் தசையினால் ஏற்பட்ட
பைகளால் முடப்பட்டிருக்கின்றன. கோளங்களின் கட்ட
த்தை இப்பைகள் தாங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. கோள
ங்களினுட்பக்கத்தில் கோளவஸ்துக்களைச் சுற்றிலும் இரு
வகை கட்டடங்களிருக்கின்றன. நார்களாலாகிய தூக்கு
களுக்கு stroma என்று சொல்லப்படும். வெளிப்புறத்
தூக்குக் கட்டடத்திற்கு trabeculae என்று பெயர். இக்
கட்டடத்தினுடே இருக்குமிடங்களுக்கு Alveoli என்று
பெயர். உட்புறத்திலும் ஒரு கட்டடமிருக்கின்றது. ஆல்லி
யோலையிலும், திரவிகுலைகளிலும் கோளவஸ்துக்களிருக்கி
றன. இக்கோளவஸ்துக்களில் Retiform tissue என்னும்
சம்பந்தத் தசைகளாலாகிய சிறிய வலைகளும் இருக்கி
றன. இவ்வலைக்கண்களில் நிணநீர்ப்பைகள் இருக்கின்றன.
இத்தசைநார்க்கும் வெளி கட்டடத்திற்கும் மத்தியில்
இருக்குமிடத்திற்கு நிணநீர் வழியென்று சொல்லுவா
ர்கள். இவ் வழியில் கோளமத்திய வழுக்கைக்குள் நிணநீர்
போகவும் வரவும் இயில் வழிகளிருக்கின்றன. இக்கோ
ளங்களிலுள்ள இரத்த தத்துவங்களும் போகின்றன.

அத்தி.]

உள்ளாக்குக் கோளங்களும், தொண்டைக்கோளங்
களும், குடல்கோளங்களும் இம்மாதிரி கட்டடங்களைப்
டையதாக இவைகளின் தொழில்போன்ற தொழில்களே
யும் உடைத்தாமிருக்கின்றன.

நிணநீர் அன்னரசத்தின் குணங்கள்.

நிணநீர்த் தாரைகளிலிருக்கும் திரவம் அல்லது
நிணநீர் சாதாரண காலங்களில் தெளிவாயும் ஒளி ஊடு
தற்க்கதாயும், வர்ணமற்றதாயுமிருக்கும். சில சமயங்களில்
மங்கின மஞ்சள்நிறமுள்ளதாயுங் காணும். இது வாசனை
யற்று இருக்கும்; இதற்கு புளிப்புணம் கொஞ்சமுண்டு.
உப்புருசியுமுடைத்தானது. அணுநரிசுளிக் கருவியால்
பார்க்குமிடத்தில் சிறிய குழல்களிலிருக்கும் நிணநீரில் சா
லங்கள் காணப்படமாட்டாது. பெரியகுழல்களில் மாத்
திரம் நிணநீர்ச்சாலங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் இச்சா
லங்கள் அன்னரசத்திலுள்ளதுபோல அதிகமாயிராது. நிண
நீர்ச்சாலங்கள் மிகக்கும் திரவம், சாதாரணமான தேக்கவு
க்கிய நிலைமைகளில் வெள்ளைக்கருசுத்தன்மைத்தகையிருக்
கும். இவைகளில் அப்பொழுது கொழப்புப்பொழுகளா
வது மற்ருமேதாவது வைரத்தன்மையுள்ள பொழுகளா
வது கலந்திருக்கிறதில்லை. ஆயினும் இரத்தத்தின் நிலை
மையைப்பற்றியும் நீர் உற்பத்தியாகும் கருவிமைப்பற்றி
யும் இதன் தன்மை வேறுபடும். இரசதாரையை நோக்கி
ப்போகும் வழியில் நிணநீர்க்கோளங்களை தாண்டியபிறகு
சில நார்கள் உற்பத்தியாகி தனக்குத்தானே உரையும் தன்
மையுடையதாகிவிடும். அப்பொழுது நீர்ச்சாலங்களும்
அதிகரித்திருக்கின்றன. குடலைச்சேர்ந்த நிணநீர்த் தாரை
களாகிய இரசவாஹினிகளிலிருக்கும் திரவம், உபவாச
காலங்களில் தெளிவாயும் ஒளியுடிகும் தன்மையுடைய
தாயுமிருக்கும். அப்பொழுது சாதாரண நிணநீரிலிருந்து
வித்தியாசமற்றிருக்கும். ஆயினும் சீரண்காலத்தில் பால்
மாதிரியாகிவிடுகிறபடியால் அதற்கு கீரரசம் (அன்ன
ம்) என்று பேர் சொல்லுகிறார்கள்.

அன்னரசமானது ஒளியூடுக்கூடாத வெண்மைநிறத் திரவமாகும். இது பால்போலக்காணும். இத்தன்மையுடனிருக்கும் காரணம் என்னவென்றால், இரசத்தில் அனைக கொழுப்பு அணுக்களும் எண்ணெயில்துக்கநுமிருக்கின்றனவாகவரலாகாது. இவைகள் மிகச் சிறிய அணுக்கள் தான். அங்குல குறுக்களவுடையவைகள். இவைகளுக்கு அன்னரசத்தின் வைரத்தன்மை அஸ்திபாரமென்று சொல்லலாம். (Molecular base) இவைகள் இருக்கும் எண்ணிக்கைகளும், அதனால் அன்னரசத்தின் ஒளியூடுக்கூடாத தன்மையும் உணவினிருக்கும் கொழுப்பு வஸ்துக்களைப் பொருந்தியிருக்கும்.

இவ்வணுக்களில் எண்ணாவஸ்து இருக்கின்றது. ஆய்வும் இவ்வணுக்கள் எண்ணே அணுக்கள் போல ஒன்றுடன் ஒன்று பக்கத்துக்கு வருவதால், கலக்காமலிருக்கிறபடியால் உள்ளிருக்கும் எண்ணையணுக்கள்மேல் வெள்ளைக்கரு சம்பந்த வஸ்துக்கள் போராவையுடையவைகள் என்று தோன்றுகிறது. இந்த அணுக்களல்லாமல் அன்னரசத்தில் வேறு வைரத்தன்மையுள்ள வஸ்துக்கள் கிடையாது. அணுக்கள் மிகவும் நெருங்கிவைக்கிருக்கின்றன. தனிக்குத்தானே உரையும் சக்தியற்றது. இரசதாரையருகில் போகப்போக அன்னரசம், முக்கியமாக மணிக்ருடல் மத்தியமாகக் கொள்ளக்கூடாது. தான்முன்பிறகு இருத்தலடைகின்றது. அணுக்களும் எண்ணெயிலைகளும் பிரமேண குறைந்து போகின்றன. அன்னரசச்சாலங்கள் என்று பெயர் வழங்கும் சரலங்களும் உற்பத்தியாகிவிடுகின்றன. நார்களும் உற்பத்தியாவதால் தனக்குத்தானே உரையும் தன்மையையும்டைகின்றது. இரசதாரையில் அன்னரசம் செல்லச் செல்ல இம்மாதிரியானவை அதிகமாகப் பெறுகின்றது. அன்னரசச்சாலங்கள் விருத்தியாகி பெருப்பதால் அதன் உரையும் தன்மையும் நுகரிகின்றது. அப்படியுரையும் கட்டியும் இரத்தமுறைந்த கட்டியைப்போலவேயிருக்கிறது. ஆனால் இதில் சிலந்த சரலங்கள்மாதிரம் கிடையாது.

அன்னரசச்சரலங்களோமாதிரம் செருக்கிக்கொண்டிருக்கும் நிணநீர்மேல் கொழுப்பு வஸ்துக்கள் வெண்மை நிறமாகி ஆடைபோல மிதக்கும். அன்னரச உரைகட்டி இரத்த உரைகட்டியைவிட அதிக மிருதுவாயும் ஈரமுள்ளதாயுமிருக்கும். இரத்தமாதிரியே அன்னரசமும் அதன் குழல்களில் அதிக காலமுரையாமலிருக்கும். குழலை விட்டு வெளிப்படுத்தினால் சீக்கிரம் உலரத்துபோகின்றது.

அன்னரசச்சரலங்களின் கட்டிடங்களைப்பற்றி வெண்குருதிச்சரலங்களை விவரித்தபொழுதே சொல்லியிருக்கிறோம். வெண்குருதிச்சரலங்களுக்கும் இவைகளுக்கும் கட்டிடத்தில் வித்தியாசம் கிடையாது.

இப்பொழுது சொல்லிய சங்குகளால் அன்னரசத்திற்கும், நிணநீருக்கும் விசேஷ வித்தியாசங்களில்லை. பெரும்பாலும், தன்மையில் இவை இரண்டும் ஒன்றாகியவென்று மறியலாம். ஆனால் நிணநீரைவிட அன்னரசத்தில் அதிக மாயுள்ளதெல்லாம் என்னவென்றால், கொழுப்பு வஸ்துக்களே.

பூதிப்பிரிவினையில் அன்னரசத்திலுள்ள வஸ்துக்களுக்கும் நிணநீர் வஸ்துக்களுக்குமிருக்கும் பேதாபேதங்களைப் பின்வரும் ஜாபிதாவில் காணலாம்.

கழகையை பரிசுத்தித்தேடித் தர்ப்பு.

	அன்னரசம்	நிணநீர்.
தண்ணீர்	90.237	96.536
வெள்ளைக்கருச்சத்து	3.516	1.206
நார்வஸ்து	0.370	0.120
பிராணிசத்துக்கள்	1.565	1.559
கொழுப்பு வஸ்துக்கள்	3.601	கொஞ்சம்
உப்புக்கள்	0.711	0.585
	100.00.	100.00.

தூதிரையின்னும் எடுத்த ஜாப்தா.

நினைநீர். அன்னரசம். இரத்தம்			
நண்ணீர்	950	935	810
காலங்கள்	...	4	92.8
வெள்ளைக்கருக்கத்து	39.11	31	80
நார்வஸ்து	...	0.75	2.8
பிராணிசத்துக்கள்	4.88	0.25	5.2
கொழப்புவஸ்து	0.09	15	1.55
சுண்ணாம்புத் தன்மைமுள்ள உப்புக்கள்	5.61	7	6.7
பிராணிகளால் தன்மைமுள்ள சுவடுபுப்பு, சுவாசுவாயு கலந்த அயம், கீழ்	0.31	1	0.95
	1000	1000	1000

இரசவாஹினிகளின் சோஷணம்.

குடலில் அன்னப்பாகு போகும்பொழுது அதில் பூரணமாக சீரணமான பாகங்கள் சிலேஷமச்சவ்வில் பரவியிருக்கும். இரத்தக்குழல்களாலும் இரசவாஹினிகளாலும் சோஷித்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. இரத்தக் குழாய்கள் உணவிலமரிக் கறைந்துபோன பாகங்களை மாத்திரம் உறிஞ்சுகின்றன. இவைகளுள் முக்கியமாய் வெள்ளைக்கருத்து வஸ்துக்களும், சர்க்கரைவஸ்துக்களும் அடங்கியிருக்கின்றன. இரத்தத்துடன் எவைகள் எல்லாம் கலந்து போகக்கூடியவைகளோ அவைகளெல்லாம் குழல்களுக்குள் போய்ச் சேருகின்றன. சேரும்விதம் பின் சொல்லப்படும். இரசவாஹினிகள் முக்கியமாய் கொழப்பு வஸ்துக்களையும் இன்னும் உணவிலுள்ள சில வஸ்துக்களை மாத்திரம் உறிஞ்சிக்கொள்ளுகின்றன. சிறுகுடலினிருக்கும் வஸ்துகள் சிலேஷமச்சவ்வில் அநிதாட்பமான குழல்தன்மையுள்ளவைகள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் இரத்த தத்துக்களும் இரசவாஹினிகளும் இருக்கின்றனவென்று சொல்லியிருக்கிறோம்.

னிகளும் இருக்கின்றனவென்று சொல்லியிருக்கிறோம். இவைகளைச் சமயி ஸ்தம்பாகா பரிஸ்தாபி முயிருக்கிறதென்னும் சொன்னோம். வில்லையே மத்தியிலும் சிறுகுடல் முழுவதிலுங்கூட இரத்த தத்துக்களும் இரசவாஹினிகளும் நிரைந்திருக்கின்றன. கொழப்பு வஸ்துக்கள் சோஷணப்படுவது சிறுகுடலில் சீரணகாலத்தில் உண்டாகின்றது. வில்லையே போர்த்துக்கொண்டிருக்கும் பரிஸ்தாபி தத்தாலும் சிறுகுடற் கவற்றில் இருக்கும் பரிஸ்தாபி தத்துமே இரத்தத்தொழில் புரியப்படுகிறதென்று உத்தேசிக்கிறார்கள். பரிஸ்தாபிதச் காலங்களினின்று பிறகு இவ்வஸ்துக்கள் இரசவாஹினிகளுக்குப் போகின்றனவென்று தோன்றுகின்றது.

சவ்வை காரவஸ்துவுள்ள இரத்தத்தில் நனைத்தால் அச்சவ்வினுடே எண்ணை சிக்கியது இறங்குகிறதென்று காண்பித்திருக்கிறார்கள். பித்தரீர், கணையர், குடல்பொசிப்புள்ள, இவையெல்லாம் உறிஞ்சிக்கொள்ளும் பரிஸ்தாபி தத்தின்மேற்படடி அது சமயிருக்கிறபடியால் எண்ணை அநிதுடே சிக்கிய நரகித்துக்கொள்ளப்படுகின்றது.

நினைநீர்தான்ரகின் சோஷணம்.

இரத்தக்குழல்களினின்று இரத்தநீர் பக்கத்துச்சுவர்கள் வழியாகக் கசிந்து அநிருக்கிறதென்று கதைகளில் பரவிகிறதென்று கண்டிருக்கிறோம். ஆகையால் நினைநீர் அவ்விரத்தநீர்தான் என்று தெரிகின்றது.

இரத்தக்குழாய்களாலுண்டாகும் சோஷணம்.

இரத்தத்தொழிலுக்கு நாளங்களின் சோஷணமென்று சாதாரணமாய்ச் சொல்லுவார்கள். அதன் காரணமென்னவென்றால், சோஷித்துறிஞ்சிக்கொண்ட வஸ்துக்கள் சாதாரணமாய் நாளங்களில் காணப்படுகின்றன. ஆயினும் அப்படி காணுவதற்குக் காரணம் வஸ்துக்களை எந்தக் குழல்கள் உறிஞ்சிக்கொண்டபோதிலும் இரத்தச்சமயில் அவைகள் நாளங்களுக்கு வந்துவருகின்றன. அதுவுமல்லாமல் இரத்த தத்துக்களால்தான் சோஷணம் விசேஷமாய்ச்

செய்யப்படுகின்றது. இதல்லாமல் நாளங்களின் சுவற்றுக்கு நாடி-தந்துகிகளின் சுவற்றைவிட சோஷித்து உயிஞ்சும் தன்மை யதிகமாயிருக்கிறதென்று எண்ணக்கூடாது.

நிணநீர்த்தாரைகளும், இரசவாஹினிகளும் உயிஞ்சுவதில் சில வஸ்துக்களைமாத்திரம் கிரகித்துக்கொள்ளுகின்றனவென்பதைக் கண்டோம். இரத்தக்குழல்களோ அப்படியல்ல. விவவஸ்துகளில்லாமல் வரபுருபமான வஸ்துக்களானாலும், திரவரூப வஸ்துக்களானாலும், இன்னம் வைரவஸ்துக்கள் சுவற்றின் ஊடே போகக்கூடியதாய் அவ்வளவு துட்ப அணுக்களாயிருந்தாலும் சரி, இரத்தத்துடன் கலக்கும் தன்மையுள்ளதாயிருந்தால் அனைவரும் எல்லாவற்றையும் இரத்தக் குழாய்கள் கிரகிக்கும்.

ஒரு பாத்திரத்தில் உப்புநீரைவிட்டு வாயை ஒரு சேவியால் மூடித் தண்ணீருள்ள வேறொரு பாத்திரத்தில் ஆழத்திவைத்தால் உப்புத்திரவத்தில் கொஞ்சம் வெளி பாத்திரத் தண்ணீருக்கும், வெளி பாத்திரத்தின் தண்ணீர் உட்பாத்திரத்திற்கும் செல்லுகின்றது. அதேமாதிரியாகவே துணிக்குப் பதிலாக ஒரு சவ்வை கட்டிவைத்தாலும்கூடும், திரவம் இம்மாதிரி சவ்வினுடே செல்வதற்கு ஆஸ்மாஸிஸ் பிரகாசியம் (Osmosis) என்கிற பெயர் விளம்புகிறார்கள்.

இதேமாதிரியாகவே ஜீவ தேசத்திலும், இரத்தக் குழல்களின் சுவர்கள் வழியாய் திரவங்கள் ஊடுருவிச் செல்லும் தன்மையுடையதாயிருப்பதிலும், இரத்தம் தன்னுடன் செரும் திரவங்களுடன் எளிதில் கலக்கும் குணமுடையதாகையாலும் இரத்தக்குழல்களால் சோஷணவேலை நட்கூறுவருகின்றது. இச்சோஷணத் தொழிலையறிபவெண்டுமானால் இன்னொருவிதத்தாலும் காணலாம். தேகத்தினின்று வெட்டியெடுத்த இரத்தக் குழல்களுடைய தசைக் கட்டியை ஒரு தண்ணீருடைய பாத்திரத்தில் போட்டால் கட்டி சேக்கிரத்தில் உப்பும், முன்பி

ருந்ததைவிட அதிக பருவாயும் நரமுள்ளதாயுமாய்விடும். இதற்குக் காரணம், அது தண்ணீரில் ஊறுவது தான். அப்படி ஊறுவதால் தண்ணீர் அதில் கொஞ்சம் சேர்த்துவிடுகிறது. அந்தத் தசைக் கட்டியின் இரத்தக் குழாயிலுள்ள இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தினால் அந்த இரத்தம் தண்ணீர் கலந்ததாகக் காணும். இதில் அதிக மாயிருக்கும் தண்ணீரெல்லாம் அந்த இரத்தக்குழல் சுவற்றுமுலமாக உள்ளிருக்கிறங்கி இரத்தத்துடன் கலந்ததாயும் பாத்திரத்திலிருந்தும் தண்ணீரும் இரத்தம்பட்ட தாயிருக்கும். தசைக் கட்டி தண்ணீரில் எவ்வளவுநேரமிருக்கிறதோ அதற்குத் தக்கபடி தண்ணீரில் இரத்தம் சேர்ந்திருக்கும். இந்தத் தசையை தண்ணீருக்குப் பதிலாக வேறு எந்த திரவத்திலாவதனாலும் இதுபோலவேகான் ஆகும். உதாரணமாக வரணவஸ்து திரவத்திலாவது அல்லது வாசனையஸ்து திரவத்திலாவது வைத்தால் இரத்தம் அந்த வர்ணத்தையாவது, வாசனையையாவது கிரகித்துக் கொள்ளும். இரத்தமும் திரவத்தில் இறங்குகிடும்.

இதேமாதிரியாக வாயுவுக்கனும் இரத்தக் குழல்களால் சோஷித்து உயிஞ்சிக்கொள்ளப்படும்.

* ஆனால் இப்படி சோஷணத்தொழில் தேகத்தில் சில கருவிகளினின்று, சில வஸ்துக்கள் சேக்கிரத்திலும் மற்ற வஸ்துக்கள் விதானத்திலும் கவரவப்படுகிறதென்றும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக எட்டி விஷத்தை இரைப்பையிற் சேர்த்ததினால் அது தேகத்தில் கலாந்து கொள்ளப்படுவதற்கு மனக்குடலில் அதைச் சேர்ப்பதனால் ஆகும் கால அளவைவிட அதிகம் வேண்டியிருக்கிறது.

11-ம் அத்தியாயம்.

போஷிப்பும் வளர்ச்சியும்.

போஷிப்பு அல்லது போஷண பரிணாமம் என்பது ஜீவ தேசங்களில் விசேஷமாகியிருக்கும் உருவமைக்குப் தொழிலின் விகாரமாயிருக்கின்றது. இத்திரிபின் தன்மையால்தான் உற்பவித்திருக்கும் கருவிகள் அவைகளின் நிரந்தரத்தைப் பராமரித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. கருவிகளின் வளத்துக்களில் புதிய போஷணை சத்துக்கள் பெருந்துவிடில், தசைகளில் சேரப்பட்ட பாகங்களில் ஏற்படும் அழிவாலும் சுபாவமான சிதைவாலும் உண்டாகுபதன்மையால் சேரப்பட்ட பெருகின்றது. ஒவ்வொரு அவ்யாக்கிருத அணுவும் இரந்தத்தினின்று தனக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களைக் கவந்துகொள்ளும் சக்தி உடையதாயிருப்பதால் லாமல் அப்படி அவரப்படும் வஸ்துக்களையும் தனது கட்டம்போன்றதாய் ஆகச் செய்துவிடுகிறது. தன்மையையும் உடம்படி செய்கின்றது.

முதிர்விற்கும் வளர்ச்சிக்குமுள்ள இதுவகையிலேயே சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போது போஷிப்பு என்னும் பாகத்தில், தேசத்தின் சகல பாகங்களும், முதிர்வாலும் வளர்ச்சியாலுமடைந்திருக்கும்படி, வடிவு, கூட்டுப்பாடுகள் இவைகளின் நிலைமைகளை அப்பாகங்களில் சேர்த்திருக்கும் அணுக்கள் விடாமல் மாற்றி வளப்போதிலும் அந்த வஸ்துக்களிலேயே இருக்கும்படி பரிணாமம் செய்துகொண்டிருக்கிற தொழிலையெடுத்துச் சொல்லுவோம்.

இத்தொழிலற்றான் சவுக்கியஸ்தியில் தாருடைய தேசத்தையும் ஒரேவித அங்கு அடையாளங்களுடனும், ஒரே அளவு பரிமாணங்களுடனும், சில சமயங்களில் ஒரே பருவுடனும் சில வருஷகாலங்களுக்கு அதைக் காப்பாற்றும் சக்தியையும் தேசமடைகின்றது. மனிதனுடைய

தேசத்தின் பல பாகங்கள் இடைவிடாமல் மாறிக்கொண்டே வந்தபோதிலும், தேசாங்க அணுக்களோ அழிந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டும், பிறகு புதிய அணுக்களால் அவைகளிருந்த இடங்கள் அமைப்பப்பட்டும், இப்படி புதிதாய் வந்தவைகளும் கிரமேன அழுகியும் வெளிப்பட்டும் வந்து கொண்டேயிருக்கின்றது. தேசத்தில் அணுக்கள் மாற்ற மல்ல இவ்வித மாறுபாடுகளுக்கு உட்பட்டும் ஒன்று போலவே காண்பது. சகல கருவிகளும், தேசத்தின் சகல பாகங்களும் தேசமுழுமையும் இம்மாறுபாடுகள் வண்டாகிக்கொண்டிருந்தபோதிலும், ஒரேவித ரூபத்தையும், கூட்டுப்பாடுகளையும் உடைத்தாயிருக்கின்றன.

சேர்த்திருக்கும் அணுக்கள் மாறுவதால் போஷணையுண்டாகிறதென்பதை ஒரு வளரும் கருவியைப் பார்ப்பதால் எளிதில் அறியலாம். ஏன் எனில், அப்பெழுதுவடிவும் மற்ற சாதாரண குணங்களும் ஒன்றுபடுபதற்குக் கண்டபோதிலும் அது பெருந்துவதும், உதாரணமாக ஒரு நீண்ட எலும்பு குதுக்களில் அதிகரித்து அப்படியதிகரிக்கும்பொழுது அதனுள் தவாரமும் பெரியதாகிவந்தால் புதிய அணுக்கள் மேற்புறம் சேருவதாலும், இருக்கும் அணுக்கள் உட்புறம் அழிந்துபோவதாலும்தான் அப்படியாகுமென்று தெரிகிறது. இதேமாதிரி பாகத்தின் ஒவ்வொரு தசையும் வளரும், ஆகையால் தேசபாகங்கள் ஒரேவிதமாயிருக்கிறதென்று காணுங் காலத்திலும், இப்படிப்பட்ட மாறுபாடுகள் நடந்துகொண்டிருக்கிறதென்பதை தேசங்களில் எல்லா அணுக்களிலும் அழிவும் சேதமும் எப்பொழுதும் இருக்கிறதென்று காண்ப்பதாலும் விளங்கும்.

பல பாகங்களில் அணுக்கள் தேசத்தைவிடப் புறப்பட்டுப் போவது தெளிவாயிருக்கின்றது. விசாக்க நீர்களைப்பற்றிப் பேசும்பொழுது, கோளங்களின் அவ்யாக்கிருத அணுக்கள் விசர்க்கப்படுகிறதென்பதைக் காலாலாம்,

ஒவ்வொரு கோளமும், அதிலுள்ள சாலங்களையும் அவைகளிலுள்ளவைகளையும் உதிர்த்துவிட்டுக்கொண்டேயிருக்கும். ஆயினும் ஒவ்வொரு கோளமும் தன் அளவும் கூட்டுப்பாடுகளும் வேறுசாமல்பரிணாமம் செய்துகொண்டிருக்கின்றது. எப்படியெனில், தள்ளும் ஒவ்வொரு சாலத்துக்கும் பதிலாக புதிய சாலம் உண்டாகின்றது. இந்தப்பிரகாரமே மீத்தோலும் மற்ற அவைபோன்ற வஸ்துக்களும் புதிப்பிக்கப்படுகின்றன. சதைகளில் அவைகள் சுருங்கும் பொழுதெல்லாம், சுருங்கும் தகையின் கூட்டுப்பாடுகள் வேறுபாட்டடைகின்றன. அதினால்தான் தொழில்புரியும் சதைகளில் உஷ்ணம் உற்பத்தியாகிறது, அதினாலேயே (பூரியா) மூத்திரவாயு, கரியமலவாயு, தண்ணீர் இவைகள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறதுமாதும். ஆயினும் சதைகளோ மாறுபாட்டையாததாகக் காணும். அத்தோற்றத்தின் காரணம் அவைகளில் அழிந்து கழியும் அணுக்களுக்குப் பதிலாக வேறு புது அணுக்கள் உற்பத்தியாவதினாலேதான். அதுபோலவே, அதிகமனோ முயற்சிக்குப்பிறகு மூத்திரத்துடன் சுண்ணாம்புகலந்த நிபாகினி வஸ்துக்கள் வெளிப்பட்டுப்போவதினால், நரம்புத் தசைகளும் அவைகளின் கூட்டுப்பாடுகளில் சுரம்புக்குறிச் தொழில்புரியும் காலத்தில் சேதப்படுகின்றனவென்றும் புலப்படும். ஆயினும் அத்தசைகளின் பரிணாமம் ஒன்றுபட்டுள்ளதாய் காண்கிறது.

இதுவுமல்லாமல் தேகத்தில் சகல அணுக்களும் கொஞ்சங்கால அளவுதான் இருக்கும்படியான தன்மையுள்ளவைகளாயிருக்கின்றன. அக்காலங் கழிந்தால் அவ்வணுக்கள் பழுதுபட்டு விலகிப்போகும். இதற்குதாரணமாக கோமத்தையும், தந்தத்தையும் பார்க்கலாம். இவைகள் சித்தி புதியவை உற்பத்தியாவதிலும் போஷணபரிணாமத்தின் முக்கிய தன்மைகள் வெளியாகின்றன. இவைகள் வளர்ந்து முதிருகின்றன. முதிர்ந்தபிறகு கொஞ்ச காலமிருந்து பிறகு சேதப்பட்டுப்போகின்றன. இதுபோலவே சீமமும், கோளப்பைகளும் இருக்கின்றன.

ஒவ்வொரு பாகமும் உயிருடனிருக்கும் கால அளவு குறிப்பிடக் கூடியதென்று காணுகிறது. ஆயினும் இக்கால அளவு கொஞ்சம் சம்பாதிக்கவருக்கும், தேகமுடையதிகளாலுண்டாகும் செலவழிவுகளுக்கும் உட்பட்டிருக்கின்றது. தவிர பல பாகங்களும் ஒரே சமனான கால அளவு உடையவைகளும்ல்ல, உதாரணம், எலும்புகள் ஒருதடவை பூர்த்தியாக வளர்ந்துவிட்டால் கொஞ்சம் நீடித்த காலம்படியே பிடுக்கின்றன. சதைகளோ அவ்வளவு காலமிருக்கமாட்டா.

போஷண தர்மம் சரியாய் நடைபெடுவதில்லாவிடும் நிலைமைகள் சரியாயிருக்கவேண்டும்.—

(1) இரத்தம் சரியான ஸ்திதியிலிருக்கவேண்டும். இதிலின்றுதான் பேரஷணைக்கு வேண்டிய பல பதார்த்தங்கள் தேகத்தையடைவின்றன.

(2) இரத்தம் சரியான அளவு தகுந்த காலங்களில் தேகத்தை யடைந்துகொண்டு வரவேண்டும்.

(3) நரம்பு மண்டல வியாபாரமும் சரியாயிருக்க வேண்டும்.

(4) போஷிப்படையும் பாகமும் சுயாவ ஸ்திதியிலிருக்கவேண்டும்.

சவுக்கியமான போஷணத்திற்குரியவைகளில் இவை போன்றவை முக்கியமானவைகள். இவைகளில் ஏதாவது குறைவுபட்டாலும், ஜாஸ்தியாகவாலாவும், பேரஷணைத் தொழில் கெட்டுப்போகும்.

வளர்ச்சி

தேகத்தின் யாதொரு பாகத்தில் அழிவடைந்து நசிக்கும் அணுக்களை புதிப்பிக்க வேறு அணுக்கள் உண்டாவதில் இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமுண்டாகி அப்பாகத்தின் பளுவும் வடிவமும் அதிகரிப்பதற்குத்தான் வளர்ச்சியென்று பெயர். பாகத்தின் கட்டடமும் கூட்டுப்பாடும் ஒரேமாதிரியாகத்தான் இருக்கும். சவுக்கிய ஸ்திதியிலிருக்

கும் தசை யதிகரிப்பதால் அதன் சாதாரணத் தொழிலை நன்றாய்ப் புரியும் சக்தியுடையதாகும்.

பாகம் முதிர்ந்துவரும் காலத்திலேயே வளர்ச்சியடைந்தும் வருகின்றது. பிண்டத்திலுள்ள பல கருவிகளும், தசைகளும் வளரும்பொழுதே முதிர்ந்து தமது சம்பூரண ஸ்திதியையடைகின்றன. ஆனால் சாதாரணமாக முதிர்வடைந்தபிறகும் வளர்ச்சி நடந்துகொண்டேயிருக்கும். சில பாகங்களில் தேகம் சம்பூரண ஆகாததையடைந்தபிறகும், அதன் ஒவ்வொரு பாகமும் வடிவிலும் கூட்டுப்பாட்டிலும் வேண்டிய பலமடைந்தபிறகும் வளர்ச்சி நடந்துகொண்டிருக்கிறது.

சில சமயங்களில் இந்த மாதிரி வளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருவதை தேகத்தின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் நன்றாய்ப் பார்க்கலாம்.

வளருவதில் சாதாரணமாய் எவ்வளவு வடிவடைய வேண்டுமோ அதையடைந்தபிறகு மனிதனுடைய நடுப் பிராயமுழுவதும் அப்பாகங்கள் மிதமாய் தமது தொழில் களைப் புரிந்துகொண்டிருந்தால், அதே ஸ்திதியிலிருக்கின்றன. யாதொரு காரணத்தாலாவது தேகத்துக்குத்தக்க படி வளர்ந்திருக்குமெப்பக்கமாவது தனக்குரிய தொழிலளவைவிட அதிகமாய் தொழில்புரியும்படி நேரிட்டால் எவ்வளவு அதிகத் தொழில்புரிகிறதோ அதற்குத் தக்க வளர்ச்சியும் அப்பாகம் அதிகமாயடைகின்றது. உதாரணமாக, வேலைசெய்து ஜீவனம்செய்யும் கூடுக்காரர்கள் கையைப்பார்த்தால் அவர்கள் உள்ளங்கைத் தோலும் மிருதுவாகியிராமல் கட்டியாயும் பெருத்துமிருப்பதைப் பார்க்கலாம்.

எப்பொழுதும் ஒரு பாகம், தனது தொழிலளவுக்கிதமாய் புரியும் தொழிலாலுண்டாகும் வளர்ச்சி சவுகியத்தை குறிப்பிக்கும் தொழிலாகும். வியாதியினாலுண்டாகும் பெருமன்போலதல்ல. முதல் சொன்னவிஷயத்

தில் சமயாசமயங்களில் தொழில்புரிய உதவுவதற்காக அளவுக்கதிகமான நல்ல தசைகள் சேருகின்றன. பின் சொன்னதிலோ பாகத்தின் சுபாவ கட்டிடத்தில் ஆரோக்கியமற்ற வஸ்துக்கள் வந்தடைவதால் அதன் தொழில்புரியும் சக்தி குறையும்படி யானதாயிருக்கிறது.

வியாதியினாலும்கூட சில சமயங்களில் தேகத்தின் சில பாகங்கள் அதிக வளர்ச்சியடைவதுமுண்டு. அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு hypertrophy என்று பெயர். உதாரணமாக, இரத்தாசுழலுக்கு யோதிபந்தகம் இடைவிடாமல் ஏற்பட்டால் இரத்தாசுக்குழிகளின் சதைசுவர்கள் பருத்து பலமுள்ளதாகிடுகின்றன. மூத்திரப்பையினின்று மூத்திரம் வெளிவரத் தடங்கல்கள் ஏற்பட்டால் பையின் சதைச் சொக்காய்கள் பருத்து உறுதியுள்ளவைகளாகின்றன. இவ்விரு விஷயங்களிலும் ரோகத்தால் வளர்ச்சியுண்டானபோதிலும் வளர்ச்சிமாதிரம் சுபரவமாயுள்ளதாகவும், முடிவில் தேகத்துக்கு அனுகூலமுண்டாக்க ஏற்பட்டதாகவும் இருக்கின்றன.

12-ம் அத்தியாயம்.

விசர்ச்ச நீர்கள்.

விசர்ச்சமென்பது அவைகள் உற்பத்தியாகும் கருவிகளினின்றும், இரத்தத்தினின்றும் தேகவின்னிர்சத்தில் (நிட்டத்தில்) வேறுதொழில் புரிவதற்காகவும், அல்லது விசர்ஜனமாக வெளியே தள்ளப்படுவதற்காகவும், பிரிக்கப்பட்டுவரும் வஸ்துக்களாகும். முதல்சொன்ன தொழிலுக்கு வேண்டியவைகளை (secretion) பொசிப்புகள் என்றும், பின்சொல்லியவைகளை (excretion) விசர்ஜனங்கள் என்றும் சொல்லலாம்.

பொசிப்புகளினேகம் பொசிந்த ஸ்திதியிலேயே பொசியுமுன் இரத்தத்தில் இருக்கிறதில்லை. இவைகள்

உற்பத்தியாக விசேஷக் கருவிகளும், விசேஷத்தொழில்களிலும் வேண்டியிருக்கின்றன. உதாரணமாக, பித்தநீரை உண்டாக்க சரலும், பாஸ்புண்டாக்க முலைக்கோளங்களும் வேண்டியிருக்கின்றன. தேகத்துக்கு வேண்டாத விசர்ஜன வஸ்துக்களை தயாராக இரத்தத்தில் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன. அவைகளை இரத்தத்தினின்றும் விலக்கி வெளியிடுதல் தான் வேண்டியதாயிருக்கும். உதாரணம், யூரியா மூத்திரவாயு, சரியமலவாயு, யூரிக் அஸிட் என்பவைகளைக் காணலாம்.

வியாதியல்லாது அல்லது விசர்ஜனக்கருவி நாகமடைந்து போவதல்லாவது விசர்ஜனவஸ்து இரத்தத்தைவிட்டுப் பிரிவது தடைபட்டு அநிலகிமடைந்தால் மற்ற கருவிகள் வழியாய் அவ்விசர்ஜன வஸ்துக்கள் வெளியிட்டுப்போவதையும் காணலாம். பொசிப்புகள் இம்மாதிரியாகமாட்டாது. பொசிப்பிக்கும் கருவி நாகமடைந்தால் கருவியினின்று பொசியும் திரவமும் நின்றுபோய் குமேயாவலானது வேறு கருவிகளால் பொசியமாட்டாது. பொசிப்புகளினால்கூடச் சில சமயங்களில் பொசிந்த திரவிலும் போகும்வழி தடைபட்டால் வேறுவிதமாக வெளியின் வரக்கூடும். ஆனால் அது பொசிப்பின் சரியான தர்மமல்ல. பொசிப்புகளுக்கும் விசர்ஜனங்களுக்கும் வேறுதாவித்தயாசங்கள் சொல்லக்கூடுமெனில்லை. ஏன் எனில், கிட் விசர்ஜனங்களைப் பிரித்துவிடும் கருவியாகிய பிருக்கதுத் (kidney) த்தின் கட்டடம் பொசிப்புகளை உற்றுவிக்கிறதும் கட்டடங்கள் போலவே பல கலப்படைந்ததாக இருக்கிறது. தவிர, மிகக் ஏற்பட்டிருக்கும் இவ்விரு தொழில்களிலும் அத்திரவங்களின் பயனும், உற்பத்தி போபபுக்கு முதலியவைகளையும் நன்றாயறியப்படவில்லையாதலால் இவைகளைப்பற்றி அதிக வித்தியாசங்கள் சொல்லக்கூடாமை யாயிருக்கிறது. பொசிப்பிற்கும் உபகரணங்களும் ஒவ்வொன்றும் சாதாரண கட்டடமற்ற சவ்வு ஒன்றாக இருக்கின்றது. ஆதிசவ்வு அல்லது அஸ்திபாரசவ்வு

என்று சொல்லலாம். சில சரலங்கள் இருக்கின்றன. கொஞ்சம் இரத்தக்குழல்களும் இருக்கின்றன. இம்மூன்று கட்டட மூலங்களும் ஒவ்வொன்றிலும் வெவ்வேறுவிதமாய் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் இவ்வேறுபாடுகளை இருவிதமாய்ப் பிரிக்கலாம். (1) சவ்வுகள் என்றும் (2) கோளங்களென்றும்.

பொசிப்பிற்குச் சவ்வுகள்.

முக்கியமாய் பொசிப்பிற்கும் தன்மையுள்ள சவ்வுகளை நினைநீர், கீல் இவைகளின் சவ்வுவென்றும், கிலேஷ்மச சவ்வுவென்றும், சருமம் என்றும் பிரிக்கலாம்.

நினைநீர்ச் சவ்வுகள் அவைகளின் மேற்புறமிருக்கும். எண்டோதீலியடி என்றும் சரம்பு போராவயினுடைய குணத்தை உடைத்தாயிருக்கும். அவைகளில் ஒருபடையில் பல பக்கமுள்ள சரலங்களிருக்கின்றன. இச்சவ்வுகளின் அஸ்திபாரசவ்வுக்கள் சம்பந்தத் தசைச் சரலங்களாய் (lymph canalicular system) நினைநீர்த்தாரை மத்திய பிரதேசம் என்று சொல்லுமிடங்களில் படிந்திருக்கும். இவைகளுடன் வெள்ளைநாரத்தசைகளை பிளனிக் கொண்டிருக்கின்றன. இன்னுமிவைகளில் கெழிந்திரமும் நார்களும் இரத்தக்குழல்களும், நரம்புகளும், நினைநீர்க்குழல்களும் பிளனிக் கொண்டு இருக்கும்.

பொசிப்பிற்கும் தொழிலை புற்றுப்பாக்குமளவில், நார், சரலத்தசை, இரத்தக்குழல், நரம்பு, நினைநீர்க்குழல் இவைகள் பரவ் அஸ்திபாரசவ்வுகளுக்கிடையே. ஆனால் இந்தத் தசை சில இடங்களில் காணுகிறதில்லை. முளைமேல் சவ்வு (Duramater) க்கடுத்த கிழப்பக்கத்திலிருக்கும் ஆர்கனாயிட் (Arachnoid) என்னும் சவ்வுப்போரவையிலும், மூளைப்பக்க பள்ளங்களிலுமாயிலும் (Ventricles of the Brain) காணுகிறதில்லை. மூலச்சவ்வும் பரிஸ்தாமிதமுமாத் திரம் இவ்விடங்களிலிருக்குமென்று காணுகிறோம்.

*சருமத்தைப்பற்றி பிரதேசம் அநியயத்திலே சொல்லப்படும்.

றது. இவைகளால் வேண்டிய திரவம் பொசிந்து சவ்வின் மேற்புறம் ஈரமடையுமென்றும் தோன்றுகிறது.

நிணநீர்ச்சவ்வு இருவகைப்படும். 1-வது அந்தரக்குழிகளை மூடிக்கொண்டிருப்பவை.

மேல்சொன்ன மூளையிலிருக்கும் ஆர்கனாபிட் சவ்வும், இரத்தாசயத்தைப் போர்த்துக்கொண்டிருக்கும் சவ்வும், பரிப்புச்சவ்வும், அந்தர்வேஷணச்சவ்வும், பிஜு சவ்வும் ஆகும். 2-வது. கீழ்முட்டுகளை போர்த்துக் கொண்டிருக்கும் கீல் சவ்வுகளும் ஹஸ்திபந்தனங்களையும் ஹஸ்திநார்க்களையும் சுற்றிக்கொண்டு இருக்கும் நிண நெய்ச்சவ்வுகளும் இரண்டாவது வகுப்பாகக்கொள்ளலாம்.

நிணநீர்ச்சவ்வுகள் மூடிய பைகளாகவிருக்கின்றன. குழிகளின் மேற்புறம் ஒன்றுடன் ஒன்று படுப்படியாய் இருக்கும் ஸ்தலங்களிலும் சுற்றியுமுள்ள பாகங்களைத் தொடராமலிருக்கும் குழிகளிலும் படிந்திருக்கும். நிணநீர்ச்சவ்வால் மூடியிருக்கும் குழி மூடிய பையை முட்டிக்கொண்டிருக்கிறதுபோலக் காணும். நிணநீர்ச்சவ்வுகள் மூடியபைகள் என்னும் விதங்கு மனிதனில் ஒரு விலக்கிருக்கின்றது. நாதவாகியென்னும் சினைப்பாதைகள் உதரக்குழியில் துவாரத்தையுடையதாயிருக்கின்றன.

• நிணநீர், நிணநெய்ச்சவ்வுகளின் முக்கிய குணம் என்னவென்றால், அது மூடியிருக்கும் கருவி அசையும்பொருட்டு மிருதுவான பசையுடைய மேற்பரப்பைத் தருவதற்கும், அக்கருவிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று உரைவதால் உண்டாகக்கூடிய கெடுதிகளைத் தடுக்குவதற்கும் உள்ளவைகள் ஆகும். இக்குணங்கள், விசாலமான தடையற்ற அசைவுகள் உண்டாகும் கீழ்முட்டுகளில் நன்றாய் விளங்குகின்றன. இரைப்பையும் குடல்களும் அவைகளிலுள்ள வஸ்துக்கள் பலவித அளவுகளாக மாறும்பொழுதும், அசைவுகளடையும்பொழுதும் ஒன்றின்மேல் ஒன்று மோதுவதற்கும், உதரத்தின் சுவற்றின்மேல் மோதுவதற்கும்

ற்கும் அதிக உபயோகமுள்ளவைகள் என்பதையும் காணலாம்.

நிணநீர்ச்சவ்வுகளின் ஊறும் திரவம் அவைகளை ஈரமாக்கிவைக்கவேண்டிய அளவுதான் இருக்கும். இச்சவ்வு ஒன்றின்மேல் ஒன்று படிந்திருந்தால் இடையில் திரவம் கலக்க இடமிருது. இறந்தபிறகு நிணநீர்ப்பைகளில் திரவம் சேர்ந்திருப்பதைக் காணலாம். ஆனால் இது வியாதியாலுண்டாகாததாயிருந்தால் இறந்தபிறகாவது சாகும் தருவாயிலாவது அவ்விடம் ஊடுருவிப்போய்ச் சேர்ந்ததாயிருக்கும். நிணநீர்ப்பையில் திரவம் அதிகரித்து நின்றவிட்டால் அப்பையின் Dropsy நீர்க்கோவை என்னும் வியாதியாகும்.

சாதாரணமாக நிணநீர்ச்சவ்வின் ஊறும் திரவம் (இரத்தநீரை தன்னிடில் கரைத்தாப்போலும்) இரத்தத்தின் நிணநீர்போலவே பார்வைக்கும் புதிகருணங்கிலும் இருக்கின்றது. அதன்மேல் கொஞ்சநிறம் ஆலலது வைக்கோல்வர்ணமாயும் கொஞ்சம் வழுவழுப்புடையதாயும் என்னும்புகன்மையுள்ளதாயும், வெள்ளைக்கருசத்துமிருக்கிறபடியால் உண்ணம் படுவதால் உரையும் குணத்தையுமுடையதாக இருக்கின்றது. காமாலைவியாதியில் இரத்தத்திலிருக்கும் நிணநீர் மஞ்சள்நிறமாக மாறுங்காலத்தில் நிணநீர்ச்சவ்வுகளிலிருக்கும் நீரும் மஞ்சள்நிறமடைவதாலும் இவ்விண்ணிக்கும் பேதமில்லை என்னும் ஊகம் கொஞ்சம் பலப்படுகிறது.

ஆனால் மூளைக்குழிகளிலும் ஆர்கனாபிட் சவ்வுகளிலும் இருக்கும் திரவத்திற்கும் மற்ற நிணநீர்ச்சவ்வு திரவத்திற்கும் வித்தியாசமுண்டென்று காணுகிறது. என்னில் இவைகளிலுள்ள திரவம் தெளிவாயும், நிர்ணயமற்றும் இலேகாயுமிருப்பாலும், பித்தநீர் இரத்தத்தில் கலக்கும்பொழுது இவைகளில் மாத்திரம் கலக்காமல் இருப்பதாலும், இன்னம் சில காரணங்களாலுமேதான்.

நினைவெய்யானது சவ்வின் கீழ்ப்புற பார்ப்பில் இருக்கும் பரிஸ்தாபிதச் சாலங்கரின்னினும் ஓரங்களினினும் ஈரானமாயுறுகின்றது. இது நிணநீரைவிட அதிக மந்தமாயும் கொழகெழுப்புள்ளதாயும் மிக்க வெள்ளைக்கருச் சத்துள்ளதாயும் இருப்பதால் இரத்தத்திலிருக்கும் நிணநீரின்னினும் மற்ருந்த சவ்வின்னிறுப்பத்தியாகும் நிணநீரின்னினும் வித்திராசமுள்ளதாயிருக்கின்றது.

சிலேஷ்மச்சவ்வு.

தேகத்தின் உட்புறத்திற்கும் வெளிப்புறத்திற்கும் துவாரசம்பந்தமுள்ள எல்லாவிடங்களின் மேற்பாப்பிலும் பாவியிருக்கும். அவைகளின் உதவிபால் வஸ்துக்கள் தேகத்தினினும் விசர்க்கப்படுகிறதமல்லாமல் தேகத்தினுள் வேறுவஸ்துக்களும் உள்ளுக்கு வருகின்றன.

அவைகளையிருதவாயும் பிட்டுப்போலிருக்கும் மிக்க குப்பரசுதன்மைமுடையவைகள் சாதாரண குடும்பத்திஷ் நிணநீர்ச் சவ்வுபோன்றவைகள். அவைகள் பரிஸ்தாபிதத்தோடும் அஸ்திவாரச்சவ்வும், நார்-ப்பை-த்தசை யல்லது சல்லடைக்கண் தசைகளையும் உடையவைகள். இவைகளினும் இரத்தக்குழாய்களும், நரம்புகளும், நிணநீர்த்தாரைகளுமிருக்கின்றன. சிலேஷ்மச்சவ்வின் கட்டடமானது எல்லாவிடங்களினும் ஒருவிதமாயிருக்கிறதில்லை. முக்கியமாக இவைகளில் பரிஸ்தாபிதம் வேறுபடுகின்றது. ஆனால், அங்கங்கே கருவிளைப்பற்றி யெடுத்துப் பேசின பொழுதே இந்தச் சவ்வின் கட்டடங்களைப்பற்றி சொல்லியிருக்கிறோமாகையால் இங்கு விவரிப்பது அநியமில்லை.

சிலேஷ்மச்சவ்வின் வெளிப்பரப்பு பற்பல் தகையருடன் ஒட்டப்பட்டிருக்கும். உதாரணமாக நாவில் சவ்வுகருடனும், முருந்துள்ள இடங்களில் அவைகளை முருந்துக்கும் நிணநீர்ச்சவ்வுடனும், தேகநீர மிரண்டிருக்கையில் காசிக்கு மேற்புறத்திலிருக்கும் எதிர்ப்பிப்போள்

என்னும் சல்லடைக்கண்ணொலும்பின் (சொல்லரித்தது போலக்காலும்) பைதனிலும், நிகழி ஏனும்பின் பள்ளங்கரின்னும் அவ்வால் என்னுள் பள்ளங்களினும், கடுக்காதினும், அஸ்திவாரச்சவ்வுடனும் ஒட்டியிருக்கின்றது. குடநகர்வாயில் அது இச்சவ்வின் கீழ்ப்புறமுள்ள சவ்வுடன் ஒட்டியிருக்கிறது. அந்தச்சவ்வின் மேற்புறத்தில் சதைச்செக்காயின் காரகருடன் ஒட்டியிருக்கிறது.

சிலேஷ்மச்சவ்வுகளைப்பற்றிப் பேசுவதில் அவைகள் சில பிரதேசங்களில் படுகெடுப்பலவை என்று சொல்லுவதற்கும் ஐரோபியப்புரப் பிரதேசமென்றும், உபஸ் கொழுத்திரப் பிரதேசமென்றும் சொல்வார்கள். முதல் சொல்வதை இரண்டாகப்பிரித்து, சோன் பிரதேசமென்றும் புப்புரப் பிரதேசமென்றும் சொல்வார்கள்.

(1) சோன் பிரதேசமென்பது வடிக் குழியில் ஆரம்பம் செய்கின்றது. இவைகளினினும் கீண்டவைகள் பிழிச்சுக்கொண்டுகளின் குழியைமுன் செலுகின்றது. வாயினின்றும் புறப்பட்டு இவைகள் தொண்டைக்குழிகளினும், தொண்டையிலும், அன்னவாகியிலும் சென்று இரைப்பைக்குப்போகின்றது. அவ்விடமிருந்து அதையொட்டியே குடலவழிமுழுதும் சென்று மலக்குடலுக்கு வருகின்றது. இக்கவழிகளில் பல திட்டங்களில் பல மடிப்புக்குடையதாயும் பல பள்ளங்களுடையதாயும் இருக்கிறதமல்லாமல் இவைகளினும் பல கீண்டவைகள் குடல் கொள்க குழாய்களினும், கையோகோள்க குழாய்களினும், கரணக்குளான குழாய்களினும் பித்தப்பை குழிய்களினும் சென்று பாவியிருக்கும். (2) புப்புரப் பிரதேசமென்பது காசிக்குழியிலும் அவைகளுடன் கலக்கும் பல என்னும் பள்ளங்களினும், கண்ணாடி உட்புறத்து கோணத்தில் உபயோகியவிலும் கன்னாடிக்குழிகளினும், இவைகள் குழியும் இடமாகியும் அஸ்திக்குழியின் மேற்புறமுடையதாயும் இருக்கும் கணவிர கலப்பினும், கணவிரவின் கண் செய்ப்பிளவதையுமே அது பற்றுகின்றதும் முடிக்கோ

ண்டிருக்கிற கண்ஜவ்விலும், நடுக்காதிலிருந்து தொண்டைக்குப்போகும் பாங்காவைப்போலொத்த குழலிலும் (Eustachean Tube) நடுக்காதையும், அக்காதின் சவ்வினுட்பரப்பையும் போத்துக்கொண்டிருக்கும் சவ்வுகளாகும். தொண்டையைத்தாண்டி மிருதுவாயிருக்கும் அண்ணத்துக்கு மேற்புறமுள்ள தொண்டையின்பாகத்தில் பரவியும், புப்புசுபிரதேசம்கிருகவாயிலுக்குச்சென்று, அவ்விடமிருந்து குரல்வளை, தமரகம், தமரக்கிளைகள் இவைவழியாய் இக்கிளைகள் ஆகிய குறுக்களவுக் கதிசுமாயிருக்கும்வரையில் செல்லுகின்றன. அதற்கப்புறம் இவைகளை ஒட்டி மெல்லிய பரிஸ்தாபிதச் சவ்வுமாதிரி மற்ற சிறுகிளைகளில் சென்று புப்புசுப்பைகளை எட்டிகின்றன. (3) உபஸ்தோ-மூத்திரப்பிரதேசமென்பது மூத்திர துவாரங்கள் எல்லாவற்றிலும், அவைகளின் வெளிநுவாரவாய் முதல் பிருக்கத்திலிருக்கும் Tubuli Uriniferi, அதாவது பிருக்கங்களின் குழல்களால் ஏற்பட்ட உட்புற பதார்த்தங்களவரையிலும் எட்டியிருக்கும். தவிர இருஜாதியிலும், ஜனனேந்திரியங்களிலும், அவைகளின் கோளக்குழல்களிலும் பரவியிருக்கும். பெண்களில் சினைப்பாதை முனையருகில் உத்தரத்தின் நிணநீர்ச்சவ்வுடன் ஒட்டியிருக்கும்.

இந்த இரண்டு பிரதேசங்களிலும், அவைகளில் ஒவ்வொன்றில் பல இடங்களிலும் சிலேஷ்மச்சவ்வுகள் கட்டிவித்தியாசங்களை உடையதாயிருக்கின்றன. ஆனால் இவ்வித்தியாசங்களின் காரணம், அப்பாகங்களில் அவையும்தொழிலுக்குத் தக்கவண்ணம் அவைகளின் கட்டிகள் பேதமடைந்திருக்கின்றன. ஆயினும் முக்கிய இடங்களில் எவ்விடத்திலிருக்கும் சவ்வும் ஒரே தன்மையடைந்திருக்கின்றது. இவ்விரு பிரதேசங்களின் முயமாகிய பாகங்களில் மேற்கொள்ள பிரகாரம் சிலேஷ்மச்சவ்வுக்கு வெளிப்புறப்படை பரிஸ்தாபிதத்தாலுண்டாகப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கடியில் அஸ்திபாரச்சவ்வு இருக்கிறது. இதனடியில் குழல்தன்மையடைந்த தனி

னும் இருக்கின்றன. இந்தவைகள் சில இடங்களில் மேலிட்ட வில்லைகளபோலும் பள்ளங்களுடைய கோளங்களாகவும் இருக்கின்றன. இச்சவ்வுகள் அவ்வவ்விடங்களில் நீண்டு கோளக்குழல்களில் பிடிபிடிக்கும்பொழுது இவைகளின் கட்டடக் கூட்டுப்பாடி மாரி அதிக துட்பமரீன பாகங்களில் பரிஸ்தாபிதமும், அஸ்திபாரச்சவ்வுமாதிரி இருக்கும். இவைமேல் ஒருபடை இரத்த தந்துகிகளும் பரவியிருக்கும். அல்லது அஸ்திபாரச்சவ்வு மெலிவான ஒளி ஊடுருக்கடிய எக்கண்ட மாயிருக்கும்படியான படியாகும். இதற்கு கட்டடம் காணப்படமாட்டாது. இதன் மேல் கரணப்படும் குழாய்த்தன்மையுள்ள கார்ப்பைத்தசைகளினின்றும் பரிஸ்தாபிதச் சாலங்களை உண்டாக்க ஏற்பட்டிருக்கும் வஸ்துக்கள் என்று காணுகிறது. சிறிய தாயகாணப்படும் கோளங்கள் குழாய்கள் இவைகளிலுள்ள சிலேஷ்மச்சவ்வில் இந்த அஸ்திபாரச்சவ்வுதான் அவைகளில் பரவியிருக்கும் தந்துகி முதலியவைகளுக்கு கவராய் ஏற்பட்டிருக்கும். சிலேஷ்மச்சவ்வினமேலிருக்கும் பரிஸ்தாபிதச் சாலங்களும் கோளங்களின் உள்ளிருக்கும் பரிஸ்தாபிதச் சாலங்களும் ஒரேமாதிரியானவைகள். கோளங்களின் கட்டடப்படைகளுக்கு கோளச் சாலங்கள் என்று மாதிரி பெயர் வழங்குகிறார்கள்.

பொசிப்பை புண்டாக்கவேண்டிய தசைகள் ஒரு பக்கத்தில் இரத்தக்குழல்களையுடையதாயும் மற்றபக்கத்தில் பரிஸ்தாபிதச் சாலங்கள் அல்லது கோளச் சாலங்களை உடையதாயிருக்கின்ற சவ்வுகளாகும். கோளங்களிற்குடகாரம்புகளும் நிணநீர்த்தாரைகளுமிருக்கின்றன.

பொசிப்பிக்கும் உபகாணத்தின் மூலபாகங்களாய் பரிஸ்தாபிதம், சாதாரணச்சவ்வு, இரத்தக்குழல்கள் ஆகிய இவைகளைப்பற்றி இதுவரையிலேயே கொல்லியிருக்கிறோமாகையால், இனிமேல் இவைகளை எம்மாதிரிகளில் அமைப்பதால் புலவித விசரிக்க கோளங்கள் உண்டாகிறதென்பதை பார்க்கலாம்.

விசர்க்க கோளங்கள்.

விசர்க்க கோளங்கள் என்பன விசர்க்கத்தையே முக்கிய தர்மமாய்க் கொண்டிருக்கும் கோளங்களாம். அவைகளுக்கு வேறுதொழிலிருப்பதாக காணப்படவில்லை. உருவத்திலும் கூட்டுப்பாடுகளிலும் பற்பல வித்தியாச வேறுபாடுகளை யுடையனவா யிருந்தபோதிலும், தேசத்தின் மற்ற கட்டடங்களினின்றும் வரையறுத்து காட்டக்கூடிய ஒருவித கட்டட நியமனத்தையுடையவைகளா யிருக்கின்றன. இவைகள் எல்லாவற்றிலும் சாலங்கள் இருக்கின்றன. இச்சாலங்களும் ஒரு விதிப்படி அமைந்திருக்கிறதாகவும் காணுகிறது. சாலங்கள் எல்லாம் பரிஸ்தாபிதக்குழிகளிலும் குழாய்களிலும் அமைந்திருப்பதும் அல்லாமல், கோளங்களினின்று வெளிப்படும் வஸ்துக்களிலும் விசர்க்கச் சாலங்களாக வருகின்றன.

இச்சாலங்களை மூன்றுவிதமான அமைப்புகளையவைகளாய் பிரிக்கலாம். இவைப்பைகுடல்: இவைகளிலிருக்கும் சாதாரண நீண்ட குழாய்களும் குழிகளும். இவைகளிலிருக்குஞ் சாலங்கள்: இவைகள் குழாய்போன்ற சிறிய துவாரங்களையடைந்திருக்கும். ஒரே மெல்லிய சவ்வாடாகப்பட்டு, சவ்வின்மேற்புறத்திலுள்ள சாலங்களிலிருக்கின்றன.

1. வளைந்து பின்னிகொண்டிருக்கும் குழாய்கள்: இவை பிஜம் பிருக்கம் இவைகளிலிருக்கும். பரிஸ்தாபிதத் தொல்களில் சாலங்களாய் அமைந்து குழாய்கள் வளைவுபெற்று பலவிதமாக சிக்கடைந்திருப்பவைகள். 2. எல்லா மொன்றுபட்டுக் கூடிய கோளங்கள்: இக்கோளங்கள் வரிசைவரிசையாயிராமல் கூட்டம் கூட்டமாகவும் சிறிய விதம்போலவும் அமைக்கப்பட்டு, தமரகம், அன்னவாடி இவைகளிலிருக்கும் கோளங்களாம். உமிழ்நீர்க்கோளங்களும் இத்தன்மையானவைகளே. கண்ணீர்க்கோளங்களும் முலையிலிருக்கும் கோளங்களும், கணையக்கோளங்களும் (prostate) பல சிறிய சாலங்களை அடக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

கும் குழாய்கள் ஒரு பக்கத்தில் சேர்ந்து, சேருமிடத்தில் சொல்ப இடமுண்டாகி சுவ்விடம் முழுதும் மறுபடியும் சாலங்கள் நிறைந்து காணும் கோளங்களாம். இப்படி பல கோளங்கள் சேர்ந்து சவ்வின்மேல் திரவத்தை பொசுக்கும். இச்சாலக்குழல்கள் வெளிப்புற ஓட்டை சவ்வுபக்கம் திறந்து துவாரத்தையுடையதாகவிருந்தபோதிலும் உட்புறம் ஓட்டையற்றிருக்கும். ஆனால் பின்புறத்தில் இக்குழல்கள் இரத்த தந்துகி வலைகளால் சூழப்பட்டிருக்கும்.

பொசிப்புத்தொழில்.

பொசிப்புத்தொழில் இருவகைப்படும். ஜடத்தொழிலென்றும் பூதிகத்தொழிலென்றும் சொல்லலாம்.

1. ஜடத்தொழில்.—சாதாரணமாய் நாம் பெளதிக பரிசுணசாலையில் இத்தொழிலைச் செய்துகாட்டலாம். அது (a) வடிக்கட்டல், (b) பரவச்செய்தல்.

(a) வடிக்கட்டல் என்பது பல துவாரங்களையுடைய சவ்வில் திரவம் படிந்து துவாரங்கள் வழியாக அழுக்கத்தகுந்த திரவம் பிறங்கிவிடும் தொழிலாகும்.

பாண்டி திரவங்களை ஒரு சவ்வினால் ஒன்றினின்று ஒன்றைப் பிரித்துவைத்து, ஒரு திரவமிருக்கும் பக்கத்தில் சவ்வை அழுத்தும்படியான வேகமிருந்தால் சவ்வின் கண்கள் வழியாக அந்த திரவம் மற்ற அழுக்கமற்ற பக்கத்துக்கு இறங்கிவிடும். இவ்விருபக்கங்களிலும் சமமான அழுக்கல் உண்டாகுமளவும் இறங்கும். பிறகு திரவம் வெளிப்போகமாட்டாது. சவ்வின் ஒருபக்கத்தில் மாத்திரம் திரவமிருந்தால் திரவத்தின் பளுவு இருக்கும்ளவும் அவையெல்லாம் கீழே இறங்கிவிடும். இவ்வடிக்கட்டும் தொழிலினால் தண்ணீர் மாதிரமல்லாமல் உப்புகள் கலந்த நீரையும் வடிக்கட்டலாம்.

(b) பரவுதல் தொழில் என்பது பளுவு இல்லாமலே ஈரமாயிருக்கும் பிராணிச் சவ்வுகளுடே திரவம் பொசியும் தொழிலாகும். இதைப்பற்றி சேஷண அதிகியாய்

தகில் கண்டிருக்கிறோம். இத்தொழில் நடப்பதில் எவ்வித இருபக்கத்திலும் திரவம் இருக்கவேண்டும். ஒருபக்கத்து திரவம் மறுபுறப்பக்கத்திலிருந்துடன் கலங்கும் நன்மையுள்ளதாகவுமிருக்கவேண்டும். அப்படியிருந்தால் சுவின் இருபக்கத்து திரவங்களும் பூதிக் கூட்டுப்பாடுகளில் ஒரே தன்மையுடையனாகவாராகும்வகையில் இப்பொசிப்புத் தொழில் நடக்கும்.

நிணரிசு சுவைகளிலிருந்து கசியும் திரவங்கள் முக்கியமாக வடிவகட்டும் தொழிலால் இரத்தத்திலிருக்கும் இரத்த நீர் அல்லது நிணரிசு வெளிவருகிறதென்று கோள் அறிந்து பொசியும் திரவத்தின் தன்மை இரத்த நீரைப் பொருந்தியும், அளவு இரத்த அழுக்கத்தைப்பொருந்தியுமிருக்கும்.

2. பூதிகத்தொழில்.-விசர்க்கத்தொழிலின் அம்சம் மேற்சொன்ன கசியு அல்லவது பெரிதல்ல. முக்கியமாய் இவைகளையே உயிர்த்தன்மை பொருந்தியவைகள் என்று சொல்லவேண்டும். ஏன் எனில், இத்தொழிலில் சாலங்கள் உண்டாகி வளருவதுடனும், அப்படி வளருங்காலத்தில்தானே அவைகளினுள் திரவம் ஏற்பட்டு அந்த திரவத்தை வெளியே தள்ளும் தொழிலாகையால் இதை உயிர்த் தொழிலெனத்தெனலாம்.

வடிவகட்டல் தொழிலால் வெளிவரும் வஸ்து இரத்தத்தின் அதே தன்மையுடனிருக்கின்றது. இரத்தத்தினின் அம் இத்தொழிலால் பிரிக்கமாத்திரம் படுகின்றது. பூதிகச் சொல்லிய விசர்க்கத்தில் உள்ள பல வஸ்துக்கள் கோளத்திலிருக்கும் சாலங்களினதவியால் விசர்க்க வஸ்துவாக பூதிகமாக மாறுபாடல்களைச் செய்யப்பெற்று உண்டாகும் திரவங்களாகும். ஆகையால்தேதன்மை இரத்தத்தின் முன்னதாக இருக்கமாட்டாது.

இந்த அம்சம் சரியாகச்சொன்னோம் என்பதற்கு அந்தவடிவாக பின் வருவனவற்றைப் பார்க்கலாம். (1)

சகல கோளங்களிலும், அவைகள் எவ்வளவு வேறுபாடுடைய வடிவகளுடையனவாயிருந்தபேர்திலும், மற்றெத்தன்மையில் பேதமடைந்திருந்தபேர்திலும், சாலங்களும் சாலங்களினுள் கருக்கொப்பினங்களுமிருக்கின்றன. (2) அணுதரிசுணிக்கருவியால் காணக்கூடிய விசர்க்க நீர்கள் விசர்க்கமாய் வெளிப்படுவதற்குமுன் கோளங்களின் சாலங்களுள் னிற் காணலாம். பித்தநீரை நரல்கோளச் சாலங்களுள் அவைகளின் மஞ்சள் நிறத்தால் காணலாம். சுக்கிலங்கள் (Spermatozooids) பித்தநீரின் குழாய்களிலுள்ள சாலங்களிற் காணலாம். பூதிக் ஆவிமூன் அணுக்களைப் பிருக்கங்களின் குழாய்களிற் காணலாம். பாஸிலுள்ளவைபோன்ற கொழுப்பு அணுக்களை முலேரிலுள்ள கோளங்களில் காணலாம்.

விசர்க்கத்தொழிலை இச்சாலங்கள் அவைகளுடைய உயிர்த்தன்மையால் செய்துகொண்டு வருகின்றனவென்று சொல்லலாம். இவைகள் மற்ற கருவிகளின் மூலப்பொருள்கள்போலவே உற்பத்தியாகி வளர்ந்து, முதிர்ந்து கொஞ்சகால மிருந்தபிறகு தாய்ந்துபோகின்றதுமல்லாமல், அவைகளுடைய போஷிப்பைப் பத்தகிழிந்தும் இரத்தத்தினின்று பெற்று அணுக்களுக்கு வேண்டிய திரவமாகவும் மாற்றிக்கொள்ளுகின்றன. இத்தொழில் கோளங்களின் சகல பாகங்களிலும் நடந்துவருகிறதாகக் காணுகிறது.

போஷிப்புக்கும் விசர்க்கத்திற்கும் சில உவமை ஒற்றுமைகளிருக்கின்றன. விசர்க்கத்தின் பயனை யோசியாமல் விட்டுவிட்டால் அவைகள் உண்டாகும் இரத்தி இடைவிடாமல் சாலங்கள் உண்டாவதும் அழிந்துமாய் வருகிற படியாலும் உவமைமிருக்கின்றது. அதாவது கோளங்கள் சாலங்களுண்டாவதிலிருக்கின்றன. சாலங்கள் அழிவதால் விசர்க்க நீர்கள் வெளிவருகின்றன. தவிர இவ்விரு தொழில்களும் அவைகளுக்கிடையே இரக்கியங்களாகும் ஒற்றுமையேற்படுகின்றது. சில கோளங்களில் பித்த நீர் ஏன் உற்பத்தியாகவேண்டும்? வேறு சிலவற்றில் பால் ஏன் உற்

பத்தியாகவேண்டும்? இன்னும் சிலவற்றில் உமிழ் நீர் உற்பத்தியாகவேண்டுமென்று சொல்வதற்குக் காரணங்கள் தெரிகிறதில்லை. இதேமாதிரியாக ஒரு தசை முருந்தாகவும், மற்றொன்று எலும்பாகவும், வேறொன்று சதையாகவும் உற்பவிக்கும் காரணமும் அறியக்கூடவில்லை.

விசர்க்க நீர்கள் வெளிப்படும் கால அளவுகள் வித்தியாசப்படும். சிலவற்றில் விசர்க்க நீர் உண்டான உடனே வெளியாகிவிடும். சில கொஞ்சகாலம் சென்றபிறகு வெளியாகும். பிறக்கங்களில் இருப்பதுபோல இடைவிடாமல் இரத்தசத்தியின்பொருட்டு வேண்டியிருந்தால், விசர்க்க நீர்கள் உற்பத்தியான உடனே வெளியாகிவிடும். கோளங்கள், அவைகளின் தொழில் அவ்வளவு விரைவாய்ச்செய்யாமல் அசதியாயிருக்குமாகில், ஸ்திமிதப்பட்டிருக்கும் பொழுது விசர்க்க நீர்களை சேர்த்துவைத்துக்கொண்டு தெரழில்புரியும்பொழுது வெளிவிடும். சில கோளங்கள் சில சமயங்களில் நிதாவமாகவும், சில சமயங்களில் விரைவாகவும் தொழில்புரிந்து திரவங்களையும் சமயத்துக்கு வேண்டிய அளவு பொசிப்பிக்கும். உதாரணம்: கண்ணீர் கோளங்கள்.

விசர்க்க நீர்கள் கோளங்களில் குழலில் படிந்தபிறகு வெளியே வருவதற்கு குழற்கவர் சுருங்குவதால் வெளியே தள்ளப்படுகின்றது. தவிர பின்னுக்கு உசியும் திரவமும் முன்னுக்கிருப்பதை அமுத்தித் தள்ளுகின்றது. இக் குழல்களுக்கு வெளிப்புறமாத்திரம் துவாரங்கள் உடையனவாய் மற்றபுறம் அடைந்திருப்பதால் துவாரமிருக்கும் பக்கத்தில் வேகமாய் வெளிவருகின்றன.

விசர்க்க நீர்களினளவு வேறுபடும் காரணங்கள். அவைகளில் முக்கியமாய் அடுத்திருக்கும் இரத்தத்தின் அளவே காரணமாகும். ஒரு கோளத்தில் இரத்தம் விரைவாய்ச்சென்றால் அப்பொழுது அக்கோளத்தில் விசர்க்க நீர் பெருகும். இரைப்பையில் உணவு விழுந்தவுடன் அதின் சுவை இரத்தம் நிறைவதால் இரத்த வர்ணமடை

கின்றது. அப்பொழுதுதான் சீரண ரசமும் அதிகமாய் பொசிகின்றது. அதுபோலவே, முலைகளும் பால் சுறக்குங் காலத்தில் அதிக இரத்தத்தையடைகின்றன. ஒரு கருவியால் உண்டாகும் விசர்க்க நீர் அதிகப்படுமளவுக்குத் தக்கபடி இரத்த ஓட்டமடிகப்பட்டு அதிக இரத்தம் அக்கருவியில் சேருகின்றது.

விசர்க்கமடையவேண்டியவஸ்துக்கள் இரத்தத்திலடிகமாயிருந்தாலும் கோளங்கள் அதிக விரைவில் அவைகளை வெளிப்படுத்தும். அதிக தேக முயற்சியாலாவது, ஒரு பிறுக்கம் கொட்டுப் போவதாலாவது இரத்தத்தில் அதிக யூரியா இருக்கும்படித்தில் சவுக்கிய ஸ்திதியிலிருக்கும் பிறுக்கம் அதிக அளவு விசர்க்கத்தை வெளிப்படுத்தும்.

விசர்க்கத்தொழில்மேல் நரம்பு மண்டலத்துக்குரிய சக்தி.

விசர்க்கத்தொழில் நரம்பு மண்டலத்தால் அதிகமாக சக்தியைப் பெற்றிருக்கின்றது. ஆனால் உயிர் உயிரும் வேலை இவ்விஷயத்தில் நன்றாய்நியப்படவில்லை. இக்கோளங்களில் பரவியிருக்கின்ற சக்திகளை நேரில் உத்திபனப்படுத்துவதால் விசர்க்கத்தொழிலுண்டாகும். அல்லது இந்த நரம்புகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட வேறு நரம்புகள் உத்திபனமடைந்தாலும் விசர்க்கத்தொழிலுண்டாகும். பின் சொல்லிய விஷயத்தில் பிரதிகரணக்கிரியை உண்டாகின்றது. வாயில் உணவு பட்டவுடன் உமிழ் நீர்க்கோளங்களிலுள்ள நரம்புகள் எல்லாம் பிரதிகரணக்கிரியை பெற்று உமிழ் நீரை அதிகமாய் உண்டும்.

நரம்புகளால் மூளையின் பல தன்மைகள் விசர்க்க நீரை தொழில் புரியச்செய்யும். உணவைப்பற்றிய ஞானமே உமிழ்நீரை அதிகமாய் உண்டாக்கெய்யும். விசனத்தாலாவது, சந்தோஷ மதிக்கமாவதாலாவது கண்ணீர் உரும். மனோதர்மத்தைப்பொருத்தியே மூத்திரப்போக்கும் வேறுபடுகிறது. சில சமயங்களில் பயத்தால் வேர்வை யதிகரிக்கும்; பேதியும் காணுவிட்டு. விசர்க்க நீரின் தன்

மைக்கட சில மனோநர்மங்களில் ஹேறுபடுகின்றது. தாயின் விசனத்தாலாவது, மாச்சாரம், கோபம் முதலிய குணங்களாலாவது பாஸின் தன்மை வேறுபட்டு குழந்தையைக்கூட சிலவேளை பாதிக்கின்றது.

சில கோளங்கள் அதிகத்தொழில் புரிவதால் வேறு சில கோளங்களின் தொழில் நின்று போவதாகவும் காணுகின்றது. சாமித்திற்கும், பிஞ்சுக்கத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தைப் பார்த்தால் இது தெரியும்.

13-ம் அத்தியாயம்.

குழலற்ற கோளங்கள்:

கோளங்களினின்ற சாதாரணமாய் விசர்க்கிக்கப்பட்டவரும் வந்துகுகள் இரத்தத்தினின்றும் பிரிக்கப்பட்டு, அவை உற்பத்தியாகும் கருவியினாலே வெளியே தள்ளப்படுகின்றன. அப்பொழுது இவைகள் சில உடனே தேகத்துக்கு வெளியே போகின்றன. அல்லது அவைகள் மறுபடியும் இரத்தத்தில் சேரப்பெற்றால் அவைகள் சேருவதற்கு முன்னமே விசர்க்க நீர் தன்மை மாறிப்போகின்றது. உதாரணம், உமிழ்நீரும் பித்தநீரும், விசர்க்க நீரில் இன்னு மொருவகையுண்டு. அது பெருந்தகருவியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றதோ அந்தக் கருவியை விட்டு வெளிவராமல் அக்கருவியிலேயே சில மறுபாடுகளையடைந்து நினைநீருடனாவது இரத்தத்துடனாவது சேர்க்கப்பெறுகின்றது. இம்மாதிரி பொதிப்புண்டாகும் கருவிகள் தேகத்தில் சில உள் இவைகளுக்கு குழலற்ற கோளங்கள் என்று சொல்லலாம். உதாரணம் ஊண்ணீர் இம் உள்னிக் கோளமும். *

* உள்னிக் கோளம் (Thymus gland) என்பது கருவின் மார்புபுறம் திண்டி ஊதும் கோளமாம். வலிப்பதில் இதின் ஓர் பாகத்தைக் காணலாம். முதலமைப்பின் கொஞ்சமேனும் கருவியில் முழுவதும் மறைந்திருப்பதே.

கேடயக் கோளம்* என்னும் சுவாசக்குழலுக்கு முன் குறுக்காயொட்டியிருக்கும் மாம்சகண்டமும் மூத்திரக் குண்டிக்காய் மேலிருக்கும் கோளங்களும் தேவதானு கோளமும்† ஆகிய இவைகள் எல்லாம் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவைகளாம். தொண்டைக் கோளங்களும் இவ்வகுப்பில் சேர்ந்தவையென்றே சிலர் சொல்லுவார்கள்.

இவ்வகைக் கோளங்கள் விசர்க்க கோளங்களின் தொழிலொத்த தொழில்களைப் புரிகிறதென்பதற்குள்ள ஆதாரமெல்லாம் இவைகளின் கட்டடங்கள் அக்கோளங்களின் கட்டடங்கள்போல இருப்பதினாலேயாம். ஆயினும் இவைகளுள் அவைகளைப்போல திரவத்தை வெளிக் குகொண்டுவரக் குழல் கிடையாது.

மண்ணீரல்.

மண்ணீரலின் கட்டடம். அந்தர்வேஷணத்தினின்ற வெளிப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிணநீர்ச்சவ்வால் மண்ணீரல் முழுவதும் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இச்சவ்வினடியில் கருவியின் சவ்வுச்சொக்காயிருக்கின்றது. கருவியின் சொக்காய்ச் சவ்வானது சம்பந்தத் தசையாலாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளில் அனேக நெடுநீர்நுரமுத்தக்க தசைகளும்மைந்திருக்கின்றன. இத்தசைகளினடியில் பட்டையற்ற சதைத்தசைகளும் கருவியை மூடியிருக்கின்றன. இச்சதைத்தசைகளினின்றும் அனேக நார்கள் கருவியினுட் செல்லுகின்றன. இவைகள் பற்பல பிரிவாகப் பிரிந்தும், பிரிந்தபிறகு வேறு இடங்களில் ஒன்றுடன் ஒன்றுய்க் கூடியும்

* கேடயக் கோளம் (Thyroid gland) தமரகத்தில் பக்கத்தக்கொன்று யிருக்கும் இரண்டு அண்டாகார இதழ்களால் ஆக்கப்பட்ட கடம். இவைகளை இசைத்தக்கொண்டிருக்கும் சங்கிப்பு தமரக வளையங்களின் மேற்பகுதியின் குறுக்கே போகும்.

† தேவதானு கோளம் (Pineal gland). இது மூளையின் சாம்பல் திரவத்து; முகனத்தின் மேல்பக்கத்தில் பாவம்போல் வளைந்திருக்கும் வெள்ளை நாய்க்கயிற்றின் பின்புறப் பரப்பில் இருக்கும். சதைத்த மேட்டுக்கு மேல்புற யிருக்கும் கோளம். வவ்வாடெனும்புகளின்மேல் ஒட்டியிருக்கும் மூளைக் கோளம்.

கருவியெங்கும் பரவியிருக்கின்றன. இவைகளினிடையே மண்ணீரல் வஸ்து அல்லது மண்ணீரல் வழக்கையிருக்கின்றது. அதைத் தாங்க இந்நார்க் கூட்டங்கள் தருந்த கட்டடமாகியிருக்கின்றன. மண்ணீரற் கழுத்துப்புறத்தின் வளைவில் காணும் பிளப்பில், அதாவது இரத்தக் குழல் களும், நரம்புகளும், நிணநீர்த்தாரைகளும் பிலகத்தினுட் செல்லுமிடத்தில் இந்த நார்ச்சொக்காயானது நீண்டு இவைகளுடன் உட்புகுந்து நாடி நாளங்களுக்குப் போர்வையாகப்போயிருக்கும். இப்போர்வையும் முன் சொன்ன நார்க்கட்டடங்களுடன் ஒட்டியிருக்கின்றது.

பீலிக-வஸ்து அல்லது மண்ணீரல் வழக்கையென்பது கறுப்புக்கலந்த சிவப்பு நிறமாய் அல்லது மங்கிற் சிவப்பு வர்ண்மாய்க் காணும். இவை முழுதும் சாலங்களாயிருக்கும். இவற்றில் சில வெண்குருதிக்குறுகடங்களிப்போல் தானியரூபமாயுள்ள சாலங்களாயிருக்கின்றன. ஆனால் இச்சாலங்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே பல வித ரூபமாறுபாடல்களையடையும் அசைவுகளையுடையனவாயிருக்கும். மற்றவைகள் செங்குருதிக்குறுகடங்களாகியிருக்கின்றன. மேலும் சில சாலங்கள் அதிகப் பெருத்துக் காணுகின்றன. இவையுள் இரத்தத்திலிருக்கும் வர்ணவஸ்துபோன்றவையிருக்கின்றன.

வாஸீரலில் மண்ணீரற் கழுத்தினுட்புகும் பீலிக நாடி பிரிந்து, பிரிவுகள் பல பிரிவாகி பீலிக-வஸ்துவுட் புகும். ஆனால் இந்தச் சிறு பிரிவுகள் பெரிய பிரிவினிரண்டுக்கு மத்தியில் மாத்திரம் திரும்பிச்சேரமாட்டாது. இப்பிரிவுகளைச் சுற்றிலும் முன் சொன்னபடி சதைச் சொக்காயும் போர்த்தியேயிருக்கின்றது. இப்பிரிவுகள் தந்துகிகளாக முடிந்து, தந்துகிகள், சிறியநாளக்குழல்களில் சில சேரும். மற்றவை தடாகம்போன்ற இடங்களில் தங்கி அவ்விடமிருந்து நாளங்கள் உற்பத்தியாகும். சிறிய நாளங்களின் கவர்கள் அவ்வளவு கட்டட் பூர்த்திபெற்றவைகள் அல்ல. ஆகையால் அவைகளின் வழியாய் இரத்தத்தில் வெண்

சாலங்கள் போய் ஏராளமாய்ச் சேருகின்றன. சேர்ந்த பிறகு இரத்தமவைகளை அடித்துக்கொண்டு போகின்றது.

ஆற்றின் தண்ணீர் எப்படி அதனடியிலிருக்கும் கால்களின்கீழே போயிருக்குமோ அப்படி இரத்தம் வழக்கையின் வலைகளினுட்கேன்று வெண்சாலங்களின் மத்திய பாகங்களையும் போய்ச்சேருகின்றது. நாடி இரத்தம் இப்படி வழக்கை மத்தியில் விழுந்த பிறகு நாளங்களுட் புகுகின்றது. இருக்கும் நாளங்கள் அதிக பெருத்தவைகள். அதிகமாய் விரியும் தன்மையுள்ளவைகள். மண்ணீரலின் தசைகள் எல்லாவற்றிலும் பல நுண்ணிய குழல்கள்மைந்து அதிக குழாய்த்தன்மையுடையதாய்கையால் சீக்கிரத்தில் இரத்தத்தை நிறைத்துக்கொள்ளும் தன்மையுடையதாகவிருக்கின்றது. இரத்தம் நிறைந்து விரிவதின் அளவு சொக்காயின் நார்ச் சதைத்தசைகளினால் மட்டுப்பெடும்.

மண்ணீரலை குறுக்கே அறுத்துப் பார்த்தால் பல சிறிய வெண்மை நிறமுடைய குத்துகள்காணும். இக்குத்துகள் ஸ் முதல் ஸ் அங்குலக் குறுக்களவுள்ளதாகக் காணும். இவைகளுக்கு Malpugian பைகள் என்று பெயர். இப்பைகளின் கட்டடம் நிணநீர்க்கோள கட்டடங்கள்போலக் காணும்.

குழலற்ற கோளங்கள் இரத்தம் மிக்க சிறப்படைய உதவுகின்றதென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். பிண்ட ஜன் மத்திலும் சிறு குழந்தையிலும் தேகம் வளருவதற்காக மிக்கச் சிறந்த இரத்தம் ஏராளமாய் வேண்டியிருக்கின்றது. உள்ளிககோளம், தேகத்துக்குத்தக்கவண்ணம் தேக வளர்ச்சி, முதிர்தல், இவைகள் நடக்கும் சீருக்குத்தக்கபடி தக்கதொழில் புரிகிறதென்று காணுகிறது. மனிதன் பெரியவனாகும்பொழுது தேகத்தின் முதிர்வு முடிந்ததென்று சொல்லக்கூடிய காலத்தில் இக்கோளம் அழிந்து கடைசியில் காணாமல் மறைந்துபோகும். சுவாசக்குழல் முன் குறுக்கே யொட்டியிருக்கும் மாம்சகண்டங்களும், மூத்திர குண்டிக்காய்மேலிருக்கும் கோளங்களும் கொஞ்

சம்கூட தொழில்புரிவது நின்றுபோகாமலிருந்தபோதிலும், பிண்ட ஜன்மத்திலும், குழந்தைப்பருவத்திலும் அதிக பெரிதாயிருக்கின்றன. வயதுவரவர அவைகள் அளவில் குறைந்து தொழில் புரிவதும் மட்டுப்பட்டுக் கொண்டுவருகின்றன. பிஸிகம்மாத்திரம் அதன் அளவு குன்றுகிறதில்லை. தேகம் பெரிதானால் அத்துடனானாவும் பெருக்கும்.

குழலற்ற கோளங்கள் வயது வந்த பிறகு உயிருடன் வாழ அவசியமானவைகளல்ல. உள்ளிக்கோளம் அழிந்து காணாமல்போகின்றது. சுவாசக்குழலருகேயிருக்கும் கோளங்கள் சில வியாதிகளால் அற்று விழுந்துபோய்விட்டால் தேகத்திற்கு யாதொரு உபாதியும் காணுகிறதில்லை. பிஸிகத்தை பிராணிகளினின்றும், சில சமயங்களில் மனிதரினும் எடுத்துவிடப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் யாதொரு கெடுதியும் தோற்றவில்லை.

குழலற்ற கோளங்களின் தொழில்களைப்பற்றி நன்றாய் தெரியவில்லை. சுவாசக்குழல் பக்கத்து கோளங்களைப்பற்றியும் மூத்திரக் குண்டிக்காய் கோளங்களைப்பற்றியும் எத்தொழில் புரிகின்றனவென்று சுத்தமாயொன்றும் தெரியப்படவில்லை.

மாரிக்கொதுங்கும் பிராணிகளில் உள்ளிக்கோளம் வாழநான்முழுதுயிருக்கின்றது. மாரிகாலம் வரும்பொழுதெல்லாம் கோளத்தில் கொழுப்பு அடைக்கப்பட்டுப் பெருத்துப்போகின்றது. ஆகையால் அவ்வித ஜீவன்கள் மாரிக்கொதுங்கி வேலையற்று இருக்கும்பொழுது சுவாசத்தையும், தேக உஷணத்தையும் காப்பாற்ற, அந்த இளைத்துப்போகும் காலங்களில் உதவுகின்றதென்று சிலர் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள்.

மண்ணீரலைப்பற்றி இதைவிட கொஞ்சம் அதிகமாய்த் தெரிந்திருக்கின்றது.

(1) சீரணத்தொழில் முடியுங்காலத்தில் கிரமேன இக்கருவி பெரியதாக விரிவதாலும், அதேகாலத்தில் மண்

அத்தி.]

சர்மமும் அதன் விசர்க்கங்களும்.

ணீரல் வழக்கையுள் அனேகமான வெள்ளைக்கருச்சத்துப் பொடிகள் காணுவதாலும், பிறகு கிரமேன இப்பொடிகள் காணாமல் மறைந்துபோவதாலும் தோற்றுகிறதென்னவென்றால், இக்கருவி உணவிலிருக்கும் வெள்ளைக்கருச்சத்தை வேண்டியபடி மாற்றி தன்னிடத்தில் சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு தேகத்திற்கு வேண்டுமளவு இரத்தத்தில் சேர்க்குமென்பதேயாகும்.

(2) வெண்குருதிக் குறுகடங்கள் இவைகளில் உண்டாகிறதென்றும் சிலர் எண்ணுகிறார்கள்.

(3) செங்குருதிக் குறுகடங்கள் தங்கள் தொழிலை முடித்தபிறகு இவ்விடத்தில் வந்து நசித்துப்போகிறதென்றும், பிறகு இரத்தத்தில் வர்ண வஸ்துக்கள் இதில் நின்று வேறு செஞ்சாலங்கள் உற்பத்திக்கு ஆஸ்பதமாயிருக்கிறதென்றும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

(4) இரைப்பைபின் சீரண விஷயத்தில் தொழில் புரியும்பொழுது உதரநாடிகளுக்கு ஒத்தாசையாக இரத்தத்தைச் சேர்த்து வைத்துக்கொண்டு வேண்டியதை கொடுத்துதவுகிறதென்றும் சிலர் கண்க்கிறார்கள்.

14-ம் அத்தியாயம்.

சர்மமும் அதன் விசர்க்கங்களும்.

உயிர் வாழ்க்கையின் விசாரத்தை சம்பூரணமாக்கவும், முக்கியமாக இரத்தத்தினின்று தேக போஷிப்புக்கு வேண்டிய வஸ்துக்களை பிரிப்பதில் சர்மத்தின் கட்டடங்களைப்பற்றியும் அதின் தொழிலைப்பற்றியும் சங்கதிகளைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியமாயிருக்கின்றது. அதன் தொழிலை பின்வருமாறு பகுத்துச் சொல்லலாம்.

(1) அதற்கு அடியிலிருக்கும் தசைகளை காப்பாற்றும் வெளிப்போர்வையாகவும்.

(2) தொக்ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் உணர்ச்சிக் கருவியாகவும்.

(3) முக்கியமான விசர்க்க கருவியாகவும்.

(4) தேக சீதோஷணஸ்திதியை சீரில் வைக்கும் கரு வியாகவும் பிரிக்கலாம்.

சர்மத்தின் கட்டடம்.

சர்மத்தின் இரு புரைகளிருக்கின்றன. உட்புரை குழல்தன்மையமைந்த தசையாலமையப்பட்டது. அதற்கு உட்தோல் என்றுபெயர். இதற்குமேல் வெளிப்புறப் போர்வையாக ஒரு பரிஸ்தாபிதத் தோலுமிருக்கின்றது. இது வெளிப்புரை; இதற்கு மீத்தோல் என்றுபெயர். உட் தோலிலும் அதனடியிலும் பல குறிப்பிட்டதொழில் களுடைய பல கருவிகள் புதைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. ஸ்வேத கோளங்கள், நிணக்கோளங்கள், மயிர்வித்துரைகளும், அதன் மேல்பரப்பில் வேர்க்குருபோன்ற சிறிய மேடுகளும் இருக்கின்றன. சர்மத்தின் உபாங்கங்களாகிய ரோமமும், நகமும் மீத்தோலின் மாறுபாடுகளாயிருக்கின்றன.

மீத்தோல், செதில்களொத்த பலபடை பரிஸ்தாபிதச் சாலங்களாலானவை. ஆயினும் அடியிலிருக்கும் பைகள் விருத்தமாயும் நீண்டிருக்கும். நீண்டிருப்பவைகள் சர்மத்துக்கு நேர்க்கோணமாக அவைகளின் நீளத்தின் மையமிருக்கும்படி அமைந்திருக்கின்றன. மேற்புறமிருக்கும் பைகள் தட்டையாயும் செதில்போன்றுமிருக்கும். மீத்தோலின் கீழ்பாகம். மேல் பாகத்தைவிட மிருதுவாயும் அதிக ஒளி ஊடுருக்கூடாததாயுமிருக்கும். இதற்கு சிலேஷ்ம் லலை * பென்று பெயர். மீத்தோல் பைகளிலனேகம் வர்ணவஸ்துவை உடைத்ததாயிருக்கின்றன. இது பலவிதமாக வேறுபடுகிறபடியால்தான் மனிதனிலும், மனிதஜாதிகளிலும் சர்மத்தின் பலவிதவர்ணங்கள் ஏற்படுகின்றன.

* செலஷ்மலலை (Reti-mucosum) மீத்தோலுக்கும் நிகத்தோலுக்கு மிடையில் சர்மத்தின் வர்ண அணுக்களை அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் மிருதுவான படை அது வலையுமல்ல, செலஷ்மமல்ல.

வர்ணவஸ்துக்கள் முக்கியமாக சிலேஷ்மவலைகளாயிருக்கும் அடிப்புறச் சாலங்களிலிருக்கின்றன. இச்சாலங்கள் கிரமேண அதன் கீழ்ச்சாலங்களால் மேலுக்கு தள்ளப்பட்டு வரும்பொழுது அவைகளுக்குமேல் முன்னிருந்த சாலங்கள்மாதிரி தட்டையாகி செதில்போலாய்விடும். மேலிருக்கும் சாலங்கள் உதிர்ந்து உதிரும் சாலங்களுக்குப் பதிலாக வேறு சாலங்கள் கீழேயிருந்து மேலுக்கு தள்ளி வந்துகொண்டிருக்கிறபடியால்தான் மீத்தோலின் வளர்ச்சி உண்டாகிறது.

மீத்தோலின் மந்தம் தேகத்தின் பல பக்கங்களின் மேல் உண்டாகும் உரைவது, அமுத்துதல் முதலிய பல வித ஹானிகளின் காரணங்களுக்கு உட்படும். வண்ணம் தக்கபடி வேறுபட்டிருக்கும். சில அளவுகளுக்குட்பட்டு, இப்போர்க்கொத்த ஹானிகளுக்கு அதிகமாய் உட்படுமளவுக்கு மீத்தோல் தக்கபடி அதிகமாய் வளரும். வளரும் ளவுக்கு அதிக மந்தமாயும் கொம்புத்தன்மையடைந்தும் வரும். இப்படியாவதால் உணர்ச்சியுடைய குழற்றன்மை பொருந்திய உட்டோல் வெளிப்புற ஹானிகளினின்றும் காப்பாற்றுவதுமல்லாமல், இரத்தச் குழல்களினின்றும் திரவம் வாயுரூபமாய் வெளிக்கிளம்பிப்போகாமலும் காத்துக்கொள்ளுகின்றது. மீத்தோலுக்குப் பின் சொன்ன குணங்கள் உண்டென்பதைக் காணவேணுமானால் செத்த ஒரு ஜதை காலையாவது, கையையாவது காற்றாடவைத்து அஜ்ஜதையில் ஒன்றின் மீத்தோலைமாத்திரம் நீக்கிவிட்டால், ஒருநினைத்தில் மீத்தோல் நீங்கின அவயவத்தின் தோல் உலர்ந்து பழுப்பு நிறமடைந்து கொம்புத்தன்மையுள்ளதாய்விடும். மற்ற அவயவம் ஏறக்குறைய அதின் சுபாவ ஸ்திதியிலுள்ள ஈரத்தைபுடையதாயிருக்கும்.

உட்தோல். பலவித கனநிசையுடைய கொழுப்புத்தசைகள், சாலத்தசைகள் இவைகள்மேல் பரவியிருக்கும் படையாகும். இது நெருக்கமாயும், உறுதியாயும், நெகிழ்ந்துரடும் தன்மையுள்ளதாயுமிருக்கும். கட்டடத்தைபு

டையதாரும் நார்-சாலங்களுடைய தகைச்சுட்டுகளால் பலவிதமாக பல பக்கங்களிலும் பின்னப்பட்டு இருக்கின்றது. இப்படிப் பின்னியிருப்பதால் பின்னல் மத்தியில் அனேக ஒட்டைகள் காணும். இவ்வோட்டைகள் அடித்தோளின் அடிப்புரைகளில் பெரிதாகவிருக்கும். அவ்விடங்களில் அவ்வோட்டைகள் கொழுப்பால் நிறைந்திருக்கும். மேல்புறங்களில் ஒட்டைகள் சிறியதாயும் சில சமயம் ஒட்டைகளைடைந்து காணாமலுமிருக்கும். சாதாரணச் சதை நார்களும் ஏராளமாயிருக்கின்றன.

உறுதியாலும், வளையும் தன்மையாலும், நெகிழ்ந்தாரமும் சக்தியாலும், சர்மம் தேகத்துக்கு மேற்போர்வையாக இருப்பதற்கும், வெளிப்புறத்தினின்று ஏற்படக்கூடிய ஹானிகளினின்றும் உட்புரக்கருவிகளை காப்பதற்கும், தேகத்தின் பல அசைவுகளுக்குத் தக்கபடி வளைந்து கொடுக்கவும் உதவுகின்றது.

ஏராளமான நரம்பு நார்களும் இதில் இறங்கியிருப்பதால் இன்னம் ஒரு பெரிய குணமுமுடைத்தானதாயிருக்கிறது. அது தொக் என்னும் உணர்ச்சியைத் தரும் கருவியாவதாகும். தேகத்தின் பரப்பு எல்லாம் மிக்க உணர்வுள்ளதாக இருக்கின்றது. ஆனால் அநிற்குட விசேஷமான தொக் உணர்வு அதிலிருக்கும் வேர்க்குருபோன்ற மேடுகளுக்கு அதிகமாயிருக்கின்றது. இச்சர்மமேடுகள் உள்தோலினின்று நீண்டிருக்கும் கூச்சான மேடுகளாகும். இவைகள் ஒரு துணியுடையதாயும், சில பல துணிகளையுடையதாயுமிருக்கும். சில அதிக மேட்டைத்துமிருக்கும். சில பாகங்களில் மற்ற பாகங்களைவிட அதிக நெருக்கமாய் உள்ளவைகளாகும். உள்ளங்கை மேல் பரப்பிலும் உள்ளங்கால் மேல் பரப்பிலும் அதிக ஏராளமாயும், மிக்கமேட்டும் காணும். ஆகையால்தான் இந்தப் பாகங்களில் தொக் உணர்வு மிக்க அதிகமானதாயிருக்கின்றது. இப்பாகங்களில் அவைகள் இரட்டைவரிசையில் சமதூர ரேகைகள்போலவும், வளையப்பட்ட ரேகைகள்போலவும்

ஒன்றினின்று மற்றொன்றுக்கு மத்தியில் பள்ளங்களையுடையதாகவுமிருக்கின்றன. தேகசர்மத்தின் மற்ற பாகங்களில் இவைகள் இவ்வளவு அடர்த்தியாகவோமல்லும் மேல் பரப்புக்கு மேல் புடைத்தெழாமலும் இருக்கின்றன.

இவைகளின் சராசரி நீளம் 1/8 அங்குல நீளமுடையதாகவும், அடி மட்டத்தில் 1/4 அங்குல குறுக்களவுடையதாகவுமிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு குறுவிற்கும் இரத்தம் ஏராளமாய் அடித்தோலிலிருக்கும் தந்துகிக்கு மூலவலைகளினின்றும் வந்து சேருகின்றது. இவ்வலைகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாடிசுழித்துக்களும், இச்சமித்துக்கள் பல தந்துகிப் பின்னல்களாகப்பிரிந்து அதன் வஸ்துக்குள் பிரவேசித்திருக்கின்றது. பிறகு இவைகள் ஒன்றுபடச்சேர்ந்து சிறிய நாளங்களாகி அதன்மீயில் அதை விட்டுச்செல்லுகின்றன. இப்படி இவைகளுக்கு இரத்தம் ஏராளமாய் வருகிறபடியால்தான் சர்மத்தில் இரத்த ஒட்டடம்திகமான காலத்தில் இவைகள் புடைத்து வேர்க்குருகளாகக் காணுகின்றன. இவைகளில், இதுவுமல்லாமல் நரம்பு நார் துணிகளும் இருப்பதால் உணர்ச்சி குறையும் அதிக தீக்ஷணமாயிருக்கின்றது.

உணர்ச்சியறிவைத் தருவதற்கு உதவும்படியான குருக்களாயிருந்தபோதிலும் வெளி வஸ்துக்களை இவைகள் நேரில் தொடுகிறதில்லை. சர்மத்தின் மற்ற பாகங்களைப்போலவே இவைகள்மேலும் மீத்தோல் போர்வை பரவியிருக்கின்றது. குருக்கள் மீத்தோலில் மிக்க நெருக்கமாய் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. குருக்களுக்கு இடையில் மீத்தோல் மத்தமாகவும் அவைகளின்மேல் அவைகளின் மட்டத்துக்குச் சமனாகவுமிருக்கின்றது. மீத்தோலை உரித்துப்பார்த்தால் பல பள்ளங்களும் மேடுகளும் உட்பக்கப் பரப்பிற் காணலாம். இப்பள்ளமேடுகள் குருக்களினது இடத்திற்கும் அவைகளின் இடைகளுக்கும் ஒத்து இருக்கும். மீத்தோலானது நிரவம் வெளிவராமல் செல்

யும் சக்தியினால் உட்தோளினின்றும் இரத்தம் வாயு ரூபமாக வெளிச்செல்லாமல் தடுத்து நிற்பதும்ல்லாமல் உணர்ச்சியுடைய உட்தோல்களுக்கு போர்வையாகவும் உணர்ச்சியுடைய ஒத்தரசையாகவுமிருக்கின்றது. குருக்களிடையில் மந்தமாகவும் குருக்கள் உச்சியில் சன்னமாகவுயிருப்பதால் சர்மத்தின் உணர்ச்சிதரும் கேலபரப்பமுடிவதையும் பல உணர்ச்சிதரும் பாசங்களாகப் பிரித்து விடுகிறது. இப்பாகம் ஒவ்வொன்றும் (குருக்கள் ஒவ்வொன்றும்) தனிமையான உணர்ச்சியை உண்டாக்கும் சக்தியுடையனவாக அய்விடுகின்றது. குருவை முடிபுருப்பதாலும் அதின் உணர்ச்சி கெட்டை யெடுத்துவிடுகின்றது. இல்லாவிட்டால், அதாவது இப்படி மீத்தோல்கள் குருக்களை முடியிராவிட்டால் வெளி வஸ்துக்கள் கொடும்பொழுதெல்லாம் தொக்குவதற்கு பதிலாக வேதனைக்கு இடமாகிவிடும். மீத்தோல் எரிந்துபோன விடத்தில் இருக்கும் மிக்க உணர்வினால் வலியையும், அதனால் தொக்குவதற்கும் உண்டாவதைப் பார்க்கலாம். குறிக் காலிலிருப்பதுபோல மீத்தோல் அதிக மந்தமாயிருந்தாலும் உணர்ச்சி ஞானம் குறைந்துபோய்விடுகிறது. ஏன் எனில் அடர்த்தியாயும் கொம்புத்தன்மையடைந்துமிருக்கும் தோல்முலமாக குருக்களுக்கு உணர்ச்சியெய்திவிடுகின்றதில்லை.

ஸ-வேத கோளங்கள். குருவரிசைகளுக்கு இடையில் குறுக்கேயிருக்கும் பள்ளங்களிலும் குருக்களின் அடிமட்டத்துக்கிடையிலும் ஸ-வேத கோளங்கள் அல்லது வேர்வைக்கோளங்கள் என்பனவைகளின் குழல் வாய்களிருக்கின்றன. இத்துவாரங்கள் வழியாக சர்மத்தால் விசரக்கமாக்கப்படுகிற ஜல வாயு வஸ்துக்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன. இக்கோளங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் கோளக்குழல் கழன்று பின்னிக்குண்டிருக்கின்றது. இவைகளைச் சுற்றிலும் இரத்தக்குழல்கள் இருக்கின்றன. கோளங்களும் உட்தோலுக்கடியிலிருக்கும் கொழுப்புத்தசைகள் மத்தி

யில் புதைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கோளங்களினின்றும் கொளக்குழல்கள் சுருண்டு சுருண்டு மேலுக்கு வந்து அடித்தோலைத் தாண்டின பிறகு நேராக மேலுக்குப்போகும். சில் சமயங்களில் கோளச்சென்ற பிறகும் மறுபடியும் சுருண்டு சுருண்டு செல்லும். மீத்தோலுக்கு வந்த பிறகு கோளக்குழல்கள் கபாடம் போன்ற துவாரவழியாக வெளிகுசுச் செருகின்றன. இக்குழல்கள் உட்புறம் மீத்தோலையனுசரித்துப்போகும். பரிஸ்தாபித்தோல் படிந்திருக்கும்; இதில் ஸ்தம்பமாகப் பரிஸ்தாபிதப் பைகள் இருக்கின்றன.

நிணக்கோளங்கள். வேர்வைவால்லாமல் சர்மம் இன்னொருவித விசரக்கத்தை வெளிப்போக்குகின்றது. அது ஒருவிதமான கொழுப்பு வஸ்து. இந்தத்தொழில் புரிய அதற்கு வேறு ஒரு வகைக்கோளங்களிருக்கின்றன. அவைகளுக்கு நிணக்கோளங்கள் என்று பெயர். இவைகளும் தேக சர்மமெல்லாவற்றிலும் ஏராளமாயிருக்கின்றன. தலை முகம்போன்ற மயிர் அதிகமாய் உற்பத்தியாகுமிடங்களில் அதிக ஏராளமாயிருக்கும். தவிர் குதம், நாசி, உதடுகள், வெளிக்காது இப்படிப்பட்ட பல துவார வாயில்களிலும் ஏராளமாயிருக்கின்றன. ஆனால் உள்ளங்கையிலும், பாதத்தடிப்புறத்தில் ஊன்றுமிடங்களிலும் கொஞ்சம் கூடக்கிடையாது. இக்கோளங்கள் அதிக துட்பமான பைகளாலாக்கப்பட்டு அவையுள் மிருதுவான எண்ணை வஸ்துக்களையடக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. இவைகளைச் சுற்றிலும் அதிதுட்பமாய் இரத்த தத்துவங்களும் இருக்கின்றன. இக்கோளங்களின் குழாய்கள் வெளிப்புறம் வருகின்றன. மயிர்களிடையில் வாயுடையதாயிருக்கும். அதிகமாக இவைகள் ரோம வேர்களில் வாய்களையுடையதாக விருக்கும்.

15-ம் அத்தியாயம்.

ரோம நகர கட்டடங்கள்.

ரோமம். மீத்தோலின் மாதுபாடாலும் வளர்ச்சியாலும் மயிரகள் உற்பத்தியாகின்றது. வெளிப்புறத்தில் மெல்லிய செதில்களால் ஒரு படை சுற்றிக்கொண்டிருக்கப்பட்டிருக்கும். மேற்கூரை ஒடுகள் போல ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அதிக நெருக்கமாய்ச் செதில்கள் படிந்திருக்கும். இதற்கு ரோம மீத்தோல் என்று பெயர். இதற்கடியில் ஒரு படை நீண்ட கொம்புத்தன்மை பெற்றவைகள் படிந்திருக்கின்றது. இவைகள் அதிக நெருக்கமாயிருப்பதால் பார்வைக்கு தசைகட்டட மூடைத் தானது போலக்காணும். மனித தேகத்தில் ரோமத்தினுட்புறமெல்லாம் இப்பைகளாகவெயிருக்கும். சில வற்றில் பைகள் மத்தியில் சொல்ப இடம் இருக்கும். அதில் கொழுப்பு அணுக்களும் அல்லது வர்ண வஸ்து அணுக்களாயிருக்கும். ரோமத்தின் வேர்க்கால்கள் சர்மத்தின் வெளிப்பரப்பிலிருந்து குழல் ரூபமாக கீழ்க்கிறங்கி இருக்கும். இது சர்மத்தடியிலிருக்கும் கொழுப்பினுட்புகுந்திருக்கும். ஸுவேத கோளங்களைவிட அதிக ஜுமாய்ச்சென்று இருக்கும். அடியில் குழல்கள் விரிந்து பெரியதாகி நீட்டுப்போக்காகப் போனவைகள் அவ்விடத்தில் கொஞ்சம் வளைந்துகொண்டிருக்கும்.

மீத்தோல் அனாமிசு அபிபெயசன் இக்குறையில் படிந்திருக்கின்றன. இவ்வேர்க்கால்களின் சுவர்கள் மெல்லிய சவ்வாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வேர்க்கால்களின்மேல் உத்தோலின் குறுகலிருக்கின்றன. இக்குறுகலினின்றும் மீத்தோல் பைகள் உற்பத்தியாகி ரோமம் உண்டாகின்றது. வேர்க்கால்களின் உட்புறச்சுவர்கள் மீத்தோல் பைகளால் படியப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு ரோமத்தைப் பிடுங்கினால் வேர்க்கால்களின் உட்புறப்பாடையும் வெ

ளிப்புறப்பாடையிலோரு பாகமும் அத்துடன் வருகிறதைக் காணலாம்.

நகங்கள். ரோமம் மாதிரியே நகமும் மீத்தோல் பைகளின் மாதுபாடாக விருக்கின்றது. தோலின் மேல் பரப்பிலிருக்கும் பைகளிப்பால் அடியிலிருக்கும் பைகள் விருத்தமாகவும் அல்லது நீண்டதாகவுமிருக்கின்றது. மேலே இருக்கும் பைகள் தட்டையாயும் செதில்கள் போலவுமிருக்கின்றன. இவைகள் கொம்புத்தன்மை அபிபெயசுடைந்துமிருக்கின்றன. உத்தோல் விசேஷ மாதுபாட்டால் நகம் உண்டாகும் வஸ்துவுக்கு matrix வழக்கையென்று சொல்லலாம். நகத்தின் பின்பக்கத்து ஓரம், அதாவது நகத்தின் வேர் வழக்கையில் பிளரபோன்ற பள்ளத்தில் புதைந்திருக்கின்றது. முன்பக்கம் வெநெறையுடனும் சம்பந்தப்படாமல் விரல் துணிச்சப்புறம் நீண்டிருக்கும்.

நகத்தின் மத்தியபாகம் அகலத்தின் அடிப்படி வழக்கையின்மேல் படிந்திருக்கும். வழக்கையை இவ்விடத்தில் நகத்தின் பிடுக்கையென்று சொல்லுவார்கள். வழக்கையினிந்தபாகம் ஒரே சமனாயிராமல் கீளத்தில் மேல் பள்ளமாயிருக்கும். இவைகளினதும் மீத்தோல் பைகள் உற்பத்தியாகி நகங்களாகும்.

மீத்தோல் ரோமம் இவைமாதிரியே, நகம் வளருவது யெப்பறையென்றால், அடியினின்றும் பின்பக்கத்தினின்றும் இடைவிடாமல் பைகள் உற்பத்தியாகி, அழிந்து போகும் பைகளாகும் அல்லது அறுத்தெறியும் பைகளாகும் பதிலாக வந்துகொண்டேயிருக்கும். நகத்தின் பின் ஓரம் தோலின் பள்ளத்தில் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நகம் வளரும்பொழுது பின்னுக்குச் செல்லத் தடங்கல் உண்டாகி முன்னுக்கு வரும். அப்படி வளர்ந்து நீளங் காலத்தில் அடிப்புறம் பைகள் சேர்வதால் மந்தமாகின்றது. விரல்துணிச்சப்புறம் நீண்டுவிட்டால் அப்படி

நீண்டிருக்கும் பாகத்திற்கடியில் பைகள் சேர இடமில்லை யாகையால் நகம் நீண்டுகொண்டே போகும். பிறகு தடிக்க இடமில்லை. கடைசியாக நீண்டபாகம் நசித்தாவது விழுந் துவிடும், அல்லது அறுத்தெறிந்துவிடுகிறார்கள்.

சர்மத்தின் விசர்க்கம்.

முன் சொன்னபடி சர்மத்திலிருவன்கப்பட்ட விசர்க் கங்களுண்டு. நிணக்கோளங்களாலும் ரோமவோர்களாலும் வரும் விசர்க்கம் ஒன்றும், இதைவிட அதிக திரவ ரூபமாயுள்ளதாயும் ஸ்கவேத கோளங்களால் வெளிப்படு த்தப்பட்டதுமான வேர்வையென்று மறுமுன்னும் உள், நிணக்கோளங்களாலும் ரோம வோர்களாலும் வெளிப்ப டுத்தப்படும் வஸ்துக்களை ஒன்வினின்னு ஒன்றாய் பிரிப்பது அசாதகியமாயிருக்கின்றது. ஆனால் இவை நின்றும் வரும் வஸ்துக்களில் எண்ணை வஸ்துவும் பிராணியினின்று வெளி ப்படும் ஓர் மூல வஸ்துவும், ஸ்டியரின் என்னும் வஸ்துவும், உதிர்ந்து போகும் பரிஸ்தாபிதச் சாலங்களுடனும் பையி னுவளிருக்கும் வித்துகளுடனும் கூடியிருக்கின்றன. சில பாகங்களில் கொஞ்சம் வாசனை வஸ்துக்களும் வெளியா கின்றன. இதில் சில வாயுக்கள் இருக்கின்றன (caproid, butyric, and ricic acids). பிண்டத்தின்மேல் பூசியிருந் தும் எண்ணைப் பூச்சின் தன்மையுடையதென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இதன் பிரயோசனம், சருமத்தை மிருதுவாக்கி வைத்துக்கொள்ளவும், சுரப்பசையுடனிருக் கச்செய்யவும் பயன்படுகிறது. அதன் எண்ணைத் தன்மை யால் மேற்பரப்பினின்று நரம் வாயு ரூபமாய் வெளிப்ப டாமல் கொஞ்சம் நடுக்கவும், சருமத்தில் சுரமிருப்பதா லுண்டாகக்கூடிய கெடுதியைத் தடுக்கவும் உதவுகின்றது. அந்தந்த ஸ்தானங்களில் தேகத்திற்கு உபயோகப்பட்டிரு ந்தபோதிலும், தேகத்தின் வெளியிலும் நீக்கப்படுகின்றப டியால் இதை விசர்க்கங்களில் ஒன்றாய்ச் சேர்க்கவேண்டி யது. இரத்தத்தை சுத்திசெய்யும் சக்தி இதற்குண்டா வென்பது தெரியவில்லை.

ஸ்கவேத கோளங்களால் விசர்க்கப்படும் திரவம் அதிக நிர்தர்மம் ஆகிறபடியால், ஆங்குகொண்டேவரும் பொழுதே வாயுரூபமாய் மாறி வெளியாகிவிடும். ஆனால் அதிக பலமான தேசமுயறி செயாபுங்காலத்திலும், வெ ளிப்புற உஷ்ணத்திற்குட்படும்பொழுதும், சில வியாதி களிலும், வாயுரூபமாய் மாறுபடல் தடங்கலப்பட்டாலும் விசர்க்கம் உணர்ச்சிக்குத் தோற்றத்தக்கதாகி சர்மத்தின் மேல் நீர்த்திவிடையோல சேர்ந்து நிற்கின்றது. ஆகையால் வேர்வை என்பதை இரண்டு வகுப்புகளாக பார்க்க லாம். வெளிகுதவரும்பொழுதே வாயுரூபமாய் மறைவு தொன்று. இதை நாம் உணருகிறதில்லை யானக்யால் உணர் வற்ற வேர்வையென்று சொல்லலாம். இரண்டாவது நீர்த் திவிடையோல சேர்ந்திருப்பது; இதை உணருகிறோமா கையால் உணரும் வேர்வையென்று சொல்லலாம். சாதாரணமாக இவ்விருண்டிற்கும் பொதுவில் வேர்வையென் னும் பெயர் விளங்குகின்றது. சுத்தமான வேர்வை பரிசைச்செய்ய கிடைக்கிறது கந்தமாயிருக்கிறது. தேகத் தின்மேல் சேருகிறவைகள் தேக அழுக்குடன் கலந்துவிடு கிறது. ஆனால் வேர்வையில் தண்ணீரும், கொழுப்பும், வாயுக்களாகிய ஆஸிடிச், பியூடிக், பார்மிக் ஆஸிட்களும், மூத்திர (பூரியா) சத்தும், சில உப்புக்களும் கலந்திருக் கின்றனவென்று தோன்றுகின்றது. உப்புகளில் Chloride of sodium, Potassium, Alkaline phosphates, Earthy phosphates, Sulphates கலந்திருக்கின்றன. இவைகளில் நாம் தண்ணீரையும், கரியமலவாயுவையும்பற்றி மாத்திர ம் பெறுகிறதே சொல்லோம்.

தினசரி சர்மத்தினின்று வெளியாகும் நீராவி 1½ முதல் 2 பவுன்சுள் இருக்குமென்று தோன்றுகின்றது. சர்மத்தினின்று வெளியாகும் கரியமலவாயு சுமார் நூரை யிரளினின்று வெளியாவதற்கு 4½ அல்லது 1½ பாகந் தானிருக்குமென்று தோன்றுகின்றது.

16-ம் அத்தியாயம்.

மூத்திரக் குண்டிக்காய்களும் மூத்திரமும்.

மூத்திரக் குண்டிக்காயைச் சுற்றிலும் உறுதியான நாகளால் செய்யப்பட்ட போர்வை ஒன்றிருக்கிறது. இப் போர்வையினுட்பரப்புக் கருவி வஸ்துவின் சல்லடைக் கண் தசைகளாலும் துண்ணிய இரத்தக் குழல்களாலும் கொஞ்சம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. கருவியின் மேற்புறத்தையினின்றும், இந்தப் போர்வையை கருவிக்கு சற்றளம் ஊனிலல்லாமல் பெயர்த்து எடுத்துவிடலாம். பிறுக்கத்தின் முடிச்ச இருக்குமிடத்தில் இப்போர்வை மூத்திரக் குண்டிக்காயின் குழலின் விரித்த மேல்பாகத்தி லுடைய வெளிப்புறத் தொக்காப்புடன் ஒன்றுபட்டுப் போயிருக்கின்றது.

பிறுக்கத்தை நீண்ட மார்க்கமாக அறுத்துப் பிளந்து பார்வைபெட்டால் உள்ளே இரண்டுவித முக்கியப் பாகத் தங்கள் காணப்படும். புறத்திலிருப்பதற்கு பட்டை பாக மென்றும், அகத்திலிருப்பதற்கு தண்டு பாகமென்றும் சொல்லலாம். இந்த உட்புறத்து பாகத்துக்கு கோபுர பாகமென்றும் சொல்லுவார்கள். என்னெனில், இதில் கூச்சக் குழல்களால் ஏற்பட்ட மொக்குள்போன்ற மூத்திரக்குழல் கட்டுகள் ஒரு டஜன் காணப்படுகின்றன. மூத்திரக் குண் டிக்காயிலிருக்கும் சவ்வுக்குழல்கள் மேற்புறத்தில் அறு விரிந்து அகன்று இருக்கும். இந்த பாகத்திற்கு மூத்திரக் குண்டிக்காய்க் குழல் கூபமென்று சொல்லுவார்கள். இக் கூபத்தானது மூன்றாய்ப் பிரிந்து, சிறகு கடைசியாக பல உட்பிரிவுகளால் ஊவசளாகின்றன. இப்படி 8 முதல் 12 உட்பிரிவுகளிருக்கின்றன. இதற்கு மூத்திரக் கிண னிகள் என்று சொல்லலாம். இந்தக் கிணிகள் ஐதை ஜனாயக யடுக்கப்பட்டிருக்கும். இக்கிணிகள் ஒவ்வொ ஁ன்றும் மொக்குள்களின் குருத்து துணி வந்து நிற்கும்.

சில சமயங்களில் ஒரு கிண்ணியில் இரண்டு மூன்று குரு த்து துணிகள் வந்திருக்கும். பிறுக்கம் என்பது குழாய் களாலமையப்பட்ட கோளமாகும். இதின் பட்டை பாக மும் தண்டு பாகமும் விசர்க்க குழல்களால் ஊக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு மூத்திரக்குழல்கள் என்று பெயர். இம்மூத்திரக்குழல்களின் ஒரு துணி பட்டை பாகத்தில் இருக்கும் சிறிய பைகளினுள் முடிபின்ன. இப்பைகளுள் இரத்தக் குழல்கள் பொருந்தியிருக்கும். இப்பைகளுக்கு malpighian bodies மால்பீஜியன் கடங் கள் என்று பெயர். மற்ற துணி குருத்துமூலமாக பிறுக்கத் தின் கூப்பாகத்தில் திறந்து இருக்கும். இதன் வழியாக அதில்வரும் மூத்திரத்தை வெளியாக்குகின்றது.

மொக்குள்களில் குழல்கள் நேர் போக்காயிருக்கும். இவைகளின் பட்டைபாகத்திற்குப் போகும்பொழுது குழல்கள் பிரிந்து வளைந்துபோகின்றன. பட்டைபாகத் தில் அப்பிரிவுகள் இன்னம் பலபிரிவுகளாகப் பிரிந்து பல வித வளைவுகளை யுடைத்தாயிருக்கின்றது.

மூத்திரக்குழல்கள் ஒரே சவ்வாலாக்கப்பட்டவை கள். இவைகளின் உட்புறத்தில் பரிஸ்தாபிதம் படிந்திருக் கின்றது. இவைகள் பல அளவு உள்ளதாக்விருந்தபோதி லும் சராசரி 1/16 அங்குல குறுக்களவுள்ளதாகக் காணுகி ன்றன.

பட்டைபாகத்திலிருக்கும் (malpighian bodies) மொக்குள் துணிக் குல்லாய்களில் சில அறுத்துபார்த்தால் காணுகின்றன. சிவந்த குருத்துப்போலக் காணுகின்றன.

பிறுக்க நாடி பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்து மூத்திரக் குண்டிக்காயின் முடிச்சினிடத்தில் கருவியினுட் செல்லு கின்றன. செல்லும்பொழுதே அதன் போர்வையின் வலை த்தை இவைகளுக்கும் போர்வையாடு உட்புச்செல்லுவிந் தது. கருவியினுள்ளே இவ்விரத்தக்குழல்கள் குருத்துக் குக்கிடையில் பாவிக்கொள்ளுகின்றன. மொக்குள்களின்

அடியில் அவைகள் பட்டையுடன் கலக்குமிடத்தில் பட்டைபாகத்தையும் ஊடுறுகின்றன.

இவ்விடத்தில் அவைகள் சிறிய வளைகளாகப் பிரிந்து, இப்பிரிவுகள் கடைசியாக குறுத்து குல்லாய்களாகிய மாலபிஜியன் கடங்கலுக்கு இரத்தத்தைச் சேர்க்கின்றன. உட்செல்லும் சிறிய நாடி குல்லாயினுட்புகுந்து அதனுள் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து தந்துவிடுகின்றன. பிறகு ஒன்றுசேர்ந்து வெளியில் செல்லும் நாளமாகி குல்லாயைவிட்டு நாடி உட்சென்றபக்கத்துக்கு அடுத்ததே வெளியில் வந்து விடுகின்றது. வெளியில் வந்தபிறகு இது பெரிய நாளங்களில் உடனே சேராமல் மறுபடியும் பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்து தந்துவிடுகின்றன. எக்குழலின் உட்புறமிருந்துவந்ததோ அதன்வெளிப்புறத்தைச் சுற்றிக் கொண்டு பிறகு கடைசியாக ஒன்று சேர்ந்து நாளங்களாகிய போய் விழும்.

மூத்திரக்குண்டிக்காயின் வஸ்துக்களாகிய குழல்களும், மொக்குள் முதலியவைகளும் லலாமல் கொஞ்சம் மெல்லிய சல்லடைக்கன் சவ்வுமிருக்கின்றன.

மூத்திரக்குண்டிக்காயின் நரம்புகள் அவ்விடமிருக்கும் நரம்புவலைகளினின்றும் வந்துசேர்ந்தவைகள்.

மூத்திர குண்டிக்காய்க்குழல் மூத்திரப்பை இவைகளின் கட்டடம்.

பிருக்கக் குழல் கோழியிறகின் குறுத்து அளவாக பன்னிரண்டு முதல் பதினாறு அங்குல நீளமிருக்கும். மூத்திர குண்டிக்காய் கூபத்தினின்று ஒட்டி ஓடி மூத்திரப்பையைத் துளைத்துக்கொண்டிருக்கும். இதன் துவாரம் மூத்திரப்பையுட்புறத்தில்கொண்டேயோச் சேர்க்கின்றது. இக்குழலுக்கு மூன்று சொக்காய்களிருக்கின்றன. (1) வெளிப்புறத்து சொக்காய்; இது உறுதியாயும், நார்த்தன்மை யுடையதும், நெறுநுதுரமத்தக்கதாய்மிருக்கும். (2) மத்திய சதைச் சொக்காய்; இதின் நார்தன்மை பட்டையற்ற வஸ்துவைச் சேர்ந்தவைகள். இதில்

மூன்று திணுகள் இருக்கின்றன. மத்தியில் விருத்தாகார நார்தன்மை இத்திருபுறத்திலும் நீண்ட நார்தன்மை அமைந்திருக்கும். (3) உட்புறச்சொக்காய்; இது சிலேஷ்ம சவ்வாலானது. மூத்திர குண்டிக்காயின் கூபத்திலிருக்கும் சிலேஷ்மச் சவ்வுடனும், மூத்திரப்பையினுடைய சிலேஷ்மச் சவ்வுடனும் ஒன்றுபட்டுள்ளதாக இருக்கின்றது. இவைகளினுள் பரிஸ்தாபிதமும் படிந்திருக்கின்றது. பரிஸ்தாபிதச் சாலங்கள் பல அடைகளாக விருத்தின்றன. மேலாக இருப்பவை கோளேவரூபமாயும் அதினுள்ளிருப்பவைகள் நீண்டிருக்கின்றன.

மூத்திரப்பையென்பது, மூத்திரம் தேகத்தைவிட்டு துளைப்படும் வேளைகளுக்கிடையில் அதை சேர்த்துவைக்க ஏற்பட்டிருக்கும் பையாகும். இதற்கு ஊத்தாம்பிள்ளையென்றும் சொல்வார்கள். இது ஏறக்குறைய கோபுராகாரமாயிருக்கின்றது. மேல்புறத்தில் கொஞ்சம் பின்னுக்குத் தள்ளி இருக்கும் அகலப் பரப்பிற்கு ஆஸை மென்று சொல்லலாம். கீழ்ப்புறத்தில் முன்னுக்கு நிற்கும் பாகம் கூச்சாய் எருங்கியிருக்கும் பாகம். இது உபஸ் தத்துடன் கலந்து ஒன்றுபட்டிப்போகும். இதற்குக் கழுத்தென்று பெயர்.

மூத்திரப் பைக்கும் காணா முக்கிய சொக்காய்களான நிட, நிணநீர் சவ்வு, சதைநார்தன்மை, வலைநகன்சவ்வு, சிலேஷ்மசவ்வு இவ்வகைத்தகைகளாலானவை.

மூத்திரப் பையில் அநேக சிலேஷ்ம கோள்களிருக்கின்றன. அதன் கழுத்தருகில் இக்கோள்கள் அநேகமாயிருக்கின்றன.

இரத்தக்குழல்களும், நிணநீர்த்தாலாகளும் நரம்புகளும் எராளமாய் மூத்திரப் பையில் அமையப்பெற்றிருக்கின்றன. நரம்புகள் முள்ளந்தண்டிக்கொடியின் கிளைகளும் ஒற்றுணர்வுள்ள நரம்புகளின் கிளைக்கொடிகளும் மாயிருக்கின்றன. நரம்பு நார்தன்மை அங்குதியுக்கும் சில நரம்புவேர் முடிகளிருக்கின்றன.

மூத்திர விசரிக்கம்.

மூத்திரக்குழல்களிலுள்ள பரிஸ்தாபித கோளப்பைகளால், மற்ற விசரிக்கங்கள் மாநிரியே வைரவஸ்துக்கள் கரைக்கப்பட்டு மூத்திரத்தில் கலந்துபோகும்படி செய்கின்றன. மூத்திர உப்பும், மூத்திரப் புளிப்பும் இரத்தத்திலேயே மாறியிருக்கின்றது என்று காணுகிறது. இவைகளைப் பிரிக்கவேண்டிய தொழில்தான் இப்பைகள் செய்கின்றனவென்றும் தோன்றுகிறது. ஆனால் மூத்திரத்தில் காணும் சில நிபாக்கினி கலந்த புளிப்புகளும், உப்புகளும் இரத்தத்தில் அந்த ஸ்திதிகளில் மாறுபட்டிருக்கிறதில்லை. இவைகள் பிரிந்துவர இப்பைகள் புதிதத்தொழில் புரிகின்றன.

மேற்சொல்லிய மால்பீஜியன் குல்லாய்களால் இரத்தத்தினின்று தண்ணீர் வடிக்கட்டி யிறங்குகிறதென்று உத்தேசிக்கிறார்கள்.

பிருக்கத்தின் நாடி நாளங்கள் பெரியதாயிருக்கிறபடியால் பிருக்கத்தில் இரத்தம் அதிகிக்கிறதில் சுத்திபெருகிறதென்று காணுகிறது. மற்றப் பொசிப்புக்களைவிட மூத்திர விசரிக்க மதிவேசமாய் நடந்துவருகிறது. பொசித்து வருவது குழல்களிலிருக்கும் மூத்திரத்தை முன்னுக்குத் தள்ளுகின்றது. அப்படி தள்ளுவதால் மூத்திரக் குண்டிக்காய் கூபம் நிறையும். அதனின்றும் மூத்திரம் பிருக்கக் குழல்வழியாய் மூத்திரப் பையைப்போய்ச் சேருகின்றது.

மூத்திரம் விசரிக்கம்.

மூத்திரம் பேயும் யந்திரம் பிவிட்கும் யந்திரத்தை ஒத்திருக்கின்றது. இச்சாபூர்வமாய்ச் செய்யும் தொழிலில் உதரச் சதைகளும் மற்ற கலாசை சதைகளும் சுருங்கி முன் சொன்னதுபோலவே உதாரந்தரத்தை முட்டுகின்றன. விகாஸம் அரைவற்று மிழ்கும். மூத்திரப்பைச் சுருக்கச்சதைகள் விரிந்து மூத்திரம் வெளியே தள்ளப்பெறும். அனிச்சாபூர்வமாய் வரும் மூத்திரம், உதரச்

சதைகளும் மூத்திரப்பைச் சதைகளும் சுருங்கி உண்டாகும். சிக்கிரமாக மூத்திரத்தை உந்தித் தள்ள இன்றொரு சதை யிருக்கின்றது. இந்தச் சதை சுருங்குவதால் பிருக்கக் குழலிலிருக்கும் கடைசித் திவிலைகள் உந்தித் தள்ளப்படுகின்றன.

சாதாரண சவுக்கிய ஸ்திதியில் மூத்திரமானது தெளிவான திரவமாகவும், இளமஞ்சள் வர்ணமாயும் அல்லது அம்பர் நிறமாயுமிருக்கும். ஓர்வித சொல்ப சுகந்தத்தை யுடையதாயிருக்கும். மூத்திரம் அழுதினால் நெடியுண்டாகி நவாசார வாசனையுண்டாகிறது. சாதாரணமாய் மூத்திரம் தெளிவாயும் ஒளியூடுநெடியதாயிருந்தபோதிலும், சில காலம் ஓரிடத்தில் தங்கி குளிர்ந்துபோவதால் அதில்கரைந்து இருக்கும் வைரவஸ்துக்கள் கிழுகிறங்கி ஒளியூடுநெடியதாயும் மட்டையடைந்த சேர்போலாய்விடுகிறது.

சாதாரணமாக இளமஞ்சள் வர்ணமுள்ளதாகயிருந்த போதிலும், மூத்திரம் சில சமயங்களில் வர்ணமற்றும், உதாரணமாயும், செம்பிதவர்ணமாயும் காணும். “ஜலத்தைப்பார்க்கிலும் மூத்திரத்தின் பளுவு அதிகம். ஜலம் தக்கனத்தில் 1,000 ஆகில் மூத்திரம் சுமார் 1,020 இருக்கும். (ஸ்பெஸிபிக் கிராவிட்டி Specific gravity) இந்த பளுவு மணி மணிக்கு வித்தியாசப்படும். 4.000 நீர் சாப்பிட்ட பிறகு இறங்குகிற மூத்திரம் பளுவில் குறைந்தும், போஜனம் செய்த பிறகு இறங்குகிற மூத்திரம் பளுவில் அதிகமாயும் இருக்கும்; ஆகையால் காலையில் படுக்கையிலிருந்து எழுந்தவுடனே பெய்கின்ற மூத்திரம்பரிசைக்கு உத்தமம். மழைகாலத்தில் மூத்திரத்தின் தக்கனம் 1,015 ஆகவும் வசந்தகாலத்தில் 1,025 ஆகவும் இருக்கும். போஜனத்துக்கு தக்கபடி தக்கனமும் வித்தியாசப்படும். மது மூத்திரரோகத்தில், சர்க்கரை அதிகரித்திருப்பதால் மூத்திரத்தின் பளுவு 1050-1060 வகையில்திகரிக்கும். ஒரு நாளிலாகிற ஜலஸ்பரிசு நீரினளவை நிச்சயிக்கக்கூடாது.

கால வித்தியாசத்தாலும், பேர்ஜன விகல்பத்தாலும், மூத்திர ஜனிப்பு வித்தியாசப்படுகின்றது. மூத்திரத்தில் ஜலமும், யூரியா (urea), யூரிக் ஆஸிட் (uric acid) என்னும் உப்புக்களும் சேர்க்கையாயிருக்கின்றன. இவைகளில் யூரியா என்கிற உப்பே மூத்திரத்திற்கு பிரதான பதார்த்தம். இரத்தத்திலிருக்கிற இந்த யூரியாவை வெளிப்படுத்துவதே மூத்திரக் குண்டிக்காய்களின் பிரதான தொழில். இந்த வஸ்து இரத்தத்தில் நினுவிட்டால் ஆடுக தூர்க்குணங்கள் சம்பவிக்கும்.”

மூத்திரத்தின் பூதிக கூட்டுப்பாடுகள்.

மூத்திரமென்பது சில இந்திய வஸ்துக்களையும் உப்பு வஸ்துக்களையும் தண்ணீரில் கலக்கப்பெற்ற திரவமாயிருக்கிறது. உணவில் உட்கொள்ளும் பல பதார்த்தங்களும் சில சமயங்களில் கலந்துவரும். உப்புகளும், வர்ண வஸ்துக்களும் இவை முதலியவைகளும் காணும்.

பல பரிசுஷ்களால் ஏற்பட்டிருக்கும் இரண்டு ஜாதி தாவை இதனடியில் காட்டியிருக்கின்றோம்.

1-வது ஜாதி.

1000-பங்கு மூத்திரத்தில் இருக்கும் வஸ்துக்களின் சராசரி அளவு:

தண்ணீர்	967
யூரியா மூத்திரப் உப்பு	14.230
யூரிக் ஆஸிட் மூத்திரபுளிப்பு	468

வர்ணவஸ்து சிலேஷ்மம், பிராணிகளினின்றும் வரும் வஸ்து.	இவைகளை ஒன்றிவிட்டு மற்றொன்றைப் பிரிப்பது கஷ்டம்.	10.167
---	--	--------

உப்புகள்	Sulphate	{ Sodium Potassium	8.135
	Bi-phosphates	{ Calcium Sodium Magnesium Ammonium	
	Chlorides	{ Sodium Potassium	
	Hippurate of Sodium		
	Fleurride of Potassium		
Silica			traces.
			1000.000

2-வது ஜாதி.

வளர்ந்த மனிதனில் தினசரி 24 மணிநேரத்தில் வெளிவரும் மூத்திரத்திலிருக்கும் கூட்டுப்பாடு வஸ்துக்களின் அளவு:

தண்ணீர்	திரவ அளவுகள்	52
யூரியா மூத்திர உப்பு	கிரேயின்.	512
யூரிக் ஆஸிட் மூத்திர புளிப்பு		8.5
Hippuric acid	நிச்சயமில்லை. 10 முதல்	15
Sulphuric acid		31.11
Phosphoric acid		45.
Chlorine		105.0
Chloride of ammonium		35.25
Potash		58.
Soda		125.
Lime		3.5
Magnesia		3.
Mucus		7.

Extractives	{ Creatin Creatinin Pegment Xanthin Hypoxanthin	154.0
	Resinous matter, &c.	

17-ம் அத்தியாயம்.

மணித தேகத்தின் வரவு செலவு கணக்கு

மணித தேக முயிருடனிருக்கவேணுமாகில், உணவு, சுவாசவாயுமுதலிய சக்தியை யுள்ளடக்கிக்கொண்டிருக்கும் சத்துவங்கள் வேண்டியனவற்றை அடைவதால் சத்துவங்களை தனக்கு வேண்டிய சக்திகளாக மாற்றிக்கொண்டு இருக்கும் யந்திரம் என்று காணப்படுகிறது. இந்தத் தொழிலையுற்பார்க்குமளவில் ஒரு நீராவியந்திரத்தை யாவது அல்லது சக்தி பிறப்பிக்கும் வேறு யெந்த யந்திரத்தை யாவது ஒத்திருக்கிறது. ஆனால் யந்திரத்தில் உற்பத்தியாகும் பலன் ஒன்றையிருந்தாலும் இருக்கலாம் அல்லது வேறுபட்டாலும் பட்டலாம். ஒரு கையாவது காலாவது அசைவதற்கு வேண்டிய சக்தி, ஒரு தாம்பியமாவது அல்லது ஒரு சக்திமாவது அசைவதற்கு வேண்டிய சக்தியாகவே இருக்கின்றது. ஆனால் பின் சொன்னதில் உண்மையும் சலனமாக மாறுவதற்கு நீராவி உற்பத்தியாகும் ஒரு யந்திரத்தால் ஆகவேண்டியிருக்கிறது. முன் சொன்னதிலே சகைநார் என்னும் யந்திரத்தாலாகிறது. அதன் கட்டத்தைப்பற்றி நமக்கு யாதொன்றும் தெரியவில்லை.

இன்னம் யந்திரபலன்கள் மிக்க வித்தியாசமுடையவைகளாயிருக்கக்கூடும். எப்படி சகை யந்திரங்களால் அசைவு என்னும் பலன் உண்டாகிறதோ அப்படியே ஓர் னம் என்று சொல்லும் ஸ்திதி, சிந்தனையென்னும் சக்தி இவைகள் நாம் யந்திரங்களின் பலனையிருக்கின்றன இந்த விஷயத்தில் யந்திரத்தின் கட்டட வேலைகளைப்பற்றி நமக்கு யாதொன்றும் தெரியாமலிருப்பதுடன், யந்திரத்தால் உற்பவிக்கும் சக்தியின் தன்மையைப் பற்றியும் யாதொன்றும் தெரியவில்லை. ஆயினும் எப்படி நீராவி யந்திரம் வேலைசெய்ய வேளியினின்று சக்திகளடங்கி சர்தனங்களைப் பெறவேண்டி யிருக்கிறதோ அப்படியே மூளைக்கும் வேண்டிய அவசிய சக்தியடங்கியிருக்கு

தனங்கள் தேகத்திற்கு வெளியினின்றும் போய்ச்சேருகிறது. நீராவி யந்திரமுதலிய யந்திரங்களிலுண்டாகிறது போலவே, மூளையின் மனோர்ப்பல பலன்களும் அத்துடன் ஐக்கியப்படும் ஜட சக்திகளுக்கு அடுத்து சம்பந்தமுடையவைகளாய்த்தானிருக்கவேண்டுமென்பது நிச்சயம்.

வெளியினின்று தேகத்திற்குட் செல்லும் சத்துக்களடங்கிய சக்திகளுக்குத் தக்கபடி தேகத்தினுள் கிரியா சக்தி வெளித்தோற்றுக்கின்றது. ஆகையால் தேகத்திற்கு வரும் வரவு எப்படி வருகின்றது, எவ்வளவு வருகின்றதென்பதும், அதையொட்டி யெவ்வளவு செலவாகிறதென்பதும் மிக்க விரும்பப்படத்தக்க விஷயமாகும்.

இதைப் பின்வருமாறு பகுத்துப்பார்க்கலாம் :—

- (1) செலவினளவும் அதற்கு சாட்சியமும்.
- (2) வரவின் உற்பத்திமார்க்கமும் அதினளவும்.
- (3) செலவின் உற்பத்தியும் அதின் காரணமும் என்று பிரித்துப்பார்க்கலாம்.

1. செலவினளவும் அதற்கு சாட்சியமும் நன்றாய் அறியப்பட்ட விஷயமாயிருக்கிறது.

தூரையிரவிலிருந்து 24 மணிநேரத்தில் வெளிப்படும் வஸ்துக்கள் :

கரியமலவாயு	15,000
தண்ணீர்	5,000
சர்மத்தினின்று தண்ணீர்	11,500
வைர வஸ்துக்களும் வாயுக்களும்	250
பிருக்கத்தினின்று தண்ணீர்	23,000
இந்திரியவஸ்து	680
தாதுக்கள் உப்புநள்	420
குடல்களினின்று தண்ணீர்	2,000
பல இந்திரிய, தாது வஸ்துக்கள்	800

செலவு அம்சத்தில் பொதியும் முலைப்பாலையும் ஜனனேந்திரியங்களினின்று பொதியும் விசர்க்கங்களையும் அதாவது, நாதம், மாதப்போக்கு இரத்தம், சுக்கிலம்,

இவைகளினளவு வேறுபட்டிருக்கிறபடியால் மேல்ஜாபி தாவில் சேர்க்கப்படவில்லை. எல்லாவற்றையும் ஒன்று புட கூட்டிப்பார்க்குமளவில் தினசரி.

வைரவஸ்துக்களும் வாயுக்களும் 2-3 பவுன்
தண்ணீர் 5-6 பவுன்

வெளியேபோகின்றன. அதாவது ஒரு வருஷத்தில் சுமார் 3,000 பவுன் வஸ்துக்கள் வெளியாகின்றன. இது சாதாரண மனிதனுடைய தேகப்பளுவைவிட 20 மடங்கு அதிகமானதாயிருக்கிறது.

ஆகையால் தேகத்தை அதன் அளவு வடிவுகளுடனும் அதன் கூட்டுப்பாடுகளுடனும் பாதுகாக்கவேண்டுமானால் செலவுக்குத்தக்க அளவு வஸ்துக்களை அதற்கு சேர்க்கவேண்டியிருக்கின்றது.

2. தேகத்தின் வரும்படி உணவும், சுவாசவாயு முதலியவைகளாலாகின்றது.

தினசரி இரைப்பையில் வருவது:— கிரேயின்.

வைரவஸ்துக்கள் 8,000

தண்ணீர் 35,000, 40,000

துரையிரல் உட்செல்லுவது:—

சுவாச வாயு 13,000

தினசரி வரவு செலவு பின்வரும் ஜாபிதா பிரகாரம் சரிப்பட்டிருக்கின்றது.

வரவு. செலவு.

கிரேயின்.	கிரேயின்.
வைரவஸ்துக்கள் 8,000	துரையிரல் 20,000
தண்ணீர் 37,650	சர்மம் 11,750
சுவாச வாயு 13,000	பிருக்கங்கள் 24,100
	குடல்கள் 2,800
58,650	ஜனனேந்திரிய ஸ்தன விசர்க்கங்கள்—இதிலு
	டங்கியதாக பாவித்
	துக்கொள்ளவும்.

சுமார் 8½ பவுன்.

கிரேயின். 58,650

இவைகள் உத்தேசமா யெடுத்த அளவுகள்.

3. சிலவின் உற்பத்தியும் உத்தேசமும்:—

(1) சாதாரணமாய் இழப்பது.

(2) உஷ்ணம், சலனம் இப்படிப்பட்ட விதங்களில் காணும் சக்தி. உஷ்ணத்தில், தேகத்தில் தருந்த உஷ்ண மிருப்பதற்கு வேண்டி தகனம் உஷ்ணமறியும் கருவியில் 100 டிகிரி பிருக்கவேண்டியதாயிருக்கிறது.

சலனத்தில் (a) சாதாரண சதையசைவுகள்: பிடித்தல், மெல்லுதல், ஓரிடத்தினின்று இன்னோரிடம்போகுதல் இவைமுதலிய பல் வழிகளில்.—(b) அனிச்சாபரமான பல அசைவுகள், சுவாசம் விடுதல், இரத்தச்சுழல் சீரணமுதலியவைகள்.

(3) நரம்பு சக்தி தோற்றம் தேகச்செயல்களில் காணும், சுவாசம், இரத்தச்சுழல் சீரணம், சிந்தனை முதலான மூளை வேலைகள்.

(4) தேகச்செயல்களில் வெளியாகும் சக்தி உதாரணம்—போஷிப்பு, பொசிப்பு, வளர்ச்சி இவை முதலியவைகளுக்கு.

18-ம் அத்தியாயம்.

நரம்பு மண்டலம்.

நரம்பு மண்டலத்தில் இரண்டு முக்கிய பாகங்கள் அல்லது மண்டலங்களிருக்கின்றன. மூளைக்கண்ட மண்டலமென்றும்; ஒற்றுணர்வு மண்டலமென்றும் சொல்லுவார்கள்.

மூளைக்கண்ட மண்டலத்தில் மூளையும், முள்ளந்தண்டுக்கொடியும், இவைகளுக்கு வெளிப்பட்டு வரும் நரம்புகளும் உட்பட்டிருக்கின்றன.

ஒற்றுணர்வு மண்டலமென்பது சிசுவிருந்து ஆஸனம் ரூபத்தில் இரட்டை வரிசையாக முள்ளந்தண்டின் இருபுறத்திலும் வேர் முடிச்சுகளுடனும் நரம்புகளுடனும்

மணிக்கோவைபோல் நீண்டிருக்கும். இவை நின்றும் மூளைக்கண்ட மண்டலத்திற்கும், சரீர நரம்புகளுக்கும் கிளைகள் பாய்ந்து சம்பந்தித்திருக்கும். (மூளையின் ஐந்தாவது நரம்பின் கிளைகள் பஞ்சேந்திரிய ஸ்தானங்களுக்குப் போயிருப்பதில் அவைகளுக்குச் சேர்ந்த சிறிய வேர் முடிச்சுகளையும் இந்த வகுப்பில் சேர்க்கவேண்டும். இன்னமினியுகள்போலச் சில உள்.)

நரம்பு மண்டலத்தின் மூலக்கட்டடங்கள்.

மூளைக்கண்ட மண்டலம் ஒற்றுணர்வு மண்டலம் இவ்விரு மண்டலங்களின் கருவிகள் இரண்டு மூலக்கட்டடங்களை யுடையவைகள். சாலங்களும், நாள்களுமாகும்; சாலங்கள் ஒன்றாய்ச்சேர்த்து நாள்களுடன் கலக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சாலங்களும் நாள்களும் ஒன்றுபடச்சேர்த்த நரம்புக் கட்டடத்துக்கு நரம்பு-மத்தியமென்று சொல்லலாம். நாள்கள் நரம்பு-மத்திய கூட்டுப்பாட்டில் சேருவதாமல்லாமல் அவைகள் தனிமையாகவே நரம்புகளாயிருக்கின்றன. பல நரம்பு-மத்தியங்களை ஒன்றுடனொன்றுச் சேர்க்கின்றன. தேகத்தில் பல இடங்களில் இவைகள் பரவியிருக்கின்றன.

தொழில் புரிவதில் நரம்புச் சாலங்களுக்கும், நரம்பு நாள்களுக்கும் வித்தியாசமிருக்கின்றது. நரம்புச் சாலங்களுக்கு நரம்புச் சக்தியை ஜனிப்பிப்பதற்கும், செலுத்துவதற்கும் சக்தியிருக்கிறது. நாள்களுக்கு அதைச் செலுத்தும் சக்திமாதிரியிருக்கிறதல்லாமல் நரம்பு சக்தியை ஜனிப்பிக்குஞ் சக்தி கிடைப்பது.

நரம்புகளின் கட்டடம்.

நரம்புகள் மிகவும் துட்பமாகிய நாள்களாலானவைகள். இந்த நாள்கள் குழல்களாகியிருக்கும். அவையுள் நரம்பு வஸ்துவையடக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. நாள்கள் சம தூரத்திலும் ஒன்றின்மேல் ஒன்று பின்னப்பட்டும் அடுக்கி இவைகளிடையிலிருக்கும் சம்பந்தத் தசைகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இச்சம்பந்தத் தசைகளில் இரத்த தத்துவிகள் பரவியிருக்கும். நரம்பு ஒவ்வொன்றை

யும் சுற்றி ஒரு புடை சல்லடைக்கண் தசையாவது சதைத் தசையாவது மூடிக்கொண்டிருக்கும். அநேகமாய் நரம்புகளில் இரண்டினித நரம்புகளாக இருக்கின்றன. மூளைக்கண்ட நரம்புமண்டலத்தைச் சேர்ந்த நரம்புகளில் ஒருவித நாள்களும், ஒற்றுணர்வு நரம்பு மண்டலத்தில் மற்றவித நாள்களும் அதிகமாய்க்காணும்.

முதல்வகை நாள்கள் வெள்ளையாயிருக்கும். மச்சையுள்ள நாள்கள் தெளிவான சாதாரணச் சுவ்வரலாக்கப்பட்ட குழல்கள்போல காண்கின்றன. பரிசுத்தித்துப் பார்த்தால் மூன்றுபுரைகள் காண்கின்றன. (a) மையக்குழல் பாகமும், (b) வெள்ளைப்போர்வை மத்திய பாகமும், (c) வெளிப்போர்வையுமாகும்.

நரம்புகளின் பருமன் பல இடங்களில் பலவிதமாக வித்தியாசப்படுகின்றது. சரீராரணமாய் உள்ள அங்குல குறுக்களவுள்ளதாயிருக்கும். இவைகள் மூளை, முள்ளந்தண்டுக்கொடி இவைகளின் சம்பத்துக்கு வருங்காலத்திலும் இவைகள் பரவியிருக்கும் தசைகளிலும் மிகச் சிறியவைகளாய் விடுகின்றன. மூளை முள்ளந்தண்டுக்கொடிகளிலிருக்கும் சாம்பல்வண்ண வஸ்துக்களில் இந்த நாள்கள் மிகச்சிறியதாய், முதல் அங்குலக் குறுக்களவுள்ளவாக விருக்கின்றன.

இரண்டாவதுவித நாள்கள் சாம்பல் நிறமாயிருக்கும் (மச்சையற்ற நாள்கள்).

வாசனை நரம்புக்கிளைகள் எல்லாமும், ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் முக்கிய முண்டங்களும் கிளைகளும் இவ்வித நாள்களாலானவைகள். மூளைக்கண்ட நரம்புகளிலும் பல விகிதங்களில் கலக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஒவ்வொரு நரம்புகளும் அதின் போக்கில் தடங்கலில்லாமல் செல்லுகின்றது. அதாவது, அது ஒரு நரம்பு-மத்தியத்திலாரம்பமாகி போய்ச்சேருமிடம்வரையிலும், அப்படி போய்ச்சேருமிடங்கள் தேகத்தின் துனிதளாயி

ருந்தாலுமிருக்கலாம்; அல்லது வேறு நரம்பு-மத்தியமாகியிருந்தாலும் இருக்கலாம்; அல்லது அது புறப்பட்டுவந்த நரம்பு-மத்தியமாகவே இருந்தாலுமிருக்கலாம்; நரம்புகளில் நாரகட்டுகளும் ஒழிக்கொண்டிருக்கின்றன. இக்கட்டுகள் ஒன்றின்பக்கம் ஒன்று அடுக்கி ஒன்றப்போலத்தான் காணும். அவைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேருகிறதில்லை. சுட்டிகள் ஒன்றுடனொன்று சேர்ந்து பிறகு பிரிந்துபோனாலும் நரம்புகள் சேரமாட்டாது. நரம்பு நார்கள் தனித்தனியாய் இருப்பதில் அவைகள் பிரிந்து பிறகு சேருகிறதில்லை. ஆனால் அவைகள் முடியுமிடத்துக்குப் பக்கத்தில் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து முடிபுகின்றன.

நரம்புகள் போகும் வழியில் சில இடங்களில் வளைகளாகின்றன. அப்படி வளைபோலாகுமிடங்களில் ஒரு நரம்பு பலபாகங்களாகப் பிரிந்தும் பிரிந்தவைகள் பலவிதமாகக்கூடியும், மறுபடி பிரிந்தும் பின்னிக்கொண்டு வளைபோலிருக்கும். இதனால் வலையினின்று பிரிந்துபோகும் ஒவ்வொரு நரம்புக்கும் அவ்வலையில் சேர்ந்த மற்ற நரம்புகளின் ஒத்தாசையுண்டாகிறது.

நரம்பு முடிவுகள் இருவகைப்படும். தேக மத்தியபாகங்களில் முடிவானும், தேக துணிகளில் முடிவதுமேயாகும்.

தேக துணி முடிவுகளின் மாதிரியைக்குறித்துக் கொஞ்சம் தர்க்கம் எப்பொழுதுமுண்டு. ஆனாலும் அவைகள் முடியும் மாதிரி பின்வருமாறு என்று எண்ணலாம். (1) நாட்பமாதிய வளைகளில் முடியும். (2) குறிப்பிட்ட முடிவுக்கருவிகளில் முடியும். இவைகளுக்கு தொகைப்பகள் என்று சொல்லலாம். (3) பைகளில் முடியும். (4) மூட்ட மற்ற துணிகளையும் இருக்கும். (5) சதைகளில் சலனபாகங்கள் என்று சொல்லுமிடங்களிலும் முடியும். நரம்பு நார்கள் தேகமத்தியில் முடிவு பெருவதைப்பற்றிப் பேசுவதற்குமுந்தி நார்களும் பைகளும் ஒன்றுபட்டினங்கியிருக்கும். நரம்பு மத்தியங்களைப்பற்றிச் சொல்லுவோம். நா

ம்பு மத்தியங்கள் முக்கியமாக மூளை, முள்ளந்தண்டுக் கொடி இவைகளின் சாம்பல்வண்ண வஸ்துக்களும் நரம்பு வேர் முடிச்சுகளும் ஆகும். மூளையிலும் முள்ளந்தண்டிலும் சல்லடைக்கண் தசையொன்று மிக்க துண்ணியதாய் ஊடுருவியிருக்கின்றது. இத்தசையாதாரத்தில்தான் நரம்புநார்களும் நரம்புச்சாலங்களும் அவைகளில் நிறைந்திருக்கின்றன. இதிலிருக்கும் நரம்புப்பைகளால்தான் இதற்கு சாம்பல்நிறமுண்டாயிருக்கிறது. இதே மாதிரியாகவே ஒன்றுணர்வு நரம்புகளின் வேர் முடிச்சுகளிலும் சாம்பல்வண்ணச்சாலங்களிருக்கின்றன. அவைகளின் வர்ணமும் சாலங்களின் வர்ணமாயிருக்கின்றன.

நரம்பு நார்களின் தொழில்கள் : பிழைத்திருக்கும் தேகத்தில் கிள்ளுவதினாலாவது, சூடுவைப்பதினாலாவது, மூளைக்கண்ட நரம்புநாரை உத்திபனம் செய்தால் இரண்டுவித குணங்களில் ஒன்று காணும். ஒரு பக்கம் வேதனையுண்டாகும், மற்றப் பக்கம் அந்த நரம்பின் நார்கள் எந்தச்சதைகளில்போய் பிழைத்திருக்கின்றன என்பதைக் கண்டிடுகிறது.

மூளையின் நரம்புப்பைகளுடைய மாறுபாடுகளால்தான் வேதனையுண்டாகிறதென்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பரீகைச் செய்பவனுக்கு தான் செய்த உத்திபனம் இரண்டுமார்க்கங்களில் ஒன்றில் செல்லுகிறதாகக் காணும். அதாவது, நாரின் மத்திய முடிவாகிய மூளைப்புறம் வேதனை காணுமிடம்கேட்கிப் போகிறதாகவாவது, அல்லது ஓரத்து முடிவாகிய அசைவுண்டாகுஞ்சதை நோக்கிச் செல்வதாகவாவது காணும். இப்பொழுது சொல்லிய பரீகையின் குணங்கள்தான் நரம்புநார்கள் தொழிலால் சாதாரணமாபுண்டாகும் பயனாகும். அவைகளை உத்திபனம் செய்வதால் மத்திய முடிவிலாவது, ஓரத்து முடிவிலாவது பலன்காணும். ஒரு உத்திபனத்தால் இவ்விரு முடிவுகளிலும் பலன்காணமாட்டாது. இந்த காரணத்தாலும் நரம்பு நார்கள் ஒவ்வொன்று

தும் ஒருவித பலன்தரும் தொழிலையே புடையதாயிருக்கிறபடியாலும், நரம்புகளை இரண்டுவிதமாக வகுத்துப்பேசலாம். அவை: உணர்வுண்டாக்கும் நரம்பென்றும் சலனமுண்டாக்கும் நரம்பென்றும் இருவகையாயிருக்கின்றன. இவ்விருண்டுக்கு முறையே மத்தியாபிகார நரம்பென்றும், மத்தியாதீத நரம்பு என்றும் சொல்வார்கள்.

நரம்புகளின் பிரிவுகள்.

நரம்புகளைப் பின்வருமாறு பிரித்திருக்கிறார்கள். (1) மத்தியாபிகாரம், உட்போக்கு அல்லது உணர்வறியும் நரம்புகளென்றும், (2) மத்தியாதீதம், வெளிப்போக்கு, அல்லது சலன நரம்புகளென்றும், (3) மத்தியாந்தரம் நரம்புகள் என்றும் பிரித்திருக்கிறார்கள்.

மத்தியாபிகாரம் அல்லது உட்போக்கு என்னும் பதங்களையும், மத்தியாதீதம் அல்லது வெளிப்போக்கு என்னும் பதங்களையும் ஸ்பர்ச நரம்பு, சலன நரம்பு என்னும் பதங்களுக்குப் பதிலாக முறையே உபயோகப்படுத்துவாராவது எனில், முன்சொன்னவற்றிற்கும் நரம்பை உத்திபனப்படுத்துவதால் எப்போழுதும் வேதனை ஞானம்வது அல்லது மற்ற எவ்வித உணர்ச்சியாவது உண்டாகிறதில்லை. அதே மாதிரியாக பின்சொன்ன வகையை உத்திபனப்படுத்துவதால் எப்போழுதும் தப்பாமல் சலனமுண்டாகிறதில்லை.

மத்தியாபிகார நரம்புகளின் வழி உத்திபனம் செல்வதினால் உண்டாகும் குணங்கள். (1) வேதனை அல்லது மற்றெவ்விதமான உணர்ச்சியுண்டாகும்; அல்லது (2) பிரதிகரணச்செயல், அல்லது (3) தடைப்படுத்தல் அல்லது சலன ஒடுக்கம் இவைகளேயாம். மத்தியாதீத நரம்புகளில் உத்திபனம் செல்வதால் உண்டாகும் குணங்கள். (1) சதை சுருங்குதல் (இவ்விஷயத்தில் நரம்புகளுக்கு சலன நரம்புகளென்பார்கள்); அல்லது (2) அதிகனூல் போஷிப்பை அதிகரிக்கும், அல்லது (3) விசர்க்கம் அதிகரிக்கும் விசர்க்க நரம்புகள்.

அத்தி. நரம்புகளில் வேகம்செல்லும் வகை நியாயங்கள். 289

மத்தியாந்தர நரம்புகளுக்கு தேகநுணிகளில் முடிவில்லாமல் அன்வகள் நரம்பு மத்தியங்களுக்கு இடையே யிருப்பவைகளாகும்.

நரம்பு நரீகளில் வேகம்செல்லும் வகை நியாயங்கள்.

நரம்புகளுக்கு அவைகளிலேயே வேகத்தை உற்பத்திசெய்துகொள்ளும் சக்திஇடையாது. செயல்களுக்கு வேண்டிய உத்திபனமும் அவைகளிலேயே உற்பத்தியாகிறதுயில்லை; அவைகளுடைய விசேஷ தர்மம் தோற்ற வேண்டுமாகில் அவைகளுக்கு வெளியினின்றும் உத்திபனம் வந்துசேரவேண்டும். ஆகையால் சாதாரணமாக ஸ்பரிச நரம்புகள், வெளிப்புற வஸ்துக்கள் அவைகளின் நுணியில் படுவதால் உத்திபனமடையும். சலனநரம்புகளோ, மனோதர்மத்தாலாவது அல்லது நரம்பு மத்தியங்களில் ஜனிக் கும் சக்தியாலாவது உத்திபனமடையவேண்டியிருக்கின்றன. நரம்புகள் செயலற்ற ஸ்திதியிலிருக்கும்பொழுது அஸ்திதியை கலக்கும் எந்த வஸ்துவும் உத்திபனமாக்கவுதவும். நிக் வேறுபாடுள்ள கர்த்தாக்களாலும் ஒரேவிதமான பலனையுண்டாக்கும். ஆனால் இப்பலன்களில் இருக்கும் வித்தியாசங்களெல்லாம் தரத்தில் மாதிரமேயுளவாகும்.

உதாரணமாக: நரந்திரிக, பூதிக, ஜம்பரிய, உஷ்ணிக ஹேதுக்களிலெதையாவது உணர்ச்சியுடைய பாசங்களுக்குப் பிரயோகித்தால், அல்லது இவைகளிலெதையாவது ஸ்பரிச நரம்புகளில் அவைகள் மூளையுடன் பந்தமாயிருக்கும்பொழுது பிரயோகித்தால் இவைகளெல்லாம் உணர்ச்சியை உற்போதிக்கும். இவைகளை சலன நரம்புகளுக்குப் பிரயோகித்தால் இவையெல்லாம் சுருங்குவதையுண்டாக்கும்.

யாந்திரிக, பூதிக அழற்சி அல்லது எவ்வித எரிப்பும், அவைகளின் உக்கிரத்தால், நரம்பு நரீகளுடைய மூலகட்டடத்தை நசிப்பித்துவிட்டால், அதற்குப்பிறகு மத்தியாபிகார நரம்புகளை மூளையினின்று நசிந்துபோன இட

290 நரம்புகார்களில் வேகம்செல்லும் வகை நியாயங்கள். [18-ம்

த்தைவிட தூரமாகிய அதாவது நசிந்த இடத்திற்கப்பறம் எந்தபாகத்திலாவது உத்திபனம்செய்தால் உணர்ச்சி அறிவையுண்டாக்கும் குணமற்றுப்போகின்றது.

இதேமாதிரியாகவே சலன நரம்பை உத்திபனம்செய்யுமிடத்திற்கும் சதைக்கும் மத்தியில் எவ்விடத்திலாவது அழுத்தி நகர்க்கி நரமாக்கியிருந்தால், எவ்வித உத்திபனத்தாலும் சதையைச் சுருங்கச்செய்வது அசாத்திய மாயிருக்கிறது.

நரம்புகார்களின் தொழில் தர்மமென்னவென்றால், எந்த நரமிலாவது அழுத்தமுண்டாக்கினால், அதினாலுண்டாகும் வேகத்தை அந்த நரம்பிலேயே கடைவரையில் செலுத்துமல்லாது பக்கத்திலிருக்கும் நரம்புகளுக்கு வியாபிக்க ஒட்டமாட்டாது.

நரம்புகார் வேகம் மிக்க அதிகமாயிருக்கிறது. ஒரு நிமிஷத்தில் 111 அடி தூரம் வேகத்தைக் கொண்டுபோகும் சக்தியுள்ளவென்று உத்தேசிக்கிறார்கள்.

மத்தியாபிகார நரம்புகள் அழுத்தத்தை அவைகள் எந்தபாகங்களில் பரவியிருக்கின்றதோ அந்தப் பாகங்களிலிருந்து அவைகள் உற்பத்தியாகிய நரம்பு மத்தியங்களை நோக்கிக்கொண்டுபோகும். அல்லது அவைகள் போகும் வழி நோக்கிக் கொண்டுபோகப்படும். ஸ்பரிச நரம்பை வெட்டின பாகத்திலிருக்கும் சமீப துனியை, அதாவது நரம்பு மத்தியத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் பாகத்தை உத்திபனப்படுத்தினால், உணர்ச்சி உற்போதமாகும்; அல்லது பிரதிகாணச் செயலாவது உற்பத்தியாகும். தூர துனியை, அதாவது வெட்டுண்டுபோன துண்டின் பக்கத்து துனியை உத்திபனப்படுத்தினால் யாதொரு பலனும் காணுகிறதில்லை.

ஸ்பரிச நரம்பின் போக்கில் எப்பாகத்திலாவது அழுத்தினால், மனதில் உண்டாகும் உற்போதம் எந்த பாகத்தில் உத்திபனம் செய்யப்பட்டதோ அந்தபாகத்

தத்தி.] நரம்புகார்களில் வேகம்செல்லும் வகை நியாயங்கள். 291

தைமாத்நிரம் உண்டாகும் உணர்ச்சியுடன் சம்பந்தப்படுத்துவதுமல்லாமல், அந்த பாகத்துக்குச் சேர்ந்த அந்த நரம்பின் கிளைகள் போயிருக்குமிட மெல்லாவற்றையும் அவ்வுணர்ச்சியுடன் சேர்ந்த பாகங்களாக உணரும்படி செய்யும். அதாவது, உண்டாகும் உணர்வு, அந்த நரம்பு நார்கள் பரவியிருக்கும் பாகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் உத்திபன பிரயோகம் செய்ததுபோலிருக்கும். ஒரு நரம்பு முண்டம் முழுவதையும் அழுத்தம்பெறச்செய்தால் அந்த முண்டத்தினின்று கிளைகள் வியாபித்திருக்கும் பாகங்கள் எல்லாவற்றிலும் உணர்ச்சியையறியலாம். முண்டத்தின் பிரத்தியேக பாகத்தை அழுத்தம்பெறச்செய்தால் அப்பாகத்தின் கிளைகள் போயிருக்குமிடங்களில் மாத்நிரம் உணர்ச்சி உற்பவிக்கும். ஆகையால், பார்சவாபு வியாதிகளில் அங்கங்கள் வெளிப்புற உத்திபன ஹேதுக்களுக்கு உணர்வற்றிருந்தபோதிலும், முளையுடன் அவ்வங்கங்கள் அடைந்திருக்கும் நரம்பு சம்பந்தத்தில் கெடாமல் சரியாயிருக்கும். நரம்பில் ஏதாவது பாகங்களிருந்தால் அப்பாகம் உத்திபனமடைவதால் அவ்வங்கங்களின் மிகு வேதனையுண்டாகிறது. அப்படியே அந்த ஸ்பரிச நரம்பு உற்பத்தியாகும் நரம்பு மத்தியத்தில் உத்திபனமடைந்தாலும் வேதனையுண்டாகும்.

இந்த விஷயங்களில் உணர்ச்சியாவது வேதனையாவது நரம்புகள் ஒடியிருக்கும் பாகங்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து உத்திபோதமாக தேர்ந்தெடுப்போதிலும் உத்திபனமடைந்த பாகம் இன்னது என்று அறிந்துகொள்ளும் சக்தியும் மனதுக்கு உண்டு.

கந்த, ரூப, சப்த, ரச நரம்புகளிலும் சாதாரண ஸ்பரிச நரம்புகளின் தர்மங்களை இருக்கின்றன. பலன் எப்பொழுதும் மத்தியத்தை நோக்கியிருக்கும். நரம்பின் முண்டத்தை உத்திபனப்படுத்துவதால் அதின் ஓங்களை உத்திபனப்படுத்தின குணமே காணும். நரம்பை வெட்டிப்பிரித்தால் உத்திபனத்துக்குத் தக்கபடி மத்திய முடிவு

ஜவாபுதருமல்லாது துணிமுடிவிலொன்றும் கிடையாது. ஆனால் உணர்ச்சிமாத்திரம் ஓரங்களைச் சுட்டிக்காட்டும். ஆனால் இவைகளிலுண்டாகும் பலன்களில் சில விசேஷங்களுண்டு. சாதாரண ஸ்பரிசு நரம்பு மூலமாகச் செல்லு முத்திபனங்களால் வேதனையுண்டாகுமாயில் ரூபநரம் புக்கு அவ்வுத்திபனங்களுண்டாகில் பளிச்செனும் வெளிச் சங்கள் தோன்றும். கந்த நரம்புகளுக்குச் செய்தால் எதையோ ஒன்றை வாசனையிடித்ததுபோலத் தோற்றும். அதேமாதிரியாகவே மற்ற இரண்டு இந்திரிய காட்சிகளின் நரம்புகளாலும் தோற்றும்.

உள்ளுக்குள்ளே யுண்டாகும் சில உணர்வுகளுக்கு இதுவே காரணமாகும். ரூபநரம்பில் யாதுகாரணத்தாலாவது அழுத்துதலுண்டானால், அல்லது அது உற்பத்தியாகும் மூளையின் பாகத்தில் அழற்சிபுண்டானாலும் நோயாளி தான் பளிச்செனும் வெளிச்சங்கள் காணுவதாக நம்புகிறான். பிணியாளிகள் அழக்கடி அவஸ்தைப்படும் கஷ்டமென்னவென்றால், அவர்கள் நிலையில் ஏதோ சப்த வேதனை யுண்டாகிறதென்பதே. அதற்கு காரணம் வெளிப்புற சப்தங்களுடன் யாதொரு சம்பந்தமும்ற்ற சப்த நரம்புகளின் உத்திபனமேயாகும். இவ்வுத்திபனத்தின் காரணம் அழியப்பட வில்லை.

சலன நரம்புகளின் தர்மங்கள் இதுவரையிலும் சொன்னவற்றினின்றும் விரோதமான வித்தியாசங்களை யுடைத்தாயிருக்கின்றன. சலன நரம்புக்கு ஒரு உத்திபனத்தை யுண்டாக்கினால் அதன் பலன் நரம்பின் துணிமுடிவில் அந்த நரம்பு பாவிபிருக்கும் சதைகள் சுருங்குவதினால் காணப்படுகிறது. வேதனை அல்லது மந்தெவ்வித உணர்ச்சியுண்டாவதாகத் தோற்றுகிறதில்லை. சலனநரம்பை வெட்டிப் பிரித்துவிட்டாலும் வித்தியாசம் நன்றாய்த் தெரியும். வெட்டிக்கப்பட்டிருந்த துணி யை உத்திபனப்படுத்தினால் சாதாரண காலத்திலுண்டாவதுபோலவே சதை சுருங்கும். நரம்புமத்தியத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்

ருக்கும் நரம்பின் வெட்டுதுனியை உத்திபனம் செய்தால் யாதொரு பலனும் காணமாட்டாது.

சலனநரம்பை யாந்திரிக அழற்சியால் உத்திபனப்படுத்தினால், உத்திபனம்செய்த இடத்தின் கீழே இருக்குமந்த நரம்புக்கிளைகள் பரவுமிடமெங்கும் உள்ள சதைகள் குறுகும். ஆனால் அதற்குமேலேயிருக்கும் கிளைகள் பரவும் சதைகள் நேராகச் சுருங்கமாட்டா. இதனால் தான் ஒரு சலனநரம்பு; மற்ற நரம்புகளுடன் நடுவழியில் உண்டாகும் வளைகளில் சேர்ந்து, பிறகு இவைகள் கூடி பெரிய நரம்பாகச்செல்லும். நரம்பில் எல்லாப் பாகங்களும் நரம்பின் உத்திபனத்துக்குட்பட்டமாட்டாது. உத்திபனம்பெற்ற நரம்பின் பாகம் மாத்திரம் அப்பெரு நரம்பில் அழற்சியைக் கொண்டுபோகும்.

நரம்புமத்தியங்களின் தொழில்கள்.

மூளை, முள்ளந்தண்டு, நரம்பு வேர்முடிகள் இவைகள்தான் நரம்பு மத்தியங்களாக இருக்கின்றன. இந்த நரம்பு மத்தியங்களில் ஒவ்வொன்றும் இவைகளினின்று முறையே நரம்புகளாகப் போய்ச் சேருமிடங்களிலெல்லாம் தொழில்புரியும் சக்தியுடையதாயிருக்கும்.

நரம்பு மத்தியத்தின் தொழில்களை பின்வருமாறு பிரிக்கலாம். 1. செலுத்துகை, 2. மாறுதல், 3. பிரதிகரணம், 4. தனக்குத்தானே செயல்புரிதல்.

I. அழற்சி நரம்புமத்தியங்களுக்கும் அதற்கப்புறமும் செல்லும். உதாரணம், குடலில் எவ்விடத்திலாவது உணவு இருந்தால் அந்தவிடத்தில் சிலேஷ்மச்சவ்வி லிருக்கும் நரம்புகள் உணவுபடுவதால் உத்திபனமாகி அழற்சி அனைச்சேர்ந்த நரம்பு மத்தியத்துக்குச்செல்லும். அதாவது அதற்குச்சேர்ந்த ஒற்றுணர்வு நரம்பு வேர் முடிச்சுக்குப் போய்ச்சேரும். சாதாரணமாக அந்த முடிச்சினின்றும் பிரதிகரணத் தொழில்பெற்று குடலின் பாகத்துக்குச் சதைச் சொக்காயிலிருக்கும் நரம்புகள் மூலமாய் செல்வதால் அச்சதைகள் சுருங்கும்.

உணவில் காரம் முதலிய அழற்சிபுண்டாக்கும் வஸ்துக்களிருந்தால் நரம்பு மத்தியத்தால் அந்த அழற்சி அப்பீறியிருக்கும் நரம்புகளில் பாய்ந்து தன்பக்கத்துள்ள நரம்பு மத்தியங்களுக்குச் செல்லும், அதனால் அவைகளும் பிரதிகரணக் கிரியைபுரிந்து குடலின் பெரும்பாகம் சுருங்கும். அழற்சி பின்னும்கிளையிருந்தால் முள்ளந்தண்டைச் சேர்ந்த நரம்பு மத்தியங்களில் தாக்கி அவை மூலமாய் பிரதிகரணத்தொழில் புரியப்பெற்று, உதரர்சதைகள் சுருங்கி வயிற்றுவலிபெடுக்கும். இதைவிட அதிகமான அழற்சியாயிருந்தால் மூலையிருக்கும் நரம்பு மத்தியங்களையுமெட்டியதை நாமுணரலாம். விரோதத்தில், மனதின் காரணத்தால் மூலையினின்று படிப்படியாய் நரம்பு மத்தியங்களுக்கு அழற்சி யிறங்கி, கிரமேன ஜீரணாகருவி முதலிய கருவிகளில் விசர்க்களீர் சுரக்கச் செய்யும்.

நரம்பு சுத்தி மாற்றமடைதல்.—மத்தியாபிகர நரம்பு நார்கள் அழற்சியை வேறு நரம்புகளுக்குத் தருகிறதில்லையென்று சொன்னோம். ஆனால் அழற்சி ஒரு நரம்பு மத்தியத்தை யடைந்துவிட்டால் அந்த மத்தியத்தினின்றின்போகும் வேறு நரம்புகளுக்கும் அது செலுத்தப்படுகிறது. உதாரணம்: இடுப்பில் வியாதியிருந்தால் வேதனை முழங்காலில் காணுகிறது. இடுப்புச்சந்தியிலிருக்கும் நரம்புகள் மூலமாக அழற்சி அந்த நரம்புகளுக்கிருக்கும் நரம்பு மத்தியத்தை யடைகின்றது. அதாவது முள்ளந்தண்டுக்குப்போகின்றது. முள்ளந்தண்டிலுள்ள அந்த நரம்பு மத்தியத்தினின்று புறப்பட்டுவரும் வேறு முழங்கால் நரம்புகளுக்கு அவ்வழற்சி மாற்றப்படுகிறது. முழங்கால் நரம்பு மத்தியங்களில் மூளைக்குச் செல்லுகிறது. முழங்கால் பக்கத்திலிருக்கும் நரம்பு மத்தியத்தால் மூளைக்கு அழற்சி செல்லுகிறபடியால் நமக்கு வலி முழங்காலில் காணுகிறது. இது மாற்றப்பட்டு, இம்மாதிரி அவ்வ

ழற்சி மூளைக்குச் சென்றாலும் ஆகியழற்சியே மூளைக்கும் சென்று இடுப்பிலும் வலியை அறியக்கூடும்.

பிரதிகரணச்செயலில் மத்தியாபிகர நரம்புவழியே சென்ற அழற்சி நரம்பு-மத்தியம் சேர்த்தபிறகு, அம்மத்தியத்தால் மத்தியாதீத நரம்புகளுக்குச் செல்வதால் அழற்சி மாற்றப்பெற்றால் அவைகள் பிரதிகரணத்தொழில்புரிந்து சலனத்தையாவது, விசர்க்கங்களையாவது, போஷிப்பையாவது இந்தத் தொழில்களில் எதையாவது நரம்பு துளி முடிவில் செய்கிக்கும்.

தனக்குத்தான் தொழில்புரியும் சக்தியென்பது நரம்புமத்தியங்களில் அழற்சி உற்பத்தியாகி, அவ்விடமிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு நரம்புகள் மூலமாய் செல்லுவது என்று சொல்லலாம். இதன் காரணங்கள் செவ்வையாகத் தெரியவில்லை.

உபபிரதிகரணத்தொழில்.

பிரதிகரணத்தொழில் இருவகைப்படும். ;

(1) உதாரணம் பிரதிகரணத்தொழில். உதாரணம்: மூலையுண்ணல், கண்மணி சுருங்கல், கட்டைவீசலை குருகுருப்படுத்தும்பொழுது காலே இழுத்துக்கொள்ளுதல், இவைகள் எல்லாவற்றையும் மனிதன் செய்வதுபோலவே இளங்குழந்தையும் செய்யும்.

(2) உபபிரதிகரணத்தொழிலில், முதல்தரம் தொழில் புரியும்பொழுதும் இச்சாபரமாய் புத்தியைச் செலுத்திச் செய்யவேண்டிய தொழில்கள். ஆனால் அடிக்கடி செய்து வழக்கத்தில்வந்துவிட்டால் இச்சாபரமென்று மனதுக்குத்தோன்றாமலே யாந்திரிக கருமமாக நடத்தக்கூடிய தொழில்களாம். உதாரணம்: படித்தல், எழுதுதல், நடத்தல் முதலியவைகள். எப்படி இவ்வளவு செயல்களாகிய தொழில்கள் இச்சையில்லாமலும் ஞானமில்லாமலும் புரியப்படுகிறதென்பதை விளக்குவோம்: உதாரணம், நடத்தல். இத்தொழில்புரிவதில் பல சதைகள் மட

ங்கவும் நீளவும் வெண்டியிருக்கிறது. இத்தொழில்கள் இச்சாபூர்வமாகச் செய்யவேண்டிய தொழில்கள். கொஞ்சகாலம் திருப்பித்திருப்பி இவைகளை புரிந்துகொண்டுவந்தால் இத்தொழில்கள் அவைகளுக்குச் சேர்ந்த நரம்பு மத்தியங்களுக்கு அப்பியாசமாய் வழங்கப்பட்டுப்போகின்றன. வழக்கத்தின்மேல் தெரீழில்புரிவதிலுள்ள இச்சாமாத் திரகஷ்டம் நீங்கி சுருவில் புரிகின்றது. இவ்வித வழக்கத்தால் தான் நடக்க ஆரம்பித்தபிறகு வேறுபெயர்ந்த யோசனை மிலாவது புத்தியைச் செலுத்திவிட்டாலும் கால்கள்மாதிரம் நடந்துகொண்டேயிருக்கும். சில சமயங்களில் நித்திரைசெய்யும்பொழுது, சிலர் நடக்கிறார்கள். படிப்பது எழுதுவது இப்படிப்பட்ட செயல்களில் புத்தி முதலில் தொழிலை யாரம்பிக்கச்செய்கின்றது. ஆரம்பித்தபிறகு புத்தி பூர்வமாய் தொழில் நிற்குமளவும் படிக்கவேண்டும், எழுதவேண்டும்; இவை முதலிய ஞானமில்லாமலே தொழில்மாத்திரம் நடந்துகொண்டுபோகின்றது.

ஞானபூர்வச் செயல்களை ஞானரகிதமாய்ச் செய்யும்படி வழக்கத்தில் கொண்டுவர நரம்புகளின் உயிர்சக்தியில்லாமல் போய்விட்டால் படிப்பு அல்லது கற்றல் அசாத்தியமாய்விடும்.

முளை-முள்ளந்தண்டுக்கொடி நரம்புமண்டலம்.


இதில், முள்ளந்தண்டுக்கொடி, முகுளம், மூளை இவைகளினின்று உற்பத்தியாகிச்செல்லும் சகல நரம்புகளையும் பற்றிய தர்மங்களை யெடுத்துச்சொல்லுவோம். இவைகளைச் சேர்ந்த நரம்பு வேர் முடிச்சுகளைப்பற்றியும் சொல்லப்படும்:

முள்ளந்தண்டுக்கொடியும் அதின் நரம்புகளும்.

முள்ளந்தண்டுக்கொடி நரம்பு வஸ்துக்களாலாகிய ஸ்தம்பாகாரமுடைய கருவிபாகும். மேல்பக்கம் முகுளத்தினால் மூளைபுடன் இணைக்கப்பட்டும், கீழ்புறத்தில் இப்பிணுடைய முதல் முள்ளெலும்பினடிப்புறத்தில் அதன் மெலிவாகிய சாம்பல்நிற வஸ்துவாக முடிவுபெறும்.

இந்த முடிவு, இதைச் சுற்றிலும் அனேக நரம்புவேர்கள் ஒன்றுபட்டு முடிச்சலான கொடியின் அடிபாகும். இக்கயரில் ஒரு துவாரம் உண்டு. அது முகுளத்துவரையில் எட்டியிருக்கிறது. அதற்கு மூளையின் நான்காவது குழியென்றும் பெயர். சொல்லுவார்கள்.

31-ம் படம்.



31-ம் படம். முன் காட்டும் முளை. 1. மூளையின் வஸ்துப்பாதி. 2. அதின் இடப்பாதி. 3. அதின் கடுவில் நெகிசுச் செல்லும் பிளவு. 4. துளை மூளை. 5. முகுளம். அதிலிருந்து கிளம்பும் புல நரம்புகளின் தோற்றவரம்புகள் தெரிவன.—கீரீன்.

முள்ளந்தண்டுக்கொடி நீளத்தில் முன்புறமென்றும் பின்புறமென்றும் சொல்லும்படி இரண்டு பாகமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பிளவை மேற்சொல்லிய ஓட்டைக்கு முன்புறத்திலிருக்கிறது. முன்பக்கத்தில் கொடியில் வெண்மைநிறவஸ்துவும், சாம்பல்நிறவஸ்துவும் கலந்திருக்கின்றது. பின்புறத்தில் சாம்பல்நிறவஸ்து மாத்திரம் இருக்கின்றது. கொடியின் ஒவ்வொருபாகமும் மூன்று சிறிய பாகங்களாக நீளத்தில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முன், மத்திய, பின் எனச் சொல்லலாம். முன்னும் மத்தியத்துக்கும் இடையிலிருந்து வரும் நரம்புவேர்களுக்கு முள்ளந்தண்டு நரம்புகளின் முன்பக்கத்து வேர்களென்றும், மத்தியத்துக்கும் பின்னுக்கும் இடையிலிருந்து வரும் நரம்புவேர்களுக்கு அந்நரம்புகளின் பின்

பக்கத்திய வேர்கள் என்றும் பெயராகும். ஒவ்வொரு முள்ளெலும்புக்கும் நேராக ஒவ்வொரு பாகத்திற்கு ஒரு ஜதை முன்பின் வேர்கள் வருகின்றன.

முள்ளந்தண்டிக்குடியின் வேண்மைவஸ்து.

கொடியின் வெண்ணிறபாகம் நாள்களாலானவைகள். கொடியில் உற்பத்தியாகும் கணக்கற்ற நரம்புகளினுடையவும் கொடிக்கு வந்துசேரும் நரம்புகளினுடையவும் ஒட்டுகள் இதிவிருக்கின்றன. இந்த நரம்புகள் எல்லாம் மூளைக்குச்செல்லும் வழியாக விருந்தபோதிலும்தான் இதில் இன்னம் சில விசேஷ சங்கதிகளுண்டு. முள்ளந்தண்டிக்குடியின் சாம்பல்வண்ணவஸ்து, மூலநரம்பு நரம்புகளும் நரம்புச் சாலங்களுமடங்கிய வஸ்துவாகும்.

முள்ளந்தண்டிக்குடியில் முப்பத்தொரு ஜதை நரம்புகள் உற்பத்தியாகின்றன. இவைகள் கொடிமுழுதிலும் முள்ளந்தண்டைச்சேர்ந்த முள்ளெலும்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஜதையாயிருக்கும். இவைகள் அமுள்ளெலும்பினையிலிருக்கும் துவாரங்கள்வழியேறுவதென்றே வெளிவரும். வெளிவருமிடத்தில் ஜதைவேர்களுடன் ஒன்றுபட்டு முடியாகிப் பிறகு இரண்டிபிரிவாகப் பிரிந்து நரம்புகள் ஓடும்.

முள்ளந்தண்டிக்குடியின் தொழில்.

முள்ளந்தண்டிக்குடி. நரம்பு - மத்தியமாகையானது அதன் தொழிலை முன்னுவிதம் பிரிக்கலாம். (1) செலுத்துதல், (2) மாற்றுதல், (3) பிரதிகாணக் கிரியைபயித்தல்.


தேகத்தின் மற்ற பாகங்களுடன் இந்த நரம்புகள் சேர்ந்திருக்கும். உடற்கூறைப் பார்க்குமளவில், தேகத்தினின்றும் தேகதுளிகளினின்றும் நரம்பு-உத்தினைகள் மூளைக்குச் செல்லவேண்டுமானால் முள்ளந்தண்டிக்குடி மூலமாகவே போகவேண்டியிருக்கின்றது.

மூளையினின்றும் அங்கங்களுக்கு நரம்பு-அழற் போகவேண்டுமானாலும் இதன்மூலமாகத்தான் செல்வேண்டியிருக்கிறது. இப்படி நரம்பு அழற்சிகள் சரியாய்

போகவும்வரவும் வேண்டுமானால் முள்ளந்தண்டிக்குடியின் சரியான ஸ்திதியிலிருக்கவேண்டும். அதன் எந்தப் பாகமாவது நசித்துப்போய்விட்டால், ஹானியான இடத்திற்குக் கீழிருக்கும் நரம்புகள்மூலமாய் ஏற்படும் ஸ்பரிசு அழற்சி மூளையிற்போய் எட்டமாட்டது. மூளையும் அந்த பாகத்துக்குக் கீழிருக்கும் நரம்புகளால் என்ன அழற்சிகளைச் செலுத்தவும் சக்தியற்றுப்போய்விடுகிறது.

(2) முள்ளந்தண்டிக்குடியானது ஒரு நரம்பு-மத்தியமாகையால், அல்லது சரியாகப் பேசுமிடத்தில் பல நரம்பு-மத்தியங்களுடனிருக்கிறபடியால் நரம்பு-உத்தினைகளை ஒரு நரம்பினின்று மற்றொரு நரம்புக்கு மாற்றுவதற்கும், பிரதிகாணக்கிரியை புரியச்செய்வதற்கும் சக்தியையுடைத்தாயிருக்கின்றது.

32-ம் படம்.



32-ம் படம். நடுவாகப் பிரிந்த மூளை, துணை மூளை, முதுகன் இவைகளினது வலப்பக்கம் 1. மூளை, 2. துணை மூளை, 3. முதுகன், 4. கச்செருவதை, 5. மகா துன்னம், 6. அடி மூளையிலிருந்து விளம்பும் நரம்புகளுள் முதலாம் சோடாகிய எந்த நரம்பு, 7. இரண்டாம் சோடாகிய பள்ளை நரம்பு, 8. கண், 9. மூன்றாம் சோடி, 10. நாலாம் சோடி, 11. ஐந்தாம் சோடி, 12. ஆறாம் சோடி, 13. ஏழாம் சோடி, 14. எட்டாம் சோடாகிய சேம்பி நரம்பு, 15. ஒன்பதாம் சோடி, 16. பத்தாம் சோடி, 17. பதினோராம் சோடி, 18. பன்னிரண்டாம் சோடி, 19. பதின்ம நரம்பு, 20. பட்டம்.—ஃரீன்.

இப்படி அழற்சியை மாற்றும் சக்தி இதற்கு இருக்கிறதென்பதைப்பற்றி முந்தியே சொன்னோம். இந்த சக்தி மூளையைச் சேர்ந்ததல்லவென்பதும் கொடியைச் சேர்ந்ததுதான் என்பதும் ஏறக்குறைய நன்றாய் விளங்குகின்றது. இடுப்புவிடையில் முழங்காலில் வலிகாண்பதும்; கல்லடைப்பு ரோகத்தில், மூத்திரப்பையில் நோவுகாணாமல் நீர்த்தாரையிலாவது ஆண்குழி விங்கத்திலாவது வேதனையெடுப்பதினாலும் காணலாம். பிரதம உப பிரதிகரணக்கிரியைகளிரண்டுமிருந்தால் இரண்டு அழற்சியையும் உணர்வேண்டியிருக்கும்.

(3) முள்ளந்தண்டுக் கொடியின் பிரதிகரணக்கிரியை.

மனிதனிலும் மற்றுமுள்ள முலையுன்னும் சாதிமிருகங்களிலும், முள்ளந்தண்டுக்கொடியானது, பெரிய நரம்பு-மத்தியங்களின் ஆளுகைக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்கிற படியால், கொடியினுடைய சுயமாயுள்ள பிரதிகரணக்கிரியைபுரியும் சக்தி, அவ்வளவு நன்றாய் கண்டறிவது கஷ்டமாயிருக்கின்றது. மனிதனுடைய முள்ளந்தண்டுக்கொடியை மூலையினின்றும் பிரித்துவிட்டால் கொடியின் அடிப்பக்கங்கள் தங்கள் பளுவுக்குத்தக்கபடியும் பக்கத்துத்தசைகள் இழுக்கும்விதத்தில் கீழேபடிந்துபோகும். பிறகு தேகத்தை அழற்சிபெறச்செய்தால் கொடி அழற்சியை நோக்கிச்செல்லுகிறதில்லை. அன்வகளைத்தொட்டால் அவைகளின் பிரதிகரணச்செயல்கள் ஒழுங்கின்றி உத்தேசமற்றதாகக்காணும். ஒரு நவனையை யிதேமாதிரியாகச் செய்துபார்த்தால் பிரதிகரணக்கிரியை கொடிபுரிவது நன்றாய் விளங்கும். உதாரணமாக நவனையின் தலையை வெட்டிவிட்டால், அவயவங்கள் சுய இடத்தில் அமைந்தேயிருக்கும் அதை அழற்சிவிட்டாலும் பிறகு எதாஸ்தியிடைந்து நிற்கும். வயிற்றையாவது முதுகையாவது உத்திபனப்படுத்தினால், கால்கள் அழற்சியையடக்கும் உத்தேசத்துடன் அசைகிறதைப்பார்க்கலாம். ஆகையால் பிராணியின் மனது இந்தச் செயலிலிருப்பது

போல ஒத்த தொழிலாகிறது. மனிதனிலும் கொடிக்கி இப்படிப்பட்ட சக்தியிருக்கிறதென்பது நிச்சயமே. ஆகையால் மனிதனிலும் பெரிய பிராணிகளிலும் கொடிக்கு பிரதிகரணக்கிரியைபுரியும் சக்தியிருந்தபோதிலும் இதற்கு வேண்டிய அழற்சி கொடியிலேயே ஜனிக்கமாட்டாது. தவிர கொடி வேறு உதவியில்லாமல் இந்தத் தொழிலை சரியாகச் செய்விக்கவுமாட்டாது.

மனிதனில் கொடியினொருபாகம் சேதப்பட்ட பிறகாவது சீர்குலைந்த பிறகாவது, கால்களில் சரீரத்தை உத்திபனம்செய்தால் உண்டாகும் அசைவுகள் கொடிமூலமாய் மூளை சம்பந்தத்துடனிருக்கும்பொழுது புத்தி தொழில்புரிந்தால் அப்பொழுது இதுபோன்ற அழற்சியால் உண்டாகும் அசைவுகள்போல இருக்கமாட்டாது. ஏனெனில், புத்தி அழற்சியையறிந்து அழற்சியடைந்திருக்கும் சதைநீர் தனதானகைக்குள் கொண்டுவரவேறு தொழில்நீரைச் செய்துவிடுகின்றது. கொடி சவுக்கியஸ்தியிலிருந்தபோதிலும், புத்தி வேறுவிதமாய் செலுத்தப்பட்டகாலத்தில் அழற்சியின் பலனாக அனிச்சாபூர்வமாய் அசைவுகள் உண்டாகும். னாங்கும்பொழுது குழந்தையின் உள்ளங்கையை விரலாற் தொட்டால் பிரதிகரணக்கிரியை பெற்ற கதைகள் உடனே விரலை மூடிக்கொள்ளச்செய்கிறது. குழந்தை விழித்துக்கொண்டிருந்தால் இப்படித் தொடுவதால் கை மூடிக்கொள்ளப்படுகிறதில்லை.

முகுளம்.

முள்ளந்தண்டுக்கொடி மேலுக்கு நீண்டு மூளை ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் பாகத்திற்கு முகுளம் என்று பெயர். இதிலும் வெண்மை, சாம்பல்நிற வஸ்துக்கள் இரண்டுமிருக்கின்றது. முள்ளந்தண்டுக்கொடியின் சகல பாகங்களேக்காட்டிலும் முகுளம் பெரியதாயிருக்கின்றது. அதன் ஸ்தம்பங்கள் ஒன்றுகூடி மொக்குள்போலிருக்கும். அடிசிறுத்து மூலையின் பக்கம் போகப்போக நுனி விரிந்து

பெரியதாகும். முள்ளந்தண்டிக்கொடியின் ஒவ்வொருபாகமும் எப்படி மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டதோ அப்படியே முகுளத்தையும் பிரிக்கலாம். முகுளத்தின் பிரிவுகள் கொடியின் பிரிவுகளுடைய நீட்டமேயாகும்.

முதனத்தின் தொழில்கள்.

முள்ளந்தண்டிக்கொடியின் தொழில்மாகிய முகுளத்தின் தொழிலையும் மூன்றுவகைகளாகப் பாகிக்கலாம். 1. செலுத்துதல், 2. மாற்றுதல், 3. பிரதிகரணக்கிரியைபுரிதல். இவைகளுடன் தனக்குத்தானே செயல்புரியும் குணம் கொஞ்சம் முகுளத்திற்கும் உண்டென்று சிலர் எண்ணுகிறார்கள்.

(1) உத்திபனங்களைச் செலுத்துவதில் முகுளத்திற்கு, நரம்புமண்டலத்தில் உள்ள எந்தபாகத்தையும்விட அதிக விசாலமான பரப்பில் தொழில் உடைத்தாயிருக்கிறது. ஏனெனில், மூளையினின்று முள்ளந்தண்டிக்கொடிக்கும் மூளைப்பாலத்தடியிலிருக்கும் நரம்புகள் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ள போக்குவரத்துகள் முகுளத்தின் மூலமாகவே ஆகவேண்டியிருக்கின்றது.

(2) உத்திபனங்களை நரம்புவிட்டு நரம்புக்குமாற்றவும் பிரதிகரணக்கிரியை புரியும் தொழிலும் நரம்பு மத்தியமாக இருக்கின்றது. முள்ளந்தண்டிக்கொடியைவிட இத்தொழில்கள் புரிவதில் அதிக விசேஷமுடைத்தாயிருக்கிறது. இதன் பிரதிகரணத்தொழிலில் ஒன்றாகிய சுவாசம் மனிதனுக்கும் பெரிய பிராணிகளுக்கும் அத்தியாவசியமானது. அதன்மீது சில நியமிக்கப்பட்ட ஜீவிப்பதரிது. (Pneumogastric Nerves) ஸ்வாசோதர நரம்புகள் முகுளத்தில் உற்பத்தியாகுமிடத்திற்கடியில் முகுளத்திற்குள் சுவாச சலனங்களை கிர்த்தம்செய்யும் நரம்பு மத்தியமிருக்கின்றது. சுவாசோதர நரம்புகள் சுவாசத்திற்கு வேண்டியவைகள் அல்ல. ஆயினும் சுவாசச் செயல்களுக்கு வேண்டிய பிரதிகரணக்கிரியையை முகுளத்தின் இந்த பாகத்தான் தருகின்றது.

சுவாசசலனங்களுக்குரிய நரம்பு-மத்தியமாகிய முகுளத்திற்கு விசாலமான பரப்பின்மேலாகிய பற்றிருக்கிறதென்பதையும் காணலாம். தேகத்தின் வெளிப்புறத்திலாவது அல்லது உட்புறத்திலாவது எந்த இடத்தில் அழற்சியுண்டாக்கினால், அதன் நியித்தம் சுவாச சலனங்கள் பிரதிகரணக்கிரியையாக புரியப்படும். தேகத்தின் எந்த பாகத்திலாவது குளிர்வது சடுதியில் தாக்கினால், அதன்மீது முகுளத்தில் குளிர்த்த தண்ணீரை யடிப்பதால் அனிச்சாபூர்வமான சுவாசங்கள் உண்டாகும்; தொண்டை, அன்னவாகி, இரைப்பை அல்லது குடல் இவைகளில் அழற்சியுண்டானால், சுவாசச்செயல்களை விருத்தி செய்து வாந்திக்கு வேண்டிய உதவியடைகின்றது. மலக்குடல் மூத்திரப்பை, கருப்பை இவைகளில் கொடுமையாகிய உத்திபனம் உண்டாகில் சுவாசச்சதைகள் தொழில்புரிந்து மற்றக் கரணங்களுக்கு உதவி, முறையே மலம், மூத்திரம், பிண்டம் இவற்றை வெளியே தள்ளச்செய்யும்.

விழுங்குதலுக்கு வேண்டிய செயல்களை ஒன்றின் பின்னொன்றாகப் புரிய, அன்னம், தொண்டை, அன்னவாகி இவைகளைச் சேர்ந்த சதைகள் தொழில்புரியச்செய்வதும் முகுளத்தின் நரம்பு-மத்தியத்தன்மையால் தான் என்று தோன்றுகிறது. முகுளம் கெட்டுப்போனால் விழுங்கும் சக்தியுமற்றுப்போகும்.

முகுளம் பின் வருவனவற்றிற்கு நரம்பு-மத்தியமாகியிருக்கின்றது. முன்னொன்றை (1) சுவாசம், (2) விழுங்குதல், இவைகளுடன் (3) மென்மையித்தலும், (4) உமிழ்நீர் சுரத்தல், (5) இரத்தாசயச்செயலை சுவாசோதர நரம்புகள் மூலமாயும் ஒற்றுணர்வு நரம்புகள் மூலமாயும், நிற்தாசயச்செயலும், (6) இரத்தக்குழல் நரம்புகளுக்கு மத்தியமாயும், (7) எண்ணுக்குப்போகும் சில நரம்புகளுக்கு மத்தியமாகவும், (8, 9) சப்பத, ரச இந்நிரியங்களுக்கு நரம்புவேர் முடிச்சுகளாயும் நரம்பு மத்தியங்களாயும்,

(10) வாக்கு என்னும் பேசும் சக்திக்கு, பேசுவதில் அதை யுண்டாக்கவேண்டிய சதைகளினசைவுகளையும் அதன் அளவு பரிமாணத்தையும் கிர்த்தாரம்செய்யும் நரம்பு-மத்தியமாகவும் இருக்கின்றது.


மதுமூத்திர மத்தியம் என்னும் முகுளத்தைச் சொல்வார்கள். இது ஒரு சமயம் முகுளத்தின் இந்த சலன நரம்புகள் நரல்மேல் தொழில் புரிவதால் அது வண்டாகும் மாறுபாடாயிருக்கலாம்.

முகுளம் ஹானியடையாமல் சரியாயிருக்கும் வரையிலும், சுவாச சலனச்சதைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்வரையிலும் சுவாசமும் உயிரும் இருந்தபோதிலும் இதற்கு ஸ்பர்ச ஞானமாவது இச்சாபுத்தியாவது கிடையாது. மூளை நீங்கினபிறகு சலனங்கள் உத்தேசமற்றதுபோலும் உணர்வுக்கு தட்டாமலிருப்பதுபோலும் பரிசைகளில் காணுகின்றது. ஆகையால் முகுளத்திற்கு ஸ்பர்ச ஞானங்களை யுண்டாக்கவும், இச்சா மாத்திரத்தொழில்கள் புரியும் சக்தியையுமுடைய மனதின் கருவியாகமாட்டாது. சிரோமத்திய சேதி (Fons Varolii), குறுக்கே போகும் நார்களில் சின்ன மூளையின் இரண்டாங்குகளுள் ஒன்றையும் இணைத்துக்கொண்டிருக்கும் வஸ்து; இது அம்மூளையின் பிளவையுள்ளும் சென்றிருக்கும். இதின் நீளத்திலும் நார்களமைந்திருக்கும். இந்த நார்கள் முகுளத்தில் சென்றிருக்கும். நீளத்திலும் குறுக்கிலும் நார்கள் போவதினால் நரம்பு உத்தீபனம் சிறுமூளையின் ஒரு பக்கமிருந்து மற்றப் பக்கம் போகிறதென்றும் காணுகிறது. இதன் நரம்பு-மத்திய குணங்களைப்பற்றி யாகொன்றும் நன்றாய் தெரியவில்லை.

மூளைக்கால்கள் (Crura Cerebri), இவைகள் முக்கிய மாய் நரம்பு நார்களாலானவைகள். முகுளத்தினின்றும் சின்ன மூளையினின்றும் பல நார்கள் வந்து சேருவதினாலாகும். இவைகளினின்றும் நார்கள் மூளைக்குட் செல்லுகின்றன. இவைகளிலும் சாம்பல் நிற வஸ்துக்கள் இருக்கின்றன.

கின்றன. இவைகள் நரம்பு உத்தீபனத்தைச் செலுத்தும் தொழிலுடைத்தானவைகள்.

33-ம் படம்.



33-ம் படம். தலையோடு பாதியாகப் பிளந்த பரவணை. 1. கபால எலும்பின் விளிம்பு. 2. மூளை. 3. கணை மூளை. 4. முகுளம்.—கிரீன்.

மூளைக்கால்களின் மேற்பக்கத்தில் மூன்று ஜதை சிறிய நரம்பு வேர் முடிச்சுகள் இருக்கின்றன. அவைகளில் வெண்மையும் சாம்பல் நிறமுமுள்ள வஸ்துக்கள் இரண்டும் கலந்திருக்கின்றன. இவைகளுக்கு, நிண முடிச்சேனயம் (Copora Jene culata) வெளிப்புறத்ததும், உட்புறத்ததும்; மற்றொன்றுக்கு நிணசுர்த்த துவய முடிச்சேனயம் (Corpora Quadrigemina) சொல்லுவார்கள். ஒவ்வொரு மூளைக்கால் நார்கள் இவைகளினின்றும் வெளிப்பட்டு மூளைக்குச் செல்லும்பொழுது பக்கத்துக்கொன்றையிருக்கும் இரண்டு பெரிய வேர் முடிச்சுகளின் ஊடே செல்லும். இவைகளில் ஒன்றின் பெயர் சக்ஷர்தல்பம் (Optic Thalamus) என்றும், மற்றொன்றின் பெயர் நிணசுர்தி (Corpus striatum) யென்றும் சொல்லுவார்கள். இவ்விரண்டு பெரிய வேர் முடிச்சுகளிலும் சாம்பல்

வாண வஸ்து நிறைந்திருக்கின்றது. மூளைக்கால் நரர்களிலும் சாம்பல் வாண வஸ்து இருக்கின்றது.

தொழிலில் மூளைக்கால்கள் உத்தீபனத்தைச் செலுத்தும் செயலை யுடைத்தாயிருக்கின்றனவென்று தோன்றுகிறது. ஒருவேளை நரம்பு-மத்தியமாகத் தொழில் புரிவதில், இதில் உற்பத்தியாகும் மூன்றாவது மூளை நரம்புகள் மூலமாய் விழியின் சலனங்களை நிர்த்தாரம் செய்யக்கூடுமென்றும் எண்ணுகிறார்கள்.


நிணசதுர்த்த துவய முடிச்சுகள். நிண முடிச்சுகளுக்கும், நிணசதுர்த்த துவய முடிச்சுகளுக்கும் தொழில்களின் வித்தியாசமிருக்கமாட்டாதென்று தோன்றுகிறது. ஆகாசச் சஞ்சார பட்சிகளிலும், நிலம் நீர் இவைவிரண்டினுள்ளும் வசிக்குந்தன்மையுள்ள பிராணிகளிலும், தண்ணீரில் மாதிரம் வசிக்குந்தன்மையுள்ள மீன்களிலும், இருக்கும் கண் விழிக்குரிய கட்டடம்போன்ற கட்டடத்தை மனிதனில் இம்முடிச்சுகளடைந்திருக்கின்றன. இவைகளை சக்கூடரிந்திரியத்திற்கு நரம்பு-மத்தியங்களை என்று எண்ணலாம்.

நிண சதுர்த்த துவயமுடிச்சுகளை யெடுத்துவிட்டால் பட்சிகளுக்கு கண்டெரியாமல் போகின்றது. வியாதிபால் இவைகள் சீர்துலைந்தாலும் குருட்டுத்தனம் வந்து விடுகிறது. இவைகளுக்கு கயரோகம் வந்தால் கண்களுக்கும் கயரோகம் வந்துவிடுகிறது.

நிண சதுர்த்த துவயமுடிச்சுகளில் ஒன்றை நாசம் செய்துவிட்டால் அதற்கு விரோதத்திலிருக்கும் கண்குருடாகிப்போகின்றது.

இந்திரியாக்ஷிகளால் உணரும் அறிவுகளைக் கொடுக்கும் வஸ்து; இந்த வேர் முடிச்சுகளிலிருக்கும் சாம்பல் வாண வஸ்துவென்று எண்ணுகிறார்கள். அதாவது இவைகள் மூலமாகவே, இந்திரியக் கருவிகளமேல் படும் அழற்சிகள் அவைகளிலிருக்கும் நரம்பு நரர்கள் மூலமாய் இம்முடிச்சுகளுக்குக் கொண்டுபோகப்படுவதால் மனதுக்கு பொதமுண்டாகின்றது என்பதேயாகும்.

34-ம் படம்.



34-ம் படம். மூளை முள்ளந்தண்டுக்கொடி. நரம்பு மண்டலங்காட்டும் படம்.—நரீகீ.

மனதுக்கும் வெளிவஸ்துக்கும் சம்பந்தப்படுத்துவதுமல்லாமல் இவ்விந்திரிய முடிச்சுகளுக்கு பிரதிகாணக்கிரியை புரியும் தொழில் உண்டென்றும் எண்ணுகிறார்கள். முள்ளந்தண்டுக்கொடி முகுளம் இவைகளுக்கு இத்தொழில் புரிவதில் ஒத்தாசையாயிருக்கின்றன.

இதுவுமல்லாமல் புத்தியாலுற்பத்தியாகும் உத்திபனத்தையும் இச்சாமாத்திரத்திலசைக்கப்படும் சதைகளுக்குக் கொண்டுபோகத்தகுந்த நரம்பு-மத்தியங்களென்றும் தோன்றுகிறது. ஆகையால் அழற்சிகளை அங்கங்கிலிருந்து மேல்நோக்கி மூளையும் மூளையிலின்று கீழ்நோக்கி அங்கங்களுக்கும் செலுத்தும் இருவிதத்தன்மை பொருந்திய நரம்பு-மத்தியமாகும்.

சின்ன மூளை.

சின்ன மூளையென்பது இரண்டு அர்த்த கோளங்களாக பிளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கோளார்த்தங்கள் ஒன்றோடொன்று பிளவிலுள்ள புழுப்போன்ற மூளைவஸ்துக்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவுமல்லாமல் சில நரம்புக்கடிகளாலாகிய கால்களும் இவை கோளார்த்தங்களை இணைத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இக்கால்களில் ஒன்றுக்கு மத்திய பாதுமன்றம் (Middle Crus or Peduncle), மற்றொன்றுக்கு அதோபாதம் என்றும் (Inferior Crus) பெயர். இதில் மத்தியபாதம், சிரோமத்திய பாலத்தின் பாகமாகியிருக்கின்றது. அதோபாதம் பெரிய மூளையை முகுளத்துடன் இணைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

இத்துணை மூளையிலும் வெண்மைநிறவஸ்துவும் சாம்பல்நிறவஸ்துவும் இருக்கின்றன. பெரிய மூளையிலிருப்பது போலவே சாம்பல்வண்ணவஸ்து மேல்பாகத்தில் மடிந்திருக்கிறது. அதுவுமல்லாமல் பெரியமூளையிலிருப்பது போலவே இதிலும் சாம்பல்நிறவஸ்து மடிந்து மடிந்திருக்கும். இப்படி நெருக்கமாய் மடிந்திருப்பதால் கொடித்த அளவு இடத்தில் அதிக பரப்பளவையுடையதாயிரு

அத்தி.]

சின்ன மூளையின் தொழில்கள்.

க்கிறது. சாம்பல்நிறவஸ்து மேற்புறமிருப்பதுமல்லாமல் வெண்மைநிறவஸ்துக்குட்புறத்திலும் மத்தியில் அங்கங்கே கொஞ்சம் இருக்கின்றது.

(1) நெடுக அதுத்துப் பார்வையிட்டால், மூளையின் உட்புறத்தாய்ச் சவ்வுக்கடுத்தாப்போல (Pia Mater) நுண்ணிய சம்பந்தத் தன்சுகளுமிருக்கின்றன.

(2) நரம்புப்பைகளு மிருக்கிறதைப் பார்க்கலாம். இவைகளிலும் மூளைவஸ்துக்கள் வெளியே பல கிளைகளாகப்போயின்றன.

(3) இதுவுமல்லாமல் தானியம்போன்ற பைகளும் ஒருபடையாய் நெகமிருக்கின்றன.

(4) சின்னமூளையின் வெண்மைவஸ்துவாசிய நரம்புநார்க்கடிகள் இருக்கின்றன. இவைகள் கிளைகளையுடைய செடியைப்போலக் காணப்படுகிறபடியால் இவைகளுக்கு பிராணவிருக்ஷமென்று (Arbor Vital Cerebelli) பெயர் சொல்லுவார்கள்.

சின்னமூளையின் தொழில்கள்.

உணர்தல், இச்சாபூர்வசலனம், பருத்தியும் சக்தி அல்லது மனதின் உயர்ந்த தர்மகுணங்கள் என மூன்று வகையாக சின்னமூளையின் தொழில்களைப் பிரிக்கலாம். தேகதர்ம பரீகைகளாலும் வியாதிக்கூறு அவதானங்களாலும், சகல ஜீவன்களின் உடற்கூறிலக்கணத்தாலுமே தான் மற்ற நரம்புமண்டலத் தொழிலறிவதுபோல இதன் தொழில்களையும் அறியவேண்டியிருக்கிறது. அழற்சிக்கு அதற்கு சுயமாய் உணர்வுகிடையாது. இது முழுவதையும் வேதனைக்குறிகள் தோற்றமால் அறுத்து எறியலாம். ஆயினும் அதன் கால்களைத்தொட்டால் வேதனைக்குறிகள் காணும். முகுளத்தின் பின்பக்கத்திய ஸ்தம்பங்களை அழற்சியடையச்செய்தால் மிக்கிலும் அதிக நோவுண்டாகிறதுபோலக் காணுகிறது. இதை யெடுத்துவிடுகிறதினால் பிராணிகளில் உணரும் சக்தி குறைவாகக் காணப்

படுகிறதில்லை. அப்படி யெடுத்தபிறகு பிராணிகள் பார் கவும், முகரவும், கேட்கவும், நோவறியவும் சக்தியுள்ளவைகள் போலக் காணுகின்றன. ஆகையால் முகுளத்தின் பின்பக்கத்திய ஸ்தம்பங்களுக்கு உணர்ச்சி சக்தியிருக்கிறதாகக் கண்டபோதிலும் அவைகள் சின்னமூளையில் வந்த போதிலும் சின்னமூளையை முக்கியமாகிய உணர்ச்சிக்கருவியென்று கருதக்கூடாது.

சின்னமூளையில் அழற்சியுண்டாக்கினால் எந்தவித அசைவும் தேகத்தில் காணுகிறதில்லை. ஆனால் சதைகளின் அசைவுகளை ஒன்றாகச் சேர்த்து வேண்டியபடி சமரசப்படுத்தும் தன்மையுண்டென்று தோன்றுகிறது.

கபாலலக்ஷண சாஸ்திரிகளில் சிலர் சிற்றின்பம் என்னும் காமமானது சின்னமூளையிலிருக்கிறதென்று நம்புகிறார்கள். ஆயினும் இது சரியான உத்தேசமல்லவென்று தெளியப்பட்டிருக்கின்றது. * கர்க் பிஸியாலஜி பக்கம்-536 பார்க்க.

சின்னமூளையின் கோளார்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் அதற்கு விரோததிக்கிலுள்ள சதைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. சலனங்கள் சரியாய் நிறைவேறவேணுமானால் இவை இரண்டும் தொழில்புரிந்து சதைச் சலனங்களை ஒழுங்குபடுத்தி சமரசமாக்கவேண்டும்.

பெரிய மூளை.

பெரிய மூளையென்பது இரண்டு கோளார்த்தங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முகுளத்துடனும், சிரோமத்திய பாலத்துடனும் அவைகளின் பாதங்களால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. சின்ன மூளையுடன் அதின் கால்

* இதன் கால்களையக, பாலத்தின் கால்களையக வெட்டி ஒரு கோளார்த்தத்தை முகுளத்திலிக்கும். முன்னந்தண்டினிக்கும் பிரித்தால் பிராணிகள் அந்த கோளார்த்தத்தின் யெகிப்புறத்தில் விழந்துவிடுகின்றன. பலமான நேரற்ற அசைவுகள் உண்டாகின்றன. பலதடவை இடைவிடாமல் புரளுகின்றன. கீத்பிசுமாயிருக்க பிரபத்தனம்செய்வதுபோலக் கண்டாலும் எண்ணம் நிறைவேறுகிறதில்லை.

களால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கால்களின் மத்தியில் சாம்பல்நிறவஸ்து யிருக்கின்றது. இந்த வஸ்து சின்னமூளையின் உள்ளிருக்கும் புழுத்தன்மையான நார்கள் முதல் நிண சதுரத்ததுவவஸ்துவரைபிலும் படிந்திருக்கின்றது. மூளை-கண்டக மண்டலத்தில் அதின் நீளமையத்தின் ஓட்டாகி இருக்கிறதென்று சொல்லலாம். இப்படியிருக்கும் நரம்பு பாலதக்குமேல் இருபுறத்திலும் சிகரமாக பெரியமூளை யிருக்கின்றது.

பெரியமூளையிலும் மற்ற மூளை-கண்டக நரம்புமண்டலத்தின் முக்கிய அலயவங்களைபோலவே, சாம்பல்வண்ணவஸ்துவும் வெண்மைநிற நார்வஸ்துவும் உடைத்தாயிருக்கிறது. ஆனால் இதில் மற்ற பாகங்களினின்றும் வேறுபாடாகி சாம்பல்வண்ணவஸ்து வெண்மைவஸ்துக்குமேல் பட்டைப்போலப் படிந்திருக்கிறது. வெண்மைநிறவஸ்துவுக்கு குல்லாயென்றும் சொல்லலாம். சாம்பல்நிறவஸ்து உட்பக்கமாக அனேக மடிப்புக்களையுடையதாயிருக்கின்றது. இம்மடிப்புக்களால் அதற்குள்ள இடத்தில் வேண்டியமட்டும் பாப்பளவை அடைந்துயிருக்கிறது. இந்த மடிப்புக்களுக்குச் சுருள்கள் (Convolutions) என்று சொல்லலாம்.

பெரியமூளையின் தொழில்கள்.

1. பெரியமூளை கோளார்த்தங்களால் நாம் பெரும் உணர்வுகளை வகித்துக்கொள்ளவும் அவைகளைப்பற்றி சிந்திக்கவும் நமக்கு சக்தியுண்டாகின்றது. 2. பெரிய மூளைதான் நமக்கு இச்சையின் கருவியாயிருக்கின்றது. என்னுளில் எவ்வளவு சிக்கிரத்தில் நாம் தீர்மானம்செய்துகொண்டாலும், இச்சை ஒவ்வொன்றையும்பற்றி யோசித்துத்தான் தீர்மானம் செய்துகொள்ளுகிறோம். 3. உணர்ந்தயியக்கூடிய வஸ்துக்களினாலுண்டாகும் பதிவுகளை (சிந்தனைகளை) வகித்துக்கொண்டு மர்னசிகமாக நமது தோற்றங்களுக்கு மறுபடியும் உணர்வு தோற்றமாகவும் அதைப்பற்றிய ஞானரூபமாகவும் கொண்டுவிந்து

விடுகிறது. 4. இதன்மூலமாகவேதான் நாம் காமகோப மதமாச்சரிபம் (Feelings and Emotions) முதலான மனோவிகாரங்களையும் அனுநாப முதலான உணர்வுகளையும் அடைகிறோம்.

பெருமூலையின் கோளார்த்தங்களின் தொழில்களைப் பற்றி அறிந்தவரையில் பின்வருமாறு சொல்லலாம் :— (1) தாக்குதலினாலாவது அல்லது அசதிசன்னி ரோகத்தாலாவது மூளை அழுந்தலுற்றால் இவைகளுக்கு பலமான ஹாணியுண்டாகி உணர்ச்சிகளெல்லாம் அற்றுப்போகக் கூடியம் காணும். (2) மனிதனிலும் மற்றுமுள்ள எலும்புள்ள பிராணிகளிலும் மனோசக்தியின் சிரேஷ்டபாகங்கள் விருத்தியடையும். நீதிக்குத் தக்கபடி, ஒருவனில் பலவயதுகளிலும், பலமனிதர்களிலும் மூளை-கண்டக நரம்புமண்டலத்தின் மற்ற அவயவங்களைவிட இக்கோளார்த்தங்கள் அதிகமாய் பெருத்துவரும். (3) நரம்புமண்டலத்தின் மற்றெந்தபாகங்களும் மனோசக்தி விருத்திக்குத் தக்கபடி இப்படி பெருத்துக் காணுகிறதில்லை. (4) மூளை கோளார்த்தங்கள் பிறப்பிலேயேயாவது ரோகத்தாலாவது ஊனமடைந்தால், புத்தி சம்பந்தமான மனோசக்திகளிலும், இயற்கையறிவிலும் தக்கபடி ஊனமடைந்து காணப்படுகிறது. (5) கீழ்ஜாதி பிராணிகளில் மூளை-கோளார்த்தங்களை நீக்கிவிட்டால் இப்பொழுது சொல்லிய விஷயங்களால் ஏற்படக்கூடிய குணங்களே சித்திப்படுகின்றன. பிராணிக்கு உணர்ச்சியிருந்தபோதிலும், மிக்க சிக்கான பிரதிகரணக் கிரியைகளைப்பிரியும் சக்தி யிருந்தபோதிலும் இச்சாபூர்வமாய் எவ்வித சலனத்தையும் உண்டாக்க சக்தியற்றுப்போகின்றது.

பெரியமூலையை யெடுத்துவிடுவதாலுண்டாம் குணங்கள்.

பெரியமூலையை கனிஷ்டஜாதி பிராணிகளினின்றும் நீக்கிவிடுவதால் அப்பிராணிகள் தனக்குத்தானே புத்தியினால் செய்யக்கூடிய அசைவுகள் நின்றுபோய், யந்திரம்போலாய்விடுகின்றன. ஒரு புருஷின் பெருமூலையை

அத்தி.]

பெருமூலையை எடுத்தாலுண்டாம் குணம்.

யெடுத்துவிட்டால் சலனமற்று இருக்கும், வெளிப்படையாக ஞானமற்றுமிருக்கும். அதை அலட்டினால் அதன் சுபாவநிலையை யடையும். ஆகாயத்திலெறிந்தால் அது பறக்கும்.

ஒரு தவனையின் பெருமூளைக் கோளங்களை யெடுத்து விட்டால் புருபோலவே தனது சுய இச்சாபூர்வ கிரியைகளை இழந்ததுபோலக் காணுகிறது. இயற்கையான அங்கஸ்திதியில் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கும். சாவதானமாய் சுவாசம்விடும். அதை கின்னினால் தூரத்தில்தாண்டிக்குதிக்கும். தண்ணீரில்போட்டால் அது நீந்துகின்றது. உள்ளங்கையில் வைத்துக்கொண்டால் அசைவற்று இருக்கின்றது. நிகாணமாந் கிரமேண கையைச் சாய்த்து கவுழ்த்திக்கொள்ள எத்தனப்பட்டால் அது தனது நடுநிலை தப்பி விழும்போலாகும்பொழுது மேலுக்கு நகர்ந்து கொண்டு அதன் நடுநிலைமையை பாதுகாத்துக்கொள்ளுகிறது. அப்பொழுது நைதுனியிலும்கூட தொத்திக்கொள்ளுகின்றது. இப்படி யெல்லாம்காணும் குணங்கள், தவனையின் மூளை முழுகையும் எடுத்து முள்ளந்தண்டுக்கொடியை மாத்திரம் நிறுத்தினால் தூணுகிறதில்லை. அப்பொழுது சாதாரண பிரதிகரணத்தொழில்கள் மாத்திரம் உண்டாகின்றன. தவளை சுவாசம்விடுகிறதில்லை. உட்காராமல் படுத்துக்கொண்டு விடுகிறது. தண்ணீரில்போட்டால் அடி தேகபளுவால் முழுகிப்போகின்றது. கால்களை நுள்ளினால் அவைகளை உதறிக்கொள்ளுகிறது. ஆனால் குதித்துப் பாய்கிறதில்லை.

மூளை எவ்விதமாக தனது தொழிலைப் புரிகிறதென்பதற்கு சாட்சியமில்லை. மிக்க சிரேஷ்டமான மனோசக்திகளல்லாமல் மற்ற விஷயங்களுக்கு பெருமூலையின் கோளார்த்தங்களிலேதாவது இருந்தால் போதுமென்று காணுகிறது. ஏன் எனில், அனைக்களில் பெருமூளைக் கோளார்த்தமேதாவது ஒன்று சிர்குலைவதினாலாவது சயத்தாலாவது தொழில்புரியும் தன்மையற்று இருக்கவேண்டுமெ

ன்று நாம் பாவிக்கக்கூடிய சமயங்களில், மனிதனுடைய ஊனம் யாதொன்றும் காணப்படவில்லை. இரண்டு கோளார்த்தங்களும் சேர்ந்து புரியும் தொழில்களேற்றையும் சவுக்கியஸ்திதியிலிருக்கும் கோளார்த்தமொன்றே புரிந்துகொண்டுவந்ததாகக் காணுகிறது. ஆனால் இந்த சமயங்களில், புத்தியின் மிக்க சிரோஷ்டமான தொழில் களைப்பற்றி பரிசோதனைசெய்ததாகக் காணவில்லை. சாதாரணமாக இரண்டு கோளார்த்தங்களிலும் ஒரு வஸ்துவா லுண்டாகும் பதிவை மனது ஒன்பது வகித்துக்கொள்ளுகின்றது, ஆகையால் உணர்வும் ஒன்றாகக் காணுகிறது.

மூளையின் மற்ற பாகங்களைப்பற்றி யாதொன்றும் சரியாய்த் தெரியவில்லை.

சித்திரை

தேசத்தில் தொழில்புரியும் கால பாகங்களும் தொழிலினின்றும் ஒழிவுபெற்றிருக்கும் சமயங்கோடியுடையதாயிருக்கவேண்டியிருக்கிறது. தொழிலும் ஒழிவும் மாறி மாறி வருவதால்தான் தேசத்தின் சவுக்கியம் நிலைபடும். புரியும் தொழிலும் சீராயிருக்கும். இது சாதாரண விதி. இரத்தாசயம் தொழில்புரிவதும் ஒழிவுடன் இருப்பதும் ஒவ்வொன்றும் ஆரையிஷ்டேசத்திலாய்விடுகிறது. சாதாரண சுவாஸச் சதைகளில் இதைவிட நான்கு ஐந்து மடக்கதிககாலம் பிடிக்கின்றது. மிக்க தேசமுபற்சி செய்யுங்காலத்தில் இச்சாபூர்வமான சதைகள் தொழில்புரியும்பொழுது செயலற்ற காலங்கள் அடிக்கடி தொழில்புரியும் இடைகளில் வந்தபோதிலும், தேசத்தின் செலவு வரவினுண்டாகும் சீர்பட்டடைவிட அதிக அளவு ஆய்விடுகிறபடியால் அதைச் சரிப்படுத்திக்கொள்ள சிலகாலம் ஓய்வடைந்திருப்பது அவசியமாய்விடுகின்றது. இரத்தச் சமூக சுவாசம் இவற்றின் இருக்கும் லயம்மாதிரி இவைகளில் தால அளவு சரியாக யேற்பட்டிருக்கமாட்டாது.

மூளைபோன்ற கருவியில் தொழில்புரியும் கால அளவும் ஓய்ந்திருக்கும் கால அளவும் சொல்பமாயிருப்பது

அசாத்தியமென்று காணலாம். அதாவது ஞானத்துடன் சிலகாலமும் ஞானரகிதமாய் சிலகாலமும் இருப்பதென்றால் அடிக்கடி யப்படியிருத்தல் வெளிப்படையாகவே திருப்தியற்றதாயுமிருக்கும். உயர்வாழ்வுக்கும் உபயோகமற்றுப்போய்விடும். ஆகையால் ஓய்வு நீண்டகால அளவுக்கப்பறம் வரவேண்டியிருக்கிறது. எப்பொழுது நீண்டகால அளவுக்குப்பிறகு வருகிறதோ அதற்குக்க்கப்படி ஓய்வின்கால அளவும் நீண்டிருக்கவேண்டிவதும் சகஜமாயிருக்கும். இந்தக் காரணத்தால்தான் சித்திரைபென்னும் குணம் தேசத்தில் உண்டாயிருக்கிறது.

காயங்களாலாவது வியாதியிலாவது பெருமூளையின் தொழில் விலகுவதினால் சித்திரைபோன்ற ஸ்திதி காணலாம். இது மண்டைக்குள் இரத்தம் குறைவகிலும் உண்டாகும். அதிகமாகவதாலும் உண்டாகும். தூங்கும்காலத்தில் இருக்கும் மூளையின் ஸ்திதியைப்போலொத்த நிலைமை அதற்கு இரத்தப்பெருக்கத்தாலுமுண்டாகுமென்று எண்ணியிருந்தார்கள். ஆனால் சில பரிசோதனாள் அது சரியான ஊகமல்லவென்று தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது.

மூளைக்கு இரத்தம் இரண்டு விஷயமாகப் போய்ச் சேருகிறது. (1) போஷிப்பு நிமித்தமாகப்போகின்றது. (2) இரத்தம் மூளையிலோவெதால் அதினின்றும் உள்ளிருக்கும் சக்தியை மூளைச்சாலங்கள் பெற்றுக்கொண்டு மூளையில் ஜனிக்கும் நரம்பு-சக்திகளையுண்டாக்கவும் அவ்விடத்திற்கு இரத்தம்போகின்றது. தூங்கும்காலத்தில் இப்பொழுது சொன்ன முதல் விஷயத்திற்குமட்டும் இரத்தம் வேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் அதிக இரத்தம் போய்ச் சேர்ந்தால் வேலைசெய்ய உற்சாகமுண்டாகி, வேண்டிய சித்திரை கெட்டுப்போகும். கெட்டுப்போவதுடன் வியாதிக்கும் இடமுண்டாகும். ஆகையால் தூக்க சமயங்களில் அதிக இரத்தம் மண்டையிலோடமாட்டாது. சாதாரணத் தொழில்புரியும் காலங்களின் எண்ணிக்கை

குறைந்தேயிருக்கும். கோளங்கள் சதைகள் இவைபோன்ற இன்னும் பல சக்தி மாறுபாடுண்டாக்கும் கருவிகளிலும் இரத்த ஓட்டம் மூளையிலுள்ளதுபோலவே இருக்கிறதென்பது தெரிந்த விஷயமாயிருக்கிறது.

நாம் சித்திரையென்று சொல்லும் ஸ்திதி நரம்பு மண்டலத்தில் பல பாகங்களில் பலவாறாக வருகின்றது. சில பாகங்களில் இருக்கும் ஓய்வுக்கு சித்திரை என்கிற நாமமே பொருந்தாததாயிருக்கின்றது.

மூளை-கண்டக நரம்பு மண்டலத்தில் சித்திரை பல இடங்களில் பலவாறு பேதித்திருக்குமென்பது, சொப்பனத்தாலும் சித்திரையில் நடப்பதாலும் காணலாம்.

சொப்பனத்தில் பெரு மூளை முற்றிலும் ஓய்ந்திருக்கிறதில்லை. கொஞ்சம் வேலை புரிந்துகொண்டிருக்கின்றது. அதன் செயலால் உண்டாகும் மனோபாவங்கள், வெளியுலகத்து வஸ்துக்களால் உண்டாகும் உணர்வை தாங்கும் மூளை வகிக்கிறதில்லை. ஆகையால் உண்டாகும் ஞானங்கள் சரியற்று இருக்கின்றன. தவிர பெரிய மூளை இப்படிச் சரம் ஜாக்கிரத விதிதியிலிருக்கும்பொழுது இச்சாபூர்வ சலனங்களை உண்டாக்கக்கூடிய சதைகளைச் சேர்ந்த பிரதிகரணக் கிரியை புரியும் நரம்பு-மத்தியங்களின் மேல் அதிகாரமற்றுமிருக்கின்றது. ஆகையால் சதைகளை அசைக்கவேண்டுமென்று சொப்பனத்தில் எண்ணினாலும் அசைக்கக்கூடுகிறதில்லை. இவ்விஷயம், அழுக்கன் அழுத்தும் தொந்திரவுபட்டவர்களுக்கு பிரத்தியட்சமாயிருக்கும்.

சித்திரையில் நடக்கும் விஷயத்திலோ இடம்விட்டு இடம் நடந்து போகவேண்டிய பிரதிகரணக்கிரியை புரியும் நரம்பு-மத்தியங்களை அழற்சியுண்டாக்கச் செய்யும் சக்தி பெருமூளைக்கிருக்கிறதென்றும், ஆனால் உணர்ச்சியடையும் பொருள் சித்திரைபுரிந்து மனோத்பவங்களுக்கும் உணர்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசமறிய சக்திபற்றிருக்கிறதென்றும் விளங்குகிறது.

சிரசு நரம்புகள்.

சிரசு நரம்புகளை சாதாரணமாய் ஒன்பது ஜதைகளாகப் பிரிப்பார்கள். ஆனால் அவைகள் பன்னிரண்டு ஜதைகள் இருக்கின்றன. ஏழாவது நரம்பில் இரண்டும் எட்டாவது நரம்பில் மூன்றுமாக விருக்கின்றது. இவையெல்லாம் வெளிப்படையாக சிரசுக்குள் இருக்கும் வஸ்துக்களினடிப்புறத்தில் உற்பத்தியாகி வருவதைக் காணலாம். இவைகள் இரட்டை இரட்டையாய்ப் போகின்றன. பெரு மூளையின் முன்பக்கத்து மேடுகளினின்று முகுளத்தினடிவரையிலும் அங்கங்கே பரவிவரும் மூளை யுட்பக்கழ் நரம்புகளைப்பற்றி பார்த்தால் அதனுள்ளிருக்கும் சரம்பல் வர்ண வஸ்துக்களுடன் கலக்கப்பட்டு, அவையொவ்வொன்றிற்கும் சம்பந்தம் செய்கிறுப்பதுமல்லாமல் பெரு மூளை கோளார்த்தங்களுடனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன.

1-வது. வாசனை நரம்பு. ஆக்கிருண நரம்புகளின் வேர்கள் பெருமூளை கோளார்த்தத்தின் முன்பக்கத்தில், சரம்பல்நிற பட்டையுட்புறத்தில் ஆழ்க்கிருக்கின்றது.

2-வது. பார்வை நரம்பு. நேத்திர நரம்புகள் சகஷுர்தல்பத்திலும், நிணரச்மியிலும், நிணசுதூர்த்த துவயங்களிலும் ஊடியிருப்பதைக் காணலாம்.

3-வது 4-வது நரம்புகள் நிணசுதூர்த்த துவயங்களுக்குடியில் இருக்கும் சரம்பல்வர்ண வஸ்துக்களில் உற்பத்தியாகின்றன.

மற்ற சிரசுநரம்புகளின் உற்பத்தியை முகுளத்தின் சரம்பல்வர்ண வஸ்துவில் பார்க்கலாம்.

சிரசு நரம்புகளை அவைகளின் தொழில்பிரகாரம் பிரிக்கும் மாதிரி :—

இந்திரிய நரம்புகள் : ஆக்கிருண நரம்பு, நேத்திரநரம்பு, சுரோத்திர நரம்பு, ஜிஹ்வாகண்ட நரம்புகளின் பாகமும், ஐந்தாவது நரம்பின் நாவுக்குரிய கிளையும்.

சாதாரண ஸ்பாச நரம்புகள்—ஐந்தாவது நரம்பின் பெரும்பான்மையும்.

சலன நரம்புகள் : மூன்றாவது, நான்காவது, ஐந்தாவதின் கொஞ்சபாகமும், ஆறாவது முகத்து நரம்பும், நாவடி நரம்பும்.

கலப்பு நரம்புகள் : ஜிஃவேரகண்ட நரம்புகள், ஸ்வாஸோதர நரம்புகள், முள்ளந்தண்டுக்குச் சேரும் நரம்பு.*

3-வது. சர்க்குலர் சலன நரம்புகள். இது மூளையினின்றும் ஜனித்து முன்னுக்குவந்து கண்குழிக்குட் பிரவேசித்து கண் சதைகளில் பரவிவிடும்.

4-வது. நேத்திரக் கீல்முட்டே சதைநரம்பு. (Nerves Trochlearis or Patheticus.) இதுவும் மேற்படி நரம்பு போகிறவழியாகச் சென்று கண் சதைகளில் பரவிவிடும். இது முழுதும் சலன நரம்பாகும். இது கண்ணில் சுழலும் கிசசதைகளில் மாத்திரம் பரவிருக்கும்.

5-வது. நரம்பு அல்லது திரையோதுவய நரம்புகளின் இலக்கணம்.

திரையோதுவய நரம்புகள் : ஐந்தாவது நரம்புக்கு இரண்டு வேர்களிருக்கின்றன. ஒன்று பெரிது, ஒன்று சிறியது. பெரியவேர் உணர்ச்சியுண்டாக்கும் நரம்புகளின் வேராகும். சிறியது சலன நரம்புகளின் வேராகும். இந்த நரம்புகள் மூன்று பிரிவாக இருக்கின்றன. முதல் இரண்டாவது பிரிவுகள் பெரிய வேரினின்றும் வரும். மூன்றாவது சிறிய வேரினிருந்து உற்பத்தியாகின்றது. இது சலன நரம்பானபோதிலும் முன்சொன்ன கிளைகளுடன் கலப்பதால் இருதொழிலும் உடையதாகும். முகத்தின் முன்புறத்திலும் இருபக்கங்களுக்கும் இதன் கிளைகள் பரவும்.

* (Spinal accessori. மேற்படி கவாச நரம்பு—முள்ளந்தண்டுப்புறமாரம்பித்து ஒற்றுணர்வு நரம்புகளுடன் சேர்வதாம்.)

செவிபக்கம் இருக்கும் சர்மத்திற்கு மாத்திரம் இந்த நரம்புகள் போகிறதில்லை. அந்தபாகத்திற்கு கொடியினின்றும் நரம்பு வருகிறது. விசேஷ இந்திரியக் கருவிகளுக்கும் இந்த நரம்புகளே போகின்றன. ஐந்தாவது நரம்புமூலமாக சாதாரண உணர்ச்சிகளுக்கு வேண்டிய நரம்புகளும், விசேஷ இந்திரியஞானம்கொடுக்கும் நரம்புகளும் பரவியிருக்கின்றன.

இந்த நரம்புகளில் மூன்று கிளைகளும் பின்வருமாறு செல்லுகின்றது:—

(1) கண்ணோக்கிப்போவது ; மேற்படி நரம்பின் இருந்து ஜனித்து முன்னுக்குவந்து கண்குழிக்குள் பிரவேசித்து புருவத்தின் உள்புறமார்ச்சுமாக நெற்றிக்கேறி பரவி விடுகின்றது. இதன் கிளைகள் கண், மூக்கு, மூகம், நெற்றி, கண்ணீர்க்கோளமாகிய இவைகளுக்குப் போய்ப் பரவும்.

(2) பெரும் தாடைநார் ; இது மேற்படி நரம்பின் இருந்து ஜனித்து கண்குழிக்கழி இருக்கும் கீண்ட துவாரம் வழியாகப் பிரவேசித்து முகத்துக்கு வந்து, மேல்வாய் பற்கள், அண்ணம், கண், நெற்றிப்பை, கன்னம், மேலுதடி ஆகிய இவைகளுக்குப் போய் பிரிபிக்கும்.

(3) சிறு தாடைநார் ; இதுவும் மேற்படி நரம்பின் ஜனித்து, கீழ்வாய் பற்கள், நாக்கு, காது, மூகம், கீழுதடி, மெல்லுதிற சதைகள் ஆகிய இவைகளில் போய் பரவியிருக்கும். இக்கிளையின் உபகிளைகள் இரண்டுண்டு—சிறிய பல்நார், இது கீழ்த்தாடை எலும்பின் அகத்திலிருக்கிற துவாரத்தில் பிரவேசித்து, உள்ளவேவந்து மூகரை சமீபத்திலிருக்கிற துவாரம்வழியாக வெளிப்பட்டிவிடும். அதன் கிளைகள் பற்களுக்கும, சதுக்குக்கும் போகின்றன. மற்றொன்று நாக்ளைச் சேர்ந்த நார் ; அது நாக்கில் பரவிவிடும்.

இந்த நரம்பின் எந்தப்பாகமாவது கெடுதியடைந்தால் அந்தப்பாகம் பாவுயிடங்களில் உணர்வற்றுப்போகின்றது.

6-வது. நரம்பு. இந்த நரம்பு கண்வெளிக்கு இழுத்துப்பிடித்திருக்கும் சதைகளுக்குப்போய் பாவும் (வெளிக்கு என்றால் மூக்கின் விரோததிக்கில்).

7-வது. முகநரம்பு. இதின் கிளைகளிலொன்றாகிய முகநரம்பு முகத்திலிருக்கும் சதைகள் யாவற்றிற்கும் போகும் சலன நரம்புகள். ஆனால் இந்த நரம்புகள் வாயைமெல்லுவதில் உபயோகப்படும் சதைகளுக்குமரத்திரம் போகிறதில்லை. இது கரதின் உட்புறத் துவாரத்திற்குச் சென்று அதிலிருக்கும் இரசகிசுபாக்கமாய் வெளிக் குவந்து முகத்திற்குப்போகும். மற்றொன்று கரோத்திர நரம்பு; இது காதுக்குச் சென்று அநேக இழைகளையுடையது. அவ்விடத்தில் அறைக்குள் விருத்தி. திரின்மேல் பிசுந்து கொண்டிருக்கும்.

முகநரம்பு கெடுதியடைந்தால் அது சேரும் சதைகளில் பார்சுவாதம் பந்துவிடும். காணும் கேட்காது, ருசியும் தெரியாது. முகம் பார்சவாயுவிருக்கும் பக்கத்தில் அதற்கு விசேஷமாயுள்ள உத்தேசம்ற்ற பார்வையுடனிருக்கும் பார்சவாயுபட்ட வாயின் பாகம் நீண்டுபோகும். கண்பார்வையிலும் உத்தேசம்ற்று முழிப்புக்கானும். ஊத எத்தனித்தரலாவது, சன்னத் தொலிமை காற்றுடன் போக்க யெத்தனித்தாலும் (சசல் whistle அடித்தாலும்) ஒருபக்கம் நன்றாய் தொழில்புரியும். ஆனால் மற்றப்பக்கம் அசைவற்றிருக்கும். சப்புவதில் வாயின் ஒருபக்கமாகத் திரம் வேலைசெய்யும். உதடுகளும் கன்னமும் சக்தியற்று இருக்குமர்கையால் வாயில் உணவை போட்டுக்கொண்டால் கன்னத்துக்கும் பற்களுக்கும் மத்தியில் நின்றுபேசுகின்றது.

8-வது. இதில் மூன்று நரம்புகள் உண்டி:—

ஜிவ்வாண்ட நரம்பு. இது அந்தரத்தகண்ட நாளாய் வருகிற துவாரம்வழியாய் வெளிக் குவந்து, நாக்கு தெண்டை இவைகளில் வியாபிக்கும். ஸ்வாஸோதர நரம்பு இது மேற்படி துவாரம்வழியாகவே வெளிக் குவந்து

அத்தி.] ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் இலக்கண தர்மம்.

321

கண்டநாடி, கண்டநாளும் இவைகளேரடிணந்து, நெஞ்சறைக்கு இறங்கி, குரல்வளை சுவாசக்குழல், புப்புசம் தொண்டை, தீனிப்பை, இருதயம் ஆகிய இவைகளுக்குப் போய் வியாபிக்கும். முள்ளந்தண்டோத்தாசை நரம்பு இது பிடரிச்சதைகளில்போய் வியாபிக்கும்.

இந்த நரம்புகள் சலன சக்தியும் ஸ்பர்ச சக்தியும் விசேஷ இந்திரியஞான சக்தியும் உடைத்தானவைகள். இரசஞானத்தை உணர்வது இந்த நரம்புகள் தான, அல்லது ஐந்தாவது நரம்பின் பாகமாகிய கீழ்த்தாடை நார்களின் நாக்குக்குப்போகும் கிளைகளால்தான உணர்ச்சியுண்டாகிறதென்று பல தந்தைக்கள் நடந்துகொண்டிருந்தன. ஆனால் பரிசைக்களால் இவ்விரண்டு நரம்புகளுக்கும் ருசியறியும் சக்தியுண்டென்று வெளியாகிறது.

9-வது. ஜிவ்வாந்தர நரம்பு. இது நாவின் சலன நரம்பாகும். நாக்குக்கடிப்புறச்சதைகள் யாவற்றிலும் போய் வியாபித்திருக்கின்றது.

முள்ளந்தண்டு நரம்புகள்.

இவைகளைப்பற்றி விசேஷமாக யிப்பொழுது சொல்லவேண்டியதில்லை. இவைகளின் முன்பக்கத்து வேர்கள் சலன சக்தியுடையதாயும் பின்பக்கத்து வேர்கள் ஸ்பர்ச சக்தியுடையதாயுமிருக்கின்றன.

ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் இலக்கண தர்மம்.

தேக அசௌக்கிய காலங்களில் கைகால்கள் விரைத்து குருக்குலைகள் உண்டாவதால், இந்த நரம்புகளின் செயலெனும் ஊதத்தின்மேல் இவைகளுக்கு ஒன்றுணர்வு நரம்புகளென்று பெயர்தரப்பெற்றன. இவைகளுக்கு இந்திரிய ஜீவனுக்குரிய நரம்புமண்டலமென்று பெயர் வழங்கும். ஏன் எனில், இந்திரிய முதலிய கருவிகள் தொழில்புரிய இந்த நரம்புகளின் உதவியடைந்து வந்ததென்கிற ஊதத்தின்மேல் இப்பெயர் தரப்பெற்றன. இந்த இரண்டுபெயர்களும் சரியானதல்ல. ஆனால் நாம் முதல்கொண்ட பெயரை இப்பொழுது சொல்லும் நரம்

புமண்டலத்துக்கு உபயோகப்படுத்தலாம். ஏன் எனில், அநேகமாய் இந்தப் பெயர் பலநாள்களாக வழங்குகிறபடியாலும், மற்றப் பெயரைவிட இது அதிக வழுவுடைய தல்ல வாகையாலுமேதான்.

இந்த நரம்புகள் மற்ற நரம்புகளினின்றும் அவற்றின் கட்டடங்களினின்றும் பேதமுள்ளவைகள் என்று சொல்லக்கூடாது. இவைகளுக்கும் மற்றவைகை நரம்புகளுக்கு முள்ள வித்தியாசங்கள் செலுத்தும் தொழிலிலும் விதியிலும் விடையாது. அவைகளின் செயல்பேதங்கள் இந்த வகை நரம்புகளுக்கு இடை இடையேயுள்ள நரம்பு-மத்தியங்களாலும் மூலவேர் முடிச்சுகளாலும் உண்டாகின்றன. ஒற்றுணர்வு மண்டலத்தில் பரவியிருக்கும் நரங்கள் பின்வருமாறு காண்க.

(1) சாதாரண சிறைநரங்களுக்கும், அதாவது பட்டையற்ற சதைநரங்களுக்கும் பரவியிருக்கின்றன. உதாரணம் இரத்தக்குழாய் சதைநரங்களுடன் ஒடுகின்றன. இப்படியோடும் நரம்புகளுக்கு வாசோமோடார் நரம்புகள் என்று பெயர். இரத்தக்குழாய் நரம்புகள் என்றும் பெயர் சொல்லலாம். குடலின் சதைசொக்காய்களிலும் பரவியிருக்கின்றன. கோளக்குழல்களிலும் பரவியிருக்கின்றன. கண்விழியினுள்ளிருக்கின்றன. இன்னும் மற்ற இடங்களிலும் காணலாம்.

(2) இரத்தாசயத்துக்கு பரவியிருக்கும் நரங்கள்.

(3) உமிழ்நீர்க் கோளங்களுக்கும் இன்னும் மற்ற பொசிக்கும் கோளங்களுக்கும் இரத்தக்குழாய் நரம்புகளுடன் பொசிப்பிக்கச்செய்யும் நரம்புநரங்கள் பரவியிருக்கின்றன.

(4) நரம்பு-மத்தியத்திடையிலும் நரம்புவேர் முடிச்சிடையிலும் பரவியிருக்கும் நரங்கள்.

(5) முகுளத்தை நாடிச்செல்லும் மத்தியாபிகரநரங்கள். இவைகள் முகுளத்திலிருக்கும் இரத்தக்குழல் நர

ம்பு-மத்தியங்களுக்குப் போகின்றன. ஒற்றுணர்வு நரம்புவேர்முடிச்சுகளுக்கும் மூளை-கண்டக நரம்பு மத்தியங்களுக்கும் செல்லுகின்றன.

மத்தியாபிகரநரங்கள் தேக துளிகளுக்கு பரவும்விஷயத்திலே அந்த இடங்களுக்கு மத்தியாபிகரநரங்கள் செல்லும் இடங்களுக்கே இவைகளும் போயிருக்கின்றன.

ஒற்றுணர்வு நரம்புவேர் முடிச்சுகளின் கட்டடம். இவைகளில் (1) நரம்புநரங்கள் உள்ளே போக்குவரத்தாயிருக்கின்றன. (2) நரம்புநரங்கள் அவைகளில் உற்பத்தியாகின்றன. இவைகளில் இந்த நரங்கள் உற்பத்திசெய்யும்பொருட்டு நரம்புச்சாறுகளும் இவைகளிலிருக்கின்றன.

ஒற்றுணர்வு நரம்புகளின் தொழில்கள்.

மூளை-கண்டக நரம்புகள் போலவே இவ்வொற்றுணர்வு நரம்புமண்டல நரம்புகள் அழற்சிகளைச்செலுத்தும் தொழிலையுடையதாயிருக்கின்றன. இவைகளைச் சேர்ந்த வேர்முடிச்சு மத்தியங்களும் அவையவைகளுக்குத் தக்கபடி அழற்சிகளை செலுத்துதல், மாற்றுதல், பிரதிகரணக்கிரியைபுரிதல் முதலிய தொழில்களையுடையதாயிருக்கின்றன.

19-ம் அத்தியாயம்.

சலனமும் அதன் காரணங்களும்.

பிராணிகளின் தேகத்தில் மூன்றுவித சலனங்களைப் பார்க்கலாம். அவையாவன (1) முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் இருந்த இடத்திலிருந்தே அசைதல், (2) அணுக்களின் சுருக்கத்தால் முண்டாகும் பலவித சலனங்கள். (3) சதை நரங்களின் சுருக்கத்தாலுண்டாகும் பலவித அசைவுகள்.

தேகத்தின் பரப்பில் பரிஸ்தாபிதத்தோல் மேலமைந்திருக்கும் ஸிலிய (Cilia) என்று சொல்லும் அணுமாத்திர இரம்பப்பற்கள் போன்று அடுக்கப்பட்டிருக்கும் நுண்ணிய வஸ்துக்கள். இவைகள் 5,000 த்தில் 1 பங்கு அங்குல நீளமுள்ளவைகள். பரிஸ்தாபிதச்சாலங்களின் கட்டுப்படாத அதாவது மேலோரங்கிலிருக்கின்றன. இவைகள் அரிச்சாபூர்வமாய்சையும்; நரம்புமண்டல அதிகாசத்துக்கும் உட்பட்டவைகளல்ல. சதைச்சுருக்கங்களும் அவைகளின்சைவுக்கு எதிர்பார்க்கமாட்டாதவைகளாயிருக்கின்றன. இறந்துபோனபிறகும் பிணத்தில் பலமணி காலம் வரைக்கும் அசைவுடனேயிருக்கின்றன. இதைப் பார்ப்பதற்கு எந்ததன்சையை பரிசோதிக்கின்றோமோ அந்தத் தசையீரமாய் மூத்திரம் இருந்தால் இவைகளின் அசைவைக் காணலாம்.

அணுமாத்திரவஸ்துக்களின் சுருங்குவதாலுண்டாகும் பலவித அசைவுகள். இவ்வித அசைவுகள் வர்ணமற்ற குருதிச்சாலங்களிலும், சமவந்தத்தசைச்சாலங்களிலும் பார்க்கலாம். இந்தச் சாலங்களின் வஸ்துக்கள் சுருங்குவதால் பைன் பலவித விடையுடைத்தானவையாகின்றன. சதையின்சைவு—சதைகள் இருவகைப்படும். பட்டை பட்டையாயிருக்கும் சதைகளும், சாதாரண பட்டையற்ற சதைகளும். பட்டையுள்ள சதைகள் சில சமயங்களில் இச்சாபூர்வச் சதைகள் என்று சொல்லப்படும். ஏன் எனில், மனதின் உத்தேசத்தினால் அசையக்கூடிய சதைகள் எல்லாம் இந்த பட்டையுடைய சதைகளால் அமையப்பெற்றிருக்கின்றன. சாதாரண பட்டையற்ற சதைகளுக்கு அரிச்சாபூர்வச் சதைகளென்று பெயர் வழங்கப்படும். ஏன் எனில், இவைகள் புத்திரீர்வமாய் இச்சதைகளை அசைப்பது அரிது.

பட்டையற்ற சதைகள் நீண்டு கதிர்கம்பிபோலக் காணும். பீஜத்தையுடைய நார்ச்சாலங்களாம். அவைகள் தட்டையாயிருக்கும். 4,500 அல்லது 8,500 ல் ஒருபங்கு

அங்குல அகலமும், 600 அல்லது 800 ல் ஒரு பங்கு அங்குல நீளமுமாயிருக்கும். இவைகளின் மத்தியிலாவது ஓர் ஓரத்திலாவது மங்கின கறுப்புப்பொட்டுகள் வரிசையாய் வது சூத்துகளாயாவது காணுகின்றன. இந்த நார்ப்பைகள் ஒன்றுசேர்ந்து சதை நார்களாகவும் சதை நார்த்தட்டுகளாகவுமாகின்றன. இந்த நார்த்தட்டுக்கு மேலுரை கிடையாது. இவ்விதச் சதைநார்கள் அன்னபசனக் குழலில் அன்னவாகி மத்தியிலிருந்து குதத்தின் உட்புறச்சுருக்கும்வரையிலும் உள்ள சதைச் சொக்காயிலிருக்கின்றன. மூத்திரக் குண்டிக்காய்களினின்று மூத்திரப்பை வரையிலிருக்கும் மூத்திரக் குழல் சவ்வினும், மூத்திரப்பைச் சவ்வினும், த்மாகம் கவாசக்குழற் கிளைகளினும், கோளங்களின் குழல்களினும், பித்தப்பையினும், இரோதஸ் இருக்கும் சிறுபைகளிரண்டினும், கர்ப்பமாயிருக்கும் கருக்குழியினும், இரத்தக் குழல்களினும், நிண நீர்த்தாரைகளினும், கண்களின் கிஷ்ணமண்டலத்திலும், இன்னும் சிலவகைகளிலும் இவ்விதச் சதைநார்கள் இருக்கின்றன. பட்டையுள்ள சதைகள் இச்சாபூர்வச்சதைகள் யெல்லாம் இவ்வகுப்பைச் சேர்ந்தவைகள். இரத்தாசயத்திலும் இச்சதைகள்தான் இருக்கின்றன. தொண்டைச் சுவர்களிலும் காது உட்பக்கத்திலும், மூத்திர துவாரத்திலும் மற்றும் தேகத்துக்குட்புறத்தில் அனேக இடங்களிலும் இவை காணும். இச்சதைகள் எல்லாம் மாம்சகண்டங்களாலாகி நார்-பை தசைகளால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் ஒன்றுடனொன்று படைபடையாய்ச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்கண்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் அதனுள் அதே பிரகாரமாய் சிறிய கண்டங்களாலானவைகள். அரிச்சாபூர்வ அசைவுகையுடைய இரத்தாசய மாத்திரம் இச்சாபூர்வச் சதைகளை யுடைத்தாயிருக்கின்றது.

இச்சாபூர்வச்சதைகளில் ஏராளமாய் இரத்தக்குழல்கள் பரவியிருக்கின்றன. தந்துகிவலைகள் யேராளமா

யிருக்கின்றன. நரம்புகளும் ஏராளமாய் சதைகளில் பரவியிருக்கின்றன.

சுதையின் பூதிகப்பிரிவுகள்.

இரத்தம்போலவே சதையையும் இரண்டுவிதமாகப் பிரிக்கலாம். சில உபாயங்களால் பார்க்கும்படித்து சதை உரைந்து மியோசின் (Myosin) என்னும் பெயரையுடைய சதை தீப்பிரெய்னும், திப்பி நீங்கிய திரவத்துக்கு சதை நீரென்றும் (Muscle serum) பிரித்தெடுக்கலாம்.

சுதையின் இலக்கணம்.

சதைகளுக்கு மூன்றுவித சொருபம் சொல்லலாம். (1) தடஸ்தமாயிருக்கும்பொழுதுள்ள குணம் ஒன்று. (2) தொழில்புரியும்பொழுதுள்ள குணம் ஒன்று. (3) விரைத்துக்கொள்ளும்பொழுதுள்ள குணம் ஒன்று.

(1) தடஸ்தகாலத்தில் சதைக்கு நெகிழ்ந்தரமும் சக்தி பூரணமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அதை நீட்டலாம், நீட்டிவிட்டால் மீறுபடியும் ஏதாஸ்தானத்தை யடைந்துவிடும். சதை சுருங்குவதால் அதனிரண்டு துளிகளும் ஒன்றின்பக்கம் மற்றொன்று வரும். தடஸ்தகாலத்திலும்கூட சதைகள் இரத்தத்தினின்று சுவாசவாயுவை கிரகித்துக்கொண்டு கரியமலவாயுவை அதற்கு நீக்கிவிடுகின்றன.

(2) தொழில்புரியும் சக்தி சதைகளுக்கு அவைகளின் சுருங்கும் தன்மையால்தானுண்டாகின்றது. இந்த குணத்தை, சதைகளை நேரில் உத்திபனப்படுத்துவதாலும் அல்லது அவைகளுக்குச் சேர்ந்த சலன-நரம்புகளால் அழற்சியடையச் செய்வதாலும் உண்டாக்கலாம்.

சதைச்சுருக்கத்தை யுண்டாக்கக்கூடிய அழற்சிகளின் மூலத்தை பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்:—

நரம்பு சக்தி, மின்சார சக்தி, வாகட சக்தி, உஷ்ண சக்தி, ஜடசக்தி எனப் பிரிக்கலாம்.

சதைக்குவரும் நரம்பை சுதையினின்றும் அதிக காலம் பிரிக்கப்பட்டால் சுதையின் சுருங்கும் சக்தி அற்றுப்போகின்றது. டார்ச்வாயு முதலிய ஸ்தம்பரோகங்களில் பார்க்கலாம். நாடி இரத்தம்விடாமல் சுதையின் போஷிப்புக்குவராமல் நின்றுபோனாலும் சுருங்கும் தன்மை நசித்துப்போகின்றது. ஆகையால் தான் மூச்சுடையும் மூர்ச்சைகளில் காணும்படியான இரத்தாசயத்தின் சதைச் சொக்காய்க்குவரும் நாடி இரத்தக்குறைவினாலும் இரத்தாசயம் தொழில்புரியாமல் நின்றுபோகக்கூடும்.

சுருங்கும் தன்மையல்லாமல் சதைகளுக்கு இன்ன மொரு குணமுண்டு; உணர்வு நரம்புகளும் சதைகளைப் பற்றியிருக்கிறபடியால் அவைகளுக்கு உணர்ச்சி சக்தியுமுண்டாயிருக்கின்றது. ஆனால் இந்த உணர்ச்சி அதிக நன்றாய் விளங்கக்கூடியதல்ல. ஆயினும் சதைகள் சுருங்கித்தொழில் புரியும்காலத்தில் மனதுக்கு அவைகளின் ஸ்திதியை நன்றாய்த் தெரியப்படுத்துகின்றன. சதைகள் சோர்வடையும்பொழுதும்கூட விசுவசிய காலும்பொழுதும் அவைகளின் சரியான நிலைமை புத்திக்குத் தெரிவிக்கின்றன. ஆகையினால்தான் அவைகளின் ஸ்திதியை வேலைபுரியும்பொழுது அறிகிறோம். இதுவுமல்லாமல் இந்த உணர்ச்சி சக்தியால்தான், சதை தொழில்புரிந்து வஸ்துக்கள் இருக்கும் தூரத்தையும் வஸ்துக்களில் ஒன்றுக்கும் மற்றொன்றுக்குமுள்ள சம்பந்தா சம்பந்தங்களையும், அவைகளின் பாரத்தையும், தாங்கும் சக்தியையும், நாம் அவைகளை தூக்குவதாலும், தள்ளுவதாலும், அளப்பதாலும் அறிந்துகொள்ளுகிறோம்.

அடிக்கடி உத்திபனப்படுத்துவதால் சதை சோர்வடைந்துவிடும். சோர்வடைந்த பிறகு சதையை இச்சா பூர்வமாய் தொழில்புரிய ஏத்தனித்தாலும் நிதானமாய்த் தான் தொழில்புரியும்.

சதைகள் சுருங்குவதால் உஷ்ணம் உற்பத்தியாகின்றது. இந்த உஷ்ணம் சதைகள் தொழில்புரியும்பொழுது

பூதிசச்செயலாலுண்டாகின்றதோ அல்லது சதைநார்கள் ஒன்றின்மேல் ஒன்று உறைவதாலுண்டாகின்றதோ தெரியவில்லை. சதைகள் வேகமாய்ச் சுருங்கினால் சப்தமுமுண்டாகிறதென்று தோன்றுகிறது. சுண்டிவிரலை காதில்டைத்துக்கொண்டு பெருவிரலை யசக்கினால் சப்தம் கேட்கும்.

விரைத்துக்கொள்ளல் என்பது பிணத்தின் சதைகளின் குணம். சதைகளுக்கு அப்பொழுது உத்திபனத்தால் சுருங்கும் தன்மையற்றுப்போய்விடுகின்றது. தேகத்திலுள்ள எல்லாச் சதைகளும் தன்மைபொருந்தியிருக்கும். ஆகையால்தான் பிணம் விரைத்துக்கொள்ளும் விரைப்பு இச்சதைகளில் இறந்தபிறகு காணுகின்றன. சதைகள் தொழில்புரிந்தவுடன் சரவு நேரிட்டிருந்தால் இக்குணம் சீக்கிரம் காணும். வெப்பம்பட்டாலும் சீக்கிரம் பிணம் விரைத்துப்போகும்.

இச்சாபூர்வச்சதைகள் தேகத்தின் எலும்புகளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. கை, நுால், பிணை, உடம்பு முதலிய பல உருப்புகளும் பலவிதமான அசையும்படி செய்யும்.

20-ம் அத்தியாயம்.

தொனியும் பேச்சும்.

தொனியென்பது சுவாச நளவாடத்தினுட் கருவியினுடைய தொழிலாயிருக்கின்றது. சுவாசம்விட்டு முள்ளெலும்புடைத்தாயிருக்கும் சகலவித ஜீவராசிகளிலும் தொனியுண்டாக்கும் கருவி சுவாசக்கருவியை யடுத்ததாகும். சில பிராணிகளில் தொனிசெய்யும்காலத்திலும் செய்தபிறகும் அதை சுவாச மாறுபாடல்களுடையதாகச் செய்யும் சக்தியை பொருந்தியதாயிருக்கின்றது. மனிதனில் தொனி வெளிவந்தபிறகு பலவித மாறுபாடல்களை இச்சாபூர்வமாய் துணைமுனையின் ஆக்கினைக்குட்பட்டு உண்டு பண்ணுவதற்குதான் பேச்சு என்று பெயர்.

கண்டசோதனைக்கருவியால் பிழைத்திருப்போரில் பரிசோதனைகள் செய்துபார்த்ததினாலும் பிணத்தினுடைய குரல்வளையில்கேய்த சில பரிசோதனைகளாலும், மனிதன்செய்யும் தொனி குரல்வளை பந்தனங்களாகிய குரல்நாணிகளின் அசைவாலுண்டாகும் குணமெனத் தோற்றுகின்றது. இக்குரல்நாணிகள், குரல்வளைக்குள் இரண்டுபக்கங்களிலும் சவ்வுகள்மடிந்து தந்திகள்போலிருக்கும்; இவைகளுக்கு தொனிதந்திகள் என்றும் சொல்லலாம். ஒவ்வொருபக்கத்துக்கும் இரண்டு தொனிதந்திகளுண்டு. அவைகளின் மத்தியமாயிருக்கிற துவாரத்துக்கு கிருகவாயில் என்று பெயர். சுவாசத்தில் காற்று வெளியே போகும்காலத்தில் இத்தொனிதந்தி துனிகளைத்தொட்ட சத்துவத்தினால் தம்பூரூம்மீட்டியதுபோலதாதி தொனி வெளியேகிளம்புகின்றது. பேச்சு என்பது, நாவு, பற்கள், உதடுகள் முதலிய பாகங்களின் உதவியினால் தொனிக்கு உண்டாகும் மாறுபாடல்களாம். இத்தொனி தந்திகளின் கட்டடம் தம்பூர் முதலியவற்றின் நாசிகள்போல பிடுவாயும், அவை போலவே நெகிழ்ந்துரழும் சவ்வுகூட்டயனளாயிருக்கின்றன. குரல்வளையின் முருந்து பாகங்களுடன் இசைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இம்முருந்துகளை யொட்டிய பேசிகளின் பலவிதச் சுருக்கங்களுக்குத் தக்கபடி தந்திகளின் பிடுவை பலவாறாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

குரல்வளை கட்டடத்தைப்பற்றி யிதுவரையிலேயே சொல்லியிருக்கிறோம். இப்பொழுது அதைச்சேர்ந்த தொனிதந்திகளின் தொழிலைப்பற்றி மாத்திரம் யெடுத்துச் சொல்லுவோம். ஆனால் அதை நன்றாயறிவதற்காக குரல்வளை அங்காதிபாதத்தை சற்று கவனிக்கவேண்டும்.

குரல்வளைக் கட்டடத்தில் முக்கியமான பாகங்கள் எவை எனில்—தேடகம்போன்ற முருந்து ('The Thyroid Cartilage'), மோதிரம்போன்ற முருந்து ('The Cricoid Cartilage'), கமண்டலம்போன்ற முருந்துகளிரண்டு

(Arytenoid Cartilages)*; தொனிதந்திகள் இரண்டு ஆக இவைகளாம்.

கிருகவாடத்திற்கும் தொனிக்கும்* யாதொரு சம்பந்தமும் கிடையாது. விழுங்கும் காலத்தில் உணவும் நீரும் குரல்வளையில் செல்லாவண்ணம் அதன் வாய்புறத்தை மூடிபோலடைத்துக்கொள்ளமாத்திரம் உபயோகமுள்ளதாயிருக்கிறது.

கேடகம்போன்ற முருந்து குரல்வளையை முழுதும் சுற்றிக்கொண்டு விருத்தமாயிருக்கிறதில்லை. அதன் முன்பக்கத்தை மாத்திரம் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மோதிரம்போன்ற முருந்தோ முழுதும் மோதிரம்போல சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது.

குரல்வளைக்குச் சேர்ந்தபேசிகள் இம்முருந்துகளைப் பற்றியிருக்கின்றன. அவைகள் ஒன்பது. ஒன்று தனியாயும், மற்றவை நான்குஜதைகளாயு் இருக்கின்றன: மோதிர-கேடகப் பேசிகளிரண்டு, கேடக-கமண்டலப் பேசிகளிரண்டு; முன்பக்கத்து மோதிர-கமண்டலப் பேசிகளிரண்டும், பின்பக்கத்து மோதிர-கமண்டலப் பேசிகளிரண்டும், கமண்டலப்பேசி யொன்றுமாம். மோதிரக் கேடகப்பேசிகள் சுருங்கும்பொழுது கேடக முருந்தின்மேல் மோதிர முருந்தைச் சுழலச்செய்யும். இப்படிச் சுழலுவதால் மோதிரமுருந்தின் பின்பக்கத்து மேல்பாகமும் அதன்மேலிருக்கும் கமண்டலமுருந்தும் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு கேடகமுருந்து முன்னுக்கு வரும். கேடகமுருந்துக்கு முன்பக்கத்தில் ஒரு துணியும்,

* கமண்டல முருந்து என்றனம்—குரல்வளையின் இரண்டு முக்கோண முருந்துகளுக்கு இப்பெயர் இடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பெயர்வரக் காரணமென்னவெனில், அவ்விரண்டு முருந்துகளும் சேர்ந்து சுவரல் மூடப்பட்டிருக்கும்பொழுது அவை தோற்றம் தோற்றத்தைப் பொருந்தியதாகும். முன்காலத்தில் பெரியோர்கள் பிராணிகளையே மூக்கியமாய் சத்திரப்பிரயோகம் செய்து பரிசோதித்து வந்தார்கள். பிராணிகளில் குரல்வளையின் வாயும் கமண்டல முருந்துகளும் ஒன்றுபடச் சேர்ந்திருக்கும்பொழுது பார்த்தால் அவற்றின் தோற்றம் வாயகண்ட காகம்போலிருப்பதைப் பார்க்கலாம்.

யும், கமண்டலமுருந்துக்கு பின்பக்கத்தில் ஒரு துணியும் இசைக்கப்பட்டுள்ள தொனிதந்திகள் மீட்டுவதற்கு தகுந்த ஸ்திதியில் வந்துவிடும். கேடக-கமண்டலப் பேசிகளோ இதற்கு விரோதமாய் தொழில்புரியும். கேடகத்தை பின்னுக்குத்தள்ளி, கமண்டலத்தையும் மோதிர முருந்தின் மேல்பக்கத்து பின்பாகத்தையும் முன்னுக்குத் தள்ளும். இதனால் தொனிதந்திகள் நெகிழ்ந்து நிற்கும்.

முன்பக்கத்து மோதிர-கமண்டலப் பேசிகள் கிருகவாயிலே அகற்றும். பின்பக்கத்து மோதிர-கமண்டலப்பேசிகள் அதன்வாயை மூடும். தனிமையாயிருக்கும் கமண்டலப்பேசியும் கிருகவாயிலே மூடும் சக்தியுள்ளது.

குரல்வளைத் தொழில்களைப்பூரிவதில், புப்புசோதர நரம்புகளின் உணர்வு-நரம்புக்கிளைகளினால் மிக்க உணர்ச்சியுடைய பேசிகளாகி, குரல்வளைபுள் வேறு வஸ்துக்கள் செல்லாவண்ணமும், சுவாசிக்கக்கூடாத வாயுக்கள் உட்புகாவண்ணமும் கிருகவாயில் மூடிக்கொண்டு கார்டுக்கும் தர்மத்தையுடையதாகின்றன. புப்புசோதர நரம்புகளின் ஊர்த்த கண்டகக்கிளைகள் அழற்சியடைந்து முகுளத்திற்கு உத்திபனத்தைச் செலுத்துகின்றன. அதினின்றும் பிரதிகரணக் கிரியைபெற்று அதோகண்டகநரம்புக்கிளைகள் பேசிகளைச் சுருக்குவதால் கிருகவாயில் மூடும்.

புப்புசோதர நரம்புகளின் விவ்விண்ணி கிளைகளும் தொனியையுற்பத்திசெய்விப்பதிலும் தொனியின் பிரமாணத்தை நிர்ந்தாரணசெய்வதிலும் தொழில் புரிகின்றன. தொனி தந்திகளுக்குவேண்டிய பிசியை அதோகண்டக நரம்புக்கிளைகள் கொடுக்கும். இவைகளிருக்க வேண்டிய தக்க ஸ்திதிகளை நிர்ந்தாரண செய்யும்பொருட்டு ஊர்த்த கண்டகக்கிளைகள் இப்பேசிகளின் நிலைமையை மனதுக்கறிவிக்கும்.

இப்பேசிகளின் பல செயல்களால்தான் தொனியின் பல சுவரங்களும் அவைகளின் ஸ்தாயிகளும் ஏற்படுகின்றன.

பேச்சு.

குரல்வளையிலுண்டாகும் சங்கீதத் தொனிகளல்லாமல் துணைமூலையின் உதவியால் வெளிப்புற வஸ்துக்களையும், அவைகளின் தன்மைகளையும், தொழில்களையும்; மற்றும் இவைபோன்ற பல விஷயங்களையும் பிரித்துக் காட்டவேண்டிய சப்தங்களை சொற்களாகவும் பார்வைகளாகவும் ஏற்படுத்த குரல்வளைக்கும் வெளிப்புறத்திற்கும் இடையிலுள்ள சப்தக் குழல்களில் பல செயல்களால் அனேகவித சப்தங்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன. இவ்விதமாயுண்டாகும் எல்லாச் சப்தங்களுமே எல்லாப் பாஷைகளிலும் சேருகிறதில்லை. ஒன்றுடன் ஒன்று சேரக்கூடாத சில சப்தங்கள் வார்த்தைகளாகச் சேருகிறதில்லை. என்கில் உச்சரிக்கக்கூடிய சப்தங்கள் சேர்ந்து பாஷைகளாக விளங்குகின்றன. பாஷா சப்தங்கள் உயிர் மெய்யென இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உயிர் சப்தங்கள் குரல்வளையிலுண்டாகி மாறுபடாமல் வெளிவருகின்றன. மெய் சப்தங்கள் சப்தக்குழல்களின் செய்கைகளால் மாறுபாட்டடைந்து வெளிவருகின்றன. உயிர் மெய்யெழுத்து சப்தங்களை உதாரணமாய்க் காண்க.

21-ம் அத்தியாயம்.

புலன்கள்.

நரம்பு மண்டலத்தின் உதவியால் மனது, தேசத்தின் பலபாகங்களினுடைய இருப்பையும் வெளியுலகத்தின் இருப்பையும்பற்றியுள்ள ஞானத்தை அடைகின்றது. இந்த ஞானம் மூலையில் சில மத்தியங்களிலுண்டாகும் அழற்சியாலும், அம்மத்தியங்களுக்குச் சில உட்போகும் (உணர்வு) நரம்புகளால் செலுத்தப்படும் அழற்சிகளாலுமுண்டாகும் உணர்ச்சியாம்.

சாதாரணமாய் உணர்ச்சியுண்டாக்க பின்வரும் நிலைமைகளவசியம், (1) அழற்சியடையும் வண்ணம் அதன்

அத்தி.]

சாதாரண உணர்ச்சிகள்.

333

ஹேதுக்களை தொக்கப்பொருந்தும்பொருட்டு தேச ஓரங்களில் ஒரு கருவியும், (2) அழற்சியைச் செலுத்த ஒரு நரம்பும், (3) -அதை உணர் ஒரு நரம்பு-மத்தியமும் வேண்டியிருக்கிறது.

உணர்ச்சியை (1) சாதாரண உணர்ச்சியென்றும், (2) விசேஷ உணர்ச்சியென்றும் இருவகையாகப் பிரிக்கலாம்.

சாதாரண உணர்ச்சிகள்.

சாதாரண உணர்ச்சிகளின் பகுதியின்கீழ் களைப்பு, ஊக்கம், மூர்ச்சை, திர்ப்தி இவைமுதலிய உணர்ச்சிகளைச் சொல்லலாம். பசியும் நாகமும் சாதாரண சஞ்சலத்தையுண்டாக்குவதுடன், இவைகள் முறையே இறைப்பையையும், தொண்டைக்குழியையும் அவை யொவ்வொன்றிற்கும் அவ்வுணர்விற்குரியபிடமாகக்காட்டும். தமனிகளின் சிலேஷ்மச் சவ்வினுண்டாகு மழற்சிகளால் உண்டாகும் இரும்பல் உணர்ச்சியையும்; மல மூத்திர விசர்சனங்களை வெளிப்படுத்தவேனுமென்று தோற்றம் உணர்ச்சிகளையும், பெண்களில் பிண்டத்தை வெளித்தள்ள வேனுமென்று காணும் உணர்ச்சியையும் இப்பகுதியின் கீழ் சொல்லலாம்.

சொறிதல், குருகுப்பு, கூச்சம், ஏரிவு முதலிய உணர்ச்சிகள் வேதனையென்பதின் பகுதியாய்ச் சொல்லக்கூடுமாயினால் இவைகளையும் இப்பகுதியிலேயே சேர்ந்தவையென்று கூறலாம். இவைகளை விசேஷ உணர்ச்சியாகிற தொக்கின் கீழெடுத்துரைக்கப்படும். இப்பொழுது சொல்லிய பலவித சாதாரண உணர்ச்சிகளில் பலவற்றை தொக்கினின்றும் பகுத்துச் சொல்வது கஷ்டமாயிருக்கின்றது. தொக் என்பது விசேஷ உணர்ச்சிகளிலொன்றாய் சொல்லப்படுகிறது. தொக்கென்பது சாதாரண உணர்ச்சிகளுக்கும்க் விசேஷ உணர்ச்சிகளுக்கும் சம்பந்தத்தை யுண்டாக்கும் உணர்ச்சியாகும். விசேஷ உணர்ச்சியாக இதை பாவித்தபோதிலும் மற்ற விசேஷ உணர்ச்சிகளின்

னின்றும் பேதித்திருக்கின்றது. இது பல நரம்புகளுக்கும் பொதுவான உணர்ச்சியாகும். பேசிகள் உணர்வு என்று சொல்லக்கூடியவையும் இப்பகுப்பிலேயே பெடுத்துக்கொள்ளலாம். நிற்பதல், நடத்தல், பிடித்தல், எடுத்தல் முதலிய பலவித பேசித்தொழில்களில் அவைகளடையும் சுருங்கலின் நிதானத்தையும், அவைகளின் சக்தியையும் அறிந்து, தக்கபடி அவைகள் ஒன்றுக்கு மற்றொன்று ஒத்தாசை புரியும்வண்ணம் செய்துகொள்ள வேண்டியதற்குள்ள உணர்ச்சியாகும். இவ்வுணர்ச்சியின் சக்தியால்தான் பல பளுவுகளின் தாரதம்மியத்தை கையிலெடுத்துப்பார்த்துச் சொல்லக்கூடும்.

பேசிகளின் உணர்ச்சிகளினின்றும், தொடுதல், அழுக்கமென்னும் உணர்ச்சிகளைப் பிரித்துப்பேசவேண்டும். நாம் நிற்கும்பொழுது பூமியை பாதத்தாலுணருகிறோம். இந்த உணர்ச்சி தொடுதல் என்னு முணர்ச்சியாகும். தேகத்தின் பளுவால் பூமியை அழுத்திக்கொண்டிருக்கிறோம் என்னும் உணர்வும் தோன்றுகின்றது. இவ்விரண்டு உணர்ச்சிகளையும் பாதத்தின் சர்மங்களாலறிகிறோம். நின்றபடியே கால் பெருவிரல்கள்மேல் பளுவைப்போட்டு குந்தி நின்றால், கெண்டைப்பேசிகள் செய்யும் பிரயத்தனத்தை அறிகிறோம்.

விசேஷ உணர்ச்சிகள்.

தொக்குடன் சேர்ந்து விசேஷ உணர்ச்சிகள் ஐந்தாகும். தொக் அல்லது பரிசம், இரசம், கெந்தம், சப்தம், ரூபம் என்பனவையே.

விசேஷ உணர்ச்சிகளுக்கும், சாதாரண உணர்ச்சிகளுக்கும் முக்கியமாயுள்ள வித்தியாசமென்னவென்றால், சாதாரண உணர்ச்சிகளால் தேகத்தின் பல பாகங்களுடைய தன்மையைறிகிறோம். விசேஷ உணர்ச்சிகளால் வெளியுலகின் ஞானத்தையும்டைகிறோம். தேகத்திலுண்டாகும் நோவு சாதாரண உணர்ச்சியாகும். தொக் ஞானம் வஸ்துவைத் தொடுவதாலுண்டாகும். உதாரண

மாக, ஒரு சக்தியின் மூளை தேகத்தில் படும்படி தொட்டால் தொக் ஞானமுண்டாகின்றது. அதையழுத்தினால் சர்மமறுபட்டு நோவுண்டாகும். இந்த நோவின் ஞானம் உடலில் காண்கிறதல்லாமல், கத்தி தொடுவதினுண்டாகும் தொக் ஞானமாதிரி சக்தியை சுட்டிக்காட்டுப்படியானதாயிருக்கமாட்டாது.

புலன்களென்பது பொரிகள்வழியாய் மூளையிலுண்டாகும் உணர்ச்சியாகையால், புலன்களுக் கிருப்பிடம் பொரிகளாகமாட்டாது. சாதாரணமாய்ப் பேசுவதில் கண்ணால் பார்ப்பதாகவும், காதால் கேட்பதாகவும், இப்படியே மற்ற பொரிகளுக்கிணங்க வார்த்தையாகுகிறோம். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் இப்பொரிகள் மூலமாய் உண்டாகும் அழற்சிகள் மூளைக்கு நரம்புகளால் கொண்டுபோகப்பட்டு, மூளையில் விசேஷ உணர்ச்சி ஞானங்கள் உண்டாகின்றன.

பார்வை நரம்பு பிரிவுபட்டு நரசமடைந்தால் கண் விழி பழுதற்றிருந்தாலும், ஒளி, உருவமுதலிய அப்புலனினுணர்ச்சி அறியாமற்போம்.

உண்டாகு முணர்ச்சியால் நாம் சொல்லக்கூடிய தென்னவென்றால், புலத்திற் கிருப்பிடமாகிய மூளையில் அழற்சியுண்டாயிற்றென்பதே இவ்வழற்சி வெளியுலக வஸ்துக்களாலாகப்பட்டாலும் படலாம். மூளையிலேயே சில விகற்பங்களாலுண்டானாலு மாசலாம். இவை யிரண்டையு முறையே வெளியுருவுணர்வென்றும், உள் ஞருவுணர்வென்றும் சொல்லலாம். ஆயினும் உணர்ச்சியை மனதானது வெளிப்பொருள்களின் காரணத்தாலுண்டாக்கப்பட்டதென்று தோற்றுவிக்கும் வழக்கத்தை யுடையதாகின்றபடியால்தான், வெளிப்புற வஸ்துக்களின் காரணங்களின்றியும் மனதில் உணர்ச்சி வெளித்தோற்று மேல் (வெளிப்பொருள் காரணமிருக்கிறதென்ற) பிரமரம், மயக்கம், மாய்கையை அடையச்செய்கின்றது.

பிரமரம் என்பதைப்பெடுத்து விளக்க அனேக உதாரணங்களிருக்கின்றன. கேள்வி நரம்பின் அழற்சியால் சில சமயங்களில் நீங்கா சப்தம் செவியிலுண்டாகின்றது. சில சமயங்களில் சங்கீதத்தொனிகளும் மனிதனிடம் பேச்சுகளும் கேட்பதுபோலத் தோற்றுகின்றன. எதிரில்லாத மனிதர்களையும் வஸ்துக்களையும் உள்ளதுபோல விழிக்கு தோற்றமுண்டாகி சிலர் சில சமயங்களிலுரைக்கின்றார்கள். விகாச சன்னியிலும் மற்றும் பலவித விகாசங்களிலும் நோயாளி, பூனை என் புழுக்கள் முதலிய வஸ்துக்களையும் மற்றும் பலவித விகாசவஸ்துக்களையும் காண்பதுபோல பிதற்றுவிடுகின்றன. பொருள்களைவற்றின் நரம்புகளையு மழற்சியடையச் செய்யக்கூடிய உடலுள்ளவற்றுக்கும் சாதாரணவஸ்து இரத்தமாகும். தந்தையர்களில் இரத்தம் அதிகரித்து வீக்கம் முதலியவைகளில் அழற்சியுண்டாகக்கூடும். கண்கள் முடியிருக்கும் காலத்திலும் இவ்வித அழற்சி விழிக்குண்டாகும்பொழுது வெளிச்சத்தைக் காண்பதுபோலத் தோற்றும். கேள்வி நரம்புக்கழற்சியுண்டானால் நீங்காசப்தம் முதலிய சப்தங்கள் கேட்கும். ஆதலினால் நரம்புக்குண்டானால் வாசனையுண்டாவதாகத் தோற்றும். பரிசு நரம்பைப்பற்றியிருந்தால் வேதனை காணும். இம்மாதிரியாகவே மயக்கவஸ்துவை இரத்தத்திலடையச்செய்தால் புலன்களின் நரம்புகளை முறையே யழற்சியடையச்செய்து பலவித வெளிச்சங்களைக் காண்பதுபோலவும், சில சங்கீததொனிகளைக் கேட்பதுபோலவும் காண்கின்றது. பின்னுமித போலவே பலமாயடிபட்டாலும், வேறுவித அழுக்கா களாலும் கண்ணில் வர்ணங்கள் தோற்றும், காதில் சப்தங்கள் கேட்கும். இம்மாதிரியே மற்ற புலன்களிலும் உணர்ச்சிகளுண்டாகும். நமதுணர்வு வெளிப்புற வஸ்துக்களாலுண்டாகிறதென்று சுட்டிக்காட்டும் குணத்தால் வெளிப்புற வஸ்துக்களால் நமது புலன்களில் தோற்றுப் ஞானமாயுதல்களுக்கு நாம் உண்டாக்கும் வஸ்துக்களின் குணங்களென்று சொல்லுகிறோம். சில வஸ்துக்களுக்கும்

இஷ்டமற்ற சுவையும் கந்தமும் இருக்கிறதென்று சொல்லுகிறோம். வாஸ்தவத்தில் அவ்வஸ்துக்களின் சுவையும் கந்தமும் நமக்கிஷ்டமில்லாமலிருக்கின்றன. ஏன் எனில், புலால் நமக்கு வெறுப்புள்ளதாயிருந்தபோதிலும், கழுகு முதலியவைகள் ஆவலுடன் நின்கின்றனவாகையால் அவைகளுக்கு இஷ்டமற்றதாயிருக்கமாட்டாது. மேலும், நமதுணர்ச்சிகளைவற்றையும் வெளிப்புறக் காரணங்களுக்குறித்தானவையென்று சுட்டிக்காட்டும் வழக்கமேதான் வெளியுலக முண்டென்பதைக் காட்ட ஏற்படும் காரணமாம். இது விசேஷமாய் ஸ்பரிசும், காட்சி இவ்விரு புலன்களின் தன்மையாயிருக்கின்றது. இவ்விரு புலன்களும் ஒன்றுக்கொன்று உதவியாகியும் மற்ற புலன்களின் ஒத்தாசையாலும் நாம் வெளிவஸ்துக்களின் ஞானத்தை அடைகிறோம். அனுதினமும் இவ்வுணர்வுகள் தோன்றும் தோறும் நமது ஞானத்தினுண்ணம் திடமுற்று, நாளைவில் நமது புலத்தோற்றங்களின் சாட்சியத்தை, யுதுதியானதாகக் கொள்ளுகிறோம்.

புலன்களினுணர்ச்சிகளுக்கும், உணர்ச்சிகளினால் செய்யப்படும் ஊகங்களுக்குமுள்ள கிர்தியாசத்தை கவனிக்க வேண்டியது. ஒரு வஸ்துவை சமீபத்தில் பார்க்கும் பொழுது, அது பத்தடி தூரத்திலிருக்கிறது அல்லது இருபத்தடி தூரத்திலிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் இப்படி துலங்கும் ஞானம், நாம் வஸ்துவை காண்பதினால் உண்டாகும் ஞானமாதிரமல்ல, அத்துடன் பல உணர்ச்சிகளும் கலந்து உண்டாகும் நிதானமாயின் தது. அப்படிச்சேரும் உணர்ச்சிகளில் அந்த வஸ்துவைப் போய்ச்சேர நாம் நடந்தால், எவ்வளவு அடிகள் ஓடித்துப் போகவேண்டியிருக்கும் என்னும் ஞானம் சோந்தது. பலதடவைகளில் அவ்வளவு தூரமுள்ள வஸ்துக்களுக்கு நடந்துபோய் அறிந்திருக்கும் காரணத்தால் உண்டாவது.

ஒருவனுக்கிருக்கும் ஞானமெல்லாம் இப்புலன்களினின்று முண்டானதாகையால் இப்பொருள்களின் விசே

ஷத்தைப்பற்றி யதிகமாய் எடுத்துக்காட்டவேண்டிய அவசியமிராது. நமது ஞானமுழுவதும் இவ்வைம்புலன்களுக்குட்பட்டதாயிருக்கிறபடியால் ஞானத்தைத்தரவேறு ஆளுவது புலன் ஒன்று இருத்தல் அசாத்தியமாகவும் நமக்குக் காணுகிறது. நமது பொறிகளாலுண்டாகு முணற்சிகள் முறையே வித்தியாசப்பட்டதாயிருக்கின்றன. இப்படி பேதப்பட்ட உணர்ச்சிகளுக்கு உணர்ச்சியுண்டாக்க அழற்சியைச்செலுத்தும் நரம்புகளின் கட்டவித்தியாசம் காரணமல்ல. ஏன் எனில், நரம்புகட்டடங்களில் வித்தியாசம் யாதொன்றுங்கிடையாது. இதற்கு காரணம் இந்த நரம்புகள் முனையிற்போய் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் குணவித்தியாசங்களேயாம்.

பரிசம், ஊறு.

“பரிசம் அல்லது ஊறு என்பது, நாம் தொழும் பொருள்கள் அல்லது நம்மேலே படும்பொருள்கள், ஒப்பமோ முறனே, குளிர்மையோ காங்கையோ, கூரோ மனையோ, வன்மையோ மென்மையோவென்று பகுத்தறியப்பண்ணும் புலனாக இருக்கின்றது.” மற்ற புலன்களைப் போல இப்புலனின் பொறி தேகத்தின் சிறியபக்கத்தில் மாத்திரம் அமைந்ததல்ல. சாதாரண உணர்ச்சியறியக் கூடிய ஸ்பரிச நரம்புகளினுலெல்லாம் இவ்வுணர்ச்சியை புழுவறியக்கூடியதாயிருக்கிறது. ஆகையால் முள்ளந்தண்டுக்கொடியின் பின்பக்கத்து வேர்க்கிணினின்றவரும் சகல நரம்புகளும் தொக் ஞானமுண்டாக்கும் நரம்புகளாகும். ஆயினும் பரிச உணர்வு சர்மம், நாவு, உதடுகள் முதலிய விடங்களில் மற்றவிடங்களைவிட சீக்கிரத்தில் எனினில் காணும். நகங்களுக்கும், பற்களுக்கும், ரோமங்களுக்குங்கூட இந்த உணர்வை அறியும் சக்தியிருக்கின்றன. உணர்ச்சி எவ்விடத்திலதிகக் கூர்மையோ அவ்விடத்தில் மற்ற இடங்களைப்பார்க்க அதிகதொகையான நரம்புக் கூந்தல்கள் ஒடியிருக்கின்றன. உதாரணமாக, விரல்களின் துணிகளிலும், உதடுகளின் விளிம்புகளிலும் நரம்புகூந்தல்களதிகமாக

அத்தி.]

பரிசம், ஊறு.

339

வும் உணர்ச்சி கூர்மையாகவும் இருக்கிறதைக் கண்டு கொள்ளலாம்.

பரிச உணர்வு பலவகைப்பட்டதாயிருக்கிறது. உதாரணமாக, கின்றாதல் என்பது ஒரு சிறியபாகத்தை மிக்க அழற்சியுண்டாக்கச்செய்வதினால் உண்டாகும் உணர்ச்சியாகும். அழுக்கம் என்பதோ ஒரு பாகத்தை அதிக அழமாக ஆனம் கொஞ்சம் மெதுவாக அழற்சியடையச் செய்வதாலுண்டாகும் உணர்ச்சியாகும். பரிசத்தை அழுக்கத்தினின்றும், சீதோஷ்ணஸ்திதியறிதவினின்றும் பகுத்தறியவேண்டும். ஆயினுமில்லுணர்ச்சிகளின் காரணங்கள் அளவை மீறிவிட்டால் வேதனையுண்டாகும். குருகுருப்புண்டாகுதல் வேதனையுடன் சேர்த்துச்சொல்லவேண்டும். ஏன் எனில், நமக்கு சுகத்தையோ துக்கத்தையோ மாத்திரம் உணர்வு தோன்றும்பாகத்தில் தருகிறதல்லாமல் இவ்வுணர்ச்சியால் வெளிப்பொருள் ஞானம் ஒன்றும் நாமடைகிறதில்லை. தேகத்தின் பலபாகங்களில் இவ்வுணர்ச்சி யுண்டாக்கக்கூடியதாயிருந்தபோதிலும் உள்ளங்கால், ஜனனேந்திரியங்கள், முலைக்காம்புகள் இவைகளில் அதிக கூர்மையாய்க்காணும்.

பரிசம் தேகமுழுதிலும்காணும். ஆயினும் மீத்தோல் மெலிவாயிருந்தால் பரிசம் நன்றாய் விளங்கும். அது குதிக்காவினிருப்பதுபோல தடித்திருந்தால் உணர்ச்சி மங்கிக்காணும். மீத்தோலை உறித்து சர்மத்தைமாத்திரம் அழற்சிதாங்கினால் பரிச உணர்ச்சியின் ஞானமற்று வேதனைமாதிரமுண்டாகும். இப்புலன் தோலிலோடும் இரத்தத்தினளவு விதத்திற்குத் தக்கபடி வித்தியாசப்பட்டிருக்கும்.

பிராணிகளிலனைவற்றிற்கும் பிரத்தியேகமாய் பரிச உணர்வு அறிய அங்கங்களுமிருக்கின்றன. பூனை முதலியவற்றிற்கு வீசைகளிருக்கின்றன. வெளவாலுக்கு இறகும், யானைக்கு துதிகையும், மனிதனுக்கு கைகளுமிருக்கிறதைப் பார்க்கலாம்.


வஸ்துக்களின் உருவத்தையும் வடிவத்தையும் பரிசு உணர்ச்சியால் மனது அறிந்துகொள்ளுகின்றது. இப்படியறியும்வண்ணம் வஸ்துக்களைப்பற்றி தடவிப்பார்க்கக்கூடிய தேக அங்கங்களில் பரிசு உணர்ச்சி யதிகமாயிருக்கின்றது. ஊறு அதாவது தொக் இந்திரியத்தால் வஸ்துக்களைக் கண்டறிவது எப்படியென்றால், இச்சாபூர்வமாய் வஸ்துக்களைத் தொட்டுத்தடவி யறிந்துகொள்ளுகின்றோம். கைகளின் மூன்பாகம் உள்ளங்கைபக்கத்தாலும் புறங்கை பக்கத்தாலும் தடவி யறியுஞ்சக்தியை யுடைத்தானதாயிருக்கிறது.

இரசம், சுவை.

சுவையறிவதற்கு (1) தக்க நரம்பும் நரம்புமத்தியமும் வேண்டும். (2) இந்நரம்புகளை உத்தபனம் செய்ய உருசியுள்ள வஸ்துக்களும்வேண்டும். இப்பதார்த்தங்களை உருசிபார்க்கில் அவைகள் தங்களில் தானே சுவையுடையிருக்கவேண்டும் அல்லது அவைகள் வாய்க்குள்ளிருக்கும் நீரிலே கறையக்கூடியதாயிருக்கவேண்டும். வைரமான வஸ்துக்கள் கரையாமலிருந்தால் உருசியற்றிருக்கும். வைர பதார்த்தங்கள் உமிழ்நீரால் கரையக்கூடியவைகள் கரைவதற்கு சற்று நேரம் பிடிக்கிறபடியால் அவைகளின் சுவையறியக் கொஞ்சநேரம் செல்லும். இது வுமல்லாமல் சுவையறியு மங்கங்கள் ஈரமாயிருக்கவேண்டும். தொண்டைக்குழியும் நாவும் ஈரமற்று உணர்ந்திருந்தால், கரைந்த சுவைகொடுக்கும் பதார்த்தங்களிலும்கூட உருசியறிவது கஷ்டமாயிருக்கும்.

சுவையறியும் கருவிகளில் முக்கியமானது நாவும் தொண்டைக்குழியுமாம். நாவானது நீர் ஊறும் சவ்வால் மூடப்பட்ட பேசிக்கூட்டத்தாலாகிய உலுப்பாகும். நாவின் நீர்ச்சவ்வு மற்ற சிலேஷம் சவ்வுகள் மாதிரியே கட்டடமுடைத்தாயிருக்கின்றது. ஆனால் நாவின் மேற்பக்கம்

35-ம் படம்.



35-ம் படம். தொண்டைக்குழி உண்ணாவுடன் கூடிய நாவின் நாக்கிடு பரப்பு. 1, 2. மூன்புறஞ்சுற்றியிருக்கு முனைகள். 3. அவ்வோப்புற முனைகள். 4. நடுமுகைகள். 6. நாவடியிலிருக்கும் சிலேஷம் கோளங்கள். 7. உண்ணா. 8. கருவியின் பாகம்.—கரிசி.

சிறு கூரான முனைகளுடைய தாயிருக்கின்றது, இம்முனைகளுக்கு நாக்கடு* என்று சொல்லலாம்.

நாவின் பேசிக் கூட்டங்களால் நாவு நீளவும் சுருங்கவும் மடங்கவும் மற்றுமுள்ள அகைவுத்தொழில்களைப் புரிய சக்தியுடைத்தாயிருக்கின்றது.*

கதுப்புளின் உட்பக்கமும், அண்ணமும் சுவையறியும் சக்தியையுடையனவாய் நாவுக்கு ஒத்தாகை புரியும்.

சுவையென்னும் புலனினாலே மனிதருக்கும் யிருகங்களுக்கும் பிரயோஜனமென்னவெனில், அதைத்தொட்டு மனிதரும் யிருகங்களும் தங்களுக்கினமான உணவுகளைத் தெரிந்துகொண்டு, இனங்காத மோசமான பதார்த்தங்களை இரைப்பையிலே சேரவிடாமல் தடுத்துக்கொள்ளும்படி உதவுவதுதான். இப்புலன் மற்றெந்தப் புலனைப் பார்க்கிலும் அந்தந்த ஆளுடைய பழக்கங்களுக்கு தக்கவிதமாய் வேற்றுமைப்படும். இப்புலன் உணர்வும் புலனைப்போல் பழக்கத்தினாலே கூர்மைபாரும். பதார்த்தங்களை உருசித்து அவைகளின் சுவையின்னவென்று நிதானிக்கும் பொருட்டு நியமிக்கப்பட்ட ஆட்கள், மற்ற மனிதர் நினைக்கவும் கூடாத திட்டமாய்ப் பொருள்களின் உருசியை மட்டுக்கட்டிச் சொல்லுவார்கள். திராட்சரசம், தேயிலை முதலியவைகளைச் சோதிக்கிற தொழிற்காரரே இதற்குச் சாட்சி.

கந்தம், நாற்றம்.

கந்தத்தின் உணர்ச்சியையுண்டாக்க வெளிப்பொருள்களின் செய்கைகளால் நாற்றநரம்புகள் உத்திபனமடையவேண்டியிருக்கின்றது. இவ்வுத்திபனங்களுக்குத் தக்கபி

* நாக்கடு, நா, நாவு, —கடு, முள்ளு (Papilla of Tongue). நாக்கின் மேல் காணப்படுகிற முள்ளுப்போன்ற சிறுசிறு முனை. நாவில் சிலேஷ்மப் பைகளும் உயிர்நீர்ச் சேரல்களும் அனேகமாய்ப் பரவியிருக்கின்றன. நாக்கடுகள் அதிகமாய் நாவின் பின் பக்கங்களில் இருக்கிறபடியால் மேல்நா அந்த பாகங்களில் அதிக ஒப்பமற்றதாயிருக்கின்றது. நாக்கடுகளிலே சுவை நரம்புக் கிளைகள் கூந்தலாய்ப் போய்ச் சேருகின்றன. இவைகளில் இரத்த தத்துவங்களும் அனேகமாய்ப் பரவியிருக்கின்றன.

ரகாரம் பல வேறுபாடுகளுடைய கந்த உணர்ச்சியையறியக்கூடும். இப்பிரத்தியேகமான உணர்ச்சிகளை யுண்டாக்கும் நாற்ற நரம்பும், நரம்பு மத்தியங்களும் பிரத்தியேகமாயிருக்கின்றன. உத்திபனங்களால் இந்த நரம்புகள் ஒரு வித மாறுபாட்டைந்து கந்தம் காணும். வைரவஸ்துக்கள் மிக்க அணுவீனுக்களுவான பொடிகளாகி, நாம் சுவாசிக்கும் ஆகாசத்தில் பரவி நாற்றநரம்புகளை தாக்குவதால் கந்த உணர்ச்சியுண்டாகக்கூடும். அல்லது சாதாரண மாய் ஆவிருபமாயும் வாயுக்கள் ரூபமாயும் வஸ்துக்கள் ஆகாசத்தில் கலந்து நாற்றநரம்புகளை தாக்குவதாலும் இவ்வித உணர்ச்சிகள் உண்டாகக்கூடும். இப்படி நாற்ற நரம்புகளைத் தாக்குவதற்குமுன்பே, உணர்ச்சியுண்டாகும் வஸ்துக்கள் நாசித்துவாரத்து சனியூரும் சவ்வுகளின் சனியில் ஊரவேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் கந்த உணர்ச்சி உண்டாவதற்கு இந்தச் சவ்வும் நாமுடையதாயிருக்கவேண்டும். மூக்கினுள்ளிருக்கும் சிங்காணசில்லியென்னும் சிலேஷ்மச்சவ்வு வரண்டிபோனால் நாற்றப்பிலன் அற்றுப்போகின்றது. தடிமன் அல்லது சலதோஷமுண்டாவது மண்டைக்குள்ளே நீர் கோர்க்கிறதினால்ல. மூக்கின் உள்ளுரைச்சவ்வு சுரப்புக்கொண்டு கொதிக்கொள்வதினாலேதான். இப்படிச் சுரப்புகொண்டவேளையில் நீர் அ்தனமாய் அகிவிருந்து சொறியும். சலதோஷ ஆரம்பகாலங்களில் மூக்கினுட்கனி பொசிவது மட்டுப்படுகிறபடியால் அக்காலங்களில் வாசனை நன்றாய்த் தெரியமாட்டாது.

நவிர, மூக்கினுள் வாசனைவஸ்துக்களை ஆக்கிறுணத்தால் செலுத்தினால்தான் கந்தத்தை உணரலாம். அதற்காக நாம் வாயை மூடிக்கொண்டு நிச்வாசிக்கிறோம். சுவாசத்தை பந்தப்படுத்தினால் கந்தத்தின் உணர்ச்சி நின்றுபோகின்றது. இச்சாபூர்வமாய் சுவாசத்தை சீக்கிரமாக அடிக்கடி நிச்வாசம்செய்தால் உண்டாகும் உணர்ச்சி மிகக் கூர்மையானதாகின்றது.

ஆகையால் இப்புலன் மூக்கினிடமாக சுவாசக்காரற்று செல்வதாகிய நாசித்துவாரங்களிலே நிலைபெற்றிருக்கின்றது. சிங்காணாசில்லி பென்னும் சளிபூரும் சவ்வும் நாசித்துவாரங்களையும் இவைகளுடனே உள்ளொக்குத்தொடுத்திருக்கும் ஆறைகளையும் மூடியிருக்கின்றது. இச்சவ்வினிலேதான் நாற்றநரம்புகளின் கூந்தல்கள் வந்தடைகின்றன.

நாசிப்பிரதேசங்களில் ஸ்தம்பாகார பரிஸ்தாபித மீத்தோலு மூடியிருக்கின்றது. இவைகள் மூக்கினுட்பக்கங்களில் பல சிறிய பிரிவுகளாகப்பிரிந்து, பிரிவுகளினிடையே நாசிகாப்பைகளும் பொருந்தினவையாயிருக்கின்றன.

நாசிகா ஆறைகள் எல்லாவற்றிலும் சாதாரண உணர்ச்சியுண்டாக்கும் நரம்புகளும் பரவியிருக்கின்றன. ஆகையால் குளிர், உஷ்ணம், சொறிதல், குருகுருப்புணைதனை முதலிய உணர்ச்சிகளையும் அப்பிரதேசங்களிலறிகிறோம்.


எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் நாற்றப்புலன் ஒரே அளவுள்ளதாகவுமிருக்கிறதில்லை. பிராணிகள் நாற்றத்தைபுணருவதில் நாற்றத்தின் தன்மையைப்பற்றி சக்திபேதமுள்ளவைகளாயுமிருக்கின்றன. மாம்சபட்சண மிருகங்கள் பிராணி வஸ்துக்களைப் புலனாலறியும் சக்தி மிக்க உடையனவாயிருக்கின்றன. புற பூண்டில் ஜீவிக்கும் பிராணிகள் ஸ்தலவரங்களின் நாற்றத்தை யெனினிலறியும் சக்தியுடைத்தானவை. மனிதனோ எல்லா நாற்றங்களையறியும் சக்தி சமனாய் பெற்றிருந்தபோதிலும் பிராணிகளுக்குள்ள விசேஷ சக்தியுடையவனல்ல. உதாரணமாக, இப்புலன் நாசிலே மிகவும் கூர்மையாகவுருக்கின்றது. மிகச் சிக்கலாயும் குறுக்கு மறுக்கான பாதைகளில் அனேகாயிரம் மனிதர்கள் நடந்து போயிருந்தாலும் அது வாசனையால் தன் யெசமானனின் அடியின்னதென்று அறிந்துகொண்டு, அவன் போன வழியேசென்று அவனை தொடர்ந்து பிடிக்கின்றது.

மேற்கூறிய மற்ற புலன் மாதிரியே இப்புலனும் பழக்கத்தால் கூர்மையானதாயாகும்.

காது, சந்தம், ஓசை.

தெளிவாயறிந்துக் கொள்ளும் பொருட்டு, காதை மூன்று பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன : வெளிக்காது, நடுக்காது, உட்காது என்பனவையே. சத்தப் புலனுக்குள்ள அங்கம் உட்காதாகும். மற்றயிரண்டும் அதற்கு ஒத்தாசை புரியும் உபாங்கங்களேயாம்.

36-ம் படம்.



36-ம் படம். a. வெளிக்காது. b. திரிதடம். c. வெளிக்காதில் துவாரம். d. கேள்வி நரம்பு. e. கம்பு. f. ஆனகம். h. யாரி. i. மிடற்றுக்குச் செல்லும் நிகரணகத்துவாரம். k. நடுக்காது. b, f, h, எல்லாம் பிரமணமாகிய உட்காது என்னப்படும்.—கிரீன்.

இவற்றுள் வெளிக்காது தலைக்குப்புறம்பே சில புருவங்களாகி, விரிந்தமுருந்தாயும், தலைக்குள்ளே நடுக்காத ளவுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு அங்குல நீளமாய் சற்றுவளைந்த துவாரமாயும் தோலினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. விரிந்த முருந்துக்கு கர்துமடலென்று சொல்லலாம். காதுமடலின்கீழ் தொங்கிக்கொண்டிருக்கிற மிருதுவான சர்மத்துக்கு சுணைக்காது (Lobules) என்று பெயர்.

காதுத்துவாரத்தின் வெளிப்புறத்தில் சிறிய ரோமங்கள் சிலும்பியிருக்கும். நிணநெய்க்கோளங்களும் இருக்

கின்றன. துவாரத்தினுட்புறத்தில் சுவேதகோளங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளினின்றும் ஒருவகை மஞ்சள் நிறமாகிய குரும்பி பொசிகின்றது. மேற்சொன்ன மயிர்களும் குரும்பியும், தூசிகிருமி முதலியவைகள் காதுக்குள் பிரவேசிக்க ஒட்டாமல் புலனே பாதுகார்க்கின்றன.

நடுக்காதுக்கும் வெளிக்காதுக்குமிடையில் அண்டவடிவான ஓர் சவ்வு இருக்கின்றது. அதற்கு காதுன் உட்சவ்வு என்று பெயர். சுரோத்திரேந்திர சவ்வு-பரை-ஆனகம் ஆம்.

ஆனகத்திற்கு பின்புறமாக நடுக்காது இருக்கின்றது.

மனிததேகத்திலுள்ள எல்லா எலும்புகளையும்விடச் சிறிய எலும்புகள் நான்கு கோர்வைபாய்ச்சேர்ந்து நடுக்காது ஒட்டையாகின்றது. அக்கோர்வையின் ஒரு தலைப்பு ஆனகத்திலும் மற்றது உட்காதுலும் தொடுத்திருக்கின்றன. இது கன்னப்பொரி யெலும்பிலுள்ள குழியாகும். எலும்பும் முருந்தும் கலந்து சிலேஷ்மச்சவ்வால் மூடப்பட்டிருக்கும் சுவருள்ள குழலாகும். இதன் உட்புற துணி நிகரணாகி என்பது உட்புறத்தின் பின்புறம் தொண்டைக்குழியில் வந்து சேருமிடத்திற்கு சமீபத்தில் போய்ச் சேருகின்றது.

இந்த நிகரணாகி வழியாய்தான் வெளிப்புறத்தின் ருந்து காற்று உட்சென்றுவரும். எந்தக் காரணத்தாலாவது தொண்டை வீங்கி இந்தக்குழல் அடைப்பட்டுப்போனால் கேள்வி மத்தமாகிவிடும்.

மேற்சொல்லிய எலும்புகளுக்கு தனித்தனியாய் பெயர் இருக்கின்றன. அவற்றுள் ஒன்று சுத்தியல்போலிருக்கும். அதற்கு சுத்தியல் எலும்பு என்று பெயர்.

மற்றொன்று அடைசல்போல தட்டையாயிருக்கும். அதற்குப் பட்டையெலும்பு என்று சொல்லலாம். அங்கப்படியைப்போலிருக்கும் மற்றொன்றிற்கு அங்கப்படி


யெலும்பு என்று பெயர். ஆனகமசையுந்தோலும் சுத்தியல் எலும்பு அசையும். இவ்வசைவு பட்டை எலும்பைத் தாக்கி அதன்மூலமாய் அங்கப்படி எலும்பு அசையும். இந்த அசைவு உள்ளிருக்கும் சவ்வில்தாக்கும்.

சுரோத்திரேந்திரியம் கேள்வி நரம்புகள் உட்காதுல் பரவியிருக்கும் அங்கமாகும். உட்காது மிகவும் சிக்கு முக்குள்ள ருடையிருக்கின்றது; இதை கவனித்துப் பார்த்தால் ஒரு பள்ளமும், மூன்று வளைந்த குழல்களும், நத்தையோடுபோலொரு எலும்புமகப்படும். இது மிக்க சிக்கானதாயிருக்கிறபடியால் இதற்கு பிரமணமென்று பெயர். இப்பள்ளத்திற்கு முக்கோணவாரி (Vestibule) யென்றும், வளைந்த குழல்கள்மூன்றிற்கும் திரிதடம் (Semicircular canals) என்றும், (Cochlea) எலும்புக்கு நத்தையோடு கம்பென்றும் பெயர். இவை மூன்றும் அஸ்திப்பிரமணத்திலிருப்பவைகள். இவ்வஸ்திப்பிரமணத்தில், முக்கோணவாரியையும் திரிதடத்தையும்மூசரித்து குடங்கினுள் ஒரு சவ்வுப்பிரமணமுமிருக்கின்றது. சவ்வுப்பிரமணத்தில் ஒருவகை திரவம் தங்கியிருக்கின்றது. சவ்வு பிரமணத்திற்கு வெளியிலும் அஸ்திப்பிரமணத்தில் வேறு வகை திரவமிருக்கின்றது. ஒன்றிற்கு வெளிக்கர்ன இரசமென்றும், மற்றொன்றிற்கு உட்புறக்கர்ன இரசமென்றும் சொல்லலாம். நரம்புகள் பிரமணத்திலுமிடங்களில் சவ்வுப்பிரமணம் அஸ்திப்பிரமணத்துடன் ஒட்டியிருக்கின்றன. வெளிப்புறத்தினின்று சப்த அமுற்சிகள் காதை தாக்கும்பொழுது திரவத்தில் மிதந்துகொண்டிருக்கும் திரவமடங்கிய சவ்விலிருக்கும் நரம்புகளைத் தாக்குகின்றன.

ஏழாவது நரம்பின் இரண்டாம் கிளையாகிய சுரோத் திரநரம்பு மிக்க மிருதுவானதாயும் அதிக மெல்லிய இழைகளாலாகிய நரம்பு கூந்தல்களையுடையதாகவுமிருக்கின்றது. இது பிரமணத்தினுள்ளிருப்பிரிவாகச் செல்லுகின்றது. ஒன்று திரிகோணவாரி, திரிதடம் இவைகளுக்

கும், மற்றொன்று நத்தைபோட்டுக்கம்புக்கும் செல்லு கின்றன. சவ்வுப்பிரமணத்துள் நீரில் நரம்பு இழைகள் படர்ந்து மிதந்துகொண்டிருக்கின்றன.

37-ம் படம்.



37-ம் படம். காதின் சகல பகுதிகளின் பாவனை. 1. வெளிக்காதின் துவாரம். 2. ஆனகம். 3. கூட்டுவெடி. 4. அடைவெடி. 5. படியென்பு. 6. பிரமணத்தின் நடுப்பகுதியாகிய வெரி. 7, 8, 9, 10. திரிதடம். 11, 12. கம்பின் புரித்துவாரம். 13. கேள்வி நரம்பு. 14. மூக்குச் செல்லும் நிக ரணைகத்துவாரம். 15. கேளாடுழம்பின் குகை முறை. 16. அதின் வெளியி முறை.—கீரின்.

சப்தத் தொழில்.

சுரோத்திரேந்திரியத்தின் சப்த விதியனுசரித்த கட்டடங்கள் ஒசையைச் செலுத்தும்பொருட்டமைந்தவைகளாகும். சப்தமுண்டாக்கும் அதிர்ச்சிகளை சகல வஸ்துக்களும் செலுத்தும் குணமுள்ளவைகளாகையால் கேட்பதற்கு மாத்திரம் இவ்வளவு சிக்கலான கட்டடம் அவசியமானதல்ல. ஆனால் இச்சட்டங்களால் சப்தம் கேட்பதை மிக்க நன்றாய் பகுத்தறிந்து தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு அமைக்கப்பட்ட கட்டடங்களாகும்.

அத்தி.] வெளிக்காதின், நடுக்காதின் தொழில்கள்.

வெளிக்காதின் தொழில்.

வெளிக்காதின் தொழில் நான்கு வகைப்படும்:

1. சப்த அலைவுகள் ஆகாசத்தில் பரவிப்போகாத படி ஒன்று சேர்க்கவும், அவைகளை காதின் துவாரத்து வழியாய் ஆனகத்திலுள்ள காற்றை முட்டிப்படிக்குச் செய்யவுமுதலுக்கின்றது.

2. சப்த அலைவுகள் காது ஒட்டை மூலமாய் அதிக சமீபவழியில் ஆனகத்தைச்சேருகின்றன.

3. காதின் துவாரத்திலுள்ள காற்று எதிரொலி செய்ய உதவுகின்றது. காதின் வெளித்துவாரத்தை நோக்கிச் சிலம்பியிருக்கும் மயிர்கள், பூச்சி, புழுக்கள் புழுதி முதலியவைகள் காதின் துவாரத்துள் துழையாமல் பாதுகார்த்து, துவாரத்தையும் ஆனகத்தையும் இரட்சிக்கும். வெளிக்காதின் முருந்துகள் பல கொணல்நாடன் மேடு பள்ளங்களை யுண்டாக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. சப்த அலைவுகள் அவலம்பனமாய் பிவைகள்மேல் தாக்கினால் மிக்க வேகமாய் தாக்கும். முருந்துகள் ஒரே சமனாயிருந்தால் பல திசைகளினின்றும் வரும் சப்த அலைவுகள் அவலம்பனமாய் தாக்கக்கூடாமலிருக்கும். அனேக குறுக்கு மடுக்குகளுடன் முருந்துகள் பல விடங்களில் பலவிதமாய் நீண்டிருக்கிறபடியால், சப்த அலைவுகள் எத்திசையினின்று வந்தபொழுதிலும் இந்த முருந்து நீட்டங்களில் தங்கள் பேரிலாவது அவலம்பனமாய் தாக்கவேண்டியே யிருக்கும். இந்தக் காரணத்தால்தான் வெளிக்காதின் விசித்திரவடிவு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நடுக்காதின் தொழில்.

சப்த அதிர்ச்சிகள் கேள்வி நரம்புகளைப் போயடைய காற்றும் பிராணிகளின் வைரபாகங்களும், சுரோத்திரேந்திரியங்களுவிடின் வைர பாகங்களும் பிரமணங்களிலுள்ள திரவங்களும் வேண்டியிருக்கின்றது.

சப்த அதிர்ச்சிகள் காற்றினின்றும் வைரவஸ்துக்களில் செவ்வையாய்ச் செலுத்தப்படமாட்டாது. அவைகள் காற்றினின்றும் தண்ணீரில் செலுத்தப்பட்டாலும் அவைகளின் வேகம் குறைந்துபோய்விடும். ஆனால் காற்றிற்கும் ஜலத்திற்கும் மத்தியில் ஒரு சவ்வு இருக்குமாயின், காற்றினின்றும் நீரிற் சப்த அதிர்ச்சிகள் மிக்க வேகமாய் செல்லுகிறதென்று கண்டிப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால், பிரமணத்திற்கும் நடுக்காதுக்குமிடையில் திரிகோணவடிவான சவ்வு ஒன்றிருப்பதால் நடுக்காதிருக்கும் காற்றின்வழியாய் செலுத்தப்பெற்றுவரும் சப்த அதிர்ச்சிகள் பிரமணத்தின் நீர்தளில் மிக்க வேகமாய் செலுத்தப்பெறுகின்றன. சவ்வுக்குள்ளே இக்குணம் சவ்வின் மெல்லிய கனத்திற்கு மாதிரம் சேர்ந்ததல்ல; மற்றும் அதின் அணுக்கள் அசையும் சலுபத்திற்கும் உரித்தானதாயிருக்கின்றது.

இவ்விதம் காற்றினின்றும் நீருக்கு அதிர்ச்சியைச் செலுத்துவதற்கு உபயோகமாயிருக்கும் சவ்வுடன் வைரவஸ்து அணைந்திருந்தாலும் செலுத்தப்படுமதிர்ச்சியின் வேகம் குறைகிறதில்லை என்பதும் கண்டிப்பிடித்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் ஆனகச்சவ்வினின்றும் கோர்வையாய்ச் சேர்ந்திருக்கும் மூன்று எலும்புகளாலும் அதிர்ச்சி பிரமணத்தைத்தாக்க நன்றாயுதுவகின்றது. இம்மாதிரியே கதிர் கூற ஒவ்வொன்றும் சப்த அதிர்ச்சிகள் நன்றாய் நரம்புகளைத்தாக்க உதவும்படி யேற்பட்டிருக்கின்றன. ஆனகம் அதிர்ச்சித்தாக்கத்தால் அதிக விரிவடைந்துவிட்டால் அதிர்ச்சியை அப்புறம் செலுத்தும் சக்தி குறைந்துபோகின்றது. தொண்டைக்குழிக்கருகில் போய்ச் சேரும் பாங்காவைப்போன்ற குழல் இந்த சப்த அதிர்ச்சிகளை சமரசப்படுத்த உதவுகின்றது.

பிரமணத்தின் தொழில்.

சப்த தர்மங்களை நன்றாயுணர்ச் செய்யும்பொருட்டு சப்த அதிர்ச்சிகள் கடைசியாக திரவங்களில் சென்று

அத்திரவங்களின் சப்த அலைவுகளால் அவற்றுள் மிதக்கும். சப்தநரம்புகளுக்கு தாக்கச்செய்வது சகல பிராணிகளுக்கும் பொதுவான கட்டட அமைப்பாயிருக்கின்றது. உட்காதின் மற்றப் பிரிவுகளும் சப்த அதிர்ச்சிகளை நடுக்காதினின்றும் அதிவன் திரவங்களுக்குச் செலுத்த உதவுகின்றன.

சுரோத்திரநரம்பின் உணர்ச்சி, காற்று, சவ்வு, காயர் முதலிய நெகிழ்ந்துழங்குடிய வஸ்துக்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் கிரமத்துடன் அசையும் லய அதிர்ச்சிக்கு சுவரம் என்று பெயர். சுவரத்திற்கும் சப்தத்திற்கும் வித்தியாசமென்னவென்றால், சப்தமுண்டாக்கும் அசைவுகளின் அதிர்ச்சிகள் கிரமம் தப்பிவருகின்றன. சங்கீதத்தொலிகள் மூன்று குணங்களை அடையவைகள் : சுவரம், ஸ்தாயி, குணம் என்று சொல்லலாம். சுவரம், அதிர்ச்சிகளின் நீளத்தினால் அல்லது பெருமையால் உண்டாகும். ஸ்தாயி அதிர்ச்சிகளின் எண்ணிக்கையாலுண்டாம். குணம் என்பது சங்கீத வஸ்துக்களின் பேதத்தால் காணும் வேறுபாடு.

கண், உருவம், ஒளி.

கண்ணிரெப்பைகள் முருந்துகளால் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால் முடிவிற்கும் அசையக்கூடிய கண்முடிகளாகும். அவைகளின் கட்டிப்படாத ஓரங்களில் குறுக்குமுள்ள மயிர்கள் இருக்கின்றன. கண்ணுக்கு அபாயம் நேரிட்டாமல் இமைப்பதால் கண்மடல்கள் குகிக்கின்றன. இமையின் மயிர்களுக்கு தொக் உணர்ச்சி மிக்க கூர்மையானதாயிருக்கின்றது. இரெப்பை முருந்தினடிப்பக்கத்தில் மிகச்சிறிய கோளங்களில் திராட்சக்கொலைபோலிருக்கின்றன. இவைகளின் குழல்கள் இமையோரங்களில் மயிர்வரும் இடத்துக்கருகில் வெளிக்கு வருகின்றன.

கண் இமையின் உட்பக்கத்தில் மிக்க உணர்ச்சியுடைய சக்தியுள்ள சிலேஷ்மச்சவ்வு முடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இந்தச் சவ்வு இமைகளின் கட்டுப்படாத ஓரங்க

ளில் மேற்புறத்தோலுடன் ஒன்றுபட்டும், விழியின் மேல் புறத்திலும் சென்று மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு கண்ஜவ்வு (கஞ்சங்கடிவா) என்று பெயர். இது கண்ணின் வெள்ளைச்சவ்வுடனும் சற்று ஒட்டி னதுபோலவிருக்கின்றது. இச்சவ்விற் குமேலிருக்கும் பரிஸ்தாபிதம் கரு விழிமேலும் பரவியிருக்கின்றது. கண்ணின் உட்பக்க ஓரத்தில் கண்சவ்வு, கண்ணீர்க்கோளம், கண்ணீர்க்குழல் இவைகளினுடைய சிலேஷ்ம சொக்காபுடன் ஒன்றுபட்டுப் போய், அங்கிருந்தும் நாலித்துவாரத்திலுள்ள கீழ்ப் பள்ளத்தின் சிலேஷ்மச்சவ்வுடன் சேர்ந்துவிடுகின்றது.

கண்ணீர்க்கோளமானது கண்குழிக்குமேல் வெளிப்புறமாயமைந்திருக்கும். அதற்கு குழல்களுண்டு. அந்தக் குழைகள்வழியாக இக்கோளம் பொசியும் நீர் மேலிமையின் உட்புறத்தில் இறங்கி கண்சவ்வை யெப்பொழுதும் ஈரமாகவே யிருக்கச்செய்யும். இக்கோளம் ஒவ்வொரு இமையிலும் கண்மூக்கைத் தொடுமிடத்திற்குக்கும் மொக்குள்போன்ற சிறிய பிதுக்கங்களின் துவாரவழியாய் கண்ணீர்ப்பையிலிறங்கி பிறகு அதினின்றும் நாலித்துவாரக் கீழ்ப் பள்ளத்தில் போய் கீழும், அழற்சிதரும் ஏதுக்களாலும் சுத்தாக்க ஸ்திதிகளாலும் இக்கோளத்தினின்று அதிக நீர் பொசிந்து கண்ணீராக கீழ் இமையை நிரப்பி வழியச்செய்யும்.


விழி.

கண்குழிக்குள்ளிருக்கிற உருண்ட உறுப்புக்கு விழி யென்று பெயர். இதுவே திருஷ்டியின் கருவியாகும்.

கண்ணின் கட்டடம் பின்வருமாறு கூறலாம். வெள்ளைச்சவ்வு விழியின் ஆறில் ஐந்துபாகத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கின்றது. இதற்கு கடினை (Sclerotic) என்று பெயர். வழக்கத்தில் இதை வெள்ளைவிழி யென்பார்கள். முன்பக்கத்தில் இந்த வெண்மைநிறமான சவ்வையொட்டியே மற்ற ஆறில் ஒரு பாகத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சுறுப்புச் சவ்வொன்றிருக்கின்றது. இதன் பெயர் சிருங்கை

(Cornea) யென்று சொல்லலாம். வழக்கத்தில் சுக்லமண்டலமென்றும், ஆணிச்சவ்வு, கருவிழியென்றும் சொல்லுவார்கள். கடினைக்குள் அடுத்தாற்போலிருக்கும் புரை அல்லது கவசத்திற்கு தரிணிசம் என்று பெயர். தரிணிசத்திற்கடியில் ரூப உற்பத்திச்சவ்வு இருக்கின்றது. இதற்கு வருணியென்று சொல்லலாம். இச்சவ்வுக்கவசங்களுக்குள்ளே சுவச்சங்களுள்ளும் நீர்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. இவைகளும் லலாமல் இன்னும் கிருஷ்ணமண்டலமென்னும் பொத்தலகருடையவும், சுருங்கும் தன்மையுமுடைய எழுனியொன்று இருக்கின்றது.

38-ம் படம்.



38-ம் படம். கண் விழியின் வலப்பக்கம். 1. கடினை, 2. கிருங்கை, இது கடினையோடு தொடுத்திருக்கிறது. 3. தரிணி. 4. 6. வருணி. 7. தாரை. 8. தரிசியம். 10. கண்ணின் முன் அறை. 11. 11. கண்ணின் பின் அறை, இவ்வறை இரண்டிலும் கண்ணிய சுவச்சம் அடக்கியிருக்கிறது. 12. இயவம். 13. படிதம். 15. பார்வை நரம்பு. 16. கண் விழியின் மத்திய நாடி. கீள்.

வெள்ளைச்சவ்வும், தக்கிலமண்டலமும் சேருமிடத்திற்கு பின்பக்கத்தில் பரிதிகப்பெசியிருக்கின்றது. கிருஷ்ண மண்டலம் கண்ணுக்குவரும் ஒளியை உள்நுக்குப் பெறவேண்டிய திட்டங்கள் செய்யவும், பரிதிகம் பல தூரங்களிலுள்ள வஸ்துக்களைப் பார்ப்பதற்கு தக்கபடி கண்ணை ஒழுங்குப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

கடினையென்பது பலவாராகப்படிந்து ஒன்றுடனென்று ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் பலபடை சம்பந்தத்தகைகளாலமைக்கப்படும். அது கெட்டியாயும் உறுதியுள்ளதாயும் ஒளியூற்றக்கூடாததாயுமிருக்கின்றது.

சிருங்கையென்பது ஒளியூற்றக்கூடிய சவ்வாலானது. விழியின் மற்ற பாகங்களைவிடச் சிறியதாகிய விருத்தத்தின் பாகமாயும் கடினையுடன் சுற்றிலும் ஒட்டியிருக்கின்றது. இதன் (எபிதீலியத்தில்) பரிஸ்தாபிதத்தில் ஏழு எட்டுப்படை பைகனிருக்கின்றன. மேல்பக்கத்திலிருப்பவை செதிள்போன்றதாயும் அடியிலிருப்பவை ஸ்தம்பாகாரமானதாயுமிருக்கின்றன. சிருங்கைத்தகையிலும் அதைச்சேர்ந்த பரிஸ்தாபிதத்திலும் இரத்தக்குழல்கள் யாதொன்றும் கிடையாது. சிருங்கை அதிநுட்பமாகிய சம்பந்தத்தகைநார் கத்தைகளால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இக்கத்தைகளினிடையே சிருங்கைப்பைகளுமிருக்கின்றன.

தருணிசமென்பது அதற்கடியிலிருக்கும் வருணியைச்சேர்ந்ததென்றே சொல்லலாம். இது இரத்தநார்புகளாலேறப்பட்டுக் கறுத்து இருக்கும். பின்னாக கனத்த பசையொட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது. தருணி அதன் வர்ணவஸ்துக்களால் வருணிக்குள்செல்லும் ஒளிக்கிரணங்களை ஸ்வீகரித்துக்கொள்ளும். அப்படிச் செய்வதால் வருணியில் உற்பத்தியாகும் பிம்பரூப உணர்ச்சிகளை ஒளியிகுதியால் தோன்றும் போவதை தடுக்கின்றது. வெள்ளை குஷ்டரோகிகளுக்கும், இன்னம் சில பிராணிகளுக்கும் தருணியில் வருணவஸ்து இல்லாமலிருப்பதால், அவர்களும் அந்தப் பிராணிகளும் வெளிச்சத்தில் நன்றாய் பார்க்கக்கூடுகிறதில்லை. பசல் வெளிச்சம் அவர்கள் கண்களை கூசச்செய்கின்றது. அவர்கள் சந்தியாகாலங்களில் சொல்ப வெளிச்சத்தில்தான் பார்க்கக்கூடியவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

வருணி யென்பது மிக மெல்லிய சவ்வு. குவிந்தபாகம் முன் பக்கத்தை நோக்கியிருக்கும். அது பரிதிக ஓரத்தில் அத்துடன் இழைபோன்று முடிச்சாகி முடிகின்றது. இது, நரம்புச் சாலங்களனேகமாய்ச் சேர்ந்தமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கண்ணிற்கு ஏராளமாய் இரத்தக் குழல்கள் வருகின்றன. வெள்விழிக்கு வரும் இரத்தக் குழல்களல்லாமல் கடினை, தரிணிசம், தரிசியம் இவைகளுக்கு வரும் இரத்தக் குழல்களும், வருணிக்கு வரும் இரத்தக் குழல்களும் பிரத்தியேகமாயிருக்கின்றன.

இப்பொழுதெடுத்து விவரித்த வருணி முதலிய பல பாகங்களின் உதவியால் திருஷ்டி நரம்பினுடைய முடிவுக் கூந்தல்கள் ஒளிக்கிரணங்களின் அழற்சியைப் பெற்று மூளைக்குச் செலுத்தி காட்சி உணர்ச்சியை அவ்விடத்தில் உற்பத்திசெய்கின்றன.

வஸ்துக்களிலிருந்துவரும் வெளிச்சம் வருணியில் அவ்வஸ்துக்களின் பிம்பங்களையுண்டாக்க, வெளிப்புற வஸ்துக்களின் எந்த குறிப்பிட்ட பாகத்தினின்றாவது வெளிச்சம் வந்தாலும்கூட, பிரதிக்கிரணமாய் பட்டாலும்கூட, அது வருணியின் குறிப்பிட்ட பாகங்களை மாத்திரம் அழற்சியடையச் செய்யவேண்டியதாயிருக்கும். ஏனெனில், வெளிச்சம் பிரகாச வஸ்துவினின்றும் எல்லாத்திசைகளின்றும் ஓளம்பி வருவதால், அவ்வெளிச்சத்தை செலுத்த இருக்கும் உபகரணம் யாதொரு தடங்கலற்றதாயிருந்தால், வெளிச்சம் வீசும் முனையினின்று வரும் பிரகாசம் அதற்கெதிர்ப்படும் வருணிபோன்ற வஸ்துவின் வெளிப்பரப்பில் யாதாமொரு முனையை வெளிச்சம்பெறச் செய்யாமல் சகல பாகங்களையும் சோபையாக்கிவிடும். அப்படியாகவொட்டாமலிருக்கும்படி வருணிக்கு முன்னிருக்கும் சகலருப கரணங்களால் வஸ்துக்களினின்று வரும் வெளிச்சங்கள் பிரத்தியேகமாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அம்மாதிரி பிரிவடையாவிடில் வருணியானது

இருட்டினின்று ஒளியைமாத்திரம் பருத்தறியும் சக்தியுடையதாயிருக்கும். ஆகையால் மனிதனிலும் மற்றும் முள்ளெலும்புள்ள பிராணிகளிலும் வருணியின் சில உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டு, அவ்வுபகரணங்கள் வெளிப்புறத்து வஸ்துவின் ஒவ்வொரு முனையினின்றித்து வரும் கிரணங்களை யெல்லாம் ஓர் முனையில் ஒன்று சேர்க்குட்டி வருணியின் ஓர் முனையில் மாத்திரம் படுப்படி செர்கிறபடியாலும் அவ்வஸ்துவினின்றும் ஒவ்வொரு முனையினின்றும் வரும் கிரணங்கள் அம்மாதிரியே வருணியில் முனைமுனையாக முறையே படுகிறபடியாலும் வஸ்துவின் சரியான விம்பம் தோன்றுகின்றது. இவ்விதம் வக்கிரகரணத் தொழில் புரியும் உபகரணங்கள் சிருங்கை, வன்ம், படிசம், இயவம் ஆகிய இவைகளேயாம்.

வஸ்துக்களுள் வெளிச்சம் செல்லும் ஒழுங்குப்பிரமாணங்கள் சில உள. அவையாவன :

1. ஒளியானது ஒரே வஸ்துவுக்கடாகப் பாயும்பொழுது லம்பமாக (சரிசேர் வழியாக)ச் செல்லும்.

2. ஒரு வஸ்துவிற்குந்து, திண்மையளவில் அதை விட விகர்ப்பமடைந்த மற்றொரு வஸ்துவினுடே ஒளிசெல்லும்பொழுது அவ்வஸ்துவின் லம்பதிக்கு அல்லாமல் வேறுதிசை நோக்கி கிரணங்கள் பாய்ந்தாலும் அவை போக்கில் மடங்கி அவ்வஸ்துவின் லம்பத்தை நோக்கி வளைந்து போகும் குணமுண்டு. இப்படி ஒளி வளைந்து செல்வதற்குக் கதிர் மடங்கல் அல்லது வக்கிரகரணம் என்று பெயர்.

3. எவ்வஸ்துவினுடே ஒளிக்கிரணங்கள் செல்லுகின்றனவோ அவ்வஸ்து குவிந்து புரக்கவிவுடையதாயிருந்தால், இப்படி புரக்கவிவுடைய மேல்பாப்பில்படும் கிரணங்கள் எல்லாம் அக்குவிவின் மத்திய முனையேநோக்கி வளைந்துசெல்லும், மத்தியமுனைக்கு பக்கத்தில்விழும் கிரணங்களைவிட தூரத்தில்விழும் கிரணங்கள் அதிகமாய் வளையும்.

மேற்சொன்ன 2, 3, ஒழுங்குப்பிரமாணங்களின்படி ஒளியூற்ற சிருங்கை உதவுகின்றது.

வன்ம் என்னும் மேல்விய நீர்போன்ற திரவம் சிருங்கைக்குப் பின்னிக்குமிடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் தொழில் உபயோகம் முதலியவைகள் நன்றாய் அறியப்படவில்லை.

வன்ம் நிறைந்திருக்கும் இடத்தில் அதை யிருபாக மாய் பிரித்துக்கொண்டிருக்கும் எழுனிச் சவ்வுக்குத் தான் தரிசியம் என்று பெயர்.

வனத்திற்கும் தரிசியத்திற்கும் பின்னாக இயவத்தின் முன்பாகத்தில் படிசம் இருக்கின்றது. இது முக்கியமாய் நார்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை காடியில் போட்டு உறையச்செய்தால் முன்றுபுரைகளாக வெடிக்கச்செய்யலாம். படிசம் வெளிப்புறத்தினின்றும் உட்புறமாய் போகப்போக திண்மையதிகரித்து அதன் வக்கிரகரண சக்தி அதிகரிக்கத்தக்கதாயிருக்கும். படிசத்தின் திண்மை வயது உயருந்தோறும் திகரிக்கும்.

இயவம் என்பது விழிக்கோளத்தின் ஐந்தில் நாலு பாகம் அளவுக்கு இருக்கும்படி குளாகும். வருணிக்கும் படிசத்திற்கும் இடையிலுள்ள இடத்தில் நிறைந்துநிற்கும். இச்சுவச்சம் தண்ணீர்நீராக பளிங்குக்கு சமானமாய் உருவெளியுள்ளதாவும் சந்தை தடித்து வைசங்கொண்டதாகவும் இருக்கிறது. இதன் தொழிலும் நன்றாயறியப்படவில்லை.

தரிசியம் வனச்சுவச்சமிருக்குமிடத்தில் குறுக்கே யிருக்கும் எழுனியாகும். இதன்மத்தியில் ஓர் தீவாரமிருக்கின்றது. அதற்கு பாப்பாயென்று பெயர். தரிசியம்பேசி நார்களாலமைக்கப்பட்டது. இப்பேசிநார்கள் வெளிப்புறத்தினின்றும் மத்தியத்தை நாவருகின்றன. பாப்பாவின் அருகில் வருமிடத்தில் நார்கள் ஒன்றுகூடி மோதிரம் போலிருக்கின்றது. விட்டார்த்தமாய் போகும் நார்கள் சுருங்கினால் பாப்பா விசாலமடையும். மோதிரபாக

நார்கள் சுருங்கினால் பாப்பா குறையும். வருணிக்கு வரும் ஒளியினளவை தரிசியம் நிர்தாரணை செய்யும் தொழிலுடையதாகும். ஒளி அளவு பாப்பாவின் பரிமாணத்தைப் பொருந்தியதாயிருக்கின்றது.

“கண்ணை வெட்டி அதின் முற்பகுதியினுட்பக்கத்திலே ஆராய்ந்துபார்க்கும்பொழுது அதற்கயலான மற்றப் பகுதிகளிலும் கருமை குறைந்தவைகளாய் ஏறக்குறைய அறுபதுவரிகள் வருணியின் சுற்று வினம்பிளிருந்து பார்த்து போகிறவைகளாய்க் காணலாம். இவைகள் ஒன்றோடொன்று அடுத்திருப்பதினால் வட்டத்துக்குப் பரிதி கம் என்று பெயர். பரிதிகத்தின் தொழில் என்னவென்றால், பல தூரங்களிலுள்ள வஸ்துக்களைக் காணும் வண்ணம் விழியை ஒழுங்குபடுத்துவதேயாகும்.

விழியிலிருக்கும் வஸ்துக்களை சிருங்கியும் கடினையும் அணைத்து வெளிச்செல்லாமல் காக்கின்றன. தவிர இவைகளில் கண் பேசிகளின் ஒரு தலைப்பு தொடுக்கப் பட்டுமிருக்கின்றன.”

காட்சியின் தோற்றம்.

காட்சித்தோற்றம் உண்டாக நம்புவிபுகளமிருக்கின்றது. அதுதான் வருணியாகும். ஒளியழற்சிகள் அதை வந்தடைய அதன்மூலமாய் மூளைக்குச் செலுத்தப்பட்டு ஒளி உணர்வுகள் உண்டாகின்றன. வருணியில் வெளிப்புற வஸ்துக்களின் சரியான பிம்பங்கள் அதில் உண்டாகும் படியாக ஊடுறும் கிரணங்களை ஒழுங்குப்படுத்த வக்கிரீகரண உபகரணங்களுமிருக்கின்றன. சுருங்கும் குணமுடைய எழுணியும் அதின் மத்தியில் துவாரமுமிருக்கின்றன. இவைகளால் கண்ணுள் செல்லும் ஒளியினளவு நிர்தாரணை செய்யப்படுகின்றது. சுருங்கும் தன்மையுடைய பேசிகளிருப்பதால் பல தூரங்களிலுள்ள வஸ்துக்களைப் பார்க்க உதவும்படி கண் விழியசையும். கண் குழிக்குள்ளே சுற்றிலும் நிணம் நிரம்பியிருக்கின்றது. அது கண்ணுக்கு நல்ல தழுவணையாயிருக்கிறபடியால் கண் அங்கே

யாதொரு சேதமும்டையாமல் தாராளமாய் எப்பக்கத்துக்கும் சுழலும். கடைக் கண் பக்கமாக விருக்கும் கண் பேசிகள் குறிபதாகவிருந்தால் கண்ணும் அந்தப் பக்கத்திலே இழுக்கப்பட்டிருக்கும். கண்ணுக்கு அகமாகவிருக்கும் பேசிகள் சுருங்கியிருந்தால் கண்ணும் உள்ளே இழுபட்டு முக்கை நோக்கி நிற்கும். இப்படிக் கண் நிற்கும் நிலைகளை வாக்குக் கண்ணென்பார்கள்.

வயது சென்ற ஆட்களில் சிருங்கையும் இயவமும் தட்டையாவதினால் பொருள்களின் உருவம் தரிசியத்திலே சரியாய் விழாமற்போகிறபடியால் வெள்ளெழுத்துண்டாகிறது. பிறப்புவாசியாக சிருங்கியும் இயவமும் மட்டுக்குமிஞ்சி குவிவாயிருந்தால் பொருள்களிலிருந்து பாயும் ஒளிக்கதிர்களினால் உண்டாகின்ற அப்பொருள்களினுருவம் தரிசியத்திற்படாமற் போகும். இவ்விதக் குறைவால் குறுகிய பார்வையுண்டாகிறது.

22-ம் அத்தியாயம்.

ஜனனம், வளர்ச்சி முதிர்தல்.

இதுவரையில் தேகத்தின் புல கருவிகளையும் அவைகளின் தொழில்களையும்பற்றிச் சொன்னோம். ஆனால் அவைகள் அவனவனுடைய தேகத்தைப் பேணுவதற்குரிய கருவிகளாம். இனத்தை விருத்திசெய்யும் கருவிகளைப்பற்றி இப்பொழுதெடுத்துரைப்போம். ஆண்மேன் சம்பந்தமான உபகரணங்களை ஜனனேந்திரியங்கள் என்று சொல்லுவார்கள்.

ஸ்திரீ ஜனனேந்திரியங்கள்.

பெண்களின் ஜனனேந்திரியங்களில் சினைப்பைகள் என்று சொல்லும் நாதாஸ்யங்கள் இரண்டு நாதியத்தை யுண்டாக்க உதவுகின்றது. சினைப்பாதையொன்று ஒவ்வொரு சினைப்பையுடன் தொடர்ந்திருக்கின்றது. இதின்வழியாய் நாதியம் நாதாஸ்யத்தினின்று காப்பாச்யத்திற்குப்போகும். நாதியம் ஜனனமுண்டாகும்பட்சத்தில்

இந்த கருப்பையில் படிந்து பிண்டமாக வளர்ந்து தாயினி ன்றும் பிரிந்து பிரத்தியேகமாய் வளரும் சக்திவருமளவு மிருக்கும். தவிர புருஷ ஜனனேந்திரியக்கருவியைப் பெற்றுக்கொள்ள ஒரு குழலும் அதைச்சேர்ந்த உபாங்கக் கருமிருக்கின்றன. இக்குழலுக்கு யோனியென்று பெயர்.

கிளைப்பைகள் பெண்களின் இடைக்குழியில் பக்கத் துக்கொன்றாய் இலுப்பைக் கொட்டையைப்போல உரு ண்டி கொஞ்சம் அமுங்கியதுபோலும் காணப்படும். ஒரு முனை கருப்பையோடும் மற்றொரு முனை நாதக்குழலோ டும் நார்த்தகர்களால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. கருக் கூட்டை திண்மையான நார்-சாலம் இவைகளாலாகிய தசைகள் சுற்றி கவசம்போல போர்த்துக்கொண்டிருக்கி ன்றன. இதை அறுத்துப் பார்வையிட்டால் சிறிய அணுக் கள் காணப்படும். அவைகளுக்கு நாதமுட்டைகள் என்று பெயர். நாதக்குமிழ்கள் என்றும் சொல்லலாம். கருக் கூட்டுவ்வொன்றும் 1, 1½ அங்குல நீளமாகவும், ½ அங் குல அகலமுள்ளதாகவும், சுமார் ½ அங்குல கனமுள்ள தாகவுமிருக்கின்றது.

நாதக்குழல் பக்கத்துக்கொன்றாக தாரையைப்போல நீண்டு கிளைப்பைகளுக்கு கருப்பையின் மேல்முனைக்கு மிடையிலிருக்கின்றது; புது 4, 5 அங்குல நீளமுள்ளதா கவருக்கின்றது. கருப்பாசயத்துடன் சேருமிடத்தில் நா தவாகி அகலமற்றொடுக்கமாயிருக்கும். கருக்கூட்டை நோக்கிச்செல்லுவதில் போகப்போக கொஞ்சம் விரிந்து காணும். மற்ற முனை குஞ்சம்போல விரிந்து அந்தாமாயி ருக்கும். குஞ்சத்தின் ஒரு பிரிவுமாதிரி கருக்கூட்டை ஒட்டியிருக்கும்; மற்ற பிரிவுகள் கட்டுப்படாமல் மிதந்து கிடக்கின்றன. நாதவாகியின் குழாய் மிக்கச் சிறியதாயி ருக்கிறதாமல்லாமல், கருப்பையைத் தொடருமிடத்தில் அதிக துண்ணியதாய் முட்புகக்கூட யிடமற்றதாய்க் கா ணும். குழாயின் மற்ற முனை வயிற்றுக்குழியை முட்டியி ருக்கின்றது.

நாதவாகி மேற்பக்கம் அந்தர்வேஷணத்தால் மூடியிருக்கின்றது. உட்பக்கத்தில் குழலில் சிலேஷ்மச்சவ்வும் பரிதிகப் பரிஸ்தாபிதமும் இருக்கின்றன. அந்தர்வேஷ ணத்திற்கும் சிலேஷ்மச்சவ்வுக்குமிடையில் அதன் பித்தி கள் கருப்பைபோலவே நார்த் தசைகளாலமைக்கப்பெற் றிருக்கின்றன.

கர்ப்பாசயம் தட்டையாய் மேற்புறம் அகன்று விரிந் தும் கீழ்ப்புறம் உருண்டு சிறுத்தும் காணப்படும். கர்ப்பம் தரிக்காத சமயங்களில் சுமார் மூன்றங்குல நீளமுள்ளதா யும், அகலத்தில், கர்ப்பாசய அடியென்று சொல்லும் மேற்பக்கத்தில் இரண்டங்குலமுள்ளதாயும், கழுத்தென்று சொல்லும் கீழ்ப்பக்கத்தில் சிறுத்து அறையங்குலமுள்ள தாயுமிருக்கின்றது. அடிக்கும் கழுத்துக்கும் இடையிலிரு க்கும் பாகத்திற்கு உடலென்றும் சொல்லுகிறார்கள். இவ் வுடல் சுமார் ஒரு அங்குல கனமுள்ளதாயிருக்கின்றது.

கர்ப்பாசய கீழ்க்கனத்தில் மூன்றுவித முக்கிய பித் திகளைக் காணலாம். இப்புரைகள் முறையே நிணரீர்ச்சவ் வும், நார்ப்பைச்சவ்வும், பேசிச்சவ்வும், சிலேஷ்மச்சவ் வுமாகவருக்கின்றன.

கருக்குழியின் வடிவு கருப்பையை ஒத்திருக்கும். கர்ப்பம் தரியாத காலங்களில் மிகச் சிறியதாயிருக்கும். அதன் ஒவ்வொரு பக்கத்திலிருக்கும் சிலேஷ்மச்சவ்வுகள் ஒட்டியதுபோல காணப்படும். குழியில் சவ்வுகருக்கி டையில் சிலேஷ்மத்தான் கொஞ்சமளவு இருக்குமென்று தோன்றுகிறது. அதன் மேல்பாகத்தில் இருபுறத்திலும் நாதவாகியின் குழாய் வந்து சேருகின்றது. அடிப்பக்கத் தில் யோனியுடன்சேரும் துவாரமிருக்கின்றது. இந்த வர யில் மின்பக்கத்திலும் பின்பக்கத்திலும் உதடுகளும் இருக் கின்றன.

யோனி சவ்வால் ஏற்பட்டது. 5, 6 அங்குல நீளமு ள்ளது. குறுக்காக கீழுக்கும் முன்னுக்கும் போயிருக் கின்றது.

கருப்பையின் கழுத்திலிருந்து புறஸ்தான ஜனனேந்திரியங்களிருக்குமிடத்திற்கு வருகின்றது. இதின் உட்புற சிலேஷ்மச்சவ்வு சாதாரணமாய் சுருங்கிய காலத்தில் மடிப்பு மடிப்பாயிருக்கும். சிலேஷ்மச்சவ்வுக்கு வெளிப்புறத்தில் யோனியின் பித்துகள் நார்ப்பைத்தசையாலமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. இத்தசைகளுள்ளும் குழாயின் கீழ்ப்பாகங்களில் முக்கியமாய் ஒருபடை எழும்பக்கூடிய தசையுமிருக்கின்றது. யோனியின் கீழ்ப்பாகவாயிலில் யோனிபந்தனம் என்னும் வட்டவடிவுப் பேசியிருக்கின்றது. யோனிவாசலின் வெளிப்புறத்தில் கன்னியழியாதவர்களுக்கு சந்திரப்பிரைபோலொத்த சவ்வு மூடிக்கொண்டிருக்கும். அதற்கு சவ்வினம் (Hymen) என்று சொல்லலாம்.

அல்குல் ஸ்தானத்திலிருக்கும் உறுப்புகளாவன:—கடிதடம், நிதம்பங்கள், புழுக்கை, சந்திரநாடி, யோனிலிங்கம், நீர்த்துவாரம், யோனிவாசல் ஆகிய இவைகளுக்கு அல்குல் என்று பெயர். கடிதடம்:—அடிவயிற்றின் கீழ், மேடாய், மிருதுவாயிருக்கிற ஸ்தானத்துக்கு கடிதடம் என்று பெயர். அது, அவிவிடத்திலிருக்கும் எலும்பின் மேல் படிந்து கொழப்படைந்து ரோமங்கள் முளைந்திருக்கும் நிதம்பங்கள். அல்குலில் சர்மமானது மடிந்து நீண்டு பக்கத்துக்கொன்றுமிருக்கிற உறுப்புகளுக்கு உதடுகள் என்று சொல்லி வழக்கம். இவைகளில் கொழுப்படைந்து ரோமங்கள் முளைத்திருக்கும் உதடுகளின் மத்தியமாயிருக்கிற பிளப்புக்கு புழுக்கை அல்லது அல்குல் பிளவையென்று பெயர். நிதம்பங்களானவை கீழுக்கிற ஒன்றோடொன்று கூடியிருக்கிற ஸ்தானத்திற்கு உபஸ்தக்கவையென்று பெயர் வழங்கலாம். அது பிரசவ காலங்களில் சிசுவின் சிரசு வெளிப்படும்பொழுது கிழிந்துவிடும். ஆணைத்துக்கும், உபஸ்தக்கவைக்கும் மத்தியிலுள்ள பாகத்திற்கு பகம் என்று பெயர்.

சந்திரநாடி.—உதடுகளுக்கு அகத்தில் சவ்வு மடிந்து நீண்டிருக்கும்; அதற்கு சந்திரநாடியென்று பெயர்.

யோனிலிங்கம்.—கடிதடத்துக்கடியில் கூர்மையாயிருக்கிற உறுப்புக்கு யோனிலிங்கமென்று பெயர். அதை ஆண்குறிக்கு ஒப்பிட்டுச்சொல்லலாம். அதை அங்குலியாற்றடவினால் ஸ்திரீகளுக்கு கரதவின்பம் உண்டாகும்.

யோனிவாசல்.—யோனிலிங்கத்துக்கு ஒரு அங்குலம் பின்னிட்டு அண்டாகாரமாயிருக்கிற துவாரத்துக்கு யோனிவாசல் என்று பெயர்.

யோனிவாசலுக்கு மேலும் விங்கத்துக்குக் கீழுமாக விருக்கிற பள்ளத்தில் மூத்திரதாரையின் துவாரம் காணப்படுகிறது.

கர்ப்பம்ந்தரியாத நாதம்.

மனித நாதத்தின் வியூகனத்தையும் தொழிலையும் இளமைப்பருவமுதல் விருத்தாப்பிய காலத்துக்குள் எப்பொழுதாவது பரிசுஷ்செய்துபார்த்தால் பல வடிவுகளுள்ள சவ்வுப்பைகளில்லமைந்ததாகக் காணும். இவைகளுக்கு திரவங்கள் என்று சொல்லலாம்; நாதகுதுவங்களுள்ளும் சொல்லலாம். இக்குதுவங்களில் வெண்கருசுத்துள்ள திரவம் நிறைந்திருக்கும். அதில் நாதமுமிருக்கின்றது. நாதம் குதுவத்தின்மத்தியில் சாதாரணமாய்க் காணும். கெர்ப்பகாலத்தில் நாதாஸை மேற்பரப்பில் முளைத்தாப்போலக்காணும். இதைச்சகிலிலும் தான்யரூபம் போல சவ்வும் இருக்கின்றது. மாஸிடநாதம் 120-ல் 1 பங்கு அங்குல அளவு உள்ளது.

இளமைப்பருவமுதல் குழங்கை பெருங்காலமுடிவு வரையில் நாதங்கள் இடைவிடாமல் உற்பத்தியாகி, முதிர்ந்து அழிந்துகொண்டிருக்கிறதாகவே காணுகின்றது. ஸ்திரீ பிரவுடதசையடையுங்காலம்வரையில் நாத உற்பத்தி அவ்வளவு சிக்கிரத்தில் ஏராளமாயுண்டாகிறதில்லை. பிரவுடையடையும் காலத்தில் உடம்பில் உண்டாகும் பல மாறுபாடல்களுடன் நாதமும் பெருத்து உற்பத்தியிலும் அனேகமாய் ஜனித்துக்கொண்டே வருகின்றன.

குதுவங்கள்பெருத்து உள்ளிருக்கும் நாதம் கருக்கூட்டுக்கு வெளிவரும்பொழுது, நாதம் தனது குதுவமுடைவதால் நீரினின்றும் விடுபட்டு நாதாஸயத்தின் மேல்பக்கத்தில் விழுகின்றன. அவ்விடத்திலிருந்து நாதவாகியில் புகுகின்றன. மாதவிடாயுடைய மரீனிடர் முதலிய பிராணிகளில் கர்ப்பசக்தியும் தப்பாமல் முறைப்படி சில நாள்நுக்கொருதரம் வருகிறதென்று தோன்றுகின்றது.

அண்டஜங்களில் ஜனனேந்திரிய சம்பந்தங்களில்லாமலே நாதாஸயங்களிலிருந்து நாதம் வெளிப்படுகிறதென்பது தெரிந்தவிஷயமே. முலைபுண்ணும் பிராணிகளிலும் அதுபோலவே நாதம் ஜனித்து முதிர்வடைந்து நாதாஸயத்தைவிட்டு வருகிறதென்பதும் தெரிந்தவிஷயமே. இப்படிவரும் நாதங்கள் நாதவாரிக்கு வருகிற விஷயம் நாய் முதலிய கீழ்ஜாதிப் பிராணிகளில் “கரம்” ஆயிருக்கிறதென்று சொல்லுகிற உஷணகாலங்களாலும், மேல்ஜாதிப் பிராணிகளில் மாதவிடாய்போன்ற காலங்களாலும் அறியலாம். ஆண் பெண் சங்கம் ஆனால் நாதம் விந்துவுடன் கலந்து கர்ப்பம் தரிக்கக்கூடும். சங்கமற்றிருந்தால் நாதம் நசித்துப்போகின்றது.

மானிட ஸ்திரீகளிலும் இம்மாதிரியே இருக்கின்றது. ஸ்திரீ புருஷ சங்கமில்லாமலே நாதம் உண்டாகி நாதாஸயத்தினின்றும் நாதவாகிக்கு வருகின்றது. இப்படியாகும்சூலம் மாதவிடாய் காலங்களை யனுசரித்துவருகின்றது. ஆயினும், நாதோற்பத்திக்கும் மாதவிடாய்க்குமுள்ள சம்பந்தாசம்பந்தங்கள் நன்றாய் கண்டறியப்படவில்லை.

மாதவிடாய் என்பது மெல்லிய இரத்தம்போன்ற பிரவம். அதற்கு ஒருவித நாற்றமுமிருக்கின்றது. அது கொஞ்சம் மங்கிக்காணும். கருப்பை, யோனி இவைகளில் சிலேஷ்மமும், பரிஸ்தாபிதமும், இரத்தமும் கலந்திருக்கிறதுமல்லாமல் நிணநீரும் சில சவ்வினழிவு பதார்த்தங்களும் கலந்து காணுகின்றது.

கருப்பையிலுள்ள சிலேஷ்மம் முதிர்ந்து உண்டாகும் சவ்வாகையால் மாதவிடாய் காலத்தோறும் இது அழிந்து வெளிவருகிறதென்று தெரிகிறது. கர்ப்பம்தரித்தால் அது பிண்டத்தைச் சுற்றிக்கொள்ளுகிறது. கர்ப்பம்தரியாவிட்டால் சீக்கிரத்தில் அழுகி மாதவிடாயில் வெளியாகிவிடுகின்றது.

பெண்களில் இருதுருத்தகம் ஆரம்பம் செய்வதினால் அவர்களுக்கு பிரவுடைகாலம் வந்ததென்றறிந்துகொள்ளும் சின்னமாயிருக்கின்றது. ஆனால் மாதவிடாயில்லாமலே பிரவுடையாகி சமயோகத்திற்கு அருகையாய் கர்ப்பமும் தரிக்கக்கூடும். மாதவிடாய் முதலில் காண்பது தேசங்களைப்போதும் ஒவ்வொருவருடைய தன்மையைப் பொருந்தியுமிருக்கும். நமது நாட்டில் 13, 14, 15 வயதுகளாகும்பொழுது காணும். சிலருக்கு இதைவிட சீக்கிரமும் காணும். இங்கிலாந்து முதலிய சீதளதேசங்களில், உஷணதேசங்களில் இருக்கிறவர்களைப்பார்க்கிலும் சற்றுநிதானித்து 15, 16 வருஷங்களில் காணும். நமது நாட்டாசாரமாகிய இளமைப்பருவ காலக்கவியாணங்களாலும் பெண்கள் அதிபாலியத்தில் மாதவிடாயுடைய தன்மை பெருகிறார்கள் என்றும் தோன்றுகின்றது. ஸ்திரீ பிரஜோத்பத்திக்கு அருகியாயிருக்கும்வரையிலும் மாதவிடாய் இருந்துகொண்டேயிருக்கிறது. அதற்கப்புறம் 45, 50-வது வருஷங்களில் அது நின்றுபோகின்றது.

இருதுருத்தக காலங்கள் சுமார் ஒருமாதத்திற்கொருதரம்வரும். ஆகையால் அதற்கு மாதவிடாய் என்று பெயர். ஆனால் சிலருக்கு சில சமயங்களில் மூன்றுவாரத்திற்கொருதரமும், சில சமயங்களில் இன்னும் சீக்கிரத்திலும் காணுகின்றது. மாதவிடாய் கண்டபிறகு மூன்று நாள்முதல் ஆறுநாள்வரையிலும் இருக்கும்.

இப்படி முறைகொண்டுவரும் சூதகம் வரும்காலங்களில் இடுப்பில் வேதனை கண்டு, கால்கள் ஓய்ந்து, மற்றும் பலபேர்களுக்கு புலவிதச்சின்னங்களும் காணும். சாதார

ணமாய் கர்ப்பம் தரித்த ஸ்திரீகளுக்கு இருதுஞ்சுகம் காணுகிறதில்லை. குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் காலங்களிலும் காணமாட்டாது. ஆயினும் கர்ப்ப காலத்திலும், பால் ஊட்டும் காலத்திலும் மாதவிடாயாவது அருமையானதல்ல.

நாதம் கெர்ப்பமடைதல்.

புருஷ ஜனனேந்திரியம்.

நாதத்திற்கு கர்ப்பமுண்டாகச் செய்யும் திரவம் முக்கியமாய் புருஷனின் பீஜத்திலிருந்து பொசியும் விந்துவாகும்.

பீஜம் பக்கத்துக்கொன்றாக இரண்டு பீஜங்களுண்டு. பீஜக்கொடி அதனைத் தொங்கவைத்துக்கொண்டிருக்கும். பீஜத்தை மூடிக்கொண்டிருக்கும் சர்மத்திற்கு அண்டகோசம் என்று பெயர். இடது பக்கத்துப் பையானது எப்போதும் கொஞ்சம் நீண்டிருக்கும். பைக்கு மத்தியில் ஒரு தடித்த சவ்வு பையை இரண்டு பாகங்களாய்ப் பிரித்துவிடுகின்றது. அண்டகோசம் எப்பொழுதும் சுருங்கி தளர்ந்தாப்போலிருக்கும். நாடிகள், நாளங்கள், நரம்புகள் இவைகளுடன் விந்துவாகியும் கலந்து சேர்ந்து கட்டப்பட்டிருக்கிற கொடிக்கு பீஜக்கொடியென்று பெயர். இக்கொடி பீஜத்திலிருந்து மேலுக்கேறி பீஜக்கொடித்து வாரவழியாகச் சென்று வயிற்றுக்குள்ளிறங்கிவிடும். இதை சவ்வு சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். இடது பக்கக்கொடி கொஞ்சம் நீண்டிருக்கும்.

பீஜமானது சிறுத்து, உருண்டு, சுமார் 1½ அங்குல நீளமுள்ளதாய், பக்கங்கள் உள்ளடங்கியிருக்கும். மேலாக உருண்டையாய் ஒன்று காணப்படும். அதற்கு விருஷணத்துவயம் என்று சொல்லலாம். பீஜத்தை ஒரு வெண்மைச் சவ்வு மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு வெளிப்புறத்தில் நித்தாசில்லி கவசமுமிருக்கின்றது. அதற்கு பீஜச்சவ்வு என்று பெயர். அது முகமற்ற ஓர் பை; அதற்குள் ஜலம் சேர்ந்தால் நீரண்டம் எனப்பேர்பெரும். மெ

அத்தி.]

நாதம் கெர்ப்பமடைதல்.

367

த்திசிறிதான விந்துக் குழல்கள் சேர்ந்து பீஜம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இவ்விந்துக் குழல்கள் ஒன்றுடனொன்று சேர்ந்து பின்னிக்கொண்டு கடைசியில் ஒரே குழலாக ஏற்படும். இப்படி ஒன்றாகச்சேர்ந்த குழலுக்கு விந்துவாகியென்று பெயர்.

விந்துவாகி பீஜக்கொடியின் பின்புறமாக மேலுக்குச் சென்று, அங்கிருந்து பீஜக்கொடித்துவாரம்வழியாய் வயிற்றுக்குட் சென்று, மூத்திரப்பைக்குப் பின்புறமாக அதின் அடிக்கிறங்கி, அந்தஸ்தானத்தில் இருக்கும் இந்திரிய கமலக்குழலோடு சேர்ந்து நீர்த்தாரையில் முடியும். அதற்கு ஸ்கலிதக்குழல் என்று பெயர். விந்து பீஜத்தில் ஜனித்து விந்துவாகி வழியாய் வயிற்றுக்குட் சென்று மூத்திரப்பைச்சுழியில் இறங்கி இந்திரிய கமலங்களில் தங்கியிருக்கும். ஸம்போககாலங்களில் அது வெளிப்பட்டு நீர்த்தாரைவழியாக யிறங்கி யோனியில் ஸ்கலிதமாகிவிடுகின்றது.

விந்துவை பூதக்கண்ணாடியால் பார்த்தால் புழுக்கள் அகப்படும். அவைகளுக்கு விந்துக்கிருமிகள் என்று பெயர். அது பெருத்த சிரஸோடும் நீண்ட வாலோடுமிருக்கும். விந்துக்கிருமிகள் நாதத்தோடு சேர்ந்து கருப்பற்றுப்படி செய்யும்.

சகலவிதப் பிராணிகளின் கர்ப்பத்தைபுண்டாக்கும் திரவங்களிலும் விந்துக்கிருமிகளிருப்பதினால் கருப்பற்ற அவைகளவசியமானவையென்றும், அவைகள் நாதங்களுடன் சேரவேண்டுமென்பதும் நன்றாய்த் தெரிந்தவிஷயமே. ஆனால் அவைகள் எப்படிச் சேருகிறதென்பது நமக்குத் தெரியவில்லை.

முற்றிற்று.

அட்டவணை.

அ

	பக்கம்
அங்கப்படி யெலும்பு	346
அஸ்திக்கவிப்பு	34
அஸ்திக்கூடு	35
அஸ்தி பஞ்சரம்	35
அட்சர ரேகை	37
அண்டசிதம்	15
அண்டயம்	16
அண்ணவென்பு	41
அதங்காயவென்புகள்	47
அப்தூவா	155
அமிலகரம்	10
அமிலதம்	10
அயம்	10
அர்த்தசந்திர கபாடங்கள்	80
அல்குல்	362
அல்புமினியிடஸ்	15
அள்ளெலும்பு	39
அன்னரசத்தின் குணங்கள்	229
அன்னவாகி	174
அன்னவாகிக் குழல் வழியாய் ஆகாரம் போகுதல்	166
அன்னவாகி—பிராணிகளின் விசேஷ தத்துவம்	4
அனுபந்த காற்று	138
அநிந்திரிய உபாதான பூதங்கள்	11-19
அநிந்திரிய வஸ்துவின் வளர்ச்சி	2

ஆ

ஆக்ஸிபிடல் போன்	40
ஆணிச்சல்வு	353
ஆகிமூல்ப்பொருள்	21
ஆப்பென்பு	46
ஆரிகுலர் அபெண்டிக்ஸ்	83
ஆரையென்பு	45
ஆனகம்	346

கு	பக்கம்
இடுப்பு முன்னெலும்பு	43
இந்திரிய உபநாண பூதங்கள்	11
இந்திரிய வஸ்துவின் வளர்ச்சி	2
இடவம்	357
இரசம்	340
இரசவாஹினிகளின் கோஷணம்	232
இரசாயினி-இவற்றின் கோளங்கள்	225
இரத்த அழுக்கமும் அளவும்	105
இரத்தக்கட்டி	58
இரத்தக்குழாய் கோஷணம்	233
இரத்தக் குறுகடத்துள்ளல்	112
இரத்தச்சூலம்	23
இரத்தச்சுழற்சி	71
இரத்தஞ் சுழலுவதில் சம்பந்தப்பட்ட கர்த்தாக்கள்	116
இரத்தத்திலுள்ள ஆவிகள்	69
இரத்தத்தின் அளவு	57
இரத்தத்தின் உபயோகங்கள்	70
இரத்தத்தின் பூதிகக் கூட்டுப்பாடுகள்	61
இரத்த நாடிகளின்மீது நரம்பு மண்டலத்துக்குரிய சக்தி	106
இரத்த நார் வஸ்து	16
இரத்த நீர்	56, 68
இரத்த பேகம்	68
இரத்தம்	55
இரத்தமுறையுங் காரணம்	60
இரத்தமுறைவது	57
இரத்தவஸ்து—வருணவஸ்து	18
இரத்தாசயத்தின் செய்கை	82
இரத்தாணுவயம்	16
இரத்தினி. பென்பு	45
இரிசுக்கத்தைகள்	78
இரிசுஸ்தம்பங்கள்	78
இருதய கபாடம்—அவற்றின் கட்டடம்	76
இருதயத்தின் உட்புற வஸ்து	76
இருதயம்	74
இருத்தை	10

	பக்கம்
இருப்புக்காற்று	138
இருமல்	149
இரைப்பையிலுள்ள சீரணமாதல்	177
இரைப்பையிலுள்ள வாயுக்கள்	221
இரைப்பையின் அசைவுகள்	184
இரைப்பையின் கட்டடம்	177
இலாஸ்டின்	17
இலிதம்	10
இலியோவிகல் வால்வ்	195
இலாபொரேஷன்	159
இழைச்சூலம்	23
இழைப்பரிஸ்தாபிதம்	26
இஞ்சை	15
ஈ	
ஈயம்	10-20
ஈரலின் தொழில்	204
ஈரலிற் கிள்கொணின் சர்க்கரையுண்டாதல்	214
உ	
உச்சித்துவாரம்	37
உச்சிரந்திரம்	37
உட்டோல்	263
உட்புறச் சிறைப்பேசி	167
உணர்ச்சிகள்—சாநாரண	333
„ விசேஷ	334
உணவு—உப்புவாயு கலந்த உணவில் ஜீரண சக்தியின் செயல்	184
„ சிறு குடலிலடையு மாறுபாடுகள்	214
உதரஜீரணத்தின்மேல் நரம்புமண்டலத்துக்குள்ள சக்தி	191
உதர நாளம்	69
உதராந்தரச் சுழற்சி	73
உபவாசத்தாலுண்டாகுங் கெடுதிகள்	163
உபநாண பூதங்கள்	11
உப்புவாயு—தேகத்திற் காணும் பூதவஸ்து	10
உமிழ்நீர் கூட்டுப்பாடு	170
உமிழ்நீர்க் கோளங்களும் உமிழ்நீரும்	166
உமிழ்நீர் புளிப்பு	17

	பக்கம்.
உமிழ்நீரின் பயன்	172
உயிருடனிருக்கும் பிராணிகளின் விசேஷ தர்மகுணங்கள்.	1
உருசகதம்	10
உருசகதேந்திரிய உபாதான பூதங்கள்	15
உருவம்	351
உருவாணி	43
உற்காயவென்புகள்	44
உறிதல்	153
உ	
உளறு	338
உன்னம்	58
எ	
எக்ஸ்கிரீடின்கொழுப்பு	13
எண்டோகார்டியம்	76
எண்ணைகள்	12
எபிடெர்மிஸ்	25
எப்திலியல் டிஷியூ	25
எலும்பாருவீதம்	34
எலும்பின் உருவம்	35
எலும்பின் எண்ணிக்கை	35
எலும்பின் கட்டடம்	34
எலும்பின் பிரிவு	37
எலும்பின் மேற்சுவ்வு	34
எலும்பு	33
எலும்புகளின் தொழில்	35
எலும்புக் கோர்வை	35
எலும்புவளைச் சம்பந்தத் திசை	29
எழுத்தாணி முனையெலும்பு	40
எலும்புப்புளி	15
என்பின் மேற்சுவ்வு	34
என்புகள்	33
ஐ	
ஐவரி-பல்தந்தம்	51
ஒ	
ஒளி	351

	பக்கம்.
ஒற்றுணர்வு நரம்புகள்	321
,, அஹற்றின் இலக்கணம்	321
,, தொழில்	323
ஓ	
ஓசை	345
ஓலின் கொழுப்பு	12
ஓவம்	20
க	
கக்கல், உஷ்ணம் கக்கல்	159
கங்கானம்	35
கஞ்சி வஸ்துக்கள்	13
கடித்தம்	362
கடினை	352
கட்டி, இரத்தக்கட்டி	58
கண்	351
கண்ணீர் சுவ்வுப்பை	41
கணையம், அதின் பொசிப்பு	198
கணையப்பொசிப்பின் கூட்டுப்பாடு	198
கந்தகம்	10
கந்தம்	342
கபாடச்சதை மடிப்புகள்	193
கபால மூலத்துவாரம்	40
கம்பு (நத்தைபோடு)	347
கமண்டல முருந்து	330
கரி	10
கருக்குச்சதை முன்புறப்பெருநார்	131
கருக்கூடு	360
கருவிழி	353
கரோகை	37
கரோனல் குகர்	37
கர்ப்பம் தரியாத நாதம்	363
கர்ப்பாசம்	360
கர்ப்பமடைதல்	366
கலப்பையென்பு	41
கல்லீரல்	200
,, அதின் கட்டடம்	200

கவுளென்பு ...	38,41
கழுத்து (பல்லின்) ...	51
கழுத்து முள்ளெலும்பு ...	41
கறணை ...	200
கன்னப்பொரியெலும்பு ...	39
கனெக்டிவ் டிவழிப்பு ...	25
கஃ	
காஞ்சிகம் ...	13
காட்சியின் தோற்றம் ...	358
காழிப்புளி ...	15
காண்டிரீன் ...	17
காண்டைல்ஸ் ...	40
காது ...	345
காதெலும்பு ...	39
காந்தமண் சத்து ...	10
காப்பாற்றஞ்சாலம் ...	24
காந்தியே டெண்டினை ...	78
கார்பஸ் ஆரண்டை ...	81
கார்பனில்ஸ் ...	56
கார்போரா காவர்கோசா ...	107
காரையென்பு ...	44
காலம்னை கார்னியே ...	78
காலென்புகள் ...	47
காலேயநானம் ...	69
காற்குளசென்புகள் ...	50
காற்றுப்பை ...	126
காற்றுலாசூரல் ...	146
கீ	
கிடங்கு பள்ளம் ...	40
கிராடின ...	17
கிரிகாயிட் கார்டிலிஜ் ...	122
கிரியேடின ...	19
கிருக கபாடக் கொம்பு ...	123
கிருக கபாடம் ...	123
கிருகம் ...	123

கிருஷ்ணமண்டலம் ...	353
கிளனாயிட் காவீட்டி ...	40
கிளைகோஜின் ...	13
கீ	
கீழ்த்தாடை என்பு ...	38
கீழ்த்தாடை கிரீடம் ...	42
கீழ்த்தாடை பள்ளம் ...	42
கீழ்த்தாடை மூட்டுமடி ...	42
கு	
குடல்களிலுண்டாகும் சீரணம் ...	191
சிறுகுடலின் சீரணத் தொழில் ...	217
பெருகுடற் சீரணத்தொழில் ...	218
குடல்களிலுள்ள வாயுக்கள் ...	221
குடல்களினசவுகள் ...	222
குடல் சீரணத்தின்மேல் கரம்புமண்டலத்துக்குள்ள சக்தி ...	223
குடல்கீர்—புளிப்பு ...	17
குண்டிமுளை ...	43
குண்டியென்பு ...	43
குணம் (சப்சத்தின்) ...	351
குயில் மூக்கெலும்பு ...	44
குரல்வளை ...	120
குரல்வளைக் கல்கணம் ...	122
குரல்வளைத் தோற்றம் ...	123
குரல்வளை மோதிரமுருத்து ...	122
குருகிதம் ...	17
குருகிக்குறுகடம் ...	56
குருகிச் சாலங்கள் ...	21,56
குவளையென்பு ...	38,41
குழலற்ற கோளங்கள் ...	256
குழாய் குஞ்சுகள் ...	24
குளுகோஸ் ...	14
குளோபிலைன் ...	16
குளோரோபில் ...	3
கூ	
கூபகம் ...	43

	பக்கம்.
கூப்பகமுனை	43
கூன் என்பு	46
கே	
கெட்ட காற்றின் குணங்கள்	146
கெந்தகம்	10
கெழுச்சாலம்	23
கே	
கேசீன்	16
கேடயக்கோளம்	257
கேள்வி நரம்பு	40
கேள்வி புறத்துவாரம்	39
கேள்வியுள் துவாரம்	40
கேளாவென்பு	38
கை	
கைக்குளசென்புகள்	45
கைமோகிராப்	104
கை பென்புகள்	45
கை விரலென்புகள்	45
கோ	
கொட்டாவி விடுதல்	151
கொழுப்பின் உபயோகம்	30
கொழுப்புகள்	12
கொழுப்பு கார்	31
கொழுப்புவகை சம்பந்தத் தகை	29
கோ	
கோசம்	107
கோட்டிதம்	17
கோஸ்தானியம்	14
கோலஸ்டிரின்	13
கோழிமுட்டையின் கூட்டுப்பாடு	162
கோளச்சாலம்	23
கோளேவச்சாலம்	23
கோளேவ பரிஸ்தாபிதம்	26

	பக்கம்.
சகல ரேகை	37
சகலவென்பு	39
சகவேதனி	106
சங்கப்பேடு	167
சஞ்செனம்	14
சடசக்திகளின் செயல்கள்	6
சடரம்—இருதயம் பார்க்க. சத்தம்	345
சப்தத்தொழில்	347
சதுர்கோணவென்பு	46
சதுரவென்பு	46
சதையினிலக்கணம்	326
சதையின் பூதிகப்பிரிவுகள்	326
சந்திரநாடி	362
சனனம்	359
சம்பந்தத்தகைகள்	25
„ மூலாதாரத்தகைப்பின்னல் நிலை	28
„ அவற்றின் தொழில்	29
சம்பந்தத் தகைச்சரலம்	23
சம்பந்தத்தகை வகைகள்	29
சப்புதல்	151
சம்பூரணக்காற்று	138
சங்குலேஷன்	71
சர்மத்தின் தொழில்	261
சர்மத்தின் கட்டடம்	262
சர்மமும் அதன் விசர்க்கங்களும்	261
சாவென்பு	49
சரோரேகை	37
சலதம்	10
சலனமும் அதன் காரணங்களும்	323
சல்லியகடம்	35
சல்லிய கவிப்பு	34
சவட்டற்பேடு	167
சவட்டுப்பு சத்து	10
சன்னியஸம்	18
சக்தி—சலன நரம்பு	318
சக்தி—தல்பம்	304

202

378	அட்டவணை.	பக்கம்
ஸ்கூலேவம்ஸ் ரூசர் ...	ஸ	37
ஸ்கூலேவம்ஸ் போன் ...		39
ஸ்தாயின் ...		12
ஸ்டெர்கொரின் ...		13
ஸ்டைலாயிட் ப்ரோஸஸ் ...		40
ஸ்தம்பாகாரச்சாலம் ...		29
ஸ்தம்பாகார பரிஸ்தாபிதம் ...		26
ஸ்தாயி ...		331
ஸ்திரப்பற்கள் ...		53
” முளைக்குங்காலம் ...		54
ஸ்திர முருந்து ...		31
ஸ்திரீனிக் வெயின் ...		67
	ஜ	
ஜலசரம் ...		10
ஜலவாயு ...		10
	சா	
சாஅிடல் ரூசர் ...		37
சாடராக்கினி ...		181
சாதாரண உணர்ச்சிகள் ...		333
சாந்து (பல்லின்) ...		51
சாநியென்பு ...		50
சாலங்கள் ...		21
” அவற்றின் அழிவும் சாவும் ...		22
” அவற்றின் மூலங்கள் ...		22
சாலத்திடை வஸ்துக்கள் ...		24
சாவு (தேகத்தின்) ...		8
	ச	
சிஸ்டமிக் சர்குலேஷன் ...		73
சிரசு நரம்புகள் ...		317
சிரவச்சடா கபாடம் ...		76
சிரவம்—இருதயம் பார்க்க, சிரவாணுபந்தம் ...		88
சிருஷ்டை ...		352
சிரோமத்திய சேது ...		308
சிரோரேகைகள் ...		37

379	அட்டவணை.	பக்கம்
	சிலேஷம்ச்சவ்வு ...	246
	சிலேஷம் வலை ...	262
	சிறித்தல் ...	151
	சிறுகூலின் சீரணத்தொழில் ...	217
	சிறைப்பேசி ...	167
	சினிப்பாதை ...	359
	” பை ...	359
	ஜி	
	ஜிலடின ...	16
	ஜிலுவாக்கண்ட நரம்பு ...	320
	ஜிலுவாந்தர நரம்பு ...	320
	ஜி	
	சீரண ரசத்தின் கூட்டுப்பாடி ...	182
	சீரண ரசத்தின் செயல் ...	184
	ஜி	
	ஜீரண ரசம் ...	131
	ஜீரணம் ...	159
	ஜீவனுக்கும் மற்ற சடசக்திகளுக்குமுள்ள சம்பந்தம் ...	5
	கூழி	
	கூழிராமிலம் ...	15
	கூ	
	கண்ணாம்பு சத்து ...	10
	கத்தக்கரி ...	10
	கத்தியல் எலும்பு ...	346
	கூரியா—கூவிலெல் போன் ...	41
	கூருக்குச்சதைகள் ...	148
	கூருக்குஞ்சாலம் ...	24
	கூரோத்திரோத்திரச்சவ்வு ...	346
	கவச்சம் ...	353
	கவா ...	351
	கவறுதல் ...	159
	கவாசக்காற்றக்குள்ள பெயர்கள் ...	138
	கவாச சத்தம் ...	136

சுவாச சலனம்	136
சுவாசச் சரஸ்வதிகள்	126
சுவாசச் செயலின் யந்திரவேலை	126
சுவாசத்தால் இரத்தத்துக்குண்டாகும் மாறுபாடுகள்	145
சுவாசத்தால் காற்றிலும் இரத்தத்திலும் உண்டாகும் வேறுபாடுகள்	140
சுவாசத்தால் காற்றிக்குண்டாகும் மாறுபாடுகள்	141
சுவாசத்திற்கும் நாடிக்குழுள்ள சம்பந்தம்	139
சுவாசத்தின்போரில் நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ள சக்தி	152
சுவாசம்	117
சுவாச யாந்திரிகம்	128, 135
சுவாசலயம்	136
சுவாசலாயு	10
சுவை	340
சுழற்சி (இரத்த)	71

செ

செஞ்சுறுகடங்கள் இவற்றின் ஐடபூத குணங்கள்	63
செதிட் சாலம்	23
செதிட் பரிஸ்தாபிதம்	26
செம்பு	10
செமிலாண்டர் வாஸ்கஸ்	79
செரிப்பமிலம்	18
செரிபிரிக் ஆவரிட்	18
செரிபிரின்	18
செரிப் போன்	18
செல்சு	20
செலிது வஸ்துங்கள்	16
செலிதவகை சம்பந்தத்தரை	29
செல்லிலோசு	4
செலிப்பி துக்கென்பு	39
செழுச்சாலம்	23

சே

சேடனென்பு	42
-----------	----

சை

சைகோமா	39
--------	----

சோ	பக்கம்.
சொற்பகல முருந்து	31
சோ	
சோஷணம்	224
சோரிநார்	58
பு	
புயாவின்	18
பெ	
பெம்பொரெல் போன்	39
பெட	
பெடரோசின்	19
ஸ்	
ஸ்திரீ ஜனனேந்திரியங்கள்	359
ந	
நகனவாயு	10
நாகியசம்	10
நாகியமற்ற இத்திரிய உபாதான பூதங்கள்	10
நகையிதம்	17
நட்டைச்சாலம்	23
நத்தம்—(பல்வின்)	51
நத்துகிகள்	106
நத்துகியின் இரத்தச்சுழற்சி	110
நமரீத் நமரீ	97
நமரீயிக்க நரம்புகள்	106
நமரகம்	120
நமரகம், நமரகக்கிலைகள் இவற்றின் கட்டடம்	122
நரிசியம்	357
நரினிசம்	353
நிலோரம்புகள்—சிரசுநரம்புகள் பார்க்க. நிலையென்புகள்	37
நா	
நாகம்	189
நாவிடாமிலதம்	12
நி	
நிரிதம்	347
நிருகுருடல்	192
நிரையோதுவய நரம்புகள்	318

204

382

அட்டவணை.

	பக்கம்.
திக்கல்	10
தும்பல்	150
துணைகுட்சி	192
தே	
தேகத்திற் காணும் பூதவஸ்துக்கள்	10
தேகிகச்சுழற்சி	73
தேகோஷண காரணம்	157
தேக சிதோஷண சமரசம்	158
தேவதானுகோளம்	257
தை	
தைலோமா தூர்யாமிலதம்	12
தோ	
தொடையென்பு வளரும் விதம்	34
தொடையென்புக்குமிழ்	48
தொண்டி	173
தொனியும் பேச்சும்	328
தோ	
தோல்	261
தோளென்பு	44
நகங்கள்	25
நகிலவென்பு	39
நகத்திரச்சாலம்	23
நடுக்கா தின் தொழில்	349
நத்தையோடு (கம்பு)	347
நரம்புநார்களின் கட்டடம்	284
” பிரிவுகள்	288
நரம்புநார்களில் வேகம் செல்லும்வகை, அநின் நியாயங்கள்	289
நரம்புமத்தியங்களின் தொழில்கள்	293
நரம்பு மண்டலத்தின் மூலக்கட்டடங்கள்	284
நரம்புமண்டலம்	283
நறையேடு	60
நளகவென்பு	48

அட்டவணை.

383

	பக்கம்.
நாக்கடு	342
நாங்குழ்	194
நாசியென்பு	38
நாடிகள்	103
நாடி கபாடம்	76
நாதக்குமிழ்கள்	360
நாதக்குழல்	360
நாதமுட்டைகள்	359
நாதவஸ்து	20
நாதவாகி	360
நாதர்கள்	24
நாதவகை சம்பந்தத்தகை	29
நாவாயென்பு	46
நாளக்கபாடங்கள்	114
நாளங்கள்	113
நாற்றம்	342
நி	
நிதம்பங்கள்	362
நித்திரை	314
நிணசதுர்த்ததுவய முடிச்சு	304
நிணநீர் குணங்கள்	229
நிணநீர் கோளங்கள்	228
நிணநீர் தாரைகளின் சோஷணம்	233
நிணமிலதம்	12
நிணமுடிச்சு	304
நிணரசமி	304
நித்திரை	314
நிபாக்கினி	10
நிரசம்	10
நீ	
நீர் துவாரம்	362
நு	
நுரையீரல்	118
நுரையீரல்களின் இசைகள்	125
நுரையீரல்களின் கட்டடம்	125

905

384	அட்டவணை.	பக்கம்.
	நே	
நெஞ்சரை	...	44
நெற்றி யென்பு	...	38
,, வளரும் விதம்	...	34
	நே	
நேத்திரக்கீல் முட்டுச்சதை நரம்பு	...	318
	ப	
பதியும், தாகமும்	...	189
பச்சைநிற வாயு	...	10
படிகம்	...	356
படிக்காரச் சத்து	...	10, 20
பட்டை யெலும்பு	...	346
பட்டை யென்பு	...	44
பப்பிகோட்	...	60
பரிசம்	...	338
பரிசர்மம்	...	25
பரிஸ்தாபிதத் தைசுகள்	...	25
பரிஸ்தாபிதத்தின் உபயோகங்கள்	...	27
பரிஸ்தாபிதம்	...	25
பரிஸ்தாபித வகைகள்	...	357
பரிதிகம்	...	26
பரிபுப்புசம்	...	121
பரிமூத்திராமிலம்	...	19
பரை	...	346
பலபக்கச் சாலம்	...	23
பல்	...	50
பல் சவ்வுப் பள்ளம்	...	51
பல் தந்தம்	...	51
பல்பு காவிடி	...	51
பல்மொனெரி ஸாருலேஷன்	...	73
பல்லீர்	...	50
பல் வழுக்கை	...	51
பல்வழுக்கைப் பள்ளம்	...	51
பல் வளர்ச்சி	...	52
பல் வேர்	...	50
பல் வைரம்	...	51

அட்டவணை.	பக்கம்.
பழுவென்பு	...
பற்கள் முளைக்கும் காலக்கிரமம்	...
பற்கழுத்து	...
பற்சாந்து	...
பற்சிகரம்	...
	பா
பாகுற்பவ வென்புகள்	...
பாசகரீர்	...
பாடல் (பாடுதல்)	...
பாப்பா	...
பாறையென்பு	...
பாலின் கூட்டுப்பாடு	...
பாலேட்டு சத்து	...
பால் பற்கள்	...
பால்மிட்டின்	...
ஸ்பிக்மோகிராப்	...
	பி
பிடரென்பு வாரச்செயல்	...
பிடரென்பு	...
பிடரென்பு மூட்டுமுடி	...
பித்தங்கட்டியம்சம்	...
பித்தரீர்	...
பித்தரீர் கூட்டுப்பாடு	...
(பிண்ட விசர்ஜனத்தில்)	...
பித்தப்பை	...
பித்திகைமேடு	...
பித்திகையென்பு	...
,, வளரும்விதம்	...
பிம்பாகாரச்சாலம்	...
பிரமணத்தின் தொழில்	...
பிரமாந்திரம்	...
பிரமரம்	...
பிரன் கோளங்கள்	...
பிராண்டல் போன்	...
பிராண சக்தி	...

பிராணசக்தியின் செயல்கள்	...	...	...	7
பிராணிகளின் வெப்பம்	...	...	...	156
பிராணிகளுக்குரிய பேதங்கள்	...	...	...	4
பிரேனிக் நெர்வ்	...	...	...	154
பிரையென்பு	...	...	...	46
பிரோடோபிளாசம்	...	...	...	20
பிளட் கார்பசில்ஸ்	...	...	...	56
பிளட் செல்ஸ்	...	...	...	56
பிளீக நாளம்	...	...	...	69
பிளூரைன்	...	...	...	10
பிறைக்கபாடங்கள்	...	...	...	80
பிறையென்பு	...	...	...	46

பி

பீஜம்	...	...	...	366
பீட்ரஸ்போன்	...	...	...	39
பீமர்	...	...	...	34
பீலகம்	...	...	...	257

பு

புஜுவென்பு	...	...	...	34
புப்புச இதழ்கள்	...	...	...	124
புப்புசச் சிற்றிதழ்கள்	...	...	...	124
புப்புசச் சுழற்சி	...	...	...	73
புயுவென்புகள்	...	...	...	44
புருஷ ஜனனேந்திரியம்	...	...	...	366
புரோட்டிஸ்	...	...	...	15
புரோடோகான்	...	...	...	18
புலன்கள்	...	...	...	332
புழுக்கை	...	...	...	362
புளிப்புகள்	...	...	...	17

பு

புணாவென்பு	...	...	...	44
------------	-----	-----	-----	----

பே

பெப்சின்	...	...	...	18
பெப்டோன்	...	...	...	18
பெரியாஸ்டியம்	...	...	...	34
பெரிடி யென்பு	...	...	...	46

பெருங்குடலின் கட்டடம்	...	...	...	196
பெருங்குடற் கோளங்கள்	...	...	...	195
பெருங்குடற் சீரணத்தொழில்	...	...	...	218
பெரையிடல் எமினென்சு	...	...	...	39
பெரையிடல் போன்	...	...	...	34
பொர்மனண்டு மீத்	...	...	...	53

பே

பேசிலார் புரோசஸ்	...	...	...	40
பேசுதல்	...	...	...	150
பேச்சு	...	...	...	332
பேச்சும் தொனியும்	...	...	...	328
பேயர் கோளங்கள்	...	...	...	194

பை

பைபிரின்	...	...	...	16
----------	-----	-----	-----	----

பொ

பொசிப்பிக்கும் சுவ்வுகள்	...	...	...	243
பொசிப்புகள்	...	...	...	241
பொசிப்புத் தொழில்	...	...	...	251
பொசியச்செய்யும் சாலம்	...	...	...	23
பொரேமன் மாக்கன்	...	...	...	40

போ

போஷிப்புக்கு வேண்டிய பதார்த்தங்கள்	...	...	...	160
போஷிப்பும் வளர்ச்சியும்	...	...	...	236
போர்டல் சர்குலேஷன்	...	...	...	73
போர்டல் வையின்	...	...	...	69

ம

மகாவென்பு	...	...	...	46
மஸ்குலே பேபிலாரிஸ்	...	...	...	80
மச்சை	...	...	...	31
மச்சைத் துவாரம்	...	...	...	34
மச்சையின் உபயோகம்	...	...	...	32
மண்டையென்பு வளரும் விதம்	...	...	...	34
மண்ணீரல்	...	...	...	257
மண்ணீரலின் கட்டடம்	...	...	...	259

201

388

அட்டவணை.

பக்கம்.

மண்ணீரலின் தொழில்	...	...	...	...	261
மண்ணீரற் கழுத்து	...	...	...	...	258
மத்தியச் சிறுகுடல்	...	...	...	...	192
மயிர்	...	...	...	...	25
மயிர் முனைகள்	...	...	...	...	193
மரவுப்புசத்து	...	...	...	...	10
மலத்தின் கட்டுப்பாடு	...	...	...	...	219
மலபாதை	...	...	...	...	220
மனித தேகத்தின் கட்டடப் பிரிவுகள்	...	...	...	...	20
மனித தேகத்தின் வரவுசெலவு கணக்கு	...	...	...	...	280
மா					
மாங்கனீஸ்	...	...	...	...	10-20
மாழரிக்கஸ்	...	...	...	...	31
மாம்ச ஸ்தம்பம்	...	...	...	...	78
மாம்ச முனை	...	...	...	...	80
மால்பீஜியன் பைகள்	...	...	...	...	259
மானவிக் நரம்பு	...	...	...	...	154
மி					
மிலக் டித்...	...	...	...	...	53
மீ					
மீத்தோல்	...	...	...	...	25,262
மு					
முக நரம்பு	...	...	...	...	320
முகுளத்தின் தொழில்கள்	...	...	...	...	301
முகுளம்	...	...	...	...	300
முக்கோணவாரி	...	...	...	...	247
முட்டையின் கட்டுப்பாடு	...	...	...	...	162
முண்டகைப்புகள்	...	...	...	...	42
முதிர்வு, முதகத்தின் உ	...	...	...	...	3,359
முதுகு முள்ளெலும்பு	...	...	...	...	43
முருந்தின் உபயோகம்	...	...	...	...	32
முருந்துச்சாலம்	...	...	...	...	22
முருந்துவகை சம்பந்தத் தகை	...	...	...	...	29
„ ஸ்திர முருந்து	...	...	...	...	31
„ சொற்பகால முருந்து	...	...	...	...	31
முழந்தாட்சில்	...	...	...	...	48

அட்டவணை.

389

பக்கம்.

முள்ளந்தண்டு	...	...	...	...	42
முள்ளந்தண்டுக்கொடியின் தொழில்	...	...	...	...	298
முள்ளந்தண்டுக்கொடியின் வெண்மைவளித்து	...	...	...	...	297
முள்ளந்தண்டுக்கொடியும் அதன் நரம்புகளும்	...	...	...	...	296
முள்ளந்தண்டு நரம்புகள்	...	...	...	...	321
முள்ளந்தண்டொத்தாசை நரம்பு	...	...	...	...	321
முள்ளெலும்பு, அவற்றின் பிரிவுகள்	...	...	...	...	43
முள்ளெலும்பு மத்திய முருந்து	...	...	...	...	42
முன்கை யென்புகள்...	...	...	...	...	44
மு					
முத்திரக் குண்டிக்காய்களும் முத்திரமும்	...	...	...	...	272
முத்திரச் சத்து	...	...	...	...	19
முத்திராமிலம்	...	...	...	...	19
முர்த்திரகை	...	...	...	...	37
மூலாதாரத் தகைப்பின்னல்களின் கட்டடம்	...	...	...	...	25
மூளை :—சின்ன மூளை	...	...	...	...	308
சின்ன மூளையின் தொழில்கள்	...	...	...	...	309
பெரியமூளை	...	...	...	...	310
பெரியமூளையின் தொழில்	...	...	...	...	311
பெரிய மூளையை எடுத்துவிடுவதால் உண்டாகுங் குணங்கள்	...	...	...	...	312
மூளைக்கால்கள்	...	...	...	...	303
மூளை முள்ளந்தண்டுக்கொடி நரம்புமண்டலம்	...	...	...	...	296
மூளையமில்வஸ்து	...	...	...	...	18
மெ					
மெல்லுதல்	...	...	...	...	167
மே					
மேலார் போன்...	...	...	...	...	41
மேற்றுடை தெய்யம்...	...	...	...	...	41
மேற்றுடை யென்பு	...	...	...	...	38
மேற்றுடை யென்புகள்	...	...	...	...	41
யு					
யுரியா	...	...	...	...	19
யூ					
யூரிகாஷிட்	...	...	...	...	19

யோ	பக்கம்.
யோனிலிங்கம் ...	362
யோனிவாசல் ...	362
ல	
லகரப்பள்ளம் ...	42
லலாட ஹஸ்தி ...	34
லா	
லாக்டோஸ் ...	14
லாம்ப்டாயிட் சூசர் ...	37
லி	
லிசர் சாங்க்வீனிஸ் ...	56
லியூவின் ...	19
லி	
லீபர்குன் கோனங்கள் ...	194
லெ	
லெவரிதின் ...	18
ல	
வருணவஸ்துக்கள் ...	18
வருணி ...	353
வலைவகை சப்பந்தத்தசை ...	29
வழுக்கை ...	51
வழுக்கைப் பள்ளம் ...	51
வளர்சி ...	239, 359
வனம் ...	356
வன்னசைக் கயர் ...	78
வா	
வாங்கல் (பூக்கணம்) ...	159
வாசன ...	317
வாசாவசோரம் ...	97
வாந்தியெடுத்தல் ...	188
வாளீரல் ...	258
வி.	
விக்கல் ...	149
விசர்க்க கோனங்கள் ...	250
விசர்க்கத்தின் மேல் நரம்புமண்டலத்துக்குள்ள சக்தி ...	255
விசர்க்கநீர்கள் ...	241

விசர்ஜனம்	...	...	...	...	பக்கம்.	241
விசேஷ உணர்ச்சிகள்	...	...	...	...		334
விந்துவாகி	...	...	...	...		367
விம்மல்	...	...	...	...		151
விரலகடம்	...	...	...	...		107
விரலென்புகள்	...	...	...	...		47
முதல் நிறை	...	...	...	...		47
இரண்டாம் நிறை	...	...	...	...		47
மூன்றாம் நிறை	...	...	...	...		47
விரல் நாடி	...	...	...	...		103
விலாத்துக்குநார்	...	...	...	...		131
வில்லை	...	...	...	...		193
விழி	...	...	...	...		352
விழுங்குதல்	...	...	...	...		174
வே						
வெண்குறுகடங்கள்	...	...	...	...	60, 67	
வெண்ணெய்ப்புளி	...	...	...	...	15	
வெளிக்காதின் தொழில்	...	...	...	...	349	
வெளிப்புறச் சிறைப்பேசி	...	...	...	...	167	
வெள்ளைநிறநார் முருந்து	...	...	...	...	32	
வைரம்	...	...	...	...	51	
வாவர்சியன் கால்வாய்	...	...	...	...	34	
வரி						
வரிபாடிச் செயின்	...	...	...	...	69	
வரிப்பூரிகாவிட்	...	...	...	...	19	
வரிமோருளோயின்	...	...	...	...	18	
வரியுமால்	...	...	...	...	34	