

1) தேவ் ராஜாஜி
(அ)
வினாயக தேவ் -
1908.



J
Nº 8
11/3/17

GOD SPEED THE PLOUGH.

விவசாயவேதினி.

இது

தஞ்சாவூர் ஜில்லா நீர்மளக்கலம்

அ. சேதுராமையரால்

இயற்றப்பட்டது

திவான்பகதாசி ஆர். நெடுஞ்சுவாமி அய்யர்

முகவரையுடன் தமிழில் அச்சிடப்பட்டது.

FIELD & GARDEN CROPS OF MADRAS

BY

A. SETURAMA AIYAR,

Diplomed Agriculturist, Nidamangalam, Tanjore District.

WITH AN INTRODUCTION BY

DEWAN BAHADUR R. RAGOONATHA ROW.

சென்னை.


ஜி. ஏ. நேசன், கம்பெனியர்.

1908.

All Rights Reserved.

பேர்டீடு பைண்டு ந. 1-4-0 கால்கோ பைண்டு ந. 2.

I
N08



GOD SPEED THE PLOUGH.

402

விவசாயபோதுனி.

இது

தஞ்சாவூர் ஜில்லா கீடாமங்கலம்

அ. சேதுராமையரால்

இயற்றப்பட்டு

திவான்பந்துர் ஜி. நெகுநாதர் அவர்கள்
முகவுரையுடன் தமிழில் அச்சிடப்பட்டது.

FIELD AND GARDEN CROPS OF MADRAS

BY

A. SETURAMA AIYAR,

Diplomated Agriculturist, Nidamangalam, Tanjore District.

WITH AN INTRODUCTION BY

DEWAN BAHADUR R. RAGGONATHA ROW.

சென்னை :

ஜி. ஏ. நேசன் கம்பெனியார்.

1908.

All Rights Reserved.

பொட்டென்பைண்டு ரூ 1-4-0. காலிகோ பைண்டு ரூ 2.

SOME SELECT OPINIONS.

The Tamil work on Agriculture by Mr. A. Seturama Iyer of Nidamangalam is, in my opinion, a most valuable and timely publication. He has devoted many years to the study of the subject and his practical knowledge cannot but enhance the value of the work. The publication has been with him a work of love, and it is to be hoped that it will prove not a source of pecuniary loss. I wish the publication every success.

ORATUR,

13—1—08.

S. SUBRAMANIAN,

Judge, High Court.

I have seen the work on Agriculture and Horticulture written by M. R. Ry. A. Seturama Iyer. It is a very useful book, not only to the Agriculturist but to every Revenue Officer who has anything to do with land. It is written in easy Tamil and illustrated with several pictures. Though the subjects are briefly treated, the work has become a bulky one containing very useful information which every landowner ought to know. M. R. Ry. A. Seturama Iyer has rendered a valuable service to the Agricultural public. I hope it will meet with such patronage from the public as would induce him to publish many more works of the description.

KUMBakonam,
2—12—07.

R. RAGOONATHA ROW.

I have seen the advance sheets of Mr. A. Seturama Iyer's Tamil work on Field and Garden Crops. It is written in a very easy, popular style and is full of information which, I think, must be very valuable to the Agriculturist. Himself a landowner of considerable experience, he has also freely utilized the information available in the latest agricultural publications. Large numbers of the educated classes desire to invest in land but do not possess the requisite technical knowledge to make themselves successful Agriculturists. To persons of this class as well as to members of the Agricultural classes, Mr. Seturama Iyer's book ought to be welcome. The publication of popular hand-books like this on a subject of vital importance to the country deserves encouragement.

MYLAPORE,
2—1—08.

P. S. SIVASWAMY AIYER,
Advocate-General.

The book is the first of its kind in Tamil. It is written in easy Tamil and deals with the methods of cultivation, &c., of the different field and garden crops of the Presidency, and gives suggestions here and there for improved methods for raising the crops, which are brought home to the minds of readers by illustrations which are fairly well depicted. The book will be a useful guide to every one interested in Agriculture. The author deserves every support.

T. V. NARAYANA ROW,

Farm Manager,

S. H. D'SILVA,

Govt. Farm, Saidapet.

Ag. Vice-Principal,

28—1—08.

College of Agriculture, Madras.

28—1—08.

Written in no pedantic Tamil, and well illustrated, the book should be welcome as it is calculated to spread the knowledge which is so necessary to our people. It would be very useful in the hands of the rural school master in serving to fix correct ideas on matters of every-day interest as food grains and oil seeds in the minds of the pupils. As to the usefulness of the book in the hands of landowners and cultivators, there can be no two opinions.

Mr. Seturama Iyer deserves all encouragement in the good work to which he has devoted himself.

TRIPPLICANE,

4—1—08.

K. B. RAMANATHAN,

Lecturer, Pachaiyappa's College.

தற்சாட்சி பத்திரங்கள்.

கிருஷி விஷயமாகத் தமிழில் நீடாமங்கலம் மிஸ்டர் அ. சேதுராமையரால் எழுதப்பட்டிருக்கிற புத்தகம் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் மிகவும் அருமையானதும் நல்ல சமயத்தில் வெளி வந்ததுமாயிருக்கிறது. அந்த சாஸ்திரத்தில் அவர் வெகு வருஷங்களாக பயின்றிருக்கிறார். அவருடைய அனுபவக்ஞானமும் இந்தப் புத்தகத்தின் மதிப்பை அதிகப்படுத்தாமல் போகமுடியாது. கிருஷி விஷயத்தில் ஆசை மேம்பாட்டினால் எழுதப்பட்ட இப்புத்தகம் திரவிய நஷ்டத்துக்கு ஹேதுவாகாதென்று நம்புகிறேன். இப்பிரசுரம் நன்கு நின்றுலவப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

ஓரத்தூர், எஸ். சுப்பிரமணிய அய்யர்.
13-1-08. மாஜி ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜ்.

ம-ந-ர-ஸ்ரீ சேதுராமையரால் விவசாய விஷயமாக எழுதப்பட்டிருக்கிற புத்தகத்தைப் பார்வையிட்டேன். அது விவசாயிகளுக்குக்கேயன்றி, நிலவிஷயமாய் சற்றேனும் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு ரெவின்யூ உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் மிகவும் பிரயோஜனமுள்ளது. அது எளிய தமிழ் நடையில் எழுதப்பட்டு பல படங்களால் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஷயங்கள் சுருக்கமாய் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் புத்தகம் பருத்து ஒவ்வொரு நிலச்சுவான் தாரருக்கும் முக்கியமாய்த்தெரிய வேண்டிய உபயோகமுள்ள சங்கதிகளே அடங்கியதாயிருக்கிறது. கிருஷிகர்களுக்கு ம-ந-ர-ஸ்ரீ சேதுராமையர் ஒரு உயர்ந்த உபகாரத்தைச் செய்திருக்கிறார். இத்தகைய புத்தகங்கள் இன்னும் பலவற்றை அவர் வெளியிடுமாறு இதைப் பலரும் பெரிதும் ஆதரிப்பார்களென்று நம்புகிறேன்.

கும்பகோணம், ஆர். ரெகுநாதராவ்.
12-2-07. திவான் பகதூர்.

நன்செய், புன்செய் தோட்டக்கால் பயிர்களைப்பற்றி அ. சேதுராமையர் தமிழில் எழுதியிருக்கிற புத்தகத்தைப் பார்வையிட்டேன். அது மிகவும் எளிய வழக்கு நடையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பிராக் தார்களுக்கு மிகப் பிரயோசனமான சமாசாரங்கள் அதில் நிரம்பியிருக்கின்றனவென்று நான் எண்ணுகிறேன். அவர் மிகுந்த அனுபவமாகசாலியான பிராக் தாராயிருப்பதன்றிச் சமீபகாலத்தில் வெளியாகியிருக்கிற பல விவசாய பிரச்சாரங்களிலிருந்து கிடைத்த அநேக சங்கதிகளையும் அதிகமாகப் பிரயோஜனப்படுத்தியிருக்கிறார். உயர்தரக் கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களில் அநேகர் பூமியில் பணத்தைப்போட்டு விருத்திபண்ணப் பிரியமுடையவர்களாகியிருந்தும் தங்களை லாபமடையக்கூடிய விவசாயிகளாக்கிக்கொள்ளாதற்கு அவசியமான காஸ்திரஞானம் இல்லாதவர்களாயிருக்கிறார்கள். இத்திறத்தாருக்கும் குடித்தனக்காரர்களுக்கும் ம-ா-ாஸ்ரீ அ. சேதுராமயருடைய புத்தகம் நிரம்ப அவசியம். நம்தேசத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான இவ்விஷயத்தைப்பற்றி எழுதப்படும் இவ்வித கலப்பமான சிறு புத்தகங்கள் நன்கு ஆதரிக்கப்படவேண்டியவையே.

மைலாப்பூர், பி. எஸ். சிவசுவாமி அய்யர்.

2-1-08.

அட்வகேட் ஜனரல்.

இவ்விதமாய்த் தமிழில் இதுவே முதலில் எழுதப்பட்ட புத்தகம். இது எளிய தமிழ்நடையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அது சென்னை இராஜதானியிலுள்ள நன்செய், புன்செய், தோட்டக்கால் பயிர்களின் சாகுபடிக்களின் வகைகளைப்பற்றிச் சொல்லுகிறது. நூதன விவசாயமுறைப்படி பயிர்களை உண்டாக்கவேண்டிய வழிகளைப் பல இடங்களிலும் காண்பித்திருக்கிறார். இவைகள், படிப்பவர்களுடைய மனத்தில் நன்றாய்ப் பதியும்படி நன்கமைந்த பாடங்களால் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விவசாயத்தில் ஊக்கமுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இது நல்ல பந்துக்கோடாயிருக்கும். தாலா சிரியர் எல்லாருடைய சகாயத்துக்கும் ஆருகராயிருக்கிறார்.

சென்னை விவசாயக்காலேஜ், எஸ். எச். டி. சில்வா,

28-1-08. ஜக்டிங் உதவி வுக்கிராஜிபர்.

சைதாப்பேட்டை பாரம், டி. வி. நாராயணராவ்.

28-1-08.

மானேஜர்.

நம்மவர்களுக்கு மிகவும் இன்றியமையாததான விஷயங்களைப் பலருக்கும் அறிவிக்கும்பொருட்டு அதிக கடினமில்லாத நடையில் ஏழுதப்பட்டு நல்ல படங்களைக் கூடியிருப்பதால் இப்புத்தகம் அன்போடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது. பள்ளி பிள்ளைகளுடைய மனதில் நித்தியாவசியமான உணவுத் தானியங்கள், எண்ணெய் விதைகள் முதலியவைகளைப்பற்றிச் சரியான அபிப்பிராயங்களை நிலை நிறுத்துவதற்கு இது கிராமப் பள்ளிக்கூட உபாத்தியாயர் கையில் மிகுந்த பிரயோஜனமுள்ளதாயிருக்கும். மிராசுகாரர்களுக்கும் குடிகளுக்கும் இதனால் உண்டாகிற பிரயோஜனத்தைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியதில்லை. அவர் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற நல்ல காரியத்தில் சேதுராமய்யர் உற்சாகப்படுத்தத் தகுந்தவராயிருக்கிறார்.

திருவல்லிக்கேணி, K. B. ராமனாதன், M.A.B.L.L.T.
4-1-1908. லெக்சரர், பச்சையப்பன் காலேஜ்.

To

DEWAN RAHADUR

R. RAGOONATHA ROW, AVI.,

Vice-President of the Kumbakonam Agricultural Association.

THIS LITTLE VOLUME

IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

AS A MARK OF GRATITUDE

For the great trouble which the Grand Old Man of Southern India
takes for improving South Indian Agriculture.

சமர்ப்பணம்.

சும்பகோணம் விவசாயசங்கத்தின்

உதவி அக்கிராசுனாதிபர் ம-ந-ந-ஸ்ரீ, ஸ்ரீமான்

திவான் பகதூர்

இரகுநாதராவ் அவர்களுக்கு,

ஜனங்களின் விவசாயமுயற்சியை சீர்திருத்த உற்சாகப்படுத்துகக்கொண்டு வரும் காருண்ய குணத்திற்காக எனது நன்றியறிதலைக்காட்டிக் கருகி வணக்கமாக இந்த நூல் சமர்ப்பிவிக்கப்பட்டது.

INTRODUCTION.

THE British Indian Empire is now larger than the whole of Europe inclusive of Russia. It includes several tracts which were once independent principalities. For the past many centuries, these were not famous for their military glory, for their industries, and for their navy. Yet they maintained their population, and that mostly from their agriculture. Agricultural science is the most ancient one and used to be known to hereditary cultivators from time immemorial. It used to be studied and rules used to be made by learned people in each village, so long as Village Governments existed. These have been recorded as axioms in several languages of India; but they are all axiomatic, and the village scientists used to explain and enlarge as necessities arose. With the disappearance of this class of men, the facility which existed for the explanation, demonstration of the rules and the science of Agriculture has been lost. The agriculturist continues to know the rules and their usual application, without the knowledge of the science and without knowing the reasons for the practice. This state of things is not very satisfactory. In other parts of the earth, the science does not appear to have existed; but from peculiar circumstances, these countries did not suffer much as long as

their populations were limited. As population increased, the knowledge of Agriculture became necessary; and people began to turn their attention to the cultivation of this science. The most advanced nation for the present is the American. Europe then felt the necessity; and it has made during the last century some good advance. The great manufacturing country—Great Britain—has lately turned its attention to the important subject of Agriculture.

In India more than three-fourths of its population depends for its existence on Agriculture. The Government draws a large proportion of its revenue from the agriculturist. It saw in the latter part of the last century the necessity for educating it in Agriculture; but did not adopt enough of measures for giving instructions on the subject. Some men, such as Mr. Robertson of the Saidapet, were asked to do the needful; but sufficient means were not supplied to them. After the dawn of the nineteenth century, earnest measures are thought of. At this juncture, publications on the subject in the vernaculars of the country are a desideratum. There are not many in Southern India where popular treatises in Tamil on Agriculture have of late, come into the field and are doing good to the country. Of these, M. R. R. Iyer Avergal is one, and a very prominent

has taken the trouble of writing an elaborate and useful work giving the rules of cultivation with their reasons, with a large number of diagrams. It is beyond doubt a very useful production, and a very valuable work which ought to be in the hands of every landowner. As a class-book in the schools, it will prove of immense advantage to the coming generation. It will help the old and experienced agriculturists in improving the production of food for the people. It must have cost heavily to bring out the work and present it to the public. It is hoped that the public will afford such a reward to it as would induce him to continue the publication of similar works.

For the revenue officers it will prove very instructive in ascertaining the exact and true state of the production of the lands which they have to report upon.

R. RAJAHNATHA ROW.

1,
1908.

மு க வு ரை :

பிரிடிஷ் இந்தியா, இராஜ்ஜியமானது உருவியாவும் சேர்ந்து ஸ்ரோப்பாக் கண்டம் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறதோ அதிலும் அதிக வீஸ்திரீணமுள்ளதாக இருக்கிறது. ஒருகாலத்தில் க்வாதந்திரியமுள்ள நாடுகளாயிருந்த அநேகம் பிரதேசங்கள் இந்த ஜியத்தில் சேர்ந்திருக்கின்றன. சென்ற பலநூடிகளாக, இந்த நாடுகள் தங்கள் யுத்த கீர்த்தொழின் முயற்சிகளிலும், போர்க்கப்பல்கள் அக்கொள்ளுதல் முதலிய கடல் யாத்திரைகளிலும் பிரசித்தியந்து, பின்னடைந்து விட்டன. பிறகுந்தபோதிலும் அவர்கள் ஜனங்களுவாறு சாப்பாட்டுக்குத் தடைக்கும்படியாக இப்படி ஜீவவேடையம் கிடைத்ததும் முவிவசாயத்தாலேயே விவசாய சாஸ்திரமுமையானது; தலைமுறை தலைமுறை என்று தொடர்ந்து வேளாண்மைத் தொழுவந்த சாதியார்களுக்கு, இந்த சாஸ்திர முற்காலத்தில் நன்றாகத் தெரிந்திருந்தது சாட்சிகள் இருந்துகொண்டிருந்தவரையிதிரத்தை கிராமத்தார் ஆராய்ச்சி செய்மான்கள் விவசாய முறைகளுக்கு விதிவதும், வழக்கமாகியிருந்து வந்தது.

இந்தியாவின் பலபாஷைகளிலும், தானாய் விவசாயக் கூடிய உண்மைகளேபோல பழமொழிகளாக்கப்பட்டு வழங்கி வருகின்றன. ஆனால் இந்த விதிகளெல்லாம் அதிக சுருக்கமான அர்த்தப் புஷ்டியுள்ள பழமொழிகளாக இருந்தபடியால் கிராமத்து விவசாயசாஸ்திரிகள் சந்தர்ப்பங்களின் தேவைகளுக்குத் தக்கப்படி இப்பழமொழிகளுக்கு விரிவாக வியாக்கியானம் பண்டிக்காண்டார்கள். இப்படிப்பட்ட அதுபோகசாலி ரால்பமாகப்போன பிரகு, இந்த விவசாய சூத்திர வியாக்கியானங்களும், வியாக்கியானங்களைப் பூர்வமாகச் செய்து காட்டுவதும், விவசாய ஜோய்ச்சியும் அபிவிருத்தி யடைவதற்குரியவர்கள் ஆற்றப்போயின. இப்போது கிருஷ்ண விவசாய விதிகளும், அவைகளை பிரயோகிக்கமான முறைகளும் மட்டும் தெரிந்திருக்கிற விவசாய சாஸ்திரஞ்ஞானமும், பயிர்த்தொழிலுக்கப்படும் செய்தொழில் முறைகளுக்குத் தெரியாமற்போய் விட்டன. இப்படிப்பட்டவர்கள் திருப்திகரமாக இருக்கவில்லை. பாகங்களில் விவசாய சாஸ்திரம் என்பதத்தில் இருந்திருப்பதாகத் தோன்றாதந்த தேசங்களின் ஜனத்தொகை குறைபடியாலும், அந்தந்தத் தனி நாட்டிற்கு விசேஷ சௌகரியங்களாலும், விவசாய வகைவால் அந்த நாடுகள் கஷ்டப்பட்டன.

வில்லை. ஜனத்தொகை அதிகப்பட்ட அதிகப்பட்ட விவசாய ஞானம் அவசியமானதாகி விட்டது; இந்த சாஸ்திர அபிவிருத்தியில் ஜனங்கள் கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பித்தார்கள். இப்போது விவசாய ஞானத்தில் எல்லா நாடுகளையும்விட முன்னிட்டு நிற்பது அமெரிக்காவே; இப்படி அமெரிக்கா முன்னுக்கு வருவதைப் பார்த்துக்கொண்டே, ஐரோப்பியர் இந்த சாஸ்திரம் தங்களுக்கும் அவசியமான தென்று கண்டு கொண்டார்கள். சென்ற நூற்றாண்டில் இந்தப்பிரத்தொழில் சாஸ்திரம் ஒருவாறு நன்றாக அபிவிருத்தி யடைந்திருக்கிறது. தொழில் முயற்சிகளில் பெருமைபெற்ற நாடாகிய மகா பிரிட்டானியாதேசத்தார் கொஞ்ச காலமாக விசேஷமானதெனக் கண்டுகொள்ளப்பட்ட விவசாய சாஸ்திரத்தில், கவனத்தை செலுத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

இந்தியாவில் ஜனங்களில் முக்கால் பாகத்தவர் பயிர்த்தொழிலை மட்டிமே தங்களுக்கு ஜீவனோபாயமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியா துஷாரத்தனத் தார் தங்கள் அரசிதை வரும்படியில் பெரும்பாகத்தை வேளாண்மைத்தொழில் உடையவர்களிடத்திலிருந்தே பெறுகிறார்கள். சென்ற நூற்றாண்டின் பின்பாகத்தில் தங்கள் பிரஜைகளுக்கு விவசாய ஞானத்தில் பயிற்சி உண்டிபண்ணல் அவசிய மென்று தெரிந்து கொண்டனர். அந்த விஷயத்தில் போதுமான அளவு கல்பயிற்சி செய்விப்பதற்கு வேண்டிய தகுந்த

களைச் செய்தார்களில்லை. சைதாப்பேட்டை துறைத் தளத்து மாதிரிப் பண்ணை அதிகாரியாக யிருந்த மிஸ் டர் ராபர்ட்ஸன் (Robertson) என்பவரைப் போன்ற சில நல்ல மனிதர்கள் அவசியமான பிரயத்தனங்களைச் செய்யும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்கள். அவைகளுக்கு வேண்டிய சாதனங்கள் அவர்களுக்குப்போதுமான அளவு கொடுக்கப்படவில்லை. இந்த சதாபதத்தின் உதயத்திற்குப் பிறகு அதுஷ்டிக்கத் தக்க உபாயங்களை உபயோகிக்க அதிக சிரத்தையோடு ஆலோசித்து வருகிறார்கள். இந்தச் சமயத்தில் இந்த விஷயத்தைப்பற்றி நமது நாட்டின் பேசும் பாஷைகளில் புஸ்தகங்கள் எழுதப்பட வேண்டியது அத்தியாவசியம். விவசாய விஷயத்தைப் பற்றி ஜனங்களுக்கு தமிழில் எளிதில் புரியும்படியான உதவிகளை எழுத சக்தியுள்ளவர்கள் கிடைப்பது தென்னிந்தியாவில் அருமை.

கொஞ்ச காலமாக சிலர் இந்தத் துறையில் இரங்கி வேலைசெய்ய முன்னிட்டு வந்திருக்கிறார்கள். இவர்களால் நாட்டிற்கு நல்ல உபயோகமான வேலை நடந்து வருகிறது. அப்படிப் பட்டவர்களில் மகாநாட்டிலே அ. சேதுராமய்யர் மிகவும் பிரபலஸ்தரான ஒருவர். மிகக்கஷ்டப்பட்டு உபயோகமான சங்கதிகளைச் சேர்த்தெடுத்து, விவசாய விதிகளையும் அவைகளின் விபாயங்களையும் எடுத்துக் காட்டி பெருந்தொகைகள் பட்டங்களுடன் ஒரு நல்ல விவசாய நூலை முடிக்கும் சிரமத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

கிறார். இது மிகவும் உபயோகமுள்ள நூல். அதற்கு சந்தேகமே இல்லை. ஒவ்வொரு பிராகதாரன் வசத்திலும் இருக்கவேண்டிய அதி சிலாக்கியமான புஸ்தகம். பள்ளிக் கூடங்களில் வகுப்பில் உபயோகப்படத்தக்க நூலா என்று யோசித்தால் வருங்காலத்துக்குரிய தலைமுறையாராகிய சிறுவர்களுக்கு அது மிகவும் உபயோகமுள்ளதென்று அனுபோகத்தில் தெரியவரும். ஜனங்களுக்காக ஆகாரத்தை உண்டுபண்ணுவதை விருத்தி ஆக்கும் விஷயத்தில் அதுபோகசாலிகளான பெரியவர்களுக்குக்கூட இந்த நூல் உபயோகமுள்ளதாக இருக்கும். இந்தப் புஸ்தகத்தை தயார்செய்து ஜனங்களுக்குக் கிடைக்கும்படி செய்ததில் அவருக்கு அதிக பணச் செலவா யிருக்கும். இதுபோல உபயோகமுள்ள நூல்களைப் பிரசுரம் செய்வதில் அவருக்கு உற்சாக முண்டாரும்படி ஜனங்கள் தக்கவாறு உதவி செய்து ஆதரிப்பார்களென்று நம்புகிறேன்.

ரெவினியூ உத்தியோகஸ்தர்களுக்கோ எளில் அது மிகவும் அறிவு புகட்டத்தக்கது. தாங்கள் பரிசீலனை செய்து மேலாருக்கு விவரங்களைத் தெரிவிக்கவேண்டி வருகிற நிலங்களில் வருஷாவருஷம் கிடைக்கக்கூடிய வரும்படியைப்பற்றி சரியான சிவதான் சங்கதிகளைத் தெரிந்துகொள்வதற்கு மிகவும் உபயோகமாகும்.

கும்பகோணம்,

ஆர். ரொகுநாதர்

13-2-08.

கனம் ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்கள்
தெரிவிப்பதாவது.

சுதேசமித்திரனில் கிருஷி விஷய நிருபங்களெழுதும் தஞ்சாவூரில்லா நீடாமங்கலம் அ. சேதுராமையரால் எழுதப்பட்டிருக்கிற சென்னை ராஜதானியில் செய்யப்படும் பயிர்வகைகளின் விவரங்களடங்கிய புஸ்தகத்தை வாசித்துப் பார்த்ததில் அது விவசாயிகளுக்கு, ரொவினியூ உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் நிரம்ப முக்கியமென்று நான் அபிப்பிராயப்படுவதுடன் கிராமாந்தர பள்ளிக்கூடங்களில் அதைப் பாடபுஸ்தகமாக வைக்கக்கூடுமென்றும் நினைக்கிறேன். அப்படிப் பாடபுஸ்தகமாக வைக்கப்படிவ் கிராமப் பள்ளிக்கூடங்களை நிர்வகிக்கும் கவர்னமெண்டாரும், மாணேஜர்களும் சில முக்கியமான ஏற்பாடுகளை செய்தால் படிப்பின் பிரயோசனம் அதுபோகத்தில் மிகப் பலன் தருவதாகும். அவைகளாவன :

(1) “கூடுமான இடங்களில் கிராமப் பள்ளிக் கூடத்துடன் சுமார் இரண்டு ஏக்கர் நிலத்துக்குக் குறை யாமல் ஒருமாதிரிப் பண்ணையைச் சேர்த்து அமைக்க வேண்டும். அதில் அநேக பயிர்களை சிறுபான்மை யில், பையன்களையே சாகுபடிபண்ணச் சொல்லியும், தாட்டங்கள் வைத்து வளர்க்கச்சொல்லியும் உற் தவேண்டும்.”

(2) “ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ஒரு சிறு பொருட்காட்சிச்சாலை (Museum) யிருக்கவேண்டும். இதில் அநேக தினுசு மாதிரிகளுள்ள நம்தேசத்துத் தானியங்களும், நார்வகைகளும், பழவகைமாதிரிகளும், கிழங்குவகை மாதிரிகளும், கருவிகள் இறைவைகளின் மாதிரிகளும், சாயவகைகளும், அநேகவித மண்கள் உண்டாக்குகிற பாறைகளும் இருக்கவேண்டும். சாய விஷயங்களை விளக்கக்கூடிய முக்கியமா கள் சாலைகளில் தொங்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

(3) “வருஷ வருஷம் சிலநாள் விடுதி ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துப் பிள்ளைச் பள்ளிக்கூடத்தைச் சுற்றியோ அல்ல யிடங்களிலோ சில மரங்கள் நடும்ப களை வருஷம்முழுவதிலும் வளர்த்து வ வேண்டும். இந்த விடுமுறைநாளு உற்சவநாள் என்று பெயர்கொடு உற்சவநாளில் மரம் நடும் விவ ரால் உபநியாசங்கள் செய்க்கி மரங்கள் நடுவதை பெரியவர்கள் ௫ பெரிய காரியங்கள், விசேஷங்கள், வும் நடலாம். இப்படி அமெரிக்க பிரான்சு, ஸ்பெயின், ஜப்பான் முத கல்விபிலாகாவில் நடந்துகொண்டு வு

(4) “பையன்களை விடுமுறைநாட்கள யாயர் பெரிய நல்லதோட்டங்களிருக்கிற இட

அழைத்துக்கொண்டுபோய், அங்கே நடக்கும் தோட்ட வேலைகளையும், இயற்கைப் பொருள்களின் அமைப்பு களையும் காட்டி, பள்ளிப்பையன்களின் புத்தியை விசாலப்படுத்த வேண்டும்.”

இப்படிச் செய்தால் கிராமத்து ஜனங்களுக்குப் பயிர் ணைகள் செய்வதில் சாஸ்திர நியாயங்களால் நிரூபிதம் அறிவு உண்டாவதுமன்றி உற்சாகமும் உண்டாகும். நிலத்தை பூர்வாசாரப்படித்து கிடைப்பதைப் பெறுவதைத்தவிர, ஜப் செய்வதுபோல ஒரு அடி நிலத்தையாவது உல ஆகாரத்துக்குப் பிரயோசனமான ிற்கக்கடியனவுமான செடி, மரங்கள் துப் பயிர் செய்யும் வழக்கப்படியும், ில் எவ்வளவோ நிலமானது உபயோ டியதா யிருந்தாலும், சோம்பலா ளாலும் தரிசுபோட்டுவைக்கப்பட்டு, ததை அடைகிறார்கள். மேலும் டு தோட்டங்கள், நடவளங்கள், களைவைத்து அவரவர் சுதப்படுவ றுக்கு உதவிசெய்வதும், தேவதாற் ற, தழைகள் கிடைக்கச் செய்வதும் ற, ராஜஸ்திரீகளும், மற்ற உயர்குல -த்தியானங்கள் வைத்து வளர்த்து ு உல்லாசமாய்க் காலங்கழிப்பதும் வழக் ைதது. இந்த மகா நாகரீகமானதும் மனப்

பயிற்சிக் குற்றதுமான வழக்கம் இப்போது நின்ற போய்விட்டது. உஷ்ண தேசமாகிய கந்தேசத்தில் எங்கெங்கு சாத்தியமோ அங்கெல்லாம் பயிர் பச்சை கள் நிரம்பி ஆகாசம் குளிர்ச்சியடையவும் கண்ணுக் குப் பச்சைகள் தோன்றி சந்தோஷப்படுத்தவும் உல லாசமார்க்கக் காலங்கழிக்க நல்லுபாயம் ஏற்படவு் செய்தல் பொதுவாக ஜனங்களது சரீர செளக்கி தையும் குணவிசேஷங்களையும் சீர்ப்படுத்த வாகுமென்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

சென்னப்பட்டணம், ஜி. சுப்பிரமணி

2-2-08.

கதேசமீதா

கிரந்தகர்த்தாவின் முகவுரை.

இரண்டு மூன்று வருஷகாலங்களாக துரைத்தனத் தாரும் ஜனங்களும் நமதுநாட்டு விவசாயத்தை விருத்திப்பண்ண வேண்டி ஆங்கங்கே சங்கங்கள் ஏற்படுத்திக் கண்டு விவசாயத்தை விருத்திப்பண்ணுவதில் லவக்கங் கொண்டு வருவதால் எளிய நடையில் நமது னியின் தென் ஜில்லாக்களின் ஜனங்களுக்கு னாகும்படி இந்தநூலைத் தமிழில் எழுத ந்த நூல் இரண்டு பாகங்களாகப் பிரித் தது. முதல் பாகத்தில் பூமி, கருவிகள், விதைப்பொறுக்குதல், இவைகளைப் பாடாம் பாகத்தில் நமது இராஜதானியி புன்செய் தோட்டக்கால் பசுர்களின் னியும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இப் பதும்போது ஒவ்வொரு பசுருக் முக்கிய தினுசுகளையும், தருந்த யநேர்த்தி விஷயங்களையும், எருக் மையையும், விதைதெளிப்பு, விதையின் ததளிக்கும் காலம், நாற்றங்கால் செய் விதம், பாசனம், பின்செய் நேர்த்தி, ி, கண்டு முதல், விளைபொருளை என் னைத்தொழிலுக்கு உபயோகப் படுத்தலா ம் தலைப்புத் தலைப்பாகப் பிரித்து, விவசாயிக

ளுக்கு எளிதில் சமாசாரங்களைப் பொறுத்தி யெடுக்க சௌகரியமாகும்படி வகுத்து எழுதியிருக்கின்றேன்.

இந்தியாவின் வடமேற்கு மாகாணத்து விவசாய இலாகா துரைத்தனத்தார் தங்கள் “டந்தி ஷுண்டே புல் லீஸ், பீல்டு ஷுண்டே கார்டன் கிறூப்ஸ்” (Duthey and Fullers Field and Garden Crops) என்கிற பிரசுரத்தி லுள்ள விவசாயப்படங்களை உபயோகப் படுத்திக் கொள்ள உத்திரவு கொடுத்ததற்கு நன்றியறிவு உள் ளவனாக இருக்கிறேன்.

இந்தியா துரைத்தனத்தாரின் பல மாகாணங்களின் விவசாய இலாகாப் பிரசுரங்களையும், இந்தியா துரைத் தனத்தாரின் பிரசுரங்களையும், சென்னை இராஜகா துரைத்தனத்தாரின் விவசாயக் குறிப்புகளையும் அநேக இந்திய விவசாய புஸ்தகங்களை ய்ந்தறிந்து இந்த ராஜதானியின் பல இடங்க ளளின் அனுபோகங்களையும், என்னாலியன் விசாரித்தறிந்து ஒத்துப்பார்த்துக் கூடிய சராசரிக் கணக்கெடுத்து விஷயங்களையும் க களையும் நிதானமாக எழுத முயன்றிருக்கிறேன்.

இந்த நூலை வாசிப்பதனால் நமது ஜனங்களுக்கு வவசாய முயற்சியில் எவ்வளவோனும் சிரத்தை ஜாஸ்திப் பட்டால் அதை எனக்கான பொருட் செலவிற்கும் மனமுயற்சிக்கும் தருந்த பிரதிபலனைக் கருதுவேன்.

கீடாமங்கலம்.

அ. சேதுராமையார்.

23-2-08

CONTENTS.

No	PAGES.
INTRODUCTION—	...
Part I.	
1. SOILS MET WITH IN THE MADRAS PRESIDENCY	...
2. RECLAMATION OF WASTE LANDS	...
3. RECLAMATION OF SALT LANDS	...
IMPLEMENTS IN THE MADRAS PRESIDENCY	...
Ploughs	...
Harrows.	...
Rills	...
Planters	...
Seed Madaka	...
Seed Madaka	...
Gorru or Seed-drill	...
Tools	...
Chaff-cutter	...
Rain-gauge	...
Lifts	...
5. MANURES—	...
6. SEED SELECTION—	...

Part II

CEREALS—	...
Paddy	...
Cholan or Great Millet	...
Kambu or Spiked Millet	...
Ragi	...
Varagu or Common Millet	...
Tenai (Italian Millet); Samai (Little Millet)	...
Wheat	...
Maize	...
PULSES—	...
Horse-gram	...
Green-gram; Black-gram	...
Bengal-gram	...
Red-gram or Dhol	...
Cow-gram	...
Lab-lab or Field Bean	...
OIL-SEEDS—	...
Castor	...
Gingelly	...
Ground-nut	...
Cocoanut	...
Safflower	...
Linseed	...

FIBRES—	...	91—118
Cotton	...	91
Sun-hemp	...	101
Roscelie	...	106
Jute	...	110
Aloes	...	114
5. ROOT CROPS—	...	119—165
Turmeric	...	119
Ginger	...	125
Onions	...	130
Garlic	...	135
Arrowroot	...	137
Elephant Yams	...	140
Tapioca	...	146
Egyptian Arum	...	152
Sweet Potato	...	155
Potato	...	161
6. SUGARS—	...	166—185
Sugar-cane	...	166
Palmyra	...	177
Date-palm	...	182
7. FRUITS—	...	186—224
Plantain	...	186
Mango	...	192
Orange	...	198
Guava	...	205

Pineapple	...	207
Pomegranate	...	210
Grape	...	212
Cashewnut	...	216
Sweet Melon	...	218
Jack	...	220
8. DYES—	...	225—229
Indigo	...	225
9. SPICES AND CONDIMENTS—	...	230—259
Chilly.	...	230
Coriander	...	236
Cumin	...	239
Mustard	...	242
Arecanut Palm	...	245
Pepper	...	249
Cardamom	...	254
Fenugreek	...	258
10. VEGETABLES—	...	260—293
Brinjal	...	260
Tomatoes	...	265
Pumpkin, white gourd melon and bottle gourd	...	267
Snake Gourd	...	272
Cucumber	...	274
Water Melon	...	276
Ribbed Gourd	...	278

Bitter Gourd	...	280
Peas	...	283
Cluster beans	...	285
Ladies' Fingers	...	288
Beans	...	291
Radish	...	292
11. FIREWOOD—	...	294—297
Casuarina	...	294
12. DRUGS AND NARCOTICS—	...	298—335
Betel	...	298
Tobacco	...	305
Indian Hemp	...	316
Opium	...	322
Bishop's Weed	...	325
Coffee	...	327
Tea	...	331
13. FENCE CROPS—	...	336—345
14. FODDERS—	...	346—352
Kolakattai grass	...	346
Guinea grass	...	350
15. SILK-WORMS—	...	353—366
16. AREA CROPPED IN THE MADRAS PRESIDENCY—	...	367—368

பொருளடக்கம் அல்லது விஷயகுசிகை.

—:0:—

நெ.

பக்கம்.

முகவுரை

முதல் பாகம்.

1. தென்னிந்தியாவிலுள்ள மன்கள்	...	1
2. புது நிலங்களைச் சீர்திருத்தல்	...	9
3. களர் நிலங்களைச் சீர்திருத்தல்	...	17
4. சென்னை இராஜதானியிலுள்ள பூங்கா	...	25 to 65
கருவிகள்	...	25
கலப்பைகள்	...	33
வேர்வாரி	...	35
உருளைகள்	...	38
களை எடுக்கும் கருவி	...	41
பெத்தமடக்கா	...	42
குண்டகா	...	47
கொர்ளு	...	54
கையால் வேலைசெய்யும் கருவிகள்	...	55
ஹைக்கோல் வெட்டி	...	57
மழை அளக்கும் கருவி	...	59
ஏற்றம்	...	65 to 85
எரு	...	86 to 88
விதைப்பொறுத்தல்	...	

இரண்டாம் பாகம்.

1. தானியவகைப் பயிர்கள்	...	1 to 36
நெல்	...	1
சோளம்	...	7
கம்பு	...	14
கேழ்வரகு	...	18
வரகு	...	23
தினை, சாமை	...	26
கோதுமை	...	29
முத்துச்சோளம்	...	33
2. துவரைமுதலிய கோதுப்பயிர்கள்	...	37 to 55
கொள்ளு	...	37
பயறு, உளுந்து	...	41
கொத்துக்கடலை	...	45
துவரை	...	48
காசாமணி அல்லது தட்டைப்பயறு	...	51
மொச்சை	...	55
3. எண்ணெயிற்பயிர்கள்	...	56 to 90
கொட்டைமுத்து	...	56
எள்ளு	...	61
வேர்க்கடலை	...	66
தென்னை	...	73
குகம்பா	...	81
ஆளிறிதை	...	87

நவீனவகைப் பயிர்கள்	...	91 to 118
பருத்தி	...	91
சென்னைச்சணல்	...	101
புளிச்சை	...	106
ஜூட் அல்லது பங்காளத்துச் சணல்	...	110
கத்தாழை	...	114
கிழங்குவகைப் பயிர்கள்	...	119 to 165
மஞ்சள்	...	119
இஞ்சி	...	125
வெங்காயம்	...	130
வெள்ளைப்பூண்டு	...	135
அரூட் அல்லது கூவைக்கிழங்கு	...	137
சேனைக்கிழங்கு, கருளைக்கிழங்கு	...	140
மாவள்ளிக்கிழங்கு	...	146
சேப்பங்கிழங்கு	...	152
சாக்கரைவள்ளி	...	155
உருளைக்கிழங்கு	...	161
6. சர்க்கரைகொடுக்கும் பயிர்கள்	...	166 to 185
கரும்பு	...	166
பனை	...	177
ஈச்சமரம்	...	182
8. பழவகைப் பயிர்கள்	...	186 to 224
வாழை	...	186
மா	...	192

கிச்சில்	...	198
கொய்யா	...	205
அனாஸ்	...	207
மாதுளை	...	210
கொழமுந்திரி	...	212
முந்திரி	...	216
கர்பூஜை	...	218
பிலா	...	220
8. சாயவகைப் பயிர்கள்	...	225 to 229
அவுரி	...	225
9. கவை அதிகரிக்கக்கூடியும் பயிர்கள்	...	230 to 259
மிளகாய்	...	230
கொத்துமல்லி	...	236
சிரகம்	...	239
கடுகு	...	242
பாக்கு	...	245
மிளகு	...	249
ஏலக்காய்	...	254
வெந்தயம்	...	258
10. கறிகாய்ப் பயிர்கள்	...	260 to 263
கத்திரி	...	260
மக்காளிக்காய்	...	265
பரங்கி, பூஷணி, கரை	...	267
புடலை	...	272
கல்லி	...	274

வெள்ளெரி	...	276
பிரக்கை	...	278
பாகல்	...	280
பட்டாணி	...	283
கொத்தவரை	...	285
வெண்டை	...	288
அவரை	...	291
முள்ளங்கி	...	292
11. விநாகுண்டுக்கும் பயிர்கள்	...	294 to 297
சவுக்கு	...	294
12. மயக்கங்குண்டுக்கும் பயிர்கள்	...	298 to 335
வெற்றிலை	...	298
புகையிலை	...	305
கெஞ்சா	...	316
அப்பளி	...	322
ஒமம்	...	325
காபி	...	327
தேயிலை	...	331
13. வெளிப்பயிர்கள்	...	336 to 345
14. சிலவகை மரட்டுத்தவனப்புல்கள்	...	346 to 352
கொழக்கட்டைப்புல்	...	346
கிணிப்புல்	...	350
15. பட்டுப்பூச்சிகளை வித்தியாக்குதல்	...	353 to 366
சென்னை இராஜதானியிலுள்ள முக்கிய பயிர்	...	...
களின் சாதபடி விஸ்தீரணம்	...	367 to 368

ILLUSTRATIONS.

படங்கள்.

PART I. முதல் பாகம்.

Tamil	Page.
Light Plough லேசான சீமைக்கலப்பை.	27
Improved Plough சீமைக்கலப்பை ...	23
Harrow வேர்வாரி ...	33
Rollers மகரூவ் கல்லுருளை ...	37
Kundaka குண்டகா ...	43
Metla kundaka மெட்ல குண்டகா ...	45
Gorru or seed-drill விதைதெளி கருவி.	47

PART II. இரண்டாம் பாகம்.

Paddy நெல் ...	1
Cholam சோளம் ...	7
Kambu கம்பு ...	14
Ragi ராகி ...	18
Varagu வரகு ...	23
Tennai தினை ...	26
Wheat கோதுமை ...	29, 30
Maize மக்காச்சோளம் முத்துச்சோளம்...	33
Horse gram கொள்ளு ...	37
Green gram பயறு ...	41
Black gram உளுந்து ...	42
Bengal gram கடலை ...	45
Dholl or Red gram துவரை ...	48
Cowgram காராமணி ...	51
Field bean மொச்சை ...	54
Castor கொட்டைமுத்து ...	56
Gingelly எள்ளு ...	61
Ground-nut வேர்க்கடலை ...	66
Cocoanut தென்னை ...	73
Safflower குகம்பா ...	81

xxxix

Linseed ஆளிவிதை ...	87
Cotton பருத்தி ...	91, 93
Sun hemp சுணப்பு ...	101
Roscelle புளிச்சை ...	106
Jute சூட் ...	110
Alces கத்தாழை ...	114
Turmeric மஞ்சள் ...	119
Ginger இஞ்சி ...	125
Onions வெங்காயம் ...	130
Garlic வெள்ளைப்பூண்டு ...	135
Yams சேனை, கருளை ...	140
Tapioca மரவள்ளி ...	146, 150
Egyptian Arum சேப்பங்கிழங்கு ...	152
Sweet Potato சர்க்கரைவள்ளி ...	155
Potato உருளைக்கிழங்கு ...	161
Sugar cane கரும்பு ...	166
Datepalm ஈச்சமரம், குலை ...	182, 184
Plantain வாழை ...	186
Mango மாம்பழம் ...	192
Orange கிச்சிலி ...	198
Pineapple அனாஸ் ...	207
Grape கொடிமுந்திரி ...	212
Sweet melon கர்ப்பூஜ் ...	218
Jack பலா ...	220
Indigo அயுரி ...	225
Chilly மிளகாய் ...	230
Coriander கொத்தமல்லி ...	236
Cumin சீரகம் ...	239
Mustard கடுகு ...	242
Pepper மிளகு ...	249
Fenugreek வெந்தயம் ...	258
Brinjal கத்திரி ...	260

Pumpkin பரங்கி	...	267
White gourd பூவிணி	...	268
Bottle gourd சுரை	...	269
Snake gourd புட்டை	...	272
Cucumber கக்கிரி	...	274
Water melon வெள்ளரி	...	276
Ribbed gourd பிர்க்கை	...	278
Bitter gourd பாகல்	...	280
Peas பட்டாணி	...	283
Cluster beans கொத்தவரை	...	285
Ladeis's Finger வெண்ணை	...	288
Radish முள்ளங்கி	...	292
Betel வெற்றிலை	...	298
Tobacco புகையிலை	...	305
Indian Hemp கஞ்சா	...	316
Opium அபிவி	...	322
Bishop's weed ஒமம்	...	325
Coffee காபி	...	327
Tea தேயிலை	...	331
Ingadulcis கொருக்காப்பள்ளி	...	336
Breeding Room for silk worms பட்டுப் பூச்சி முட்டையிலிருந்து புழுக்களு ண்டாக்குதல்	...	353
Mulberry tree முசுக்கட்டைச்செடி	...	355
Shelves for feeding silk worms பட்டுப் பூச்சிப் புழுக்கள் இலைகளை ஆகார மாக உட்கொள்ளும் தட்டுகள்	...	356
Brush for spinning the cocoons கிளை களில் கூடுகள் உண்டாக்குதல்	...	359
Silk moth and eggs பட்டுப்பூச்சி முட்டைகள்	...	361

தென்னிந்தியாவிலுள்ள

மண்கள்.

கமது சென்னை ராஜதானியிலுள்ள பூமிகளாவன :—
பருத்தி பயிரிடும் கரிசங்காடு, செம்மண் நிலம், அடை மண் நிலம், சுக்கான், மணல், சதுப்பு, களர்.

பருத்தி பயிரிடும் கரிசங்காடு.

இது பலாஸ்ட்டு பாறையின் சிதைவால் உண்டா யிருக்கலாம். கிருஷ்ணை, கோதாவரி ஜில்லாக்களி லுள்ள கரிசல்கள், பலாஸ்ட்டு பாறையின் சிதைவு ஈசங்களை வாரி சுருட்டிக் கொண்டு வருகிற கிருஷ்ணை, கோதாவரி ஆறுகளின் வண்டல்மேலானமைந்திருக்க வேண்டும். இவ்விதமே கருப்பு நிறமுள்ள கரிசல்கள், பெண்ணையாறு, பாலாறு, காவேரி, முதலியன தீரங் களிலேயும், அநேக இடத்திலிருக்கின்றன. இவ்வாறு களின் வண்டல் சேற்றோடு, மூலதிரவியங்கள், மக்கிச் சிதைத்து கலந்தால், கரிசல் மண்ணுண்டாகிறதென் கிறார்கள். காடுகளில் பூமி முழுபையும் கரிசலாயிருக் கிறது. ஏனெனில், இலை, காய், கனி, செடி, பூண்டு முதலிய மூலதிரவியங்கள் பூமியில் வீழ்ந்து மண்ணுடன் மக்கி மண்ணோடு மண்ணாய்ப்போகின்றன. பருத்தி கரிசல்களெல்லாம் முன் காடாயிருக்குமோ வெனில், கிண்டியெடுக்கப்பட்ட காட்டுச்சின்னங்களாகிய முக் கிய பிரமாணங்கள் இதுவரையில் அவைகளில் ஒன்றை யும் காணோம். ஆகையால் பருத்திக் கரிசல்கள் முன்

2 தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

காடாயிருந்திரா, களியுடன் மூலதிரவியங்கள் சம்பந்தப்பட்டாவது, அல்லது வண்டல் சேற்றேறும் செடி, காய், கனி முதலியன மக்கிக் கலந்தாவது, அல்லது பஸால்ட்டு பாறையின் சிதைவினாலாவது “கரிசற் பருத்திக்காடு” அமைந்துண்டா யிருக்கவேண்டும். இவ்வித நிலம் ஒரே கருப்பு நிறமாயிருக்கும். இங்கிறத் துக்குக் காரணம் மூலதிரவியங்கள்தான். எங்கே பார்த்தாலும் கனதூரம் ஒரே கரிசலாயிருக்கும். வெட்டிச் சோதனைசெய்தால் கரிசற்படை பன்னிரண்டு அங்குலம்முதல் பதினைந்து அடிவரையில் ஆழத்திருப்பதைப் பார்வையிடலாம். பருத்திக்கரிசல் இவ்விராஜதானியில் அநேக இடங்களிலிருக்கின்றது; கடப்பை, பல்லாரி, அனந்தப்பூர், கர்னூல், கிருஷ்ணா, கோதாவரி, கெல்லூர், திருநெல்வேலி, மதுரை, வடஆர்க்காடு, தஞ்சை, திருசிராப்பள்ளி, கோயமுத்தூர் ஜில்லாக்களிலேயும், மைசூர் பிராந்தியத்திலேயுமிருக்கின்றது. இது கோடை காலத்தில் வெகு வெடிப்புள்ள தாயும், மாரிகாலத்தில் நிரம்ப பிசுபிசுப்புள்ளதாயுமிருக்கும். இத்தன்மைபூமி மிகவும் வளமானது. ஜலத்தை இறுக்கிவைத்துக்கொள்ளும் சக்தியும் இதற்கு ஜாஸ்தி. மூலதிரவியங்கள் இவைகளில் 100க்கு 4 பாகம் முதல் 9 பாகம்வரை யிருப்பதாகக் கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கிறது. சில ஜில்லாக்களில் கரிசல் பருத்திக் காட்டில் வெள்ளைக் கப்பியைப்போன்ற சில சுக்கான் கல் அகப்படுகின்றது. இந்த சுக்கான்படை கரிசற்

தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள். 3

படைக்குக் கீழுள்ளது. பல்லாரியிலுள்ள கரிசல் நிரம்ப உரப்புகிறது. இப்படி உரப்புகின்ற கரிசற்காட்டை புடைய ஜில்லாக்களில், பூமியில் பெத்தமடக்கா என்னும் பெரும் கலப்பையைக்கொண்டு உழுகிறார்கள். இதை இழுக்க 5, 6 ஜோடி மாடுகள் கட்டி ஒட்டுகிறார்கள். பார்வைக்கு நிரம்ப காட்சியுள்ளதாயிருக்கும். இந்த கலப்பைபைக்கொண்டுமூலதப் பார்க்கிலும், சீமைக் கலப்பையை வாங்கி இந்த பூமிகளில்போட்டு வேலை செய்வால் எவ்வளவோ லாபகரமுண்டு. வேலையும் நன்றாயிருக்கும். கருவினைப்பற்றி யெழுதும்போது இவைகளின் (சீமைக் கலப்பைகள்) லாபகரத்தை எடுத்துத் தெளிவாகக் காட்டுகிறேன். ஆகையால் பல்லாரி, அனந்தப்பூர், கர்னூல், கடப்பைமுதலிய ஜில்லாக்களில் பருத்தி கரிசல் காட்டில் 60 அல்லது 70 ரூபாய் மதிப்புள்ள சுவிடிஷ் கலப்பைகளைப் போட்டு வேலைசெய்து பெத்தமடக்காவைவிட அநேகவிதத்தில் திறமென்று, அறிந்துகொள்ளுவார்க ளென்று கம்புகிறேன்.

கடப்பை, கோயமுத்தூர் ஜில்லாக்களில் கரிசற்காடு, சுக்கான்சம்பத்தத்தால் நொருங்கலாயிருக்கும். இது நிரம்ப செழுமையுள்ளது. உரத்தகரிசல்களுக்கு 1000 ராத்தல் முதல் 5000 ராத்தல் வரையில் சுண்ணாம்பு நீற்றைவாவகி எருவிடலாம். முக்கியமாய் இங்கிலாந்தில் பயிரிடும் தானியாதிகள் பருத்தியும், சோள முந்தான். கோதுமையும், அவுரியும், அவைகளில்

4 தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

ஏராளமாப் பியிரிகிரூர்கள். பருத்தி பியிரிடுவது கோடைகாலம். விளையும் பருவத்தில் செடி இளைக்காமல், செழிக்க ஈரம் பூமியிலிருக்க வேண்டுமே. ஆகாயத்திலிருந்து ஈரத்தைக் கவர்த்து அடக்கிக் கொள்ளும் சக்தியிருப்பதால், கரிசல் நிலத்துக்கு, பருத்தியைக் கோடையில் ஈரம் ஊட்டி விளைவிக்கும் யோக்கியதையுண்டு. கொத்துக்கடலை, கொட்டைச் செடிகளும் அவைகளில் பியிரிடப்படுகின்றன.

— செந்நிலம்.

இந்த இராஜதானியில் காணப்படுகிற இன்னொருவித நிலம் யாதெனில் செம்மண் நிலம். இது செவப்பு வர்ணமுள்ளது. இந்த செவ்வர்ணத்துக்குக் காரணம் அயபஸ்பம்தான். கம்முடையவிகளில் இரும்புபாத்திரங்களைத் தேய்த்து சலத்தைத் தொடைக்காமல் வைத்தால் துரு பிடித்து விடுகிறதல்லவா? இந்தத் துருதான் அயபஸ்பம். கலப்பை கொழுக்களிலேயும் இந்தத் துருவைப் பார்க்கலாம். செந்நிலம் ஆறுகளின் எக்கல் வண்டினால் படிந்து ஒத்ததரையாகி அடைமண் நிலமாயிருந்தாலு மிருக்கலாம். அல்லது பாறைகளின் சிதைவாலமைந்திருந்தாலு மிருக்கலாம். கீழ் சமுத்திரக்கரையில் இப்பூமி செம்பூரன் கல்களின் சிதைவு நாசத்தால் உண்டாயிருக்கின்றது. வட ஆற்காடுஜில்லாவைப்போல் சில இடங்களில், கனதூரம். ஒரேமைதானமாய், இந்த செந்நிலம் அமைந்து, பூமி கெட்டிப்பட்டு, பாறையைப்போல் ஒரே அடையாயிருக்கிறது.

தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள். 5

இதில் சுதேசத்திலுண்டாகும் புற்பூண்டுகள் கூட விரத்தி ஆகாமல் ஒரே பொட்டையாயிருக்கிறது. மெடமார்பிக் பாறைகளிலிருந்து உண்டாகிய சில செந்நிலம் அநேகமாய் எல்ல வளமானதுதான். செம்பூரன் கல்லிலிருந்துண்டாகிய செந்நிலம் பொதுவாய் மட்டமான பூமிதான். சிலாக்கிபமான செந்நிலம் வேலை செய்வதற்கு வெகு நொருங்கலான தன்மையானது. ஆகாசத்திலிருந்து ஈரத்தைக்கிரகிக்கும் சக்தியுள்ளது. இந்த ஈரத்தை இழுக்கும் சக்தி அயபஸ்பத்தாலுண்டாகிறது. இதில் புன்செய் தானியங்கள் நன்றாய் விளையும். பாசனத்துக்கு நீர் குறைவில்லாமலிருந்தால் நெல்லும் பியிரிடலாம். சில ஜில்லாக்களில் இதில் பருத்தி பியிரிகிரூர்கள். கடப்பை, கர்னூல், பல்லாரி, அனந்தப்பூர் ஜில்லாக்களில் இந்த இரண்டுவித பூமிகளைத் தவிர (பருத்தி கரிசற்காடு, செந்நிலம்) செம்மண் வெண்மண் இந்த இரண்டு மண்களும் கலந்த ஒருவித பூமி இருக்கிறது. இதற்கு மஸ்ஸாப்பு என்று பெயர். ஆகையால் இந்த என்னு ஜில்லாக்களில் பருத்தி பியிரிமே கரிசற்காடு, செந்நிலம், மஸ்ஸாப், என்று மூன்றுவித பூமிகளிருக்கின்றன.

அடைமண் நிலம். (Alluvial soil.)

அடைமண் நிலமாவது, நதி, ஆறு, கால்வாய் முதலிய வற்றிலிருந்து வண்டல் எக்கல் படிந்து அடைந்திருக்கப்பட்ட மண். இது நதி தீரங்களில் விசேஷம். சுகல விதமான பாறைகளிலிருந்துண்டாகிய மக்கிப்போன

6 தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

வந்துக்களை உடைத்தாயிருப்பதால் இப்பூமி சீரம்ப வளமுள்ளது. இதில் எல்லா பயிரூட்டங்களும் குறைவில்லாமலிருக்கின்றன. அடைமண் இரண்டு விதமுண்டு:—

(a) “கரிசல் அடைமண்.” (b) “அடைமண்மணல்”

(a) கரிசல் அடைமண் (Black alluvial) கரிநிறமாயிருக்கும். இது ஆறுகளின் உற்பத்தி பாகங்களுக்குச் சமீபத்திலும், நதிகளின் பிரிவுகளின் மத்திய ஸ்தலங்களிலேயும் விசேஷம்; கரிசல் பருத்திக் காட்டைப் போல் வளமுள்ளது, ஆனால் அவ்வளவு உரப்பல்ல; கிரம்ப கொருங்கலான தன்மையுண்டு; யாவற்றுப் பயிர்களும் விரத்தியாகும். இதில் மூலதிரவியம் ஜாஸ்தியாதலால் இப்பூமி கருப்பு நிறமாய்த் தோற்றுகிறது. ஆற்றுப்படுகை இவ்வித வகுப்பு நிலத்தைச் சேர்த்தது.

(b) மணல் அடைமண். (Alluvial sand) சமுத்திரக் கரைக்குச் சமீபத்திலிருக்கும் ஆறுகள், சமுத்திரத் தோடு சங்கமாகு மிடத்துக்குச் சமீபத்திலுமிருக்கும். இப்பூமியின் வளம் பாசனத்திற்குத் தக்கபடி அமைந்திருக்கிறது. பாசனக் குறைச்சலான இடத்தில் வளமும் குறைச்சல்தான்.

சுக்கான்.

இப்பூமி கரிசலோடு அநேக ஹில்லாக்களில் கலந்திருக்கிறது. சிலாக்கியமான பூமிதான்.

7 தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

மணல்.

இவ்வித நிலம் சமுத்திரக்கரை ஓரம் விசேஷம். சவுக்கு, தென்னையவைத்துப் பயிரிட்டு லாபத்தைப் பெறலாம்.

சதுப்பு.

சதுப்பாவது, பள்ளம், பதிவுகளிலுள்ள பூமி. வெகு காலம் நீரிலும் நிலத்திலும் முனைத்து வளர்ந்து முதிர்ந்து பட்டுப்போன மூலதிரவியங்கள் பாதி மக்கியும் மக்காமலுமிருக்கின்ற காலத்திலமைவது; நீலகிரியில் லாவில் மிகுதி. மலைப்பிராந்தியத்தில்தான் இவ்வித நிலத்தைக்காணலாம். சமஸ்தியில் காணமுடியாது.

காசி.

இது உப்பு பூத்திருக்கப்பட்ட பூமி. இதன் சீர்திருத்தத்தைப்பற்றி, 3 வது அத்தியாயத்திலு் தெரிவிக்கப்படும்.

இவ்விதமானியின் பெயர் லட்சணங்கள்.

நமது சென்னை இராஜதானி இயற்கையில் செழிப்புள்ள தேசமல்ல. மிகவும் வளமுள்ளபாகங்கள் சமஸ்தியில் இருக்கின்றன. மலைச்சரிவில் வளமே கிடையாது. வளமுள்ள பாகமெல்லாம் அநேகமாய் அடைமண் நிலந்தான். இது தஞ்சை, கோதாவரி, கிருஷ்ணை, திருசிராப்பள்ளியில்லாக்களில் மிகுதி. இவ்விதமானியில் விஸ்தீரணத்தில் அநேகமாய் முக்கால்பாகத்தில் பாசனமேகிடையாது. ஏற்றமவைத்து நீர்பாய்ச்சக்கூட சாதியில்லை. அதாவது வானவாரிதான். இதிலும் அநேக

8 தென்னிந்தியாவிலுள்ள மண்கள்.

விடத்தில் வருஷம் 40 செவிக்குமேல் மழை கிடை யாது. இந்த மழைகூட இப்போது சரிவரப் பெய்கிற தில்லை.

சாகுபடி விஸ்தீரணத்தை ராஜாங்கத்தார் நீஞ்சை, புஞ்சை, தோட்டக்காலென்று வகுப்பிட்டிருக்கிறார்கள். நீஞ்சையாவது, கால்வாயிலிருந்து சுபாவமாய் பாயக் கூடிய நிலங்கள்.

புஞ்சை எல்லாம் வானவாரிதான். அதாவது மழை ஜலத்தைக்கொண்டு பயிர்கள் உண்டிபண்ணுகிற பூமி கள். புஞ்சை, சாகுபடி விஸ்தீரணத்தில் முக்கால் பாகத்துக்குமேலிருக்கிறது. புஞ்சையில் முக்காலே அரைக்கால்வாசி வளக்குறைவான ஸ்திதியி லிருக்கின்றது.

தோட்டக்கால் பூமியாவது கிணறு, குளம், குட்டை முதலியவைகளிலிருந்து ஏற்றத்தினால் இறைக்கப்படு கிற பூமி. சாகுபடி விஸ்தீரணத்தில் நமது இராஜ தானியில் நீஞ்சை 100க்கு 15 பாகம்தானுள்ளது; 100க்கு 2 பாகம் தோட்டங்கள்; 100க்கு 80 பாகம் புஞ்சை; பாக்கி 3 பாகம் மேச்சல்களும், தரிசு நிலங் களுமாயிருக்கின்றன.

புது நிலங்களைச் சீர்திருத்தல்.

நம்முடைய ராஜதானியில் ஆயிரம் பதினாயிரம் ஏக்கர் கணக்காய்ப் பயிரிட்டிராத பொட்டல்நிலங்கள் அநேகமிருக்கின்றன. இவைகளைக் கவர்ன்மெண்டார் அநேக நிபந்தனைகளுக்குட்படுத்தி தர்க்காஸ்துக்கு விடுவது வழக்கமாயிருக்கின்றது. அப்பேர்க்கொத்த பூமிகள் நமக்குக்கிடைத்தால் எவ்விதமாகத் திருத்திப் பயிருண்டுபண்ணுவது என்பதைச் சொல்லுவோம். இராட்டில் வரவர ஜனசங்கியை அதிகரிக்கிறது. எவ் வளவுக்கு ஜனசங்கியை அதிகப்படுகிறதோ அவ்வள வுக்கு சாகுபடியும் அதிகரித்தால்தான் வதுமையின்றி யிருக்கலாம். ஆகையால் நம்முடைய நாட்டு விவசாயம் விரத்தியாக வேண்டும்; விரத்தியாவதோடும் கூட சாஸ்திரோக்தமாய் மிருக்கவேண்டியது. இவைகளை மெல்லாம் ஊன்றி நோக்கிப்பார்ப்பது நிரம்ப அவசியம். ஒருவித நிலம் காடாயிருந்தால் சீர்படுத்துவது எப் படி? காடுகளிருப்பது கிருஷிகனுக்கு அனுகூலமென் றிருர்கள். ஏனெனில் அவைகளுக்கும் சீதோஷ்ண மழைகளுக்கும் சம்பந்தமுண்டென்று பிரத்தியட்ச பிரமாணமாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. காடு ஊஸ் திக்குத் தகுந்தபடி மழையும் ஜாஸ்தியுண்டு. காடுகளை எல்லாம் தாறுமாறாய்த் தறித்ததினால் முன் செழுமை

யாயிருந்த இடமெல்லாம் இப்போது மழையன்னியில் வறுமையாயிருக்கின்றன. ஆகையால் காடுகளைச்சாகுபடிக்குக் கொண்டுவருவதில் எல்லாமாங்களையும் ஒரே அடியாய் வெட்டி விடாமல் யோசித்து எங்கெங்கு தறிக்கவேண்டுமோ அவ்வவ்விடத்தில் மாத்திரம் தறித்துவிட்டு பாக்கியை இருந்தபடியே விட்டுவிட வேண்டும். காடுகளால் சீதோஷ்ணஸ்திதிபாறாமலிருக்கும். விவசாயத்துக்கு வேண்டிய தண்ணீரானது ஊற்றங்களால் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. காட்டை அழித்து விட்டால், மழை ஜலம் சேகரித்து வைக்கப்படாமல், ஓடிப்போய் ஆறுகளில் விழ்ந்து, வரவா, அந்தக் காணுங்களில் ஜலத்தட்டுண்டாய் கோடையில் வரண்டுபோய் விடுகிறது.

இவ்வகைக் காரணத்தைப்பற்றிச் சீர்திருத்துகையில் முதலில் மாங்களைத் தறிப்பதில் நிரம்ப கவனமிருக்க வேண்டும். வெட்டின மாங்களைகள் சிலாக்கியமாயில்லாத்துடன், விற்பனைக்கு வண்டிச்சத்தமும் அதிகரித்தால், அல்வித மாங்களை அவ்விடத்திலேயே எரித்து விட்டு சாம்பலைப் பூமியில் பாப்பிவிடலாம். இல்லாவிடில் வெட்டப்பட்ட துண்டங்களுக்கு அங்கேயே கிராக்கியிருந்து அல்லது சமீப இடங்களுக்குக்கொண்டுபோய் இலாபங்கிடைக்கக்கூடியதாயிருந்தால் விற்பனைவிடலாம். இப்படி மாங்களைச் சாக்கிரதையாய்ச் சரிப்படுத்தின பிறகு, புல் பூண்டுகளை நீக்கியாவது அல்லது எரித்துவிடவாவது வேண்டும்.

சப்பாத்திக் காடாயிருந்தால் அவைகளை வெட்டி பெரியகுழி தோண்டி அதில்போட்டு மடியச்செய்து பிறகு நெருப்புவைத்துக் கொளுத்திவிடுவது நன்மை.

காடு, செடி, புல், பூண்டுகளுடைய பூமியை ஸர்வே (Survey) பண்ணி அழித்தபிற்பாடி, பள்ளம் மேடுகளை நிரவி, கொஞ்சமாக சரிவுவைப்பது நன்று. இப்படி சமப்படுத்தப்பட்ட பூமியை நல்லவர்ப்புடன் வயல்களாகத் தடுக்கவேண்டும். இந்த வயல்கள் சதுரமாகவாவது அல்லது நீண்ட சதுரமாகவாவது இருக்கவேண்டும். நீர்ப்பாசனத்துக்கு நல்ல பாய்மடைகளும் வடிமடைகளும் வைக்கவேண்டும்.

மலைப்பாகங்களில் பூமி ஒரேசரிவையிருப்பதால் அந்தப் பூமியைப் படிப்படியாய் வெட்டி அமைக்கவேண்டும். பூமியில் கற்கள் அதிகமாயிருந்தால் அவைகளை யிடித்து பிரயோசனமிருந்தால் கிணறு, கொட்டில், சுவர்முதலான கட்டிடங்கள் கட்ட உபயோகித்துக் கொண்டு, இல்லாதவரையில் அப்புறப் படுத்திவிட வேண்டியது. விவசாயக் கருவிகளைப் பூமியில்போட்டு வேலைசெய்வதற்கு முந்தி, பெரிய கற்களை எடுத்துவிட வேண்டும். சின்னகற்கள் ஜாஸ்தியாயிருந்தால் அவைகளையும்ப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும். சின்ன கற்கள் சிறுபான்மையிலிருந்தால் அவ்வளவு கவலைவைக்க வேண்டாம். இவ்வளவு முயற்சியெடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்ட பூமியின் குணத்தையும் திறத்தையும் அதிகரிக்க, சாஸ்வதத்திருத்தங்கள் செய்யவேண்டும்.

பொதுவாக பசுளைமண்தான் விவசாயத்துக்குத் திறம் அவ்வாறில்லாமல் பூமியிலுள்ள களி, மணல், சுக்கான் இத்திரியவஸ்து, தானுவஸ்துக்கள் ஆகிய இந்த ஐந்து பூதக்கூறுகளில் எதாவது ஒன்று மிதமிஞ்சியிருந்தால் அப்போது அப்பூமி சிலாக்கியமில்லை. அந்த நிலத்தின் எது குறைவாகவிருக்கிறதோ அதைப்போட்டுச் சேர்த்து விட்டால் குறை தீர்ந்து திறப்பட்டுப்போய் விடும். ஆகையால் இந்தக்குறைகள் நிவர்த்திக்காகச் சீர்திருத்தல் அவசியம். சாஸ்வதத்திருத்தங்களாவன :—

நிலங்களைக் கலத்தல்.

சுக்கான் நிலம், மணற்பூமி, நீருடன் சுவர்த்து மூல திரவியங்களை ஜாஸ்தியாயுள்ள பள்ளத்தாக்கு நிலங்கள், களிச்சேர்க்கையால் நன்மைப்படுகின்றன. மணல், களி, பள்ளம், பதிவு, நிலங்களுக்கு, சுக்கான் மண்ணைச் சேர்ப்பது சாஸ்வத விர்த்திக்கு இடமுண்டு. ஒரு பூமியில் மேற்படைமண், கீழ்ப்படைமண் இரண்டையும் பரிசோதித்து விர்த்திக்குக் கொண்டுவரலாம். மேல் படை மண்ணைப்போல கீழ்ப்படை மண்ணுமிருக்கலாம். இல்லாவிடில் மேல்படை ஒரு மாதிரியாகவும் கீழ்ப்படை ஒருமாதிரியாகவு மிருக்கும். இப்படி வெவ்வேறு மாதிரியுட னிருக்கையில் விர்த்திக்குக் கொண்டுவர இடமுண்டு. உதாரணமாக, மேற்படை மணலாயிருந்து கீழ்ப்படை களியாயிருந்தால் களியை வெட்டி மணலின்மேல் தூவிவிடலாம்; மேற்படை களியாயிருந்து கீழ்ப்படை மணலாயிருந்தால் களியை

நன்றாய்க் குத்திக் கிளறி மணலுடன் சேர்த்துக் கலந்து விடலாம். இவ்விதமன்னியில் ஒவ்வொரு தினுசான நிலம் சமீபத்திருக்கலாம். ஒரு களிமண் நிலத்துக்குச் சமீபத்தில் ஒரு மணல்பூமியிருந்தால் களியைக் கொண்டுவந்து மணலுக்கும், மணலைக் கொண்டுவந்து களிக்குமடிக்கலாம்.

சுண்ணாம்பு நீற்றைப்போட்டுக் கலத்தல்.

அதிக களியாயுள்ள நிலத்துக்கும், அதிக மூலதிரவியங்களடங்கிய பள்ளத்தாக்கு நிலத்திற்கும் சுண்ணாம்பு நீற்றைப்போடுவது மிகவும் நலம். இவ்வித நிலத்தில் ஒரு ஏகருக்கு 1 டன் முதல் 6 டன் வரையில் போடலாம். அடிக்கடி நீற்றைக் கலக்கவேண்டாது. 8 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு டன் அல்லது இரண்டு டன் ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு அடித்துவர வேண்டியது.

களி சுடுதல்.

உரப்பான களி நிலம் இவ்வித திருத்தத்தால் நன்மையடையும். களியை உழுது சுரண்டிக் குவித்து அதிக தீப்படாமல் சுள்ளிகளால் சுட்டு, பூமியில் பரப்பிவிட வேண்டியது. இதனால் நிலத்தின் பிசுக்குமாறி, வேர் நன்றாயிரங்கிப் பயிர் திறப்பெம்.

காண்டிசி சுடுதல்.

இது களி நிலத்துக்கும், புல், பூண்டுமுதலிய களைகள் ஜாஸ்தியாய்த் தொந்தரவு பண்ணுகிற நிலங்களுக்கும் சிலாக்கியம். இதற்கும், முந்தின களி சுடுதலுக்

கும வித்தியாசம் யாதெனில், இதன் மேல் ஒரு அங்குலம் அல்லது இரண்டுதான் சுரண்டிச் சுடப்படும் ; அதிலே ஜாஸ்தி ஆழமெரிக்கப்படுகிறது. இது முக்கியமாய்ப் பயிர்களுக்கு இடஞ்சல்பண்ணுகிற களைகளையும், பூச்சிகளின் புழுமுட்டைகளையும், தொலைக்கச் செய்யும் திருத்தம். இதனால், களைகளின் வேரையும், விதைகளையும், பூச்சியின் முட்டையையும் அடியோடு தொலைக்கப்படுகிறது. இப்படி எரிப்பதால் இந்நிலங்களில் இந்திரியவஸ்து எரிந்துபோய் கஷ்டமுண்டாகிறது. இந்நஷ்டத்தைத்தீர்க்க அவுரி இலை முதலிய பச்சை எருவை அடிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் அவுரி முதலிய பூரையப் பயிரிட்டு பூக்கு முந்தி பூமியிலுமுதுவிடவேண்டும். இப்படி பண்ணுவதால் மறுபடியும் நிலத்தில் இந்திரியவஸ்து உண்டாய்விடுகிறது.

ஜலதாரா.

அதிக களியுள்ள நிலத்தில் மேல்படைமண் வழியாய் பாசனத்துக்கு மடைகள் வைப்பதுடன், கீழ்ப்படை மண்ணில் குசவன் மண் சட்டி பண்ணுவது போல, மண் குழாய்கள் செய்து, அவைகளைக் கொண்டு வைத்து, பிணைத்து, சில முனிசிபாலிட்டிகளில் தண்ணீர்க் குழாய்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பது போல வைத்துவிட வேண்டியது. இதால் ஜலம் அதிகமாகத் தேக்கங்கொள்ளாமல் நிலத்துவாரங்களிலிறங்கி குழாய் வழியாய் வடிந்து விடும், வாயு நன்றாயிறங்கி வேர் ஆழ ஓடி பிடிர் கொழிக்கும். சதுப்பு நிலங்களில் அந்நா

வது ஜலம் வடிய ஏது அன்னியில் தங்கிக்கிடக்கின்ற பூமியிலாவது அல்லது மூலதிரவியங்கள் எதேஷ்டமாயுள்ள சதுப்பிலாவது ஜலதாரா வைத்து வடியச் செய்வதுடன், அவ்வித இடங்களில் சிலவித விருட்சங்கள் வைத்து வளர்க்கவேண்டும். கற்பூர விருட்சம் (Eucalyptus), ரெயின் டிரி (Raintree) முதலிய மரங்களைப் பயிர்செய்தால் ஜலங்களைப்போக்கடித்து விடும். இவ்வித மரமொன்று தன் நிறை எவ்வளவோ அதற்குப் பத்துப்பங்கு கனதியுள்ள ஜலத்தை 24 மணி காலத்தில் நீராவியாய் புகைத்து போகும்படி பண்ணிவிடுகிறது. இப்படி இத்தமரங்களை விர்த்திபண்ணை ஐரோப்பாக் கண்டத்திலும், அல்ஜீரியாவிலுமுள்ள சதுப்புக்களையெல்லாம் சாகுபடிக்கு நல்ல பூமியாகவிருக்கின்றன. அந்த சதுப்புக்களில் ஜ்வரம் (காய்ச்சல்) வருவது இயற்கை. கற்பூரவிருட்ச விர்த்தியால் இவ்விதம் ஜ்வரம் தொலைத்து பூமி சீர்பட்டு நன்னூடாயிருப்பதற்கு பிரத்தியட்சம் அல்ஜீரியாதான். நமது கவர்னர் கோடைக்குப் போகும் நிலகிரியிலும் இப்படியே செய்கிறதாகக் கேள்வி.

வண்டலடித்தல்.

கால்வாயில் அணைகட்டி, வண்டல் ஜலங்களைப்பூமியில் விட்டு, அவ்வண்டல் படிவால், நிலத்திறப்படுகிறது. மேற்சொல்லிய திருத்தங்களில் எந்த எந்த பூமிக்கு எப்படி எப்படிச் செய்யவேண்டுமோ அப்படிச் செய்வதே உசிதம்போல் திருத்திக்கொள்ளவேண்டியது.

ஆறு, நதி, கால்வாய், பாசனமில்லாத இடத்தில் நன்றாய் யோசித்து நிலத்தின் அளவுப்படிக்கு கேணி கிணறுகள் தோண்டி, கற்கட்டிடங்களாகக்கட்டி, நல்ல சிலாக்கிய ஏற்றம் ஏற்படுத்திவிட வேண்டும்.

இவ்வித ஏற்பாடுகளுடன் தன்னுடைய பூஸ்திதிக்கு மத்தியில் கிருஷிகன் வசிக்க ஒரு வீதி கட்டவேண்டியது ; அவனுக்கு வேலை செய்யும் பண்ணை ஆட்களுக்கும் தன்னருகில் வசிக்க இடமமைக்கவேண்டும், மாடு ஆடுகள் முதலிய விவசாயக் கால்நடைகளுக்குக் கொட்டணம் சமீபத்தில் சாஸ்திரப்படி அமைப்பது நன்மை. கிருஷிகன் தன்னுடைய பூஸ்திதியைச்சுற்றிலும் உயிருள்ள வேலி உண்டு பண்ணுவதுடன், பல விருட்சங்களும் அநேக விடத்தில் உண்டாக்க வேண்டியது. உயிருள்ள வேலிகளாவன—கொருங்காப்பள்ளி, கத்தாழை திருகுக்கள்ளி முதலியன. இப்படிச்செய்தால் கிருஷிகனுக்கு விரம்ப நன்மையைக்கொடுக்கும். பயிர்களை நன்றாய் பார்வையிடலாம். எருக்களை சாஸ்திரோக்தமாய்க் கொட்டிலுக்குச் சமீபத்தில் சேகரித்து வைத்திருக்கும் இடங்களிலிருந்து பூமிக்குக் கொண்டு அடிப்பதில் தொந்தரவில்லை. வண்டிச் சத்தங்களில் அதிக நஷ்டப்படவேண்டியதில்லை. வேலையை ஊழலன்னியில் கவனித்துப்பார்க்கலாம். வயல்களுக்குச் சமீபத்திலிருப்பதால் விவசாயிக்கு இன்னும் அநேக வித லாபங்களிருக்கின்றன.

களர் நிலங்களைச் சாகுபடிக்குக்

கொண்டுவரச் சீர்திருத்தல்.

களர் சிலமாவது உப்பு நிலத்தான். இவ்வித நிலம் பார்வையிலேயே வெளுத்தகிறமாகவும், சாம்பல்வாணமாயுந் தோன்றும். பாறைபோல் கெட்டியாயிருக்கும். இதில் ஒருவித பயிரும் விளையாது. மாரிகாலத்தில் மாத்திரம் சிலவித பிரயோசனமற்ற புற் பூண்டுகள் காணப்படும். கோடையில் இவைகள் வாடி அவிந்து கிடக்கும்.

இத்தகைய களர் நிலத்தைத் தமிழ்நாட்டில் களர் அல்லது உவர் நிலமென்றும், தெலுங்கு தேசத்தில் செளடு என்றும், இந்தியாவின் வடபாகத்தில் உசார் (Usar) என்றும் சொல்லுகிறார்கள். பூமியின்மேல் பூத்திருக்கப்பட்ட உப்புக்குத்தான் களர் என்று பெயர். இப்பேர்ப்பட்ட நிலம் இந்தியாவின் வடபாகத்தில் விசேஷமாய் மிகுதி. நம்முடைய ராஜதானியிலும் அநேக இடங்களிலிருக்கின்றது. இத்தக்களர் நன்செய் சாகுபடி பூமியில்தான் காணப்படுகிறது. புன்செய் சாகுபடியில் அவ்வளவு ஐஸ்தியாய்க் காணப்படவில்லை. நமது ராஜதானியில் துங்கபத்திரை, கிருஷ்ண கால்வாய்கள் பாசனமுள்ள இடங்களில் களர் கொஞ்சம் விசேஷம். புன்செய் நன்செய்யாக மாற்றப்பட்ட சில இடங்களில் கூட களரைப்பார்க்கலாம். இப்படி புன்செய் நன்செய்யாய் மாறின இடங்களில், தரை முகத்

தில் பூத்திருக்கப்பட்ட உப்பு கொஞ்சமாயிருந்தால், பாசனத்தை சிலகாலம் நிறுத்திவைத்தால் களர் நீங்கி பூமி முன் ஸ்திதிக்கு வந்துவிடுகிறதாக அனுபோகத்தினால் தெரியவந்திருக்கிறது. களரினால் பூமி வெளுத்திராமல், சுக்கான் மிருதியால் வெளுப்புகிற மடைத்திருந்தால் அந்தப் பூமிக்கு சுண்ணாம்பும் களர் என்று பெயர்.

உப்பு பூத்தலுக்குக் காரணம்.

கிருஷி சாஸ்திரத்தில் மேல்படை மண், கீழ்ப்படை மண் என்று இரண்டுவித மண்ணுண்டு. மேல்படை மண்ணாவது பூமியில் விவசாயக்கருவிகளால் உழுது கொத்தப்படுகிற மண்தான். இது சுமார் ஒன்பது அங்குல ஆழத்துக்குமேல் போகாது. இதற்குக் கீழுள்ள மண்ணெல்லாம் கீழ்ப்படைதான். இந்த மண்களில் அதிக துவாரங்கள் (pores) இருக்கின்றன. இந்தத் துவாரங்கள் நுட்பமானவை. நாம் ஒரு சாம்பல் கட்டியை எடுத்து நுனியில் பிடித்து, அடியை ஜலத்தின் மீது வைத்தால், ஜலம் சரேலென்று நுனிக்குப்போய் அந்தக்கட்டி முழுவதையும் நனைத்து விடுகிறது. ஏனெனில், இந்தச் சாம்பல்கட்டியில் அதிக நுட்பமான துவாரங்களிருக்கின்றன. எவ்வளவுக்கு துவாரங்கள் அதிக நுட்பமாயிருக்கின்றனவோ அவ்வளவுக்கு ஜலம் ஜாஸ்தியாய் ஏறும். இப்படியே நம்முடைய வீட்டிலெரியும் விளக்குத் திரிகளிலேயும், மசி ஒத்துகிற கடித்தத் திரிகளிலேயும், (Blotting Paper) இவ்விதசத்தியை (Capillary

action) பார்க்கலாம். இதேமாதிரி பூமியிலும் துவாரங்களிருக்கின்றன அவைகள் வழியாய் நுட்பத்துக்குத் தகுந்தபடி ஜலமேறுகின்றது.

சிலத்துக்கு இறைக்கிற ஜலம் மழைஜலமாயிருந்தாலும் சரி, பாய்ச்சல் ஜலமாயிருந்தாலும் சரி, பூமியில் சுவர்த்து கீழ் இறங்குகிறது. கீழ்ப்படை மண்ணில் கிரம்ப நுட்ப துவாரங்களிருந்தால் அதிலுள்ள ஜலம் கோடையில் இந்தத் துவாரங்கள் வழியாய் ஒடி கீராவியாய்ப் புகைத்துப் போய்விடுகின்றது. இந்தக் கீழ்ப்படை மண் ஜலத்தில் சிலவித உப்புகள் கரைந்திருக்கின்றன. இவ்வித ஜலம் மேலேறி ஆவியாய் புகைத்தபிறகு இந்த உப்புகள் மேல்படை மண்ணில் தங்கிவிடுகின்றன. மேற்கூறிய காரணத்தினால் களர் நிலம் உண்டாகிறது.

அதேகவித உப்புகள் துறைமுகத்திலிருந்து மலர்ந்து படர்கின்றன. நாம் தினம் சாப்பாட்டுக்குப் பிரயோகிக்கிற உப்பு (Common salt or Sodium chloride) ஒன்று வாணக்காரர்கள் வெடிமருந்துக்காக உபயோகப்படுத்துகிற பொட்டிலுப்பு (Salt petre or Potassium nitrate) ஒன்று. இந்தப் பொட்டிலுப்பு மாதிரியாக (Sodium nitrate) ஒன்று, மற்ற உப்புகளாவன:— ஸோடா உப்பு (Sodium carbonate), கந்தக உப்பு (Sodium sulphate), ஆக இந்த ஐந்து உப்புகள்தான் முக்கியமாய் காணப்படுகின்றன. இவைகளுக்குள் பொட்டிலுப்பும், ருசக்கரமில் லௌடியமும் (Sodium

nitrate) நல்ல எருக்கள். பயிருக்குவேண்டிய முக்கியமான பதார்த்தங்கள் இவைகளிருக்கின்றன. ஆகையால் இவைகளைக்கொண்டு நல்ல பிரயோசனப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

களரின் விசேஷபாகம் பூமியிலிருந்து அரை அங்குல ஆழத்துக்குள்ளாகக் காணப்படுகின்றது. நிலத்தின் மேல்படையணைப் (soil) பரிசோதனை செய்யும் பொருட்டு ரசாயன சாஸ்திரிகள் ஒரு இடத்தில் ஒன்பது அங்குலம் ஆழமுள்ள சிறுகுழியை வெட்டி அதிலுள்ள மண்ணை எடுத்து நன்றாய்க் கலக்கி தீயில் காட்டி ~~நாசியுதல்~~ போக்கடித்து விடுகிறார்கள். பிறகு விதிப்படி அணுப்பரிவாகப் பிரிக்கிறார்கள். பிரித்து 100 பங்கு மண்ணுக்கு இன்ன இன்ன பதார்த்தம் இவ்வளவு கிறையிருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கிறார்கள். ஏகரா 4840 சதுரகஜம். மேல்படையணை ஒன்பது அங்குலமாக, ஒரு ஏகரா பூமியில் $4840 \frac{1}{4} = 1210$ கஜக்குழி மண்ணிருக்கிறது. இந்த 1210 கஜக்குழி மண்ணரத்தின் சிறையை நீக்கி, அதாவது 1210 கஜக்குழி வரண்டமண் (dry soil) சுமார் 3,000,000 பவுண்டு (lbs) கிறையிருக்கும். இந்த வரண்ட மேல்படையணையில் 100க்கு $\frac{1}{2}$ பங்குக்கு அதாவது ஒரு ஏகராவுக்கு 15,000 பவுண்டுக்குமேல் கரையக்கூடிய உப்பு இருந்தால் பூமி வளங்குறையும். 100க்கு 2 பங்கு அதாவது ஒரு ஏகராவுக்கு 60,000 பவுண்டுக்கு மேலிருந்தால் பூமியில் ஒரு பயிரும் விளையாது. ருசக்கரா

மில் லவணசாரங்கள் (Nitrates) 100க்கு 4 பங்கு அல்லது ஒரு ஏகராவுக்கு 120,000 பவுண்டு வரையில் நல்ல செழுமையான பூமியிலிருக்கிறதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோதுமைப் பயிரை (Wheat) உள்ள சிலபூமிகளில் 100க்கு 6பங்கு அல்லது 180,000 பவுண்டு ருசக்கராமில் லவணசாரம் (Nitrates) இருக்கிறதாகத் தெரியவருகிறது. ருசக்கராமில் லவணங்கள் மாத்திரம் 100க்கு 6 பங்குக்குமேல் போனால் நிலம் பொட்டைதான். இதனால் நாம் என்ன அனுமானிக்கலாம். பூமியில் 100க்கு 2 பங்கைப்பார்க்கிலும் கரையக்கூடிய உப்புகள் அதிகரித்தால் அந்தப் பூமி பொட்டை. $\frac{1}{2}$ பங்குக்குமேல் 2 பங்கு வரையில் செழுமை வரவாக்குவதற்கொண்டேவரும். ருசக்கராமில் லவணசாரங்கள் (Nitrates) மாத்திரம் 100க்கு 6 பங்கு வரையிலிருக்கலாம். இதற்கு மேற்பட்டால் நிலத்தரிசையாய்த்தான் போடுமபடி நேரிடும்.

களர் நிலம் யாதென்று இப்போது நன்றாய் விளங்கக்கூடும். ஒரு பூமியில் 100 பங்கு மண்ணுக்கு 2 பங்குக்குமேல் சாதாரண கரையக்கூடிய உப்புகளிருந்தாலும் அல்லது 100 பங்குக்கு 6 பங்குக்குமேல் ருசக்கராமில்லவணகாரம் (Nitrates) இருந்தாலும், அந்தபூமிகள்ள்தான். இந்தக் களரில் பயிர் முளைக்காது, ஆதலால் பயிருண்டுபண்ண சிசிச்சைகளைக் குறிப்போமாக. இந்தச் சிசிச்சைகள்தான் கிரம்ப முங்கியம். யாவற்று குடித்தனக்காரர்களும், விவசாயிகளும் இவைகளைக்

கவனித்துப் பார்த்து தாங்கள் அனுபவித்துக்கொள்ள வேண்டுகிறேன்.

களரைச் சீர்படுத்தல்.

களர் நிலங்களை முதலில் நான்கு பக்கத்திலேயும் வேலியால் அடைக்கவேண்டியது. அப்படி பண்ணினால் ஆடு மாடுகள் நடந்து அதிக கெட்டிப்பாடாமலும், இயற்கையாய் வளர்ந்திருக்கிற புற்பூண்டுகள் கால்கடைகளால் நாசப்படுத்தப்படாமல் இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்து படரும். இப்படி வளர்ந்து படருகிற புற்பூண்டுகளின் வேர்கள் களர்பாறையின் கெட்டியைக் கொஞ்சம் இளக்குகின்றன. இதில் செலவு மிகவும் சொற்பம். மூலதிரவியம் ஜாஸ்தியாய், உப்பு அடங்கலாம். (2) களர் நிலங்களில் நான்கு பக்கத்திலேயும் நல்ல பெரிய கரைகள் சுட்டி கால்வாயில் கவணை (littledam) வைத்து வண்டல் ஜலத்தை நிரப்பிவிட வேண்டும். ஜலம் வற்றின பிறகு வண்டல்கள் படிந்திருக்கும் வண்டல் நிரம்பப் படியவேண்டியது. அப்போதுதான் சிலம் திறப்படும். (3) பூமியின் சீழ் ஜலதாரை வைத்தால், இவைகள் வழியாய் உப்பு ஜலம் தொலைந்து, பூமியில் களர் நீங்கிவிடும். நமது நாட்டில் இதைசெய்ய நிரம்ப கஷ்டமாகும். (4) பூமியை நன்றாய் முழங்கால் துடை பரியந்தம் வெட்டிக் கொத்திவிடவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் நிலத்துவாரங்கள் எல்லாம் நாசப்பட்டு துவாரங்களின்

வழியாய் ஜலம் ஏறுகிற சக்தி (Capillarity) யும் குறைவு பட்டுப்போய்விடுகிறது. இந்த சக்தி குறைந்தால் மேல்படை மண்ணில் உவர் ஏழாது. (5) மனுஷ்சாணமாகிய மலங்கள் (Night soil), அவிரிமுதலிய பச்சை எருக்கள் (Green-manure), தோல்கிடங்கு எருக்கள், தோல்கிடங்கைக் குழவினஜலம், பிண்ணாக்குகள் (Oilcake), புளியம் விதைகள், பெரண்டை, வரகு (Varagu) வைக்கோல், அவரிச்சாணம் (Indigo refuse) முதலியவைகளை எருக்களாக அடித்து நிலத்தைச் சாத்திரப்படுத்தவேண்டியது. மேற்கூறிய எருக்களில் எது அதிகமாக அகப்படுகிறதோ அதைப்போட்டாலும் சரி, எல்லா மகிடைக்கக்கூடியவையையிருந்தால் அவைகளைப்போட்டாலும் சரி, கிடைத்ததை யெல்லாம் போட்டால், களர் நீங்கி பூமி நல்ல ஸ்திதிக்குவரும். (6) களர்பூமியில் நாம் தினம் உண்ணும் உப்பு அதிகமாயிருந்தால் இதில் மிகவும் ரிசியமுள்ள பயிர்களைப் பயிருட்டு வித்திசெய்யவேண்டும். அவ்வித பயிர்களாவன தென்னை, கேழ்வரகு, சிலவித நெற்பயிர், சுற்றாழி, சவுக்கு, கொருக்காப்புள்ளி, பெரண்டை, சிலவித பூண்டுகள் (Salt lusi) கருவை மரம் முதலியன. பிரத்தியட்சமாய் சமுத்திரக்கரையில் தென்னையும் சவுக்கும் செழிக்கிறதை நாம் அறியோமா? இந்தப்பயிர்களை உண்டுபண்ணினால் களர்நீங்கும். (7) உப்பு நிலங்களுக்குப் பின்வருமாறு சலதாரையும் வடிமடையும் கட்டவேண்டியது.

முதலில் வயலில் ஜலத்தைக்கட்டி கலப்பையால் கல்ல குழப்ப யடித்து உழுது, உடனே கிடங்குகள் (Trenches) வெட்டி, உப்பு சலத்தைக் கிடங்குகள் வழியாய் வடியவிடவேண்டும். இன்னுமொன்று யாதெனில், பூமியில் பன்னிரண்டு அடி பன்னிரண்டு அடிக்கு மண்ணைக்கொண்டு மேடுகள் (Ridges) வைத்து மேடுகள் கொஞ்சம் சரிவுடன் போட்டுவிடவேண்டியது. மேடு மூன்றடி உயரம் இருக்கவேண்டும். சரிவுகளில் கேழ்வரகைப் பயிரிடவேண்டும். இரண்டு பாத்திக் கும் மத்தியிலிருக்கப்பட்ட பள்ளமடை, மழைக்காலத்தில் உப்பு ஜலத்தைக் கொண்டுபோய்விடும். வயலின் பள்ளபாகத்துக்குக்கீழ் ஒரு பெரிய கிடங்குவெட்டியிருந்தால் அதில் போய் இந்த உப்புஜலமெல்லாம் விழுகுவிடும். இந்திபாவின் வடபாகத்தில் கவர்ன்மெண்டார் இந்தக் களர் நிலங்களைப்பற்றி கவனபெடுத்துக் கொண்டு, ஒரு கமிட்டி ஏற்படுத்தி விசாரிக்கச் சொன்னபோது, அந்தக் கமிட்டிக்காரர்கள் உப்புப்பூத்தலுக்கு அநேக காரணங்களைச் சொல்லி அவைகளைப் போக்க அநேக சீர்பாடுகளையும் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒருவர் கால்வாய் ஜலத்தால் களர் உண்டாகிற தென்கிறார். இது நம்பக்கூடியதல்ல! ஏனெனில் அந்தப்பக்கங்களில் கால்வாய் ஜலத்தைப் பார்க்கிலும் கேணிஜலம், ஜாஸ்தி ஸோடா உப்புக்களை உடைத்தாயிருக்கிறது. அவர்கள் சொல்லியிருப்பதைத் தவிர இன்னுமனேக திருத்தங்களை நான் இதிலுட்படுத்தி யிருக்கிறேன்.

சென்வண் இராஜதானியிலுள்ள முக்கிய கருவிகள்.

(1) கலப்பைகள்.

—:0:—

காட்டுக்கலப்பை அல்லது துச்சிக்கலப்பை யென்றும், கொல்லைக்கலப்பை யென்றும், கொழுக்கலப்பை யென்றும், சீமைக்கலப்பையென்றும் அநேக கலப்பைகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன.

(a) காட்டுக்கலப்பை அல்லது குச்சிக்கலப்பையில், வால்கட்டையைக் கூர்மையாகச் சீவி, அந்தக் கூர்மையான பாகம் தான் கொழுவாகிறது. இது அடிக்கடி தேய்ந்துபோய்விடுமாதலால் அடிக்கடி தச்சனால் சேவப்பட்டுக் கூர்மை பண்ணப்படும். இதை அநேகமாக நஞ்சை வயலில் குழிகள் உபயோகப்படுத்துவார்கள். சிலவேளை வால்கட்டையில் இரும்புக்கொழுவை அமைப்பதுமுண்டு. உழுகிறவன் அஜாக்கிரதையினால் சில சமயம் காட்டுக்காலில் கொழு ஏறிவிடுமென்று சில குழிகள் அதன்னியில் உழுகிறார்கள். குச்சிக்கலப்பையைப் பார்க்கிலும் கொழுக்கலப்பை சிலாக்கியம்.

(b) கொல்லைக்கலப்பை என்பது குச்சிக்கலப்பையைப்போலிருப்பது மன்னியில் பெரிதாகவிருக்கும். இது இரும்புக்கொழுவுமே, கொழுவன்னியிலும்

உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. புஞ்சையிலும், படுகையிலும் இதனால் பூமி உழப்புகிறது.


(c) பெந்தமடக்கா என்பது 5 6 ஜோடி மாதிகளால் இழுக்கப்பட்ட கலப்பையாக இருந்தபோதிலும், இது கரிசல் காட்டில் உபயோகப்படுத்தும் கொல்லைக் கலப்பையாகச் சொல்லலாம்.

(d) கொடிரு கலப்பை என்பது 3 வாட்கட்டைக்குக் குறைவன்றியில் அமைந்துள்ள கலப்பை. கொடிரு என்னும் விதை தெளிகருவியில் மூங்கில் குழாயைப் போர், உடுக்கையையும் எடுத்துவிட்டால் இக்கருவியாகிறது. இது கரிசலிலும் செவ்வலிலும், புஞ்சையில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

(e) சீமைக்கலப்பை.

இதில்கொழு என்றாயிருப்பதுடன், மண்ணைப் புறட்டித்தள்ள இறகுடன் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் லேசான கலப்பையும், கனமான கலப்பையும், இரட்டை இறகு கலப்பையும், இப்படி அநேக கலப்பைகள் உண்டு. ஆனால் நமது இராஜதானி நஞ்சைகளுக்கு 6, 7 ரூபாய் விலையுள்ள லேசான சீமைக்கலப்பைகள் போதுமானவை. புஞ்சையில் பொலபொலத்த மண்களுக்கும் மணல்சாரிக்கும் 10, 12 ரூபாய் விலையுள்ள சீமைக்கலப்பை போதுமானது; பருத்தி பயிரிடும் கரிசல் காட்டிற்கு 60, 70 ரூபாயுள்ள சவீடிஷ் கலப்பைகள் நிரம்ப பிரயோஜனமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

லேசான சீமைக்கலப்பை.




A. கொழு.

B. இறகு.

C. ஏர்க்கால்.

D. பிடி.

சீமைக்கலப்பை.



- | | |
|----------------|----------------------|
| (1) பிடி. | (5) கொழு. |
| (2) ஏர்க்கால். | (6) இறகு. |
| (3) கத்தி. | (7) கலப்பைச் சட்டம். |
| (4) சங்கிலி. | (8) சக்கரம். |

சீமைக்கலப்பைக்கும் நாட்டுக்கலப்பைக்கும்
உள்ள தார தம்மியம்.

—:0:—

நாட்டுக்கலப்பை உழுதுகொண்டு போகும்போது 5 அங்குல அகலமும், 4 அங்குல ஆழமுமுள்ள படைச் சாலை பிரிக்கிறது; ஆனால் சீமைக்கலப்பையோ 7 அங்குல அகலமும் 5 அங்குல ஆழமுமுள்ள படைச் சாலைப் பிரிக்கிறது; அதாவது ஒரு படைச்சாலின் பிரிவு சுமார் 35 சதுர அங்குலமிருக்கும். ஒரு ஏக்கர் 4840 சதுரகஜமானதால், 5 அங்குல ஆழம் கிளறப் படும்போது $\frac{4840 \times 5}{36}$ அதாவது 672 கனகஜமண் கிளறப்பட்டு புறட்டப்படுகிறது. இப்படி ஒரு ஏக்கர் உழு $\frac{4840 \times 36}{7} \times \frac{1}{1760} =$ சுமார் 14 மடிக் மாடுகள் நடக்கும்படியாகவிருக்கும். இவ்விதம் ஒரு ஏக்கர் உழு $1\frac{1}{2}$ நாள் செல்லும்.

சீமைக்கலப்பையினால் உழு ஒரு தினத்திற்கு
நேரிடும் செலவு.

கலப்பை ரூபாய் 20 என்று வைத்துக்கொண்டும், வருஷத்தில் 60 நாள் வேலை செய்கிறதென்று வைத்துக்கொண்டும், ரூபாய் 100க்கு வருஷம் 1க்கு ரூபாய் 12 வீதம் வட்டி போட்டுப்பார்த்தால் ஒரு நாளைக்கு வட்டி ஆகிறது.

$$\frac{12 \times 20 \times 1}{100 \times 60} = \text{ஒரு சுமார்} \quad \dots \quad 0-0-8$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ஒரு கலப்பை 10 வருஷமிருக்கும்;} \\ \text{ஒரு காளைக்கு சேதாரம் பார்த்தால்} \\ \frac{20}{100} \times \frac{1}{60} \dots \dots \dots \end{array} \right\} \quad 0-0-6$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{மாட்டின் விலை 80 ரூபாயென்றுவைத்} \\ \text{துக்கொண்டு வருஷத்தில் 300 நாள்} \\ \text{வேலை செய்கிறதென்றும் வைத்துக்கொ} \\ \text{ண்டு 1 காளைக்கு ஒரு 80க்கு வட்டி பார்த்} \\ \text{தால் } \frac{20}{100} \times 80 \times \frac{1}{60} = \dots \end{array} \right\} \quad 0-0-6$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{மாட்டுக்கு சேதாரம் ரூபாய் 100க்கு} \\ \text{ரூபாய் 10 என்றும், அதை 300 காளைக்} \\ \text{குக்கணக்கிட்டால் ஒரு காளைக்கு} \dots \end{array} \right\} \quad 0-0-5$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{கலப்பை செப்பனிட வருஷம் 2 ரூபா} \\ \text{யென்றுவைத்துக்கொண்டு 60 காளைக்கு} \\ \text{கணக்கிட்டால் ஒரு காளைக்கு} \dots \end{array} \right\} \quad 0-0-6$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ஒரு காளைக்கு ஒரு ஜதைமாட்டுக்கு} \\ \text{தினி வகைஞ்ச செலவு} \dots \end{array} \right\} \quad 0-6-0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{உழுகிறவன் கூலி} \\ \text{1 காளைக்கு} \end{array} \right\} \quad 0-3-0$$

$$\text{ஆக மொத்தம் சுமார்.} \quad 0-12-0$$

ஆக சீமைக்கலப்பையால் 5 அங்குலம் ஆழம் ஒரு ஏக்கர் உழ சுமார் 1 ரூபாய் செலவு பிடிக்கும்.


நாட்டுக்கலப்பை உழும்போது மேலே 5 அங்குலம் அகலமும், அடியில் $\frac{1}{2}$ அங்குலம் அகலமும், 4 அங்குலம் ஆழமும் உள்ள படைச்சாலை உண்டாக்குகிறது. படைச்சாலின் அகலம் 5 அங்குலமானதினால்,

$\frac{4840}{5} \times 36 \times \frac{1}{1760}$ (ஒரு ஏக்கர் உழ) 20 மயில் நடை மாட்டுக்காகிறது. படைச் சால் ஒன்றோடொன்று சேர்த்தாப்போலிருந்தால் ஒரு ஏக்கர் உழ மாடு நடக்க இப்படி 20 மயில் செல்லும் ஆனால் நாட்டுக்கலப்பை வேலையில் படைச்சால் ஒன்றோடொன்று சேர்த்தாப்போலிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஒரு பூமியை 4 அங்குலம் ஆழம் நன்றாய் உழ, குறைந்த பட்சம் 3 உழவாவது உழவேண்டியிருக்கிறது. நாட்டுக்கலப்பை உழவில் 2 படைச்சால்களுக்கு மத்தியில் எப்போதும் சிலபாகம் உழுபடாமலே இருக்கும். ஆகையால் ஒரு ஏக்கர் உழ, மாடு குறைந்த பட்சம் 40 மயிலாவது நடக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இப்படி மாடு 40 மயில் நடந்து ஒரு ஏக்கர் நாட்டுக்கலப்பையால் நன்றாய் உழ தினம் 8 மணி மேனிக்குக் குறைந்த பட்சம் 3 நாள் செல்லும். மாட்டின் தினிக்கு தினம் 5 அணுவாகவும் உழுகிறவன் கூலி தினம் 3 அணுவாகவும் ஒரு ஏக்கர் நாட்டுக் கலப்பையால் உழ சுமார் ரூ. 1-8-0 ஆகும். இப்போது நாட்டுக்கலப்பை சீமைக்கலப்பையின் தாதுமீயும் நன்றாய் விளங்குகிறதல்லவா? நாட்டுக்கலப்பையினுடைய வேலையானது மட்டமாயிருப்பதுடன் அதிக செலவுள்ளதாகவும், காலம் ஜாஸ்தி பிடிக்கக்கூடியதாகவுமிருக்கிறது. சில பருவங்களில் காலத்தினுடைய விலை மதிப்பற்ற தென்றும், நிரம்ப முக்கிய மென்றும் யாருக்குத்தான் தெரியாது?

குடிகள் புஞ்சையில் 5, 6 ஏக்காவுக்கு ஒரு கலப்பையும், புஞ்சையில் 3 ஏக்காவுக்கு ஒரு கலப்பையும் வைத்திருக்கிறார்கள். உரப்பான 15 ஏக்கர் புஞ்சை உழவு செய்கிறதற்கு ஒரு சீமைக்கலப்பை போதுமானது. இந்த விஸ்தீரணத்துக்குக் குறைவுபட்டால் சீமைக்கலப்பைக்குப் போதுமான வேலை இருக்காது. டாப்டர் வாயல்கர் நில விஸ்தீரணம் ஜாஸ்தியாயுள்ள விடங்களிலும், கரும்பு சாகுபடிக்கும், குந்தானத், அருகம் புல் முதலிய களைத்தொந்தரவு இல்லாத பூமிகளிலேயும், மழை ஜாஸ்தியாயுள்ள இடங்களிலேயும், ஆகிய இந்த நான்கு வழிகளில் சீமைக்கலப்பையை தாராளமாய் உபயோகிக்கலாமென்று சிபார்சு செய்கிறார்.

—:0:—

(2) வோர்வாரி.



எங்கெங்கே சீமைக்கலப்பை உபயோகப்படுத்தப் படுகிறதோ, அங்கேபெல்லாம் வேர்வாரியை கட்டாயம் உபயோகப்படுத்தவேண்டும். இது சட்டத்தில் கூருள்ள முனைகள் அநேகம் அடித்ததாக இருக்கும் ஒரு கருவி; அம்முனைகளுக்கு வேர்வாரி பல் என்று பெயர். பற்கள் வேர்வாரிச்சட்டத்தில் ஒன்றுக்கொன்று சமதூரமாகவும், ஒருவரிசை பற்கள் மறுவரிசை பற்களுக்கு நேராக இராமல் விலகிப்பொருந்தியிருக்கும். இப்பற்கள் உபயோகிக்கும்போது எங்கும் ஒரே விதமாகப் பதையும்.

பிரயோசனம்.

மண்ணுக்குள் இருக்கும் புல், பூண்டு, முதலிய களைகளின் வேர்களை நன்றாய் வாரிக்கொண்டு வரும். உதிராமலிருக்கிற மண்ணுங்கட்டியைத் தூளாக்கிவிடும். விதைத்த தானியத்தை மண்ணால் மூடும். பூமியை ஒத்தாப்போலாக்குகிறது. இப்படிச் செய்வதனால் விதையும் ஒத்தாப்போல் விழுந்து ஒத்தாப்போல் முளைக்கிறது. உழவு முதலிய செய்கோத்தி செய்யப்பட்ட வயலில் மழை பெய்து பூமி கெட்டிப்பட்டுப் போய் விட்டால் அதைக்கிணடிவிடப் பிரயோசனப்படும். வேர்வாரியில் வேலைக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறு வடிவமாய் அமைக்கப்படும். கட்டி உடைக்கிறதற்கு நிரம்ப கனமுள்ள மரக்கட்டைகளில் நீளமான பற்கள் அமைந்துள்ளதாக இருக்கும். விதையை மூடுவதற்கும் மழையால் மூடிப்போன விதைக

ளின் முனை வெளிவர பூமியைக்கிளறவும் சின்ன பற்களையுடைய இலேசான வேர்வாரி போதுமானது. சுமார் 15 ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு வேர்வாரியின் ஒரு நாள் வேலைக்குச் செலவு விபரம்.

ஒரு ஜதை மாட்டுக்கு வாடகை ரூ.	0—8—0
ஒட்டுகிறவன் கூலி 1 நாளைக்கு „	0—3—0
சேதாரம் வகைரா „	0—1—8
ஆக ரூ.	0—12—8

ஒரு நாளைக்கு 4 ஏக்கர் வேர்வாரியால் வேலை செய்யலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏக்கர் வேர்வாரியால் வேலை செய்ய சுமார் 0—3—2 செலவாகிறது.

(3) உருளைகள்.

மரத்தினாலாவது; கல்லினாலாவது, இரும்பினாலாவது தரையில் தடையின்றி உருளத் தக்கதாய்ச் செய்து சட்டத்தில் மாட்டி, அந்தச் சட்டத்தில் ஏருது இழுக்க ரக்காலுடன் அமைந்திருக்கும் ஒரு கருவி. சாதாரணமாய் மர உருளையே போதுமானது.

பிரயோசனம்.

வேர்வாரிகளால் உடைக்கப்படாத கட்டிகளை உடைக்கிறது. கற்கள் ஏதாவது நீண்டுக்கொண்டிருந்தால், அறுப்புக் காலத்தில் அரிவாளில் படாம இருக்கும்படி மண்ணில் அழுத்திவிடுகிறது.


மண் நிரம்ப பொலபொலப்பாக இருந்தால் அதை கெட்டிப்படுத்துகிறது. அப்படி கெட்டிப் படுத்துவதால் பூமியில் பூச்சி, புழுக்கள் அதிகமாக விர்த்தியாகிறதில்லை.

நிரம்ப சிறியவிதைகள் தெளிக்கும்போது பூமியில் ஆழத்தில் போய் முளை காணாமல் கெட்டுப்போய் விடுவதைத் தவிர்க்க உருளையால் கெட்டிப்படுத்தி பிறகு தெளிப்பது நல்லது. இப்படி அவுரி, ராகி, புகையிலை முதலிய சிறு விதைகள் தெளிக்குமுன் உருளையால் அவசியம் வேலை செய்யவேண்டும். உருளைகள் புஞ்சைக்கு உபயோகமே ஒழிய நஞ்சைக்கு உபயோகமில்லை. புஞ்சையிலேயும் மணல் சாரிக்கும் பொலபொலத்த மண்களுக்கும் தான் பிரயோசனப்படும். சாதாரண 10 ரூபாய் விலையுள்ள உருளையால் ஒரு ஏக்கர் வேலைசெய்ய செலவு விபரம்.

ஒரு நாளைக்கு மாட்டுக்கு வாடகை ரூ.	0—8—0
ஆள் கூலி ...	0—3—0
சேதாரம் ...	0—1—4
ஆக.	0—12—4

ஒரு நாளைக்கு 4 ஏக்கர் உருளையால் வேலை செய்யலாம். ஆகையால் ஒரு ஏக்கர் வேலை செய்ய சுமார் ரூ. 0—3—1 செலவாகிறது.

3. (a) மாகூல் கல்லுருளை.



கதிரடி போரடிக்கு மாடுகளை பிணையலாகக்கட்டி தானியம் வைக்கோலிலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றது. இதற்குப் பதிலாக கல்லுருளையை கதிரின் பேரிலும், போரின் பேரிலும், ஒட்டினால் சுலபத்தில் தானியம் பிரிந்துவிடும். மாட்டுப் பிணையலைப் பார்க்கிலும் இதில் செலவு நிரம்ப மட்டு. இதைத் தமிழ் ஜில்லாக்களில் போரடிக்கு அனுப்புகத்தில் கொண்டுவந்தால் நிரம்ப அனுகூலமுண்டு. சோளத்தை கதிரிலிருந்து பிரிக்க 4 ஏருதுகளை பிணையல் கட்டினால், 8 மணி சாவகாசத்தில் சுமார் 200 பட்டணம்படி தானியத்தை கதிரிலிருந்து பிரிக்கும். கல்லுருளையை 2 ஏருதுகளைக்கொண்டு 6 மணி சாவகாசம் வேலை செய்தால் சுமார் 500 பட்டணம் படி தானியத்தை கதிரிலிருந்து பிரிக்கிறதாய்.

(4) களை எடுக்கும் கருவி.

இது அநேகமாய் நாட்டுக்கலப்பையைப் போலத் தான்; ஆனால் கொழுமோடு இருக்கும். இதில் அநேகத் திணுகளுண்டு. உழுத நிலத்தை நெகிழச் செய்வதற்கும் அல்லது உழுவதற்கு முன் பூமியை பெயர்க்கிறதற்கும் இதை பிரயோகிப்பதுண்டு. பயிர் அடர்த்தியாக இருந்து அதைக்கலக்கச் செய்வதற்கும், பயிருக்கு நடுவில் கொத்தி களையெடுப்பதற்கும், இக் கருவியால் மாடு கட்டி இரண்டு வரிசைப் பயிருக்கு நடுவில் ஒட்டுவதுண்டு.

பிரயோஜனம்.

ஆட்டுக்கிடை, மாட்டுக்கிடை எருவை பூமியில் ஒத் தாப்போல் கலப்பதற்கும், ஆழமாய் ஓடி தொந்தரவு செய்யும் களைகளைத் தொலைப்பதற்கும், பூமியின் ஈரத்தை ஆவியாகப் போகாமல் பாதுகாப்பதற்கும், பூமியின் செய்நேர்த்திகளை சீக்கிரம் செய்வதற்கும், பயிரடித்தலுக்கும் இக்கருவி பிரயோசனமாகும்.

ஒரு ஏக்கர் வேலையையே செலவு விபரம்.

35 ரூபாய் விலையுள்ள ஒரு களையெடுக்கும் கருவி ஒரு நாளில் 2½ ஏக்கர் கொத்தி களையெடுக்கும். இதற்கு ஒரு ஜோடி மாடு பெரிதாக இருந்தால் போதுமானது.

ஒரு களைக்கு மாட்டுக்கூலி	ரூ.	0—8—0
ஒட்டுகிறவன் கூலி	...	0—3—0
சேதாரம்	...	0—3—6
	ஆக ரூ.	0—14—6

ஒரு ஏக்கரவுக்கு செலவு சுமார் ... 0—6—0

பயிர்த்தொழிலில் சாதாரணமாய் வழங்கும் கருவிகள், ஏறும், வேர்வாரியும், உருளையுமாம். உழவு செய்நேர்த்தி காரியங்களில் பூமி முதலில் கலப்பையால் உழப்பட்டு, கட்டிகளை உடைப்பதற்காக கனமான வேர்வாரியால் வேலை செய்யப்படுகிறது. பிறகு அநேகமாய் உருளையால் கெட்டிப்படுத்தப்பட்டு விதை

கள் கையாலேயோ, அல்லது வரிசை வரிசையாகவோ தெளிக்கப்படுகின்றன. விதையை மூடுவதற்கு லேசான வேர்வாரியால் வேலை செய்யப்படுகின்றது. சில சமயம் கலப்பையால் உழுதபிற்பாடு களையெடுக்கும் கருவியால் வேலை செய்யப்படுகின்றது. பூமி நிரம்ப களைத் தொந்தரவால் மூடப்பட்டிருந்தாலும், வறட்சிகாலமாக இருந்து பூமியினுடைய ஈரத்தைப் பாதுகாக்கவேண்டியிருந்தாலும் அந்தக்காலங்களில் கலப்பையை உபயோகப்படுத்தாமல் களையெடுக்கும் கருவியைக்கொண்டு பூமியைக் கீறிக் கிண்ட உபயோகிக்கலாம். இப்படி நமது இராஜதானி கவான்மெண்டு பண்ணைகளில் உழவு செய்கிறீர்த்திகள் நடந்துகொண்டு வருகின்றன.

நமது இராஜதானி தென் ஜில்லாக்களில் பூமியை உழ, நாட்டுக் கலப்பை, அல்லது கொழுக் கலப்பையைக்கொண்டு வேலைசெய்து கட்டிகளைச் சிலசமயம் சட்டக்கம்புகளால் உடைத்து, சமத்துவம் செய்வதற்குச் சில சமயம் பரம்புப்பலகையைக் கட்டி இழுத்து விதை மூட நாட்டுக் கலப்பையைக்கொண்டு உழுதாவது அல்லது மூட்பட்டலைக்கட்டி இழுத்தாவது மூடுகிறார்கள். ஆனால் கலப்பை, கர்நூல், பல்லாரி, அனந்தபுரம் ஜில்லாக்களில் செய்கிறீர்த்தி வேலைகளுக்கும், பின்புச் செய்கிறீர்த்தி வேலைகளுக்கும் அநேகவித சொற்ப விளையுள்ள நல்ல பிரயோசனமுள்ள கருவிகள் இருக்கின்றன. அவைகளில் அநேகமாய் எல்லாம் தென் ஜில்லாக்களில் பரவுவது நலம்.

அவைகளாவன.

(1) பெந்த மடக்கா. இது ஒரு பெரிய நாட்டுக் கலப்பை. இது சுமார் $\frac{1}{4}$ டன் நிறையிருக்கும். இது 4, 5 அல்லது 6 ஜோடி மாடுகளால் இழுக்கப்படும். கலப்பைக்குச் சமீபமாயிருக்கும் ஜதை நிரம்ப பெரிய தாமிருப்பதுமன்னியில் நிரம்ப நீண்ட துகத்தடியில் பூட்டப்பட்டிருக்கும். அடுத்தவரும் ஜதைகளில் லாம் வரவா குறுகிவரும் துகத்தடியில் பூட்டப்பட்டிருக்கும். இதனால் படைச்சாலை பெயர்க்கும்போது மாடுகளுக்கு சிரமம் ஜாஸ்தி கொடுக்கிறது. நன்றாய் பூமியைக்கிளற, குறுக்கு உழவு கட்டாயம் அவசியம். இல்லாவிடில் சிவபாகம் உழுபட்டால் சின்றுவிடும். 6 ஜதை மாட்டுக்கு 6 பெயர் ஓட்டுகிறவனும் 2 பெயர் கலப்பை உழுகிறவனும் வேண்டும். இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு காளில் 5 ஏக்கர்தான் உழ முடியும். குறுக்கு உழவு அவசியமானதால் ஒரு ஏக்கரை உழ 4 நாள் செல்லும். இதை வருஷாவருஷம் உபயோகிக்கிறதில்லை. பூமியில் கோளையும், புல்லும் ஜாஸ்தியாய் விட்டால் அதைத் தொலைப்பதற்காகவே 3 வருஷத்திற்கு ஒருதாமாவது அல்லது 4 வருஷத்திற்கு ஒருதாமாவது வேலை இல்லாதகாலத்தில் கூட்டின்பேரில் குடிகள் வேலைசெய்கிறார்கள். இதன் விளைவு சுமார் 5 முதல் 12 ரூபாய் வரையிலிருக்கும். பருத்தி பயிரிடும் கரிசல் காட்டில் 10, 12 ரூபாய் செலவுடன் களைதொலைப்பதற்காக இக்கலப்பையை உபயோகிப்பதற்குப் பதிலாக


60 ஸ்பாய் பொருமானமுள்ள இரும்புக் கலப்பை உபயோகித்தால் செலவில் சிறப்ப லாபம் உண்டு.

(2) இதற்கு அடித்தபடி மடக்கா என்று ஒருவித கொல்லைக்கலப்பை உண்டு. அது பெத்த மடக்காவைப் போல் பெரிதாக இல்லாவிட்டாலும், சாதாரணமாய் நஞ்சையில் உபயோகப்படுத்தும் குச்சிக் கலப்பை யைப் பார்க்கிலும் சிறப்ப பெரியதாக இருக்கும்.

(3) துண்டகா. குண்டகாவும், கொர்ளுவும்தான் சாதாரண முக்கிய விவசாயக்கருவி. கொர்ளுவுக்குத் தகுந்தபடி ஆஸ்தியைக் கணக்கிடலாம். கொர்ளுவுக்கு இரண்டுபெங்கு துண்டகா கிடைக்கும். குண்டகாவா வது ஒரு கட்டையில் பிடியும், அதற்குச் சரியாக ஒரு இரும்புக் கொழுப்பானத்தை மா முனையால் அதோடு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் கருவி; கட்டையின் நடுவில் ஏர்க்கால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த இரும்புப் பிளம் அல்லது கொழு பி அடி நீளமிருக்கும். இந்தக் கொழுப்பாளம் தட்டையாக இருப்பதுடன் ஒருபக்கம் கூர்மையாக இருக்கும். இது சுமார் 3 ஸ்பாய் விலை. இதுதான் சாதாரண குண்டகை என்று பெயர். அநேக வித வேலைகளுக்கு அநேகவித குண்டகாக்கள் உண்டு. அடித்தானை அப்புறப்படுத்தவும், பூமி மண்ணை சீவவும், மேடு பள்ளத்தை சீராவவும், விதையை மூடவும், விதைமுனைக்க பூமி மழையால்கெட்டிப்பட்டிருப்பதை சீவவும், பயிர்சளுக்கு நடுவில் கொத்திக் கிளறவும், ஆகிய வேலைகளுக்கெல்லாம் குண்டகா உபயோகப்படுக.

கிறது. ஆகையால் குண்டகா நாட்டுக்கலப்பை வேலையும் வேர்வாரி வேலையும் சேர்த்து வேலைசெய்கிறது.

குண்டகா.




- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. பிடி. | 4. மோதிரம் |
| 2. மரத்துண்டு. | 5. இரும்புச்சட்டம். |
| 3. சட்டக்கால். | 6. ஏர்க்கால். |

(a) பாரதண்டகா இதில் கட்டை பெரியதாக இருப்பதுடன் அதலமானவும், கனமானவும் 3 அடி நீளமுள்ள கொழுப்பாளத்தை உடைத்தாவிருக்கும். பெத்த மடக்கா வேலை செய்தபிறகு பூமியை கிரவ இதைக் கொண்டு வேலைசெய்வார்கள். 3, 4 ஐதை மாடுகளால் இது இழுக்கப்படும். ஒரு காளைக்கு 3 ஏக்கர் வேலை செய்யும். இதன் விலை 4, 5 ரூபாய் இருக்கும்.

(b) போடுதானு குண்டகா அல்லது சாதாரண குண்டகா, இது கலப்பையின் வேலையைச் செய்கிறது. அதாவது தாட்களை நீக்கி மண்ணைச் சீவிக்கிறது. ஒட்டுகிறவன் கட்டையில் கின்றுகொண்டு அழுத்தி ஒட்டுகிறான். விதை தெளிப்பதற்கு முந்தியும் பித்தியும் வேர்வாரியின் வேலைசெய்கிறது. இரு ம்புப்பாளம் 3 அடி நீளமிருக்கும். 3 வருஷத்திற்கு ஒருதரம் பாளத்தை மாற்றும்படியாக இருக்கும். இது சுமார் 3 ரூபாய் விலை. ஒரு காளைக்கு 3 அல்லது 4 ஏக்கர்வுக்குக் குறையாமல் வேலைசெய்யும்.

மெட்ல குண்டகா.




- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. பிடி. | 4. இரும்பு மோதிரம். |
| 2. மரத்துண்டு. | 5. இரும்புத் தகடு. |
| 3. குறுக்குக்கால். | 6. ஏர்க்கால். |

(c) மெட்டல துண்டகா. இது மாடுகட்டி பயிருக்கு நடுவில் ஒட்டும் களையெடுக்கும் கருவி. குண்டகா வைப்போல் இதில் மரக்கட்டையும் ஏர்க்காலும்ருப்ப துடன், கொழு ஒரே பாளமாயில்லாமல் 3 பற்களில் 3 தனி சிறு கொழுப்பாளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்தப் பாளங்கள் பயிருக்கு நடுவில் வேலைசெய்து கொண்டுபோகும். சிவசம்பம் 6 பாளங்கள்கூட இருப்பதுண்டு. இந்தப்பாளங்களெல்லாம் மர்ப்பல்லில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். 3 பல் மெட்டலகுண்டா சுமார் 1½ ரூபாய் விலை. இது ஒரு நாளைக்கு 3 ஏக்கர் வேலை செய்யும். இது பயிரடித்தல், கொத்தல், களைபிடுங்கல் முதலிய வேலைசெய்வதுடன் பயிருக்கு மண்ணையும் அணைக்கும். இரண்டு, 3 பல் மெட்டலகுண்டா காவை ஒரே ஏர்மாட்டைக்கட்டி வேலைசெய்வதுண்டு. இதில் குண்டகைக்கு 1 ஆள் மேனிக்கு 2 ஆள் வேணும். இதில் துகத்தடி நிரம்ப நீளமாயிருக்கும். 1 ஏர் மூட்டைக் கட்டி 2 குண்டகை வேலை செய்வதால் அதாவது 6 ஏக்கர் வேலைசெய்வதால் செலவுமட்டு.

(d) தத்துலு. (ஒருவகை குண்டகா) இதுவும் பயிர்களுக்கு நடுவில் மாடுகட்டி ஒட்டி களையெடுக்கும் கருவி. இது 3 சிறு குண்டகை சேர்ந்தாப்போல் வேலைசெய்யும் கருவி. இது ஒரு ஏர் மாட்டினாலும், 3 ஆட்களைக்கொண்டும் ஒட்டப்படுகிறது. இது சுமார் 1½ ரூபாய் விலை. ஒரு நாளைக்கு 1 ஏக்கர் வேலைசெய்யும். இது அநேகமாய் கல் ஐந்துதாயுள்ள நிலங்களில் வேலை செய்யப்படுகிறது. வேலை செய்துகொண்டு போகும்போதே ஒரு குண்டகைக்கு கல்லால் தடை ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த குண்டகையைத் தூக்கிக் கொண்டுவிட்டால் வேலை தவக்கமன்றியில் எடக்கும்.

(4) கொர்ரு அல்லது விதைதெளி கருவி.



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. பிடி. | 7. விதை உடுக்கை. |
| 2. மரத்துண்டு. | 8. பிசுவுக் கட்டை. |
| 3. கலப்பைக்கொழு. | 9. பிசுவுக் கயிறு. |
| 4. மூங்கில் குழாய். | 10. பிசுவுக் கம்பி. |
| 5. உடுக்கைக்கயிறு. | 11. ஏர்க்கால். |
| 6. கொக்கி. | |

இந்தக் கருவி நாட்டுக் கலப்பையைப்போல் தீறி உழுவதற்கும், பயிர்களுக்கு நடுவில் மாடுகளால் கட்டி இழுக்கப்பட்டு கொத்தி பயிரடித்தலுக்கும், விதை தெளிப்பதற்கும் பிரயோசனப் படுகிறது.

இக்கருவி ஒரு மாக்ஸ்டெயில் கைப்பிடியுடனும், 3, 4 அல்லது 6 கொழுக்களுடன் அமைந்தவால்கட்டைகளுடனும், ஏர்க்காலுடனும், எவ்வளவு வால்கட்டைகளோ அவ்வளவு மூங்கில் குழாய்களுடனும், அம்மூங்கில் குழாய்களுக்குமேல் விதை உடுக்கும் அமைந்ததாயிருக்கும். உடுக்கையின் நாலு பக்கத்திலும் கயிறுகோத்து இறுக்கப்பட்டு, பிடியுடனும், மாத்நுண்டில் கொக்கியுடனும் ஏர்க்காவில் பிசுவு கட்டையுடனும் கயிறுகளா விறுக்கப்பட்டு, உடுக்கை குழாய்களில் பொருத்தி கட்டப்பட்டிருக்கும். இக்கருவியில் மூங்கில் குழாய்களையும், உடுக்கையையும், எடுத்து விட்டால் கொள்ளு கலப்பையாகிறது. இக்கலப்பை உழுவதற்கும், பயிரின் மத்தியிலோடுவதற்கும், பிரயோசனப் படுகிறது. உடுக்கையையும், மூங்கில் குழாயையும் சேர்த்துவிட்டால் விதைதெளி கருவியாகிறது. வால்கட்டையில் துவாரங்கள் ஏற்படுத்தி அவைகளில் மூங்கில் குழாய் பொருத்தி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். விதையை உடுக்கையில் போட்டால் அதிலுள்ள துவாரங்களின் வழியாய் மூங்கில் குழாய்களில் இறங்கி வால்கட்டையின் துவாரங்களால் பூமியில் விழும்படிக்கும். மூங்கில் குழாய்களும், உடுக்கையும் ஆட்டங்கொடுத்துப் போகா

மல் கெட்டியா யிருப்பதற்காக ஒரு பக்கத்தில் மாத்நுண்டின் கொக்கிகளில் கயிறுகளால் இறுக்கப்பட்டும், மற்றொருபக்கத்தில் ஏர்க்காவின் மேலுள்ள பிசுவு கட்டையில் கயிறுகளால் இறுக்கப்பட்டும் இருக்கும். இந்த பிசுவுக் கட்டையின் கீழ், வால் கட்டை ஆட்டங்கொடுக்காமலிருப்பதற்காக, வால் கட்டைகளோடு பிசுவு கட்டை கம்பிகளாலும், கயிறுகளாலும், இறுக்கப்பட்டிருக்கும்.

உடுக்கை.

இது நாட்டினத்தைப் போல் நடுவில் குறுகியகழுந்தையுடையதாயிருக்கும். அதிலுள்ள துவாரங்கள் குவிந்த வடிவமுள்ளதாயிருக்கும். இது கருமரம், அல்லது செம்மரத்தினால் செய்யப்படுகிறது. இதின் விலை சுமார் 0—12—0 அணா.

கொள்ளு ஒரு ஜதை மாட்டினால் ஓட்டப்படுகிறது. இதை வேலை செய்ய மாடு ஓட்டுவதற்கு ஒருவனும், விதை தெளிக்க ஒருவனுமாக இரண்டு பெயர் வேண்டும். விதை தெளிக்கிறவன் ஓட்டுகிறவனுக்கு எப்போதும் இடது பக்கத்திலேயே யிருப்பான். விதை தெளிக்கிறவன் நிரம்ப அனுபோக சாலியா யிருக்க வேண்டும். இடுப்பில் விதையுடனுள்ள ஒருவிதகடையைக் கட்டிக்கொண்டு அதிலிருந்து கையால் விதை எடுத்து உடுக்கையில் மெதுவாயும், சாக்கிசையாயும் வைக்காமல் விதையை அளவாப்ப போட்டுக்கொண்டேவருவான். விதை சரியாய் ஒத்தாப்போல் விழ

கிறதற்கு இப்படி செய்கிறான். தலைமாட்டில் திரும்புகையில் கொள்ளு ஒரு விதமாகத் திருப்பப்படுகிறது. 6 வால் கட்டையுள்ள கொள்ளுதான் சாதாரணம். ஒரு நாளைக்கு சுமார் 6 ஏகர் விதை தெளிக்கும். இதன் விலை சுமார் 10, 15 ரூபாயிருக்கும்.

இந்த கொள்ளு வேலையில் சிலவித அசௌகரியங்க ளிருக்கின்றன வென்று ஆங்கிலேய கிருஷி சாஸ்திரி கள் சொல்லுவார்கள். அதாவது:—

1. விதை தெளிக்கவேண்டிய ஆழத்தை கிரமப் படுத்தமுடியாது.

2. பயிர்களுக்கு மத்தியிலிருக்க வேண்டிய இட வெளியை மாற்ற முடியாது.

3. விதையின் அளவையும் திட்டமாய் ஒழுங்கு படுத்த முடியாது.

4. மண் சிலவேளை வால்கட்டையின் துவாரத்தை அடைத்துவிடும். அப்போது மூங்கில் குழாய்களில் விதை கிரப்பிக்கொண்டு வருமாதலால், விதைகள் ஒழுங்காய் கீழே விழாது.

மாடு பழக்கப்பட்டும், விதைக்கிறவன் அனுபோக சாலியாய் மிருத்தால் சாத்தியமானவரையில் இக்கெடு திகள் வராதபடி காக்கப்படுகின்றன.

கொத்துக் கட்டையைப்போல சிலவித விதைகளை ஆழத்தில் விதைக்கவேண்டி யிருக்கும்போது அனு போகசாலியாகிய விதைக்கிறவன் கட்டையின் மே

லேறி ஓட்ட, விதை ஆழத்தில் விழுகிறது. அவரிமுத லிய சிறுவிதைகளை பூமியின் மேல் விதைக்கவேண்டி யிருக்கும்போது தேய்ந்த வால்கட்டையை உபயோகப் படுத்துகிறான். அனுபோகத்தினால் இப்படி விதை தெளிக்கவேண்டிய ஆழத்தையும், விதையின் அள வையும் ஒழுங்கு படுத்துகிறான். கணக்காக எவ் வளவு விதை விதைக்க வேண்டுமோ அவ்வளவே ஒரு ஏக்கராவுக்கு விதைக்கிறான். தலைமாட்டில் குழாயில் மண் அடைபட்டிருக்கிறதாவென்று பரிட்சைபண்ணு கிறான். இவ்வித அனுபோகங்களால் அசௌகரியங் களை நிவர்த்தி செய்துகொள்ளுகிறான்.

கலப்புப்பயிர்களும் கொள்ளுவினால் தெளிக்கலாம்:— உதாரணமாக:—பருத்தி ஒருவரிசையும், தினை இரண்டு வரிசையும் தெளிக்கவேண்டி யிருந்தால் தினைவிழும் துவாரங்களை உடுக்கையிலடைத்துவிட்டால் பருத்தி மாதிரியே விழும். பருத்தி வரிசைக்கு அடுத்தாப்போல் தினை இரண்டுவரிசை விழுவதற்கு வேறொரு உடுக்கை யையும் மூங்கில்குழாய்களையும், சேர்த்தாற்ற்போல் கட்டி அவைகளின் வழியாய் தினை விதை விழும்படி செய் வார்கள். ஆனால் இதில் பருத்திவிதை தெளிக்க ஒரு வனும், தினை விதைதெளிக்க ஒருவனுமாக இரண்டு பேர் செல்லும். மாடு ஒட்டுகிறவனுக்கு வலது பக் கத்தில் ஒரு தெளிக்கிறவனும், இடது பக்கத்தில் ஒரு தெளிக்கிறவனுமாக இருப்பான். கொள்ளுவானது திரும்புகையில் இடதுபக்கத்தி லிருப்பவன் வலதுபக்

கத்திலேயும் வலதுபக்கத்தி லிருப்பவன் இடதுபக்கத் திலேயும் இருப்பான்.

இன்னொருவிதமாகவும் கலப்புப்பயிர்கள் தெளிக்கப் படுகின்றன:

பருத்தியையும், திணையையும் கலந்து தெளிக்கவேண் டியிருந்தால் உடுக்கையில் திணைவிழவேண்டிய துவாரங் களையடைத்து பருத்திமாத்திரம் அதன்வழியாய் விதை க்கப்படும். திணை தெளிக்கிறதற்காக உடுக்கை செய் யும்வேலையை அக்கடிலோட்டா என்பது செய்யும். இந்த அக்கடிலோட்டா உருவத்தில் உடுக்கையைப்போல் இல்லாதிருந்தபோதிலும் அதிலுள்ள துவாரங்களில் மூங்கில் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது கொள்ளுக்குச் சுமார் 6 அடிக்குப் பிந்தி கயிற்றால் கட் டப்பட்டிருக்கும். இதில் தனியாக ஒருவிதை தெளிக் கிறவன் இருப்பான். கொள்ளு இழுக்கிற மாடுகளே அக்கடிலோட்டாவையும் இழுத்துக்கொண்டுபோகும்.

சனிகை கொட்டு

இது கொத்துக்கடலைத் தெளிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கிற விதைதெளி கருவி. இது கொள்ளுவைப் போலத்தான் இருக்கும். ஆனால் கிரம்ப பெரிது. சாதாரணமாய் 4 வால்கட்டைகள் அமைந்ததாயிருக் கும். இது 4 ஜோடி மாடுகளால் இழுக்கப்படும். இதில் 4 மாடு ஒட்டுகிறவனும், ஒருவிதை தெளிக்கிறவ னும் விதை ஆழத்தில் விழவேண்டியதற்காக 3, 4 பெயர்கள் மரக்கட்டையிலும் உட்கார்ந்திருப்பார்கள்.

விதை தெளிக்கிறவன் ஏர்க்காலில் உட்கார்ந்துகொ ண்டு முதல் ஐதை ஒட்டுகிறவனை பார்த்துக்கொண் டிருப்பான். 9 அங்குலம் ஆழம் கலப்பைகள் பெயர்க் கும். கொத்துக்கடலை ஆழத்தில் தெளிக்க இவ்வளவு கிரமம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. கொத்துக் கட லைக்கு முன் சோளமாவது, திணையாவது பூமியிலிருப்ப தாலும் மேல்படை மண்ணின் சாரத்தை சோளம் கிர கித்து விடுவதாலும், கொத்துக்கடலை இப்படி ஆழத் தில் தெளிக்கப்படுகின்றது. மேலும் கொத்துக்கடலை தெளிக்கப்படுகிற வம்பர்மாதத்தில் கடப்பை, கர்நூல், பல்லாரி, அனந்தபுரத்தில் மேல்படை மண்ணில் ஈர மில்லாததினாலும், கீழ்படைமண் ஈரத்தினால் முளை காண்பதற்காக இப்படி ஆழத்தில் தெளிக்கப்படுகிற தாம். கொத்துக்கடலையை வம்பருக்கு முந்தி தெளி க்க முடியாது. ஏனெனில் அப்படி தெளித்தால் மழையினால் அதிலிருந்து உண்டாகும் புளிப்புக்காடி யை அடித்துக்கொண்டு போய்விடுமாம். இப்படி ஆழத் தெளிக்கவேண்டி யிருப்பதாலும், ஈரக்குறைவி னால் முளை சரியாகக் காணாததினாலும் ஒன்றுக்கு இரண்டுபங்கு சுமார் 50 பவுண்டு வரையில் விதை தெளிக்கும்படியாக நேரிடுகிறது. சனிகை கொள்ளு வின் விலை சுமார் ரூபாய் 8.

நமது இராஜ்தானியில் உபயோகப்படுத்தப் படும் கையால் வேலைசெய்யும் கருவிகள்.

—:0:—

(1) பாம்புப்பலகை.

இது கஞ்சையில் உழுத வயலை மேடு, பள்ளம் கிரவி ஒத்தாப்போலாக்குகிறதற்கு உபயோகிக்கப்படும். சாதாரணமாய் காற்றங்காளில் தான் வேலைசெய்யப்படுகிறது.

2. மண்வெட்டி.
3. வைக்கோடாவி.
4. இருதலைக் கூந்தாவி.
5. கூந்தாவி.
6. கடப்பாறை.
7. வெட்டரிவாள்.
8. வாங்கரிவாள்.
9. கருக்கரிவாள்.

இங்கிலிஷ் வைக்கருவிகள்.

1. ஷவல் மண்வெட்டி.
2. போர்க்கு மண்வெட்டி.
3. ரேக் மண்வெட்டி.

அறுப்பு யந்திரங்கள்.

- (a) புல்வெட்டிக் கருவிகள்.
- (b) கதிரடிக் கருவிகள்.

- (c) தானியங்களை தூற்றும் கருவிகள்.
- (d) கொண்டையிலிருந்து தானியங்களை பிரிக்கும் கருவிகள்.

எண்ணெயிறுக்கும் கருவிகள்.

1. செக்குகள்.

- (a) ஒத்தைமாட்டுச் செக்கு.
- (b) இரட்டைமாட்டுச் செக்கு.

வண்டிகள்.

- (a) கட்டைவண்டி.
- (b) கைவண்டி முதலியன.

ஆலைப்பந்திரங்கள்.

அரிசி ஆலை, சர்க்கரை ஆலை, பஞ்சு ஆலை, எண்ணெய் ஆலை முதலியன.

மாட்டுத் தீவனக் கருவிகள்.

வைக்கோல் வெட்டி. (Chaff cutters.)

சோளத்தட்டை முதலிய வைக்கோல்கள் மாடுகளுக்குக் கொடுத்தால் கிரம்ப நீண்டிருப்பதால் அளிகமாகக் கழித்துவிடும். வைக்கோல் வெட்டியில் கொடுத்து சிறு துண்டங்களாக ஆக்கி மாடுகளுக்குக் கொடுத்தால் கழிக்காது. ஆகையால் வைக்கோல் வெட்டியை உபயோகிப்பதில் குடிகளுக்கு கிரம்ப லாபமுண்டு.

(பிண்ணுக்குத் தூள்செய்யும் கருவிகள்.)

பிண்ணுக்குகளை மாடுகளுக்குத் தூள்பண்ணாமல் கொடுக்கப்படின மாட்டின் தொண்டையிலடைபட்டு

அபாயம் றேரிடும். இதைத் தவிர்க்க, கருவியில் கொடுத்து உடைத்து தூள்செய்யப்படுவதை மாடுகளுக்குக் கொடுப்பதற்காக வேண்டியவர்கள் இக்கருவியைத் தருவித்துக் கொள்ளலாம்.

பாசனம்.

பாசனங்களில் ஆற்றுப்பாசனமென்றும், ஏரிப்பாசனமென்றும், கிணற்றுப்பாசனமென்றும், வானமாரி என்றும், அநேக விதங்கள் உண்டி. பாசனம் சில சமயம் சுபாவமாயும், சில சமயம் ஏற்றம் முதலிய உபாயங்களினாலும் பண்ணப்படுகின்றது. ஏற்றங்களின் விபரங்களைச் சொல்லுவதற்குமுன் மழையின் அளவுப் பிரமாணங்களை குறிக்கவேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது.

ஒரு ஏர் 4840 சதுர கெஜம். அதாவது $4840 \times 5 \times 144 =$ சதுர அங்குல விஸ்தீரணமாகிறது. ஒரு அங்குல ஆழம் ஒரு ஏர் பூமியில் மழை பெய்தால் அது $4840 \times 9 \times 144 \times 1$ கன அங்குலம் மழையாகிறது. ஒரு பட்டணம் படி 100 கன அங்குல மழையைக்கொள்ளும். ஒரு ஏரில் ஒரு அங்குல மழையானது $\frac{4840 \times 9 \times 144 \times 1}{100} =$ அதாவது சுமார் 62726 பட்டணம் படி ஜலமாம். ஒரு காலன் ஜலம் $277\frac{1}{4}$ கன அங்குல அளவுள்ளதாக யிருக்கும் ஒரு ஏரில் ஒரு அங்குல மழை $\frac{4840 \times 9 \times 144 \times 1}{277\frac{1}{4}} = 22600$ காலன் ஆகிறது. ஒரு காலன் ஜலம் 10

பவுண்டு நிறை இருக்கும். ஒரு ஏரில் ஒரு அங்குல மழையானது 226000 பவுன் நிறை உள்ளதாக இருக்கும். அதாவது சுமார் 100 டன்.

மழை அளக்கும் கருவி.

இக்கருவியானது மழை ஜலத்தை சேகரிக்க சக்கர வடிவமான தலையுள்ள ஒரு பொனலையும், இந்தப்பொனலைத் தாங்குகிறதற்கு ஸ்தம்ப வடிவமுள்ள ஒரு பாத்திரத்தையும், இந்தப் பாத்திரத்துக்குள் பொனல் வழியாய்வரும் மழை ஜலத்தை வாங்க ஒரு ஏனத்தை யும் இந்த ஏனத்திலுள்ள மழை ஜலத்தை அளக்க ஒரு அளவு கிளாசையும் உடைத்தாயிருக்கும்.

பொனல் வழியாய்வரும் மழை ஜலத்தை வாங்கும் ஏனமானது குறுகிய கழுத்துள்ளதாக இருக்கவேண்டும். ஏனெனில் அதிலுள்ள ஜலம் ஆவியாய்ப்போய் குறைந்துபோகாமல் இருப்பதற்காகத்தான்.

பொனலைத்தாங்கும் ஸ்தம்ப வடிவப்பாத்திரமானது (இதற்குள்ளான் மழை ஜலத்தை வாங்க குறுகிய ஏனமிருக்கும்.) இந்தியாவில் எங்கேயும் ஒரு அடி உயரமிருக்கும். பொனல் வழியாய் ஏந்திவைத்திருக்கப்பட்ட மழை ஜலமானது காற்றிலுள்ள நீராவியினால் அதிகரித்தாலும் அதிகரிக்கலாம் அல்லது காற்றிலுள்ள உஷ்ணத்தினால் குறைந்தாலும் குறையலாம். இப்படி கம்பி ஜாஸ்தி அதிகமில்லாமலிருப்பதற்காக மழை அளக்கும் கருவியை வீடு, சுவர், மாங்கள் முதலிய இடங்களுக்குச் சமீபத்தில் வைக்காமல் பொட்டை

வெளியில் தரையட்டத்திற்குமேல் உயர வைக்கப் பட்டிருக்கும்.

மழை பெய்தால் மழை ஜலத்தை பொனல்வாங்கி, ஒரு அடி உயரமுள்ள ஸ்தம்ப வடிவமான பாத்திரத் துக்குள்ளிருக்கும் குறுகிய கழித்துள்ள ஏனத்துக்குள் விடும். உள்ளேயிருக்கப்பட்ட ஜலம் ஆவியாகப்போகாமலிருப்பதற்காக பொனலானது ஸ்தம்ப வடிவப் பாத்திரத்தில் நன்றாகப் பொருத்தியிருக்கும். பொன லும் அளவு கிளாசும்தான் இக்கருவியில் முக்கிய பாக ங்கள். இன்றைக்கு மழை இரண்டு அங்குலமென்றால் இரண்டு அங்குலம் ஆழமுள்ள மழை ஒரு சமமான இட க்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதென்றும் அதிலிருந்து ஒரு துளி ஜலமாவது பூமியில் சுவஸிப்போகாமலும், காற் றில் ஆவியாகப் போகாமலும், அடித்துக்கொண்டு போகாமலும் ஆகிய எந்தவிதத்திலும் கஷ்டப் படாமல் இரண்டு அங்குலம் ஆழம் மழை சேகரித்து வைத்திருப்பது என்பது அர்த்தம்.

காற்றோட்டத்தில் ஒரு திறந்த பாத்திரத்தில் ஜல தை வைத்திருந்தால் ஜலம் ஆவியாகப்போய் கிராமப் ஷ்டமுண்டாகும். ஆனால் மழை அளக்கும் கருவி யில் அது ஏற்பட்டிருக்கிற தன்மையினால் அப்படி கஷ்ட ம் அடைய ஏதுவிலலை.

24 மணிக்கு ஒருதரம் காலை 8 மணியில் இக்கருவி ானது எவ்வளவு மழை ஜலத்தை உடைத்தாயிருக் ிறதென்று சோதனை செய்யப்படும்.

ஒரு வட்டவடிவமுள்ள விஸ்தீரணம் அல்லது பரப்பு அந்த வட்டத்தின் குறுக்களவின் பாதியைச் சதுரித்து ினால் பெருக்கினால் கிடைக்கும்.

பொனலுடைய வட்டமுள்ள உச்சியானது 5 அங் குலம் குறுக்களவை உடைத்தாயிருந்தால் மழை ஜலம் சேகரிக்கப்படுகிற பரப்பானது $\frac{5 \times 5 \times 22}{2 \times 2 \times 7} = \frac{275}{14}$ = சுமார் இருபது சதுர அங்குலமாகும்.

ஒரு அங்குலம் மழையெய்ததாக வைத்துக்கொண் டால் பொனலின் பரப்பில் 20 கன அங்குல மழை சேகரிக்கப்படும். $\frac{1}{2}$ அங்குலம் மழையென்று வைத் துக்கொண்டால் 10 கன அங்குல மழையாகும்.

அளவு கிளாஸ் 10 கன அங்குல மழையைக் கொள் ளும். அந்த கிளாசானது 50 பாகமாகப் பிரிக்கப்பட் டிருக்கும். ஒரு பாகத்துக்கு ஒரு சென்டி என்பது பெயர். இப்படி 100 சென்டி கொண்டது ஒரு அங் குல மழை. கிளாசை அளவுபித்த பொனல் வட்டத் தின் விஸ்தீரணத்தைக் கண்டுபிடிக்கிறோம்.

ஏற்றம்.

கிணற்றிலிருந்து ஜலத்தை மொண்டு மேலே பாச னத்துக்காகக் கொண்டுவரப்படும், உயரங்களுக்கு ஏற்றமென்று பெயர். ஏற்றங்களில் சாதாரண இரு ம்பு சால் உள்ள ஏற்றமாம், ஒற்றைக் கபிலை, இரட் டைக் கபிலை, காற்றாடியக்திரம், ஆயில் இன்சின், முச ிய அநேக தினுசுகள் உண்டு.

ஏற்றமாம். Picotta.

இதில் இருசு அல்லது அச்சு, மரமன்னியில் இரும்புக் கம்பியாயிருந்தால், கிரம்ப சுலபமாய் வேலைசெய்யும். ஜலமட்டம் 12 அடிக்குள் இருக்கப்பட்ட இடங்களிலெல்லாம் ஏற்றமாததைக்கொண்டு வேலைசெய்வது கிரம்ப மலிவு. இதில் 3 ஆள் வேலைசெய்ய வேண்டியிருக்கும். ஒருமணிக்கு சுமார் 290 கன அடி ஜலம் வீதம் ஒரு ஏகரை ஒரு அங்குலம் ஈரப்படுத்த சுமார் 13 மணி சாவகாசமாகிறது. அதாவது சுமார் 2 நாள் செல்லும். இதை ஸ்தாபிக்க சுமார் 10 ரூபாய் செல்லும். ஒரு ஏகர் ஒரு அங்குலம் ஈரப்படுத்த சுமார் ரூபாய் 1—2—0 செலவாகும்.

ஒன்றக் கபிலை:

இதில் மூடுபோவதற்கு 4 அடிக்கு ஒரு அடி சரிவுள்ள சமதளமும், கபிலையால் ஜலம் கொட்டப்படுகிற இடத்தில் 4, 5 அடி உயரமுள்ள கேர்மையான இரண்டு கட்டைகளும், இரண்டு கயிறுகளும், இரண்டு உருளைகளும், ஆகிய இவ்வித அவயவங்களுடன் அமைந்துள்ளதாயிருக்கும். இது ஒரு ஜதை மாட்டாலும், அதை ஒட்டுகிறவனாலும் வேலைசெய்யப்படுகிறது. சில ஜில்லாக்களில் 2 ஜதை மாட்டைக்கொண்டும் வேலைசெய்யப்படுகிறது. ஒரு ஜதை மாட்டைக்கொண்டு வேலைசெய்யும்பொழுது மாடு சரிவில் இறங்கி மறுபடியும் பின்னாலேயே நகர்ந்து ஏறவேண்டியிருக்கிறது. இப்படி வேலைசெய்வதில் மாட்டுக்கு கிரம்ப கஷ்டம்

உண்டாகிறது. தமிழ்நாட்டில் இந்தக் கபிலை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. பல்லாரியில் விரியானது கிரம்ப அதலமாயும் சாய்வாயிருக்கும். சரிவில் மாடுமேலே இருந்து கிழே இறங்குகிறது. உடனே மாடு அவிழ்க் கப்பட்டு இன்னொரு வழியாய் மேல்கோக்கி வருகிறது. ஒட்டுகிறவன் கயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு மேல்கோக்கிச் செல்லுகிறான். அப்போது மாடு அங்கே வந்து கிற்கும். வடக்கயிற்றையும், நுகத்தடியையும் முனைக் கட்டையால் பூட்டுகிறான். இதில் மாடுகளுக்கு பின்னால் நகர்த்துபோகிற கிராமம் இல்லாததினால் தமிழ்நாட்டுக் கபிலையைப் பார்க்கிலும் திறமென்றே சொல்ல வேண்டும். சரிவு கிரம்ப தூரமிருந்தால் ஒருஜதைக்கு மேல் 2 ஜதை மாடுகள் உபயோகப்படுத்துவதுமுண்டு. ஜலமட்டத்தின்மேல் 20 அடிக்கு உள்பட்ட கிணற்று களுக்கெல்லாம் ஒற்றைச்சால் கபிலையை உபயோகப்படுத்துவது நல்லது. ஒருமணிக்கு சுமார் 256 கன அடி ஜலம் இறைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஏகரை ஒரு அங்குலம் ஈரப்படுத்த சுமார் 14 மணி சாவகாசம் செல்லும். இந்தக் கபிலையைக் கட்டிமுடிக்க சுமார் ரூபாய் 25 செலவாகும். ஒரு ஏகரை ஒரு அங்குலம் ஈரப்படுத்த சுமார் 1½ நாள் செல்லும். இதற்குச் சுமார் ரூபாய் 1—1—0 செலவாகும்.

சுற்றுக்கபிலை அல்லது இரட்டைக் கபிலை.

இதில் இரண்டுதோல் இறைவைச் சால்களும், கயிறுகள் சுற்றி இருக்கப்பட்ட தம்பட்ட வடிவமுள்ள

ஒரு ராட்டினமும் (இந்த ராட்டினம் பூமியிலிருந்து 6 அடி உயரத்தில் ஒரு ஸ்தம்ப அச்சில் கோர்க்கப்பட்டிருக்கும்) ஒரு ஏர்க்காலும் உள்ளதாயிருக்கும்.

இந்த ராட்டினம் ஆட்டம் கொடாமலிருப்பதற்காக, கோர்க்கோணத்தோடு இருக்கப்பட்ட இரண்டு உத்திரத்தோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த உத்திரங்களைத் தாங்க நான்கு கட்டைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும். இந்த உத்திரங்களிலும் ஸ்தம்பத்திலும் ராட்டினம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த ராட்டினமானது சுற்றக்கூடியது. மட்டத்தின்மேல் ஜலம் எவ்வளவு தூரம் தூக்கப்படுகிறதோ அதில் 5ல் 1 பாகம் இந்த ராட்டினத்தின் சுற்றளவாயிருக்கவேண்டும். ஏர்க்காலில் வளைவான ருகத்தடி இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கிணற்று ஓரமாகவும், ஓரோரமாகவும் கட்டைகளிருக்கும். ராட்டினத்தில் ஒரு கயிறு சுருளும், ஒரு கயிறு பிரியும்; ராட்டினத்தைச் சுற்றி மாடு 1½ சுற்று வந்தால் ஒருசால் ஜலம் மொண்டு கொட்டப்படும். மறுபடி திருப்பினால் சால் கிணற்றில் இறங்கும். இந்தக் கபிலையைக் கட்டிமுடிக்க சுமார் ரூபாய் 135 செலவாகும். ஜல மட்டத்துக்குமேல் 20 அடி உயரமிருந்தால் 1 மணி நேரத்தில் 384 கன அடி ஜலம் இறைக்கப்படும். ஒரு ஏகரில் ஒரு அங்குலம் நாப்படுத்த சுமார் 10 மணிகாலம்செலலும். இதற்கு சுமார் அரை 10 செலவாகும்.

ஏற்றங்களின் சிலாக்கியத்தை அநிய 4 விஷயங்கள் கவனிக்கப்படவேண்டும்.

1. அதன் வல்லமை.
2. அதிக சிக்கலான அவயவங்களில்லாம விருத்தல்.
3. வேலைசெய்வதின் கிரமம்.
4. வேலைசெய்ய வேகம் செலவு. ஆகிய இந்த நான்கையும் கவனித்து ஏது சிலாக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறதோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.

நீர் மட்டத்திற்குமேல் 1, 2 அடி உயரமுள்ள இடங்களுக்கு இறைக்கடையாலும், முக்காலிமரத்தில் கயிறுகளால்கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட மர இறைஆப்பையாலும் ஜலம் பாய்ச்சப்படுகிறது.

பில விஸ்தீரணம் ஜாவதி உள்ள இடங்களிலும் அதாவது 50 ஏகருக்கு குறைவாக இடங்களிலும் ஜலத்தட்டு இல்லாத இடங்களிலும் லாபகரமான பயிர்களை உண்டாக்கினால் ஆயில் இருநின் வைத்து வேலைசெய்வது லாபம் உண்டு.

எமது இராஜதானியில் உஷ்ணமான பாகங்களில் சாதாரண பூமியில் கலப்புப் பயிர்களுக்கு வாரம் 50 டன் தண்ணீர் வேண்டியிருக்கும். அதாவது வாரம் ½ அங்குலம் மழைபாடுகிறது. கரும்புக்கும், வாழைக்கும் வாரம் ஓங்குலம் மழை அல்லது 100 டன் தண்ணீர் வேண்டும். பொதுவாகவே தோட்டக்கால் பயி

ர்களுக்கு வாரம் 1½ அங்குலம் முதல் ஓங்குலம் வரையில் மழை வேண்டியிருக்கும்.

புதிதாக கட்ட பயிர்களுக்குச் சிறுபான்மையில் அடிக்கடி ஜலம் வேண்டியிருக்கும். வேளாண்மையிலேயே கால்நடைகள் 1-க்கு ஒருதரம் இவ்வித பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சவேண்டும். வேளாண்மையில் பூமியில் வளருகிற பயிர்களுக்கு நீடித்த இடைவெளியில் தேவையான ஜலம் கிடைத்தால் போதுமானது. எப்போதும் நீடித்த இடைவெளியில் ஏராளமான பாசனம் கொடுப்பது சொற்ப இடைவெளியில் சொற்ப பாசனம் கொடுப்பதைப் பார்க்கிலும் நிரம்ப நன்று. ஏனெனில் ஏராளமான பாசனம் அதிக ஆழம்போய்ச் சுவறுவதுமன்னியில் வேர்களும் அதிக ஆழம் ஓடுகின்றன.

சிலவித பயிர்களுக்கு தண்ணீரின் சூனமே சிலாகியமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. உதாரணமாக—புகை இலைக்கு உவர்த் தண்ணீர் நல்லதாக கொள்ளப்படுகிறது. சக்கரவள்ளிக்கு நல்ல ஜலம் வேண்டியிருக்கிறது.

ஆற்றுப் பாசனத்தைப் பார்க்கிலும் கேணிப் பாசனத்தில் ஜலம் நிரம்ப செட்டாகச் செலவழிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் தோட்டக்காவில் செட்டாயும் நஞ்சையில் ஜலம் ஜாஸ்கியாயும் செலவழிக்கப்படுகிறது. கேணிப்பாசனத்தைப் பார்க்கிலும் ஆற்றுப் பாசனத்தில் 3 பங்கு ஜலம் ஜாஸ்கியாக செலவழிக்கப்படுகிறது.

ஜலத்தினுடைய அளவெல்லாம் பூமியினுடைய சுபாவத்தையும், பூமி வாய்த்திருக்கப்பட்ட இடத்தையும், சீதோஷண ஸ்திதியையும், கால ஸ்திதியையும், பாசனத்துடைய உத்தேசத்தையும், பயிரின் சுபாவத்தையும், பொருத்ததாக இருக்கிறது. பூமி சமமாக இல்லாமல் செங்குத்தாக இருந்தால் அப்பேர்ப்பட்ட நிலங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஜலம்வேண்டி இருக்கும். வண்டல் படியவேண்டியிருந்தாலும் அப்போது ஜாஸ்தி பாசனம் பண்ணப்படும்.

எரு.

“எருச்செய்கிறது இனத்தான் செய்யமாட்டான்; உரம் செய்கிறது, உறவுடையான் செய்யமாட்டான்,” என்ற பழமொழி யாருக்கும் தெரிந்ததே. எப்படி பசு, கன்று ஊட்டாவிட்டால், பால் சுறக்காதோ அது போல் உரம் கொடுக்காத வயல் நல்ல கண்டுமுதலைக் கொடுக்காது. பூமியானது பயிரூட்டங்கள் அடங்கிய களஞ்சியம். பயிர்களைப் பூமியில் உண்டாக்கினால், ஊட்டங்கள் குறையுமல்லவா. இக்குறைவுக்கு எரு வினால் ஈடுபண்ணாமல் பயிர்செய்துகொண்டே போனால் வரவாக சண்டுமுதல் கம்பப்படும். இப்படிப் பூமி வளம் குறைந்து கண்டுமுதல் கம்பப்படாமலிருப்பதற்காக, எருவிட்டுப் பயிர்செய்யவேண்டியது முக்கியம்.

1. மாட்டுக்கொட்டில் எரு.

மாட்டுக்கொட்டிலில் விழும் சாணம், மூத்திரம், களம், குப்பை இவைகளை எல்லாம் சாஸ்திரோக்த

மாய்ச்சேதப்பட்டாமல் ஓரிடத்தில் சேர்த்துவைத்து மக் கும்படிசெய்து ஊதாக்கருப்புநிறமாய் மாறிப் பக்கு வத்துக்கு வந்து இருப்பதுதான் மாட்டுக்கொட்டில் எருவென்பது. இவ்வெருவில் இலை, தழை, உமிழ், உதவாதென்று விலக்கியகுப்பை, சாம்பல் இவைகளும் சேர்த்திருக்கலாம். இவைகளில் குடிகள்மூத்திரத்தைச் சேகரித்துவைப்பதே கிடையாது. மூத்திரம் பூமியில் ஓடி, ஒதம்பலாய்ப் போயோ, அல்லது வேறுவிதமாக நஷ்டமடைந்தோ, குடிகளுக்குப் பிரயோசனமில்லாமல் கெட்டுப்போய் விடுகிறது. விறகு கிராக்கியென்று அடுப்பு எரிக்கச் சாணத்தை முட்டைதட்டி விடுகிறார்கள். ஆகையால் மாட்டுக்கொட்டில் எருவில் நிரம்ப முக்கியமான மூத்திர நஷ்டத்தினாலும், பிறகு சாண நஷ்டத்தினாலும் நமது குடிகள் நஷ்டத்தை அடைகிறார்கள். மாடுகளுக்குக் கூளம், குப்பைகளைப் பதிகையாக் விரித்து, அவைகள் மூத்திரத்தைக் கிரகிக்கும் படி செய்யவேண்டும். இப்படிச்செய்தும், சாணத்தை முட்டையாக்காமலும் நமது குடிகள் சிலவிடங்களில் சேகரித்துவைப்பதுபோல் பொட்டல் வெளியில் குழிகள்வெட்டி அவைகளில் போட்டுவிடுகிறார்கள். இப்படிப் போட்டுவிடுவதினால் வெய்யிலால் காரமெல்லாம் ஆவியாய்ப் போய், மழையால் சத்துக்களெல்லாம் கரைத்துக்கொண்டு ஓடிப்போய்க் குடிகள் நஷ்டமடைகிறார்கள். சாணத்தை முட்டைதட்டி எரித்துவிடும்காலத்திலும், அப்படி முட்டைதட்டாமல் சாஸ்திரோக்த

மாய்ச்சேகரித்துவைக்கத் தெரியாமல் பொட்டல்வெளியில் சேகரித்து வைக்கும்போதும் ஆகிய இந்த 2 வகையினாலும் குடிகள் நஷ்டமடைகிறார்கள்.

ஒரு ஜதை மாட்டின் சாணத்தை ஒருவருஷம் சேகரித்து முட்டைதட்டினால் சுமார் 3,000 முட்டைகள் கிடைக்கும். இதன்விலை சுமார் ரூபாய் 4க்கு மேல் போகவே போகாது. சாணத்தையும், மூத்திரத்தையும் சாஸ்திரோக்தமாய் சேகரித்துவைத்தால் ஒருஜதை மாட்டிலிருந்து சுமார் 7½ டன் அதாவது சுமார் 20 வண்டிக்குக் குறையாமல் எருக் கிடைக்கும். இதன்விலை சுமார் ரூபாய் 20. ஒருஜதை மாட்டின் எருவிலிருந்து ரூபாய் 4 கிடைக்கிறது லாபமா, ரூபாய் 20 கிடைக்கிறது லாபமா, நீங்களே அறிந்துகொள்ளுங்கள், ஆகையால் விறகு கிராக்கிக்காகச் சாணத்தை முட்டைதட்டாமல் இருக்கும்பொருட்டு வயல் வரப்புகளிலும் மனைகளிலும், திடல்களிலும் விருட்சங்களை உண்டிபண்ணி அவைகளை விறகுக்காக உபயோகிப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம்.

எருவைச் சாஸ்திரோக்தமாய்ச் சேகரித்துவைக்கும் விதம்.

ஒரு மாட்டுக்கொட்டிலின் கீழ் சிலம் நிரம்ப கெட்டியாயும் மிருதுவாயும் மிருப்பதோடு ஒருபக்கம் மேடும் ஒருபக்கம் பள்ளமுமுள்ள சரிவா யிருக்கவேண்டும். கடுவில் கவணைவைத்துக் கவணைக்கு இருபக்கத்திலும் மாடிகட்டும்பட்சத்தில் கவணைப்பக்கம் மேடாயும் இதர பக்கங்கள் பள்ளமாயுமிருக்கலாம். ஓரங்களில் கவணை

வைத்து நடுவில் சரிவு இருக்கலாம். பின் சொன்ன இரண்டுவிதத்திலும் மாட்டுக் கொட்டிலில் இரண்டு வரிசை மாடுகட்டும்படியாக இருக்கும். சரிவுகளின் கடைசியில் ஒரு ஜலதாரை ஏற்படுத்தி அந்த ஜலதாரையில் விழும் மூத்திரம் வெளியில் ஒருசட்டியில் விழும்படி, ஏற்பாடுபண்ணிவிட வேண்டும். கொட்டிலுக்குச் சமீபத்தில் எருக்குழி ஒன்று வெட்டி அக்குழியின் அடியிலும், பக்கத்திலும், களிமண்ணால் மெழுகி, மேலே கொட்டகைபோட்டுக்காற்றினாலும் மழையினாலும் கூடம் வராமலிருக்கும்படி செய்து, தினம்விடும் சாணத்தையும் கூளம், குப்பை, மூத்திரத்தையும் கொட்டிப், பிறகு நிரவி, தினம் அதன்மேல் காப்பத மண்ணைத் தூவிக் கொண்டு வரவேண்டும். குழியைச் சுற்றிவர விளிம்புகள் கட்டி, வெளி ஜலம் குழியில் விழாமல் இருக்குமாபடியாயும் செய்யவேண்டும். எருக்குழியில் கூளம், குப்பை, இலை, தழைகள், சேர்த்துக்கொண்டு வரலாம். குழியில்விடும் தழைமுதலிய எருக்களைக் கலந்து அப்போதப்போது சமமாய் நிரவி மிதித்து அழுத்திவைத்திருக்கவேண்டும். இப்படி வைத்திருந்தால் மெதுவாயும், ஒத்தாற்பேரலவும் எருவானது மக்கிக்கொண்டே வரும். நன்றாய் மக்கி ஊதாக்கருப்பாய் மாறி, வெண்ணெய்போன்ற பக்குவமடையும் போது எடுத்து உபயோகிக்கலாம். இவ்வித எருவை வெட்டி எடுத்தால் காரமுள்ள ஒருகூற்று வெளிவரும். அக்காற்றில் ஈரமஞ்சள் துணியைப் பிடித்தால் அது

சிவப்பு நிறமாகிவிடும். ஜலதோஷமுள்ளவர்கள் அக்காற்றில் கின்றால் ஜலதோஷம் மாறிவிடும். இதில் சாணத்தைப்பார்க்கிலும் 4பங்கு விலையுயர்ந்த பயிருட்டங்கள் அடங்கி இருக்கிற மூத்திரமானது நன்றாய்ச் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. அடிக்கடி நன்றாய் மிதித்துவிடுவதினால் காரமான வஸ்துக்கள் ஆவியாய்ப் போய்விடுகிறதில்லை. எப்போதும் எருக்குழி ஈரப்பசையாகவே இருக்கிறது. இவ்விதம் எருவைச் சேகரிப்பது சிரமமாக இருந்தாலும் ஒரு ஜதை மாட்டிவிருந்து சுமார் 20 வண்டி முதல் 30 வண்டிவரையில் எருக்கிடைக்கும். அதாவது சுமார் 7½ டன் எருக்கிடைக்கும். மேற்கூறிய விதத்துக்கு இங்கிலீஷில் Byre-pit system என்று பெயர்.

இன்னுமொருவிதம் எருவைச் சேகரிப்பது இதைவிட சுலபம். அதற்கு Loose Box system என்று பெயர்.

இதில் கொட்டிலின்கீழ் நிலம் தரைமட்டத்திற்கு 2, 3 அடி ஆழம் கீழ்வெட்டப்பட்டுப் பள்ளமாயிருக்க வேண்டும். கீழ் நிலம்பக்கத்திலேயும் அடியிலேயும் களிமண்ணால் மெழுகப்பட்டிருக்கவேண்டும். வெளியிலிருந்து ஜலம் உள்ளே வரமுடியாமல் கல்லபலமான விளிம்போடு இருக்கவேண்டும். குழிக்கு மேல்கொட்டகை இருக்கவேண்டும். இந்தக் குழியில் ஒவ்வொரு காளும் கூளம், குப்பைகளை மாட்டுக்குப் படுக்கையாகப் போட்டுக்கொண்டு வரவேண்டும். சருகு, தழை, உரி, கருக்காய், இவைகளை எல்லாம் ஒழிந்தகாலத்தில்

எதேஷ்டமாய்ச் சேகரித்துவிவத்து தினம் கொஞ்சம், கொஞ்சமாய்ப் போட்டுக்கொண்டு வரலாம். முதலில் கூளம் குப்பையைப் பரப்பினவுடன் மாடுகளை அதில் தனித்தனியாகவாவது அல்லது 10 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள அரைகளாகத் தடுத்தாவது அனைவதில் விட்டுவிடலாம். அரை அரையாகத் தடுக்காதபட்சத்தில் மாட்டுத் தீவனத்திற்காக நடுவில் கவணைவைத்து விடலாம். அரையாகத் தடுக்கும் பட்சத்தில் அரைகளில் கவணைவைத்துவிடலாம். ஒருநாள் இரத்திரி மாட்டைக்கட்டினால் மறுநாள் கட்டுவதற்கு முன்னால் சாணங்களை எல்லாம் உடைத்துவிட்டு அவைகளின் மேல் புதுக்கூளங்களை உதறிப் படுக்கையாகப் போட வேண்டும்; தினம் சிறுகச் சிறுகப் போடவேண்டும். ஜாஸ்திபோட்டால் ஒரு சிலாக்கியமாக இல்லாததுடன் நன்றாக மக்கியுமிராது. ஆகையால் சிறுகச்சிறுகப் பிரயோசனப்படுத்தவேண்டும். இதில் மூத்திரம் சேதமன்னியில் கூளம் குப்பைகளால் உருஞ்சப்படுகிறது. மாடு நடமாடுவதால் எருவெல்லாம் நன்றாய் அழுத்தப்பட்டு காரம் வெளியில்போகாமல் இருக்கும். இப்படிக்குழி கிரம்பித் தரைமட்டத்திற்கு வந்தவுடன் எடுத்து உபயோகித்துவிடலாம். எருவை எடுக்கும்போது மேலே மக்காமலிருக்கப்பட்டவைகளைத் தனியாக ஒதுக்கி விட்டு அடியில் வெண்ணெய்போல் மெதுவாயும், கருப்பு நிறமாயும் இருக்கப்பட்ட எருவை எடுத்து உபயோகிக்கவேண்டும். அரைகுறையாய் மக்கி இருந்து

மேல் சுரண்டி எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த எருவை மதுபடியும் கொட்டினிழீழ் போட்டுவிடலாம். இதில் ஒரு ஜதை மாட்டிலிருந்து சுமார் 40 வண்டி எருக்கிடைக்கும். ஒரு காலத்திலும் 30வண்டிக்குக் குறையாது. அதாவது சுமார் 10 டன் எருக்கிடைக்கும். குடிகள் இப்போது பொட்டைவெளியில் சேகரித்து வைப்பதுபோல் வைத்தால் ஒரு ஜதை மாட்டிலிருந்து அரைகுறையாய் மக்கின மட்டமான எரு சுமார் 1½ டன் கிடைக்கும். அதாவது சுமார் 5 வண்டி.

கருக்கமாக.

ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஜதை மாட்டின் சாணத்தை முட்டைதட்டி வற்றால் சுமார் 4 ரூபாய் கிடைக்கும். ஒருஜதை மாட்டின் எருவை மழையாலும், வெய்யிலாலும் கஷ்டம் அடையும்படி பொட்டல்வெளியில் போட்டிருந்தால் ஒருவருஷத்திற்குச் சுமார் ரூபாய் 5, 6 பெறுமபடியான எரு கிடைக்கலாம்.

பயிரிடில் சீஸ்டம் பிரகாரம் ஒரு ஜதை மாட்டின் எருவைச் சாஸ்திரோக்தமாய்ச் சேகரித்து வைத்தால் வருஷத்தில் சுமார் 15, 20 ரூபாய் எருக்கிடைக்கலாம். லாஸ்பாக்ஸ் சீஸ்டம் பிரகாரம் சேகரித்தால் ஒருஜதை மாட்டிலிருந்து சுமார் ரூபாய் 30 பெறுமபடியான எருக்கிடைக்கும்.

நமது சென்னை இராஜதானியில் மாடுகள் சுமார் 100 லட்சத்துக்குக் குறையாமலிருப்பதாகத் தெரிய வருகிறது. இவைகளின் எருவைச் சாஸ்திரோக்தமாய்

சேகரித்துவைத்தால் குறைந்தபட்சம் 6 கோடி ரூபாய் க்குக் குறையாத நல்ல எரு கட்டாயம் கிடைக்கும். அப்படிச் செய்யாததினால் வருஷத்தில் ௩௫௫ குடிகள் இந்த மாட்டுக்கொட்டில் எருவிஷயத்தில் ௩௫௫ இராஜ தானியில் சுமார் 3 கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடைகிறார்கள். எல்லாவற்றையும் விளக்கிக்காட்டி இருப்பதால் நஷ்டம் அடையாத வழியை இனிமேலாவது தேடிக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

இந்த எருவை எவ்விதபூமிக்கும் போடலாம். இதன் குணம் கொட்டிலின் தன்மையும், மாடுகளின் வர்க்கத் தையும், வயதையும், தேகஸ்திதியையும், ஆகாராதிகளையும், பிச்சைசயாக விரிக்கும் களம், குப்பையின் அளவையும், குணத்தையும் பொறுத்ததாக இருக்கிறது.

இந்த மாட்டுக்கொட்டில் எருவைப் பூமியை உழுவதற்கு முன்னால் கொட்டி ஒத்தாப்போல் பரப்பி உடனே உழுதுவிடவேண்டியது. உழ முடியாவிட்டால் எருவைப் பரப்பக்கூடாது. முட்டுமுட்டாகக் கொட்டி வைத்திருந்து மண்ணால் முடிவைத்திருக்க வேண்டும். தானியப் பயிர்களுக்கு அடிக்கும் பட்சத்தில் ஏகர் 1க்கு 10 வண்டிக்குக் குறையாமல் அடிக்கவேண்டும். கரும்புமுதலிய லாபம் தாக்கடிய பயிர்களுக்கு ஏகர் 1க்கு 30 வண்டிக்குக் குறையாமல் அடிக்கவேண்டும்.

(2) பசுந்தான் எரு.

பசுந்தான் எருவாவது தலை, செடி, பூண்டுமுதலியவைகளைக்கொண்டு பூமியை உரப்படுத்துவதும் அல்லது

வது கொள்ளு, மணிலாக்கொட்டை, அவிரி, துவரை, உளுந்து, கொத்துக் கடலை, மொச்சை, காராமணி, பயறு, சணல்முதலிய பயிர்களை உண்டாக்கிப் பூக்கும் முந்தி நிலத்தோடு உழுதுவிடுவதும் தான். மேல்கூறிய பயிர்களுக்கு நிலத்தை உரப்படுத்துகிற பயிர்களை என்று பெயர். சில பயிர்களைப்போல இவைகள் அவ்வளவு பூமியைச் சளைக்கப்படுத்துகிறதில்லை. இப்பயிர்களின் வேர்களில் குண்டு ஊடுபின் அடிப்பக்கத்துக் குண்டைப்போலவும், பாலுண்ணிகளைப்போலவும் அநேகத் தோற்றங்கள் சிதறியிருப்பதைப் பார்க்கலாம். இத்தோற்றங்கள் எண்ணிமுடியாச் சிறு கிருமிகளின் குத்தில்களால் உண்டாக்கப்படுகின்றன. மேற்கூறிய பாலுண்ணி வடிவங்களில் இக்கிருமிகள் ஆகாயம் அல்லது வாயுவிலுள்ள கைட்ரஜன் கிளிக்ந்து அதனால் ஜீவித்து வருகின்றன. ஆகையால் இவ்வேர்களுில் கைட்ரஜன் எதேஷ்டமாய் இருக்குமல்லவா? எல்லா எருவைப்பார்க்கிலும் கைட்ரஜன் எரு கிரம்ப விலையுள்ளதுடன் கிரம்ப முக்கியமானது. ஆகையினாலே அவிரி முதலிய பயிர்வர்க்கங்களைப் பூமியில் உழுது மண்ணுடன் மண்ணாய்க் கலந்துவிட்டால் நில முரப்பிடுவதில் என்ன தடை? தானியப் பயிர்களுக்கு முன்னால் இப்பயிர்களில் ஏதாவது ஒன்றை உண்டாக்கிப் பூக்குமுன் உழுதுவிட்டால் பித்திய தானியப்பயிர் கல்ல கண்டு முதலைக் கொடுக்கும். கருப்புப் பசுருக்கு மத்தியிலும், பழவகைப் பசுருக்கு மத்தியிலும், சணல், கரிப்பயறு,

அவுரி, மொச்சை முதலியவைகளை உண்டாக்கி உழுது விட்டால் பூமி நன்றாய் வளப்படும். பூமியை வளப்படுத்தவேண்டுமானால் இவ்விதப் பயிர்களை உண்டாக்கிப் பூக்குமுன் உழுதுவிடவேண்டும். நமது இராஜதானியில் பசுந்தாள் எருவைப்பற்றிக் குடிகள் கிரம்பக் கவனமெடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். வளங் குறைந்துகொண்டிருக்கிற நமதுபூமிகளுக்குச் சிரமமன்னியில் கஷ்டத்தை நடுபண்ண இவ்வுரத்தினால்தான் முடியும். ஆகையால் பசுந்தாள் உரத்தை வருஷா வருஷம் உண்டு பண்ணி ஒவ்வொரு குடியும் தன் நிலத்தை வளப்படுத்தவேண்டும். நெற்பயிர் அறுவடைக்குப்பின் பசுந்தாள் உரத்துக்காவது அல்லது மாட்டுத் தீவனத்துக்காவது ஒரு பயிர் உண்டுபண்ணினால் அதற்குத் தண்ணீர்வரி கிடையாதென்று கவர்ன்மெண்டார் அனுசூலமான ஒரு உத்தரவு பண்ணி இருக்கிறார்கள். குடிகள் இவ்வனுசூலத்தினால் மேல்மேலும் பசுந்தாள் உரத்தை விர்த்தி செய்யவேண்டும். சுமார் 2 ரூபாய் சாகுபடிச் செலவில் கொள்ளுப் பயிரைப் பசுந்தழை உரத்துக்காக உண்டாக்கி விதைத்து 2 மாதத்துக்கெல்லாம் பயிரை பூமியில் மிதித்து உழுதுவிடலாம். பசுந்தழை உரத்துக்குச் சணற்பயிர் முதல்தரம். வயல் கரைகளில் புங்கன், ஆடாகொடை முதலியவைகளைப் பயிர்பண்ணித் தழைகளைக்கொண்டு பூமியை உரப்படுத்தலாம்.

(3) மலம்.

நமது இராஜதானியில் சுமார் 3 கோடி ஜனங்களிருக்கிறார்கள். நமது இராஜதானியில் ஒரு மனிதன் ஒரு வருஷத்தில் சுமார் 6 பவுண்டு கழிந்தான் சத்தும், 3 பவுண்டு எலும்பு சத்தும் மல, மூத்திராதிகளினால் கழிக்கிறான். அதாவது சுமார் 60 பவுண்டு மலத்தையும், சுமார் 600 பவுண்டு மூத்திரத்தையும் கழிக்கிறான். இந்த மல, மூத்திராதிகளைச் சுகாதாரத்துக்குக் குறைவன்னியில் ஒட்டத்திலேசுகரித்துப்பூமிக்கு இட்டால் பூமாதேவி கல்ல நன்றியறிதலுடன் ஒன்றுக்கு இரண்டுபங்குகண்டுமுதலைக் கொடுப்பாள். துவேஷத்தினாலேயும், தப்பு எண்ணத்தினாலேயும், இந்த முக்கிய எருவைப் பற்றி கவனிக்காமல் கண்ட இடம், கேட்ட இடங்களில் ஒதுக்கிச் சுகாதாரக்குறைவு உண்டாக்குவதுமன்னியில் நிலம்வளம் அடைவதையும் ஜனங்கள் கெடுக்கிறார்கள். ஒருமனிதன் வருஷத்தில் சுமார் 2 அணு பெரும்படியான மல, மூத்திராதிகளைக் கழிக்கிறானென்று வைத்துக்கொண்டாலும் நமது இராஜதானியில் குடிகள் சுமார் 40 லட்சம் விலையுயர்ந்த எருவைச் சேகரித்துவைத்துப் பூமிக்கு இடாததினால் கஷ்டம்அடைகிறார்கள். இதைப் பூமியில் கிடங்குகள்வெட்டி மண்ணோடு கலப்பித்து மக்கினவுடன் பூமிக்கு அடிக்கலாம். அல்லது முனிசிபாலிடி, யூனியன் எருக்களோடு கலந்து மக்கும்படி செய்தும் அடிக்கலாம். அல்லது ரசாயன சாஸ்திரப் பிரகாரம் சாம்பல், சுண்ணாம்பு நீறு, சில உப

புக்களோடு கலந்து பக்குவம் பண்ணினதற்கும் அடிக் கலாம். இவ்வாறு மல் எரு களர் சிலங்களுக்கு ஏராளமாய் இடப்பட்டால் களர் தொலைந்தபோதும், சில இடங்களில் இதுடன், சுமார் ரூபாய் 1—8—0 மேனிக் கும் சில இடங்களில் சுமார் ரூபாய் 6 மேனிக் கும் விற்கப்படுகிறதாம். ஒவ்வொரு குடிபும் தன் சிலத் தில் மல, மூத்திராதிகளைக் கழிக்கிறதென்று ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டால் கஷ்டத்தைக் கொஞ் சம் ஈடுபண்ணலாம்.

(4) ஆட்டுக்கிடை வைத்தல்.

ஆட்டு எருவை இரண்டுவிதமாகப் பூமிக்கு எருவிட லாம். ஆடுகளைக் கொட்டிலில்கட்டிச் கொட்டிலின்மீட் திலத்தில், மண், மணல்களைத் தூவி அந்தமண், மணலி ன்மேல்விழும்புழுக்கை மூத்திராதிகளைத் தினம்குட்டி ஒரீட்டத்தில் கஷ்டமவராமல் சேகரித்து வைத்திருந்து மேய்ச்சல் சிலங்களுக்கும் தூவலாம்; பசுர்களுக்கும் கொத்திவிடும்போது ஆணைக்கலாம்.

இன்னுமொருவிதம். இராக்காலங்களில் தட்டிகளி னால் அடக்கிக் கிடைவைத்தோ அல்லது தட்டிவைக் காமல் கிடைமறித்தோ பூமி உட்படுத்தப்படும்.

100 ஆடுகிடைவைத்தலுக்குச் சுமார் 6 அணு செல வாகும். ஒரு ஈசருக்கு 2000 ஆட்டுக்குக் குறைவா மல் கிடைவைக்கவேண்டும். மாட்டுச்சாணத்தைப் பார்க் கிலும் ஆட்டுப்புழுக்கைக்கு வீரியம் ஜாஸ்தி. மாட்டுக்

கிடைவைப் பார்க்கிலும் ஆட்டுக்கிடை சிலாக்கியம். கிடை வைக்கும்போதெல்லாம் பசுக்கிடையிலுல் கொ டிக்கிறலாட, பாக்கிவிதம் கிடைவைக்கிறதினால் கிடை க்கிறதில்லை. ஏனெனில் பசுங்கிடையில் கஷ்டம் உண் டாகிறதில்லை. ஆகையால் கிடைவைத்தவுடன் உழுது விட்டால் சூற்றினாலும், மழையினாலும் காரங்கள் கஷ்டமடையாது உரம்மண்ணோடு சேர்ந்து நல்லபல னைக் கொடுக்கும் கிடைவைத்தலில் மூத்திரம் கஷ்ட மாகிறதில்லை. பாணம், புழுக்கையைப் பார்க்கிலும் மூத்திரம் நல்லபலனைக் கொடுக்கக்கூடிய எரு. ஆகை யால்தான் இராக்காலங்களில் கீதாரிகள் 3, 4 தடவை ஆடு மாடுகளை எழுப்பிவிட்டு மூத்திரம் பெய்யும்படி பண்ணுகிறார்கள்.

சென்னை இராஜதானியில் சுமார் 130 லட்சம் ஆடு கள் இருக்கின்றன. இந்த ஆடுகளை வீரத்தியூயம்சம் பண்ணிக் கூட்டின்பேரில் தொழில்செய்தால் எவ்வள வோ லட்சக்கணக்காக லாபம் அடையலாம். நமது இராஜதானியில் மேற்கூறிய 130 லட்சம் ஆடுகளை உரத்துக்காகச் சரிவர உபயோகப்படுத்தினால் வருஷத் தில் ரூபாய் 50,000 பெறும்படியான உரத்துக்கு மேலேயே கிடைக்கும்.

(5) நோல்கிடங்கு எரு; ஆடு மாடு ஷபீதும் நோட்டி எரு.

ஆடு மாடு அடிக்கும் தொட்டியில் மாம்சங்களும், நோல்களும்போக பார்க்கி கழிசல் பதார்த்தங்களை எல்

லாம் ஒருகுழியில் கூளம், குப்பைகளோடும் தழைகளோடும் போட்டுவைத்துத் தூக்கத்தம் உண்டாகாமல், இருப்பதற்காகத் தினம் சாம்பலாலும், மண்ணாலும் மூடப்பட்டுச் சீக்கிரம் மடிப்பதற்காகக் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு நீறும் மேலே தூவப்பட்டுக் கொண்டுவந்தால் இந்த எரு மடித்தவுடன் நல்ல உயர்த்தாருவாகிறது. இந்த எருவில் இரத்தம், எலும்பு, பூந்தோல், குளம்பு, கொம்பு, மயிர் எல்லாம் சேர்ந்திருக்கும். இவைகள் எல்லாம் சரிவரச் சேகரித்து வைக்கப்பட்டு எரு விடப்படாததினால் நமது இராஜதானியில் சுமார் 50,000 ஏக்கருக்குமேல் புஷ்டிகொடுக்கக்கூடிய எருக்கள் நஷ்டமாய்விடுகின்றன. இப்படி நஷ்டம் உண்டாக்காமலிருக்கும்படி குடிகள் இதுவிஷயத்தில் கவனமெடுத்துக்கொள்ளவேண்டும் அசடு கசடு ஒன்றையும் அல்டீசியம் செய்யாமல் சேகரித்துப் பூமிக்கு எருவாக இடவேண்டும். இப்படிச் செய்துவந்தால் ஒரு நாளும் நமக்கு வறுமைவராது.

(6) எலும்புகள்.

எலும்புகளை ஓரிடத்தில் சேகரம்பண்ணிச் சுண்ணாம்புக் கல்லுருளைகளால் கலவை ஒட்டத்தில் $\frac{1}{4}$ அங்குலம் $\frac{1}{2}$ அங்குலம் தூள்களாகப்பண்ணிப் பூமிக்கு இட்டாலும் இடலாம். இத்தூள்களை மேய்ச்சல் நிலங்களுக்கு மேல்நாட்டில் போடுவது வழக்கம். இதனுடைய குணம் நன்றாய் மக்கினவுடன்தான் தெரியவரும். இவைகளைப் பட்சிகளும், நாய், நரிகளும் கொண்டு

போனாலும் கொண்டுபோகலாம். அப்படிக் கொண்டு போகமலிருப்பதற்காக எலும்புகளைத் தூள்பண்ணிப் போடுவதும் உண்டு. அல்லது எலும்பை, மாவாக அறைத்துப் பூமியில் தூவுவதும் உண்டு. மேய்ச்சல் நிலங்களுக்குத் தூவுகையில் ஏகர் 1க்கு 1,000 பவுண்டுமேனிக்குத் தூவப்படுகிறது. இது களிநிலத்தைப் பார்க்கிலும் மணலசாரி பூமிக்குத் தகுந்தது. இன்னும் எலும்புகளை வேலைவத்துத் தூள்பண்ணியும் கொடுக்கிற ஆயிரில்வைத்துத் தூள்பண்ணியும் பூமிக்கு இடலாம். எலும்புத் தூளெல்லாம் பழுவதைப் பறிருக்கும், பருத்திப் பறிருக்கும், காப்பிக்கொட்டைச் செடிக்கும் சிரமப் முக்கியமான எரு. எலும்புகளைக் கரியாக்கிச் சர்க்கரை ஆலைகளில் வெல்லத்தின் பழுப்பு வர்ணத்தை இக்களிகள் நீக்கினவுடன், அக்களிகள் நல்ல எருவாகிறது. சென்னை இராஜதானியில் எலும்புகள் தப்பெண்ணத்தினால் தூவிக்கப்பட்டு, பூமிக்கு உரமாகக் கொடுக்கப்படுவதில்லை. ஆகையால் வெட்டியான்திடல்களிலும், புறைச்சேரிகளிலும் உள்ள எலும்புகளை அன்னிய நாட்டார்கள் ஏஜண்டு மூலமாய் வாங்கி ஏற்றுமதி செய்துவிடுகிறார்கள். ஒரு செத்தமாட்டில் சுமார் 40 பவுண்டு எலும்பு கிடைக்கும். வருஷத்தில் நமது இராஜதானியில் லட்சக் கணக்காய் மாடுகள் சாகின்றன. எலும்பு ஏற்றுமதியில் சுமார் 4, 5 லட்ச ரூபாய் நமது இராஜதானி நஷ்டமடைகின்றது. ஆகையால் குடிகள் தங்களுக்குக் கிடைக்கும் எலும்புகளை

எல்லாம் எருக்குழியில் போட்டு மக்குப்படி செய்து பூமிக்கு இட்டால் கஷ்டம் தெரிவிப்படி ஏற்படாது. கல்ல லாபம் அடையலாம். 1 டன் எல்லாப் சுமார் 40 ரூபாயாக விற்கப்படுகிறது.

(7) லுபர்க்கானம்.

எங்கெங்கே அலுரிச்சாயம் காய்ச்சப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இவ்வெருக்கிடைக்கும். ஒருவண்டி அலுரிச் சாணம் 2 ரூபாய் முதல் 3 ரூபாய் வரையில் விற்கும். முக்கியமாய் கெலப்பிருக்கு உரமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

(8) மீன் உரம்.

சமுத்திரக்கரை ஓங்குகளிலுள்ள இடங்களில் இவ்வுரம் கிடைக்கும். மலபார் பக்கங்களில் இவ்வுரத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். சிறு மீன்கள், மீனாடைய அச்சு, கசுடி, கூளம், குப்பைகளெல்லாம் சேகரித்து வைக்கப்பட்டு ஏகர் 1க்கு 1½ டன் வீதம் பூமிக்குச் சில இடங்களில் அடிக்கப்படுகிறது. சிழங்கு வகைப் பயிர்களுக்கும், பழவகைப் பயிர்களுக்கும் சீரம்பத் திறமான உரம்.

(9) பிண்ணுக் உரம்.

இதில் கொட்டைமுத்துப் பிண்ணுக்கென்றும், இலுப்பைப் பிண்ணுக்கென்றும், சூசம்பாப் பிண்ணுக்கென்றும், கடலைப் பிண்ணுக்கென்றும், பே எள்ளுப் பிண்ணுக்கென்றும் அனைவதப்பிண்ணுக்குகள் இருக்கின்

றன. சில பிண்ணுக்குகள் மாட்டுத் தீவனத்திற்காகவும், சில உரத்திற்காகவும், சில இரண்டுக்கும் பிரயோசனப்படுத்தப்படுகின்றன. கொட்டைமுத்துப் பிண்ணுக்கு ஏகர் 1க்கு 2 பாரத்துக்குக் குறையாமல் உரம் கொடுத்து கோதாவரி ஜில்லாவில் கரும்பு சாகுபடி செய்வதற் வழக்கம். கரும்புமுதலிய லாபம்தரக்கூடிய பயிர்களுக்கு ஏகர் 1க்கு சுமார் 2 பாரம் பிண்ணுக்கு உரம் கொடுக்கவேண்டும். தானியாகிப்பயிர்களுக்கு ஏகர் 1க்கு 500 பவுண்டு பிண்ணுக்கு உரம் கொடுத்தால் போதும். பயிர்களின் லாபத்துக்குத்தக்கபடி ஏகர் 1க்கு 200 பவுண்டு முதல் 1000 பவுண்டு வரையில் உரம் அனைக்கலாம். குசும்பாப்பிண்ணுக்கு உரம், கொட்டைமுத்து பிண்ணுக்கைவிட கரும்புக்கு சிலாக்கியமாம். வெப்பம் பிண்ணுக்கும் கொட்டைமுத்து பிண்ணுக்குக்குச் சமமாக சொல்லலாம். பிண்ணுக்கு உரங்களை எல்லாம் தூள் செய்து களை கொட்டும்போது சிறுகச் சிறுகப்பயிருக்கு உரமாக அனைக்கவேண்டும். நமது இராஜதானியில் பிண்ணுக்குகளை அதிகமாக உரத்துக்கு உபயோகப்படுத்தாமல் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. எண்ணெய் கொடுக்கும் விதைகளும், கூட ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. எண்ணெய் ஏற்றுமதியில் நமது பூமிக்கு கஷ்டம் உண்டாக மாட்டாது. ஆனால் எண்ணெய் விதைகளும், பிண்ணுக்குகளும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டால் நமது பூமிக்கு நிரம்ப கஷ்டம் உண்டாகிறது. விலை மோரில் வெண்

ணைய எடுப்பது போல நமது பிண்ணாக்கிலிருந்து அன்னிய நாட்டார்கள் எங்கிரப் பிரயோசனத்தினால் மறுபடியும் எண்ணைய எடுத்து, பாக்கி இருக்கும் பிண்ணாக்கை உரமாகக் கொடுக்கிறார்கள். நம்முடைய அறிவின்மையால் எண்ணைய விதைகள், பிண்ணாக்குகள் ஏற்றுமதியால் நமது இராஜதானியிலிருந்து சுமார் 50 60 லட்சரூபாய்க்குக் குறைபாத விலையுள்ள எருவை நஷ்டமடைகிறோம். இந்த எருவைப் பூமிக்கு இட்டால் நாம் எவ்வளவோ லாபம் அடையலாம்.

(10) சருகு, தழை. சேர்க்கை உரம்.

பழுத்த சாகு, தழை, புல், பூண்டு முதலியவைகள் எங்கெங்கே ஜாஸ்தியாய்க் கிடைக்கிறதோ அங்கே எல்லாம் இவைகளைச் சேகரித்து, ஒரு குழாயில் போட்டு, மக்கும்படி செய்து பூமிக்கு உரமாக இடலாம். இதைப் பற்றியும் குடிகள் கவனிக்கவேண்டும்.

(11) கடற்பாசி, கடற்பூண்டுகள்.

கடற்கரை யோரங்களிலும் சமுத்திர சலத்திலும் உண்டாகி, இருக்கும் பூண்டுகளையும் முன் சொல்லி இருக்கிறபடி சேகரித்து வைத்துப்பயிர்களுக்கு உரமாகக் கொடுக்கலாம்.

(12). உப்பு.

இது சிறுபான்மையில் கேழ்வரகு, தென்னை, சவுக்கு சிலவித நெல்லுகளுக்கு உரமாகிறது.

(13) பட்சி எருக்கள்.

இவ்வெரு கிரம்ப விலையுயர்ந்தது. எங்கெங்கே கிடைக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் சேகரித்துப் பூமிக்கு இடலாம். கோயில்களிலும், காலிமனைகளிலும் கிடைக்கும் வெளவால் புழுக்கைகளை சேகரித்து பூமிக்கு இட்டால் கிரம்ப லாபம் உண்டு.

(14) பொட்டிலுப்பு மண்.

இது பாழ் மனைகளில் உப்புப்பூத்து சொரிந்து இருக்கப்பட்டமண். இது மணங்கு (80 பவுண்டு) 2½ ரூபாய் முதல் 3 ரூபாய் வரையிலிருக்கும். தானியப் பயிர்களுக்கு உரமிட்டால் நல்லகண்டு முதல் கொடுக்கும். பொட்டிலுப்பு சிலவித கேணி சலத்தில் ஜாஸ்தி. அவ்விடங்களில் புகையிலைச் சாகுபடி செய்வார்கள். மிளகாய், புகையிலை, கத்திரி உருளைக்கிழங்கு இவைகளுக்கு நல்ல எருவு. ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 100 பவுண்டு வீதம் பயிரில் 3 தடவையில் தூவவேண்டும்.

(15) கண்ணாம்பு நீர்.

இது கோதும்பயிர்களுக்கு முக்கியமான உரம். கோதுமைப்பயிர்களாவன :—நிலைக்கடலை, அவரி, துவரை, உளுந்து, கொள்ளு, பயறு, முதலியன. ஏக்கர் 1க்கு சுமார் ½ வண்டி உரம் கொடுக்கலாம். இது பிசுபிசுப்பான கவியை தளர்ச்சிப்படுத்தவும், தளர்ச்சியான மணலை கெட்டிப்படுத்தவும் பிரயோசனப்படுத்தப்படுகிறது. நிலக்கடலைக்கு ஏக்கர் 1க்கு சுமார் ½

வண்டி சுண்ணாம்பு நீற்றுடன் 1 வண்டி சாம்பலைக் கலந்து பயிரில் தெளித்தால் அதற்கு தகுந்த உரமாவதுடன், அதில் வாழும் பூச்சி புழுக்களையும் தொலைத்து விடுகிறதாம். பழவகைப்பயிர்களுக்கு ருசி கொடுக்கவும், வாசனை கொடுக்கவும் இவ்வூரம் அவசியமென்று தெரியவருகிறது.

(16) குளத்துப் பொருத்து.

குளம், ஏரி, வாய்க்கால்களில் சலம் வற்றினவுடன் வண்டல் பொருதுகுகள் வெடித்திருப்பதைப் பார்க்கலாம். அவைகள் மணல்சாரி பூமிகளுக்கும் மட்டமான பூமிகளுக்கும் நல்ல உரமாகிறது. ஆற்று மண்ணுக்கு வேற்று மண் என்கிற பழமொழிப்பிரகாரம் இது நல்ல எருவாகும். தென் ஆர்க்காடு ஜில்லாவில் வேர்க்கடலை பூமிகளுக்கு வண்டல் பொருதுகுகளை உரமாக அடிக்கிறார்கள்.

சுருக்கமாக.

உலகத்தில் உபயோகமற்ற வஸ்து ஒன்றும் கிடையாது. அசடு, கசடு என்று தள்ளப்படுவதெல்லாம் நிரம்ப முக்கியமான எருவாகிறது. ஒன்றையும் தப் பெண்ணத்தின்பேரில் துவைத்து அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. எவ்வளவு அற்ப வஸ்துவென்று சொன்னபோதிலும் அவைகளைச் சேகரித்து வீணாக்காமல் பாதுகாப்போமானால் நமக்கு ஒரு விஷயத்திலும் ஒரு நாளும் குறைவு ஏற்படவேமாட்டாது. மேற்கூற இருக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு எரு விஷயத்திலேயும் குடி

கள் கவனமெடுத்துக்கொண்டு நஷ்டம் உண்டாக்காமல் சேகரித்து வைத்துப் பூமிக்கு இடுவார்களேயானால் அவர்களுக்கு இப்போது கிடைக்கும் வரும்படியைப் பார்க்கிலும் ஒன்றுக்கு ஒன்றை கிடைப்பதற்கு சந்தேகமே இல்லை. இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழியுண்டு. (Waste not, want not) எனப்படிக். அதாவது எவ்வளவு அற்பவஸ்துவாயிருந்தாலும் ஒருவன் அதை வீணாக்கி பாழ்படுத்தாமல் இருந்தானேயானால், அவனுக்கு ஒரு நாளும் வறுமை உண்டாகாது. ஒரு சேகரிக்கிற விஷயத்தில் நமது குடிகள் இந்த பழமொழியை எப்போதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கவேண்டும். சில எருக்கள் பூமியின் செய்நேரத்திகாலத்திலும், சில எருக்கள் பயிர்கள் பூமிவிருக்கையில் பின்செய்நேரத்தி காலங்களிலும் அடிக்கும்படியாக இருக்கும். மாட்டுக்கொட்டில் எருவை பூமி உழுவதற்கு முன்னால் அடித்து ஒத்தாப்போல் பரப்பி உழுதுவிடவேண்டும். இப்படியே மலஎருவையும் பண்ணவேண்டும். பொட்டிலுப்பு மண்ணை பரிசைக்கொத்திவிடும் காலங்களில் பயிர்களின் அடியில் அணைக்கவேண்டும். வளர்ச்சியை தூண்டிடல் பண்ணி நல்ல சுண்டுமுதலைக் கொடுக்க வேண்டியதற்காக, வளர்ச்சி காலங்களில் சிலவித எருக்களை அணைக்கும்படியாக இருக்கும். பொட்டிலுப்பு ஜலத்தை நறைத்து புகையில், உருளைக்கிழங்கு முதலிய பயிர்களுக்கு கொத்தி விடுங்காலத்தில் பயிரின் அடியில் தெளிக்கலாம். கரும்புக்கு 2 வது, 3 வது கொத்தல்களில் பின்னாக்குகளை தூள் செய்து உரமாக பயிரின் அடியில் அணைக்கவேண்டும். எருவிட வேண்டிய காலமும், தன்மையும், அளவும், அனுபோகத்தினால் தான் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.

விதை பொருக்குதல்.

—:o:—

விதை ஒன்றுபோட சரை ஒன்று முளைக்குமா? நல்ல பயிர் உண்டாக்க நல்ல விதை வேண்டியது அவசியம். நல்ல விதைகள் முதிர்ந்ததாயும், புதிதாயும், அதாவது பலங்குறையாததாயும், கொழுப்பானதாயும், நோவு அற்றதாயும், மருக்கலப்பு இல்லாததாயும் வீரியம் ஜாஸ்தி உள்ளதாயுமிருக்கவேண்டும். இப்படி நல்ல விதைகளைப் பொருக்கி எடுப்பதில் நமது குடிகள் கவனக்குறைவாயிருக்கிறார்கள். முந்திய அறுப்புக் காலத்தில் இவ்வித விதைகளைப் பொருக்கி எடுத்துப் பக்குவமாய் வைத்திருந்து பிந்திய தகுந்த பருவகாலத்தில் தெளிக்கவேண்டும். விதைகளைச் சரிவரப்பொருக்கி எடுத்துவரும் பட்சத்தில் இப்போது சாகுபடிக்காக விதைபின் அளவு எவ்வளவு செலவாகிறதோ அதில் பாதி போதுமானது. விதைகளைப் பொருச்சி எடுத்துச் சாகுபடி செய்யும்போது நல்ல கண்டுமுதலும் கிடைக்கும்.

உதாரணமாக.—சோளம் முதலிய தானியப் பயிர்களில், விதைகளைப் பொருக்கி எடுக்க வேண்டுமானால் கதிர்கள் உச்சியில் முதலில் பழுத்துக் கீழே முதிர்ந்து கொண்டுவரும்போது உச்சியில் முதிர்கிற தானியங்களில் பெரிய வீரியமுள்ள தானியங்களைப் பொருக்கி எடுத்து, அடுத்த பருவம்வரையில் பக்குவமாய்ப் பாதுகாத்து வைத்திருக்கவேண்டும். வருஷா வருஷம்


விதைகளை இப்படியே பொருக்கி எடுத்துக்கொண்டு போனால் நல்ல ஒருவர்க்கத்தை உண்டுபண்ணலாம். குடிகள் ஒரு ஏகர் நெல்பயிர் நாற்றநட, சுமார் 8 செண்டில் சுமார் 36 பட்டணம்படி விதை தெளிக்கிறார்கள். விதைபைப் பொருக்கி எடுத்து நல்ல விதைகளைத் தெளித்து நாற்றைப்பிடுங்கி அலகுசுளைக்கின்ளி 1 அல்லது 2 அலகுகளாக டீட்டால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 4 பட்டணம் படி விதைபோதுமென்று சிலரால் அனுபோகத்துக்குக் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. இப்படிச் செய்வதில் கண்டுமுதலும் கிரம்ப ஜாஸ்தி கிடைத்திருப்பதாகவும் தெரிய வருகிறது. அமெரிக்காவில் சி அயலண்டு பருத்தி விதைகளைப் பொருக்கி எடுத்து சிலருணங்கள் அமைந்த வாக்கங்கள் உண்டாக்கிச் சாகுபடி செய்வதில் கண்டுமுதல் அதிகரித்துப் பருத்தியின் இழையின் நீளங்கடும் ஜாஸ்தியாகி முன் பவுண்டு ரூபாய் 0-8-0 விற்குப் பஞ்சு இப்போது விதை பொருக்குவதனு லுண்டாகும் கூர்மை சாகுபடியால் பவுண்டு 1க்கு ரூபாய் 2 விற்கும்படியான நேர்த்தியான பஞ்சை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நமது இராஜதானியில் விதைகளைப் பொருக்கிச் சாகுபடி செய்துவந்தால் விதைகளின் அளவில் இப்போது உபயோகிப்பதைப் பார்க்கிலும் குறைச்சலாய் உபயோகித்து விதைகளின் அளவிலேயே மிஞ்சுவதில் நமக்கு ஒருலாபமாகுவது மன்னியில் கண்டுமுதலிலும் வரும்படி ஏராளமாய் கிடைத்து இப்

போதைவிட இன்னும் அதிக லாபம் கிடைக்கும். இதன் உண்மையை அறிவீர்களாக.

கமது ராஜதானியில் சுமார் 70 லட்சம் ஏக்கராவரையில் நெல் சாகுபடியாகிறது. இப்போது மேற்கி. விஸ் திரணத்துக்கு சுமார் 210 லட்சம் ரூபாய் (சுமார் 2 கோடி ரூபாய்) விதை விதைக்கப்படுகிறது. விதை களைப் பொறுக்கி செட்டாயும் சாஸ்திரப்படியும் அனு போகத்துக்குக் கொண்டுவந்து சரிவரத் தெளித்தால் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய்க்குக் குறையாத விதையை மீற்றலாம்.

தானியவகைப் பயிர்கள்.

நெல்.



நெல் பயிரும் நெல் கதிரும்.

பயிர்வகைபயல்:—

கம்முண்டிய இராஜகாணியில் தானியப்பயிர்களில் நெல் முக்கியமான பயிர்.

மாதிரிகள்:—

இதில் கார், சம்பா என்று இரண்டு முக்கிய மாதிரி இருக்கின்றன.

தகுந்த பூமிகள்:—

இவை, களியிலும், செவ்வளிலும், சதுப்பு நிலங்களிலும் பயிராகும். பாசனக்குறைவில்லாத இடங்களில், களியிலும் சதுப்பு நிலங்களிலும் கஞ்சைபாகவும், வானவாரியில் புஞ்சைபாகவும், சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.

சேய் (நீர்த்தி):—

புஞ்சையில் சாகுபடி செய்யவேண்டியிருந்தால், மே, சூன், மாதங்களில் பெய்யும் கோடைமழைகளைக் கொண்டு பூமிகள் இரண்டு, மூன்று தரம் உழப்படுகின்றன. கஞ்சைச் சாகுபடியில் சூன் மாதக்கடைசியில் ஆற்று வெள்ளத்தைக்கொண்டு பூரியை மூன்று தரம் உழுது நன்றாகக்கொத்தி விடப்பட்டு, களைபிடுங்கி கரைகள் போட்டு கடவுக்குத் தயார்ய வைத்திருக்க வேண்டும்.

தகுந்த உரம்:—

ஏகரா ஒன்றுக்கு உழும்போது இரண்டு வண்டி கொள்ளிஞ்சித்தழைகளாவது அல்லது 5 வண்டி ஆடா

கொடை, புங்கன், ஏருக்கு முதலிய கழைகளாவது போடலாம். அல்லது 10-வண்டி மடித்த குய்பைச் சாம்பலாவது, 1 பாரம் பிண்ணுக்காவது உரமாகக்

க்கலாம். வண்டல், பொருக்கு கிடைக்கும் சதில ஏகரா ஒன்றுக்கு இருபது வண்டிக்குக் ராமல் அடிக்கலாம். ஏருவை உழும்முன் தில் பாப்பினாலும் பரப்பலாம். தழைகளை உழும் து மிதந்துவிடலாம். பிண்ணுக்குகளை கடும் து துளாக்கித் தெளிக்கலாம். பசுத் தழை துக்காக அவுரி முதலிய பயிர்களை உண்டாக்கி பெயர்..... முன் பூரியில் உழுதுவிடலாம்.

றிய விவரங்கள் யின் ஐயவு, விதைப்பு, நடவு முதலியவை:—

துறை. நஞ்சயில் சூலை, ஆகஸ்ட்டு மாதங்களில் ஏதாவது ஏட்டின் பெய்தால், கோடை உழவேண்டுமென்றும், ஒரு அல்லது இரண்டு தரம் உழுது, ஏகரா ஒன்றுக்கு 36-பட்டணம் படிவீதம் விதைதெளிப்பார் வரிசை வரிசையாய் படைச்சாஸில் விதைக்கின் 30-பட்டணம்படி விதைபோதுமானது. காற்று கடுமீயடச்சத்தில் ஒரு ஏகரா கட 8-செண்டில் க்காலிலாவது, சேற்றுக்காலிலாவது சுமார் 36-ணம்படி விதை விதைக்க வேண்டியதாயிருக்க புழுதிக்கால் காற்றாவது மழையில் காற்றங்கால் பட்டு, கிணற்றிறுவையால் காற்றை விருத்தி. பதிவருவை ஏட்டி. இத்தப் பாதியை அவ் காற்றங்கால் சேருக்கப்பட்டு அதில் விதை கும்.

யாளரிடம் திருப

கொடுக்கப்பட

ர், ஆராய்ச்சிக்க

விதைக்கப்பட்டு நாற்றை உண்டாக்குதல். நடவு சுமார் சாணுக்கு ஒன்று வீதமிருக்கவேண்டும். அலகைக்கிள்ளி நடவேண்டும். பள்ளத்தாக்காயிருந்தால் அலகு கொஞ்சம் கூடவைக்கவேண்டும்.

தகுந்தகாலம்:—

புஞ்சையில் சூலை, ஆகஸ்ட்டு மாதங்கள் விதைக்கத் தகுந்தகாலம். நஞ்சையில் சூன் மாதக்கடைசியில் விதைவிட்டு, சூலை இறுதியில் அல்லது ஆகஸ்ட்டு மாதம் 15-தேதிக்குள் நட ஆரம்பித்துவிடவேண்டும்.

பாசனம்:—

ஒரு ஏக்கர் ரெல்பயர் விருத்திக்கு 40 அல்லது 45 அங்குலம் மழைபெய்தால் போதுமானது; அல்லது சுமார் 3,13,6000 பட்டணம்படி ஜலமிருந்தால் போதுமானது. ஆனால் இதற்கு இரண்டு, மூன்று மடங்கு இப்போது அதிகமாக பிரயோசனப்படுத்தப் படுகின்றது. எரிப்பாசனம், கிணற்றுப்பாசனங்களில் ஜலம் குறைவாயும், ஆற்றுப்பாசனங்களில் ஜலம் ஜாஸ்தியாயும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

பின்செய் நேர்த்தி:—

புஞ்சையில் இரண்டு தரமும், நஞ்சையில் ஒருதரமும், களை எடுக்கப்படுகிறது. நஞ்சையில் களை எடுப்பதோடு, பயிரை நன்றாய் மிதித்து விடவும்படுகிறது.

வயது, அறுப்பு:—

கார் 4-மாதத்துப்பயிர்; சம்பா 6-மாதத்துப்பயிர். கார் அக்டோபர் மாதத்திலும், சம்பா பிப்ரவரி மாதத்

திலும் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. பயிரை அரிவாளால் அறுத்து அரிக்காய்ச்சல் போட்டும் அல்லது போட்டாமலும் சுட்டுக்கட்டி நெற்போராய் போட்டு பித்தி அவகாசமிருக்கையில் கட்டடித்தாவது அல்லது உடனேயே கோட்டுப்பிடித்து அடித்தாவது மாகுலை உண்டாக்குகிறார்கள். வைக்கோல் பழுக்க ஆரம்பிக்கும்போதும் கதிரில் கீழ் டீ-வாசி பால் பிடித்திருக்கிற சம்பத்திலும் நெற்பயிர் அறுவடை செய்யவேண்டும். வைக்கோல் கொஞ்சம் பசுமையாயிருக்கும்போதே, தானியத்தை விரலினால் அணுகினால் பால் வெளிவராமலிருந்தால் உடனே அறுத்துவிடலாம். தானியப்பயிர்களிலெல்லாம் அறுப்பில் இப்படியே கவனம் செலுத்தவேண்டும்.

கண்ணீழதல்:—

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சுமார் 500-பட்டணம்படி ரெல் சராசரியில் கிடைக்கும். நல்லபூமியாயிருந்தால், 1000-பட்டணம்படியும் கிடைக்கலாம். நிலம் மட்டமாயிருந்தால் 500-பட்டணம்படிக்குக் கீழும்போகலாம். ஒரு போகத்தில் சுமார் 30 ரூபாய் மொத்தவருமானமாக வைத்துக்கொள்ளலாம். இதற்குச்செலவு, உழவு, எருகளைப்பிடுங்குதல், நடுதல், சர்க்கார் கிஸ்தி முதலியன எல்லாம் சுமார் ரூபாய் 25க்கு குறைவில்லை. ஆகையால் செலவெல்லாம்போக ஒரு போகத்தில் குடி களுக்கு மிஞ்சுவது ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சுமார் ரூபாய் 5 தான். இருபோகத்தில் செலவெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 13 கிடைக்கலாம்.

கைத் தேயில்:—

அரிசியிலிருந்து ஒருவிதமாகவும், சாளுயரும் உண்டு பண்ணலாம். 100-மாக்கால் கொடி, 4 மாக்கால் திட்டல் தடிமும், 12-மாக்கால் உயரத்திலும் கொடுக்கிறதாம். அரிசித் தடிடு பசுவுக்கு கல்ல உணவு ஆனால் வண்டிக்காளைக்கு அல்லவா; திறம் அல்லவாம். அல்லும், பழுங்கலிசியும் அதிக புஷ்டியை கொடுக்கக் கூடியதாம். ஏனெனில் அவைகளில் தவிடும் சர்பர் தப்பட்டிருக்கிறதாம்.

சோளம்.



சோளப்பயிர், சோளக்கதிர்.

பயிரின் தர்பாவம்:—

நமது இராஜதானியில் தென் ஜில்லாக்களுக்கு எப் படி செல் முக்கிய உணவோ, அதுபோல கடப்பை, கர்நூல், பல்லாரி, அரங்கபூர் ஜில்லாக்களுக்கு சோளம் முக்கிய உணவாகிறது. சோளம் தனியாகவாவது அல்லது பருத்தியுடனாவது அல்லது துவரை, மொச்சை முதலிய கோதுப்பயிர்களுடனாவது கலந்து பயிர் செய்யப்படுகிறது.

மாதிரிகள்:—

சோளத்தில் வெள்ளை, மஞ்சள், சிவப்பு, கறுப்பு ஆகிய நான்கு முக்கிய மாதிரிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் வெள்ளையும், மஞ்சளும் தான் ஜாஸ்தியாக சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.

தகுந்த பூமிகள்:—

வெள்ளை உரப்பானகளியிலும், பாதிக்களி, பாதிமணலும் சம்பந்தப்பட்ட பசளை மண்பூமியிலும், செவ்வளிலும் இவை சண்டாகின்றன.

செய்தோந்தி:—

கோடைமழையில் பூமியை மூன்று அல்லது நான்கு தாத்துக்குக்குறையாமல் உழவேண்டும். களை ஜாஸ்தியாயிருக்கும்பட்சத்தில் சீமைக்கலப்பையைக்கொண்டு உழலாம். பாக்கி காலங்களில் சாதாரண கலப்பை களைக்கொண்டாவது, அல்லது குண்டகா, கொர்ரு கலப்பை முதலிய தருவிகளைக் கொண்டாவது வேலை செய்யலாம். சோளத்துக்கு ஆழ உழுவது திறம்.

தகுந்த உயர்:—

கடை யெருக்களையாவது, ரத்தத்துக்குப்பைகளை யாவது எருவாய்ப்போடுவது நலம். சோளம் பூமியின் சத்தை இழுத்துவிடுமாதலால், கட்டாயம் எருவிட்டே பயிர்செய்யவேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்கு ஆறுவண்டி எருவுக்குக்குறையக்கூடாது.

தகுந்தகாலம், விதைப்பு:—

சோளத்தை கம்மிராஜதானியில் சூன், சூலையிலும், அக்டோபர் நவம்பரிலும் சாகுபடி செய்கிறார்கள். சூலைமாதம் முதல் வராத்தில் தெளிப்பதுதான் விசேஷம். சூலையில் மஞ்சள் சோளமும், அக்டோபரில் வெள்ளைச்சோளமும், சாகுபடிசெய்வது சாதாரணம். தென் ஜில்லாக்களில், ஒருநாளில் குடிகள் 3½ ஏகா நிலத்தில் 20 பட்டணம்படி சோளவிதைகளை, கைத் தெளியால் தெளித்து இந்த விதைகளைமூலம் 6 ஏர் களைக்கட்டி உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். இதற்குப்பதி லாக கொர்ருவை (மூங்கில் குழாய் விதை தெளிக் கருவி) உபயோகித்தால் ஒரு நாளில் ஒரு ஜதை மாட்டைக்கொண்டு 3½ ஏகா நிலத்தில் 5 பட்டணம்படிக்கு மேல் போகாமல் சோளவிதையை தெளிக்கலாம். இதன் துண்டுகளின்னும் கருவியை உபயோகித்தால் இன்னும் ஒரு ஜதை மாட்டைக்கொண்டு அசை ஒரு நாளில் மேற்படி விதையையும் மூடி விடலாம்.

விதையின் அளவு:—

ஏகரா ஒன்றுக்கு கொர்ரு (விதை தெளிகருவி) வினால் விதை தெளித்தால் சுமார் 8 பவுண்டு அல்லது

3-4 பட்டணம்படி விதை போதுமானது. கையால் தெவிக்கும்பட்சத்தில் சுமார் 8 பட்டணம்படி விதை செலவாகும். கரிசல் நிலங்களில் கல்ல பூமியாயிருக்கும்பட்சத்தில் 3 பட்டணம்படி விதை போது. மணல் சாரியாயிருக்கும்பட்சத்தில் சுமார் 8 பட்டணம்படி விதை தெவிக்கும்படி ரேறியர். சோளத்தை மட்டித் திவனத்துக்கர்க் சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில், சுமார் 16 பட்டணம்படி விதை செல்லும். கொற்கு வினாள் சோளம் விதைக்கப்படும் ஒருவரிசைக்கும் இன்னொருவரிசைக்கும் சுமார் 2 அடி வித்தியாக இருக்கவேண்டும். விதை தெளித்தவுடன் ஹேரோ (Harrow) பைக் கொண்டு பரம்படித்து விதைகளை மூடுவார்கள். விதைக்குமூள் விதையை வெள்ளிலாவது அல்லது மையலுத்தம் கரைத்த நீரிலாவது ஊரவைத்துத் தெளிப்பது சிலாக்விடும்.

களைபிடுத்தல் முதலிய பின்பெய்தெத்தி:

விதை தெளித்து ஒருமாதத்துக்கெல்லாம், கலப்பையில் மாட்டைக்கட்டி பயிருக்கு மத்தியில் ஓட்டிக் களை எடுப்பார்கள். இரண்டாவது மூன்றாவது மாதங்களில் பூமி கொத்திவிடப்பட்டுக் களைகள் பிடுங்கப்படுகின்றன. மதர் விடுகிற சமயத்தில் களைப் பயிராயிருக்கும்பட்சத்தில் பயிர் கீழே விழுந்து விடாமள்குப்பதற்காக ஒன்றோடொன்று கட்டுவது வழக்கம்.

பாசனம்:—

பயிர் ஒரு அடி உயரமிருக்கையில், மழையாவது அல்லது பாசனமாகவது முக்கியம். மொத்தம் 7-8-கட-

வை ஐலம் பாய்ச்சினால் போதுமானது. வருஷம் சுமார் 25-30 அங்குலம் மழை பெய்யுமிடத்தில் பயிர் களையும்கூட.

வயசு, ஹப்பி:—

சோளம் ஓர்து மாதத்துப்பயிர்; சூலை மாதம் முதல் வரத்தில் மஞ்சள் சோளத்தை தெளித்தால் கவர்பர் மாதம் கடைசிக்குள் அறுவடை செய்பவராம். வெள்ளைச் சோளமானால் சுமார் 4 மாதத்தில் அறுவடை செய்யலாம். செப்டெம்பர் கடைசிக்குள் வெள்ளைச் சோளத்தை தெளித்தால் பிப்ரவரி கடைசிக்குள் அறுவடை செய்துவிடலாம். சோளம் முக்கிய தானியப் பயிர்களின் கதிரகள், உச்சியில் முதலில் பழுத்து, வாலா கீழே முதிர்ந்துகொண்டு வருகின்றன. ஆகையால் உச்சிக்குவைத்திதுள்ள தாவியவர்கள் நிமையிதும் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு சீக்கிரம் இந்தச் தாவியங்கள் அறுவடையாகிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு வைக்கோல் கல்ல புஷ்டியுள்ளதாயிருக்கும். தென் ஜில்லாக் களில் கதிரடி, போரடிக்கு, மாடுகளை பிணையலாகக்கட்டி ஓட்டி, தானியங்கள் தானியிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றன. காநாள், அனந்தபூர், கரப்பையில் இப்படி மாட்டுப்பிணையல் கட்டாமல், கதிரடிக்கும், போரடிக்கும் கல்லுநனைக்காய் பிடியோசனைப் படுத்துகிறார்கள். இதில் கொவு காய்ப்பட்டு. ஆகையால் தென் ஜில்லாக்குடிகள் போரடியில் மாட்டுப் பிணையல்களுக்கு பதிலாக கல்லுநனைகளை உபயோகப்படுத்தலாம்.

12 தானியவகைப் பயிர்கள்

கண்டுழைதல்:-- |.

ஏகரா ஒன்றுக்கு கல்ல பூமியாமிருந்தால் 400-பட்டண்படி தானியம் கிடைக்கும். சராசரிககண்டு முதல் 500-படிண்டு அல்லது சுமார் 200 பட்டணம்படி தானியத்தான். மாட்டுத்தீவனத்துக்காகப்பயிர் செய்யும்பட்சத்தில் சோளத்துக்கு மஞ்சினது வேறொரு பயிருமில்லை. சோளத்தை பூச்சு முன் வெட்டவேண்டியது. ஒரு வருஷத்தில் மூன்று கான்கு தடவை மாட்டு தீவனத்துக்காக வெட்டலாம். (வெட்ட, வெட்டபடுர் வளரும்) பாசனத்தில் வருஷம் ஒன்றுக்கு சுமார் 60000 படிண்டு ஓர் ஏகராவுக்குப்பகம் சோளத்தண்டு கிடைக்கும். பாசனமில்லாத இடத்தில் சுமார் 4 அறுப்டில் சுமார் 20000 படிண்டு பகம் சோளத்தண்டு கிடைக்கும். இனம் சோளப்பயிரை அதிகவது ஓர் அடி உயரமிருக்கையில் மாடுமேயக்கூடாது ஏனெனில் அதுவீஷமாம். 400-படிண்டு பகத்தான் சுமார் ஒரு ரூபாய் விலை. ஏகரா ஒன்றுக்கு கட்டு 1க்கு 5 படிண்டு பிறையுள்ள 300 கட்டுகார்ப்த சோளத்தட்டைகிடைக்கும்.

செலவுபேராக வருட்படி:--

செலவெல்லாமபோக ஏகரா ஒன்றுக்குக் குடிகளுக்கு மிஞ்சுவது சராசரியில் சுமார் ரூபாய் 5 தான். கல்ல பூமியில் ஏகரா ஒன்று மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் 25-ல் சாகுபடி செலவு சுமார் ரூபாய் 10. தள்ளினால் ஏகரா ஒன்றுக்கு ரூபாய் 15 கிடைக்கலாம்.

சோளம்

கைத்தொழில்:--

சிலவகை சோளத்திலிருந்து சர்க்கரை பெடுக்கலாம். சாராயம் உண்டு பண்ணலாம். சோளத்தட்டையின் ருந்து பெனு செய்யலாம். தானியத்தின் காமபுகளைக் கைத்துடைப்பவர்களால் பிரயோசனப்படுக்கலாம்.

கம்பு



கம்புப் பிரும், கம்புக்கருடும்.

கம்பு

பயிற்சிக்பாலம் —

கோலத்தெருவிற்குப் பாலம் முக்கிய உணவாக வந்து இரண்டு தானியங்களுதலாம். இது ஒரு அழுத்த மால் தானியம். தேக்குக்குக்குளிரச்சி கொடுக்கக் கூடிய தானியம் பால் அதிகரிக்கச்செய்யவாம், இத் தானியத்தைப் பூண்டு

இதில் அரிசிக்கம்பு அல்லது தொட்டக்கம்பு என்றும், காட்டுக்கம்பு அல்லது கட்டுக்கம்பு என்றும் இரண்டு முக்கிய மாதிரிகள் இருக்கின்றன. அரிசிக்கம்பு பிரச்சனத்திலும், காட்டுக்கம்பு வாவ்வாரிப் புஞ்சைச்சரி வும் சாதாரண நிலையங்களில் வள

தருந்த பூமிகள் —

காத்திரணம்பய் இது மலர்ந்தாநி முயிலில் காதுபடி செய்வப்படுகின்றது. கரிசனிலும் செவ்விலில் சாகு படி செய்வலாம்.

செய்தோத்தி —

கோலத் மலையில் அக்கக் கட்டவை உழுது கீழ் வலயம் — வளி நிலத்தை கத்தமாய் வைத் குளிர் குலை மலையில் உழுது விதைக்க மலர்ச்சினைக்கு செய்காத்து கட்டத்துவது போலி கத்தமாய் கத்தனைமேல்.

உயம் —

கதார இலையகருதி, அல்லது நி வலயி சாணத் துக்குக் குறைபாயல் எருப்போட வேண்டும். பிண னுக்கு, பக்கத்தை முக்கிய எருக்களையும் போடலாம்.

விதையின் அளவு, விதைப்பு:—

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 10—15-பவுண்டு அல்லது 4,5 பட்டணம் படிவிகை போதுமானது. தானியம் சிறிதளவு கைபால் சைத்தெளியில் விதை ஒத்தாப்போல் பூமியில் விழ, மணலை சேர்த்துக் கொண்டு தெளிப்பது திறம். கம்பு விதைத்த வடம் மண் மூடுவதற்காக முட்டை கட்டி இழுப்பது உலகது.

தஞ்சைநிலம்:—

சூன், சூலை மாதங்கள் தான் கம்பு விதை தெளிக்கத் தகுந்தகாலம்.

பாசனம்:—

அழத்தமான தானியபாசனதால் கம்புக்கு அதிக பாசனம் வேண்டியதில்லை. மழை அதிகமானால் தாங்காது. ஒரு மாதம் வரையில் பயிரகர்த்தாலும் கொடாது. தோட்டச் சாகுபடியில் சுமார் 4,5 தடவை ஜலம் இறைத்தால் போதுமானது. வருஷம் சுமார் 20 அங்குலம் மழையுள்ள இடங்களில் இப்பயிர் சாகுபடி செய்பவரம்.

பிஞ்செய்தேறித்தி:—

விதை தெளித்து ஒருமாதத்திற்கு பிறகு ஏரினால் பயிரைக் கலைக்கவேண்டும். இரண்டாவது மாதத்தின் பூமியைக் கொத்திக் களை பெரிக்கவேண்டும்.

வயக, அறுப்பு:—

கம்பு முன்று மாதத்திற் பயிர். கம்பக் தட்டை அதிகமாக மாட்டுத் தீவனத்திற்கு பிடியோசனப் படா

தாதலால், கதிர்களை மாதிரியம் முன்னடியே அறுத்து விடுவது வழக்கம். பிறகு சாவகாசமாய்க் கரையேய வாவது, அல்லது, வைக்கோலுக்காவது தட்டைகளை வெட்டுவது வழக்கம்.

கண்ணீறுதல்:—

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு முதலதாக கண்டுமுதல் 600 பட்டணம் படி, சாதாரணக் கண்டு முதல் சுமார் 400 பவுண்டு அல்லது 200 பட்டணம் படிக்குமேல் கிடை யாது.

செலவுபேகவருப்படி:—

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு மொத்த வருமானம் 12 ரூபாயில் கிடைப்பதில் செலவு தொகை சுமார் ரூபாய் 7. போனால் குடிசைக்கு மிகுகலது சுமார் ரூபாய் 5. தான். கல்ல பூமியில் செலவெல்லாம போக சுமார் ரூபாய் 10. கிடைக்கலாம்.

வைக்கோல்:—

கம்பைக் கொண்டு, மொச்சை முதலான பயிர் தனோடு கலந்து பயிரிடலாம். கம்பத்தட்டையை, வைக்கோல் வெட்டியால் சேர்த்ததட்டையை வெட்டி மரிட்டுக்குக் கொடுப்பது போல கொடுக்கவேண்டும்.

கேழ்வாகு.



கேழ்வாகுப் பூக்கும் கேழ்வாகுக் கதிரும்.
பயிர் செய்யும்.

இதன் மூலம் காணா, கோயரத்தூர் பக்கங்கள்
சூது முகிசை உண்டி, தாவியடி, இவ்வுத தோட்டச்

கேழ்வாகு

19

சாகுபடியிலேயும், புஞ்சைப் பயிராகவும் சாகுபடி
செய்யலாம். இது கோடைப்பயிராகவும், மாரிப்பயிராக
கவும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

பூம்:—

கிணற்றுப்பாய்ச்சல நிலங்களிலும், கஞ்சை நிலங்
களிலும் புஞ்சையிலும் கன்றாய் வளரும். கஞ்சைய்
மேட்டுப் பூமிப்பயிருக்கவேண்டும்.

செய்தேர்த்தி:—

பூமிப்பைக் கோடை மழையில் கன்றாய் 5, 6 தரமும்,
சூலை, ஆகஸ்டு மழையில் சில தரமும் உழுது புஞ்சையில்
விதை விதைக்கப்படுகின்றது. கிணற்றுக்குச் சமீபத்தி
லும் கஞ்சையிலும், காற்றுக்கள் உண்டாக்கி நடப்படு
கின்றன. சூன், சூலையில் காற்றுந்நூல் ஒரு, தழை முத
வியவைகளால் செம்பேரத்தி பண்ணப்பட்டு, பாத்திகள்
சட்டப்பட்டு, கிணற்று ஜலத்தைப் பாவது ஆற்று ஜலத்
தையாவது ஆதாரமாய் கொண்டு விதைகள் பழுதிக்கா
ளில் தெளிக்கப்படுகின்றன.

உரம்:

மரிகளுக்குத் தேரல்கிடங்கு எனவும், ஆட்டுக்கிடங்
கும், மழித்த சாணமும் கல்ல உரங்கள். ஏகரா ஒன்
றுக்கு கமர 5, 6 வண்டி. சாணத்துக்குக் குறையக்
கட்டாது. கிடங்கைக் குரப்பட்டசத்தின் ஏகரா ஒன்றுக்கு
லா. இரவு 1000 ஆட்டுக்குக்குறையக்கட்டாது. தேரல்
கிடங்கு எனவானால், இரண்டு வண்டிக்குக்குறையக்
கட்டாது. சப்பரத்திக்களளியினடியினிருக்கும் மண்
காற்றுக்கு கல்ல ஏருவாய்.

காலம்:—

தோட்டச்சாகுபடி அதாவது கிணற்றிலிறவைச் சாகுபடியில் வருஷம் 360-நாளும் சாகுபடி செய்யலாம். புஞ்சை சாகுபடிக்கு சூலை ஆகஸ்ட்டு மாதங்கள் தகுந்தகாலம்.

விதையின் அளவு; நடவு:—

புஞ்சையில் விதைக்க ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 10-15 பவுண்டு விதைபோதும். நாற்றங்காலில் விதைக்கிறபடி சத்தில் சுமார் 10 பவுண்டு விதை தெளிந்தால் போதும். நாற்றை முப்பதாவது நாள் பிடுங்கி செய்தேர்த்தி செய்திருக்கப்பட்ட வயலில் ஒன்பது அங்குல வித்தியாசத்தில் நாற்றைக்கிள்ளி கடவேண்டும். பூமியைப் படைச்சால்களாகவும், முக்கிகளாகவும் பிரித்து, முக்கிகளில் நாற்றை கடுவது கிணக்கியம்.

பாசனம்:—

சுமார் 30 அங்குலம் மழையுள்ள இடங்களில் பயிர் செய்யலாம். சுமார் 2, 2½ அடித் தண்ணீர் பாசனம் கொடுத்தால் போதுமானது. சுமார் 15 தரம் தண்ணீர் இறைக்கும்படியாய் வேண்டும். பிச்செய் தேயீழ்:—

கி.டு ஒருமாதத்திற்கெல்லாம் களைபெடுக்க வேண்டும். இரண்டு தாதுக்குக்குறைபாய்வு களைபிடுங்க வேண்டும். கொத்திவிடும்போது கம்புக்கு மண்ணைப் பதுபோல மண் அணைப்பது திறம். பயிர் தழைத்து வளருமபட்சத்தில் கெல் பயிர் கலை யறுப்பதுபோல இசையுள் அறுத்துவிடலாம்.

வயசு அறுப்பு:—

ராகி 4-மாதத்துப்பயிர். செப்டம்பர், அக்டோபரில் கட்டால் ஜனவரிக்கடைகிக்குள் அறுத்து விடலாம். பயிர் ஒரே காலத்தில் சேர்த்தாற்போல் பழுக்காததால் அறுவடைக்குக் கொஞ்சம் கிரமமும் செலவும் தேரிடும். கதிரைத்தாளினின்றும் பிரிப்பது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆகையால் பரிசை அறுத்துக் கதிர்ப்போராய்ப் பேரட்டு தானியம் கொஞ்சம் புழுங்கினவுடன் கதிரடிப்பது வழக்கம். கெல்லுக்குள் இதற்கும் பேராடிக்கக் கல்லுனைகளைப் பிரயோசனப் படுத்துவது திறம். பரிசை கிரமப் முகிரவிட்டு அறுத்தால், கெலைப்போலக்கொட்டுண்டுபோகும். கண்டு முதல்:—

புஞ்சையில் ஏக்கர்வுக்கு சராசரி கண்டுமுதல் 500 பவுண்டு. கெல் புஞ்சையாலுல் சுமார் 1000 பவுண்டு, கண்டு முதலும் கிடைக்கும். புஞ்சையிலும் தோட்டக் காலிலும் கல்லுமியில் சுமார் 2000 பவுண்டு வரையில் தானியம் கிடைக்கும். ஆனால், புஞ்சையிலும் தோட்டக்காலிலும் சராசரி கண்டுமுதல் சுமார் 1000 பவுண்டு தான். சுமார் 5000 பவுண்டு வரையில் வைக்கோல் கிடைக்கும். கேழ்வரகு வைக்கோலை மாடுகள் ருசியுடன் தினனும்.

கெலவுபோக வறுப்படி:—


புஞ்சையில் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சகல செலவுமேபோக ரூபாய் 15ம், இதாச்சாகுபடிகளில் சுமார் ரூபாய் 15ம் வருமானம் கிடைக்கலாம்.

22 தானியவகைப் பயிர்கள்.

சிறைச்சாலை உணவு:—

கேழ்வரகு நமது இராஜதானியில் சிறைச்சாலைகளில் குற்றவாளிகளுக்கு உணவாகக் கொடுக்கப்படுகின்றது.

வரகு.



வரகுப் பயிரும் வரகக் கதிரும்.

பயிரின் கபாலம்:—

வரகு மகா கெட்டியான தானியம். பாக்கி தானியப் பயிர்களைப்பார்க்கிலும் இது மகா கோடையையும்,

மகாமாரியையும் தாங்கும். இது சாதாரணமாகப் புஞ்சை யில் தான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

மாதிர்கள்:—

பெரு வரகு, பனிவரகு என்று இரண்டு முக்கிய மாதிரிகளிருக்கின்றன.

பூமி:—

மகா கீழ்த்தரமான நிலத்தில் சாகுபடி செய்யப்படு கின்றது. கல்ல நிலத்தில் சாகுபடி செய்தால் பூமி யை சளைக்காப்பண்ணும்.

செய் நேர்த்தி:—

மட்டமான தானியமானதால், இதன் சாகுபடியில் அதிக கவனம் பாராட்டுகிறதில்லை. ஒரு மழையில் உழுது வரகைத் தெளிப்பது வழக்கம்.

விதையின் அளவு:—

ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 15 பவுண்டு விதை செல லும்.

காலம்:—

அகேசுமாய் சூலை ஆகஸ்டில் தெளிக்கப்படுகிறது. அதுதான் தகுந்தகாலம்.

உரம்:—

இதற்கு எருவே போடுகிறதில்லை.

பிச்செய் நேர்த்தி:—

சில ஜில்லாக்களில் துவரையோடு கலந்து விதைக் கிருர்கள். ஒருநாள் அல்லது இரண்டு நாள் கொதிக்க களை யெடுப்பதுண்டு.

பாகளம்:—

சுமார் 15 அங்குலம் மழை பெய்யக்கூடிய, இடங்க ளில் வளரும்.

வயசு அறுப்பு:—

இது சுமார் 5 மாதத்துப்பயிர். ஆகஸ்டு மாதத் தெளித்தால் ஜனவரியில் அறுவடைபாகும்.

கண்டு முதல்:—

ஏகரா ஒன்றுக்கு சராசரி சுமார் 500 பவுண்டு தா னியம் கிடைக்கும்.

வைக்கோல்:—

வரகு வைக்கோல் மாட்டுத் தீவனத்துக்குப் பிர யோசனமில்லை. நிரம்ப கெட்டியாய்க் கூப்பிடுபால் இருப்பதால், மாடுகள் அதைத் தன்று ஜீரணிக்கு சக்தி யில்லாதனவாயிருக்கின்றன.

பிரயோசனம்:—

புனையிலே பிரம்ம பண்ணுவதற்குப், பழங்களைப் பழுக்கவைப்பதற்கும் வரகு வைக்கோல் பிரயோசனப் படுகிறது. வரகு வைக்கோலினால் ஒருவித கல்லவாச னையும், கல்ல ருசிபும் உண்டாகிறது. இந்த குணம் பாக்கிவைக்கோலுக்குக் கிடையாதாம். கூரை வேப்பவதற்கு வரகு வைக்கோல் முதல் தரமானது.

பணவநுயானம்:—

ஏகரா ஒன்றுக்கு செலவெல்லாம் போக சுமார் 3, 4 ரூபாய் கிடைக்கலாம்.

திவனயும் சாமையும்



திவனப் பயிரும், தினைக் கதிளும்.

பயிரின் கபாவம்:—

தினை வரகைப்போல் தேகத்துக்கு உஷ்ணம் கொடுக்கக்கூடியது. சாதாரணமாய் இதைபும் புஞ்சைப்பயி

தினையும் சாமையும்.

27

ராகத் தான் சாகுபடி செய்திருந்தால், தினையில் அநேக தினைகள் உண்டு. நஞ்சையிலும் சாகுபடி செய்தல் துண்டு.

புயம்:—

இது கரிசலிலும் செவ்விலும் வரும்.

செய் முறை:—

உழவு முதலியவை தேவ்வரகுக்குப் பணனுவது போலத்தான்.

விதை முகலியை

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 15 பவுண்டு விதைசெல்லும்; குள், குவையில் விதை தெளிசெய்யப்படுகிறது. இது நாலாறுதத்துப்பயிர்.

கண்டு முதல்:—

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 400 பவுண்டு கண்டுமுதல் கிடைக்கும்.

கலப்புப் பயிர்:—

இது தனியாகவாவது அல்லது புஞ்சையில் பருத்தி யோடாவது கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.


ஏகா ஒன்றுக்கு செல்வெல்லாம் போக சுமார் ஐந்து பாய் 5 கிடைத்தால் பெரிது.

சாமை:—

இது ஒருமட்டமான தானியப்பயிர். சப்பையான நிலங்களில் நன்றாய் வளரும். பாசனத்தில் வல்ல மாட்டுத் தீவனத்தை கொடுக்கும். தினையைப்போல தான் சகல சாகுபடியும். சாமை களத்திலேயும், எள் முரத்


திலையும் என்ற பழைமொழிப்படி, கனத்துக்கு நிகர ணடுபோனபிற்பாடு தான் கண்டு முக்லை உருவாக்க லாம். சைதாபேட்டைப் பண்ணையில் 4 மாதத்தில் சுமார் 40000 பவுண்டு பசுநாள் தீவனம் கொடுத்ததாக வும், இதைக் காயப்போட்டதில் நாய்க்குப் புல் சுமார் 15000 பவுண்டு கிடைத்ததாகவும் தெரியவருகிறது. மாட்டுத்தீவன சாகுபடிக்காக ஏக்கர் 1க்கு 28 வண்டி சாண உரமும் பாசனம் 7 நடவையும் செய்யப்பட்டிருக்கிறதாம்.

கோதுமை.



கோதுமைப் பயிரும் கோதுமைக் கதிரும்.
பயிர்ச் சுபாவம்:—

இதன் விதைத்தயவுக்கு முக்கிய உணவு. நல்ல புஷ்டி கொடுக்கக்கூடிய தானியம். இது மாரிகாஸ்பயிரி.



கோதுமைப் பயிரும் கோதுமைக் கதிரும்.

இது புஞ்சைப்பயிராகவும், தேரட்டப்பயிராகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. இது வடமேற்குத் தானியில் சொற்பமாய்ப்பயிரிடப்படுகின்றது.

மாடிகள்:—

மாவுகோதுமை, ரவைகோதுமை, வாலகோதுமை என்று சிலவகைகள் உண்டு.

கோதுமை.

பூம்:—

கலவ கரிசலிலும், செவ்வலிலும் பஞ்சை நிலங்களிலுமாகிய கலவ கொழுமைபான நிலங்களில் தான் வளரும்.

உம்:—

இதற்குக்குப்பை ஒருவும், ஆட்டுக்கிடையும், சுப்பாந்த அடிமணலும், வாய்க்கால் மெருக்கும் எருவாகக் திகையமுத்தாரில் போடப்படுகின்றன. பசுத்தான் ஒரு உண்டு பண்ணி உழுதுவிடுவதும் திறம்.

வெய் போதி:—

செய்யென்றில் சிலம் 4—5 தடவை உழுப்பட்டு ஏக்கர ஒன்றுக்கு 2000 ஆடு விதம் கிடை வைக்கப்படுகிறது. கவாயா வரையில் அக்கேசம் உழவுகளை பெறுகின்றது. புஞ்சையில் சேளத்துக்கு உழுலதுபோல உழுகிறார்கள்.

விதையின் வரவு:—

ஏக்கர ஒன்றுக்கு 80 முதல் 120 பவுண்டு வரையில் விதை செலவுகிறார்கள். ஆனால் சுமார் 40 பட்டணம் படி போதுமா. கைத்தொழியால் விதைகள் விதைக்கப்பட்டு, தேரட்டச்சாகுபடியில் தண்ணீர் இறைவைக்காகப் பாத்திகளும் போடப்படுகின்றன.

காலம்:—

அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்கள், சாகுபடியாரம் சிக்கத் தகுந்தகாலம்.

புளியேயுநீர்த்தி :-

சமயத்துக்குத் தகுந்ததுபோல் பூம், 2-3-நாள் கொத்திவிடப்பட்டு சுளைகள் நீக்கப்படுகின்றன.

பாசனம் :-

விதை தெளித்து 3-வாரத்துக்குள்ளாய் ஒருசாம ஜலம் இறைக்க வேண்டும். அதுமுதற்கொண்டு, மழை இல்லாவிடில் வாரம் ஒரு தண்ணீர்விதம் பாய்ச்சி வர வேண்டும்.

வயக, கண்டுழதல் :-

இது நான்கு மாதத்திப்பயிர். ஏக்கர் ஒன்றுக்குத் தோட்டச்சாகுபடியில் சுமார் 1000, பவுண்டு தானியம் கிடைக்கும். புஞ்சையில் சுமார் 500, பவுண்டு தானியம் கிடைக்கும். தானியம் ஊஞ்சும் பழுத்த முதுகிற் வரையில் அறுவடை செய்கிறதில்லை.

செலவுபோகவருமானம் :-

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சுமார் மொத்தவருமானம் தோட்டச்சாகுபடியில் ரூபாய் 30-க்கு செலவு ரூபாய் சுமார் 15 போய்விட்டால் பாக்கிவருமானம் ரூபாய் 15க்குமேல் கிடைப்பது. புஞ்சையில் ஏக்கர் 1க்கு மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபாய் 15 செலவு ரூபாய் சுமார் 10 போனால் பாக்கி வருமானம் ரூபாய் 5 கிடைத்தால் பெரிது.

கைத்தொழில் :-

கோதுமையிலிருந்து ஒருவித—மாவும், ரவாயும், ரொட்டியும் உண்டாக்குகிறார்கள்.

முத்துச்சோளம்.



முத்துச்சோளப் பயிருர்; முத்துச்சோளக்கதிரும்.

பயிர்ச் சுயவம்:—

இது வட இந்தியாவில் சிலபாகங்களில் முக்கிய உணவாயிருந்தபோதிலும், சென்னை இராஜதானியிலும், சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. இது அமெரிக்காசனாக் குழுக்கிய உணவு. பால் சுறவை ஜாலுதி பண்ணுவதற்கும், மாட்டை கொழுக்கவிடவும் இத்தானியத்தை அரைத்துக்கொடுப்பது வழக்கம்.

மாதிரிகள்:—

இது வெள்ளை, சிலப்பு, மஞ்சள், ஊதா, கறுப்பு இப்படி அநேக மாதிரிகள் உண்டு. சிலகாயங்களில், ஒரே சோளக்கொண்டை அநேக நிறத்தை உடைத்தாயிருக்கிறது. வெள்ளையும், ஊதாவும், எல்ல உயர்ந்த ஜாதிகள், கறுப்பு நிறம் மட்டமான தினுக.

பூம்:—

சுக்கான சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியும், படுகை நிலமும் முதல் தரமானவை. மணல் சம்பந்தமுள்ள களியிலும் உரத்தின் பேரில் கனரகம் வளரும்.

காலம்:—

வடகிழக்கு மழைக்காலம் பயிர் செய்யவந்ததத் தருக்காலம்.

செய் நேர்த்தி:—

சூன், சூலையில் உழப்பட்டு செப்டம்பரில் அப்படி உழுதபூமியை முகடுகளாகவும், உழவுச் சாலகளாகவும் பிரித்து, உழவுச்சாலகளை மடித்த சாணம், குப்பை முதலியனவிகளால் நிரப்பி முன் உழவுச்சால்

களாக இருந்தவைகளை முகடுகளாகவும் முன் முகடுகளாக இருந்தவைகளை உழவுச்சால் களர்க்குமாக்கி இரண்டாவதுகட்டைவ ஆக்கப்பட்டிருக்கிற முகட்டில்விதைகள் புதைக்கவேண்டும். ஒரு முகட்டுக்கும் மற்றொரு முகட்டுக்கும் 2 அடி வித்திபாசமிருக்கவேண்டும். முகட்டிலேயே ஒன்றையடித் கொருதரம் கூர்மை யான குச்சியால் குழிகள் பண்ணி ஒவ்வொரு குழிக்கும் தாது வினவதை 2 விதம் புதைக்கவேண்டும். பசுந்தான் வீருவால் நிலத்தை வளம்பண்ணுவது நலம். விதை:—

ஏதா ஒன்றுக்கு சுமார் 30-பவுண்டு அல்லது 10 பட்டணம் படி விதை வேண்டுமாம்.

பிச்செய்நேர்த்தி:—

பயிர்ச் சுயவமும் உயர்மிருக்கையில் முகடுகளைக் குறுக்கே உடைத்து விட்டால், ஒவ்வொரு பயிரும் ஒரு சிறுதூண்விவிருக்கும். பயிர் ஓர் அடி உயர்மிருக்கையில் பண்ணுக்கு முதலிய உரத்தைப் பயிரடியில் வைத்து பூமியைக் கொத்தி மண்ணைவததால் பயிர் கன்றாய் வளரும்.

களைபிடித்தல்:—

தெளித்து இரண்டரை மாதத்துக்கெல்லாம் பூக்க ஆரம்பிக்கும். அதற்குமுன் மூன்று களைத் தடவை கொத்திக் களைபிடிப்பது உத்தமம்.

வயக, அறுப்பு:—

இது 1½ மாதத்துப் பயிர். செப்டம்பரில் விதை தெளித்தால் ஜனவரிக் கடைசியில் அறுவடை செய்ய

லாம். சோளக் கொண்டைகள் தாவிலிருந்து காயது காயவைக்கப் படுகின்றன. கொண்டைகள் கனரகக் காய்தவுடன், தானியம் பிரிக்கப்படுகின்றது.

ஒரு செடிக்கு இரண்டு கொண்டைகளுக்கு மேல் சில வேளைபிருந்தாலு மிருக்கலாம்.

கண்டு முதல்:—

ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 1000-பவுண்டு தானியமும் 2½ டன் வைக்கோலும் கிடைக்கும். செல்வெல்லாம் போக; ஏகரா ஒன்றுக்கு ரூபாய் 15 வருமானம் வரலாம்.

கைந்தேயில்:—

முத்துச் சோளத்திலிருந்து ராக்கரையும் ஒருவிதமாகவும் உண்டுபண்ணலாம்.

கலப்புப்பயிர்:—

இப்பயிரைத் தனியாகவும் பருத்தியோடு கலந்தும் சாகுபடி செய்யலாம். பருத்தியோடு கலந்து சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் பருத்தி இரண்டுபாசமும், சோளம் ஒருபாசமுமாக கிளவில்தீரனத்திலிருக்க வேண்டும். அப்போது ஏகரா ஒன்றுக்கு சோளவிதை 10-பவுண்டு போதும்.

மழையிடிவு:—

25—30 அங்குலம் மழை பெய்யுமிடங்களில் வளரலாம்.

துவரை முதலிய கோதுப்பயிர்கள்.

கொள்ளு.



கொள்ளுப்பயிர்.

பயிர் சபாவம்:—

இதை தானியக் குக்காசலம், இன்ன துகக்காசலம், பருந்தால் எருவுக்காசலம், சாகுபடி செய்யலாம். கொள்ளை வேகவைத்து வண்டி மாதிரிக்குத் துக்கி மாகளுக்கும், கொடுப்பது கழக்கா, மீதாண்டுப்படி மீதாண்டு தானியம் ஏராளமாகத் தனிப்பயில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. நல்ல பூமிகளில் பருத்தியோடாவது, வேறு இதர தானியப்பயிர்ப்போன்றது கருத்து சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

தஞ்சை பூமிகள்:—

மிகக் சபையான பூமிகளில் சாகுபடி செய்யலாம். பூமியில் சக்காள் சபாபடி கொண்டு பட்டி பட்டிருக்கும்படிச் சத்தில் பயிர் தானியமில்லாமல் தண்ணீர் சம்பாமாகப்போயவோ இப்பயிருக்கு சபாபடி மூக்கில் தீவிரமானவை, சக்காள் சபாபடி மூக்கில் சபாபடி திறந்து திரைக்கிழை.

இதை அதிக கொட்டை மூக்கில் சபாபடி தானிய சாகுபடி செய்யும்படிச் சத்தில், சபாபடி சபாபடி போடல், சபாபடி பயிர் செய்வதற்குத் தகுந்த சபாபடி பசுநகரத்தாக சாகுபடி செய்யும்படிச் சத்தில், சூசு சூசுபிள பிளவை தண்ணீர் பண்ணலாம். செய்கிறீர்கள் இதைச் சபாபடி.

2—3 தரம் பூமி உழப்பட்டு, விதைகள் கலந்துகலப்படுகின்றன. சாலங்கிதி சரியாயில்லாமலும் பூமியும் இளப்பமாயிருந்தால் ஏகாவுக்கு சுமார் 40 பவுண்டு

விதை செல்லும். நல்ல பூமியிலும் சலல் பருவத்திலும் விதைக்க ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 20 பவுண்டு விதைபோடும். பூமித் திவனத்துக்கும் பக்காள் நடுவுக்கும் சாகுபடி செய்யும்படிச் சத்தில் ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 30 பவுண்டு விதை செல்லும். இதைக் குத்தெனியிலும் பதவிகளிலும் கொரு (மூக்கில் குழாய் விதைத்தென்குறு) விதை செல்களும் விதைகளியால் தெளித்தால் கலப்பையால் உழந்து விதைப்பா மூடியது கழக்கம் கொருவால் தெளித்தால் குண்டாகலாக மூட்டும்.

பயிர் சபாபடி:—

இந்தப் பயிருக்குக் களை பிடுகுதல் முதலியவை செய்கிறதில்லை. ஏகாவில் பயிர் பட்டும் சபாவ மாறுதலில் அதிக விதைகளில் எவ்வெவ்வாறில் செய்கிறது. விதை தெளித்த பிறகு அதிகமலை பயிருக்குச் சபாபடி.

சபாபடி தகவர்தல்:—

இதில் சபாபடி அகப்போயில் தெளித்தால் தண்ணீரில் அதுவடை செய்யலாம். நல்ல பூமியில் ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 200 பட்டியாய் தானியம் விதைக்கும். மாதிரித் திவனத்திற்குச் சாகுபடி செய் மாதிரிச் சத்தில் ஒரு வருஷத்தல் பசுந்தான் 4—5 அதுபடி பசுந்தான், ஏகாவிலு அதுபடி மூக்கில் சுமார் 2000 பவுண்டு பக்காள் விதைக்கும். 1 பட்டியாக தானியத்தைப் போடப்போட்டால் 1 பட்டியாக பட்டியாக விதைக்கும்.


சியோசனம்:—

இது தானியப்பயிர்களைப்போல நிலத்தைச் சளைக்கப் பண்ணாது. இந்த தானியத்துக்காவது, மாட்டுத்தீயை ததிறகாவது சாகுபடி பண்ணின் போது இம் பூயிக்கு கல்ல வளப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. இதன் மேலிருந்தும், இவை உதிர்வுகளும் நிலம் கொழுமையடைகிறது. ஆகையால் பசுக்கள் எருவுக்காகச் சாகுபடி செய்தபின்னர் பூயிவேண்டு உழுதுவிட்டால் சாகுபடி நிலம் அல்லது சளைத்த நிலம் வளமாய் மலையும்.

காயிந்தபுல் தீவனம்:—

இதனுடைய பசுத்தானைக் காயப்போடும், மாட்டுத்தீவனமாகக் கொடுக்கலாம்.


பயனும், உளுந்தும்.



பயனும் பயிர்.

பயிர் பயனும்:

இவைகளும் உளுந்தும் தீவிரப்பயிர்கள் தான். இவைகள் எலிக்காய் பயிர்களாகச் சாகுபடி செய்யப் படுகின்றன. பயறு அகையாய் ஏதாவது ஒரு தானிய பயிரின் மேல் தவறுதலாகத் தானியப் பயிரை விதைக்கிறது.



உளுதுப்பயிர்

உளுத்தோர் தன்னைப்பில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது ஆனால் உளுத்து அதிக விளக்கோணத்தில் பயிர் பண்ணப்படுகின்றதில்லை.

மாதிரி:-

பயறில் பலவகைகள் உண்டு. பச்சையாறு, பனிய் பயறு முதலியன.

பூம்:-

இவைகள் களி நிலங்களில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. சிலவேளை அதிகக்களியில்லாத பண்ணைகளிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.

காலம்:-

செய்டெம்பர் முதல்பார வரையங்கள் சாகுபடி செய்யக்கூடுத காலம்.

செய்கைத்தீ:-

செய்டெம்பரில் கிலம் இரண்டு மூன்று தரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. விளைகளை தெளிக்கப்படுகின்றன.

உளுத்துக்குப் பயறு வளமானதெனில் கிலம் உற்பத்தி ஏறவும் வேண்டும்.

விளையுள் அளவு:-

செய்டெம்பர் முதல் பாரில் ஏதாவது விளைக்து சுமார் 25 பவுண்டு விளைகளை எடுத்தெளிப்பால் தலக்கவாவது அல்லது வரிசை வரிசையாகவாவது தெளிக்கப்படுகின்றன.

பிச்செய் செய்தி:-

பயிர் நெருங்கிவிருக்கும்பொழுது ஏர்களைக்கொண்டு பயிர் எடுத்தலும், களை பிடித்துவிடும்பொழுது களைக் கொட்டால் கொத்திக் களை பிடித்துவிடும் 2, 3 தரம் செய்யப்படுகின்றன.

வயகு, கண்டுழதல்:

இவைகளிரண்டும் காங்கு மாதத்தின்பயிர். செப்
டம்பரில்தெளிந்தால், ஜனவரி ஆரம்பத்தில் அறுவடை
செய்யலாம். ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 500 பவுண்டு
முதல் 500 பவுண்டு வலையில் வண்டு முதல் தலைக்
குழல் திண்ணம் முதல் தனியையில் காதுபசி செய்யப்
பட்ட பூமிக்குப் பெயரில் விழு தானியப்பயிர்களை
களைகுப் பண்ணப்பட்ட பயிருத்தலை தானியப்பதிகோடு
களைகுப் பரிசிடலால் ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 200-பவு
ண்டு தான் தானியம் கிடைக்கும்.


தீவனம்:

கொறுக்கப்பட்ட காம்பு, இலை, பொது, கோல முத
லியவைகள், மட்டுக்கு அல்ல தீவனமாகின்றன. பற்ற
ம் பெட்டை, பசுபால், உளுத்தம் பொட்டு, அல்லள்வு
கிளக்கியால், உளுத்தம் பொட்டில் கொண்டு ஜிஸி
ஆகையால் அதைப் பற்றம் பொட்டோடு கலந்து
கொடுப்பது சிறம்.

வரப்பிலும் சாதுபு செய்யலாம்:

உளுத்தம், கஞ்சை வரல் வரப்புகளின் செடியப்
பில் விதைத்து ஓசூரில் அறுவடை செய்யலாம்.
பயிர்நடை கஞ்சையில் அறுப்புக்கு 20 நாள் முன்பு சாப்
படைபிறக்கும்போது தெளித்து விடுவது வழக்கம்.
இந்த வரல் பயிர்நடை மரக்காந்தம் அறுவடை செய்
கிறது வழக்கம்.

கொத்துக்கடலை



கொத்துக்கடலை.

பயிர் கபாவம்:

கடலை, ஜலத்திலு லுறவைத்தாவது வெகுவைத்
தாவது, பெய்கள்ளத்தில் குதிரைக்கு உணவாகுக்

கொடுக்கிறார்கள். இதுவும் கண்ணாம்புத்தீனிப் பயி
தான். இது பனிகாலப் பயிர்.

பூமி:—

இது கரிசன காட்டியில் முக்கியமாய் பயிரிடப் படு
கின்றது. உரப்பரன்களி நிலங்களில்கன்றாய் வளரும்
இது அனேகமாய்த் தணிமையில் பயிர்செய்யப் படுகின்
றது. கவம்பா டிசம்பரில் சேரளம் அதுவடை
பண்ணப்பட்ட பூமியில் இது பயிர் பண்ணப்படுகின்றது.
காலம்:—

கவம்பா டிசம்பர் மாதங்கள் பரிவர்த்தைக்குத் தகுந்த
காலம்.

செய் தோத்த:—

இதற்கு 5-6 தரத்திற்குக் குறைபாமல். கல்ல
ஆழமான உழவு வேண்டிம். சுட்பை, பல்லாநிலிலங்க
களில் குளடகா, கொட்டுகலப்பை முதலியவைகளைக்
கொண்டு பூமி கன்றாய் செய்கொத்த பண்ணப்படு
கிறது.

விதைகள் அளவு:—

கவம்பா தண்டியிலாவது, டிசம்பர் ஆரம்பத்திலா
வது வகா ஒன்றுக்கு சுமார் 25 பவுண்டிக்கு மேல்
40-பவுண்டு வரையில் விதைகள் தெளிக்கப் படு
கின்றன.

பாதுன் மழை:—

முன் கண்டபிறகு இப்பயிருக்கு அதிகமழை வேண்
டியதில்லை குளிர்காலத்துப் பனியைக்கொண்டே பயிர்
முதிர்ந்துவிடும்.

கொத்தல்:—

விதை தெளித்து மூன்று வாரத்துக்கு கெல்லாம்
ஒருதரம் கொத்தி விட வேண்டும்.
வயது கண்டுதேறல்:—

இது மூன்று மாதத்தையுடையது. வகா ஒன்றுக்கு
தூண்டு கண்டு முதல் சுமார் 1300 பவுண்டாகும்.
சராசரி கண்டு முதல் 200-பவுண்டாம் படிக்குமேல்
இல்லை.

மடட்டுத்தல்:—

சுடலைப் பொட்டிம் மடட்டுக்கு கல்ல துவளம்.

தைத்தோழல்:—

பயி வளர்க்கையில் ஒருவிதமான பரிப்பு ஜலத்தை
வடிய விடுகிறது. இதற்குக் கட்டிப்பிளிப்பு என்று
பெயர். இரத்தியில் கல்ல சுத்தமான வெள்ளை
மங்லிஸ் (Mungli) துளியைக் கட்டிப்பிளிப்பேரில்
விசித்து வைத்திருக்கல், பிசுபிசுபுள்ள காய்கலந்த
பனி ஜலம் துளியில் சுவடம். இததுணியை மறுபுள்
தடுவாய் பிழிச்சால் கட்டிப்பிளிப்பு உண்டாகும்.
இவ்வித சேய்க்கலை துணை தது அஜிசன்ம மலகட்டி.
இனல்தனக்கு மருத்தாக உபயோகிப்பது வழக்கம்.

துவரை.



துவரை.

பயிர் சுயவம் :-

சுண்ணாம்புத் தீனிப் பயிர்களுள் துவரை நிரப்ப முக்கியமானது. ஏனெனில், இதன் பருவைப் பயன்பாடுகள் துவரை உண்ணாமைக்குப் பதிலாக, புஷ்டி கொடுக்க

துவரை.

கூடியவாறு உதில் தூள். இது எழும்பும்தும் தானியப் பயிர்களுடைய கனத்துடன் பயிரிடப்படுகிறது. சில வேளைகளில் தானியப் பயிரிடும்படி கிட்டுகின்றது. வேள்கூறுக இப்படி மகிழ்தவன் விலைதுண்டு. இது வருஷம் வருஷம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

இதன் மலத்துவரை பெரிதும் கட்டித் துவரை மென்மும், வெள்ளைத்துவரை மென்மும் சிவப்புத் துவரை மென்மும் அச்சு மச்சுநிலைக்குக்கின்றன. நாட்டித் துவரை வெட்டி மலத்துவரை வெள்ளை மலத்துவரை மென்மும்.

பயிர் :- துவரை கொழுந்தகரி பூய் பூய், கள்ளை முளையிடுவதற்கு வளரும். சாதாரணமாகப் பருகிச் சுவைக்கிற தானியச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. நெய்மேகித் :-

பயிர் வேர் ஆழமாய் ஆறினால்தான் ஐந்தாறு உழவுக்குத் குறையாமல் உழவேண்டும். அப்படி உழவு ஆகிய பருவத்திலும், சுண்ணாம்பு நீர்நிலை உரப் படுத்தி விட்டு வரகு, கம்பு, முகில்வள்ளுநிலை உகத்து பருகி வேண்டும். ஒரு வரிசைப்படுக்கும், இன்னொரு வரிசைப்படுக்கும் 6 அடி விட்டமாகத் தூக்குக் குறையக்கூடாது. வரிசையிலேயே ஒரு பருக்கும் இன்னொரு பருக்கும் 1½ அடி விட்டமாகத் தூக்கு வேண்டும். 5 வரிசை வரகு ஒரு வரிசை துவரைப்படுக்கும் இரண்டு வேண்டும்.

காலம் :—

சூன், சூலை மாதங்கள் தான் விதைப்பதற்குத் தகுந்த காலம். சிலவேளை ஆகஸ்ட் மீது தெனிக்கப் படுகிறது. விதையின் அளவு:—

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சுமார் 15-பவுண்டு விதை செல்தும். இதைச் செருளால் வரிசை வரிசையாய்த் தெனிக்கலாம். தென்னில்லாக்களில் இது கைத்தெனியால் தான் தெனிக்கப் படுகின்றது. துவரைப்பயிர் மத்தியில் தானியப்பயிர்களைத் தெளிப்பது வழக்கம்.

காயெடுத்தல் :—

இதற்கு முன்னு காங்குதரம் கொத்திக் களை யெடுக்க வேண்டும்.

வயகு சண்டெடுத்தல் :—

இது 11 மாதத்தியபயிர். சூலையில் விதை தெனிக் காலம். ஜனவரியில் அறுவடை செய்யலாம். ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ஜாவ்தி கண்டுமுதல் தானியம் சுமார் 1000 பவுண்டும், சராசரிக் கண்டுமுதல் 500-பவுண்டும் தான் விடைக்கும்.

மாட்டுத்தீயி :—

துவாரம் பொட்டி மாட்டுக்குப் பால் சுற்றலையை ஜாவ்தி பண்ணக் கொடுப்பது வழக்கம்.

பிரயோதனம் :—

துவரை மலாக்கரியை, பெய் மருத்து செய்ய உபயோகிப்பது வழக்கம். மலாக்கை கூரவேய்வதற்குமுன் கூடு பிண்ணி உடைக்கிணற்றில் மண்ணையாக வைப்பதற்கும் பிரயோஜனப்படுகிறது.

காராமணி அல்லது தட்டைப் பயறு.



காராமணி அல்லது தட்டைப் பயறு.

கோதுப் பயிர்கள்

பயிர்க்காலம் :-

இது மாட்டுக்குத் தினிக்காகவும், பசுக்களின் வுக்காகவும், தானியத்துக்காகவும் பயிரிடலாக இதை கொடி சேக்கிரத்தில் வளரும். அமெரி தேசத்தில் பசுத்தான் எருவுக்கு, இப்பயிரை நி சிலாக்கியமாகக் கொண்டு பயிர் செய்கிறார்கள். ராஜா கானியில் இப்பயிர் சேத்தவாக, கடைசியிலாக டன் கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

அநேக சிறமுள்ள கிராமணி தினிக்கை இருக்கின்றன. இதில் செடிக்கிராமணி பெயரால், கிராமணி கிராமணி பெயரால் இரகசியமாகவருகின்றது.

பூமி :-

இதற்கு சுகமான சமத்தரமுள்ள அரிவெட்டிலாகிய யம், இதில் தானியத்தை எடுக்கலாம். பெரிய நிலமும் திறமாள. வளமருவாகிய பூமிபயிர்நுக்கும் பட்சத்தில், அசலிலங்களில் இப்பயிரை உண்டாகிய பூக்கும்பொது பூமிபயிர் உழுதுவிட்டால் பூமிபயிர் இளம்பர நிலையிலேயும், இவ்வதமாக அபிவிருத்தி தேசத்தாக்கள் இளம்பரான பூமிபயிர் வளம்புள்ள பூமிகளாக ஆக்குகிறார்கள்.

காலம், விதை முதலியன :-

இதுமாரிகாவப்பயிர், அக்டோபர் காலம் முதல் சாகுபடிக்குச் சிலாக்கியம். இதை வரிசை வரிசையாகவும், வகைகளையாலும் தெளிக்கலாம். ஏதாவது சேய்ய உக்கு சுமார் 10-15 பவுண்டு விதைசெய்யும், பசுக்கள்

கிராமணி அல்லது சுட்டைப்பயிர் 55

க்காத அமெரிக்கர்கள் சுமார் 50-60-பவுண்டிலினை வறையில் தெளிக்கிறார்கள். வரிசை வரிசையாக தெளிக்கும் பட்சத்தில் ஒருவரிசைக்குத் தினிக்கொரு வரிசைக்கும் சுமார் 2-4 அடி வந்தியாகிய இருக்கவேண்டிய விதைவழி 1-2 அடிவழி ஆகியதில் பதைக்க வேண்டிய அகிலமும், குவிந்திலவாகிய பசுத்தில் விதை தெளிக்கவேண்டிய, கொத்தல், தளைப்பிடுதல் எல்லாம் இது கோதுப்பயிர்களைப் போலத்தான்.

வாய்க்காட்டுமுதல் :-

இது சமனது மாதத்தியப்பயிர், ஏதாவது ஒருக்கு சுமார் 500 பவுண்டு காணியம் கிடைக்கும். மாட்டுத் தினிக்கத்துக்காக பசுத்தான் எடுக்குபட்சத்தில் சுமார் 25000 பவுண்டு பசுத்தான் கிடைக்கும். இதைக்காய் வைத்துப்பயிர் போலாகப் போட்டால் சுமார் 2½ டன் காய்த்தான் கிடைக்கும்.

தவினத்தின் உயர் :-


சுட்டைப்பயிர் கொடிக்கோக் கால் கிடைக்காத குக இவையாகிய அல்லவளின் மலிமூர்த்தியாகியே தேச மண்ணிலே சேக்கிரத்துவந்து பூமிக்கு உரமாக, இவ்வதுவரி, இப்படி, இவ்வது பசுத்தான் எரு வளம்பாக்கிலும் சிலாக்கியமாகக் கொள்ளப் படுகின்றது.

அழகு :-

இதில் பசுக்கள் ஒழிந்தவையில் முதிராமலிருப்பதால் அதுவடைபும் ஒகே காலத்திலாவதில்லை.

பசுந்தாள் உறம் :-

நல்ல பூமியிலுண்டாகும் பசுந்தாள் கண்டிமுகல இளப்பமான பூமியிலுண்டாவதைப் பார்க்கிலும் ஐஸ் சிராம் ஆனால் காராமணிக்குப் பின்வரும் பயிர்கள் இளப்பமான நிலத்தில் காராமணி பசுந்தாள் எருவால்



மொச்சைகொட்டைப் பயிர்.

குணத்தைச் சேர்த்தியல்மாய்க் காட்டுமே - பொழிய
கல்லிசெய்தில் அப்படித் தட்டிவது தெரியவரது.


அமெரிக்கர்கள் ஏகா ஒன்றுக்கு 300-பவுன்டு
கரைபக்கடிய ஏறுபுச்சத்தை உரமாகத் கொடுத்து
ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 2000-பவுன்டு தானியத்தை
அடைகிறார்கள்.

மொச்சைக் கொட்டைக்கும் இதேமாதிரிகான் சாகு
பாடியும் தன்னை முகலும்.

மொச்சை, கொட்டைபோன்ற உரமான பயிர்
களுக்கு காலாடகத்திலேயும் சுற்றிலாப்பயிர் செய்து
இரண்டி ஸிருத்தமாய் கொட்டைச் செடிதளில்
பிரிவுகள் தருதல் கொண்டுபயிர் சாகுபடி செய்வது
வழக்கம். மொச்சைக்களிலேயும் விட்டைச் சுற்றிலா
சாகுபடி செய்துகொடி சவற்றிலேயும் இரண்டுமேலேயும்
போதுபபடி சாகுபடி செய்வதுண்டு. பச்சை மொச்
சையை சுற்றியுக்கொடியும், கிணரதரி மொச்சையை
தானியத்துக்கொடியும் புளுகுகளில் சாகுபடி செய்வது
வழக்கம்.

எண்ணெய் விதைப்பயிர்கள்.

ஆமணக்கு அல்லது கொட்டை முத்துப்பயிர்.



ஆமணக்கு அல்லது கொட்டை முத்துப்பயிர்.

ஆமணக்கு ஈ கொட்டை முத்துப்பயிர். 57

பயிர் தபாவழம் வகையும். —

இது ஒரு தைவிதைப்பயிர். இதில் பெரிய ஆமணக்கு என்றும், சிற்றாமணக்கு என்றும் இரண்டு தினுக உண்டு. சிற்றாமணக்கு எண்ணெய் பேதிக்காகவும், பேராமணக்கு எண்ணெய் விளக்கு எரிக்கவும் உபயோகப்படும். இப்பயிர் எண்ணெய்க்காகவே சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. சிற்றாமணக்குத் தண்டு வெளுப்பதும் பேராமணக்குத் தண்டு சிவப்பாயுமிருக்கும். இந்த இரண்டு தினுக சாகுபடியும் ஒரே மாதிரியான. சிற்றாமணக்கு நீர்த்தரப்பயிர். பேராமணக்கு வருஷம் வருஷம் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. சிவ சிற்றாமணக்கு மாதிரி வருஷம் கொத்தாப்போல் பயிரிடுவதற்குரியது.

தந்தையினம். —

தோட்டக்கால நிலங்களிலும், கல்ல செவ்வெனிலும், மணல் களத்த களிமண்ணிலும், அன்றாடம் வளரும். பேராமணக்கு தண்ணீரிலேயும், சிற்றாமணக்கு கெழ்வார்து முதலிய தாழியாப்பிரதங்களோடும், சிழல் கொடுப்பதற்காக மஞ்சள் பம்போடும், சிலம்பாய் கொத்துக் கடலைகளோடும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

செய்துநீத்தி, தந்தையினம். —

கோவடமழை ஒவ்வொன்றுக்கும் பூயியை கல்ல உழவனிடேனு, பின்னாகுது, சாணம், கடை வைக்கல் முதலியவைகளால் உடப்படுத்தி வைக்கவேண்டும். துறிய, துறியை பயிரிடுவதற்குத்தகாலம். இக்காலத்தில் மழை பெய்தவுடன் பூயியை உழுது எருவை

யெல்லாம் கலைத்து, பாம்படித்து கல்ல செய்கோத்தி யுடன் பூமியை வைத்திருக்கவேண்டும். கொட்டை முத்துப்பயிர் முகக்கட்டான் பூச்சிகளால் கிரம்பத் தொத்தினை அடைகிறபடியால் மாரிகாலத்தில் பூமியை உழுது, செய்கோத்தி செய்து, பூச்சி, புழுக்களை எல்லாம் வெளிக்கொட்டி, பூச்சிகளாலும், எறும்புகளாலும், பாசமாகும்படி செய்யவேண்டும். கீப்படி விதை தெளிக்கிற வனையில் பூமியைமாதம் ஒரு முறை கொத்தி, கிளரி வைத்திருக்கவேண்டியது அவியிபம் விதைப்பு விதையின் அளவு:—

ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 16 முதல் 24 பவுண்டு வரை விதை செல்லலாம். சுமார் 10 பட்டணம் படி விதைப்போது, ஒரு கூர்மையான குச்சியால் குழி தோண்டி, குழி ஒன்றுக்கு இரண்டிலைத் வதம் புதைக்க வேண்டும். ஒருவரிசைப் பயிருக்கும் மற்றொரு வரிசைப்பயிருக்கும் சுமார் 4 அடி வித்தியாசம் இருக்கவேண்டும். வரிசையிலேயே ஒரு பயிருக்கும், மற்றொரு பயிருக்கும் சுமார் 1½ அடி வித்தியாசமிருக்கவேண்டும். விதையை குழியில் போட்டவுடன் மூடி விடவேண்டும். விதைக்கு முன், விதையை ஒரு நாள் வெந்நீரில் ஊரவைத்துத் தேளிப்பது நலம். கோத்தல், களைபிடுங்கல்:—

பயிர் ஓரடி உயரம் இருக்கையில், காந்திமுள்ள செடியை வைத்துக்கொண்டு, பாக்கியை பிடுக்கி யெறித்துவிடவேண்டும். அப்பொழுது ஒரு முறை பூமியைக்கொத்தி விடலாம். பிறகு மாதத்துக்கு ஒரு

ஆமணக்கு¹ கொட்டை² முத்துப்பயிர் 59

தடவைபாக்கதொத்தி களை பிடுங்குதல் நலம். பயிர் அடி உயரம் வளரும்பட்சத்தில் தலைபைக்கின்ளி கீழ்க்கிளை ஐந்து உண்டு பண்ணுவது சிலைக்கியம். அறுவடை:—

பயிர் 2-3 மாதமிருதையில் பூச்சி, புழு ஏதாவது இருந்தால் அவைகளை எடுத்து எறித்துவிட்டு சாம்பலைத் தூவுவது நலம். 7வது மாதம் முதல் 9வது மாதம் வரையில் தாய்கள் பறிக்கப்படுகின்றன. வயசு கண்டேதல், தேக்கித்தல்:—

இது 9 மாதத்திய பயிர். ஏகா ஒன்றுக்கு ஐந்து வரும்படி சுமார் 900 பவுண்டு. சராசரிக் கண்டு முதல் சுமார் 500 பவுண்டு தான். இவர்பயிர்களுடன் கலத்து சாகுபடி செய்தால் ஏகா-1க்கு சுமார் 250 பவுண்டு தான் கொட்டை முத்து கிடைக்கும். காய்கள் ஒரே காலத்தில் பழுக்காததால் கொட்டையில் பயிர் தரப்படுகிற வரையில், அடிக்கடி காய்கள் தேக்கித் தண்ணீருக்கும், கார்பொருளும் ஊதா கிளையிருக்கையில் செகரிக்க ஆரம்பிக்கவேண்டும். தேக்கித்து ஒரு மூலையில் கொட்டை வைத்திருந்து, காரணப் பேரகாமல் வைக்கொல்லில் 6-8 நாள் அடிவைத்திருந்தால் மேல் தோல்கள் அழுகா. பிறகு 2-3 நாள் வெந்நீரில் போட்டிருந்தால் காய்கள் வெடிக்கும். அச்சமயத்தில் தட்டுப் பலகையால் அடித்தால் கொட்டை முத்து எல்லாம் வெளி வந்துவிடும்.


கைத்தொழில் எண்ணெய் எடுத்தல்.

இதின் எண்ணெயை, பாம்புள்ள இயந்திரத்தினால் அழுத்தி பிழித்தவினாலாவது, அவ்வது வழுத்திகொதிப்பித தவினாலாவது உண்டாக்கலாம். மேல்கொவினைய எடுத்துவிட்டு உட்பகுப்பைச் சிறிய கொணியைப்பக்கலில்போட்டு இயந்திரத்தில் கொடுத்து அழுத்தினால் எண்ணெய் உண்டாகும். செவ்விலைவாத்து ஆட்டினாலும், எண்ணெய் உண்டாகும். அவ்வது கொட்டைமுத்தை அவ்வது ஜலத்தில் குழப்பி கொதிக்க வைத்தாலும் எண்ணெய் உண்டாகும். 100 பவுண்டு கொட்டைமுத்து கயிற் பவுண்டு எண்ணெய் கொடுக்கும்.

பிரயோஜனம்.

ஆமணக்கு எண்ணெய் தழைப்பாகருவதனால் இயந்திரங்களுக்கு தடவவும், விளக்குகெய்க்கவும், பெத்திருசாய்க்கவும், வறுத்திரபொன்னம் கொடுத்த கொட்டைமுத்துப் பிண்ணுக்கு கொள், கரும்ப, மஞ்சள், முதலிய பயிர்களுக்கு சிரமம் மெலானதாம். செல்வங்களுக்கு ஏகா ஒன்றுக்கு ஒரு பாரம் பிண்ணுக்குப், கருப்புக்கு ஏகா ஒன்றுக்கு ஏகா, 10 பாரம் பிண்ணுக்குப், மஞ்சளுக்கு கயிற் பாரம் பிண்ணுக்கும்கொடுத்தால் ஏகமான் கண்டு முதல் செயல்படும். கொட்டைமுத்துத் தண்டினதரி, வெடிமருத்துக்கு பிரயோசனம் படுத்தப்படுகிறது. தண்டுகள் எடுத்துத் தர, இலைகள் எடுத்து தினிக்குப் பிரயோசனம் படுகின்றன.

எஸ். ஏ.



பயிர்க்கப்பாவம்.

எஸ். ஏ.

இது கொட்டை முத்துப்பால் அவ்வளவு, கொட்டையான் பிச்சை. முத்துப் பிந்துவானபயிர். இதைப்

புஞ்சைப் பயிராகவும் தோட்டப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம்.

மதிர் :—

கருப் பெள்ளென்றும், வெள்ளை எள்ளென்றும் இரண்டு முக்கிய நிணங்கள் உண்டு. கருப்பெள்ளைதான் விசேஷமாகச் சாகுபடி செய்யப் படுகின்றது.

தஞ்சீப் பூமிகள் :—

இது புஞ்சைக் காலங்களிலேயும், கஞ்சையிலேயும், தோட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. படுகை நிலங்களிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம்.

செய் நேர்த்தி :—

எள்ளுக்கு ஏழுமழை வேண்டும். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு அதிகம் உழுதாலும் விளைபோகாது. உழுவு ஒத்தாப்போல இருக்கவேண்டும்.

பிண்ணுதல உரம் :—

எள்ளுப் பிண்ணுக்குகள் பிசும்பு சக்துடையதா தலால், கல்வெண்ணெயால் நிலத்திள்சத்து குறைவு படாமலிருப்பதாலும், எண்ணெயை எடுத்துக் கொண்டு பிண்ணுக்கை உரமாக பூமிக்குப் போட்டு விடுவது திறம்.

விதைப்பு விதையின் அளவு :—

விதை சிறியதாதலால் தெளிக்கு, பூமிக்குலும் உட்டி யுமாயிராமல் தூவாவளியடிகுப்பது திறம். விதையை வரிசை வரிசையாய்த் தெளிக்கு வேண்டும். ஒரு வரிசைக்கும் இன்னொரு வரிசைக்கும் சுமார் 1 அடி வித்தியாச மிருக்கவேண்டும். விதைகள் $\frac{1}{2}$ அங்குல

அழகுக்குக் கீழ்போகாமல் இருக்க வேண்டும். ஏகரா ஒன்றிக்கு கைத்தெளியில் சுமார் 10 பவுண்டு செல்லுகிறதாம். அதாவது 3 பட்டணம் படி வரை செல்லலாம். கொட்டு கலப்பையால் சால் சாலகளுக்க விதைத்தால் ஒன்று அல்லது இரண்டு பட்டணம் படி போதுமானது. கலப்பை உண்டாத வேண்டி இருந்தால் நெருக்கமாகத் தெளிக்கக் கூடாது. எள்ளு விதையின் சாமயில் சாகாரணமாகக் காப்பாற்றி வைக்கப்படுகிறது.

தஞ்சீந்தகாலம் :—

எள்ளுக்கு இரண்டு பிசும்பு உண்டு. எப்போது தெளித்தாலும் கோடைநில அறுவடை யாகும்படி யாய்ப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது. புஞ்சையில் விதை தெளிக்கு கலப்பை, மசம்பை தஞ்சீந்தகாலம் நல்லவாறும் கோட்டைகளிலும் கெல் அறுவடை யானவுடன் ஜனவரி, பிப்ரவரியில் தெளிப்பது நல்லது. எள்ளு பூத்திறகாலம் மழைகாலம் பிறப்பது கூடாது. பாகனம் :—

மனமில்லாத பட்சத்தில் இரண்டு தடவை பாசனம் தெளித்தால் போதுமானது. அறுப்புக்கு 15, 20 நாள் முந்தி பாசனமும் கூடாது கம்பழமும் கூடாது.

பிண்டைய நேர்த்தி :—

தெளித்துத் வர்த்துக் கெல்லாம் பாடுகட்டி பாடு அடிக்கவேண்டும். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு மாடுகட்டி பபிரடிக்கப் படுகிறதோ, அகலது கொத்திகளைப் படுவ கப்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு எண்ணெய்

44-38861-10

1990年12月

11293

கனகசூக்தி :

2000年12月

1970年

70011450

1940

சேலம், போது வர

புதுநாடு

யோசனையில்லை. சாதாரணமாய் மணல் சாரி நிலங்களில் பயிர் செய்யலாம்.

செய்முறை—

புஞ்செய்நீர் சாகுபடிசெய்தால் மே, சூன் மாதங்களில் கோடை மழையில் பூமி உழுப்படுகிறது; மழை நிலவாத பட்சத்தில் சூலை மாதத்தில் உழுப்படுகிறது. சேதொட்டச் சாகுபடியானால் ஆகஸ்டி மாதம் 15-ல் வரையில் உழுப்பட்டு வருகின்றன. சீமைக்கலப் பையை உபயோகிக்கால் அதற்குப் பின் பூமி, வேர் முதலியனவற்றை அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென்றால் கருவியை உபயோகிக்கவேண்டும். மே, சூனில் உழுது கம்பைத் தெளித்தால் சூலையில் கம்பைச் செலுத்தி விடுவதாயிருக்கும். அப்போது சிறு குத்கள் உண்டாகக் கிடலைப்போட்டு மண்ணால் மூடி விடலாம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பூமி உழுவு, செய்ரோத்துபரதிற தேர் அவ்வளவுக்கு கல்லது. மொத்தம் 6 உழவுக்கு கம்பைப்போடக்கூடாது.

தகுந்த உயர்—

புஞ்செயில் குளத்துப் போருக்குகளையும், தோட்டக்களவில்களையும், ரத்தத்துக்குப்பை, சாம்பல் முதலியவைகளால் உழுப்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் அவற்றைவிட புஞ்செய் எருக்கலை உண்டாக்கி பூமியில் உழுது மடிக்கக்கூடியது. இதனுள் ஏகர் 1க்கு 500 பவுண்ட் அளவுப் சுண்ணாம்பு சீற்றுடன் மண்ணைப்போட்டுக் கொடுத்து விடுவதோடு 300 பவுண்டி உடலைப் செல்லுதல் வேண்டும். வண்டி, சாம்பலும், ஒரு வண்டி போட்டு

கொட்டவும் எருவும் உயர் கொடுத்தால் முதல் தாலாப மடைவதில் சுகத்தேகரிவது.

விதைப்பு விதையின் அளவு—

புஞ்செய் நிலங்களில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 70 பவுண்டி விதைப் படிக்கும். தோட்டத்தில் ஏகர் 1க்கு 60 முதல் 80 பவுண்டி விதையில் விதைசெல்லும். அதாவது சுமார் 27 பவுண்டியை ஒது எடுத்த விதை செல்லும் வரிசையில் விதைகளை 6 அங்குலத்துக்கு ஒருதாம் புதைக்கவேண்டும். ஒரு வரிசைக்கும் மற்றொருவரிசைக்கும் சுமார் 3 அடி விதையிடம் இருக்கவேண்டும். ஒரு படைச்செயில் விதைகளைப் போட்டுக் கொண்டு, போனால் துடித்த படைச்செயில் மண்ணால் இக்கடம்பைச் சுற்றி மூடியப்படுகிறது. கடலை விதைகள், நடவை உவர்த்த பிறகு, உள்ளே விதைகள் கல்லால் பூமியில் போடப்படுகிறபோது விதைகளின் மேல் உள்ள கம்பைத் தெளித்தல் வேண்டும். சீமைவெண்மம் காலம்—

புஞ்செயில் சூன், சூலை மாதம், தோட்டத்தில் சூன், ஆகஸ்டில் விதை தெளித்தல் தகுந்த காலம்.

பாசனம்—

மழை மொழியில் செய்தால் சீமைவெண்மம் காலம் முதல் ஆறுவடைகாலம் வரையில் 8 முதல் 10 வரையில் நீர் பாரச்செய்வாழியிருக்கும். கிழகாழை மழை ஒத்துக்கொள்ளுமபட்சத்தில் தண்ணீர் பாரச்செய்வென்றிய நிலை.

பிச்சேய்மேந்தி:

விதை தெளித்த ஒரு மாதத்துக்கெல்லாம் பூமி
யைக்கொத்தி களைபிடுங்கவேண்டும். (நேரு) 1 ஆவ
வது 2 மாதத்துக்கெல்லாம் இன்னும் ஒரு கட்டளை
கொத்திச் களை பிடுங்கவேண்டும். இச்சாக்கில்களில்
பயிரில் ஏதாவது பூச்சி புழு, தீருக்கால் சுண்ணாம்பு
நீற்றை சரம்பனுடன் கலந்து பயிரில் தெளிப்பது
திறம். இந்த சுண்ணாம்பு நீர் பூச்சி புழுவைச்
தொலைப்பதளவியில், கடலைச் சுண்ணாம்பு நீர்வியான
தால், அதற்கு உரமாகவாகிறது. இச்சாக்கில் பழை
பாவ ஆரம்பிக்கும். இப்படி பாவம் பூயிரில் அழுச்
தங்காலால் அழுத்தவேண்டும். பூஷணி கொச்சைகா
யை பயிருடன் தெளித்து விட்டால் அலைகள் பள்
ளைப்பரவ விடாது. இப்படி அழுத்தலைச் சுன்னை
வாக்கொட்டையும் பூமிக்குள் உண்டாக்கும்.

வயக:

இது 6 மாதத்துப்பயிர். அதன் சரியாகவந்தவுக்
கொண்டால் சில பாகம் கடலை அல்லது மாதத்துமம்
சில பாகம் ஏவது மாதத்திலுள்ள இன்றையாகம் லைது
மாதத்திலும் பழுக்கும்.

அறுப்பு, கண்டுமுதல்:

அறுவடைகாலத்தில் ஒரு கிணறுவாறுதான் பயினை
அப்படியே பிடுங்கிவிடலாம். இல்லாத பட்சத்தில்
தாடிகளையெல்லாம் அறுத்து அப்பறப்படுதல் பூமி
வை கொத்து அல்லது மண்ணெட்டிக் கலப்பையால்
உழுது கடலையைச் சேகரம் செய்கிறார்கள். அதற்கு

பதிலாக மழை நீர்சேர்த்துக்கொண்டு சீமைகலப்பைப்
பூல சேகரம் செய்வது சிறப்பாகும். புஞ்சையில்
ஏன் 1க்கு 1000 முதல் 1200 பட்டணம்முடி
வரையில் கடலைக்கணி முத்த கிடைக்கும். தோட்ட
க்காலில் ஐந்து கலவியும்தல் சுமார் 5000 பட்ட
ணம்முடி வரையில் காணப்படும். சராசரிச் சுண்ணா
முத்த சுமார் 2500 பட்டணம்முடி. மட்டமில் சுண்ணா
முத்த 1000 பட்டணம்முடியும். புஞ்சையில் சுத்த
பழம் செலவெல்லாமல் வேகக் 14 முதல் 15 நாட்கள்
20ம், தோட்டக்காலில் சுமார் ஏராளம் 50ம் கிடைக்கும்
தரவில் சுமார் ஆறு துத்துமம்முடி தட்டு 20க்குக்
குறைவாகும்.

தீவனம்:

கடலையின் கால ஆதி பரிசுத்தத்து, உலர் தீவி
தானகளைகாப்பலத்துப் போர்ப்பாட்டி விட்டால் பரி
சாலக்கல் குஞ்சைக்கெஞ்சும் மீதிதனக்கும் கல்ல
தீவிபாக்கியும்.

கலப்புப்பயிர்:

கடலை, புஞ்சையில் சம்போகம் சிலவகை தீவி
பேரமும், ஹோமும் கலந்துவாயிச் செய்யப்படுகின்றது.
கைத்தேவழி.

மோரீக்கடலைக்கு 100க்கு சுமார் 45 பாகம் எண்
னெய் கிடைக்கிறதாம். இந்த எண்ணெய் தேய்வு
செய்ய அதிக நிலக்கிளமாகத் தேர்ன்வப்படுவதால்
அன்னிய எட்டுக்கு ஏதாவதாய் ஏற்றமற்றிச் செய்யப்
படுகிறது. பழுத்தி எண்ணெய், அல்லி எண்ணெய்,

எண்ணெய்விறைப் பயிர்கள்.

தேங்காய் எண்ணெய் முதலியவற்றைப் பராகிலும்
இந்த எண்ணெய் தோண்டி எழுருவித் தீயெய் கிரம்
பதிலாகியமாம். கடலைப்பண்ணைக்கு மட்டுத்தீவ
னத்துக்கும் உரத்துக்கும் உபயோகப்பயிம். கடலை
எண்ணெய் இதர எண்ணெய்களோடு கலந்து மேச
டி யாய் விற்கக்கூடாது. கடலை எண்ணெய்க்கு அதிக
வாசனை இல்லாததினால் இதர எண்ணெய்களோடு கல்க
தால் இதன் குணம் அன்றாடம் உபயோகப்படுகிறது.

தென்வரை



தென்வரை

புதிதான அபிவிருத்தி :-

இதை ஒரு கைக் கிடைப்பிற்காகவும், காலியைப் பயிர்ந்தும், பழங்கைப் பயிர்ந்தும், கைகளிலும், அஞ்சல் கழுது தோல்களில் முத்திரைகள் செய்து வரவந்தோமென்பதைச் சான்றபடி இன்னமொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதை முத்திரைகள் செய்து கொள்ளவேண்டிய இது உபயுக்திகள் அல்லது கை உபயோகிகள் உபயோகிக்கும் கைகள் மூலம் அனைத்து கைகளில் தான் சமுத்திரத்தின் மூலகம் மூலப் பங்கு இது உலக இயக்கத்தின் மூலகம் கைகள் மூலம் வந்திருக்கிறது.

103 103 103

(1) பரததேவபிரகாசம் (Hareem Choudhary) - ராஜபுரம்;
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரததேவபிரகாசம் தாலுகா, காஞ்சிபுரம்
மாவட்டம் பரததேவபிரகாசம் தாலுகா, திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர்
தாலுகா, திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் தாலுகா, திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாரூர் தாலுகா.

(b) கெவனியாகத்தான். நான் மஞ்சளாகவும், சிவ
வேண் ணாக் கிடமாகவந்திருக்கும். நான் கெவனியாக
முடிவான கெவனியாகவந்திருக்கிறேன். கெவனியாகவந்திருக்கிறேன்.
கெவனியாகவந்திருக்கிறேன்.

[illegible]

(1) ஈட்டினை வளர்த்து, அதைப் பிழைப்புடன், காயப்படுத்தி
சாத்தியமாக்கிவிடுதல். இதையே பித்தத்திற் சித்தமாகக் கொள்

(e) உருண்டை — தாது பச்சைப்பிப் பால் உருண்டை யாக இருக்கும். குவியில் அதிகக்காய்களிருக்கும்.

(1) பாடிப்படினாத்துக்காடி—காய் சிறப்பி பெரிதாக இருக்கும்.

(ii) கெரவாழி த. சத் துக்காபா. - குலைக்கு இரண்டு
காழி குத்துமா.

தமிழ் மூலிகள் :—

உடையவகாறுகத்து கம்பமுள்ள மணல் சாரியை, பரு
கையும்கிளக்கியும், சமுத்திரத்திலா யோரங்காற் றுள்ள
மணல்சாரியிறும், உபபிகால் அல்லது மணல் படைக்
ரு மேலுள்ள கணியலும்கொண்ட சாருபுறசெய்ய
லாம். இது கஞ்சகயிலைப் புஞ்சைகளிலும் மெலும்பு வள
ருகிறது. கஞ்சை சிலம்புமேற் ஆழமானாயில் கணா
டல் கொடுத்த லைமணலுந் இருக்கப்படாததில் மால
கன் சிலகாலங்களில் அதிக கொழுப்பெய்தித்துச் சரி
யாதத காரய்க்கிறதனால், அப்படி இருந்தால் மால்களைச்
சுற்றி ஆழப்பாடி ஆழங்கள் மயங்கி, அவைகளில் சாலை
அல்லது சம்பல் போட்டு நீர்ப்படி மேலே மண்களைப்
போட்டு மூடிவிட்டு வேராவகிட்டு இதுவேருக்கு சம்பத்
ரொய்களாதரிவானுள் வந்தென்க. மால்கள் கார்ப்பாய்கில்
லாமல் கட்டிவிட்டபின் மூலக் கிழங்குமூலங்கள் அவை
களிலிருந்து விலகி நுழைந்து வந்தகார்ப்பாயை மரிக்காப்பா
டுகிறது.

செய்தேன் —

சூழியாளனாக உழைப்பதற்கு ஒரு கடவை
ஒரு கெஜ சதுரம்தான் குழியை விட அதிகமான

டி உலரப்போட்டு விட வேண்டியது. கனரூப உலரத் திறப்பதி ஒருபடி உப்புடன் சப்பாததெக்கள்ளி, அதன் வேர்மண், சாணம் முதலிய ஏடுக்களால் பாதிக்குழியைக் கீர்ப்பி வைக்கவேண்டும். குழியினை ஒரு மாதத்திற்குத்துறைபாமல் உலரப்போட்டு வைக்கவேண்டும். இளம்பிள்ளையை கறைபான அரிக்காமல் இருப்பதற்காக ஒரு சிறு கடை மரச்சாமல் ஒவ்வொரு குழிக்கும் போடுவது சல்லது.

நாமக்கால் நடவு முதலியன.

200 சதுரடி புள்ள மண்ற்பாங்கு மேட்டி பூமியில் கனரூப 5 அடி ஆழம் கொத்தி அடிக்கு ஒரு ரெற்று வீதம் முதல் கொஞ்சம் வெள்ளியே தெரியுபடி புதைத்து ஐலம் விட்டுக்கொண்டே வரவேண்டும். சாய்பனும், உப்பு, தெற்றுக்கு அடியில் போட்டால் கறை யான வரவது. வாசம் 2-3, தாதுக்குத்துறைபாமல் தண்ணீர் விட்டுக்கொண்டு வரவேண்டி. சுமார் 6 மாதத்தில் குருத்து கிளம்பலாம். தெற்று கிளந்து ஐலத்தல் போட்டு வைத்துநூலும் 6 மாதத்தில் முளை கிளம்பும். தெற்றுக்கு உதாக்க தெற்று பிடியோ சளநிலை. கல்ல வயதான மாததெள்ளைகல்ல தெற்று ஜாக்கிரதமாக எடுத்து சுமார் 6 மாதம் காப்பாற்றி வைத்திருந்து இளநீர் சளைப்போளபற்று முதல் புதைத்து விடவேண்டும். குருத்து கிளம்பி 6 மாதத்துக்கெல்லாம் தயாசெய்திருக்கப்படி குழியில் புகிவிட்டுக்கொண்டு வேண்டும். 10 அடிக்கு ஒரு குழி இருக்கும்பட்சத்தில் ஏகா 1க்கு 200 சிள்ளை செல்லும்.

சிள்ளைகள் 20 அடிக்கு ஒன்று வைப்பதுகான் திறம் தெருக்கலைத்தால் மரம் கொணிப்போய் கம்பப்பு அறுகமா தக்காய்க்காது. சாதாணமாய் 2 வருஷத்து பிள்ளைகளை குழியில் கடுகிறார்களாம். இப்படி கட்டவுடன் பிள்ளையை வெளியில் படாமல் சூழ வைக்கவேண்டும். சில இடங்களில் 5 வருஷமான பிள்ளைகளைப், சில இடங்களில் 5 வருஷமான பிள்ளைகளைப் பதப்படி கடுகிறார்களாம். இப்படிச் செய்வதால் கம்பப்பு குழி தியாசுந்தாம்.

தாலம்.

தென்னீர் பிள்ளைவிதைக்கு மறைக்கலாம் தான் திறம் அதாவது செபட்டம் அகட்டாம்.

பாசனம்.

இளம்பிள்ளையை கட்ட பித்தாடி 5 வருஷம் வராவியு தண்ணீர் பாய்ச்சி கொண்டு வரவேண்டும். கட்டவுடன் 2 தினத்துக்கு ஒரு தண்ணீரும் மேல் கனரூப புத்தி களன்றிப் போனவுடன் வராததுக்கு ஒரு தண்ணீருக்குக் குண்டாயால் பாய்ச்சி வரவேண்டும். 5 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடு பாசனம் வேண்டியது வேண்டாதது பூமியின் சபா வசனம் பொருத்தமாக இருக்கிறது.

கலப்புப்பாய்.

கட்டிப்பவர் ஊனிய தோறது. இடைவெளியில் முதல் 2 வருஷத்திலாடில் சிஞ்சி, வெங்காயம், காய், செழுவாது கிளந்துகருவ. முதலிய பயிர்கள்

சார்புச் செய்தலாம். இப்படிச் செய்தால் பூமி அடிக்கடி இளம்பபட்டி நல்ல வளத்தினைருக்கும்.

இச்செயலுக்குத்

பயிவளஞ்செய்யில் அடிக்கடி முரிபைக்கொடுத்தியிருந்து உதரம் அணைத்து வரவேண்டும். வேறுநிலைகளுக்குள்ளிப்பாதி மனைக்காலத்தில் அதன்னைப்பச்சாறு அடி சுவாடிக்கொடுத்தி விவாகளாகவெடுத்துச் சாயலை, தாணம், கோல் கிடங்கு முதலாகப் பத்தகங்கள், உப்பு, முதலிய ஏனாவன அணைத்து வரவேண்டுமாத்தான் அடியில் அணைத்து மாகவசச்சுதறியிழைப்பை வெளியில் போகாமல் வரப்புகடல் விடவேண்டியது.

வயது

தென்னை சாதாரணமாக 50 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடால் தலைமரம்வகிபென்று சொல்லுகிறார்கள். 30 வயதுள்ள மரத்தை நல்ல முசார்க்கு மரமென்று சொல்லலாம். தென்னைக்கு வயது காலம் 100 வருஷம்.

கண்டிழைதல்

சாதாரணமாக 10 வருஷத்தில் மரங்களுக்குப் பிக்கும், செப்பினைக்கிளில் கவனக்குறவிருந்தால் கிளசாயம் 7வது வருஷத்தினம் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். வருஷத்துக்கு ஒரு மரத்துக்கு சுமார் 10 மூலை கிடைக்கும். குலைக்கு சராசரி 10 காய்க்குமுதலாய்வு. சராசரி வருஷம் 1 சுதமரம் 1க்கு மூலாய் 1 கிடைக்கும். தென்னைச் சார்படியில் போட்ட மரமூலத்து, எல்லாம் ஒத்துக்கொண்டால், வருஷம் 1க்கு ரூபாய் 100க்கு

வருஷம் 21 வருஷ கிடைக்கலாம். தேங்காய்மட்டையிலிருந்து 10 வருஷ கிடைக்கலாம். 50 காய் மட்டையிலிருந்து சுமார் 6 வருஷம் கிடைக்கலாம். ஒரு மரத்திலிருந்து காய் 10 வருஷம் கிடைக்கலாம். சுமார் 20 வருஷம் போதலாம். 30 வருஷம் வருவது 1 மரத்திலிருந்து வரலாம். 40 வருஷம் வருவது 2 மரத்திலிருந்து வரலாம். 50 வருஷம் வருவது 3 மரத்திலிருந்து வரலாம். 60 வருஷம் வருவது 4 மரத்திலிருந்து வரலாம். 70 வருஷம் வருவது 5 மரத்திலிருந்து வரலாம். 80 வருஷம் வருவது 6 மரத்திலிருந்து வரலாம். 90 வருஷம் வருவது 7 மரத்திலிருந்து வரலாம். 100 வருஷம் வருவது 8 மரத்திலிருந்து வரலாம்.

வாங்கித்தரல்

தென்னை மரத்திலிருந்து கிடைக்கலாம். இந்தக் கிடைக்கலாம். 10 வருஷம் கிடைக்கலாம். 20 வருஷம் கிடைக்கலாம். 30 வருஷம் கிடைக்கலாம். 40 வருஷம் கிடைக்கலாம். 50 வருஷம் கிடைக்கலாம். 60 வருஷம் கிடைக்கலாம். 70 வருஷம் கிடைக்கலாம். 80 வருஷம் கிடைக்கலாம். 90 வருஷம் கிடைக்கலாம். 100 வருஷம் கிடைக்கலாம். 110 வருஷம் கிடைக்கலாம். 120 வருஷம் கிடைக்கலாம். 130 வருஷம் கிடைக்கலாம். 140 வருஷம் கிடைக்கலாம். 150 வருஷம் கிடைக்கலாம். 160 வருஷம் கிடைக்கலாம். 170 வருஷம் கிடைக்கலாம். 180 வருஷம் கிடைக்கலாம். 190 வருஷம் கிடைக்கலாம். 200 வருஷம் கிடைக்கலாம். 210 வருஷம் கிடைக்கலாம். 220 வருஷம் கிடைக்கலாம். 230 வருஷம் கிடைக்கலாம். 240 வருஷம் கிடைக்கலாம். 250 வருஷம் கிடைக்கலாம். 260 வருஷம் கிடைக்கலாம். 270 வருஷம் கிடைக்கலாம். 280 வருஷம் கிடைக்கலாம். 290 வருஷம் கிடைக்கலாம். 300 வருஷம் கிடைக்கலாம். 310 வருஷம் கிடைக்கலாம். 320 வருஷம் கிடைக்கலாம். 330 வருஷம் கிடைக்கலாம். 340 வருஷம் கிடைக்கலாம். 350 வருஷம் கிடைக்கலாம். 360 வருஷம் கிடைக்கலாம். 370 வருஷம் கிடைக்கலாம். 380 வருஷம் கிடைக்கலாம். 390 வருஷம் கிடைக்கலாம். 400 வருஷம் கிடைக்கலாம். 410 வருஷம் கிடைக்கலாம். 420 வருஷம் கிடைக்கலாம். 430 வருஷம் கிடைக்கலாம். 440 வருஷம் கிடைக்கலாம். 450 வருஷம் கிடைக்கலாம். 460 வருஷம் கிடைக்கலாம். 470 வருஷம் கிடைக்கலாம். 480 வருஷம் கிடைக்கலாம். 490 வருஷம் கிடைக்கலாம். 500 வருஷம் கிடைக்கலாம். 510 வருஷம் கிடைக்கலாம். 520 வருஷம் கிடைக்கலாம். 530 வருஷம் கிடைக்கலாம். 540 வருஷம் கிடைக்கலாம். 550 வருஷம் கிடைக்கலாம். 560 வருஷம் கிடைக்கலாம். 570 வருஷம் கிடைக்கலாம். 580 வருஷம் கிடைக்கலாம். 590 வருஷம் கிடைக்கலாம். 600 வருஷம் கிடைக்கலாம். 610 வருஷம் கிடைக்கலாம். 620 வருஷம் கிடைக்கலாம். 630 வருஷம் கிடைக்கலாம். 640 வருஷம் கிடைக்கலாம். 650 வருஷம் கிடைக்கலாம். 660 வருஷம் கிடைக்கலாம். 670 வருஷம் கிடைக்கலாம். 680 வருஷம் கிடைக்கலாம். 690 வருஷம் கிடைக்கலாம். 700 வருஷம் கிடைக்கலாம். 710 வருஷம் கிடைக்கலாம். 720 வருஷம் கிடைக்கலாம். 730 வருஷம் கிடைக்கலாம். 740 வருஷம் கிடைக்கலாம். 750 வருஷம் கிடைக்கலாம். 760 வருஷம் கிடைக்கலாம். 770 வருஷம் கிடைக்கலாம். 780 வருஷம் கிடைக்கலாம். 790 வருஷம் கிடைக்கலாம். 800 வருஷம் கிடைக்கலாம். 810 வருஷம் கிடைக்கலாம். 820 வருஷம் கிடைக்கலாம். 830 வருஷம் கிடைக்கலாம். 840 வருஷம் கிடைக்கலாம். 850 வருஷம் கிடைக்கலாம். 860 வருஷம் கிடைக்கலாம். 870 வருஷம் கிடைக்கலாம். 880 வருஷம் கிடைக்கலாம். 890 வருஷம் கிடைக்கலாம். 900 வருஷம் கிடைக்கலாம். 910 வருஷம் கிடைக்கலாம். 920 வருஷம் கிடைக்கலாம். 930 வருஷம் கிடைக்கலாம். 940 வருஷம் கிடைக்கலாம். 950 வருஷம் கிடைக்கலாம். 960 வருஷம் கிடைக்கலாம். 970 வருஷம் கிடைக்கலாம். 980 வருஷம் கிடைக்கலாம். 990 வருஷம் கிடைக்கலாம். 1000 வருஷம் கிடைக்கலாம்.


80 எண்ணெய்விதைப் பயிர்கள்.

நது மய்யுடையதேது விரியலாகப்பின்னி கரைக்கு
உபயோகிக்கலாகுள்.

வண்டு நெல்லைத் தல் :-

வண்டி லுல எதாவது மரத்துக்கு முடிதல எந்
பட்டால் தந்த விண்டை குத்தி எறிததுனி லேண்டும்.

குசும்பாப் பயிர் அல்லது செந்
துருக்கை.



குசும்பாப் பயிர் அல்லது செந்துருக்கை.

പ്രകീർത്തി : 13916

இது மூன்று வகை வகையாயிற்று. சாயப்பிரகவும
சொன்னவாம். இது கைப்பிரகவும உதவுகிறது.
மறுத இரண்டாவது வகை ஆலைகளில் சாயப்பிர
கவுமும் கைப்பிரகவுமும் சாதுபுத செய்தி
யுள்ளன. இது மூலச்செய்யகால தான்பிரயப்பிர
கவுகூறு மிகவிடையது. பாய்செய்வது என்பது.
மறுத இரண்டாவது வகை சாதுபுத செய்யாமடிகிறது.
மூலச்செய்யகால

[illegible][illegible][illegible]

மை. உருளைக்கிழங்கு, கொத்துக்கடலை முதலிய பயிர்
களோடு கலந்து பயிரிடப்பட்டால் இவ்வளவு விதை
வேண்டியதில்லை. தனிமையில் பயிர் செய்தால் சுமார்
1) சேர் விதைப்போதுமானது. காரைக்குடி நகரிலும்
வேலிப்பாளையம் தாலுகா செய்தால் சுமார் 5 சேர்
விதைப்போது. இப்படி கலந்து பயிரிடும்போது சிறு
தண்ணிக்கைகளில் தெளிப்பது வலுக்கூறு.

தமிழ்

செவ்வாய், அக்டோபர் மாதம் விதை தெளிக்க
கல்ல சதுரத் துவம். இளம்பயிராக இருக்கையில்
மனது பிடிவது கலம். பூச்சுமபேர்து மழைபெய்வது
கெடுதல்.

பொருள் உரை.

மருகிசுபகதமுபநிதிருது தெயகதமு ஒரு முறாவிக்
திபாசயிருக்கவேண்டும். இப்படித்து அன்னியிக் தெருக்
கத்தெனிகதபல தெருக்கமரபுள்ள பதிரகளைப் பிடுங்கி
எயிலெண்ணும். எந்தெதெளிபு ஒண்டெதும் பதிரருக்கு
இப்படிச் சபாதிவெண்ணயிருக்கும். பூசக ஆரம்பிக்களை
விளக்குளி மெயட்டுகளைக் கொள்ளி ஏறத்து விடவேண்
டும். இப்படித் கொள்ளி உத்தரகால பூசகங்களில் முளை
கொள்கிற பதிர பாய்விப்பதக் களரும். இப்படி
கரம் தெயதநீசு கொப்பிடுங்கலது திரம்.

1955

இது காலியா + தூப மரம். செவ்வெம்பரில் தே
வித்தால் ஜெனஸிசின் அருமணம் செய்யலாம்.

அறுப்பு கண்டுழதல்:—

சாயத்துக்காக பூக்களைக் காலையில் பறிக்கவேண்டி அதிகவெயிலில் பறித்தால் அதிக சாயமிராது. முன்னாலுக்கு ஒருதரம் பூக்களை வெயிலுக்கு முந்தியது ஜாகிரதையாகப் பயிரைப் பாதுகாத்தால், முன்காலங்களில் பூக்களைப் பறிக்கலாம். பூக்கள் ஒருநாளை குக்காயவைக்கப்பட்டு நல்லெண்ணெயரில் பிசறப்புகின்றன. 1-பவுண்டு புஷ்பத்துக்கு 1-மெதலா எண்ணெய் பிசறப்பிடிக்கும். பிறகு காயவைத்துப் புஷ்பங்கள் தூளாக்கப்படுகின்றன. ஏகராக்கு சுமார் 80-பவுண்டு புஷ்பம் கிடைக்கும். பூளிக்காயால் விதை எடுக்கும் படச்சத்தில் ஏகராக்கு சுமார் 800-பவுண்டு செந்துருக்கை விதை காணும். ஜூன் மீது கண்டு முதல் 1000-ம் பவுண்டு. விதை சராசரியில் பூப்பதற்கு 8 பந்து கட இருக்கும். 100-பவுண்டு விதைக்கு சுமார் 30-பவுண்டு எண்ணெய்கிடைக்கும். ஏகராக்கு சாயு படிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 12-ம் முன்காலத்தில் மொத்த வரும்படி சுமார் ரூபாய் 25-ம் செலவெல்லாம் போக சுமார் ரூபாய் 13 கிடைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. இப்போது அன்னிய நாட்டுப்போட்டியால் இன்னாட்டு சாயங்களுக்கு மகிமை இறவியிருக்கிற படியால் இப்போது மொத்த வருமானம் ரூபாய் 15 தான். ஆகையால் இப்போது செலவெல்லாம் போக ஏகராக்கு ரூபாய் 3-4 தான் கிடைக்கும். எண்ணெய்க்காகச் சாகுபடி செய்தால் ஏகராக்கு செலவெல்லாம் போக ரூபாய் 10 தான் கிடைக்கும்.

தொழில் பிரயோசனம்:—

சும்பா எண்ணெய் விளக்கு எரிக்கவும், கவலை நுக்குத் தடவவும், கலியாணகாலங்களில் பட்சணம் செய்யவும் பிரயோசனப்படுத்தப் படுகிறது. எலிகள் இந்த எண்ணெயைத் தொடாதாம். சும்பா பிண்ணனுக்கு மாட்டுத்தீனிக்கு சிலாக்கியமல்ல. ஆனால் உரத்துக்கு நிரம்ப திறம். நான்கு மணிகேரம் எண்ணெயை மெதுவாய்க் காய்ச்சினால், அவ்வெண்ணெய் தடவப்பட்ட துணி ஜலத்தில் நனையாதாம்.


சும்பாப் புஷ்பத்திலிருந்து சாயம் எடுக்கும் விதம்:—

பூக்களைக் கொய்து, காயப்போட்டு, தூளாக்கிக் கோணிப்பையில் கட்டி ஒருதொட்டியில் போட்டு அதன் மேல், சலம் ஓடும்படி பண்ணி பையை அடிக் கவாவது, மிதிக்கவாவது, வேண்டியது. இப்படிப் பண்ணினால் அசுத்தங்களெல்லாம் வெளியில் போய் விடும். தொட்டியிலிருந்து சலம் சுத்தமாய்ப் போகிற வரையில் கழுவி சுத்தம் செய்யவேண்டும். சலம் சுத்தமானதாக இருக்கவேண்டும். சலம் காரமுள்ள தாத் இருக்கும் பட்சத்தில் சாயத்தைக் கரைத்து விடும். ஆகையால் சாயத்தைக் கரைக்காமலிருக்கிற தற்காக சுத்த சலமாக இருக்கவேண்டும். இப்போது கோணியில் பூக்கள் சதையாகவும், சொனையாகவு மிருக்கும். இதுகளை ஈரம்போக நன்றாய்ப் பிழிந்து சிறு சிறு கட்டியாக செய்யப் படுகின்றன. இந்தக் கட்டிகளைக் காயவைத்துக் சும்பாச் சாயமென்று விலைக்கு விற்கிறார்கள்.

சுசும்பாச்சாயம்பருத்தினால், பட்டு, கம்பளித் துணி, முதலிய வைகளுக்குச் செகப்புச்சாயம். ஏற்ற உபயோகப் படுகின்றது. அநேகவித அளவுக்குத் தகுந்தபடி அநேகவித ரெங்குதள் உண்டாகின்றன.

ஆளி விதை.

—:0:—



ஆளிவிதைப் பயிர்.

பயிரின் சுபாவம்:—

இதை ஒருதல்-விதைப் பயிராகவும், நார்வகைப் பயிராகவும் கொள்ளலாம். ஆனால் நமது இராஜதானியின் வடஜில்லாக்களில், விதைக்கும், எண்ணெய்க்கு மாத்திரந்தான் சாகுபடி செய்யப் படுகிறதே ஒழிய, நாருக்காகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. நல்ல சீதோஷ்ண மிருந்து சரியாய்ச் சாகுபடி செய்தால் நாரும், விதையும், உண்டாக்கலாம்.

பூமி:—

நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள பூமியாகவும், பருத்திப் பயிரிடும் கரிசல் காட்டிலும், நல்ல களி நிலத்திலும் சாகுபடி செய்யலாம்.

சாகுபடி, செய்நேர்த்தி முதலியன:—

இது கோதுமைவயல்களுக்கு சுற்றிலும்கரைகளில் போடுவதுண்டு. சோளத்தோடும், கொத்துக் கடலை யோடும், வரிசை வரிசையாக தெளிப்பதும் உண்டு, தனிமையிலும் சாகுபடி செய்வதுண்டு. சுமார் 3-4 தடவை உழுது, ஏகரா 1க்கு சுமார் 12-பவுண்டு வீதம் அக்டோபர், நவம்பரில் தெளித்து, பிப்பிரவரியில் பயிர் முதிர்ந்தவுடன் அறுத்து காய்களை தடிக்கம்பால் அடித்து விதைஎடுப்பது வழக்கம்.

கண்டுமுதல், கைத்தொழில், முதலியன:—

ஏகரா 1க்கு சராசரியில் சுமார் 500-பவுண்டு விதை காணும். விதையில் 100 க்கு 25 வீதம் எண்ணெய் கிடைக்கும். இதின் பிண்ணுக்கு மாட்டுத்தீனி ஆகிறது. இந்த எண்ணெயை காற்றோட்ட மாயிருக்கும் எதி

லாவது தடவினால் சிக்கிரம் காய்ந்து பளபளப்பாய் விடுமாதலால், இதை மினுக்கு எண்ணெயாகக் கொள்ளவும், வர்ணங்கள் கலக்கவும், பிரயோசனப் படுகிறது. இதன் பிண்ணுக்குத்தானே சிறங்குதளுக்கு மாவாகக் கட்டுவது வழக்கம். சரிக்குச்சரி, இந்த எண்ணெயையும், சுண்ணாம்பு தெளிவு ஜலத்தையும் கலந்தால், (carroon oil) காரன் எண்ணெய் என்ற எண்ணெயாகி அதை புண்ணுக்கு உபயோகப் படுத்துவது வழக்கம்.

நார்ப் பயிர்:—

அதிக உஷ்ணமில்லாத தேசங்களில் நாருக்காக பயிர் செய்யப் படுகிறது. நமது நாட்டில் உஷ்ணம் ஜாஸ்தியானதால் நார் முரிந்து போய்விடும். ஆகையால் நாருக்காக பயிர் செய்யும் பட்சத்தில் சீதோஷ்ணம் ஒரே நிலமையாக இருக்கவேண்டும். அதிக வரட்டியும் கூடாது. அதிக சீதளமும் கூடாது. பயிரை அறுவடை செய்யும் காலத்தில் மழை கூடாது. பூமி நல்ல செய்நேர்த்தியாக இருக்கவேண்டும். இதற்கு முந்தி சாகுபடி செய்யும் பயிருக்கு உரம் அடிக்க வேண்டும். இதற்கு நேராக உரம் அடித்தால் அதிக கிளைகள் உண்டாகும். அப்போது கீளமான நார் கிடைக்காது. விதையை கிரம்ப நெருக்கடியாக தெளிக்கவேண்டும். அப்போதுதான் ஒழுங்கான தண்டிகள் கிடைக்கும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 100 பவுண்டு விதை தெளிக்கவேண்டும். அஃதாவது சுமார் 35 பட்டணம்படியாம். இப்படி நெருக்கமாகத் தெளித்

தால் கிளைகள் விடாமல் தண்டிகள் ஒழுங்காய் வளர்க்குது நீளமான நாரும் கிடைக்கும். தண்டை வெட்டி பனியில் போட்டாவது, அல்லது ஜலத்தில் ஊரப் போட்டாவது அழுகவைத்து நார் உரிப்பது வழக்கம். ஆளி விதைப் பயிரின் சணல் நார், துணிகள் செய்யவும், உதவுகிறது. இந்நார் உரோமங்களுடனும் கலக்கப்படுகிறது. பெல்ஜியம் தேசத்துத் துணிகளெல்லாம் இந்நாரால்தான் உண்டாக்கப்படுகின்றன.

நார்வகைப் பயிர்கள்.

பருத்தி.



பருத்திப் பயிர்.


பயின் கபலம்:—

இது நார்வலைப் பயிரில் கிரம்ப முக்கியமானது. ஊனுக்குப்பின், உடைமுக்கியமாதலால், உடைகளுக்காகப் பயிரிடும் பயிர்களில், பருத்தினால் கிரம்ப விலை சரசமானதால், பருத்தினால் உடைபை அதிகமாகத் தரிக்கப் படுவதால், இப்பயிர் சாகுபடியை அதிகரிக்க வேண்டியது, எல்லாருடைய கடமையாகவுமிருக்கிறது. நமது இராஜதானியில் திருகெல்வேலி ஜில்லாவிலுண்டாகும் பருத்தி இதர ஜில்லாக்களிலுண்டாகும் பருத்தியைப்பார்க்கிலும் சிலாக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. மாதிரிகள்:—

உப்பம் பருத்தி, நாடான் பஞ்சு, போர்பன் பஞ்சு, கமடா பஞ்சு, என்று அநேகமாதிரிகளும் அன்னிய தேசத்திலிருந்து விறைகள் வரவழைத்து நமது நாட்டு சிதோஷ்ணத்துக் குள்ளாக்கப்பட்ட இஜிப்டு தேசத்துப் பருத்தி, சீஜலண்டு பருத்தி, பெருதேசத்துப் பருத்தி, போர்பன் பஞ்சுகளும், இந்தியா தேசத்து இதர மாகாணங்களிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட அநேக மாதிரிகளுமிருக்கின்றன.

தகுந்த பூயிகள்:—

கரிசல் காட்டு பூரியில்தான் பருத்தி கிரம்ப சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. சுக்கான் சப்பந்த முள்ள கரிசல் காடு முறுகுபதமாய் பொலபொலவென்று இருக்குமாதலால் சர்வ சிலாக்கியமாய் கொள்ளப்படுகிறது. சுக்கான் சமமந்த மில்லாத கரிசல் கிரம்ப பிசுபிசுப்பு களியாயிருக்கு மாதலால் அவ்வளவு திறமானதல்ல.



பருத்தினால் இழைகள்.

நமது இராஜதானியில் செவ்வலில் அநேக இடங்களில் பருத்தியை முக்கியமாய்ச் சாகுபடி செய்கிறார்கள்.

செவ்வலில், மணல் சாரியாயிருக்கப்பட்ட இடங்களில் கேணி இறவையினால் உயர்ந்த பஞ்சு தினுசு உண்டாக் கலாம். உப்பங்காற்றுக்குச் சமீபமுள்ள கரிசல்காட்டி லும் மணல் சாரியிலும் ஒருவித நேர்த்தியான பஞ்சு உண்டாக்கலாம்.

உழவு முதலிய செய் நேர்த்தி:—

மேல்காற்று மழையைக்கொண்டு குன்மாதம் முதல் செப்டெம்பர் வரையில் காலத்துக்குத் தகுந்தபடி எவ்வளவு தடவை உழவேண்டியதோ, அவ்வளவு தடவை உழுது விடுகிறார்கள். தெலுங்கு ஹில் லாக்களில் குண்டகையாலும், கோநுகலப்பையாலும் உழுகிறார்கள். களைகள் ஜாஸ்தியாயிருக்கும் பட்சத் தில் 5-6 ஜோடிமாடுகட்டிய பெத்தமடக்கா என்னும் பெரிய கலப்பைபைக்கொண்டு வேலை செய்கிறார்கள். தென் ஹில்லாக்களில் கலப்பையைத் தவிர வேறு ஒரு விதகருவியையும் உபயோகிக்கிற தில்லை. ஆகையால் வடஜில்லாக்களின் கருவிகளெல்லாம் சென்ஜில்லாக் களில் பரவுவது கலம். பருத்திப் பிடுரிடும் கரிசல் காடுகளிலெல்லாம் சுமார் ரூபாய் 70 பொறுமானமுள்ள சீமைக் கலப்பையை உபயோகிப்பது நிரம்பதிறம். ஏனெனில் இதன்வேலை செட்டாரும், கிரம்ப திற மாயும், காலதாமத மன்னியிலும், நடக்கிறது. சில இடங்களில் ஜாஸ்தி களைகளைத் தொலைப்பதற்காகக் கடப்பாறைபாஸ்த் ஏகரா 1க்கு சுமார் ரூபாய் 10 செலவில், கொத்திவேலை செய்கிறார்கள். பெத்தமடக்கா செலவுக் கும், கடப்பாறை செய்கேர்த்தி செலவுக்கும் எவ்வளவு

அகிறதோ, அதைவிட சீமைக் கலப்பை உபயோகிப்ப தில் குறைச்சலாய் முடியும். ஆகையால் பருத்தி சாகுபடிக்குச் சீமைக் கலப்பையையே உபயோகிக்க வேண்டும். பருத்தியைப் பாசனத்தில் சாகுபடி செய்ய வேண்டுமானால், பூமியை நன்றாய் உழுது முகடுகளாகவும் உழவுசாஸ்களாகவும் பிரித்துவிட வேண்டும். ஒருமுகட்டுக்கும் இன்னுமொரு முகட்டுக் கும் 2 அடி வித்தியாச மிருக்கவேண்டும். ஒரு முகட்டில் பருத்தியும் அடுத்த முகட்டில் முத்துச் சோளமும், இப்படியாக மாற்றி மாற்றி பயிர் செய்ய வேண்டும். முகட்டிலேயே 4 அடிக்கு ஒருபருத்திச் செடி இருக்கவேண்டும். ஆக ஒருவரிசை பஞ்சும், ஒருவரிசை முத்துச் சோளமாக இருக்கவேண்டும். முத்துச் சோளம் அறுவடையானபின் எங்கு பார்த் தாலும் 4 அடிக்கு ஒரு பருத்திச்செடி யிருக்கும்.

தகுந்த உரம்:—

விதை தெளிக்க 15, 20 நாளைக்கு முன்னால் சில நிலங்களுக்கு ஆட்டுப்புழுக்கையையாவது, சாணத்தை யாவது ஏருலாகப் போடுகிறார்கள். ஏகரா 1க்கு 10 வண்டி சாணம், குப்பை அடிக்கப் படுகிறது. பருத் திக்கு எலும்புத்து அகிகம்வேண்டும். ஆகையால் சலத்தில் கரையக் கூடிய எலும்புத் தூள்களும் எலும்புசத்து அடங்கிய கொட்டைமுத்து பிண்ணுக்கு அல்லது பருத்திக்கொட்டை பிண்ணுக்கு அடிப்பது திறம். சுமார் 7 மணங்கு கொட்டை முத்து பிண்ணுக் கும், 4-5 ரூபாய்க்கு எலும்புத்தூளும் 2-3 ரூபாய்க்கு

சுண்ணாம்பு, நீரும் வாங்கி அடித்தால் கிரம்பதிறம். பருத்திச் செடியின் தண்டை எரித்தசாம்பலும் சர்வ சிலாக்கியம். எலலாவற்றையும் உழுவதற்கு முந்தி மண்ணோடு கலப்பித்து விடவேண்டும். முகட்டில் சாகுபடி செய்தால் முகடிகளின்கீழ் ஒரு இருக்கும்படி செய்யவேண்டும்.

விதைக்கத் தகுந்தகாலம்; விதைப்பு மாதிரி, விதையின் வளவு, முதலியன:—

செப்டெம்பர் மாதம் விதைதெளிக்கத் தகுந்தகாலம். வடஜில்லாக்களில் சூலை, ஆகஸ்டிலும் தெளிக்கிறார்கள். ஏகரா 1க்கு 10 அல்லது 15-பவுண்டு விதை செலவும். விதையில் பஞ்ச ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதால், சாணசலத்தில் விதைகளை களைத்துப் பூமியில் போட்டு, கையால் பிசறி, காயப்போட்டு விதை தெளிக்கப் படுகின்றது. வரிசை வரிசையாய் உழவு சாலில் விதையைப் போட்டுக்கொண்டு பேய் மூடப் படுகிறது. கொர்ருவால் விதைதெளிப்பது திறம். முகடிகளில் 4 அடிக்கு ஒருதடவை குழிகள் தோண்டி குழி ஒன்றுக்கு 2 விதை வீதம் போட்டு மூடவேண்டியது. விதை பொறுக்குவதில் நல்ல கவனமிருக்க வேண்டும். நல்லகாத்திரமாயுள்ளவும், பஞ்ச இழை நீளமுள்ளவும், எல்லா இழைகளின் நீளம் ஒரேதன்மையுள்ளவும், இழை நேர்த்தியாயும் கொட்டை பருமனுள்ளவும் ஆகிய இந்த லட்சணங்களமைந்த செடிகளின் விதைகளைப் பொறுக்கி வைக்கவேண்டும்.

பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல்:—

பருத்திப் பயிருக்கு முளைகாணும் பருவத்தில் மட்டாய் சலம்போதும், வளரும் பருவத்தில் ஜாஸ்தி சலம் தேவை. பயிர் முதிரும் காலத்தில் மழை அல்லது எவ்வித ஈரமும் நாடவேகூடாது. பஞ்ச இழை நீளமாயும் நேர்த்தியாய் மிருக்கவேண்டுமாயின் பாசனம் கட்டாயம் பருத்திக்குக் கொடுக்கவேண்டும். பாசனம் பண்ணிச் சாகுபடி செய்தால் இப்போது கிடைப்பதற்கு ஒன்றுக்கு இரண்டுபங்கு கிடைப்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இது நன்றாய்ப் பரீட்சை பண்ணி அறியப் பட்டிருக்கிறது. பயிர் முதிர்வதற்கு முன் மழை நின்றபோனால் இரண்டு மூன்று முறை சலம் பாய்ச்சவேண்டும். விதை தெளித்து ஒருமாதமானவுடன் களைபிடுங்கி கொத்திவிடவேண்டும். இன்னும் 2 தடவை, களைகள் எடுத்து மொத்தம் 3 தடவை களைகள் எடுக்கவேண்டும். வடஜில்லாக்களில் மேட்டல குண்டகாவால் களை எடுக்கிறார்கள். பொதுவாக மாதம் ஒருகளை வீதம் மூன்றுமாதத்துக்கு மூன்று களை எடுக்கவேண்டும். பயிர் 5-6-அங்குலம் உயரமிருக்கையில் நல்லகாத்திரமான பயிர்களை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு பாக்கி பலவீனமான பயிர்களைப் பிடுங்கி எறித்துவிட வேண்டும். பயிர் நல்ல வளமாய் வந்தால் துணியைக் கிள்ளி எறித்து விடவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் பக்கங்களில் ஜாஸ்தி களைகள் உண்டாகிப் பரவும்.

வயசு, பொறுக்குதல் கண்டுமுதல், முதலியன :—

இது 6 மாதப்பயிர். சிலமாதரிகள் நிரந்தரமாய் பூமி யிலிருக்கும். இம்மாதரிகளுக்கு வருஷாவருஷம் கிளைக ளைவெட்டி கபாத்துசெய்து, உரம் கொடுத்து, பாசனம் பண்ணிக் கொண்டுவந்தால், நல்ல பலன்கொடுக்கும். சாதாரணமாக, செப்டெம்பரில் தெளிந்தால், பிப்போ வரி, மார்ச்சில் பஞ்சு பொறுக்கப் படுகிறது. காய் வெடித்த வுடன் பொறுக்க ஆரம்பித்து விடவேண்டும். அவைகள் கீழேவிறும்படி விட்டுவிடக் கூடாது. மொத்தம் மூன்றுதரம் பொறுக்கினால் போதுமானது. ஆனால் சில இடங்களில் ஜாஸ்திகடவையும் பொறுக்கு கிறார்கள். முதல் முதலில் பொறுக்கப்படும் பஞ்சு சர்வசிலாக்கியம். கடைசியில் பொறுக்கப்படும் பஞ்சு மட்டம். ஆகையால் முதலில் பொறுக்கப்படுவதை தனி யாகவும் கடைசியில் பொறுக்கப்படுவதை தனிபாகவும் வைக்கவேண்டும். முதலில் பொறுக்கப்பட்ட காத் தரமாயுள்ள காய்களிலிருந்து விதைகளைப் பொறுக்கி வைப்பது திறம். பொறுக்குங் கூலி மொத்தவரும்படி யில் சுமார் 10 ல் ஒரு பாகம் பஞ்சிலேயே கொடுக்கப் படுகிறது. ஏகா 1க்கு சுராசரிக் கண்டுமுதல் கூலி நீங்கலாக சுமார் 300-பவுண்டுவரையில் கொட்டை யுள்ள பஞ்சு கிடைக்கும். இதில் சுமார் 80 முதல் 100 பவுண்டு வரையில் பஞ்சம் பாக்கி கொட்டையு மிருக் கும். திருநல்வேலி, கோயம்புத்தூரில் இப்படி கிடைக் கிறது. வட ஜில்லாக்களில் இதில் பாதிதான் கிடைக்கு


மாம். பாசனம் பண்ணி, எலும்பு சத்து உரம் கொடுத்து, சொல்லி இருக்கிறபடி சாகுபடி செய்தால் சிந்து தேசத்தில் கிடைத்திருப்பதுபோல ஏகர் 1க்கு சுமார் 200 பவுண்டு பஞ்சம் 500 பவுண்டு கொட்டை யும் கிடைக்கலாம். திருநல்வேலியில் ஏகர் 1க்கு சாகு படிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 10; மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் முப்பது; செலவுகளெல்லாம் போக குடிசைக்கு மிஞ்சுவது ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 20 தான். முகடுகள் போட்டு, நன்றாய்க் கொத்தி, உரம் கொடுத்து நல்லவிதை தெளித்துப் பாசனம் பண்ணி, சாகுபடி செய்தால் ஏகர் 1க்கு செலவெல்லா ம்போக சுமார் ரூபாய் 50க்குக் குறையாமல் சிந்து தேசத்தில் கிடைத்திருப்பதுபோல் ரூபாய் 140 வரை யில் கிடைக்கலாம்.

கைத்தொழில் :—

பஞ்சிலிருந்து நூல் வஸ்திரங்கள் செய்யலாம். கொட்டையையும் பஞ்சையும் லாட்டணத்தினாலா வது அல்லது எந்திரத்தினாலாவது பிரித்து, பஞ்சி லிருந்து நூல் நூற்று கைத்தறியாலாவது அல்லது விசைத்தறியிலாவது வஸ்திரங்கள் செய்யப்படுகின்ற ன். பருத்திக் கொட்டையிலிருந்து அமெரிகர்கள் பருத்தி எண்ணெய் எடுக்கிறார்கள். இது சோப்பு செய்பவும், விளக்கு எரிக்கவும் உபயோகப்படும். 100 பவுண்டு பருத்திக்கொட்டை சுமார் 20 பவுண்டு

எண்ணெய் கொடுக்கும். பருத்திப் பயிர் வேரின் பட்டை, மருத்துக்கு பிரயோசனமாம். இதற்கு அமெரிக்கா தேசத்தில் கிறுக்கியுண்டாம். பருத்திக் கொட்டை ஓடு காகிதம் செய்ய உபயோகப்படுகிறது.

சென்னைச் சணல் அல்லது
சணப்பு.



சென்னைச் சணல் அல்லது சணப்பு.

பயிரின் சுபாவம்:—

இது ஒரு நார்வகைப்பயிர். பருத்தியைத் தவிர, பாக்கி நாரெல்லாம் பயிரின் தண்டுகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன. ஆனால் பருத்தியிலோ, விதைகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன. இதை மாட்டுத் தீவனத்துக்காகவும், பசுந்தழை எருவுக்காகவும் சாகுபடி செய்யலாம். இது சுண்ணாம்புத்தீனி.

தகுந்த பூமிகள்:—

இது மாட்டுத் தீவனத்துக்காகவும், பசுந்தழை எருவுக்காகவும் நஞ்சையில் முதிர்ந்த நெற்பயிருக்கு மத்தியிலாவது, அல்லது அதுவடை செய்யப்பட்ட நஞ்சையிலாவது சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. நாருக்காக சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில் வடிகால் வசதியுள்ள சுக்கான் சம்பந்தமான களி நிலம் திறம். தோட்டக்கால் களிலேயும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

செய் நேர்த்தி:—

நாருக்காக பயிர் செய்யும்பட்சத்தில், மேல்காற்று மழையைக்கொண்டு, பூமியை நன்றாய் உழுது வைத்திருக்கவேண்டும். சுமார் 3-4 உழவுக்குக் கம்மிப்படக் கூடாது.

தகுந்த உரம்:—

நார்ப்பயிராகையால், உரம் கொடுத்தால் அதிக கிளைகள் உண்டாகும். இதற்குமுன் இருக்கப்பட்ட பயிருக்கு உரம் கொடுத்தால் போதுமானது. இதற்கு முன் பயிர் தானியப்பயிராக இருக்கவேண்டும். எனக்

சென்னைச் சணல் அல்லது சணப்பு. 103

1க்கு சுமார் ரூபாய் 2க்கு சுண்ணாம்பு, நீதும் 2 வண்டி சாம்பலும் அடிப்பது நல்லது.

தகுந்த காலம்:—

எருவை எல்லாம் பாப்பின்வுடன் குன், சூலையில் ஏதாவது மழைபெய்தால், உழுது விதைத் தெளிக்கப்படுகிறது. நாருக்காகச் சாகுபடி செய்யும்பட்சத்தில் குன், சூலேதான் தகுந்தகாலம். சாதாரணமாய் மாரி அல்லது குளிக்காலத்தில் தான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. தோட்டக்காலில் எப்பொழுதும் சாகுபடி செய்யலாம்.

விதைப்பு மாதிரி, விதையின் அளவு:—

நார்ப்பயிருக்காக 20 முதல் 30 பட்டணம்படிவரையில் விதை தெளிக்கப்படுகிறது; (அதாவது சுமார் 50 பவுண்டு). வரிசை வரிசையாக தெளிக்கவேண்டும். ஒரு வரிசைக்கும் மற்றொரு வரிசைக்கும் 9 அங்குலம் வித்தியாசமிருக்கவேண்டும். விதை அடர்த்தியாக தெளிக்காவிட்டால் கிளைகள் ஜாஸ்தி வெடிக்கும். ஆகையால் நார்ப்பயிருக்கெல்லாம் விதை ஜாஸ்தியாகத் தான் தெளிக்கவேண்டும். அடர்த்தியாகத் தெளித்தால் தண்டி நீளமாயும் கோணல் அன்னியிலும் நேராய் வளர்ந்து, நார் உரிப்பதற்குப் பக்குவமாக இருக்கும். ஆகையால் நார்ப்பயிருக்கே விதைகள் ஜாஸ்தியாக தெளிக்கப்படும். சில இடங்களில் சுமார் 40 படிவரையில் தெளிக்கிறார்களாம். மாட்டுத்தீவனத்திற்காகவும், பசுந்தழை எருவுக்காகவும் சாகுபடி செய்யப்படும்பட்சத்தில் முதிர்ந்த நெற்பயிருக்கு மத்

திடிலோ அல்லது நெற்பயிர் அறுவடையானவுடன் அதே அளவு சுமார் 25 பட்டணம்படி தெளிக்கப்படுகின்றது. பசுந்தழை ஏருவுக்கும் மாட்டுத் தீவனத்துக்கும் தெளிக்கும்பட்சத்தில் அசற்கும் வீதை ஜாஸ்தி தான் தெளிக்கவேண்டும். வீதை, தானியத்துக்காக தெளிப்பதைப் பார்க்கிலும், ஒண்ணுக்கு மூன்றுபங்கு தெளிக்கும்படியாக இருக்கும்.

வயசு, கண்டி, முதல். முதலியன:—

இது மூன்று மாதத்து பயிர். குன் கடைசியில் தெளித்தால் செப்டெம்பரில் அறுவடை செய்யலாம். டிசம்பரில் தெளித்தால் மார்ச்சில் ஏதாவது ஒரு மழை பெய்யும்பட்சத்தில் அந்த நூத்தைக்கொண்டு இதைப் பூமியில் உழுது மிதித்து விடலாம். சிறுகச் சிறுக மாட்டைவிட்டு மேயவிடலாம். நாருக்காகப் பரிரை அறுக்கும்பட்சத்தில் பரீபூக்கிற சமயத்தில் அறுத்தாவது அல்லது பரிரைக் கையால் பிடுங்கிபாவது, இலைகள் உதிரி வரையில் காயவைத்துப் பிறகு பனியில் போட்டாவது அல்லது சலத்தில் ஊரவைத்தாவது தண்டு கொஞ்சம் அழுகினவுடன் நார் உரிப்பார்கள். நார் நேர்த்தியாயும் மிருதுவாயும் இருக்க வேண்டுமபட்சில், பூசுகிறசமயத்தில் அறுத்துவிட வேண்டும். வீதைவிட்ட பிறகு அறுத்தால் நார் பல மாயிருந்தாலும் கூட, மிருதுவாயிருக்காது. சராசரிக கண்டிமுதல் ஏகர் 1க்கு சுமார் 800 முதல் 1000ம் பவுண்டு வரையில் நார் கிடைக்கும். ஊரப்போடு வதற்கு மிருதுவான ஓமம் தண்ணீர் திறம். சுமார்


3, 4 நாள் ஊரப்போட்டால் போதுமானது. அதிக நாள் ஊரப்போட்டால் நார் கறுகி பலவீன மடைந்துவிடும். ஊரப்போடுவதற்கு உப்புசலம் கூடாது. உப்புசலமாக இருந்தால் நார் வெண்ப்பாக இராது. நார் உரிப்பதற்கு அதிக மழைகாலமில்லாமலும், அதிக வறட்சிகாலமில்லாமலும் மிருக்கவேண்டும். ஊரவைத்த தண்டை அடித்து நார் எடுப்பது வழக்கம். நார் சுமார் 36 அங்குல நீளமிருக்கும். ஒரு டன் அல்லது 2240 பவுண்டு சனல் நார் சீமையில் சுமார் 16 பவுன் அல்லது 240 ரூபாய் விலைபோகிறதாம். ஏகர் 1க்கு மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபாய் 40ல் சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 20 போனால் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 20 கிடைக்கலாம்.

கைத்தொழில்:—

நார் எடுத்துச் சிறுகயிறாக முறுக்கிச் சாக்குகள் நெய்கிறார்கள். இப்படி கடப்பை ஜில்லா ராசம்பட்டில் இந்த கைத்தொழில் நடக்கிறது. பம்பாய் இராஜ தானியில் செம்படவர்கள் மீன் பிடிக்க, வலைகளுக்காக இக்காரினால் வலைகள் பின்னுதிரர்களாம். இக்காரினால் செய்யப்பட்ட வலைகள் 5, 6 மாதிரி உண்டாம். சமுத்திரத்தில் மீன் பிடிக்கவும் இதர இடங்களில் மீன் பிடிக்கவும் இந்த வலைகள் பிரயோசனப்படுகின்றன. இக்காரினால் செய்தவலைகளை துவர்ப்புக் கஷாயங்களில் போட்டு, மாதத்துக்கு ஒரு தரம் தோய்த்துத்தோய்த்து எடுத்துப் பதப்படுத்திப் பிரயோசனப் படுத்துகிறார்களாம்.

புளிச்சை.

—:0:—



புளிச்சை.

பயிர் கபாவம் :—

இதை ஒரு நார்ப்பயிராகவும், வேலிப் பயிராகவும், சாகுபடி செய்யலாம். இதைத் தனிமையில் அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப் படுகிறதில்லை. இதர பயிர்களுடன் கலந்துதான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதன் தண்டு, காய்ப்பு, காய்கள் சுணையுள்ளதாக இருக்கும். ஆகையால் கையாடுவது, சுலபமல்ல. நார்வகைப் பயிருக்குள், புளிச்சை வர்க்கத்தைப் போல், சந்தானவிர்த்தி கபாவம், அதாவது காய்கள் ஜாஸ்தியாய் வெடிக்கும் கபாவம், வேறொன்றுக்கும் கிடையாது. இதில் இரண்டு மாதிரிகளிருக்கின்றன. இதன் இலைகளைக் கறிகளாகச் சமையல் பண்ணுகிறதும் உண்டு. இந்தப்பயிர் சுமார் 4-அடி உயரமிருக்கும்.

தகுந்த பூமிகள்:—

கிராமந்தங்கள்லேயும், புஞ்சைத் திடல்களிலேயும், கறிகாய்க் கொல்ல்களிலேயும், சாகுபடி செய்யப் படுகின்றன. படுகைமண் சர்வசிலாக்கியம் செவ்வல், கரிசலினும், சாகுபடி செய்யலாம். கெய்தேந்தி, பருவம், விதைப்பு, விதையின் அளவு, முதலான :—

தனியாகப் பயிர் செய்தால், கோடைமழையில் பூமியை 2-3 தடவை உழுதும், விதைக்குமுன் சூலைமாதக் கடைசியில் ஒருதடவை உழுதும், விதை தெளிக்க வேண்டும். இதரப்பயிர்களுக்கு மத்தியில் பயிர் செய்தால், அங்கு மிங்குமாய் விதை தெளிக்கப்பட்டு அந்தப் பயிர்களுக்குள்ள செய்கோர்த்து

தான் இதற்கும், ஏற்படுகிறது. களை விடுமானதால் அதிக உரம் கொடுப்பதில்லை. தனிமையில் பயிர் செய்தால் ஏகரா 1க்கு சுமார் 30-பவுண்டு விதை செல்லும். இதர பயிர்களுடன் தெளிக்கும் பட்சத்தில் ஏகரா 1க்கு சுமார் 2-பவுண்டு போதுமானது. கலந்து பயிர்செய்யும்போது வேலிப் பயிராகக் கரை ஓங்குகளில் விதை தெளிப்பது கலம். சூலைமாதக்கடைசி தான் விதை தெளிக்கத் தகுந்தகாலம். தெளித்து ஒருமாதத்துக் கெல்லாம் கொத்திக் களைபிடுங்க வேண்டும்.

வயசு, வறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன:—

இது மூன்றுமாதத்திய பயிர். அக்டோபர், கலம் பரில் பயிர் முதிர்ந்துவிடும். முதிர்ந்தவுடன் வேரோடு பிடுங்கி வெப்பலில் காயவைத்து 30-40-தண்டுகளை ஒருகட்டாக கட்டி இலைகளையும், காய்களையும் கீழே விழும்படியாக அடிக்கப்படுகிறது. காய்கள் அடிக்கப் பட்டு மாற்றப்பட்டு விதை சேகரிக்கப்படுகிறது. தண்டுகள் கட்டுகளை எல்லாம் ஒரு பெரிய கட்டாகக் கட்டி கல்குமையுடன், சுமார் 10 நாள் தண்ணீரில் ஊர வைத்தால், பின்பட்டையை சுலபமாக அடியிலிருந்து உரித்து விடலாம். இந்தப் பட்டைகளைத் தடியால் அடித்தால் கார்பிரிந்துவிடும். சலத்தில் கழிவி, அடித் தால்சுத்தகாரகிடைக்கும். ஏகரா 1க்கு சுமார் 5000-ம் பவுண்டு காய்ந்த தண்டுகள் கிடைக்கும். இந்த தண்டுகளிலிருந்து சுமார் 1,000-பவுண்டும் காரகிடைக்

கும். 1 ஏராய்க்கு 8-பவுண்டு கார்விலை போகிறதாம். காரின் நீளம் 3 அடிமுதல் 6 அடிவரையிலிருக்கும். கைத்தேயில்:—

இந்த காரிலிருந்து தாம்புக்கயிறுகளுப், மாலைக் கயிறுகளும், கலப்பை வடக்கயிறுகளும், தும்புகளும், பூட்டுக் கயிறுகளும். சாக்குகளும் செய்யப் படுகின்றன. ஆனால் இதிலிருந்து உண்டாகும் சாக்குத் தண்ணீரில் பட்டால் பலவின மடைகிறது.

ஜெட் அல்லது பங்காளத்துச் சணல்.



ஜெட் அல்லது பங்காளத்துச் சணல்.

ஜெட் அல்லது பங்காளத்துச் சணல். 111

பயிர் கபாலம்:—

இந்த காவகைப் பயிரில் 2 மாதிரிகள் இருக்கின்றன. ஒரு மாதிரியின் விதை உருண்டையாயும், மற்றொன்றின் விதை நீளமாயிருக்கும். இது பங்காளத்தில் ஏராளமாகச் சாகுபடி செய்யப்பட்ட போதிலும் கூட, நமது இராஜதானியில் கிருஷ்ணா, விசாகப்பட்டணம், கஞ்சம், முதலிய விடங்களில் சொற்பமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதாகத் தெரியவருகிறது. பயிர் 3 அடி முதல் 12 அடிவரையில் வளரும்.

தகுந்த பூமிகள்:—

செவ்வல், கரிசனிலும், வரும். ஆனால் பங்காளத்தில் சாதாரணமாய்த் தாழ்க்தபடுகை நிலங்களிலும், நஞ்சைகளிலும், தான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. நேரத்தியான கார் கிடைக்கவேண்டுமானால் நல்ல வாழ்காலுள்ள வளமான களி நிலத்தில் தான் சாகுபடி செய்யவேண்டும். உஷ்ணமான நீர்க் காற்றுள்ள சீதோஷ்ணம் இப்பயிர் வளர்ச்சிக்கு முக்கியம். நஞ்சையிலும் சாகுபடி பண்ணலாம். புஞ்சையிலும் சாகுபடி பண்ணலாம். புஞ்சையில் கிணற்று இறவையாயிருக்கவேண்டும்.

செய்நேர்த்தி, விதைப்பு, பருவம், முதலியன:—

ஆகஸ்டு, செப்டம்பர் முதல் ஏப்பிரல் வரையில் அநேகம் தடவை உழுப்பட்டு, சுட்டிகள் உடைக்கப்பட்டு தரிசாய் வைத்திருக்கிறார்கள். ஏப்பிரல், மே மாதங்களில் ஏகா 1க்கு 8 முதல் 20 செர்வரையில் அதாவது 5 முதல் 12½ பட்டணம்படி வரையில்

விதை தெளித்தப்படுகிறது. விதையைக் கையால் தெளித்தாலும் தெளிக்கலாம் அல்லது காற்றுவிட்டு கட்டாலும் நடலாம். நமது இராஜதானியில் சூலை, ஆகஸ்டுமாதம்தான் விதைவிட் தருத்தகாலம். நமது இராஜதானியில் நெல் எப்படி ஆற்றுவண்டல் படித்த சலத்திலே நஞ்சையில் விர்த்தியாகிறதோ, அதுபோல ஜூன் பயிர் பங்களத்தில் ஆற்றுவண்டலினால் விர்த்தியாகிறது. ஆகையால் நமது இராஜதானி நஞ்சைகளில் லெல்லாம் விர்த்தி செய்தால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். அபூர்வமாக சாணம், பசுந்தழை முதலிய எருக்களைக் கொடுக்கிறார்கள். பயிர் ஒரு அடி உயரமிருக்கையில் களை பிடுங்கப்படுகிறது.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுமுதல், முதலியன :—


ஆகஸ்டு மாதத்தில் பூக்க ஆரம்பிக்கும். ஆகையால் இது 3½ மாதத்துப்பயிர். காருக்காக வென்றால் பூக்கிறதற்கு முன் அறுப்பது தான் சர்வசிலாக்கியம். பயிர் நன்றாய் முதிர்ந்த பிற்பாடு அறுத்தால் நிரம்ப மட்டமான நாரைக் கொடுக்கும். பூ, மொட்டு விட்டவுடன் அறுப்பது இரண்டாத்தரமான நாரைக்கொடுக்கும். பூத்த பிற்பாடும் காய் பிடிக்கும் சமயத்திலும் அறுக்கும்பயிர் மூன்றாம் தரமான நாரைக்கொடுக்கிறதாம். பயிரை வேருடன் பிடுங்கி இலையும் காயும் உதிர்வதற்காகக் காயப்போட்டு, பிறகு கட்டாகக்கட்டி தண்ணீரில் 10, 20 நாள் ஊரப்போட்டு, அழுகினவுடன், கொட்டாப் பிடியால் அடியிலும், நடுவிலும்,

அடித்து நார் எடுக்கிறார்கள். நார் சுமார் 8 அடி நீளமிருக்கும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 500 முதல் 700 பவுண்டு வரையில் சுத்தமான நார் கிடைக்கிறதாம். ஒரு காளைக்கு ஒருமனிதன் 10 சேர் முதல் ஒரு மணங்கு வரையில் நார் எடுப்பானும். ஒரு டன் ஜூன் நார் சுமார் ரூபாய் 300 லண்டனில் விலை போகிறதாம் இந்த காருக்கு இப்போது நல்ல கிராக்கி. ஏகர் 1க்கு சுமார் 100 ரூபாய் நார் கிடைக்கும். சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 40 போனாலும் ஏகர் 1க்கு குடிக்குருக்கு ரூபாய் 50 மிஞ்சும்.

கைத்தொழில் :—

இந்த நாரிலிருந்து பலமான சாக்குகள் உண்டாக்கலாம். பங்களத்தில் இந்நாரிலிருந்து, படுக்கிற பாய் & னும், சாக்குகளும் ஏராளமாய் செய்யப்படுகின்றன. இப்பயிர் வேர், கடுதாசு செய்ய பிரயோஜனப்படுகிறது. நார் உரித்தவுடன் தண்டைக்கரியாக்கி வெடிமருந்துக்கு உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். இதன் இலைகளைக் கறியாகச் சமைத்துச் சரப்பிடுகிறார்கள். இதின் காய்ந்த இலையின் கஷாயம் தேகத்துக்கு பலவிர்த்தி ஒளவுதமாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

கத்தாழை.



மருள்கத்தாழையும், சாதாரணக் கத்தாழையும்.

பயிரின் கபாவம்:—

இதை நார்வகைப் பயிராகவும், வேலிப்பயிராகவும், சாகுபடி செய்யலாம். இதில் யானைக்கத்தாழை என்றும், சோற்றுக்கத்தாழை என்றும், மருளென்றும்,

முள்ளில்லா ராகுசிமடலென்றும், சாதாரண கத்தாழை என்றும் இப்படி அநேக திணைகள் உண்டு. மருள் முகலிய கத்தாழைகள் சாகுபடி செய்யப்படாமல் சுபாவமாகவே வனஞ்சூழாய் வளருகின்றன. மருள் நார், வில்களில் பிரயோகிக்கப்பட்டு வந்தது. சோற்றுக்கத்தாழை மருந்தாக உபயோகப்படும். எல்லா கத்தாழைகளினிருந்தும் நார் எடுத்தாலும்கூட யானைக் கத்தாழை தான் முக்கியமானதால் அதன் சாகுபடியை முக்கியமாய் விவகரிக்கப்படும். இந்தப்பயிர் மெதுவாகவளருவதினால் நானுக்காக அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை.

தகுந்த பூமிகள்:—

எல்லா பூமியிலும் வரும். செவ்வல், கரிசல், கப்பி முதலிய பூமிகளில் வளரும். ஆனால் நல்ல நானுக்காக சாகுபடி செய்யப்படாதுகூட நல்ல வளமுள்ள, பாதி களி, பாதி மணல் சம்மந்தமுள்ள களிமண் பூமிதான் திறம். பொட்டை வெளியிலேயும், நிழலிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம். ஆனால் நிழலில் சாகுபடிசெய்வது அவ்வளவு சிலாக்கியமல்ல. ஏனெனில் மடல் குறுகிப்போய் விடுவதோடும் கூட, கொடி முதலியவைகள் படருவதனால் கோவுமுண்டாகும்.

சேய் தேர்த்தி, விதைப்பு, பருவம், முதலியன:—

வேலிக்காகச் சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் பயிரைச் சுற்றிக்கரை போட்டுக் களைகளின்பேரில், கத்தாழைக் கிழங்குகளை 1. மாகல் 3 அடிக்கு ஒருதரம்

நடவேண்டும். கரை 3-4 அடி உயரமிருக்கவேண்டும். ஒருகெஜம்நீளம் கரை போட அணுஒன்று செலவாகும். காருக்காக சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் பூமியை நன்றாய் உழுது 8 அடிக்கு ஒருகுழி தோண்டி ஒவ்வொரு குழியிலும் உரம்போட்டு கத்தாழைப் பதியன் களைநடுவது திறம். மழைகாலத்தில்தான், பதியன் களைநடவேண்டும்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுழநல், முதலியன—

சாதாரணமாய் கட்டு, மூன்று வருஷத்துக் கெல்லாம் காருக்காக மடலை அறுக்கலாம். 5-6 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடு மடலை அறுக்க ஆரம்பிப்பது நன்று. பிறகு வருஷா வருஷம் மடலை அறுக்கலாம். 7வது வருஷத்தில் 280 மணங்கு மடலிலிருந்து 7 மணங்கு நார்கிடைக்கும். வெளிப் பக்கத்தில் அடியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பழுத்தமடல்கள் சாதாரணமாய் நார் எடுக்க சர்வசிலாக்கியம். முதிராத உள் மடலிலிருந்து எடுக்கும் நார், குட்டையாயும், பலவினமாயுமிருக்கும். சுமார் 7 வருஷமுள்ள ஒருகத்தாழைச் செடியிலிருந்து வருஷா வருஷம் 12 முதல் 15 வரையில் முதிர்ந்த மடல்கள் அறுக்கலாம். கட்டு 7 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடு முதலில் அறுக்கும்போது ஒவ்வொரு செடியிலிருந்து சுமார் 25 மடல் அறுக்கலாம். பிறகு வருஷாவருஷம் 12 முதல் 15 மடல் வரையில்தான் அறுக்கலாம். யானைக்கத்தாழை ஒரு

மடல் சுமார் 2½ பவுண்டு நிறை இருக்கிறதாம். முள்ளுள்ள யானைக் கத்தாழையின் நார் நீள்மாயிருந்த போதிலும்கூட முள்ளில்லா யானைக் கத்தாழையின் நார் அதிக பலமுள்ள தன்னியில், வேலிப்பயிருக்கு சர்வசிலாக்கியம். முள்ளில்லா யானைக்கத்தாழையின் மடல் ½ பவுண்டு நிறை இருக்கும். மடலை வெட்டி முட்களை நீக்கி துனியில் 6 அங்குலம் வெட்டிவிட வேண்டும். பிற்பாடு நீளத்தில் 5-6 துண்டாகக் கிழித்துக் கொண்டு கொட்டாப் பிடியால் அடித்து 4 அடி நீளம் 4 அங்குலம் அகலம் 3 அங்குலம் கனமுள்ள கட்டையில் கால்கட்ட விரலால் அழுத்திக் கொண்டு சோறு, சதைகளை, சுறண்டியால் சுறண்டி விடவேண்டும். பிற்பாடு நாரை வெய்யிலில் காயவைத்துப் பிரயோகிக்கலாம். அல்லது முன் சொன்னபடியே கிழித்து கொட்டாப் பிடியால் அடித்து கட்டாகக் கட்டி சுமார் 15, 20 நாள் தண்ணீரில் ஊரப்போட்டுச் சோறு அழுகி, மக்கிப்போனவுடன் எடுத்துக் காயவைத்து நார் எடுக்கவேண்டும். முதல்சொன்ன மாதிரியில் சிலாக்கியமான நார் கிடைக்கும். லண்டனில் ஒரு டன் நார் சுமார் ரூபாய் 375 விலைபோகிற தாம். தண்ணீரில் ஊரவைத்த நார் சுமார் ரூபாய் 150 விலை போகிறதாம். கையால் எடுக்கும் நாரைப்பார்க்கிலும் யந்திரத்தினால் எடுக்கும் நாருக்கு விலை ஜாஸ்தி. நமது பக்கத்தில் ஒரு பவுண்டு நார் இரண்டு அணு விலை. தண்ணீரில் ஊரவைத்து எடுத்த நார், காண்டி எடுக்க

கும் நாரைப்பார்க்கிலும் நீளமாயிருக்கும்; ஆனால் வெளுப்பாக இர்து.

கைத்தொழில்:—

நல்ல பலமான விவசாயக் கயிறுகளுக்கும் இதர கயிறுகளுக்கும் இது உபயோகப்படுகிறது. கோரைப் பாய்கள் குறுக்கு கயிறுகளுக்கும் இது பிரயோசனம் படுகிறது.

கிழங்குவகைப் பயிர்கள் மஞ்சள்.



மஞ்சள்.

பயிரின் சுபாவம் :—

இது ஒரு கிழங்குவகைப் பயிர். இதைச் சாயப்பயி ராகவும் கொள்ளலாம். இதில் பசும் மஞ்சளென்றும் கஸ்தூரி மஞ்சளென்றும் இரண்டிவகைகள் உண்டு. கஸ்தூரி மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறதில்லை. இது வனாந்திரமாய் வளருகின்றது. இதனுடைய கிழங்கு வைத்தியத்தில் பலவிர்த்திக்காகவும், வாயு நிவர்த்திக்காகவும் பிரயோசனப்படுகிறது. பசு மஞ்சள்தான் சாகுபடிசெய்யப் படுகின்றது. இதி லிருந்துதான் வரளிமஞ்சளென்றும் பலகை மஞ்ச ளென்றும் உண்டாக்கப் படுகின்றன. நமது இராஜ தானியில் வாய்க்கால் பாசனத்திலும் கிணற்றுப் பாசனத்திலும் சிலவிடங்களில் ஏராளமாய்ச் சாகு படி செய்யப் படுகின்றது. மழை ஜாஸ்தியாயுள்ள மலையாளபக்கங்களில் பாசனமன்னியில் சாகுபடி செய்யப் படுகிறது. இதைத் தனிமையிலாவது அல்லது இஞ்சி, சேனை, கருளை, சேம்பு, கரும்பு, வெங்காயம், கொட்டைமுத்து, அகத்தி, சிலகறிகாய்ச் செடிகளோடும் கலந்தாவது சாகுபடி செய்யப் படுகிறது.

நதந்த பூமிகள் :—

நல்லவழிகால் வசதியுள்ள சாதாரண கரிசல்பூமி நீர்ப் திறம், பாதிமணல் பாதிகளியாயிருக்கப்பட்ட களிமண் பூமி திறம்.

சேய் நேர்த்தி :—

பூமியை அடிக்கடி உழுதுமண் தூவாளியா யிருக்க வேண்டும். சுமார் 6 உழவுக்குக்கம்மிப் படக்கூடாது. பிறகு வேர்வாரியினால் 2 தரம், களை, புல், வேர் முதலியவைகளை அப்புறப் படுத்த, வேலை செய்ய வேண்டும். பிறகு பரம்புப்பலகையினால் மேடுபள்ளங் களைச் சமத்துவம் பண்ணவேண்டும். பிறகு 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள புரத்திகளாகப் பிரித்து, இப்பேர்ப்பட்ட புரத்திகள் இரண்டொருசைக்கு 100வீல், பாசனத்துக்காக ஒருசிறு கண்ணி ஏற்படுத்தி விட வேண்டும். இப்படி வயல் முழுவதும் புரத்திகளும் கண்ணிகளுமாக இருக்கும். ஒருகண்ணிக்கும் மற்றொரு கண்ணிக்கும் 12 அடி வித்தியாசமிருக்கும். இந்தப்புரத்திகளில் முதல் 1½ அடிவித்திபாசத்திலும் 3 அங்குல ஆழத்திலும் அநேக குழிகள் உண்டாக்கி கிழங்குக் கண்களைப் புதைத்து மூடுவது வழக்கம்.

நதந்த எரு :—

ஏகரா 1க்கு 40 வண்டி சானம் அடிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் ஆட்டுக்கிடையினாலும், நதத்தது எருவி னாலும் உரப்படுத்தவேண்டும் குளத்துப்பொருக்கும் அடிக்கலாம். ஏகரா 1க்கு 30 வண்டிக்குக் குறையக் கூடாது.

நதந்தகாலம், விதைப்பு, விதையின் அளவு, முதலியன :—

குன், சூலையில் உழுது ஒரு அடித்து பாத்தி கட்டி, பாத்தியின் குழிகளில் கிழங்குக் கண்கள்

புதைக்கப் படுகின்றன. ஏகா 1க்கு 1800-பவுண்டு முதல் 2000ம் பவுண்டுவரையில் விதைக்கிழங்குகள் செல்லும். ஒவ்வொருவிதைக் கிழங்குகளுக்கும் 2-3 கண்கள் உள்ளதாய் பொறுக்கிவைக்கவேண்டும். இஞ்சி யோடுகலந்து சாகுபடிசெய்தால் இஞ்சியைப் பாத்தி களிலும், மஞ்சளைப் பாத்திக்கரைகளிலும் போடுவது வழக்கம். அப்போது ஏகா 1க்கு 600 முதல் 800 பவுண்டு வரையில் விதைக் கிழங்கு செல்லும். பாத்திகளில் விதைக் கிழங்குகளை புதைத்தால் பாத்திக்கரைகளில் கருணை, சேம்பு, போடலாம். அப்போது ஏகா 1க்கு சுமார் 600 முதல் 700 பவுண்டு வரையில் கருணை, சேம்பு, விதைகளைக்கரை ஓரங்களில் போடும்படியாக இருக்கும். பாத்திகளில் மஞ்சள் கிழங்குகள் போட சுமார் 600 பட்டணப்படி விதைச் செல்லலாம். கருணையைக் கரைகளில் 4 அங்குல ஆழத்தில் 3 அடிக்கு ஒரு தரம் பயிர் செய்ய வேண்டும். பாத்திகளின் 4 மூலைகளிலும் கொட்டை முத்து அல்லது அகத்தி உண்டுபண்ணலாம். கொத்த வரை, மிளகாய், கத்தரிமுதலிய பயிர்களும் கரைகளில் உண்டாக்கலாம். ஆகையால் சூன், சூலை மாதம்தான் விதைபோட நல்லகாலம்.

பாசனம், கொத்தல்:—

புதைத்து 5, 6 மாதத்துக்கு, வாரம் ஒரு முறை விதம் ஜலப்பாய்ச்சிக் கொண்டுவரவேண்டும். பயிர் ஒரு மாதமானவுடன் மாதத்துக்கு ஒரு தரம் கொத்தி,

களைபிடுங்கி பூம் சுத்தமாயிருக்க வேண்டும். மொத்தம் சுமார் 15,20 தரத்துக்குக் குறையாமல் இறவைத் தண்ணீர் கொடுக்கும்படியாயிருக்கும். கிணற்றிரவையானால் இதற்கு சுமார் ரூபாய் 40 செலவு பிடிக்கும். வயாது, அறுப்பு, கண்டு முதல்:—

இது சுமார் 9 மாதத்துப்பயிர். ஐ-ஒனில் விதைக் கிழங்கு ஊன்றினால் பிப்ரவரி, மார்ச்சில் மஞ்சளை வெட்டலாம். இலைகள் காய்ந்து சுருகாய்ப் போனது தான் மஞ்சள் முதிர்க்கத்தற்கு அடையாளம். பயிர் முதிர்க்க பிற்பாடுகூட கிழங்கு பூமியிலிருந்தாலும் அதனால் கெடுதல் ஒன்றும் ஏற்படாது. நல்ல விலைவாரும் போது பக்குவமாய் வெட்டி விற்றுவிடலாம். சின்னக் கூத்தாலியால் பயிரை சேதப்படாமல் வெட்டவேண்டும். கருணை நிரம்ப ஆழத்திலிருந்தால் சேதமன்னியில் வெட்டியெடுக்க நிரப்ப செலவாகும். ஏகா 1க்கு சுமார் 15,000ம் பவுண்டு பசும் மஞ்சள் கிழங்கு கிடைக்கும். கருணையில் சுமார் 5,000ம் பவுண்டு கிடைக்கும். இவைகளில் வேர், மண், முதலிய அசடுகளைப் போக்கி சுத்தப்படுத்தினால், ஏகா 1க்கு 10,000ம் பவுண்டு சுத்தப்படுத்தின மஞ்சளும், 3,500 பவுண்டு சுத்தப்படுத்தின கருணைக்கிழங்கும் கிடைக்கும். மஞ்சளில் சுமார் ரூபாய் 150ம் கருணை முதலிய பயிரில் சுமார் ரூபாய் 100-ம் ஆக மொத்த வருப்படி சுமார் ரூபாய் 250-ம் வரலாம். இதற்குச் செலவு சுமார் ரூபாய் 150 போனாலும் ஏகா

1க்கு மஞ்சள் சாகுபடியில் சுமார் ரூபாய் 100 கிடைக்கும். இஞ்சியோடு சாகுபடி செய்தால் ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 3,000 பவுண்டு பசும் மஞ்சள் கிடைக்கும். வேகவைத்துப் பக்குவப்படுத்தின மஞ்சள் சுமார் ஏக்கர் 1க்கு 3,000ம் பவுண்டு தான் கிடைக்கும். பசும்மஞ்சள் ரூபாய் 1க்கு சுமார் 60-பவுண்டும், பாடம் பண்ணின் மஞ்சள் ரூபாய் 1க்கு 10-பவுண்டும் விலை போகிறது.

மஞ்சளை வியாபாரத்துக்குத் தயார் செய்தல்:—

கிழங்குகளை வெட்டி வேர் முதலிய அசடுகளைச் சுத்தம் செய்தவுடன், மண் சட்டியில் சாணசலத்தில் போட்டு கலந்து வேகவைத்துப் பிற்பாடு கிழங்குகள் காயவைக்கப் படுகின்றன.

கைத்தொழில்:—

மஞ்சளிலிருந்து மஞ்சள் சாயம் எடுக்கலாம். இந்த சாயக்கஷாயத்தில் துணிடைகளைத்து மஞ்சள் வர்ணம் ஏற்றுவார்கள்.

இஞ்சி.



இஞ்சிப்பயிர்.

பயிர்ச்சபாவம் :—

இது ஒரு கிழங்குவகைப் பயிர். இதை வாசனைச் சரக்குப் பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது உஷ்ண தேசத்துப் பயிர். சம்பூமிகளில்தான். முக்கியமாய் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மலைப்பிரதேசங்களில் அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப் படுகிறதில்லை. பயிர் சுமார் 2 அடி உயரமிருக்கும். இஞ்சி தனிமையி லாவது அல்லது மஞ்சள், கருணை, வெங்காயம், மிள காய், கத்தரி, முதலியவைகளுடன் கலந்தாவது சாகு படி செய்யப்படுகிறது. முக்கியமாய் இஞ்சியும், மஞ் சளும், கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

தகுந்தபூமிகள் :—

கல்லவடிகால் வசதியுள்ள வளமான பொலப் பொலப் புள்ள மண்ணையுடைய பூமி சிலாக்கியம். படுகைமண்ணில் நன்றாய் வருகிறது. தோட்டக் கால் பூமி திறம். கொஞ்சம் களிசம்பந்தப் பட்ட மணல் சாரியிலும் வரும்.

செய்நேர்த்தி :—

ஜூன்மாதத்தில் சுமார் 40-வண்டி சாணம் உரம் கொடுக்கவேண்டும். இல்லாத பட்சத்தில் 30-40-வண்டி பொருக்கு அடிக்கலாம். அப்பேர்ப்பட்ட பூமியை ஒரு மழைக்குப் பிந்தியாவது அல்லது பூமியை ஈரப்படுத்தின பின்பாவது உழுது களை, புல், முதலியவைகளை வேர் வாரியால் சுத்தப்படுத்தி,

பரம்புப் பலகையால் மேடு பள்ள மன்னியில் சமமாக்கி, 12 அடிகளும் 6 அடி அகலமுள்ள பர்த்திகள் கட்டி, இரண்டு பாத்திகளுக்கு மத்தியில் பாய்ச்சலுக்காக கண்ணிகள் ஏற்படுத்தி, இப்படி வயல் முழுவதும் பாத்திகளும், கண்ணிகளும் ஈருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். ஜூன் மாதத்துக்கு முந்தி சுமார் 5 உழவு ஆயிருக்கவேண்டும். மொத்தம் 6 உழவுக்குக்குறையக் கூடாது. (கண்ணிகளைத் தவிர) ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 550 பாத்திகளிருக்கும்.

தகுந்தகாலம் விதைப்பு விதையின் அளவு முதலியன :—

ஜூன், ஜூலைமீல் பாத்திகளில் 9 அங்குல வித்தியா சத்திலும், 2 அங்குல ஆழத்திலும், 2, 3 கண் களுடைய இஞ்சித்துண்டத்தை புதைக்கவேண்டும். இப்படி 9 அங்குல வித்தியாசத்தில் குச்சியால் குழிகள் உண்டாக்கி 2 அங்குல ஆழத்தில் புதைத்த பிற்பாடு, குழிகளை மூடிக்கையால் சமத்துவம் செய்து விடவேண்டும். ஒரு பாத்திக்குப் புதைக்க சுமார் 144 இஞ்சிக் கண்விதைகள் செலவாகும். ஒரு ஏக்கரு க்குசுமார் 77,000ம் விதைக்கன்கள் செலவாகின்றன. இந்த 77,000ம் கண்களும் சுமார் 1,200 முதல் 1,500 பவுண்டிவரை இஞ்சிக்கிழங்கிலிருந்துவிதைக்கிழங்காக கிடைக்கும். சிலசமயம் 2,000ம் பவுண்டு கூட செல்ல லாம். விதைக்காகக் கிழங்குகள் கல்லகாதிரமா யிருக்கவேண்டும். ஜூன், ஜூலைதான் விதைக்கத் தகுந்தகாலம். இஞ்சியை பாத்தியிலும், இஞ்சிக்கு

கிழங்கொடுப்பதற்காக கரைகளில் மஞ்சள், கருணை, அகத்தி, கொட்டை, கொத்தவரை முதலியவைகள் பயிரிடப் படுகின்றன.

பாரனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல் :—

மழை யில்லாதகாலத்தில் வாரம் ஒருமுறை வீதம் விதை புதைத்த நாள் முதல் பயிர் முதிருகிறவரையில், இறவைத் தண்ணீர் கொடுக்கவேண்டும். மொத்தம் சுமார் 20 இறவை கொடுக்கும்படியாய் நேரிடும் மாதம் 1 தரம் வீதம் 4 தடவைப் பயிரைக் கொத்திக் களைபிடுங்க வேண்டும். 2வது கொத்தும்போது பயிருக்கு மண்ணைக்க வேண்டும். அப்போது கொட்டைப் பிண்ணாக்கைத் தூராக் கிப் பயிருக்கு உரம் அணைப்பது திறம். இப்படி 2, 3 கொத் தலிலும் பிண்ணாக்கு உரம் கொடுப்பதும் திறம். வயசு, அடப்பு, கண்டுழதல், முல்லியன் :—

இது சுமார் 8 மாதத்துப் பயிர். ஐஞ்சிலை புதைத் தால் பிப்பிரவரியில் இஞ்சியை வெட்டலாம். எவ்வளவுக் கெவ்வளவு உரம் ஐஸ்தியாய்க் கொடுக்கிறோமோ அவ்வளவுத் தவ்வளவு பயிர் ஒரு மாதம் சித்திரம் முதிரும். கூந்தாலினாலாவது அல்லது மண்வெட்டினாலாவது சேதப்படாமல் வெட்டி பெரிக்கவேண்டும். ஏதர் 1க்கு வேர், மண் முதலிய அசடுகள் நீக்கப்பட்ட இஞ்சிக் கிழங்குகள் சுமார் 12,000ம் பவுண்டு கிழங்குக்கும் ரூபாய் 1க்கு சுமார் 40-பவுண்டு விலைபோகும். இந்தக்கிழங்குகளில் விதைக்கு எடுத்து வைக்கப்படும் கிழங்குக்கு விலை


ஐஸ்தி. அதாவது விதைக்கிழங்கு ரூபாய் 1க்கு சுமார் 25 பவுண்டு. ஏதர் 1க்கு சுமார் மொத்த வரும்படி ரூபாய் 300ம், சாகுபடிச்செலவு ரூபாய் 200ம் போனால் குடிதருக்கு தாராளமாய் ரூபாய் 100 மிஞ்சும்.

இஞ்சியைப் பாதுகாத்து வைத்தும் வீதம் :—

நல்ல காற்றோட்டமுள்ள குளிமையான இடத்தில், அழுகலை எல்லாம் நீக்கி வெய்யனில் காயவைத்து, தரம்பார்த்துப்பிசித்து 4, 5 அடி உயரத்தில் குவியல் குவியலாக அடுக்கி விடவேண்டும். அடிக்கடி குவியலை சோதிக்கவேண்டும். குவியல்களின் நடுவில் உஷ்ணம் புறப்படாமலிருந்தால், இஞ்சிகள் கெட்டுப்போகவில்லை யென்றும் எண்ணவேண்டும். உஷ்ணம் புறப்பட்டால் மறுபடி அழுகலையெல்லாம் நீக்கி மறுபடி அடுக்கவேண் டும். இப்படி கெட்டுப்போகாமல் சுமார் 7-8 மாதம் வரையில் அடுக்கிவைக்கலாமாம். இப்படி அடுக்கி வைப்பதில் நிறை குறையும். நல்லகாத்திரமாயுள்ள இஞ்சியை ஜலத்தில் நனைத்து சுற்றாடி சுத்தப்படுத்தி மறுபடி கழவி 3, 4 நாள் வெய்யனில் காயப்போட்டு, சுத்தப்படுத்தி மறுபடி காயப்போட்டு வைப்பது தான் சுக்கு என்று பெயர். 20 மணங்கு இஞ்சியை சுக்காக் குவதற்கு 5 ரூபாய் செலவு சிடிக்குமாம். இஞ்சி, சுக்கு, வைத்தியத்திலேயும் சுவை அதிகரிக்க உணவு பதார்த்தத்திலும் உபயோகப்படுகின்றன.

வெங்காயமும் வெள்ளைப் பூண்டும்.

வெங்காயம்.



வெங்காயப் பயிர்.

பயிர்ச்சுவை:—

இதைக் கிழங்கு வகைப்பயிராகவும் சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் வாசனைச் சரக்குப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது ஒரு முக்கியமான தோட்டக்கால் பயிர். இது தனிமையிலே சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதில் மூன்று முக்கிய மாதிரிகள் இருக்கின்றன; சிகப்பு, மஞ்சள், வெள்ளை. சிகப்பு மாதிரியில் வெளியில் தோல் கல்ல சிகப்பு நிறமாயிருக்கும். மஞ்சளில், வெளித்தோல் ஒரு விதக்கலங்க வெளுப்பாயிருக்கும். வெள்ளையில் சித்தையும் சுத்த வெளுப்பாயிருக்கும். இது மாரிகலத்தோட்டக்கால் பயிர்.

தஞ்சை பூமி:—

கல்லவடிதால் வசதியுள்ள, கஷ்டமன்னியில் கருவிகள் வேலை செய்யக்கூடிய, பொலபொலத்த மண்ணையுடைய பூமி திறம். தோட்டக்கால் கரிசனிலும் செவ்விலும் வரும்.

வயல் செய்கை:—

பூமியை ஆறு உழவுக்குக் குறையாமல் உழவேண்டும். செப்டம்பரில் கடைசி உழவு உழுது, ஏகரா ஒன்றுக்கு 15 டன் அல்லது சுமார் 30 வண்டி கல்ல மடித்த சாணம் எருவடித்துப் பரப்பி உழுதபிற்பாடு, களை, புல், வேர் முதலியவைகளை நீக்கவேர்வாரி யென்னும் கருவியால் இரண்டு தரம் வேலைசெய்து, பரம்புப் பலகையால் மேடு பள்ளத்தை திரவி, பாத்திகள் கட்டி இரண்டு வரிசைப் பாத்திகளுக்கிடையே கண்ணி

களுமேற்பித்தி, இப்படி வயல் முழுவதும் பாத்தி களும் தண்ணிகளுமாயிருக்க வேண்டும்.

நாற்றங்கால் செய்யேந்தி :—

நாற்றங்காலை நன்றாய் வெட்டி வாங்கி, ஏராள மாய் உரமடித்து நல்ல தூவாளியாய், வைத்திருக்க வேண்டும். மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமி நாற் றங்காலுக்குத் திறம். செட்டம்பர் மாதத்தில் நாற்றங் காலை 15 பவுண்டு நல்லகாத்திரமான விதை, கைத் தெளியால் “நெருக்கமாய்த் தெளிக்கப்படுகின்றது. இந்த 15 பவுண்டு விதையிலிருந்துண்டாகும் நாற்று ஒரு ஏக்கர் நடபோதுமான்று. நாற்றங்கால் சுமார் 10 செண்டு விஸ்தீரணமிருக்கவேண்டும். நாற்றங்கா லில் களை முதலியவைகளை சுத்தப்படுத்தி நெருக்க மாயிருக்கப்பட்ட இடங்களைக்கலக்கப்படுத்தி கோ வற்ற காத்திரமான நாற்றுகளை உண்டாக்கவேண்டும்.

தகுந்த காலம்:—

செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதத்தான் விதை தெளிக் கத்தகுந்த காலம். பயிரை, நாற்றைக்கொண்டு நடடா வது, அல்லது கண்பதியன்களினாலாவது உண்டாக்க லாம். விதை விட்டு நாற்று உண்டாக்கி நடும்போது, விதையைச் செப்டம்பரில் தெளித்து நவம்பரில் நாற் றைப் பிடுங்கித்தயாராயிருக்கப்பட்ட வயல் பாத்தி களில் நடவேண்டும். நாற்றங்காலில் தண்ணீர் கட்டி பூமி மிருதுவாயிருந்தால், நாற்றைக் கையால் பிடுங்கி விடலாம். நாற்றுகளின் உச்சியில் பாதி கொய்து

நாற்றை முந்தி பாசனம் பண்ணப்பட்ட பாத்திகளிலா வது, அல்லது வெறும் பாத்திகளிலாவது, நடவேண் டும். வெறும் பாத்திகளில் நடடால் நடவுடன் தண்ணீர் பாய்ச்சவேண்டும். ஒவ்வொரு நாற்றுக்கும் 4 அங்குல வித்தியாசமிருக்க வேண்டும். இப்படி நாற் றுண்டாக்கி கட்டி பயிர்செய்தாலும் வேறு தினுசாகவும் பயிர் செய்யலாம். பாத்திகளில் சுமார் 6 அங்குல வித்தியாசத்தில் சிறு வெங்காயங்கள் புதைக்கப் படு கின்றன. இப்படி ஒரு ஏக்கரில் புதைக்க சுமார் 1,000ம் பவுண்டு சிறுவெங்காய விதை செல்லும். இச்சிறு வெங்காய விதைகளைக் குச்சியால் குழிகள் உண்டாக்கி அவைகளில் புதைத்து முடி விடவேண் டும். இவ்வெங்காய விதை நவம்பர் மாதத்தில் குழிகளில் புதைக்கப்படுகின்றது.


பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன:—

பாத்திகளில் நட வெங்காய நாற்றுகளுக்கு காலா வது நாள் ஒரு தண்ணீரும் பிற்பாடு வாரம் ஒரு முறை ஜலம் இறைக்கவேண்டும். விதை வெங்காயம் புதைத்த வுடனும் ஜலம் இறைத்து பிற்பாடு வாரம் ஒருமுறை ஜலம் இறைத்துக்கொண்டே வரவேண்டும். மொத்தம் சுமார் 20 தரம் ஜலம்பாய்ச்சவேண்டியிருக்கும். இரண் டி தரம் கொத்தி களை பிடுங்கவேண்டும். டிசம்பரில் கொத்தும்போது சாம்பலுடன் கொட்டை முத்துப் பிண்ணாக்கைக்கலந்து உரம் அணைப்பது திறம்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுதல், முதலியன:—

இது ஆறுமாதத்தியப் பயிர். செப்டம்பரில் தெளித் தால் மார்ச்சு, ஏப்ரலில் அறுவடை செய்யலாம். நவம் பரில் விதைக்கிழங்குகளைப் புதைத்தால் ஏப்ரல் கடை கியில் அறுவடை செய்யலாம். பயிர் முதிர்ந்ததற் கடையாளம் நுனியில் மஞ்சளாய்ப் போய்க் கீழே விடும். கடைசி பாசனத்துக்குப் பத்து நாள் பிற்பாடு கையால் பிடுங்கி விடலாம். இல்லாவிடில் கூந்தலி மண் வெட்டியால் பக்குவமாய் எடுத்து விடலாம். பிற்பாடு அசடுமுதலியவைகளை எல்லாம் எடுத்து, அப்புறப்படுத்தி சுத்தம் செய்து தாங்கட்டி பிரித்து விடவேண்டும். — நுனி இலைகளையும், அடிவேர்களையும் கத்தியால் நீக்கிவிடவேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்குச் சுமார் 30,000 பவுண்டு வெங்காயம் கிடைக்கும். இது சுமார் ரூபாய் 200 விலையிருக்கலாம். ஏகராவுக்கு மொத்தவருமானம் ரூபாய் 200ம் சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 120ம் வைத்துக்கொண்டாலும் செல வெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 80 மிஞ்சும்.

வெள்ளைப்பூண்டு.



வெள்ளைப்பூண்டுப் பயிர்.

இதற்குச் சாகுபடி விஷயம் சகலமும் வெங்காயத் தைப்போலவே, பயிர் உண்டாக்குவதற்குச்சிறுபூண்டு களையே விதையாக உபயோகிக்கப்படுகின்றன. அக் டோபர் மாதத்தில் 10 சதுர அடியுள்ள பாதத்தில் 1½ பவுண்டு காய்ந்த விதைப் பூண்டை விதைக்கவேண்டும். இப்படி புதைத்தால் ஏகர் ஒன்றுக்கு 700 பவுண்டி விதைப்பூண்டு செல்லும். உரம், செய்கேர்த்தி, காலம், பாசனம் எல்லாம் வெங்காயத்தைப்போலவே. பயிர் முதிர்ந்ததற்கு அடையாளம் இலைகள் பழுத்துப் போய்விடும். விதைபுதைத்து 5 மீ தூக்கெல்லாம் பயிர் அறுவடைக்குத்தயாராயிருக்கும். இது 5 மாதத் துப்பயிர். ஏகர் ஒன்றுக்கு சுமார் 8,000 பவுண்டு முதல் 10,000 பவுண்டு வரையில் வெள்ளைப்பூண்டுகிடைக்கும். இதன் விலை சுமார் ரூபாய் 250. ஏகர் 1க்கு செலவெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 100 கிடைக்கும்.

அரஞட் அல்லது கூவைக் கிழங்கு.

படம் அநேகமாய்

மஞ்சள் கொத்தைப்போல தானிருக்கும்.

பயிரின் கூபாவம்:—

இது ஒரு கிழங்குவகைப்பயிர். இந்தக் கிழங்கிலிருந்து வரும் மாவை உணவுக்கு உபயோகப் படுத்தப் படுவதால், இதை ஒரு உணவுப் பசிராகவும் கொள்ளலாம். இதில் ஈண்டு இந்தியன் அரஞட் யென்றும், வெஸ்டு இந்தியன் அரஞட் பென்றும் இரண்டு மாதிரி யுண்டு. ஈஸ்டி இந்தியன் அரஞட் கிழங்குமற்றொரு மாதிரியைப் பார்க்கிலும்பெரிது. அதிகவேர்களை யுடையதாயிருக்கும். கிழங்குகளில் பச்சையில் ஒருவித கசப்பான வஸ்து இருக்கிறதாம். தென் இந்தியா சிலபாகங்களிலும், மலையாளப் பக்கங்களிலும், கோதாவரி லில்லாமேல் பாகத்திலும் ஏராளமாய்ச் சாகுபடி செய்யப் படுகின்றது. மலையாளப் பக்கங்களில் மழை ஜாஸ்தியானதால் பாசன மன்னியில், மழையைக் கொண்டே

சாகுபடி செய்து விடலாம். நல்ல செய்கோத்தி யுடனும் நல்ல உரத்துடனும் சாகுபடி செய்தால் கிழங் குகளில் அதிக மாவும் கசப்புப் பதார்த்தம் குறைச்ச லாயும் உண்டாகும்.

தகுந்த பூமிகள் :—

மணல் ஜாஸ்தியாயுள்ள களிமண் பூமி நிரம்ப சிலாக கியும், பொல பொலத்த மண்ணையுடைய களிமண் பூமியும் நிறம், நல்ல வடிகால் வசதியுள்ளதா யிருக்க வேண்டும்.

செய்கோத்தி :—

4-5 உழவுக்குக் குறையாமல் உழவேண்டும். பிறகு வேர்வாரியால் சுத்தப் பித்தி, பரம்படித்துப் பாத்திகள் உண்டாக்க வேண்டும்.

காலம், விதைப்பு, முதலியன :—

ஆகஸ்டும் செப்டெம்பரும் விதைக்க நல்லகாலம். நல்ல கிடைவைத்து அல்லது சாணம், சாம்பல், பிண்ணாக்கு முதலிய உரங்களினால் உரப்பித்தி செய்கோத்தி செய்யப்பட்ட பாத்திகளில் சுமார் 1½ அடிக்கு ஒருதரம் குச்சியால் குழிகள் உண்டாக்கி, அவைகளில் விதைக் கண்களைப் புதைக்க வேண்டும். சுமார் 1,000 ம் பவுண்டு அரஜுட் கிழங்கிலிருந்து விதைக் கண்கள் எடுக்கும்படியாய் இருக்கும்.

பாசனம், கொத்தல் களைபிடுங்கல், முதலியன :—

மழை இல்லாத போது வாரத்துக்கு ஒருதடவை தண்ணீர் இறைக்க வேண்டும். 2-3-கொத்தலுக்குக்

அரஜுட் அல்லது கூவைக்கிழங்கு 139

கம்மிப்படக்கூடாது. கொத்தும்போது உரம் அணைக் கலாம்.

வயசு, கண்டுமுதல், முதலியன :—

சுமார் 6 மாதத்துப் பயிர். ஆகஸ்ட்டில் விதைக் கிழங்குகளைப் புதைத்தால் ஜெனவரி கடைசியில் வெட்டி விடலாம். பழிரைக் கூந்தாநியினாலாவது அல்லது மண் வெட்டியினாலாவது ரோதமன்னியில் வெட்ட வேண்டும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 6,000ம்-7,000-பவுண்டு அரஜுட் கிழங்கு கிடைக்கும். 100-பவுண்டு கிழங்குக்கு சுமார் 12½ பவுண்டு அரஜுட் மாவு கிடைக்கும். அதாவது ஏகர் 1க்கு சுமார் 750 பவுண்டு அரஜுட் மாவுகிடைக்கும். ஒரு பவுண்டு அரஜுட் மாவு 4 அணுவிலே

கைத்தொழில் :—

கிழங்கிலிருந்து அரஜுட் மாவு செய்யும் விதம். கிழங்குகளை நன்றாய் அலம்பிவிட்டு, சதை சதை யாய்த் நீருத பலகையினால் சுரண்டி, வரும் தூள்களை ஜலத்தில் கலந்து, குழப்பி, ஒரு துணியினால் வடிக்கட் டினால், மாவும் ஜலமும் ஒரு பக்கமும், சக்கை ஒரு பக்கமாய்ப்போய்விடும். பிறகு ஜலத்தைத் தெளிய வைத்துத் தெளிந்த ஜலத்தைக் கொட்டி மாவைக்கழு வி சுத்தம்செய்து காயவைத்து எடுத்து வைப்பதை தான் அரஜுட் மாவு என்று சொல்லுவார்கள்.

சேனைக்கிழங்கு, கருவணக் கிழங்கு.



சேனைக்கிழங்குப் பயிர்.

சேனைக்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு. 141

பயிரின் சுபாலம்:—

இதைக்கிழங்குப் பயிராகவும் கறிகாய்ப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். கருணைக்கிழங்கில் காராத கிழங்குகளையும், யானைக்கால் போலும் இருக்கும் கிழங்குகளுக்கு சேனைக்கிழங்கு அல்லது காராக்கருணை என்று பெயர். சாதாரணக்கருணைக் கிழங்குகள் காரலாம். ஒவ்வொரு கிழங்கிலும் நடுவில் ஒரு கண் முளை இருக்கும். அக்கிழங்குகளுக்கு தாளிக்கிழங்கு என்று பெயர். ஒவ்வொரு தாளியின் பக்கத்தில் அநேக வாளிக்கிழங்குகளும் புடைத்திருக்கும். இந்த முளைகளையும் சிறுகிழங்குகளாகிய விரலிகளையும் வெட்டி நட்டால் முதல் வருஷத்தில் சிறிய கிழங்குகள் உண்டாகும். நமது இராஜதானியில் மலையாளப்பக்கம் களிலும் கோயமுத்தூர், சேலம் ஜில்லாக்களில் சில பாசங்களிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. அநேக இடங்களில் இதைத்தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறதில்லை. மஞ்சள், விஞ்சி முதலிய சிலபயிர்களோடு கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

நடுத்த பூமிகள்:—

பொலபொலத்த வண்டல் மண்ணையுடைய பூமியில் வரும். நல்லவளமான மணல்சாரியிலும் வரும். தோட்டக்கால் கரிசனிலும் வரும்.

நடுத்த உரம்:—

ஏகரா ஒன்றுக்கு 30 வண்டி சாணம் உரமாகக் கொடுக்கவேண்டும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உரம்

ஜாஸ்திபாகக்கொடுத்து சரிபாய்ச் சாகுபடி செய்கிறோமோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு கிழங்கு பெருந்துகாரலும் மட்டாயிருக்கும்.

செய்நேர்த்தி :—

பூமியை நன்றாக ஐந்தாறுதரம் உழுது, களை, புல், வேர் இவைகளையெல்லாம் நீக்க வேர்வாரியால் இரண்டு தரம் வேலைசெய்து, பாம்புப்பலகையால் மேடுபள்ளத்தை நிரவி, 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள பாத்திகள் உண்டாக்கி, இரண்டு பாத்திகளின் வரிசைகளுக்கு நடுவே கண்ணிகள் ஏற்படுத்தி, வயல் முழுவதும் பாத்திகளும் கண்ணிகளுமாய் இருக்குமாபடி செய்யவேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 560 பாத்திகள் போடும் படி நேரிடும். ஜூன் மாதத்துக்கு முந்தி சகலவிதமான செய்நேர்த்திகளும் செய்துவிடவேண்டும்.

தகுந்த காலம் :—

ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் தான், முளைக்கிழங்குகள் ஊன்றத் தகுந்த காலம். கல்ல பெரிய கிழங்குகளிலிருந்து நடுமுளைகளையும், விரளிக் கிழங்குகளையும் எடுத்துப் பாத்திகளில் நடவேண்டும். ஒரு பெரிய கிழங்கில் சுமார் 5 அல்லது 6 விரளிக்கிழங்குகள் இருக்கும். பாத்தி 1க்கு சுமார் 60 விரளிக்கிழங்குகள் புதைக்கவேண்டும். முளைத்துக்கொஞ்சம் இலை விகிறவரையில் பயிர் வெயிலில் காய்த்துவிடாமலிருக்கும்படி இலைகளால் மூட்டம்போட்டு வைக்கவேண்டும்.

பாசனம் முதலியன :—

மழைகாலம் தவிர, பாக்கிகாலங்களில் வாரம் 1 முறைவீதம் சலம்பாய்ச்ச வேண்டும். களைகள் ஜாஸ்திபாய்க்காணும் போதெல்லாம் கையால் ஜாக்கிரதை யாய்க்கொத்திக்களைகளை நீக்கிவிடவேண்டும்.


வயசு அறுப்பு, கண்டுமுதல் முதலியன :—

இது சுமார் 6 மாதத்திய பயிர். ஜூன் மாதத்தில் புதைத்தால் டிசம்பர் மாதத்தில் இலைகள் பழுத்துகிழே விழுந்துவிடும். அப்போதுதான் கிழங்குகளை வெட்ட வேண்டும். கிழங்குகளை வெட்டி அசடுகளை நீக்கி, காய்ப்போட்டு சிழலில் ஜாக்கிரதையாய் வைக்கவேண்டும். முதல் வருஷத்தில் கிழங்கு வெட்டியானவுடன் இரண்டாவது வருஷம் ஜூன் மாதத்தில் வேறொரு பூமியில், அதே செய்நேர்த்தி, அதே உரத்தில், பாத்தி 1க்கு சுமார் 40 சிறு கருணைக்கிழங்குகள், புதைக்கப் படுகின்றன. கிழங்குகள் ஜனவரி மாதத்தில் அறுவடை செய்யப்படுகின்றன. முதல் வருஷத்து ஒரு கிழங்கைப்பார்க்கிலும் இது 4 பங்கு ஜாஸ்தி கனமுள்ள கிழங்காயிருக்கும். இதுவும் முன்பேரல ஜாக்கிரதையாய் சிழலில் பாதுகாத்து வைக்கப்படுகின்றது. மூன்றாம் வருஷத்து ஜூன் மாதத்தில் வேறு பூமியில் ஏகரா ஒன்றுக்கு 40 வண்டி உரத்தில் பாத்தி 1க்கு 15 கிழங்குகள் வீதம் புதைக்கவேண்டும். இதை அடுத்த ஜனவரியில் அறுவடை செய்யும்போது மூன்றாவது வருஷத்து கிழங்கு இரண்டாவது வருஷத்து கிழங்

கைப்பார்க்கிலும் சுமார் 4 பங்கு கனம் ஜாஸ்தியுள்ள தாயிருக்கும். அடுத்த ஜூனில் வேறு பூமியில் அதே மூன்றாவது வருஷத்துப் பயிருக்குள்ளுள் செய்கேர்த்தி யில் பெரிய கிழங்குகளை விலைக்கு வைத்துக்கொண்டு, சிறு கிழங்குனைப் பாத்திக்கு சுமார் 8 வீதம் புதைத் தவேண்டும். நாலாவது வருஷத்தில் பயிர் 4 அடி உயரம் வளர்ந்து பூமியை நிறல் படுத்தி, பார்வைக்கு நிரம்ப நன்றாயிருக்கும். இப்பயிருக்கு நடுவில் தழை எருவுக்காக சணலைப் பூமியில் பயிர் செய்யலாம். பாத்திகளின் கோடியில் பூசனி பரங்கி, சுரைக்காய் முதலிய பயிர்களைப் பயிர்செய்யலாம். பூசனி சுமார் 300 அல்லது 400 காய்களுக்கு குறையாமல் கிடைக் குர். சுரைக்காய் 1000 கிடைக்கலாம். 4வது வரு ஷத்துக்கிழங்கு 3-வது வருஷத்துக் கிழங்கைப்பார்க்கி லும் 4 பங்கு கனம் ஜாஸ்தியாயிருக்கும். அதாவது 1 சேனைக்கிழங்கு சுமார் 10 முதல் 20 பவுண்டுவரை யில் நிறையுள்ளதாயிருக்கும். அதாவது ஒரு ஏக்கர வுக்கு சுமார் 3000 சேனைக்கிழங்குகள் கிடைக்கும். இது சுமார் 15 டன் நிறையிருக்கும். இது சுமார் 1000 ரூபாய் விலையிருக்கும். நல்ல வெளிச்சமுள்ள அரையில் அடுக்கிவைத்திருந்தால் கெடாமல் வெகு நாள் வரையிலிருக்கும். நாலாவது வருஷத்தில் சாகு படிச் செலவு சுமார் 500 ரூபாய் ஆகலாம். இதிலும் சுமார் வருஷாவருஷம் சராசரியில் வருஷம் 1க்கு செலவெல்லாம்போக ரூபாய் 50 முதல் 100 வரையில்

கிடைக்கலாம். சில சேனைக்கிழங்குகள் 40 பவுண்டு நிறையுள்ளதாய்க்கூட இருக்கும்.

கருணைக்கிழங்கு சுமார் 6 மாதத்திய பயிர். ஜூ னில் கட்டால் டிசம்பர், ஜனவரியில் வெட்டலாம். ஏக்கர ஒன்றுக்கு விதைக்க 10, 15 மணங்கு விரளிக் கிழங்குகள் செல்லும். செய்கேர்த்தி யெல்லாம் சே னைக் கிழங்குகளுக் குள்ளதுபோலத் தான். ஏக்கர ஒன்றுக்கு சுமார் 300 மணங்கு கிழங்கு கண்டுமுதல் கிடைக்கும்.



மரவள்ளிக் கிழங்குப் பயிர்.

பயிரின் சுபாவம்:—

இதற்கு ஆள்வள்ளிக் கிழங்கென்றும், சுவாரிக்கட்டை என்றும் பெயருண்டு. இக்கிழங்கில் பச்சையில் ஒரு மகா விஷவஸ்து இருக்கிறது. வேகவைத்தால், விஷவஸ்து போய்விடும். இவ்விஷயம் தெரியாததினால் தான், ஏழைகள், பசியின்கொடுமையால் பச்சைக்கிழங்கைத் தின்று உயிர்மாண்டிருப்பது, அநேகருக்குத் தெரியும். ஆகையால் கிழங்கை வேகவைத்தே உண்ணவேண்டும். இதை ஒருகிழங்குவகைப் பயிராகவும், உணவுப்பயிராகவும், சாகுபடிசெய்யலாம். இது முக்கியமாய் ஏழைகளுக்கு உணவுக்கு உபயோகப்படுகிறது. இக்கிழங்கிலிருந்து உண்டாகும் டப்பாக்கீ அல்லது பீசின் வரிசி பணக்காரர்களுக்கு உணவாகிறது. இப்பயிரின் இலையை மாடுதின்னும். செடி, நிரம்ப அழகுள்ளதால், பூத்தோட்டங்களில், அழகுக்காகப் பயிர் செய்வது வழக்கம். இதை வேலிப்பயிராகவும் சாகுபடிசெய்யலாம். நமது இராஜதானியில் எங்கேயும் சாகுபடி செய்தபோதிலும், முக்கியமாக அனந்தசயனம், மலையாளம் பக்கங்களில் சாகுபடிசெய்வது ஜாஸ்தி. இதில் அநேக மாதிரி எரிருக்கின்றன.

தகுந்த பூமிகள்:—

நல்லவடிகால் வசதியுள்ள பொலபொலத்த மண்ணையுடைய மேட்டுக்கால் பூமி சிலாக்கியம். தோட்டக்கால், நல்லவளமுள்ள மணல், சாரி பூமியிலும் வரும்.

உம் :—

ஏகர் 1க்கு சுமார் 20 வண்டி சாணம், சாம்பல், குப்பை குறையாமல், ஒரு கொடுக்கவேண்டும்.

செய்நேர்த்தி :—

கோடை மழையில் பூமியை நன்றும் 5, 6 தரம் உழுது, உரமடித்து பரப்பி, சுத்தமாய் மேடு பள்ளம் நிரவி, வைத்திருக்க வேண்டும். பாத்திகள் கட்டி பாத்திகளில் சிறு முகடுகளும், படைச் சால்களும் போடவேண்டும். முகடுகள் சுமார் 3 அடி வித்தியா சத்திலிருக்கவேண்டும்.

தகுந்தகாலம், விதைப்பு, முதலியன :—

மலையாளப் பக்கத்தில் மார்ச்சு, ஏப்பிரல் மாதமும், கடலூர் முதல் திருநெல்வேலி வரையில், பதியன் தளை நட, சூலை, ஆகஸ்டும் தகுந்த காலம். இக்காலங்களில் 4 முதல் 8 அங்குலம் நீளமுள்ள கிளைகளை வெட்டி முகடுகளில் சுமார் 1½, 2 அடிவித்தியாசத்தில் சாய்வாய் நடவேண்டும். கட்டவுடன் பதியன்களின் உச்சியில் சிறுசாண உண்டையால் கீரீடம் சாத்த வேண்டும். சிலர் 2, 3 அடி நீளமுள்ள பதியன்களை கட்டால் சீக்கிரம் பயிர் உண்டாகுமென்று சொல்லுகிறார்கள். இப்பயிருக்கு நடுவில் முத்துச்சோளமும், மானவாரி நெல்லுகளும் சாகுபடி செய்யலாம். அல்லது உரத்துக்காக சணலைப் பயிர் செய்து பூமியில் மிதித்துவிடலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 20,000ம் பதியன்கள் செல்லும்.

பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன :—


மழை இல்லாத காலத்தில், வாரம் ஒருதரம் ஜலம் இறைக்க வேண்டும். அநேகவிடங்களில் ஜலம் இறைக்காமலே சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. பயிர் பூமியை நிழல் படுத்துகிற வரையில் கொத்தி, களைபிடுங்கவேண்டும். கிழல் உண்டாகி விட்டால் களைகள் ஜாஸ்தி இருக்காது. கொத்துமபோது மண் அணைத்து உரம் கொடுப்பது திறம்.

வயசு, அறுப்பு, களைமுதல், முதலியன :—

இது சுமார் 9, 10 மாதத்துப் பயிர். சிலமாதிகள் 6 மாதத்திலேயும், சிலது 18 மாதத்திலேயும், முதிர்கிறதாம். டிசம்பர், ஜனவரியில் தோட்டக்காவில் கட்டால் நவம்பரில் கிழங்கை வெட்டலாம். பாசனம் கொடுக்காத பூமியில் ஜூலை கடைசியிலாவது அல்லது ஆகஸ்டு முகனிலாவது கட்டால் பிப்ரவரி, மார்ச்சில் வெட்டலாம். ஏகர் 1க்கு சிலோனில் 10 டன் பச்சைக்கிழங்குகளும், இதை காயவைத்தால் 2½ டன் கிழங்குகளும் கிடைக்குமாம். இந்த 2½ டன் கிழங்கிலிருந்து சுமார் 2,800 பவுண்டு மாவு கிடைக்குமாம். சராசரி கண்டுமுதல் ஏகர் 1க்கு சுமார் 12,000 பவுண்டு பச்சைக் கிழங்காக வைத்துக் கொள்ளலாம். 18 மாதத்தில் வெட்டுகிற ஒரு கிழங்கு சுமார் 10 முதல் 25 பவுண்டு நிறை இருக்கிறதாம்.

கைத்தொழில் (டப்பாக்கி அரிசி செய்யும்விதம்) :—

பச்சைக் கிழங்குகளை வெட்டி சுத்தப்படுத்தி, ஜலத்தில் கழுவி, ஒரு தொட்டி ஜலத்தில் சுமார் 6 மணி நேரம் போட்டு வைத்திருக்க வேண்டும். போட்டு வைத்தால், கையால் மேல்தோலை, சுலுபமாக உரித்துவிடலாம். பிற்பாடு திருகுபலகையால் சுறண்டி, தூள்களைப்பிழிந்தால், பால் உண்டாகும். அந்தப்பாலை 8 மணி நேரம் ஒரு சிறுதொட்டியில் வைத்திருந்தால், மாவு, கீழேபடிந்துவிடும். பிற்பாடு தெளிவுஜலத்தைக் கொட்டிவிட்டு, மாவை ஒரு தட்டியில் போட்டு 2, 3 மணி சாவகாசம் வெய்யிலில் காயவைக்க வேண்டும். பிற்பாடு குடுள்ள தட்டுகளில்போட்டு, கிளறவேண்டும். இப்படிக்கிளறினால் மாவெல்லாம் சிறு உண்டை உண்டையாய் சேர்ந்து விலைக்குத் தயாராகிவிடும். 1 பவுண்டு டப்பாக்கி அரிசி 4 அணு விலை. கிழங்கின் ரசத்திலிருந்து ஒருவித சாராயம் காய்ச்சலாம்.



மரவள்ளிக் கிழங்கு.

சேப்பங் கிழங்கு.

:0:



சேப்பங்கிழங்குப் பயிர்.

பயிர் கபாவம்:—

இதற்குச் சாமைக் கிழங்கு என்றும் பெயருண்டு. இதை ஒரு கிழங்குவகைப் பயிராகவும், கரிகாய்ப் பயிராகவும் சாகுபடிசெய்யலாம். இதின் இலை, கிழங்கு, தண்டு, முதலியன சமையல் செய்வதற்கு முன்னால், மிகவும் காலாயிருக்கும். இதில் அநேக தினுககள் உண்டு; வயல்கரைகளில் சில இடங்களில் சேம்பு, சாகுபடியன்னியில் காடாய் வளர்த்திருப்பது ஒரு தினுக. நீர்ச்சேம்பு ஒரு தினுக. இதை அநேகமாய்த் தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. கொல்லைகளிலும், கிணற்றோரங்களிலேயும் கரிகாய்க்காக சாகுபடி செய்யப்படும். தோட்டக்காவில் அநேகமாய் இதர பயிர்களோடு கலந்துதான் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது ஜாஸ்தி விஸ்தீரணத்தில் இதை அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை.

தகுந்த பூரிகள்:—

கைப்புள்ள பூமியில் நன்றாய் வரும். சாகக்கடைக்கும்பிமண்ணில் வெகு நன்றாய் வரும். தோட்டக்கால் பூமிகளில் நன்றாய் வரும்.

செய் நேர்த்தி:—

இது தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்பட்டால், பூமியை 5 அல்லது 6 தாம் நன்றாய் உழுது, சுத்தப்படுத்தி மேடுபள்ளம் 8 அடி, 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள பாத்திகள் உண்டாக்கி, பாத்திகளில் 40 செடி வீதம்

பயிர்செய்யவேண்டும். பூமியை நன்றாய் உரப்படுத்த வேண்டும்.

தகுந்தகாலம், விதைப்பு, முதலியன.—


ஜூன், ஜூலை விதைக்கத் தகுந்தகாலம். பாத்ரி 1க்கு 2 விதை விதைக்கிழங்கு செல்லும். விதைக்கிழங்கைப் பாத்ரியில் கிழங்குக்காகப் பயிர் செய்தால், 1. அடி வித்தியாசத்தில் புதைக்கவேண்டும். சேப்பந்தண்டு, இலைக்காகச் சாகுபடிசெய்தால், துளிர்களை நீக்கவேண்டியதில்லை. கிழங்குக்காக சாகுபடி செய்தால் வேர்விடுவதற்கு முந்தி துளிர்களை நீக்கிவிட வேண்டும். இதற்கு வாரம் ஒருமுறை வேண்டிய போது ஜலமும், அவசியமானபோதெல்லாம் கொத்தி, களைபிடுங்கி, உரம் அணைப்பது திறம்.

வயக, அறுப்பு, கண்டிழை, முதலியன:—

இது சுமார் 10 மாதத்திய பயிர். விதை புதைத்து 4, 5 மாதத்துக்கெல்லாம் இலைகளையும் தண்டுகளையும் மூன்று அல்லது நான்கு நாளைக் கொருதரம் பறிக்கலாம். இளந்தண்டுகளையும் இலைகளையும் பறிக்கும் போது, பூமியின் மட்டத்துக்குப் பறிக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு செடியிலும் சில முதிர்ந்த இலைகளை வைத்திருக்கவேண்டும். ஏகர் ஒன்றுக்கு சுமார் 1,000 மணங்கு கிழங்கு கிடைக்கும். இது சுமார் ரூபாய் 200 விலை.

சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு.

—:0:—



சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்குப் பயிர்.

பயிர் சுபாலம்:—

இதை ஒருகிழங்குப் பயிராகவும், உணவுப் பயிராகவும், சாகுபடி செய்யலாம். கிழங்கை கரிகாய்க்கும் பிரயோசனப்படுத்தலாம். இதில் சிகப்பு வள்ளிக்கிழங்கென்றும், வெள்ளை வள்ளிக்கிழங்கென்றும் 2 தினுகு உண்டு. சிகப்பில் அதிக கொடிகள் இருக்கும். அதிக ருசியாயிருக்கும். வெள்ளை வள்ளியில், கண்டுமுதலதிகம். சிகப்பில் கண்டுமுதல் கம்மி. இதை ஒரு தோட்டக்கால் பயிராகவும், மாரிகாலப்பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம்.

தகுந்த பூமிகள்:—

நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள மணல் கலந்த வண்டல், களி, செவ்வல், கரிசல், முதலிய பூமிகள் திறம். எந்த தோட்டக்கால் பூமியிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம். மணல் பூமியிலேயும் சாகுபடி செய்யலாம். ஆனால் உரம் ஜாஸ்தியாய் கொடுக்கவேண்டும். களைகள் ஜாஸ்தியுள்ள பூமியிலேயும், சாகுபடி செய்யலாம். செய்தால் பயிர் சுமாராய் வருவதுடன் கொடிகள் படர்ந்து களைகளைத் தொலைத்துவிடும்.

தகுந்த உரம்:—

ஏகர் 1க்கு 30 வண்டிக்கு குறையாமல் உரம்கொடுக்கவேண்டும். இதற்கு 10 உப்பு ஜாஸ்தியிரியமானதால் சாம்பல் உரமே ஜாஸ்தியாக அடிக்கவேண்டும். சுமார் 15 வண்டி சாணமும், 15 வண்டி சாம்பலும் அடிப்பது திறம். பசுந்தழை உரத்துக்காக ஏதாவது ஒரு

பயிர் முன்சாகுபடி செய்திருந்தால், அதைப் பூமியில் உழுது மடிக்கச்செய்தாலும் நல்ல உரமாகும்.

செய் நேர்த்தி:—

ஜூலை, ஆகஸ்ட்டில் 6 தாத்துக்குக் குறையாமல் உழுது, வேர்வாரியால் 2, 3 தடவைவேலைசெய்து, பூமியை சுத்தம்செய்து, மேடு பள்ளம் நிரவி, செப்டம்பரில் 30 வண்டி உரம்கொடுத்து, மறுபடி உழுது, பாத்திகள் கட்டியாவது அல்லது முகடுகள் போட்டாவது, கொடிகளை நடவேண்டும். பாத்திகள் போடும்பீச்சத்தில் சுமார் 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமிருக்கவேண்டும். முகடுகள் போட்டால் அவைகள் சுமார் 2 அடி வித்தியாசத்திலிருக்கவேண்டும். பாத்திகள் சாகுபடியைப் பார்க்கிலும் முகடுகள் சாகுபடிதான் சிலாக்கியமாம். நாற்றுங்கால்:—

மாகுல் எடுக்கும் சமயத்தில் நல்ல முதிர்ந்த கொடிகளை அறுத்து 3 கணுக்களையுடைய பதியின்களாக நறுக்கி, 2 கணுக்கள் 2, 3 அங்குல ஆழத்தில் பூமியில் புதைக்கப்பட்டு, பாக்கி ஒருகணு வெளியில் இருக்கவேண்டும். சாதாரணமாய் நாற்றங்கால் ஜலவசதிக்கு சமீபத்தில் இருப்பது திறம். பூமியின் கீழிலுள்ள 2 கணுக்கள் வேர் விட்டி, மேல்காற்று நாளில் கொடிகள் செழுமையாக வளர்ந்து ஒடி இருக்கும். இவைகளிலிருந்துதான் பதியன் களைநறுக்கி, தயார்செய்திருக்கிற பூமிகளில் ஊன்றவேண்டும். நல்லபதியன்கள், கொடிச் தண்டின் நடுபாகத்திலிருந்து எடுக்கப்படும்.

வோர்ப்பக்கம் இருக்கப் பட்டவைகளையும், புதிதாய் கொடிவிடும் இளமையான பாகங்களையும், பதியன் களுக்காக எடுக்கப்படுகிறதில்லை. பதியன்களை நறுக் கும் போது கணுக்களிலுள்ள சில்லரை வேர்களை அரிந்து விடவேண்டும்.

தகுந்தகாலம், விதைப்பு, முதலியன :—

அக்டோபர், நவம்பர்மாதம்தான் பதியன்களை வயல் பாத்திகளிலாவது அல்லது முகடுகளிலாவது நடத் தகுந்தகாலம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 6 ரூபாய் பதியன்கள் செல்லும். பாத்திகளில் 1½ அடிவித்தியாசத்திலுள்ள வரிசைகளில் 1 அடிவித்தியாசத்தில் நடப்படுகின்றன. முகடுகளில் 1 அடி இடைவெளியில் பதியன்கள் நடப் படுகின்றன. 12 அடி நீளம் 6 அடி அகலமுள்ள ஒரு பாத்தியில் சுமார் 100 பதியன்கள் நடும்படியா யிருக்கும். 16 முதல் 24 அங்குலம் நீளமுள்ள பதியன்களை கட்டால் சிறுபதியன்களைப் பார்க்கிலும் ஜாஸ்தி வரும்படி கொடுக்கிறதாக தெரியவருகிறது. ஏகர் 1க்கு சுமார் 20,000 பதியன்கள் செல்லும். சிலர் 10,000 பதியன்கள் போது மென்கிறார்கள்.

பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன :—

முகட்டுச்சாகுபடியில் பாசனம் சிலாக்கியம். பாத்தி களில் அவ்வளவு சிலாக்கியமல்ல. ஏனெனில் முகடு களில் செட்டான பாசனம் ஏற்படுவ தல்லாமல், பயிர்தரும் சிலசமயம் அதிகஜலத்தால் கெடுகிறதில்லை. மழை ஜில்லாத காலத்தில் சுமார் 10 நாளைக்கு ஒரு

தண்ணீர் இறைத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். பயிர் பூமியை நிழல் படுத்துகிற வரையில் களை எடுக்க வேண்டும்; பிற்பாடு, வேண்டியதில்லை. பயிர் வளர்கிற சமயத்தில், கொடிகள் ஓடி நன்றாய் இருந்தால், அடிக்கடி கொடிகளை, பூமியின் பேரில் தூக்கி விட்டு, கண்ட இடங்களிலெல்லாம் வேர்விடாமலிருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். இப்படிச் செய்யாதபட்சத்தில், பாசனத்தி னால் ஒவ்வொரு கணுக்களிலும் வேர் ஓடி கிழங்கு நிரம்ப சிறுத்துப்போய்விடும். கல்லவிலே சிடைக்காது. பயிர் பஞ்சையாயிருந்தால் இப்படிச் செய்யவேண்டிய தில்லை. கொடித்தண்டுகளை தூக்கிவிடும்போது இலை சுருளும் தண்டுகளும் சேதப்படாமல் ஜாக்கிரதையாக தூக்கிவிடவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் முக்கிய வேர்களிலுண்டாகும் கிழங்குகள் பெருந்து, கல்ல விலேபோகும். பயிர் காடாய் வளர்த்திருந்தால், துனிக் கொடிகளை அரிந்து மாட்டுக்குப் போட்டுவிடலாம்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :—


இது சுமார் 5 மாதத்துப்பயிர். அக்டோபர், நவம் பரில் கட்டால் மார்ச்சு, ஏப்பிரலில் வெட்டலாம். சூன், சூலையில் கட்டால் டிசம்பர், ஜனவரியில் வெட்டலாம். அநேக இலைகள் பழுத்து உதிர்ந்தாலும்கூட, அல்லது கணுக்களிடத்தில் நிரம்ப கெட்டியாய் நார் நாராயிருந் தாலும்கூட, அல்லது ஒரு கிழங்கை வெட்டிகத்தியால் அறுத்துக் கறுப்பு நிறம் அடையாவிட்டாலும்கூட, பயிர் முதிர்ந்துவிட்டதாக எண்ணலாம். கொடிகளை

எல்லாம் பூமியோடு அறுத்து அடுத்த பயிருக்காக நாற்றங்காலுக்கு எல்லா பதிகளை எடுத்துவைத்துக் கொண்டு, பாக்கியை மாட்டுக்குப் போட்டுவிடலாம். கிழங்கை மண்வெட்டியினாலாவது அல்லது கூந்தாலியினாலாவது வெட்டலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 4 டன் கிழங்கு கிடைக்கும். ஜாஸ்தி கண்டுமுதல் 6 டன் கூட கிடைக்கலாம். 6 டன் கிழங்கு சுமார் ரூபாய் 300 விலை. சாதாரணமாய் மொத்தவருமானம் ரூபாய் 200 கிடைக்கலாம். ஏகர் 1க்கு செலவு சுமார் ரூபாய் 140ம், மொத்த வரும்படி சுமார் ரூபாய் 200ம், செலவு எல்லாம்போத ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 50 கிடைக்கலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 6,000 பவுண்டு கொடிகள் கிடைக்கும்.

கைத்தொழில் :—

இது பஞ்சகாலத்துக்கு உணவாகிறது. இதின் இளம் இலைகளை கரியாக சமைக்கலாம். கிழங்கிலிருந்து ஒருவிதமாவு உண்டாக்கலாம். இதை மாடுகள் நன்றாய்த் தின்னும்.

உருவளக் கிழங்கு.



உருவளக்கிழங்குப் பயிர்.

பயிர் சுபாவம் :—

இது மலைப்பிரதேசங்களில் தான் சாகுபடி ஜாஸ்தி. சமஸ்தானங்களில் அவ்வளவு நன்றாய் வராது. கோட்டக் காவில் எங்கும் சிறுபான்மை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதில் வெள்ளையும், கொஞ்சம் மஞ்சள் வர்ணமுள்ள மாதிரியும் நிரம்பத் திறமாம். இதை ஒரு கிழங்குப்பிராகவும், உணவுப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். ஜரிஷ் (Irish) ஜாதிபார்களுக்கு இது முக்கிய உணவு. இது ஒரு மாரிகால்த் தோட்டக்கால் பயிர். இது எப்போதும் தனிமையில்தான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மது இராஜதானியில் நீலகிரி, பழனி, பெங்களூர், உதகமண்டலம் முதலிய இடங்களில் ஏராளமாய் பயிரிடப்படுகின்றது. ஒரே வருஷத்தில் சில இடங்களில் 3 போகமும், சில இடங்களில் 2 போகமும் சாகுபடி செய்கிறார்கள்.

தகுந்த பூமிகள் :—

கல்லவடிதால் வசதியுள்ள பொலபொலத்த மண்ணையுடைய பூமி திறம். நிரம்ப உரமேற்றப்பட்ட மணல் சாரியும் திறம். தோட்டக்கால் கரிசனிலும் செவ்வளிலும் வரும்.

செய் நேர்த்தி :—

ஜூன்மாதம் முதல் செப்டெம்பர் மாதம் வரையில் அடிக்கடி சமயம் நேர்த்தி போதெல்லாம் 6 உழவுக்குக்குறையாமல் உழுது வேர்வாரியால் வேலைசெய்து, சுத்தப்படுத்தி, ஏகரா ஒன்றுக்கு 30 வண்டிக்குக்குறை

யாமல் மடித்த சாணம் அடித்து, பரப்பி, மறுபடியும் உழுது பூமியை எருவுடன் கலந்து, தூவாளியாக்கி, 2 அடி வித்தியாசத்தில் முகடுகள் போட்டு, கண்ணிகளும் ஏற்படுத்தி, இப்படி நல்ல செய்கேர்த்தியுடன் பூமி இருக்கவேண்டும். உருளைக்கிழங்குக்கு மர உப்பு பிரியமானதால் சாம்பலும் பொட்டிலுப்பு மண்ணும் சாணத்தோடு கலந்து அடிப்பது திறம்.

தகுந்தகாலம், விதைப்பு, முதலியன :—

அக்டோபர், நவம்பர்மாதத்திலும், ஜூன், ஜூலைமீனும், விதைக்கிழங்குகளை ஊன்றலாம். முதல்போகம் ஜூன், ஜூலைமீனும் 2ஆம் போகம், அக்டோபர், நவம்பரிலும். விதைக்கத்தகுந்தகாலம். முகடுகளில் ஒன்றையடி வித்தியாசத்தில், கிழங்குகளையாவது அல்லது கண்முளைகளையாவது புதைக்கவேண்டும். மட்டமான பாத்திகளிலும் ஊன்றலாம். விதைக்கு நடுத்தரமான கிழங்கு திறம். ஏகரா ஒன்றுக்குச் சுமார் 1,200 பவுண்டு கிழங்குகளிலிருந்து கண்முளைகளை வெட்டியாவது அல்லது சுமார் 1500 பவுண்டு முழுக்கிழங்குகளையாவது புதைக்கலாம். கண்முளைகளில் சிறிய பலவீனமான கிழங்குகளும், மற்றதில் பெரிதான கிழங்குகளும் உண்டாகிறதாம். ஆகையால் கண்முளைகளைப்பார்க்கிலும் முழுக்கிழங்குகளை விதைக்க சிலாக் கியமாம். பாத்திகள் சாகுபடியைப் பார்க்கிலும் முகடுகள் சாகுபடியே திறம். பாத்திகளில் கண்முளைகள் 9அங்குல வித்தியாசத்தில் போடப்படுகின்றன. விதை

க்கிழங்கு, முழுதாய் நடுப்பட்டத்தில், $1\frac{1}{2}$ அங்குலம் முதல் $1\frac{1}{2}$ அங்குலம் சுற்றளவுள்ளதாயிருக்கவேண்டும். பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல் :—

வாரத்துக்கு 1 முறை விதம் ஜலம்பாய்ச்சவேண்டும். விதைத்து 1 வாரத்துக்குள் முளைகண்டெனும். ஆன்று வாரத்துக் கொரு தரம் களையெடுக்கவேண்டும். ஆக மொத்தம் இரண்டு கொத்தலும், 2 மண்ணைப்பூசும் திறம். மண்ணைக்கும்போது சாம்பலும் பொட்டிலுப்பு மண்ணும் உரமனைப்பது திறம். மொத்தம் சுமார் 10 தடவை ஜலம் பாய்ச்சும்படியா யிருக்கும்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுழதல், முதலியன :—

இது சுமார் 4 மாதத்துப் பயிர். அக்டோபரில் விதைமைய ஊன்றினால் மார்ச்சில் கிழங்குகவெட்டலாம். பயிர் வாடி பழுப்பாய்ப்போனதுதான் பயிர் முதிர்ந்ததற்கு அடையாளம். கிழங்கு வெட்டுவதற்கு 2 வாரத்திற்கு முந்தியே இறவையை நிறுத்திவிட வேண்டும். ஏகரா ஒன்றுக்கு சுமார் 12,000 பவுண்டு கிழங்கு கிடைக்கும். சிலசமயம் 18,000 பவுண்டு வரையில்கூட கிடைக்கலாம். 1 ரூபாய்க்கு 60 பவுண்டு விதம் ஏகராவுக்கு மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் 200. சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 130 போனாலும் ஏகரா ஒன்றுக்கு செலவெல்லாம்போக சுமார் ரூபாய் 70 கிடைக்கும். கிழங்குகளைப் பெரிதாகவும், நடுத்தரமாகவும், சிறிதாகவும், ஆன்றுவிதமாகப் பிரித்து,

நல்ல வெளிச்சமுள்ள அரையில் அடுக்கி வைக்க வேண்டும்.

கைத்தொழில் :—

இதிலிருந்து ஒருவிதமான மாவம், சாராயமும் உண்டாக்கலாம்.



கரும்புப்பயிர்.

பயிரின் சுபாவம்:—

இது சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்களில் ஒன்று. இது நிலத்தை சிரம்ப சளைக்கப்படுகின்றும். ஆகையால் ஒரேயூழியில் அதிக ஒரு அன்னியில் சாகுபடி செய்யக்கூடாது. இது ஒரு தோட்டங்கால் பயிர். இதில் ரஸ்தாளி என்றும், நாயக்கரும்பென்றும், செங்கரும்பென்றும், நாணல் கரும்பென்றும், பூவன் கரும்பென்றும் அநேகவகைகள் உண்டு.

மாதிரிகள்:—

கரும்பில் அநேக தினுசுகள் இருந்தபோதிலும், எல்லாவற்றையும் இரண்டு பெரிய பிரிவுக்குள்ளடக்கி விடலாம். அதாவது:—

“(a) அடிக்கடி ஏராளமான பாசனத்தை அபேகித்திறதாயும், சுற்றளவு பெரிதாயும், சாறு ஜாஸ்தி கொடுக்கக்கூடியதாயும், சுலபமாய்க் கடிக்கக்கூடியதாயும் உள்ளவைகள் ஒருவர்க்கம்.

(b) பாசனம் கம்மியாயும் அடிக்கடி அபேகை இல்லாமலும், மெலிதாயும், கடிக்க மிகவும் கெட்டியாயும், சாறு குறைச்சலாய் முள்ளவைகள் மற்றொரு வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த தினுசுகள்.” கரும்பிலுள்ள எல்லா மாதிரிகளும் இந்த இரண்டு வர்க்கத்தின் சுபாவங்களை ஏற்றத்தாழ்வுடன் உடையனவாயிருக்கும்.

தருத்தபூமிகள்:—

பொலபொலத்த மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியிலும், வளமுள்ள படுகை நிலங்களிலும் வரும்.

நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள மேட்டுப்பூமியாய் இருக்க வேண்டும். நான்கு பக்கமும் நெல்வயலால் சூழ்ந்த பள்ளத்தாக்கு நஞ்சை கூடாது. சுக்கான் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியிலும் வரும். சுமார் 10 மாதம் பாசனக்குறைவில்லாத பூமியாயிருக்கவேண்டும். மேட்டுக்கால் நஞ்சையிலும் வரும். நல்லவடிகால் வசதியுள்ள பாசனத்துக்குக் குறைவில்லாத மேட்டுக்காலான மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியே சர்வதிலாக் கியம்.

தகுந்த உரம்:—

ஏகர் 1க்கு 30 டன் மடித்த கொட்டில் ஒருவாவது அல்லது 60 வண்டி. மலமாவது உரமாகக் கொடுக்க வேண்டும். இது கிடைக்காவிட்டால் பிண்ணுக்கு உரங்களையும் அடிக்கலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 5 டன் கொட்டைப் பிண்ணுக்கையாவது அல்லது வேறுபிண்ணுக்கையாவது உரமாகக் கொடுக்கலாம். கரும்பு கொழுந்தாடை, சக்கை, சரகு முதலியவைகளை, குழிகள் வெட்டி, அவைகளில் போட்டு இன்னும் மற்றக் கூளங்குப்பைகளையும் சேர்த்து, மண்ணை வெட்டி மூடி, மக்கும்படிசெய்து, ஏகர் 1க்கு 30 வண்டிக்குக் குறையாமல் பிண்ணுக்கு உரத்துடன் அடிப்பதும் திறம். கூளம், கொழுந்தாடை முதலியவைகளை ஜாக்கிரதையாய்ச் சேர்த்து ஒருவாக்கினால், ஒருவில் அதிகசெலவு நேரிடாது. ஆட்டுக்கடை, மாட்டுக்கடை, வைக்கலாம். பசுந்தழை உரமாக சணல் முத

லிய பயிர்களை பூமியில் உண்டாக்கி மிதித்துக் கரும்பை வளப்படுத்தலாம். மீன் உரமும் கொடுக்கலாம்.

சேய் நேர்த்தி:—

கோடைமழையில் செளகிரியப்பட்டபோதெல்லாம் பூமியை உழுது நல்ல துவானியாய் வைத்திருக்க வேண்டும். சுமார் 10 ஆழ உழவுக்குக் கம்மிப்படக் கூடாது. எட்டுக்கலப்பை அதிக ஆழம் போகாததினால், கடப்பாறையால் பூமியைப் பிரித்து, கொத்தி வாங்குவது திறம். இக்கடப்பாறைக் கொத்தலுக்கு ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 10க்குக் குறையாமல் செலவாகுமாம். ஆழ்ந்த உழவுக்கு நீமைக் கலப்பையையே உபயோகிப்பது திறம். நன்றாய் உழுத பிற்பாடி கூளை, புல், வேர் முதலியவைகளை நீக்க வேர்வாரியால் வேலைசெய்து, கட்டிகளை உடைத்து மேடு பள்ளம் சிரவி, ஒரு ஏராளமாக அடித்து, பாப்பி, பூமிகளில் மூன்றடிக் கொருதாம், எங்கும் இரண்டடி அகலம், ஓரடி ஆழமுள்ள குழிகளை உண்டாக்கிப் பதியன்களை நடலாம். அல்லது மூன்றடி வித்தியாசத்தில் ஒருஅடி ஆழம் ஒருஅடி அகலமுள்ள கிடங்குகளை வெட்டியாவது பதியன்களைப் புதைக்கலாம். பூமி வளமாயிருக்கும் பட்சத்தில், கிடங்குகள் 4 அடி வித்தியாசத்தில் இருந்தால் போதும். முகடுகளும், படைச்சால்களும் ஏற்படுத்தி, முகடுகளிலும் சாகுபடிசெய்யலாம். முகடுகள் சுமார் 2 அடி வித்தியாசத்திலிருக்கலாம்.

தகுந்த காலம், விதைப்பு, முதலியன:—

கரும்பு சாகுபடிக்கு நமது இராஜதானியில் இரண்டுகொல முண்டு. ஒன்று பிப்ரவரி மார்ச்சிலும், இன்னொன்று ஜூன் ஜூலியிலும்; ஜூன்மாதமே. மிகவும் மேலானது; எனினில் பிப்பாடு 7, 8 மாதத்துக்கு ஜலக்குறைவே ஏற்படாது. கரும்பை, கொழுந்தாடையாலும் பதியன்களாலும், காற்று களிஞலும் முதல் வருஷத்து அடிக்கட்டையிலிருந்தும் உண்டாக்கலாம். பதியன்களால் உண்டாக்குவதுதான் சிலாக்கியம். கொழுந்தாடையைப் பார்க்கிலும் பதியன்களினு லுண்டாக்குவது நல்ல லாபம் கொடுக்கிறதாம். முதல் வருஷத்து அடிக்கட்டையிலிருந்து உண்டாகும் பயிருக்குச் சாகுபடிச் செலவெல்லாம் குறைவாயிருந்த போதிலும், வரும்படியில் பதியன்களைப் பார்க்கிலும் சம்மிதானும். பதியன்களைக் குழிகளிலாவது அல்லது கிடங்குகளிலாவது அல்லது முகடுகளிலாவது நடவேண்டும். குழிகளில் 2 பதியன்கள் விழுக்காடும், கிடங்குகளில் மூன்று நாலடி வித்தியாசத்தில் 2 பதியன்கள் விதமும் அடியில் புதைக்கவேண்டும். முகடுகளில் கிரம்பகிட்ட நடப்படுவதால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 20,000 பதியன்கள் நடுகிறார்கள். சிலசமயம் ஜாஸ்தி பதியன்களும் நடப்படுகின்றனவாம். இப்படி ஜாஸ்தியாகப் பதியன்களை நடடால் கரும்புகள் ஒங்கி வளர்ந்து கீழே விழுந்து வெவ்லம் ஜாஸ்தி காணுதாம். ஆகையால் மூன்றடி

வித்தியாசத்தில் ஓரடி ஆழமுள்ள குழிகளில் அல்லது கிடங்குகளில் இரண்டு பதியன்கள் விதம் நடுவதே மிகவும் நல்லது. இப்படித்தான் மொரிசில் (Mauritius) நடுகிறார்களாம். இந்த மொரிஸ் மாதிரியில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 13,000 பதியன்கள் செல்லுமாம். இந்தமாதிரி சாகுபடியின் விசேஷம் யாதெனில், “சர்க்கரை கண்டுமுதல் ஜாஸ்தி கொடுப்பதோடும் கூட, இன்னும் அநேக கன்மைகள் இருக்கின்றன. அதாவது சுமார் 7,000 பதியன்கள் லாபமாகும். பயிர் கலக்க இருப்பதால் காற்று மழையால் பயிர் கீழேவிழாது. பயிர் கீழேவிழாமலிருந்தால் வெவ்லம் ஜாஸ்தி காணும்.” பதியன்களுக்கு நல்ல பழுத்த கழிகளாக இருக்கவேண்டும். பதியன்கள் நடுவில் ஒருகணுவையும் இரண்டுகோடிகளிலும் கணுவொடு ஆக மூன்று கணுக்களையுடையனவா யிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு கணுவிலும் ஒன்று அல்லது 2 கண் முளைகள் இருக்கும். பதியன்களைப் பூமியில் செங்குத்தாய் நடாமல், மட்டமாய் புதைப்பார்கள். பதியன்களை சுமமாவாவது அல்லது சாணஜவததில் மூன்று நான்குநாள் போட்டுவைத்தாவது பிப்பாடு நடுகிறார்கள். கொழுந்தாடிகள் செங்குத்தில் சாய்வாய் நடப்படுகிறதாம். சிலவிடங்களில் பதியன்களை காற்றங்காவில் நட்பு முளைகண்டவுடன் பிடுங்கி வயல்களில் நடப்படுகின்றனவாம். சிலவிடங்களில் முதல்வருஷத்துப் பயிரின் அடிக்கட்டையிலிருந்து இரண்டாவது வருஷத்துப் பயிர் உண்டாக்குகிறார்கள்.

பாசனம்:—

பதியன்கள் நடுகிறதற்கு சுற்றுமுற்றியாவது, அல்லது கட்டவுடனேயாவது ஜலம் பாய்ச்சவேண்டும். பாசனம் பண்ணி நாள்கழிந்து நடுவது சுத்த பிசுரு. சுமார் பதியன்களை நட்டு உடனே ஜலம் பாய்ச்சுவதே சர்வ சிலாக்கியம். முளைத் தண்ணீருக்குப் பிற்பாடு முதல் இரண்டு வாரத்தில் வாரத்துக்கு 2 தடவை விதமும் பிறகு பயிர் முதிர்ச்சி வரையில் வாரம் ஒருதரம் வீதம் ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். மொத்தம் இப்படிச் சுமார் 40 இறவையாகும். கிணற்றுப் பாசனத்தில் மட்டாயும் கால்வாயில் ஜூஸ்தியாயும் ஜலம், இறைக்கப் படுகிறது. வேண்டிய அளவும் செட்டான பாசனமே கல்லது.

கொத்தல், களைபிடுங்கல், உரமணைத்தல், முதலியன:—

பயிரை நெருக்க நடாமல் மோரீஸி (Maritius)ல் அனுஷ்டிக்கும் மாதிரி கட்டால் கொத்தல், களைபிடுங்கல் நன்றாய் நடக்கும். ஏனெனில் கொத்தின இடங்களில் காலடிவைக்காமலும் பயிரை சேதப்படுத்தாமலும் வேலைசெய்யலாம். 15, 20 நாளில் முளைகண்டு, பதியன்கள் சுமார் 3 வாரத்தில் துளிர்விட ஆரம்பிக்கும். அப்போது ஒருகொத்தலும், கொட்டைப் பிண்ணுக்கு உரமணைத்தலும் திறம். பிண்ணுக்குக்கு, காட்டுச்செக்கு பிண்ணுக்கே திறம். சீமை அச்சுப் பிண்ணுக்கு நிரம்ப கெட்டியா யிருக்குமாதலால், அவ்வளவு கல்லதல்லவாம். பிற்பாடு, மாதம் 1 கொத்தல் வீதம் சுமார்

3, 4 கொத்தலுக்குக் குறையாமல் கொத்தி ஒவ்வொரு தடவையிலும் சிறுசுச்சிறுசு பிண்ணுக்கு உரம் அணைத்துவருவது சர்வசிலாக்கியம். கொட்டைப்பிண்ணுக்கு, உரமாவதுடன் கறையானையும் தொலைக்கும். 6 மாதத்துக்குள் கொத்தல் எல்லாம் முடிந்து விடவேண்டும். உரமணைத்தவுடன் பாசனம் பண்ணவேண்டும். பயிர் 5, 6 அடி உயர மிருக்கையில் பூமி கொஞ்சம் இளகலாக இருக்கால் பெருங்காற்றினால் பயிர், கீழே சாயும். இதைத் தடுக்கும் பொருட்டு மூங்கில் சாரங்கள் கட்டி பயிர்களுக்கு ஊன்றுகோலாக்குவார்கள். மோரீஸ் (Mauritius) மாதிரி கட்டால், பயிர்கள் கொத்துக்கொத்தாய் வளர்ந்து இவ்வளவு அதிகமாய்க் கீழேவிழாது. அதில் ஊன்றுகோல் முதலிய செலவு அதிகம் வேண்டுவதில்லை. அநேகம் கழிகளை ஒன்றோடொன்று சேர்த்து கீழேவிழாமல் தட்டலாம். அகத்தி, கொட்டை முதலியவைகளை தெளித்து வைத்திருந்தால், பிற்பாடு ஊன்றுகோலாக உபயோகப்படும். பயிர்களின் சரகுகளை நீக்கியாவது அல்லது கரி உபத்திரவமிருந்தால் சரகுகளை கழிகளில் சுத்தியாவது கட்டவேண்டும்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுமுதல், முதலியன:—

இது சுமார் 1 வருஷத்துப் பயிர். சிலமாதிரிகள் 8, 9, 10 மாதங்களிலும் முதிர்கின்றன. சிலசமயம் 4, 5 வருஷம் பயிர் அடிக்கட்டையின்றி உண்டாக்கப் படுகின்றது. அடிக்கட்டைப் பயிருக்கு, பூமிக்கு 1 அல்லது 2 அங்குலமேல், பயிரை வெட்டவேண்டும்.

இல்லாவிடில் பயிரை அடியோடு வெட்டியாவது அல்லது பிடுங்கியாவது விடவேண்டும். காலையில் பணி இருக்கும்போது வெட்டவேண்டும். இல்லாவிடில் வெயிலில் தழைகள் சுணைகளினால் உடம்பைக் கீறும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 30, 35 டன் கழிகள் கிடைக்கும். இந்த 30, 35 டன் கழிகளிலிருந்தும் சுமார் 200, 300 மணங்கு வெல்லம் கிடைக்கும். ஒரு மணங்கு ரூபாய் 1½ ஆக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 250 முதல் 375 வரையில் லாபம் கிடைக்கலாம். ஏகர் 1க்கு சாகு படிச்செலவு சுமார் 150 ரூபாயும் மொத்தவருமானம் சுமார் ரூபாய் 300ம் வைத்துக்கொண்டால் செலவெல்லாம் போக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 150 மிஞ்சும். சராசரியில் ரூபாய் 100க்கு கம்மிப்படாது. மேற் சொல்லி யிருக்கிறபடி ஒரு ஜாஸ்தியாய்க்கொடுத்து நல்ல செய்கேர்த்தியுடன் ஜாக்கிரதையாய்ச் சாகுபடி செய்தால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 500 ரூபாய் கூட லாபம் கிடைக்கலாம்.

கைத்தொழில் :—

கரும்பிலிருந்து வெல்லம், பழுப்புச்சர்க்கரை, ஜீனி, கற்கண்டு, சாராயம் முதலியவைகள் உண்டாக்கலாம். சாகு முதலியவைகளை நீக்கி, சுத்தப்படுத்தி, கழிகளை கட்டாகக்கட்டி, ஆலையிருக்குமிடம் கொண்டுபோய், இரும்பாலையில் துண்டு துண்டாய் வெட்டிக்கொடுத்து, சாறு உண்டாக்கி, அதிக ஆழமில்லாத சட்டியில் காய்ச்சி, பாகாய்ப்போய்ப் பக்குவ மடைந்தவுடன்,

அச்சுகளில்போட்டோ, அல்லது போடாமலோ வெல்லம் விலைக்குத் தயாராகின்றது. மர ஆலைகளைப்பார்க்கினும் இரும்பு ஆலைகளில் அதிக சாறு கிடைக்கும். சாற்றில் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு ஜலத்தைக் கலந்து கொதிப்பிக்கவேண்டும். இப்படி கொதிக்கையில் மேலேவரும் கட்டிகளை எல்லாம் அரித்து நீக்கிவிடவேண்டும். பாகுண்டாகும்வரையில் கொதிப்பித்துப் பிறகு அச்சிலேயோ அல்லது உண்டையாகவோ அல்லது பூமிக்குள் பாயோடுபோட்டு புதைத்தோ, வைக்கப்படுகின்றது. வெல்லம் கெட்டியா யிருக்க வேண்டும். பாகாய் ஒடிப்போகாமல் கெட்டியாய் இருக்கும்படி தயார் செய்வதில் முக்கியகவனமிருக்கவேண்டும்.

சர்க்கரை செய்யும் விதம் :—

இதற்கு வெல்லத்துக்குக் காய்ச்சுவதைப் பார்க்கிலும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாய்க் காய்ச்சி, ஒரு ஆழமில்லாத பாத்திரத்தில் போட்டு குளுமைப்படுத்தி, கட்டைகளால் தேய்த்து தூள் தூளாய் உண்டாக குகிறார்கள். இதற்கு வெல்லத்தூள் அல்லது பழுப்பு வெல்லச் சர்க்கரை என்று பெயர். அநேகமாய் வெல்லப்பாகை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அநேக நாள் வைத்திருந்தால் சர்க்கரைச் செதில்கள் கீழேபடியும். இப்படி படிக்கசர்க்கரைக்குப் பழுப்புச் சர்க்கரை என்றும் பெயர். இந்தப்பழுப்புச் சர்க்கரையில் அசுத்தம் கொஞ்சம் இருப்பதால் அவைகளை ஜலத்தில் கரைத்து, முட்டை வெள்ளைக்கருவுடன் கொதிப்

176 சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்.

தால் அசுத்தங்க ளெல்லாம் திரண்டு கீழ்ப்படிந்து விடும். பிறகு பழுப்பு நிறத்தை நீக்க எலும்புக்கரி யில் பாகுஜலத்தை ஊற்றுவார்கள். பிறகு நன்றாய் காய்ச்சப்பட்டால் வெள்ளைச்சர்க்கரைச் செதில்க ளாக கீழேபடியும். இச்செதில்களை அடிக்கடி கிளரூவி ட்டால், கற்கண்டுகளாகத் தங்கிவிடும். செதில்கள் கீழேபடியாமல் பாக்கிலிருக்கும் பாதிவிருந்து சாராயங் கள் இறுக்கப்படுகின்றன. சர்க்கரைகாய்ச்கவதில் கொ திக்கும்போது அடிக்கடி அசுத்தங்களை நீக்கி, ஒரேதன் மையான குட்டுடன் கொதிப்பிக்கவேண்டும். ஜான்சு திகொடுத்தாலும் அல்லது மட்டான திகொடுத்தாலும், வெல்லம் கறுத்துப் போகும். கொதிக்கிற பாகை, அதாவது தூக்கி தூக்கி குமிழிகள் விடுகிற பாகை, கொஞ்சமெடுத்து குளிர்ந்த ஜலத்தில்போட்டு அது உடனே கெட்டிப்பட்டுவிட்டால் காய்ச்கவதை நிறு த்தி பாகைக் கீழே இறக்கிவிடவேண்டும். துறுபங்கு கழிகளுக்கு சுமார் 50 பங்குமுதல் 80 பங்குவரையில் சாறும், 8 பங்குமுதல் 20 பங்குவரையில் வெல்லமும் கிடைக்குமாம். கோயமுத்தூர் ரஸ்த்தாளியில் சுமார் 100க்கு 19 பங்குவரையில் வெல்லம் கிடைக்கிறதாம். ஒருபொதி வெல்லம் காய்ச்ச சுமார் ரூபாய் 2 செலவு பிடிக்கும். அல்லது பயிரை அறுத்து 600 பவுண்டு வெல்லமாகக் சுமார் ரூபாய் 5 செலவு பிடிக்கும்.

பயிர்.

இதை ஒரு பழவகைப் பயிராகவும், கார்கொடுக்கும் பயிராகவும், சர்க்கரைகொடுக்கும் பயிராகவும் கொள் ளலாம். இது அநேகமாய் வயல்கரை ஓரங்களில் காணப்படுகிறது. கஞ்சை வயல்கரைகளிலும், புஞ் சைகளிலும், வடிகஷ்டமாய்க் காணலாம். நல்ல நெற் றுப்பழங்களைக் கையால் இறக்கி பாத்திகளில் மழை காலத்து ஆரம்பத்தில் புதைத்தால், குளிர்கால ஆரம் பத்தில் குறுத்துகள் காணும். இக்குறுத்துகளை கறி காயாக வேகவைத்து சில இடங்களில் சாப்பிடுவது வழக்கம். குறுத்துகளைக் கறிகாய்க்குப் பிடுங்காமலும், ஆடுமாடு மேயாமலும் ஐக்கிரதையாகப் பார்த்துக் கொண்டால் மரங்களாகிவிடும். பனை சமுத்திரக்காற் றுக்குச் சமீபமாயுள்ள மணல்காரியில் நன்றாய் வரும். இதை வேனிக்காகவும், காற்றின்வேகத்தைத் தடுப்பதற் காகவும், மணல்காற்றைத் தடுப்பதற்காகவும், சாகுபடி செய்யலாம். இது அதிக செலவென்னியில், சீக்கிரத்தில் நன்றாய்வளருகிற பயிர். பிள்ளையைப் பிடுங்கி, ரட்டா லும் நடலாம். இல்லாவிட்டால் ஒரேயடியாய் வளர விட்டாலும் விடலாம். இது கரிசலிலும், கப்பிக்கல் பூமியிலும், நன்றாய்வளருகிறது. நீர் சுவறின காற்றுள்ள சீகோஷ்ணம் இதற்குத் தேவை. பிப்ரவரியில் பூத்து ஜூனில்பழுத்து நெற்குள் கீழே உதிருகின்றன. இப் படி உதிர்வதால் நெற்குள் தானாகவே சில இடத்தில்

முளைத்துப் பயிராகின்றன. இதற்கு உரம், கொத்தல் முதலிய செப்பேற்றங்கள் சரிவரசெய்யும் பட்சத்தில் நல்ல பலனைக்கொடுப்பதில் தடை இல்லை. பனை இருந்தாலும் 1,000 வருஷம், இறந்தாலும் 1,000 வருஷம் என்பது பழமொழி. 15 முதல் 30 வருஷத்துக்குள்ளாக காய்க்க ஆரம்பிக்கும். அப்போது முதல்தான் கள்ளுகட்ட ஆரம்பிப்பார்கள். ஒருமரத்தில் ஒருகாளைக்கு 6 முதல் 16 பயிண்டுவரையில் பதனி கிடைக்கும். இத்தப்பதனியை சுண்ணாம்பு தடவின கலயத்தில் இறக்குவார்கள். சுண்ணாம்பு தடவாத கலயத்தில் வைத்திருந்தால் கள்ளுகிளிடும். தென்னை பேரீச்சப் பதனியைப் பார்க்கிலும், பனைப்பதனியில் ஜாஸ்தி சர்க்கரை இருக்கிறது. பனம் பதனி குடித்ததுபோக, ஏராள மரம் மிஞ்சுகிறபடியால் அதிலிருந்து சர்க்கரை இறக்கப்படுகிறது. ஆண் பனையில், பெண்பனையில் கிடைப்பதில் 3 திட்டம்தான் பதனி கிடைக்கும். பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பம் முதல், அக்டோபர் ஆரம்பம் வரையில் பதனி கொடுக்கும். 3 குவார்ட்டி பதனியிலிருந்து 1 பவுண்டு வெல்லம் கிடைக்கும். பனை மரத்தை இப்படி பதனி கட்ட 50 வருஷம்வரையில் உபயோகப்படுத்தலாம். ஆனால் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் கள்ளுகட்டிவதை நிறுத்தி காய்க்கவிடவேண்டும். பனையில் ஆண் பனை, பெண் பனை, என்று இரண்டு வகைகள் உண்டு. ஆண் பனை கள்ளுகட்ட மாத்திரமும், பெண் பனையை கள்ளுகட்டவும், காய்க்கவும், குடிகள் விடிகிறார்கள். ஒவ்வொரு மரத்திற்கும்

25 முதல் 45 பச்சை மட்டைகளிருக்கும். இதில் வருஷாவருஷம் 12 மட்டைகள் வெட்டிவிடுவது வழக்கம். அருங்கோடை காலமாகாததில் பனையின் பச்சை ஓலைகள் மாட்டுக்குத் தீவனமாகிறது. இளம்பிள்ளை ஆணிலே நுனியையும் குவந்தையும் கரிகாயர்களும், ஊறுகாய்போட்டும் சாப்பிடலாம். பனை மட்டையிலிருந்து கார் உண்டாகக்கலாம். மட்டையை மரத்திலிருந்து எடுத்து அடிமட்டையை கொட்டாப்பிடியா வடித்து கார் எடுக்கிறார்கள். நண்ணீரில் ஊறவைத்தும் அடித்து கார் எடுக்கலாம். கார் எடுப்பதற்கு 12, 15 அடி உயர்முள்ள இளமரத்தின் மட்டைதிறம். குலை வைக்க ஜாஸ்தி காலம் பிடிக்கும். ஆனாலும் அதாவது சுமார் 15 வருஷத்துக்கு குறைவாதபோதிலும், கார் எடுக்க மட்டைகளை 5, 6 வயது மரத்திலிருந்து வெட்டலாம். பாம்பனில் 112 பவுண்டு கார் சூராய் 10 வீலை. ஒரு மரத்திலிருந்து வருஷம் ஒன்றுக்கு சுமார் 10 மட்டை கிடைக்கும். இந்த 10 மட்டையின் அடி மட்டையிலிருந்து ஒருளளில் சுமார் 1 பவுண்டு கார் எடுக்கலாம். ஒரு பவுண்டு கார் சுமார் அரை 2½ வீலை. இந்த காரிலிருந்து பலநிலைகள் கயிறுகளும் பண்ணலாம். இன்னும் சுமார் 2 அடி நீளமிருக்கும். இது கிரம்ப பலமாகவும் கம்பிபோலவுமிருப்பதால் போஷ் துடைப்பம் பண்ணலாம். ஓலைகள் கூடாபோடுவதற்கும், விறகாக்கும் பிரயோசனப் படுகின்றன. ஓலைகளிலிருந்து அகேகவித விசிறிகளும், கூடைகளும், இறை கூடைகளும் பண்ணலாம். மரம், உத்திரம், கை

மரம், ஏற்றச்சால், கபிலை இறவை வேலைகளுக்காகவும், வாய்க்காலாகவும், பிரயோசனப்படுகின்றது. ஒலைகளிலிருந்து கடிதாகும் செய்யலாம். பனங்காயின் மட்டையிலிருந்தும் கார் எடுக்கலாம். பனையிலேவர் முதல் ஒலைவரையில் பிரயோசனப் படாதது ஒன்றுமில்லை. ஒலையை மழைக் குடையாகவும், பாயாகவும் செய்யலாம்.

இளம் பிள்ளையை கற்காய்க்காக சாகுபடி செய்தல்:—

கற்காய்க்காக சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் ஜூன் ஜூலையில் முதிர்ந்த நெற்களைப் பொறுக்கி முந்தியார் செய்திருக்கப்பட்ட நாற்றங்காலில் ஊன்ற வேண்டும். கட்டு 4 மாதத்துக் கெல்லாம் கற்காய்க்கு பிரயோசனப்படுகிறது. நாற்றங்கால் 5 சென்டி அல்லது 10 சென்டி விஸ்திரணத்துக்கு மேல் இராது. ஒரு சதுரகஜத்தில் 50 நெற்கள்கள் நடப்படுகின்றன. இந்த அன்பது நெற்றிலிருந்தும் 100 இளம் ஆணியேர்களுக்கு மேல் கிடைக்கும். இந்த ஆணியேர் 9 முதல் 12 அங்குலம் கீளமாகவும் சுமார் 1 அங்குலம் சுற்றளவு உள்ளதாகவு மிருக்கும். இதற்கு கல்லவளமான மணல் சம்பந்தமுள்ள கரிமண் பூமிதிறமாம். 1 அணுவுக்கு 16 குறுத்து விலைக்கு கிடைக்குமாம். இக்கற்காய் சாகுபடியில் ஏகர் 1க்கு மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபாய் 1500 பம்பாய் இராஜதானியில் கிடைப்பதாக Mr. மாரிசன் சொல்லுகிறார். கற்காய்க்காக

சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் சுமார் 10 செண்டு சொல்ப விஸ்திரணத்தில்தான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதில் கல்ல வரும்படி வருவதால் நமது இராஜதானியில் இச்சாகுபடியை விரித்தி பண்ணுவது நன்மையுக்கும். இதன் குறுத்துகளையும், ஆணியேர் நுணியையும், ஏழை ஜனங்கள்தான் கற்காயாக சாப்பிடுகிறார்களாம்.


சச்ச மரம்.



சச்ச மரம்.


இதை ஒரு பழவகைப்பிரகவும், சர்க்கரைகொடுக்கும் பிரகவும் கொள்ளலாம். இதில் ஆண் சர்க்கை, பெண் சர்க்கை என்று இரண்டுவிதமாக உண்டு. இதின் வயதை உயர்த்திவிடுத்து அநியஸாசனம் பொழிய பனை முதலியவைகளுக்கு அநியஸாசனம் மோதிரவீனயங்கு களிஞல் வயதை அநியஸாசனம். இதற்கு மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண்பூமிதான் திறம். இதை விதை, யினாலும், பிள்ளைகளினாலும் விரித்தபண்ணலாம். மரம் 15 வயதுமுதல் 25 வயதுக்குள்ளாகத் தான் கள்ளுக் கட்டுகிற வழக்கம். நல்ல பூமியில் விளக்காக 40 வருஷத்துக்கெல்லாம் மரம் சளைத்துப்போய்விடுகிறதாம். பதனியைக் காய்ச்சினால், வெல்லம் உண்டாகக்கலாம். இலைவிடுத்து பாய் பின்புலாம். இதன் பழமும் சர்ப்பிட உபயோகப்படுகிறது.

பேரிச்சங் குலை



பேரிச்சங் குலை.

பேரிச்சை ஈச்ச ஜாதியைச் சொந்தபோதிலும் கூட அது நமது இராஜகாணியில் இல்லை. ஆகையால் அதின் சாகுபடி எடுத்து எழுதப்படவில்லை. பேரிச்சை சாகுபடி நல்ல லாபங்கொடுக்கக் கூடியதாக தெரியவருகிறது.



வாழை மாம்.

பயிரின் சுபாவம்:—

இது ஒரு பழவகைப் பயிர். இது உஷ்ண தேசத் திற்குரிய பயிர். குளிர்ந்த சிதோஷ்ண தேசத்தில் காய், காய்க்காது. இதில் கிழங்கு, தண்டு, பட்டை, இலை, பூ, காய் முதலிய சகல பதார்த்தங்களும், பிரயோஜனப்படுகின்றன. ஒன்றாவது விணுகிறதில்லை. ஆகையால் பழவகைப் பயிருக்குள் இது மூல முக்கியமானது. இதில் மொத்தன், ரஸ்தாளி, பேயன், பூவன், செவ்வாழை, பச்சைவாழை, மலைவாழை, கடைட்டை வாழை முதலிய அநேகவகைகள் உண்டு. சிலவகை பாசன மன்னியில் வானமாரியில் உண்டாகும்.

தகுந்த பூய்கள்:—

நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள மேட்டுப்பாங்கான களி மண் நிலத்திலும், படுகை நிலங்களிலும், கன்றாய் வரும். சலவசதியுள்ள செவ்வல் நிலங்களில் வளரும். மணற் சாரியிருந்தால், அதிக உரமும், தண்ணீரும் வேண்டும். ஜலம் வசதியுள்ள சுக்கான் சப்பந்தமான களி நிலம் நிரம்ப திறம். ஏனெனில் சுண்ணாம்பு பழத்திற்கு ஒருவித வாசனையும் ருசியையும் கொடுக்கிறது.

செய் நேர்த்தி:—

வாழையை நட இரண்டு மாதத்திற்குமுந்தி பூயியை 8-தரம் உழவேண்டுமாம். உழுது புல, களை முதலியவைகளை நீக்கி 8 அடிக்கு ஒரு தரம் குழிகள்

உண்டாக்கி, கன்றுகள் புதைக்கப்படும். அல்லது வாழைக் கொல்லையை மண்வெட்டியால் ஆழவெட்டி வாங்கி, கிரவி வடிகாலுக்காக கிடங்குகள் வெட்டி சுமார் 8 அடிக் கொருதரம் கன்றுகள் புதைக்கப்படும். தகுந்தகாலம், விதைப்புழதலியன் :—

வாழையை ஆடி அதாவது சூலை, அல்லது மார்ச்சு அதாவது ஜனவரியில் புதைக்கத் தகுந்த காலம். புதைப்பதற்கு முன்னால் ஆற்றுவண்டில் படியாதநிலங்களுக்கு ஏகர் 1க்கு 30 வண்டிக்குக் குறையாமல் ஒரு இடவேண்டும். புதைத்தவுடன் ஆட்டுக்கிடைவைத்தாலும் வைக்கலாம். ஏகர் 1க்கு சுமார் 700 கன்றுகள் புதைக்கவேண்டும். கன்றுகளை உடனே பிடிங்கி கட்டாலும் கட்டலாம். அல்லது 1 மாதம்வரையில் சேதப்படுத்தாமல் வைத்திருந்து கட்டாலும் கட்டலாம். புதைத்தவுடன் கன்றைச் சுற்றிலும் உலக்கையால் இடித்து கெட்டிப்படுத்திவார்கள். பிறகு தோட்டத்தை வேலியாலடைத்து பங்கோபஸ்து பண்ணுவார்கள்.

பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல், முதலியன:—

புதைத்து 3 வாரத்திற்குப் பிற்பாடு வாரம் இரண்டு முறை வீதம் ஜலம் பாய்ச்சப்படும். முதல் வருஷத்தில் அதமபசும் மாதம் இரண்டு தாத்திற்குக் குறையாமல் ஜலம் பாய்ச்சிவர வேண்டும். முதல் வருஷம் பாசனத்திற்கு இளங்கால், பாசனமென்று பெயர். இரண்டாவது 3 வது வருஷத்தில், மாதம் ஒரு தரம் பாசனம் கொடுத்தால் போதும். இவைகளுக்கு முதிர்

கால பாசனமென்று பெயர். சிலவகைகள் பாசனமெனியில் உண்டாகும். அவை ஆற்றோற்றங்களில் படுகையிலிருக்கும் வாழைகள். பாசனமெனியில் ஊற்றத்தினாலேயே வரலாம். வாழைக்கு மொத்தம் 100 தண்ணீரென்று சொல்லுவார்கள். கன்றுகள் புதைத்து 3 மாதத்திற்கெல்லாம் கொத்தி, களைபிடுங்கி, வாழைக்கு மண் அனைத்து உரமேற்றலாம். முதல் கொத்தில்தான் செலவு ஜாஸ்திபிடிக்கும். பிறகு மூன்றுமாதத்திற்கு ஒருதரம் கொத்தி உரம் அனைத்துவரவேண்டும். கோல்கிடங்கு ஒருவும், ஆட்டுப்புழுக்கையும், கொள்ளுசிஇலை யும், பிண்ணுக்கும் உரமாக அனைக்கப் படுகின்றன. ஆதமொத்தம் முதல் வருஷத்தில் 4 கொத்தலுக்குக் குறையாமல் 6 கொத்தலுக்கு மேற்படாமல் கொத்திவரவேண்டும். 2வது, 3வது வருஷங்களில் வருஷம் 1க்கு இரண்டு கொத்து வீதம் கொத்தி வரவேண்டும். தாய்மரம் பூண்டுமேவரையில் பக்கத்து கன்றுகளில் ஒன்றைவிட்டு பாக்கியெல்லாம் தலையரிப்பிடும். தாய்மரத்தில் காய் வெட்கிறவரையில் இலை அறுக்கக்கூடாது. வயசு, காய்வெட்டுதல், கண்டுழதல், முதலியன:—

வாழை ஒருவருஷத்துப் பயிர். புதைத்து 3வது மாதத்தில் பூக்க ஆரம்பித்து, ஒருவருஷத்திற்கெல்லாம் சூலைகள் முதிர்ந்துவிடும். அப்போது, அதாவது புதைத்து 13 வது மாதத்தில் சூலைகள் வெட்டப்படும். இப்படி ஒரு வருஷத்திற்குள் சூலைகள் வெட்டப்பட்டாலும், வாழை சாதாரணமாய் மூன்றுவருஷம் நின்ற


கிலையில் நிற்கும். சிலசமயம் 4, 5 வருஷம்வரையில் கூட விளையவில்லை. வைத்திருப்பார்களாம். 12வது மாதம் முதல் 30வது மாதம்வரையில் காய்களை வெட்டிக் கொண்டு வரவார்கள். மொத்தம் ஒரு வாழைக்கு ஒரு குலைவிதம் கிடைக்கும். சராசரியில் ஒரு மாதத்தினின்று ஒன்று வருஷத்திற்கு 1 ரூபாய் முதல் 1 1/2 ரூபாய் வரை காய்களும் இலைகளும் கிடைக்கும். தாய்மாமம், கன்றுகள் எல்லாம் செர்த்துதான் இவ்வரும்படி கிடைக்கும். சராசரி வருஷம் வருஷம் ஒரு ஏக்கரில் 300 முதல் 600 தார் வரையில். அதாவது சுமார் 40,000 காய்களாக வெட்டலாம். இதன் விலை சுமார் 100 ரூபாய்க்குக் குறையாது. இலையில் சுமார் 3 வருஷத்திலும் 100 ரூபாய்க்குக் குறைபாமல் கிடைக்கும். ஆகையால் வருஷம் வருஷம் செவவு எல்லாம் போக, வாழையில் ஒரு ஏக்கருக்கு 15 ரூபாய்க்குக் குறைபாமல் கிடைக்கும்.

கைத்தொழில்:—

வாழையிலிருந்து கார் எடுக்கலாம். இந்த நாராக் கொண்டு கயிறு பண்ணலாம். இந்த வாழை கார் கயிறு பவுண்டு 1க்கு ஐந்து அல்லது விலை. நாரிலிருந்து நேர்த்தியான துணிகளும் சால்வைகளும் பண்ணலாம். கார் எடுக்கிறதாயிருந்தால் பூக்கிறதற்கு முந்தி மாத்னைத் வெட்டிவிடவேண்டும். நீர்ப்போக்கில் பட்டைகளை எடுத்து 3 அங்குலத் துண்டுகளாய்க் கிழித்து ஒரு சுறண்டியால் சுறண்டி, கார் கிழிக்கப்படுகிறது.

இந்த நாரைக்கழுவி காயவைத்து கொட்டாப்பிடியால் அடித்து மிருதுவாக்குவார்கள். மட்டைகளை ஐலத்தில் ஊர்ப்போட்டும் கொட்டாப்பிடியால் அடித்தும் நார் உண்டாக்கலாம். ஒரு ஏக்கராவுக்கு 600 பவுண்டு சுத்தம்செய்த நார்கிடைக்குமாம். லண்டன் நகரத்தில் 1 டன் கார் 150 ரூபாய் விலை போகிறதாம். கார் எடுக்கிறதற்கு கொட்டைவாழைதான் திறம். இதற்கு மானில்லா வாழையென்றும் சொல்லுவதுண்டு. இந்த வாழைகாரின் அசடு கசடுகளிலிருந்து ஒருவித கடிதமும் செய்கிறார்களாம். வாழைக்காயிலிருந்து ஒருவித மாவு உண்டாக்கலாம். உள்சதையை எடுத்து விசையை நீக்கி காயப்போட்டு உரலில் இடித்து வாச்சல்லடையால் சலித்தால் மாவு உண்டாகும்.

மா.



மல்கோவா மாம்பழம்.

பயிரின் கபாலம் :—

இந்தப் பழவகைப் பயிரில், பழங்களின் குணங்கள் நிரம்ப வித்தியாசப்படுகின்றன. சில மிகவும் ருசியாயிருக்கும். ஆனால் முக்காலே மூன்றுவிதம் வாசி பழங்கள் மிகுந்த நாருள்ளனவாயும், ஒருவிதத் தைலவாசனையுள்ளனவாயுமிருக்கின்றன. ஆகையால் மாந்தோப்பு உண்டாக்குவதில், கிளை ஒட்டுவைத்து உயர்ந்த தினுசான பழங்களை உண்டாக்குவதில் நிரம்ப கவனம் வைக்கவேண்டும். ரயிலுக்குச் சமீபத்தில் மாந்தோப்பு வைத்தால் லாபம் நன்றாய் வரும்.

முக்கிய மாதிரிகள் :—

மல்கோவா, இது ஒரு ஒட்டு ஜாதி. இது பெங்களூர், வடஆர்க்காடு, சேலம் முதலிய விடங்களில் முக்கியமாய்ப் பயிரிடப்படுகின்றது. சதை, நாரன்னியிலும் நிரம்ப ருசியாயுமிருக்கும். மங்கல் வெளுப்பாயும், மஞ்சளாயுமிருக்கும். இது நிரம்ப பெரிது. பட்டணத்தில் 100 பழம் எட்டுமுதல் பத்து ரூபாய் வரையில் விலை போகிறது.

கோவா, இது மல்கோவாவைப்போல் நிரம்ப ருசியாயிருந்தபோதிலும் கூட, ஆகிருதியில் நிரம்ப சிறிது. இதற்கு வடஆர்க்காட்டில் காதப்பகத்து என்றும், சேலத்தில் துண்டே என்றும் பெயர்.

பீற்றி, முன் இரண்டு மாதிரியைப்போல அவ்வளவு ருசியாய் இல்லாவிட்டாலும், நிரம்பவாசனையை உடை

த்தாயிருக்கிறது. இது எல்லாவற்றையும்விட நிரம்ப மலிவு. இது 3 ஆம் ஒட்டு தினுசுகள் தான்.

கதந்த பூமிகள்:—

நல்லவடிசால் வசதியுள்ள பாதி களி, பாதி மணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண்பூமியில் நன்றாய்வரும். ஆனால் கீழ்ப்படை மண்ணில், கூழாங்கல்லுகளும், கப்பிக்கல் லுகளும் இருந்தால் நிரம்பதிறம். செவ்வலிலும் வரும். செய்நேர்த்தி, உரம், கன்றுகள் முதலியன:—

பூமியை நன்றாய் உழுது 30 அடிக்கு ஒரு தரம் 3 அடி நீளம் 3 அடி அகலம் 3 அடி ஆழம் உள்ள குழிகள் உண்டாக்கி மண்ணை ஆறப்போட்டுவிட வேண்டியது. காற்றில் நீர்சுவறின உஷணமான இடங்களிலும், நல்லவளமான பொலபொலத்த களிமண் பூமியிலும், குழிகள் 40 அடிக்கு ஒரு குழிவிதம் இருக்கலாம். குழி வெட்டுகையில், மேல் மண்ணை, ஒரு பக்கத்திலும், அடி மண்ணை ஒரு பக்கத்திலும், போட்டு வைக்கவேண்டும். ஒரு குழிக்கு 50 பவுண்டு பொடி செய்த எலும்பை குழியின் அடியில் போட்டு, சுற்றி வரக்குழியைச் சுறண்டி, அந்த மண்ணால் மூடி, காற்றாடப்போட்டிருக்கிற மேல்மண்ணை ஒரு கூடை மடித் தசாணத்துடன் கலந்து, அந்த எலும்பு மூடி இருக்கிற மண்ணின் மேல் போட்டுவிட வேண்டும். இதில் கம்பிக்கை உள்ள இடங்களிலிருந்து நல்ல ஒட்டு ஜாதி கன்றுகளை வரவழைத்து வைத்து அந்தக் கன்றுகளை அடிமண் வேருடன் மொத்தையாய்ப் புதைக்க

வேண்டும். இப்படிப் புதைத்துப் பாக்கி இருக்கிற மண்ணையும் குழியில்போட்டு நிரப்பிவிடவேண்டியது. கன்றுகள் சுமார் 18 மாதமானவுடன் ஒட்டுகட்டி வைத்து பிறகு சுமார் 2½, 3 வருஷத்தில் பூமியில் நட வேண்டும். இப்படி 30 அடிக்கு ஒருதரம் நட்டால், ஏக்கர் 1க்கு 50 கன்றுகள் செல்லும். 40 அடிக்கு ஒரு தரம் நட்டால் ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 30, 35 கன்றுகள் நடலாம். ஆகையால் ஒரு ஏக்கரில் மாந்தோப்பு உண்டாக்க 30 முதல் 50 கன்றுகளை புதைத்து மாங்கள் உண்டாக்கலாம். கன்றுகள் இளமையாயிருக்கையில் 4 மாதத்துக்கு ஒரு தரம் 40 பவுண்டு காய்ந்த சிறு மீன் களையாவது, பிண்ணாக்கையாவது கொத்தும் மண்ணுடன் கலந்து உரமாக அணைக்கவேண்டும். கன்றுகளை மழை காலத்தில் நடுவது திறம்.

கொத்தல், களைபிடுங்கல், இடையில் பயிருண்டாக்குதல் முதலியன.—

கன்று புதைக்கது முதல் 3, 4 வருஷங்களில் இடைவெளியில் நிலக்கடலை, சேழ்வரகு, அவுரி, சோளம், அஞ்செடி முதலிய பயிர்கள் உண்டாக்கி லாபம் அடையலாம். இப்படிப் பயிர் செய்தால் பூமி பொலபொலத்திருக்கும். இப்படிப்பயிர் செய்யாதவரையில் வருஷா வருஷம் கொத்தி, மாங்கன்றுகளுக்கு உரம் அணைத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். சுமார் 5 வருஷத்தில் பூக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போது முதல் 4 வருஷத்துக்கு பூமலர்களை எல்லாம் ஒடித்துக்கொண்டு வரவே

ண்டும். வருஷாவருஷம் முதிர்ந்த கொழுப்புள்ள மரத்தின் கிளைகளைக் கபாத்துச் செய்யவேண்டும். அதாவது கிளைகளை ரம்பத்தால் நறுக்கவேண்டும். பெரிய மாமரத்துக்குத் தழையாய்ப்போய் மதத்துப் போகாமலிருப்பதற்காகவும், நிரம்பப் பூ மொட்டுவிட்டு காய் உண்டாவதற்காகவும் வருஷாவருஷம் மழைக்காலக் கடைசியில் சுமார் 10 பவுண்டு உப்பை சிலவிடங்களில் உரமாக கொடுக்கிறார்களாம். போர்துவழிமுந்த மரங்களில் புழுக்களிருந்தால் தாரை ஊற்றி வெளிப்படுத்தி நாசப்படுத்தி விடவேண்டும். மரத்தில் புல்லுருவி இருந்தால் அதாவது வேறுபூயிர்கள் கிளைவிட்டிருந்தால் அணுகளைக்கி அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

இது 50 முதல் 80 அங்குலம் மழை பெய்யும் இடங்களில் நன்றாய் வளரும்; பாக்கி இடங்களில் பாசனம் கொடுக்கவேண்டும். இளங் கன்றுகளுக்கு நட்டவுடன் வேரூன்றுகிற வரையில் தினம் அல்லது இரண்டுதினத்திற்கு ஒருதரம் தண்ணீர் பாய்ச்சி வரவேண்டும். பிறகு முதல் 1 வருஷத்திற்கு மழை இல்லாத காலத்தில் வாரம் 1 முறையும், 2வது, 3வது வருஷங்களில் 2 வாரத்திற்கு ஒருமுறையும் தண்ணீர் பாய்ச்சி வரவேண்டும். பிறகு மாதம் ஒருமுறை வீதம் தண்ணீர் பாய்ச்சுதல் நல்லது.

வயசு, கண்டுழதல் முதலியன :—

மாமரத்துக்கு சுமார் 100 வயசு சொல்லலாம். சுமார் 10, 12வது வயசு முதல் நன்றாய்க் காய்க்க ஆரம்பிக்

கும். சிலசமயம் நல்ல பூமியாயிருந்தால் இதற்கு முந்தியும் காய்க்கலாம். சுமார் 10, 12 வயதுள்ள ஒரு மரத்திலிருந்து சராசரியில் 2 முதல் 5 ரூபாய் வரையில் கிடைக்கலாம்; அதாவது சுமார் 1000 பழம். உயர்ந்த ஜாதிமரங்களில் மரம் 1க்கு சுமார் 50 ரூபாய்முதல் 100 ரூபாய்வரை சிலவிடங்களில் வருவதாகத் தெரிகிறது. இதன் வரும்படி போட்ட முகலுக்கு வருஷத்துக்கு 100க்கு, 24க்கு குறையாமல் வட்டி கிடைக்கும். வரும்படியெல்லாம் கன்றுகள் நட்டு 6 வருஷத்துக்குப் பிற்பாடுதான். அதற்கு முந்தி சில்லரைப் பயிர்களை உண்டாக்கி லாபம் சம்பாதித்து தோப்புக்குச் செலவு செய்துகொண்டு வரவேண்டும்.



கிச்சிலி மரம்.

பயிர் கபாவம்:—

இந்தப் பழவகைப் பயிர் வறட்சியான இடங்களில் நன்றாய் வளரும். பள்ளத்தாக்கான ஹில்லாக்களில் நல்ல பழங்களைக் கொடுக்காது. சமுத்திரக்கரையிலிருந்து 2,000 அடி உயரத்துக்குள்ளாக, உஷ்ணமும் நீர் சுவறின சீதோஷ்ணமுள்ள இடங்களில் நல்ல கிச்சிலிப்பழம் கிடைக்கின்றது. கிச்சிலி என்றாய் வேரூன்று கிறபடியால், சாதாரண காற்றுள்ள இடங்களில் கெடுதல் உண்டாகாது ஆனால் அதிக பெருங்காற்றுள்ள இடங்களில், பழவரும்படியில் கம்மி ஏற்படுகிறது. ஆகையால் அப்பேர்ப்பட்ட இடங்களில் பொதுவாகவே, எல்லாப் பழவகைத் தோட்டங்களுக்கும் சுற்றிவர வேளியாக அதிக நிழல்கொடுக்கக் கூடாதவையும் அடர்த்தியாயில்லாதவையுமான மரங்களை உண்டாக்குவதுதான். மாதிரிகள்:—

சர்க்கரை நார்த்தை என்றும், கசப்பு நார்த்தை என்றும், புளிப்பு நார்த்தை என்றும் அநேக மாதிரிகள் இருக்கின்றன. சிலவகையில் தோல் கெட்டியாயும், சிலவற்றில் இணக்கமானதாய் மிருக்கும். எலுமிச்சை, பொம்பளிஸ், கிடாரை, கொளிரஞ்சி முதலியவைகள் கிச்சிலிவகையைச் சேர்ந்தவைகள் தான்.

தகுந்த பூமிகள்:—

கிச்சிலித்தோட்டம் நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள மேட்டு பூமியாயிருப்பதுடன், மேற்படைமண் நிரம்ப ஆழமுள்ளதா மிருக்கவேண்டும். வளமான களிசம்பந்த

முள்ள மணல்காரி திறம். பூமியின் கீழ், கீழ்ப்படை மண் நிரம்ப கெட்டியுள்ளதாய் இருக்கக்கூடாது. அக் கான் சம்பந்தமுள்ள படுகைமண் சர்வ சிலாக்கியம். உரப்பான களிநிலம் திறமல்ல.

கிச்சிலி வகைகளை விரித்தியாக்குதல்.

A. நாற்றங்கால்:—

பிலாக்கொட்டை, நாகக்கொட்டையைப்போல கிச்சிலி விதைகள் பழத்திலிருந்து எடுத்தவுடன் காய்ந்து விட்டால் அவைகளின் விரியம் போய்விடுமாம். ஆகையால் பழத்திலிருந்து எடுத்தவுடனேயே காய்ந்துபோவதற்குமுன் விதைகளை விதைத்துவிட வேண்டும். விதையினாலும், மொட்டு (Bud grafting) அல்லது அரும்பு ஒட்டுக் கன்றுகளினாலும் பயிர் உண்டாக்கலாம். நல்ல முதிர்ந்த பழங்களிலிருந்து நவம்பர் மாதத்தில் விதைகளை எடுத்து நன்றாய் செபீரேர்த்தி செய்திருக்கப்பட்ட சுத்தமான நாற்றங்காலில் 6 அங்குலத்துக்கு ஒருசரம் விதைகளை தெளித்துவிட வேண்டும். ஒருவாரத்துக்குள் முளைகாணும். ஆறு அங்குல உயரமிருக்கையில் கன்றுகளைப் பிடுங்கி 9 அங்குலத்துக்கு ஒரு கன்றுவீதம் மறுபடி நடவேண்டும். இப்படிப் பிடுங்கி நட்ட கன்றுகள் ஒரு வருஷத்துக்குக் குறையாமல் நாற்றங்காலிலிருக்கவேண்டும். நாற்றங்கால் நிழலான விடத்தி லிருக்கவேண்டும். சிலசமயம் இந்த ஒருவருஷத்துக் கன்றுகளை மறுபடி பிடுங்கி நிழலில்லாத

விடத்தில் நடவேண்டும். அப்போது மொட்டிகளுக்கு மேல் ஒரு அங்குலம் வெட்டி எறிந்துவிடுவார்கள். பொதுவாக ஒரு வருஷம் முதல் இரண்டு வருஷமான கன்றுகளைப் பிடுங்கித் தோட்டங்களில் நடவேண்டும். சில குணங்களுள்ள கிச்சிலி உண்டாக்க வேண்டுமானால், ஒரு வருஷமுள்ள கன்றுகளுக்கு அக் குணங்கள் அமைந்த ஒரு மரத்தின் அரும்புகளைச் சீவி ஒட்டுகள் கட்டி, ஒட்டு சேர்த்த கன்றுகளைத் தோட்டங்களில் பிடுங்கி நடுவதுமுண்டு. அரும்பு ஒட்டுசேர ஒரு வருஷம் செல்லும். ஒட்டுக் கன்றுகள் விலை சுமார் 3 ரூபாய்க்குக் குறையாது. நாற்றங்காலன்னியில், கன்றுகளை நல்லமண் உரம் நிரப்பிய கூடைகளிலும், கன்றுகளை விரித்திபண்ணி ஒட்டுக்கட்டியாவது கட்டாமலும் தோட்டங்களில் நடுவதுமுண்டு.

B. தோட்டம்.

தோட்டங்களின், நல்ல பூமியாயிருந்தால் 15 முதல் 20 அடிக்கு ஒருதரம் நடவேண்டும். இப்படி நட்டால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 130 கன்றுகள் செல்லும். சப்பையான நிலமாயிருந்தால் 10 அடிக்கு ஒருதரம் கன்றுகளை நடவேண்டும். கன்றுகளை மழைகாலத்தில் நடுவது திறம். தோட்டத்தில் 2 அடி அகலமுள்ள குழிகளை வெட்டி மண்ணைக் கொஞ்சகாலம் ஆறப்போட்டிருந்து சாணம் குப்பைகளினால் நிரப்பி அவைகளில் கன்றுகளை நடவேண்டும். பாசனத்திற்காகப் பாத்திகளும், கண்ணிகளும் ஏற்படுத்தவேண்டும். கன்றுகளை நடட்டு

1, 2 வருஷத்துக்கு நிரம்ப தவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

பாசனம், கொத்தல், களைபிடுங்கல் முதலியன :—

கன்றுகள் இளமைபா யிருக்கையில், இடவெளியில் சில கரிகாய் பதார்த்தங்களையும், கடலை, வெங்காயம், இஞ்சி, மஞ்சள், அவுரி முதலிய பயிர்களையும் சாகு படி செய்து லாபம் அடையலாம். இப்படிச் செய்தால் அடிக்கடி பூமி கொத்திக் கிளறப்படுகிறது. கன்றுகள் வேரூன்றுகிறவரையில் 2 தினத்துக்கு ஒரு தரம் பாசனமும், பிறகு வாரத்துக்கு ஒரு தரம் பாசனமும் செய்யவேண்டும். 3 வது வருஷத்தில் 15 நாளைக்கு ஒரு தரமும் பிறகு மாதத்துக்கு ஒரு தரமும் பாசனம் செய்து வந்தால் போதும். நட்ட பிறகு கீழே இருந்து காணுகிற முளைகளை எல்லாம் அப்போதைக் கப்போது தண்டுகளிலிருந்து அப்புறப் படுத்திவிட வேண்டும். கிச்சிலி மேலாகச் சல்லிவேர் ஜாஸ்தியாக விடுவதினால் ஆரம்பத்தில் அதிக ஆழம் கொத்தக் கூடாது. மேலாகக் கொத்தவேண்டும். ஆனால் வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் அல்லது 2 வருஷத்துக்கு ஒருதரம் கூந்தலியால் கொத்திவாங்கினால் நன்மைவிளையும்.

கபாத்து செய்தல் :—

கன்றுகளை நட்டு, துளிகள் உண்டாகி மரம் 5 அடி உயரம் வளருகிறவரையில் கபாத்து செய்யவேண்டியிருக்கும். மரம் நன்றாய் வளர்ந்தால் பக்கங்களில் நிர

ம்ப கிளைகள் வெடிக்கும். அந்தக் கிளைகளை அப்போதைக்கப்போது வெட்டிவிடவேண்டும். வெட்டி மரத்தை ஒழுங்காய் நேரவளரவிடவேண்டும். முதிர்ந்த கிச்சிலி மரங்களில் கோணலாயிருக்கப்பட்ட கிளைகளையும் பட்டுப்போன கிளைகளையும் ரம்பத்தால் அறுத்து, அறுபட்டபாகத்தில் தார் தடவி விடவேண்டும். மரம் காய்ப்பில்லாமல் தழையாய் மதத்துப்போனால், மரத்தைச் சுற்றிவர சுமார் 4, 5 அடிக்கு வெட்டி, சல்லி வேர்களை எல்லாம் களைந்து மறுபடி மண்ணை இருந்த விடத்தில் போட்டுவிட வேண்டும். இதற்கு வேர்கபாத்து என்று பெயர்.

எது இடுதல் :—

இளம்மரங்கள் நன்றாய் வேரூன்றி வளருகையில் அடிக்கடி நல்ல மடித்த சாணத்தையாவது அல்லது சிறுமீன்கள் எருவையாவது உரம் அணைத்தால் மரம் கொழு கொழுவென்று வரும். காய்ப்புள்ள மரங்களுக்கு வருஷா வருஷம் மேற்படி உரங்களை எலும்புத் தூளுடனும் சுண்ணாம்பு நீற்றுடனும் அணைத்து வர வேண்டும்.

கண்டுமுதல் :—

5வது வருஷம் முதல் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். 5வது வருஷத்தில் மரம் 1க்கு சுமார் 50 பழமும் 6வது வருஷத்தில் மரம் 1க்கு 100 பழமும், 7வது வருஷத்தில் மரம் 1க்கு 150 பழமும், 8வது வருஷத்தில் மரம் 1

க்கு 200 பழமும் கிடைக்குமாம். பிறகு வருஷா வருஷம் எல்லாம் ஒத்துக்கொண்டால் சராசரி ஒரு மரத்திலிருந்து 300 பழங்களுக்குக் குறைபாமல் கிடைக்குமாம். மரம் 1க்கு 5 வது வருஷம் முதல் சராசரி வரும்படி 1 ரூபாய் கிடைக்கும். கிச்சிலித்தோட்டத்தில் போட்ட முதலுக்கு 100க்கு 24 வட்டிக்குக் குறையாது.

கைத்தொழில் :—

கிச்சிலியினுடைய இலைகளையும் துளிக்களையும் ஜலத்தில் காய்ச்சி ஆவியை வாளியில்விட்டு குளிர்மைப்படுத்தினால் இந்த ஆவி ஒருவித கிலை இல்லா எண்ணெயாய் மாறிவிடும். இதற்கு கிச்சிலி இலைத் தைலமென்று பெயர். இதைத் திறந்து வைத்திருந்தால் ஆவியாய்ப் போய்விடும். ஆகையால் நன்றாய் மூடி வைத்திருக்க வேண்டும். இப்படியே பழத்தின் தோல்களிலிருந்தும், புஷ்பங்களிலிருந்தும் கிலை இல்லாத தைலம் எடுக்கலாம். பூக்களிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்தவுடன் அந்த எண்ணெயோடுசம்பந்தப்பட்டிருக்கிற சுத்தஜலத்திற்கு கிச்சிலி புஷ்ப ஜலம் என்று பெயர். இது வைத்தியத்திற்கு பிரயோசனப்படுகிறது. கிச்சிலி இலை, தோல் பூக்களிலிருந்து உண்டாகும் தைலங்களுக்கு நல்ல கிராக்கியுண்டு.

கொய்யா.

இப்பழவகைத் தோட்டம் தனிமையில் காண்பது அரிது. பழங்களை காக்கையும், கிளிகளும், பகலிலேயும் வெளவால் இராத்திரி காலங்களிலேயும் நிரம்பச் சேதப்படுத்துவதாலும், காவல் காப்பது கஷ்டமாயிருப்பதனாலும் தனி கொய்யாத் தோட்டங்கள் அதிகமாகப் போடுவதில்லை. ஆகையால் கொய்யாமரம் அங்குமிங்குமாயிருக்கும். கொய்யாத் தோட்டங்கள் நிரம்ப அபூர்வமாயிருக்கும்.

பயிர் வித்திசெய்தல் :—

விதைகளிலிருந்து நாற்றங்காலில் கன்றுகள் உண்டாக்கி தோட்டங்களில் நடலாம். நல்லமரங்களிலிருந்து கன்றுகளுக்கு ஒட்டுகட்டி ஒட்டு சேர்த்த கன்றுகளையுங் தோட்டங்களில் நடவது சர்வ சிலாக்கியம். கன்றுகள் நட 2 வருஷம் முதல் 4 வருஷம் உள்ள கன்றுகள் யிருக்கலாம். தோட்டங்களில் 20 அடிக்கு ஒரு தரம் குழிகள் வெட்டி கன்றுகளை புதைக்க வேண்டும். மா, கிச்சிலிக்குச் செய்வதுபோல செய் கேர்த்தி, உரம், கொடுக்க வேண்டும். காய்க்க ஆரம் பிச்சிற்வரையில் இடைவெளியில், வெண்டை, கொத்தவரை, முள்ளங்கி, கொத்துமல்லி, முதலிய பயிர்களை, உண்டாக்கி லாபம் அடையலாம். 2 வது வருஷத்தில்

கட்டால் 3வது வருஷ முதலிலும், 4வது வருஷத் தில் கட்டால் 3வது வருஷ முதலிலும் பூக்க ஆரம் பிக்கும். பூமியை வருஷாவருஷம் களை அன்னியில் மாததைச் சுற்றி கொத்திவிட்டு உரம் அணைத்து பழங் கள் சேதப்பட்டுப் போகாமல் பாதுகாத்து வரவேண் டும். இம்மரங்களுக்கு களை கபாத்து செய்வதில்லை. ஆனால் நீண்ட களைகளை எல்லாம் கீழேவளைத்து ஒன் றோடொன்றாய்க்கட்டிவெளிச்சமும் காற்றும் போதும் படியாய்ச் செய்து பழம் பெருக்கும்படி செய்வார்கள். அக்மோபர் நவம்பரில் பழுக்கும். வெள்ளைச் சதை யுள்ள ஒரு சாதியும், சிவப்புச்சதையுள்ள ஒருசாதியும் உண்டு. ஒரு கொய்யாத் தோட்டம் 12 வருஷம் முதல் 20 வருஷத்துக்குமேல் இருக்காது. பூமி கல்லகாயிரு த்து கல்லகவனம் எடுத்துக்கொண்டால் 20 வருஷம் வரையிலிருக்கும்.

அனாஸ்.



அனாஸ் பழம்.

ஆனால் விர்த்தி யாக்குவதற்கு நீர் சுவர்த்த சீதோஷ்ணமும், பொலபொலத்த பழுப்பு நிறமுமுள்ள பாதி களி, பாதிமணல் சமபந்தமுள்ள நிலமும், நல்ல வடிகால் வசதியும், நல்ல உரம் செய் நேர்த்தியும், வேண்டுமாம். இதைக் குறுத்துக் கிழங்கினால் விர்த்திபண்ணலாம். ஜெனவரி மாதம் முதல் மார்ச்சு மாதம்வரையில் 2. அடி வித்தியாசமுள்ள வரிசைகளில், வரிசைகளிலேயே $1\frac{1}{2}$ அடிக்கு ஒரு உரம் நடப்படுகின்றன. குறுத்துக் கிழங்குகளை இளமையில் மூட்டம் போட்டு மூடி வைத்திருப்பார்கள். வேருன்றுவதற்கு முன்னால் வெகு ஜாக்கிரதையாய்ப் பாசனம். செய்யவேண்டும். பயிர் வளருகையில் காய்ந்த சிறுமீன்களை உரமாகக்கொடுத்து பூமியை எப்பொழுதும். நைப்பாக வைத்திருக்கவேண்டும். மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் வேண்டியதில்லை. பழம் முதிருகையில் ஜாஸ்தி பாசனம் கொடுக்கவேண்டும். கிழவில் பயிர் செய்தால் பழம் பெருமனாக இருக்கும். ஆனால் நல்ல வாசனையைக் கொடுக்காது. நட்டு 1 மாதத்துக்கெல்லாம் பழுத்து முதிர்ந்துவிடும். சேலம், வட ஆர்க்காடி, பெங்களூர் முதலிய இடங்களில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இவ்விடங்களில் லெல்லாம் மார்தோப்பு, தென்னந் தோப்புகளில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. ஆனால் பழம் கொஞ்சம் காரலாயிருந்தால் உப்பு சலத்தினால் கழுவினால் காரல் நீங்கிவிடும். பாக்குத் தோட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

கைத்தோழி:—

ஆனால் மடலிலிருந்து நேர்த்தியான நார் எடுக்கலாம். அந்த நாரிலிருந்து நேர்த்தியான வஸ்திரம், பட்டு முதலியவை செய்யப்படுகின்றன.

பூமி :—

நல்ல ஆழமுள்ள வடிகால் வசதியுள்ள சுக்கான் சம் பந்தமான களி அல்லது செவ்வல் திரம்.

விரித்தியாக்ருதல் :—

விதைகளிலிருந்து கன்றுகள் உண்டாக்கி அவைகளி லிருந்தும், ஒட்டிக்கன்றுகளிலிருந்தும், பயிர் உண்டாக் கலாம். கன்றுகள் 3 வது வருஷத்தில் கடத் தகுதி யுள்ளதாயிருக்கும் ; தோட்டங்களில் 20 அடிக்கு ஒரு தரம் கடவேண்டும். சொற்ப மழையுள்ள வறட்சியான இடங்களில் நன்றாய் வளரும். கன்றுகளை 2, 3 தரம் பிடுங்கி நடுவதும் உண்டு.


செய் நேர்த்தி :—

பாக்கிப் பழுவகைப் பயிர்களுக்குச் செய்வதுபோல கொத்தல், சுளைபிடுங்கல், பாசனம், இடைவெளியில் பயிர் உண்டாக்குதல், கபாத்து செய்தல் முதலியன செய்ய வேண்டும்.

கண்டு முதல் :—

செப்டெம்பர் முதல் டிசம்பர் வரையில் மாதுளங் காய் முதிர்ந்து கொண்டுவரும். ஒரு மாம் 1 க்கு 30 பழம் முதல் 50வரையில் கிடைக்கும். காக்கை, கிளி, அணில் முதலியவைகளின் தொந்திரவுகளுக்கு பழங்

களை மூடிவைத்திருக்க வேண்டும். மணிகள் கட்டி அடிக்கடி அடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். மாம் 1-க்கு சராசரி வருஷம் 1 க்கு சுமார் ரூபாய் $\frac{1}{2}$ வரும் படி கிடைக்கும்.



கொடிமுந்திரிப்படிம்.

நகுத்தபூமிகள் :—

பொலபொலத்த பாதிசுளி, பாதிமணல், கலந்தபூமி திறம். கல்ல பாசன வசதியுள்ள தோட்டக்கால் நிலம் மிகவும் நல்லது. அதிக காற்றுள்ள இடங்கள் கூடாது. நீர் சுவறின அதிக குளிரான இடங்களில் காய் காய்க் காது. அதிக வறட்சியுள்ள இடங்களிலும் அப்படியே. சேய்நேர்த்தி, உரம், பதியன்கள், நடவு, கபாத்து முதலியன :

பூமியை வெகு நன்றாய் உழுது, வேர்வாரியால் வேலைசெய்து துவாளியாக்கி, சுத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டும். இப்படி கருவிகளால் வேலை செய்வதில், தோட்டம் நன்றாய்ப் பலித்துவிட்டால் பிற்பாடு 10 வருஷம் உழவு முதலியது செய்யவேண்டியதில்லை என்று நினைத்து வேலைசெய்யவேண்டும். 8 அடிக்கு ஒருதரம் 2 அடி நீளம், 2 அடி அகலம், 2 அடி ஆழமுள்ள குழிகள் உண்டாக்கி அக்குழிகளை, ஆற்றுவண்ட வினாலும், மடித்த சாணத்தினாலும் நிரப்பி வைத்திருந்து, அவைகளில் நல்ல முதிர்ந்த கொடிகளிலிருந்து 3, 4 கனுக்களையுடைய பதியன் துண்டுகளை எடுத்து நடவேண்டும். பதியன்கள் அக்டோபர், நவம்பரில் காற்றங்காலில் ஊன்றப்பட்டு, வேரூன்றின பிற்பாடு 2 வாரத்துக்கெல்லாம் தளிர்களளிடும். இப்படித் தளிர்கள் கண்ட பதியன்களை 9, 10 மாதத்துக்கெல்லாம் தோட்டக் குழிகளில் நடவேண்டும். பதியன்களெல்லாம் அக்டோபர் மாதத்தில் கபாத்து செய்யப்படுகிற கொடிகளிலிருந்து எடுக்கப்படும். ஏகர் 1க்கு 30டன்

மடித்த சாணமும் 40 டன் மடித்த குப்பையும் 4 டன் எலும்புத்தூளும் 1 டன் பொட்டிலுப்பும் போட்டால் நல்ல கண்டு முதல் கிடைக்கும். பதியன்கள் தோட்டங்களில் வளருகையில் ஊன்றுகோல் கொடுத்த வேண்டும். இதற்குக் கலியாண முருங்கையில், ஒய் வொரு பதியனுக்கும், ஒரு அடி தூரத்துக்கப்பால் கைமொத்தமுள்ள போத்துகளை ஊன்றுவது வழக்கம். கொடிகள் வளரும்போது கலியாண முருங்கைப் போத்துகளில் கட்டுவது வழக்கம். கொடி 5 அடி உயரமிருக்கையில், தலையைக் கிள்ளிவிடுவார்கள். இளம்பயிரில் கிளைகளை பெல்லாம் தறித்துவிட வேண்டும். பிற்பாடு 6 முக்கிய கிளைகளை வைத்துக்கொண்டு பாக் கியைத் தறித்துவிடவேண்டும். ஒவ்வொரு தளிரிலேயும் கொடி இளமையாயிருக்கையில் ஒரு குலை காய்தான் வைத்திருக்கவேண்டும். தோட்டம் பலப்பட்டு விட்டால் ஒரு தளிர்க்கு 2, 3 குலை வைத்திருக்கலாம். பெரும் காத்திரமான பழம் வேண்டுமானால் ஒரு தளிர்க்கு ஒரு குலைக்குமேல் வைத்திருக்கக் கூடாது. பழம் முதிர்ந்துகொண்டிருக்கையில் பாசனத்தைக் கம் மிப்படுத்திக்கொண்டு வரவேண்டும். கோடைகாலத்திலும், குளிர்காலத்திலும் பழம் பறித்தவுடன் கபாத்து செய்யப்படுகிறது. கோடைகாலத்தில் கபாத்து செய்தவுடன் கொடியின் மேற்பட்டைகளை உரித்து, சாணசலத்தில் மண்ணைக் கரைத்து உரித்த இடத்தில் பூசுவார்கள். இப்படிப் பண்ணினால் தண்டில் பூச்சி

கள் ஏறாதாம். கபாத்து செய்தவுடன், பக்கத்தில் காணும் தளிர்கள் கிளைகளவிட்டு ஓடும். பந்தல்போட்டு கொடிகளையும், தளிர்களையும், ஏற்றுவார்கள். நிலவிடங்களில் நிரந்தரமான இரும்புக்கம்பிப் பந்தல் போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள். முதல் 2 வருஷத்துக்கு திராசைத் தோட்டத்தில் இடைவெளியில் ஏதாவது பயிர்கள் உண்டாக்கலாம்.

திராசைக்கொடித் தோட்டம் உண்டாக்க நிரம்ப செலவு பிடிக்கும். சாதாரணக் குடிகளால் செய்யக் கூடிய காரியமல்ல. கொத்தல், கபாத்துசெய்தல், ஏறு விடுதல், பாதுகாத்தல் முதலியவைகளுக்கு, நிரம்ப செலவு பிடிக்கும். முதல் 2, 3 வருஷத்துக்கு வரும் படி கிடைக்காது. பூக்களை அப்போதைக்கப்போது பறித்து, முதல் 2 வருஷத்தில் கொடிகளில் காய்க்க விடக் கூடாது. சிலது வருஷம் முதல் 9வது வருஷம் வரையில் நல்ல பலனைக்கொடுக்கும். பிற்பாடு தோட்டம் பலவினப்பட்டுப் போய்விடும். குலைகளைப் பறித்தவுடன் கொடிக்கு பாசனம் கொடுக்காமலும், பசுரையிலும் தளிரவிடாமலும் அடிக்கவேண்டும். தோட்டம் பனித்துவிட்டால் ஏராளமான வரும்படி கிடைக்கும். கைத்தொழில்:—

திராசைத் தோட்டிலிருந்து ஒருவித உயர்ந்த சாராயம் இறக்கலாம்.

முந்திரி.

இது ஒரு பழவகைப் பயிர். இது சாதாரணமாய் கடற்கரை யோரங்களிலும், மணல்சாரியிலும் நன்றாக வருகிறது. இது 15, 20 அடி வரையில் உயரும். ஜூலை, ஆகஸ்டு மாதங்களில் ஒரு உழவு உழுது முந்திரிக்கொட்டையை ஊன்றினால் செடிகள் உண்டாகிவிடும். விதை ஊன்றுவதற்கு முன்னால் விதை ஓய இரண்டு நாள் ஜலத்தில் ஊரப்போட்டிருந்து பிறகு ஊன்றுவது நலம். இதைத் தண்ணீரில் சாகுபடி செய்கிற வழக்கத்தை அதிகமாகக் காணோம். 3வது வருஷத்திலேயே காய்க்க ஆரம்பிக்கும். 7வது வருஷத்துக்குப் பிற்பாடுதான் நல்ல காய்ப்பு உண்டாகும். வருஷத்தில் மரம் 2 தடவை பூக்கும். முந்திரிப் பழம் என்று சாதாரணமாய்ச் சொல்லுவது, முந்திரிக்கொட்டையின் காய்பே ஒழிய வேறல்ல. மரம் விறகுக்கு பிரயோசனப்படுகிறது. பழத்தின் ரசத்தி விருந்து சாராயம் இறக்குகிறார்கள். பருப்பு போசன பதார்த்தத்தோடுச் சேர்க்கப்படுகின்றது. பருப்பிலிருந்து ஒருவித நிலையுள்ள எண்ணெய் எடுக்கிறார்கள். கொட்டையைச் சுட்டு பருப்பு எடுத்தாலும் எடுக்கலாம். இல்லாவிட்டால் கொட்டையை ஊசியால் குத்தி உடைத்து பருப்பு எடுத்தாலும் எடுக்கலாம். உடையாத் பருப்புக்குத்தான் விலை ஜாஸ்தி. முந்திரிக்கொட்டை ஒட்டிலிருந்தும் ஒருவித எண்ணெய் எடுக்க

முந்திரி.

217

லாம். பூச்சிவைக்கிற புண்களுக்கு முந்திரி எண்ணெய் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு முந்திரித் தர்ப்புக்கு 2, 3 விசை பிசின் கிடைக்கும். பிசின் வார்னிஸ் கொடுக்க உபயோகப்படுகிறது. மாப்பட்டை துவர்ப்பானதால் அப்பட்டையின் கஷாயம் தோல் பதனிட பிரயோசனப்படும்.

சப்பையான நிலம் இம்மரத்தின் இலை உதிர்வதனால் கொழுமை அடைகிறது. நிலத்தை பலனுண்டுகளாக வகுத்து, முந்திரியை சுட்டு இதரபயிர் சாகுபடிசெய்து வந்தால் நிலம் விழுகிற சாகுகளால் கொழுமை அடைவதுமன்னியில் இதர பயிர்ச் சாகுபடி செய்யத் தகுதி உள்ளதாகும்.

கர்ப்பூஜ்.

—10—



கர்ப்பூஜ் பழம்.

இது பாங்கி, பூஷணிமுதலிய ஜாதியைச் சொந்தது. நல்ல வளப்பமான களிமண் பூமியில் வளரும். பெரிய பாத்திகள் கட்டி, முகடுகள் உண்டாக்கி, அவைகளில் விதை தெளித்துப் பயிர்செய்தால் பூமியில் அதிக ஜலம் தங்கிக்கொண்டாலும், பயிரை ஒன்றும் பண்ணாது. செப்டெம்பர் முதல் டிசம்பர்வரையில் விதை தெளிக்கப்படுகிறது. பயிர் 1 அடி இருக்கையில் துளிக் கொழந்தை ஒடித்துவிட்டால் பக்கங்களில் ஜாவ் தி கிளைகள் உண்டாகும். கிளைகளிலேயும் அப்படியே கிள்ளி, சுமார் 12 கிளைக்குமேல் வளரவிடாமல் வைக்கவேண்டும். கிளைக்கு 1 அல்லது 2 பழம் உண்டாகிவரையில் பயிரை வைத்திருக்கலாம். கர்ப்பூஜ் காய் கன்றாய்ப் பழுக்கிறவரையில் 2 கிளைக்கு ஒரு தாம் தண்ணீர் பாசனம் பண்ணிக்கொண்டு வரவேண்டும். பிற்பாடு நிறுத்திவிடலாம். நல்ல வசனையும் கைக்கு நிறுதுவாய் நிறுந்தால் பழம் பழுத்ததற்கு அடையாளமாகும். குதிரை லத்தி நிரப்ப திறமான உரமாக. பூமியை அடிக்கடி கன்றாய் வெட்டி, கொத்தி, எருவைப்பரப்பி ஜூம்பத்தில் கொஞ்சமாய்ப் பாசனம் கொடுத்து அப்பிறும் அதிகரித்து வரவேண்டுமாம். காய்கள் பழுத்தவுடன் பழங்களுக்குக் கீழும், (வைக்கோலால்) வெய்யில் கிரணம்படாதபடி மேலேயும் மூடிவைப்பதுண்டு. வெள்ளரிப் பழத்துக்கும், கர்ப்பூஜ் பழத்துக்கும் உருகியில் அதிக வித்தியாச மிராது. வெள்ளரிப்போலத்தான் இதற்கும் சாகுபடி.

பலா.



பலா மரம்.

பயிரின் சுபாவம்:—

இது ஒரு பழவகைப்பயிர். இதில் வர்க்கை, சுவை, வேர்ப்பலாவென்று அநேகமானிரக எரிருக்கின்றன.

தகுந்த பூமிகள்:—

பலாமரத்திற்கு முதல்தரமான பூமி செவ்வல் மண், வடிகால் வசதியுள்ள ஆற்றுப்படுகையில் கன்றாய்வரும் நீர் பிடிப்புள்ள பூமிகளும், கரிசல் பூமியும் கூடாது.

தவறுகள் உண்டாகத்தல்:—

சுமார் 50 வருஷத்திற்கு மேற்பட்ட மரங்களின் சிறுகிளைகளில் காய்த்துத் தானாகப்பழுத்த பழங்களில் திடமான கொட்டைகளைத் தொப்புளோடு கரம் காய் முன் எடுத்து, 3 அடி அகலமும் 1 அடி ஆழமுமான மண்சட்டி அல்லது மூங்கிற் கூடைகளில் மடித்த சாண உரமும் மண்ணும் நீர்ப்பி, கூடை அல்லது சட்டி 1க்கு 2 கொட்டைகள் விதம் ஊன்றி 2 மாதகாலம் வைப்பாக வைத்திருக்கவேண்டும். 2 வது மாத இறுதியில் சட்டியை உடைத்துவிட்டு கன்றுகளை நடலாம். பூமியில் காற்றுகள் அல்லது கன்றுகள் எடுத்து வெவ்வினால, கன்றுகள் அதிகமாகப் பலிதமாகிறதில்லையாம்.

செய் தேர்த்தி:—

பூமியை கன்றாய் உழுது 4 அடி சதாரமும் 5 அடி ஆழமுமான குழிகள் 40 அடிக்கு ஒன்றுவிதம் வெட்டி 2 மாதம் ஆறப்போட்டிருத்து, எலும்புத் தூள், கண்ணாம்பு நீர், சாம்பல், மடித்த சாணம், கருக்காய்

இவைகளைச் செம்மண்ணுடன் கலந்து குழிகளை நிரப்பி 2 மாதக் கன்றுகளை முன்சொல்லி இருக்கிறபடி நடவேண்டும். இப்படி கட்டால் 1 ஏக்கர் நிலத்துக்கு சுமார் 30 கன்றுகள் வேண்டியிருக்கும். கன்றுகளுக்கு மூங்கில் ஊன்றுகோல் ஊன்றி நேரவளர விடுவது வழக்கம்.

பாசனம்:—

கட்டு வேளூன்றி ஒருவருஷகாலம் வரையில் தினம் ஒரு தண்ணீரும் 2 வது வருஷத்தில் 2 நாளைக்கு ஒரு தண்ணீரும் 3 வது வருஷத்தில் 3 நாளைக்கு ஒரு தண்ணீரும் 4 வது வருஷத்தில் 4 நாளைக்கு ஒரு தண்ணீரும் அகற்குப் பிறகு வெய்யில் காலங்களில் நாலு தண்ணீரும் விட்டால் போதுமானது.

பின் செய்நேர்த்தி:—

வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் பூமியை கன்றாய் உழுதும் கன்றுகளை சுற்றிவர வருஷத்துக்கு 2 தடவை கன்றாய்க் கொத்திக் கொடுத்தும், வருஷத்துக்கு 2 தரம் உரம் அணைத்துக்கொண்டும் வரவேண்டும். முதல் வருஷம் கன்று ஒன்றுக்கு ஒரு கூடையும், 2 வது வருஷம் 2 கூடையும், இப்படி வருஷத்தோறும் ஒரு கூடை கூட்டி உரம் அணைத்து வரவேண்டும். இதில் சுமார் 10 வருஷம் புஞ்சைப் பயிர் இடவெளியில் தாராளமாய்ப் போடலாம். முதல் 4, 5 வருஷத்தில் கல்ல வெள்ளா மையும் பிறகு $\frac{1}{2}$ வெள்ளாமையும் கிடைக்கும்.

முதல் 5 வருஷத்துக்கு செலவு விபரம்:—

	ரூபா.	அ.	பை.
30 சட்டியும் மண் உரமும் தயார்பண்ண	1	0	0
விலை போட	...	1	0
சட்டியில் 2 மாதத்துக்கு தண்ணீர்விட.	1	0	0
30 குழிகள் வெட்ட	...	5	10
30 குழிக்கும் உரம்போட்டு மண்ணால்			
நிரப்ப	...	3	0
5 வருஷம் தண்ணீர் தூக்கிக்கொட்ட...	60	0	0
மூங்கில் கட்டுக்கும் மூங்கில் கம்புக்கும்.	3	12	0
வருஷம் 2 தரம் கொத்தி உரம் அணைக்க.	5	0	0
ஆக மொத்தம்...	80	6	0

மூக்கிய செலவு ஆகும்.

கண்டுமுதல்:—

5 வது வருஷத்தில் காயக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு கிளையில் ஒரு பிஞ்சுக்கு மிஞ்சின பிஞ்சுகளை கறிக்கு பக்குவமான காலத்தில் எடுத்துவிட வேண்டும். பின் காய்களை பால் முறித்தபிறகு தட்டிப்பார்த்து கன்றாய் முதிர்ந்தபின் மரத்திலிருந்து அறுக்கவேண்டும். 5வது வருஷத்தில் மரத்துக்கு 4 காயும், 10வது வருஷத்தில் மரத்துக்கு 20 காயும், 20வது வருஷத்தில் மரத்துக்கு 100 காயும் காய்க்குமாம். 20 வருஷத்தில் மரம் 1க்கு 10 காய்கள் மாத்திரம் காய்க்கக்கூடிய மரங்களு மிருப்பதால் அதிகமான காய்ப்பு, கீலத்தின் வளத்தையும்,

மரத்தின் சுபாவத்தையும் பொறுத்ததாக இருக்கிறது. 5 வருஷம் முதல் 20 வருஷம்வரையில் பரத்துக்கு சராசரி வருஷம் 1க்கு 40 காய் வரும்படியாக வைத்துக் கொள்ளலாம். -காய் 1க்கு ரூபாய் 0-4-0 வீதம் ரூபாய் 10 கிடைக்கும். இப்படி ஏக்கர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 300 கிடைக்கலாம். 21^வ வருஷத்துக்கு மேற்பட்டு மரம் 1க்கு வருஷம் 1க்கு சராசரி ரூபாய் 15க்கு கம் மிப்படாதாம். எந்த விதத்திலும், இச்சாகுபடியில் போட்ட முதலுக்கு வட்டி மாதம் 1க்கு ரூபாய் 100க்கு ரூபாய் இரண்டுக்குக் குறையாமல் கிடைக்கும். மரம் இளமையாயிருக்கையில் காய்கள் கிளையிலும் பிறகு தண்டு அல்லது அடிக்கட்டையிலும், முதிர்ந்தமரத்தின் வேரிலும் காய்க்குமாம்.

கைத்தொழில் :-

பலா மரத்திலிருந்து பெட்டிமுதலிய அநேகவித மரச்சாமான்கள் செய்யலாம். இழைப்பு வேலைக்குச் சிலாக்கியமான மரம். பலாமரத்தின் இழைப்புத்தூளி லிருந்து ஒருவித மஞ்சள் சாயம் படிக்காரத்தினால் இறுக்கப்பட்டு, பர்மா தேசத்து மதர்சாரியார்களின் உடைகளுக்கு சாயம்கொடுக்கவும், பட்டுக்கு மஞ்சள் சாயம் கொடுக்கவும் உபயோகப்படுகிறதாம்.

சாயவழைப் பயிர்கள்.

அவுரி.



அவுரிச் செடி.

பயிரின் கபாலம்:—

இது ஒரு சாயப்பயிர். பசுந்தாள். அல்லது தழை எருவுக்கும் பயிர் செய்யப்படுகிறது. இது கண்ணும் புத்தினி.

மாதிரிகள்:—

கொளின்சி முதலிய அநேகவித அவுரிகள் நமது நாட்டில் வளத்திரபா யிருக்கின்றன. இவைகளிலிருந்தும், அவுரியிலிருந்து சாயம் எடுப்பதுபோல் ஒருவித சாயம் எடுக்கலாம்.

பூமிகள்:—

இது சாதாரணமாக புஞ்சைப் பயிராக சாகுபடி செய்யப்பட்டாலும், அநேக இடங்களில் கிணற்று இறவையில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. நஞ்சையில் அதிகமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. இது கரிசல் முதலிய எல்லா நிலங்களிலும் வரும். எந்தப் பூமியில் சுக்கான் சம்பந்தம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதோ, அந்தப் பூமியில்தான் நன்றாய் வரும்.

செய்நேர்த்தி:—

செப்டெம்பர், அக்டோபரில் 2, 3 தடவை உழுது டிசம்பர்வரையில் தரிசாகப்போட்டுவிட வேண்டியது. விதை தெளிப்பதற்கு முன்னால் பூமியை மறுபடியும் ஒரு தடவை உழுது, புன், பூண்டுகளை யெல்லாம் களைந்துவிட்டு, விதை சிந்தாகைதால் அதிக ஆழத்தில் போய் முளைகிளப்பாமல் கெட்டுப்போவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு உருளையால் பாம்படிப்பது நல்லது.

இல்லாவிடில் உழுத பூமியை கடப்பை, கர்தூலில் செய்யவதுபோல குண்டகை என்னும் கருவியால் மண்ணை இருகச் செய்வது நல்லது.

உரம்:—

மணல் சாரியாயிருந்தால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 20 வண்டி வண்டல் பொருக்கடிப்பது திறம். சுண்ணாம்பு நீறு $\frac{1}{2}$ வண்டியும் சாம்பல் 1 வண்டியும் கலந்து அடிக்கலாம். தோட்டக்காவில் சுமார் 10, 15 வண்டி சாம்பல் குப்பை எருவாவது அடிப்பார்கள்.

காலம். விதையின் அளவு முதலியன:—

நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்கள் விதை தெளிக்கத் தகுந்தகாலம். சாதாரணமாய் டிசம்பர் மாதத்தில்தான் அவுரி விதை தெளிக்கப்படுகிறது. தோட்டக்காவில் ஜூலை, ஆகஸ்டிலும் தெளிக்கிறார்கள். ஏகர் 1க்கு சுமார் 10, 15 பவுண்டு விதை செல்லும். அதாவது 3 பட்டணம்படி முதல் 5 பட்டணம்படிவரையில் விதை செல்லுகிறதாம். விதைகளை $\frac{1}{2}$ அங்குல ஆழத்துக்கு மேல் தெளிக்கக்கூடாது. விதைகளை கொற்றுவால் (விதை தெளிக்கருவி) வரிசை வரிசையாய்த் தெளிக்க வேண்டும். தழை எருவுக்காகப் பயிரிடும் பட்சத்தில் ஏகர் 1க்கு 6, 7 பட்டணம்படி விதை கைத்தெளியால் விதைக்கலாம்.

பின்செய் நேர்த்தி:—

விதைத்தவுடன் மழைபெய்தால் முளைகாண வேர் வாரியால் வேலைசெய்ய வேண்டும். விதைத்து ஒரு

மாதத்துக்கெல்லாம் கொத்திகளை பிடுங்க வேண்டும். எப்போது களைகள் தொந்திரவு பண்ணுகிறதோ, அப்போதெல்லாம் களையைப் பிடுங்கிவிடவேண்டும். இல்லாவிடில் பயிரை ஒங்கவிடாது. தோட்டப் பயிரில் 6, 7 தாம் ஜலம் இறைக்குப்படி நேரிடும்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுழல், முதலியன:—

இது சுமார் 6 மாதத்துப் பயிர் நமது இராஜதானியில் அக்டோபர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, ஏப்பிரல் இம்மாதங்களில் அறுவடைசெய்யப்படுகின்றது. விதைத்துச் சுமார் 2 மாதத்துக்கெல்லாம் 1 அறுப்பும், 4 மாதத்துக்குப் பிந்தி ஒரு அறுப்பும், 6 மாதத்துக்குப் பிந்தி ஒரு அறுப்பும், பிறகு விதைக்காதவும் விட்டுவிடுகிறார்கள். இப்படி 10 மாதம் வரையில் ஒரு சமயம் பயிர் பூமியிலிருக்கலாம். ஒரு அறுப்பானவுடன் இலைகளைக் காயவைத்துக் கோணிப்பையில் கட்டிவைத்து விடுகிறார்கள். ஒரு அறுப்புக்குப்பின், இரண்டாம் தரம் தளிர்க்க பூமியை கொற்றா குலப்பையினால் கீறியும் அல்லது வேறுவிதமாய் உழுதும் அல்லது வேறுவிதமான உழவு செய்கேர்த்தியும் செய்கிறார்கள். ஏகர் 1க்கு சுமார் 12,000ம் பவுண்டு தழைகள் கிடைக்கும். அதாவது சுமார் ரூபாய் 30 பொருட்படியான தழை கிடைக்கும்.

ஏகர் 1க்கு சாகுபடிச் செலவு சுமார் ரூபாய் 15 மொத்த வருமானம் சுமார் ரூபாய் 30. செலவுபோக மீத தழையில் வருமானம் சுமார் ரூபாய் 15.

பிரயோகனம்:—

அவுரித்தழை நெல் முதலிய தானியப் பயிர்களுக்கு முதல்தர உரம். இது பூமியை உரப்படுத்துகிற பயிரில் ஒன்றாதலால், அறுவடைக்குப்பின் கீழ் வேரே பின்வரும் தானியப் பயிருக்கு நல்ல உரமாகிறது. அவுரிச் சாணமும் நெற்பயிருக்கு நல்ல உரம். ஒரு வண்டி அவுரிச்சாணம் 3 ரூபாய் விலை.

வகந்தொழில்:—

பச்சைத் தழையிலிருந்தும், காய்ந்த தழையிலிருந்தும் 24 மணி சாவகாசம் தண்ணீரில் ஊரப்போட்ட பிற்பாடு, நீலச்சாயம் காய்ச்சலாம். முதலில் ஒரு தொட்டியில் ஊரவைத்து இன்னும் ஒரு தொட்டியில் துடுப்புகளால் நீலச்சாய ஜலத்தைக் கலக்கினால் அடியில் சாயம் சேராய்ப் படித்துவிடும். இந்தச் சாய சேற்றை எடுத்துத் துணியில் ஒத்திச் சுரம் சுரமாய் வெட்டி, நீழலில் காயவைத்து விலைக்கு விற்கிறார்கள். 1 ஏகர் தழையிலிருந்து சுமார் 2 மணங்கு சாயம் கிடைக்கும். 1 மணங்கு சாயம் சுமார் ரூபாய் 45 விலைபோகும். ஜெர்மனிதேசத்துச் சாயப்போட்டியால் இப்போது அவ்வளவு விலைபோகாது. அவுரிச்சாயத் தால பருத்தி, பட்டு முதலியவைகள் அநேக ரெங்குளாக சாயமேற்றப்படுகின்றன.

சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்.

மிளகாய்.



மிளகாய்ப் பயிர்.

மிளகாய்=

231

பயிரின் கபாவம்:—

இது ஒரு சுவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர். இது அநேகமாய்த் தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. சில சமயம் தோட்டக்கால் பாத்திகளின் கரைகளில் அங்கு மிங்குமாய்க் கலந்தும் சாகுபடி செய்யப்படும். இது சிலவிடங்களில் புஞ்சைப் பயிராகவும், சிலவிடங்களில் தோட்டக்கால் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. புஞ்சை மிளகாய் மிகவும் காரமுள்ளது. இதில் அநேக மாதிரிசள் இருக்கின்றன. மாதிரிகளெல்லாம் நிறத்தையும், பருமனையும், பொருத்ததாயிருக்கிறது. குடமிளகாய் ஒருமாதிரி. மிளகாய், கத்திரி, புகையிலைவாக்கங்களைச் சேர்த்ததால், இதற்கும் அவைகளைப்போல் சாம்பல் காரத்தில் பிரீதி ஜாஸ்தி. தலைநீர் பூமிகள்:—

தோட்டக்கால் செவ்வளவும் கரிசனிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இது இரைற்றுப் பாசனத்தில் அநேகமாய் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மணல் கலந்த களி நிலத்தில் நன்றாய் வரும். சுக்கான் சம்பந்தமுள்ள களியிலும் வரும். சிலம், மேட்டி பூமியாயிருக்க வேண்டும். ஈரத்தையும் நீராவியையும் கொடுக்கக்கூடிய ஆழமாயுள்ள பொலபொலத்த மண்ணையுடைய கரிசலில் புஞ்சைப் பயிராகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. நாற்றங்கால் செய்யே நேரித்தி:—

மே, ஜூன்மாதத்தில் ஒரு கிழலுள்ள 4 அல்லது 5 செண்டு நல்ல நிலத்தைப் பொறுக்கியெடுத்து, வெட்டி

வாங்கி, கொத்தி, சாய்பல், சப்பாத்திக் கள்ளியினடி மண், கல்ல மடித்த குதிரைவத்தி முதலியவைகளால் ஒருவண்டி உரம் அடித்து, கல்ல தூவாளியாக்கி, சிறு பாத்திகள் கட்டி, பாத்திகளில் 1 முதல் 1½ பவுண்டு விதை தெளிக்கவேண்டும். விதைகள் சிறிதாகையால் மண்ணோடாவது, சமப்பலோடாவது கலந்து ஒத்தாப் போல்வழித் தெளிக்கப்படும். இந்த 1½ பவுண்டு அல்லது புட்டணம் படியால் ½ பாடி விதைகளினிருந்து உண்டாகும் காற்று ஒரு ஏக்கர கட்பு போதுமானது. காற்றுகள் கிரம்ப கொறுக்கமா இருக்கக்கூடாது. விதை த்தவுடன் சாய்பலேக்கொண்டாவது, மண்ணைக்கொண்டாவது பாத்திமேல் தூவிவிடவேண்டும். இளம் காற்றுக்களை வெவிலில் அடிபடாமல், வைக்கோலினால் மூடி வைக்கவேண்டும். ஆகையால் காற்றுகளுக்குத் தண்ணீர் இறைக்கும்போதெல்லாம் வாளியாலாவது அல்லது வையால் மூட்டத்தின் பேரிலாவது தண்ணீர் தெளிக்கவேண்டும். தெளித்த மூன்றுவாரம் வரையில் பயிர் விரம்ப இளைமையாகுஞ்நாள். நிறகு கொஞ்சம் வலுவூண்டாகும். காற்று 1½ மாதம் வயதானவுடனும், 6 முதல் 8 அங்குலம் வரையில் உயரமுள்ள போதும் பிடுங்கி எடுப்போம்.

வயல் செய்கோத்தி :-

பூமியை காணு தரத்துக்குக் குறையாமல் ஆழ உழுது, புல், களை, வேர் முதலியவைகளை வெர்வாரியால் நீக்கி, சுத்தம் செய்து, முதல் உழவுக்கு முன்

தீயே 30 வண்டி மடித்த சாணத்தினால் உரப்படுத்தி, பூமியை 10 அடி நீளம் 10 அடி அகல்முள்ள பாத்திகளாகப்பிரித்து, பாத்திகளில் முகடுகளும் படைச் சாலகளுமேற்படுத்தி, கண்ணிகளுமுண்டாக்கி, தபார் செய்திருக்கப்பட்ட முகடுகளில் காற்றுகள் எடுப்படவேண்டும். சிறு மிளகாய்ச் செடியாயிருந்தால் முகடுகள் 1½ அடி வித்தியாசத்தில் இருக்கவேண்டும். வயல் உழவுக்கு இரும்புக் கலப்பையையே உபயோகிப்பது நிறம். சில சமயம் கல்ல பயிருக்கு முகடுகள் 3 அடி வித்தியாசத்திலு மிருக்கலாம்.

தகுந்த காலம் நடவு முதலியன :-

ஒருன்மாதக்கடைசியில், காற்றங்காலில் விதை விட்டால் ஆகஸ்டுமாதக் கடைசியில் காற்றுகளைப் பிடுங்கி எடுவாம். முகடுகளில் காற்றை 1½ அடி வித்தியாசத்தில் எடுவேண்டும். பெரும் மிளகாய்ச் செடியாயிருந்தால், இன்னும் இட வெளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாய் விட்டு எடுவேண்டும். சில சமயம் 1 காற்றும், சில சமயம் 2, 3 காற்றுகளையும் கலந்து எடுப்படுகிறது. எடுவெல்லாம் மப்பான சாயங்காலத்தில் எடுப்படுகின்றன. ஏனென்றால் எட்ட ஜாதத்திரியாவது அல்லது மறு காளைவது சிறுமழை பெய்தால் பயிர் கண்ணாய் வருமென்று சொல்லுவார்கள்.

பாகனம், கொத்தல், களைநீக்கல் முதலியன :-

எட்டு வெகுளன் தரையில் மண்மேலிலாவிட்டால் காற்றுகள் மிகுதியாய் பட்டுப்போய் விடும். ஆக


போது பட்டுப்போன இடங்களுக்குப் புதிய நாற்றைப் போட்டுக்கவப்பிடுக்க வேண்டும். பாத்திகளும் முகடுகளும் களையெடுக்க சங்கடமன்னியில் மிசவும் ஒழுங்காயிருக்கவேண்டும். பயிர் வேர் ஊன்றுகிறவரையில் தினம் ஒருதரம் அல்லது இரண்டு நாளைக்கொருதரம் ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். பிறகு மழையில்லாத காலத்தில் 8 நாளைக்கொருதரம் அல்லது 10 நாளைக்கொருதரமாவது ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். நட்டு 15 நாளைக்கெல்லாம் ஒரு கொத்தலும், 45 நாளைக்கெல்லாம் ஒரு கொத்தலும், பிறகு ஒரு கொத்தலும், ஆகமொத்தம் மூன்று கொத்தல் கொத்த வேண்டும். இரண்டாங் கொத்தலில் மண்ணைத் து உரமணைப் பது திறம். தோல் கிடங்கு எருவையாவது அல்லது குதிரையாக் து எருவையாவது அல்லது பொட்டிலுப்புகரைத்த ஜலத்தையாவது உரமாக அணைப்பது திறம். கொட்டைப்பிண்ணுக்கு உரமும் அணைக்கலாம். கொட்டைப் பிண்ணுக்கு 600 பவுண்டு முதல் 1,000 பவுண்டு வரை தூளாக்கிப் பிற்றுக்கு அணைத்து, சரிவரபாசனம் பண்ணிக்கொண்டு வந்தால் மூன்று அறுப்பு கண்டு முதல் எடுக்கலாம்.

வயசு, அறுப்பு, கண்டுமுதல், முதலியன: —

இது புஞ்சையில் சுமார் சராசரியில் 6 மாதத்துப் பயிராய் வைத்துக்கொண்டாலும், இறவையில் 9 மாதம் வரையில் பலனை அடிக்கடி அடையலாம். நட்டு மூன்று மாதத்திற்கெல்லாம் முதல் பலனையடைய

லாம். இறவையில் பூமியை சரிவர பாசனம்பண்ணி வந்தால், மூன்று மாதகாலத்தில் 4 அல்லது 5 தடவைக்குக் குறையாமல் மிளகாயைக் கிள்ளலாம். பச்சை மிளகாய்க்கு எங்கு அதிக கிராக்கி இருக்கிறதோ, அவ்விடத்திலெல்லாம் ஆரம்பத்தில் மாதம் 3 தரம் கிள்ளி விற்பாட்டலாம். பிற்பாடு மாதம் இரண்டு அல்லது ஒருதரம்தான் கிள்ள வேண்டும். பழுத்த மிளகாயை மூன்றுதடவையோ அல்லது பழுக்கும் போதெல்லாமோ, பறித்துக்கொண்டு வரவேண்டும். ஆகஸ்டு கடைசியில் நட்டது நவம்பர் கடைசியில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரியில் 4, 5 தடவை பழுத்த மிளகாயைப் பறிக்கலாம். ஏகா ஒன்றுக்கு சுமார் 6,000 முதல் 9,000 பவுண்டு வரையில் பச்சை மிளகாய் கிடைக்கும். அதாவது சுமார் 12 முதல் 18 கண்டியாகும். பழுத்த மிளகாயை வெய்யிலில் காயவைத்தால் நரம் சுண்டி ஏகா ஒன்றுக்கு மூன்று முதல் 4 கண்டி மிளகாய் வற்றல் கிடைக்கும். இதன் விலை சுமார் 150 முதல் 200 ரூபாய்வரையி லிருக்கும். சாகுபடிச் செலவு சுமார் ரூபாய் 100 போனாலும், ஏகா ஒன்றுக்கு செலவெல்லாம்போக 50 முதல் ரூபாய் 100 வரையில் மீறும். மிளகாய்வற்றலைப் பட்டம் பண்ணின பிற்பாடு சாக்கில் தைத்து மூட்டை மூட்டையாய் விலைக்கு விற்பனையெவர்கள்.

கொத்துமல்லி.



கொத்துமல்லிப் பயிர்.

கொத்துமல்லி.

237

பயிர் கபாவம்:—

இது ஒரு சுலா அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர். இது ஒரு மாரிகாவப்பயிர். இது விதைக்காகவும், இலைக் காகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

பூம்:—

இது பருத்திப்பயிரிடும் கரிசல்காட்டில் நன்றாய் வருகிறது. பொதுவாக கரிசலிலே நன்றாய் வருகிறதாம். தோட்டக்காலிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. தோட்டக்காலில் தனிமையிலும், கரிசலில் உப்பம் பருத்தியோடும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறதாம்.

செய்நேர்த்தி:—

அக்டோபரில், முத்தியே செய்நேர்த்தி செய்திருக்கப்பட்ட பூவியை, மறுபடியும் ஒரு தாம் உழுது ஏகர் 1க்கு 10 பவுண்டு விதை வீதம் தெளித்தால் ஜனவரியில் பயிர் முதிர்ந்துவிடுமாம். தோட்டக்காலில் ஜூனில் அதே அளவு தெளித்து செப்டெம்பரில் முதிர்ந்து விடுமாம். தோட்டக்காலில் வாரம் ஒரு தாம் வீதம் மொத்தம் 6, 7 தரத்துக்குக் குறையாமல் தண்ணீர் பாய்ச்கவார்களாம்.

வயது, கண்டுமுதல்:—

இது சுமார் 3 மாதத்துப்பயிர். தோட்டக்காலில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 300 பவுண்டு விதை கிடைக்குமாம். பருத்தியோடு கலந்து சாகுபடி செய்தால் சுமார் 200 பவுண்டுதான் கிடைக்குமாம். அதாவது

238 சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும்பயிர்கள்.

பருத்தியினுடைய சாகுபடிச் செலவை எடுபண்ணி விடுமாம்.

பிரயோசனம்:—

இதை ஒரு கீரைப்பயிராக உண்டாக்கி இதன் இலைகள் தினம் உணவில் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஆகையால் இதை ஒரு கறிகாப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். இதின் விதை ஒளவுதங்களில் ஏராளமாய் பிரயோசனப்படுத்தப்படுகின்றது. விதையில் 100 க்கு சுமார் ஒரு பங்கு ஒரு நிலை இல்லா எண்ணெய் எடுக்கலாம். மகமதியர்கள் அம்மையினால் கண் கெட்டுப்போகாம னிருக்கிறதற்காக, இவ்விதையிலிருந்து கண் சுத்தம் செய்கிற மருத்தை உண்டாக்குகிறார்கள்.

ஜீரகம்.



மலை ஜீரகம்.

பயிரின் சுபாவம்:—

இது ஒரு சுவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர். இது சுமார் 1½ அடி உயரமிருக்கும்.

பூம்:—

செம்மண்ணில் நன்றாய் வரும். பாதிக்கனி, பாதி மணல் சம்பந்தப்பட்ட களிமண் பூமி யினும் வரும்.

செய்நேரித்தி:—

இதற்கு 7 உழவுக்குக் குறையாமல் உழுது, கட்டி. கள் உடைபடவேண்டியதற்காக பெரும் பலகைகளை கட்டி, இழுத்து, ஏகர் 1க்கு சுமார் 10 வண்டிக்குக் குறையாமல் மாட்டுச்சாணம் உரம்கொடுத்து, பிறகு கொள்ளு கலப்பையால் உழுது, பிறகு பரம்புப்பலகை யால் சம்பப்பித்தி, பாத்திகள் கட்டி பாசனத்துக்காக கண்ணிகள் ஏற்படுத்திவிட வேண்டும்.

விதையின் அளவு, காலம் முதலியன:—

ஏகர் 1க்கு 12 பட்டணம் படி அல்லது 1 மணங்கு விதை வீதம் அடர்த்தியாய் தெளித்து, மண்ணுல்மூடி விடவேண்டுமாம். இப்படி மூடி 5 நாளைக்குப் பிறகு ஒரு பாசனம் கொடுக்கவேண்டுமாம். இப்படிக் கொடி த்தால் தெளித்த 11 நாளைக்கெல்லாம் முளைகாணு மாம். ஜனவரி ஆரம்பத்தில் தெளிக்கப்படுகிறதாம்.

பூச் செய்நேரித்தி:—

வாரத்துக்கு ஒரு தண்ணீர் பயிர் பூக்கிறவரையில் பாய்ச்சிக்கொண்டு வரவேண்டுமாம். விதைத்து ஒரு

மாதத்துக்கெல்லாம் வாய்ப்பிருந்தபடியே களைகளை எடுத்திவிட வேண்டும். இப்பயிருக்கு அதிக நோவு கொடி உண்டாகக் கூடியதாதலால் நோவுகொடி வரா மல் கவனமாகக் காருபடி செய்யவேண்டும்.

வயசு, அறுப்பு, களைமுதல் முதலியன:—

இது சுமார் 2½ மாதத்துப் படி ஜீரகம் நன்றாய் பழுத்து அரைப்பதமாய்க் காய்த்திருக்கையில் வேரு பின் பயிரைப் பிடுவதி கட்டாகக்கட்டி களத்திற்குக் கொண்டுபோய்காயவைக்கப்படுகின்றன. காயும்போது அடிக்கடி திரும்பிக்கொடுத்து நன்றாகக் காயவைக்கப் பட்டு பிறகு தடிக்காம்பாஸடித்து பிறகு மாட்டுப் பிணை யல்லாது அடிதடி பிறகு விதை தூற்றப்பட்டு ஏகர் 1க்கு சுமார் 20 மணங்கு விதை கண்டுமுதல் செய்யப் படுகிறதாம். மணங்கு 1க்கு சுமார் ரூபாய் 6 வீதம் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 120 வருமானம் ஆகிறது. நோய்கொடி இல்லாவிட்டால் நல்ல லாபம் கொடுக்கக் கூடிய பயிர்தான். இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு கண்டு முதல் கிடைக்காதாம். இதில் காருபடி செலவுபோக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 50 மிஞ்சுமாம்.

கடுகு.



கடுகுப் பயிர்.

கடு=காரம், கடுகு=காரமுள்ள பொருள். கடுகு சிறுத்தால் காரம் போகுமா என்பது பழமொழி.

இது சுணை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர். இதில் வெள்ளைக்கடுகு என்றும் கருப்புக் கடுகென்றும் இரண்டு வகைகள் உண்டு. இந்த இரண்டு தினுசு விறைததனும் வைத்தியத்திலும் சமையலிலேயும் பிரயோகனப்படுகின்றன. இதனுடைய இளம்பயிரை கீரை யாக சமையல் செய்து சாப்பிடலாம். கடுகை, கறி, குழம்பு முதலியவைகளில் பொரித்துக் கொட்டுவார்கள். வைத்திய சாஸ்திரத்தில் கறிகாய் முதலிய பதார்த்தங்களில் உள்ள கெடுதல்களை நீக்கவும் சரீரத்தை ஆரோக்கியமாய் வைப்பதற்கும் கடுகு பொரித்துக்கொட்ட வேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை ஒரு தைலவிறைப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது அபூர்வமாய் தனிமையில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இது கோதுமை பட்டாணியோடு கலந்து சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. அநேகமாய் வயல்களாகளில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. ஏகர் 1க்கு சுமார் 3 பவுண்டு வீதம் அக்டோபர் மாதக்கடைசியில் தெளித்து பிப்ரவரிமாதக் கடைசியிலாவது அல்லது மார்ச்சு மாத ஆரம்பத்திலாவது அறுவடை செய்யப்படுகிறது. ஏகர் 1க்கு சுமார் 300 பவுண்டு கடுகு கிடைக்கும். மாட்டுத் தீனி கம்மிப்பட்டால் வடஇந்தியாவில் ஜனவரி, பிப்ரவரியில் பயிர் பசுமையா யிருக்கும்போது அறுத்து மாட்டுக்குத் தீனி

யாக்குகிறார்கள். கடுகுவிருந்து எண்ணெய் இறுக்கப் படுகிறது. வட இத்தியாவில் கடுகு எண்ணெயைத் தான் உடம்புக்கு தேய்த்துக்குளிப்பது வழக்கம். சமையலில் பொரிப்பதற்கும் தாளித்துக்கொட்டுவதற்கும் இந்த எண்ணெயை உபயோகப் படுத்துவது முண்டு. கடுகில் ஒரு காரமுள்ள வஸ்து இருக்கிறது. இந்த காரமுள்ள வஸ்துவை ஒரு நிலை இல்லா எண்ணெயாகப் பிரிக்கலாம். அதவாது ஜலத்தோடு கடுகை அரைத்து ஜலத்தில் கொதிப்பித்து, ஆவியை ஒரு வாளியில் லீங்கி குளிரச்செய்தால், இக்காரமுள்ள நிலை இல்லா எண்ணெய் உண்டாகும். ஜலத்தோடு சம்பந்தமில்லாத வரையில் இந்த நிலை இல்லா எண்ணெய் உண்டாகாது. அப்போது நிலை உள்ள எண்ணெய் தான் உண்டாகும். ஆகையால் கடுகிலிருந்து நிலை உள்ள எண்ணெயும் நிலை இல்லா எண்ணெயும் உண்டாக்கலாம். இந்த இரண்டுவித எண்ணெயும் கருப்புக்கடுகிலிருந்து தான் உண்டாகும். வெள்ளைக் கடுகிலிருந்து உடம்பில் தேய்த்துக்கொள்ளும் எண்ணெய் தான் உண்டாகும். கடுகுப்பொடியை மாலாக வைத்துக்கட்டி வைத்தியத்தில் பிரயோசனப்படுத்துவது முண்டு.

இங்கிலீஷ் கடுகாய்களாகிய டர்ஸிப், முள்ளங்கி, நோல்கோஸ், காபேஜ், காலிபனவர், இவைகள் கடுகு, ஜாதியைச்சேர்ந்தவை.

பாக்கு மரம்:

பயிர் சுபாவம்:—

இதை ஒரு பழவகைப் பயிராகவும் கொள்ளலாம். சமுத்திரத்திற்கு வெகுதூரத்திலுள்ள இடங்களில் இது நன்றாய் வளராது. இது அதிகமழையுள்ள இடங்களில் வீர்த்தியாகும். பாக்குத்தோட்டத்தில், மிளகு, ஏலக்காய் சாகுபடி சாதாரணம். நமது இராஜகானியில் மலையாளப் பக்கங்களில் இதன் சாகுபடி ஜாஸ்தி.

தகுந்த பூமிகள்:—

இதை கல்ல குளிர்ந்த இடங்களிலும், ஜலத்தட்டேயில்லாத இடங்களிலும் தான் உண்டாக்கலாம். இது வாசனைச் சாக்கு உண்டாகும் தோட்டங்களில் ஏராளமாயிருக்கும். வெற்றிலைக் கொடிக்கால் பூமியில்கன்றாய் வளரும். படுகை நிலங்களிலும் உண்டாக்கலாம். பூமியானது பாதிக்கி, பாதிமணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியாயிருக்கவேண்டும்.

நாற்றங்கால்:—

பூமியை வெட்டி வாங்கி, தூவாளியாக்கி, சுத்தப்படுத்தி, மடித்த சாகுசீனினை உரப்படுத்தி, அதில் வயதான மரத்திலிருந்துண்டான முதிர்ந்த பாக்குப் பழங்களைப் பொறுக்கி, எப்பால் மாதத்தில் 9 அங்குல வித்தியாகத்தில் புதைக்கப்படுகின்றன. நாற்றங்காலை எப்

போதும் ஈரமாய்வைத்திருக்கவேண்டும். ஒன்றுமாதத் தில் தளிர்காணும். அக்டோபர் மாதத்தில் பாக்குக் கன்றுகள் தோட்டத்தில் கரிவான இடங்களிலாவது, கண்ணிக்கரைகளிலாவது 2 அடி வித்தியாசத்தில் நடப் படுகின்றன. செய்கோத்தி செய்திருக்கப்பட்ட தோட் டத்தில் பிடுங்கி நடுகிறவரையில், இப்படியேயிருக்கும். இந்த இளங்கன்றுகள் சுமார் 3, 4 வருஷத்தில் பிடுங்கி நடப்படும்.

தோட்டம் :-

பூமியைக் கொத்தி, கிரவி, சிறுகிடங்குகள் 12 அல் லது 15 அடி வித்தியாசத்தில் வெட்டி, நாலுபக்கத்தி லும் பெரிய கிடங்குகள் வெட்டி, இந்தப்படி வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தி, இரண்டு கிடங்குகளுக்கும், நடுவில் வாழைகளைக் கிடங்குகள் ஓரமாய் உண்டாக்கிவைத் திருப்பார்கள். வாழை கொஞ்சம் வளர்த்து கிழல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும்போது, 2½ அடி ஆழம் 3 சதுர அடி அகலமுள்ள குழிகளில் தழை முதலிய எருக் களைப்போட்டு 4, 5 அடி உயரமுள்ளவும் 3, 4 வரு ஷம் வயதானவைகளுமான பாக்குக்கன்றுகளைப் பிடு ங்கி நடவேண்டும். இப்படி 6 அடி முதல் 8 அடிக் கொருதாம், குழிகளில் நடப் பிற்பாடு, வாழை கொ ஞ்சநாள் இருக்கும். பிறகு வாழையை நீக்கி, இர ண்டு கன்றுகளுக்கு நடுவில் ஏலக்காய்ப்பயிரை உண் டாக்கி, பாக்குக்கன்றுகளினடியிலிருந்து மிளகுக்கொ டிகளைப் பாக்கு மரத்தில் படர்த்தோடும்படி செய்கி

றார்கள். இப்படி ஏகர் ஒன்றுக்கு சுமார் 700 கன்று கள் புதைக்கப்படும். நட்டு 6 வருஷத்திற்கெல்லாம் அதாவது சுமார் 10 வயதிற்குட்போது, காய்க்க ஆரம்பிக்கும். வருஷத்திற்கு இரண்டு கொத்தலும் ஒரு ஏரு அணைப்பும் கொடுக்கவேண்டும்.

வயது, கண்டுமுதல் முதலியன :-

பாக்குமரம் சுமார் 50 வருஷம் வரையில் காய்க்கும். 10 வருஷம் முதல் 30, 40 வருஷம் வரையில்தான் நல்ல காய்ப்பு. 1 மரம் சராசரியில் 2 குலை பழம் கொடுக்கும். சிலசமயம் 3, 4 குலைகளும் கொடுக்கும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உரம் ஜாஸ்தி கொடுத்து மழை யும் ஜாஸ்தியாய், அல்லளவுக்கல்லளவு குலை பெருத் திருக்கும். ஒரு நல்ல குலையில் 200 முதல் 300 கொட்டைப் பாக்கு கிடைக்கும். கிரம்ப சிலாக்கிய மான குலையில் 400 பாக்குகளும் கிடைக்கும். மார் ச்சு, ஏப்ரலில் பூத்து நவம்பர், டிசம்பரில் குலை பழுக் கும். இரண்டு நல்ல குலைகளிருந்தால் 2, 3 மட்ட மான குலைகளு மிருக்கும். பட்டைகளைத் தைத்து பாக்கு மழையில் அடிபட்டு அழுகிப்போகாம லிருக் கும்படி அவைகளால் மூடிவைப்பது வழக்கம். சரா சரியில் ஒரு மரத்துக்கு வருஷம் ஒன்றுக்கு 8 அணு வீதம் கிடைக்கும். மரம் ஏறகிறவன், 1 தரம் மரத் தில் ஏறிவிட்டால், பிற்பாடு அவன் இரண்டு மூன்று தடவை. ஒருமரத்தி லிருந்தபடியே சாதாரியமாய் இன் னுமொரு மரத்திற்குத் தாவி, ஊஞ்சலாடிக் குலைகளை

வெட்டிக்கொண்டே போவான். பாக்குப் பட்டைகளைத் தைக்கிறதும், மரத்திலேயே குலைகளை மூடுகிறதும், கீழே இறங்காமல் குலைகளை மரத்துக்கு மாம்தாவி வெட்டுகிறதும், இந்த வேலைகளெல்லாம் அது போகசாவிதளாலேயே நடத்தப்படுகின்றன.

கோட்டைப்பாக்குண்டாக் கும் விதம் :—

பாக்குப்பழம் ஒரு குலையில் அடியிலிருந்து துளிக் குப்பழுத்துக்கொண்டு போகிறது. ஆகையால் ஒரு குலையில் சிலது பழுத்தும் சிலது பழுக்காததுமா இருக்கும். அவைகளில் பழுத்ததெல்லாவற்றையும் எடுத்து மேல் மட்டையை அரிவாளால் உரித்து, சுறாண்டி, பச்சைப் பாக்கு எடுக்கப்படுகிறது. பிறகு இரண்டு மணி சாவகாசம், ஒரு கையளவு சுண்ணாம்பு கலந்த ஜலத்தில், கண்ணுளிகள் வெண்பருகிறவரையில், வேகவைக்கப்படுகிறது. பிறகு எடுத்து வெயிலில் காயவைத்து மூன்று மாதிரியாய் பிரித்து வைக்கிறார்கள். கன்றாய் பழுத்தவைகளை ஒரு தினசாகவும், பழுக்காதவைகளை ஒரு தினசாகவும், தனித்தனியே பிரித்து விலைக்கு விற்பார்கள். பாக்கு வேகவைத்த ஜலத்திற்குப் பாக்குக் குழம்பு என்று பெயர். இந்தக் குழம்பை, வேகவைக்க ஜலத்துடன் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துவார்கள். குழம்பு கிரம்ப கெட்டிப்பட்டுப் போய்விட்டால் அது ஒருவித சாயச்சாக்காகும்.

மிளகு.



மிளகு கோடி.

பயிரின் சுபாவம்:—

இது ஒரு கொடி. இது மலையாளப்பக்கங்களில் காட்டில் வளர்க்குமா யிருக்கிறது. இந்தக் கொடி நிரம்ப தூரம் ஒடும். பாக்குமாங்களில் இக்கொடியை ஓட விடுவார்கள். இது 100 அங்குலம் மழை பெய்யும் படியான இடங்களில்தான் நன்றாய்வரும். எங்கெங்கே ஊன்றுகோல் ஏற்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் நன்றாய்ப்படும்.

நன்கு பூமிகள்:—

இது குளிர்ந்த கிழனுள்ள கைப்பான பாக்குத்தோட்டங்களில் நன்றாய்வரும். கழுக்குரும், எலக்காய்ப் பயிருக்கும் பொருந்திய பூமி இதற்கும் ஒவ்வும்.

சாகுபடி:—

பாக்குத்தோட்டங்களில் கழுக்கு ரட்டு 7, 8 வருஷத்துக்கெல்லாம் அம்மாவங்களில் மிளகு கொடி ஏற்றப்படுகிறது. மிளகு கொடி பதியன்களினால் உண்டாகப்படுகின்றது. ஒரு நல்ல கோவற்ற, நீண்ட, முதிர்ந்த கொடியை எடுத்துப்பதியன்களாக வெட்டி, ஒரு மரத்திற்கு 2 பதியன்கள் வீதம் ஒவ்வொருகழுக்கமரத்தடியிலும், ரட்டு விடுவார்கள். இப்படி பாக்குத்தோட்டங்களில் ஜூன், ஜூலியில் நடப்படுகின்றனவாம் கொடிகள் ஓடி கிளைகள் விட்டிருக்கையில், அவைகளை நாரினால் மரத்தோடு கட்டிவிடவேண்டும். ஓடிக்கொருதரம் கட்டப்படுகிறது. சில நல்ல தோட்டங்களில் வருஷாவருஷம் துளியில் ஒருதரமும், அடியில்

2 தரமும் கட்டப்படுகின்றன. இளங்கொடிகளை அடிக் கடி கட்டிம்படியாயிருக்கும். வருஷத்திற்கு 5 அடிக் குச் குறையாமல் உயர்ந்து கொண்டிப்போகும். ரட்டு 3 வருஷத்திற்கு, வருஷாவருஷம் நல்ல மடித்த சாணம், மடித்ததழை, சாகு இலை, கிளை, முதலியவைகளை உம்மாக அணைத்துவந்தால், கொடிகள் வளமாய் ஓடி நன்றாய் கிளைகள் விடுமாம். மேற்படி இலை, தழை, கிளை, சாகு முதலியவைகளை, மாடுகளுக்குப் படுக்கையாகப்போட்டு, இப்படுக்கையையும் மூத்திரம் சாணம் முதலியவற்றையும் தினம் ஒரு குழியில் போட்டு, இவைகளினால்லாம் மக்கினவுடன் மேற்படி மிளகு, எலக்காய், கழுக்குமுதலிய பயிர்களுக்கு உரமாகக்கொடுக்கப் படுகின்றனவாம். ஒரு நல்ல முதிர்ந்த கொடிக்கால் தோட்டத்தில் 1 மிளகு கொடி 15 முதல் 20 அடி வரையில் ஓடி இருக்கும். இக்கொடி குறுக்கில் 1½ அடி நீளத்தில் கிளைகள் விட்டு, இலைகளுடன் ஆடர்த்தியாயிருக்கும். ஒரு கொடிக்கால் ரட்டு மூன்று நான்கு வருஷம் வரையில் காய்க்கும். இப்படி பழைய கொடிகளை எடுத்து, கழுக்கு மரத்துக்குக்கீழ் பதியன்கள் ரட்டு உண்டாக்கிக்கொண்டே இருந்தால், ஒரு மிளகுத்தோட்டம் வெகு நாள் வரையில் பலனைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும். ஜூன், ஆகஸ்ட்டில், பூக்க ஆரம்பித்து மாஸ்சில் சிறுகாய்கள் பழுக்க ஆரம்பிக்கும். எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உரம் ஜாஸ்திகொடுத்து மழையும் ஜாஸ்தியாயிருக்கிறதோ, அவ்வளவுக்கவ

252 கவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிர்கள்.

வளவு கண்டுமுதலும் ஜூன், ஜூன், ஜூலைமீல் அவசியம் மழை வேண்டுகாம். ஆனால் கனத்த பெரிய மழை கூடாது.

கண்டுமுதல்:—

ஒரு கொடி சுமார் 1,000 குலை கொடுக்குமாம். குலைகள் பருமனின் வித்தியாசப்பட்டாலும், இந்த 1,000 குலைகளுக்கும் சுமார் 168 ரூபாய் எடையுள்ள காய்ந்த மிளகைக் கொடுக்குமாம். அதாவது, சுமார் 7 செர். ஒன்றைமுதலில் எணிகளினால் அதாவது, குறுக்குக் கொடி கொடி எண்பது மாதங்கலாய் ஏற்படுத்தி, குலைகள் பயிர்க்கப்படுகின்றன.

விலைக்குத் தயார் செய்யும் மிளகு:—

கன்றாய்ப் பழுத்த குலைகளினால்லாம் ஒருமாதிரியாகவும், பாக்கி ஒருமாதிரியாகவும், தரங்கட்டிப் பிரிக்கப் படுகின்றன. இப்படி பிரித்தவுடன் 7, 8 காளைக்குத் தண்ணீரில் கலைய வைத்தோ, அல்லது குவியலாய் வைத்தோ, கையால் தேய்த்து அல்லது துளியால் தேய்த்து, அல்லது காலால்மிதித்து, மேல்தரை நீக்கப் படுகிறது. ஒடுகிற தண்ணீரில் பிசுறி மேல்தரையை நீக்கலாம். பிறகு ஒருவாசல் வெய்யிலில் காயப்போட்டு, வெள்ளைமிளகு உண்டாக்கப்படுகிறது. கறுப்பு மிளகுதான் முக்கியம். மிளகுக்குலைகள் தரங்கட்டிப் பிரிக்கப்பட்டால் 4 காளைக்குக் குவியல்களாகப் போட்டிருந்து, கையால் பிசுறிக் கசக்கப்பட்டு, பாப்பி வெய்யிலில் காயவைக்கப்படுகின்றன. இவைகளுக்குத் தான்

• மிளகு •

253

கறுப்பு மிளகு என்று பெயர். வெள்ளை மிளகு மணங்கு ஒன்றுக்கு ரூபாய் 10 விலை. கறுப்பு மிளகு மணங்கு ஒன்றுக்கு சுமார் ரூபாய் 8 விலை.

ஏலக்காய்.

பயிர்ச் சுபாவம்:—

இது ஒரு கிரந்தரமான பூண்டு. இது சுமார் 6 அடி உயரமிருக்கும். இது மஞ்சள்போல கிழங்கிலிருந்துண்டாகிறது. நைப்புள்ள வளமான காட்டுப்பூமிகளில் ஏராளமாய் காணப்படும். பரிலா விதையிலிருந்தும், கிழங்கிலிருந்தும் உண்டாக்கலாம். இது பாக்குத் தோட்டங்களிலும், மிளகு கொடிக்காலிலும், ஏராளமாகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

நூற்றுக்காய்கள்:—

நிழலுள்ள குளுமையான தோட்டத்தில் நைப்புள்ள பூமியில் கன்றுய்வரும். பாதிமணல் பாதிகளில் சம்பந்தமுள்ள பூமியிலும், மணல் சம்பந்தமுள்ள களி நிலத்திலும், நா நைப்புள்ளதாய் வைத்திருந்தால், அவ்வித பூமிகள் சிலாக்கியம் தான். தோட்டம், பெருங்காற்றின் உபத்திரவத்தைத் தடுக்கும்பொருட்டு கன்றுய் வேலியால் அடைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும். நிழலில் லாவிட்டால் நிழல் கொடுக்கக்கூடிய மரங்களை விருத்தி பண்ண வேண்டும்.

நாற்றங்கால்:—

நாற்றங்காலை வெட்டி வாங்கி நல்ல மடித்த காய்க்காய் சாகு உரத்தினால் உரப்படுத்தி, 8 அடி நீளம், 4 அடி அகலமுள்ள பாத்திகளில், பாத்தி ஒன்றுக்கு 2 ரூபாய்

இடையுள்ள விதை தெளிக்கப்படுகிறது. விதை மிகவும் சிறிதாகையால், ஒத்தாப்போல் தெளிப்பதற்குச் சாம்பலோடு கலந்து தெளிக்க வேண்டும். தெளிப்பதற்கு முன்னால் அதை முளைக்கப்பண்ணிப் பிறதும் தெளிக்கலாம். இல்லாவிடில், சாதாரணமாய் தெளித்தால் முளைகாண ஒருமாதம் செல்லுமாம். செப்டம்பர், அக்டோபரில் விதை தெளிக்கப்படுகிறது. நாற்றங்காலுக்கு வெய்யில், மழை முதலிய துன்பத்தைத் தடுக்க முன்று, நாலு அடி உயரத்தில பந்தல்போட்டு வைக்கவேண்டும். நாற்றங்காலுக்கு இலை, கிளைகளினால் மூட்டம்போட்டு வைக்கவேண்டும். நாற்றுகள் அடர்த்தியாயிருந்தால் கலக்கப் பண்ணவேண்டும். இப்படி நாற்றுகள் சுமார் 4, 5 மாதமிருக்கும். இப்படி இருக்கையில், எப்போதும் நைப்பாயிருக்கவேண்டும். முதலில் இப்படி 4 மாதத்திற்கெல்லாம், நாற்றுகள் பிடுங்கப்பட்டு, தோட்டத்திற்குச் சமீபத்திலுள்ள கெவ்வயலில் முகடுகளும் கண்ணிகளாக ஏற்படுத்தி, முகடுகளில் சுமார் 1 அடி வித்தியாசத்தில் 2 வரிசையாக நாற்றுகள் நடப்படுகின்றன. முகடுகள் சுமார் 2 அடி வித்தியாசத்தி லிருக்கும். இந்த 2வது நாற்றங்காலின்பேரில் நிழலுக்காக பந்தல் போட்டு வைத்திருப்பார்கள். கண்ணிகளின் வழியாய் எப்போதும் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். ஆகையால் முகடுகள் எப்போதும் நைப்பாயிருக்கும். இப்படி 2வது நாற்றங்காலில் சுமார் 15 மாதம் முதல்

18 மாதம் வரையில் நாற்றுகள் இருக்குமாம். அப் போது நாற்றுகள் சுமார் 4 அடி உயரமிருக்கும்.


தோட்டம்:—

இப்படித்தயார் செய்திருக்கப்பட்ட நாற்றுகளைப் பாக்குத்தோட்டங்களில், மாச்சு முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலாவது, அல்லது செப்டம்பர், அக்டோபரிலாவது பிடுங்கி, பாக்கு மரங்களுக்கு நடுவில் நடுகிறார்கள். $1\frac{1}{2}$ அடி ஆழம் $1\frac{1}{2}$ அடி அகலமுள்ள குழியில் மக்கின சரக்குகளை மண்ணுடன் போட்டு நிரப்பி நாற்றை நடவேண்டும். சிலசமயம் பயிர்க்கொத்துகளை, எடுத்து கிழங்கைச் சிறுதுண்டாக்கி, அந்த இலையோடேயே $1\frac{1}{2}$ அடி ஆழம் $1\frac{1}{2}$ அடி அகலமுள்ள குழிகளில் புதைப்பார்களாம். கிழங்குகளை அதிக ஆழத்தில் புதைக்கக்கூடாதாம். மேலோடு புதைத்துக் கொஞ்சம் மண்ணைத் தூவி விடவேண்டுமாம். இப்படி புதைத்தவுடன் ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு குச்சியை நட்டு இலைகள் காற்றினாலும், மழையாலும், கிழிந்து கீழே விழுந்து விடாமலிருக்கும்படி வநழைவாரால் இலைகளைக்கட்டி விடுவார்களாம். ஒரு ஏக்கருக்கு 300 முதல் 400 செடிவரையிலிருக்குமாம். இதற்கு வருஷாவருஷம் வெட்டிவாங்கிக்கொத்தலும், மக்கின சரக்குகளால் உரமணைத்தலும் வேண்டுமாம். நட்டு 1 வருஷத்திற்கெல்லாம் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். முதல் வருஷம் அதிக வரும்படி கிடைக்காதாம். நட்டபிறகு ஏப்ரல், மேமாதத்தில் அங்குமிங்குமாய்ப் பூக்க ஆரம்பித்

து, ஜூன், ஜூலையில் காய்கள் உண்டாகி, செப்டெம்பர், அக்டோபரில் பழுக்குமாம். பசுமையிலிருந்து காய்கள் மஞ்சள் நிறமாய் மாறும்பொழுது பழுத்ததாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமாம். அதிகமாக பழுக்கிற வரையில் வைத்திருந்தால் காய்கள் வெடித்துப்போய் விடுமாம். கிள்ளும்போது காய்ப்புடனே கிள்ளவேண்டும். இல்லாவிட்டால் வெடித்துப்போய்விடுமாம். காய்களை எல்லாம் கிள்ளி வெயிலில் 2, 3 நாள் காயவைத்து, காய்த்தவுடன் விலைக்குத் தயாராக்கப்படுகின்றன. ஒரு கல்ல செடியிலிருந்து சுமார் $\frac{1}{2}$ பவுண்டு காய்த்த ஏலக்காய் கிடைக்கும். சராசரியில் 1 செடிக்கு காய்த்த காய் 4 தோலாதான் கிடைக்குமாம். 48 சேர் கொண்ட ஒரு அணங்கு 40 முதல் 75 ரூபாய் வரையில் விலைபோகிறதாம்.

ஏலக்காயை பக்குவம் பண்ணும் விதம்:—

பழுத்த ஏலக்காய்களை சீயக்காயும், சோப்புத் தண்ணீரும் கலந்த ஜலத்தில் போட்டு பிசறி எடுத்து, மறுபடி இன்னுமொருதரம் இப்படியே சோப்பு ஜலத்தில் சுத்தப்படுத்தி, ஜலம் வடிந்த பிறகு பாயில் பரப்பி 4, 5 மணி நேரம் வெயிலில் காயவைக்கப்படுகின்றன. பிறகு சிறு காய்களை எல்லாம் நறுக்கி, தாங்கட்டிப் பிரித்து விலைக்குத் தயாராக்குகிறார்கள். இப்போது அரிசி, கோதுமை, சோப்பு, மோருடன் கஞ்சி உண்டாக்கி, அவைகளைக் கொஞ்சமாய் ஜலத்தில் கரைத்து ஏலக்காயைப்பிசறி வெளுப்புண்டாக்கிக் காயவைத்து விலைக்கு விற்றுவிடுகிறார்கள்.



வெந்தயப் பயிர்.

மாரிகாலத்தில் தோட்டங்களில் கீரைப் பயிராகவும், வட இந்தியாவில் அபூர்வமாக மாட்டுத் தீனியாகவும் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதை ஒரு சுவை அதிகரிக்கச் செய்யும் பயிராகவும் கொள்ளலாம். வெந்தய விதை சமையலில் தாளித்துக் கொட்டவும், வைத்தி

யத்திலும், பிரயோசனப்படுகிறது. இளங்கீரை சமய லுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் கீரையை வதக்கி புண்ணுக்கும் வீக்கத்துக்கும், கட்டுவது முண்டு. மயிர் உதிருவதைத் தடுப்பதற்கும்; இதன் இலைகளை உபயோகப்படுத்துவது முண்டு. வெந்தய விதையைப் பொடிசெய்து மாட்டுத் தீனிக்கு உருசினை கொடுப்பதற் கும், மடித்த வைக்கோலை தீன்பதற்கு வாசனை கொடுக் கவும், உபயோகப்படுத்துவது முண்டு. பஞ்சாபில் மாட்டுத்தீனிக்காகவே சாகுபடி செய்யப்பட்டு 2, 3 தடவை அறுத்து தீவனமாகக் கொடுக்கப்படுகிறதாம். பூமியை நன்றாய் உழுது, ஏக்கர் 1க்கு 16 சேர் வீதம் விதை தெளித்து, 3 மாதத்துக்கெல்லாம் ஒரு அறுப் பும், பிறகு 4வது மாதத்தில் ஒரு அறுப்பும், 5வது மாதத்தில் ஒரு அறுப்பும், 6வது மாதத்தில் ஒரு அறுப் பும், அறுத்து மாட்டுக்கு தீவனமாக்குகிறார்கள். ஒவ் வொரு அறுப்புக்குப் பின்னும் பாசனம் செய்யவேண் டுமாம். இது நிரம்ப அழுத்தமான பயிரானதால் அதிக ரோய் டொடி உண்டாகாதாம். விதைக்காகச் சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் சுமார் 10 சேர் வரையில் தெளித்து பிப்பிரவரி, மார்ச்சில் அறு வடைசெய்தால் ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 300 பவுண்டு விதை கிடைக்கின்றதாம். தென்னாட்டில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இவ்விதையைப் பலவழியும் உபயோகப் படுத்தாத நாள் இராது. ஆதலால் இதுவும் நல்ல வரும் படி கொடுக்கும் பயிர்தான்.

கறிகாய்ப் பயிர்கள்.

கத்திரி.



கத்திரிச் செடி.

பயிரின் சுபாவம்:—

இந்தக்கறிகாய் ஒரு தோட்டப்பயிர். இது எல்லா வகுப்பு ஜனங்களாலும் சாப்பிடப்பட்டு அநேகமாய் வருஷம் முழுவதிலும் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.

இதின் வகைகளெல்லாம் காய்களின் நிறத்தையும் உருவத்தையும் பொருத்ததாயிருக்கின்றன. சிலகாய் சுமார் 10 அங்குலம் நீளம் வரையில் வளருகிறது. சில காய்கள் பெரியதாயும் உருண்டையாய் இருக்கின்றன. சிலது நெத்தரமாய் இருக்கிறது. நிறத்தில் ஊதாவும, சிகப்பும் மஞ்சளும் சேர்ந்ததும், சிகப்பும் வெள்ளையும் சேர்ந்ததும், பச்சையும் வெண்மையும் சேர்ந்ததும், சில கீரலுமுள்ளதாய் இருக்கின்றன. ஒரு நல்ல கத்திரிக்காய் கைக்கு லேசாயும் விதைபற்றதாய் இருக்கும். சாகுபடி விதம் எல்லாம் மிளகாயைப்போலத்தான். தனிமையில்தான் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. கத்திரியானது புகைபிலை, மிளகாய், உருளைக்கிழங்கு முதலிய பயிர்ஜாதியைச் சேர்ந்தது. இவைகளுக்கெல்லாம் சாம்பல் காரத்தில் பிரீதி ஜாஸ்தி. அதாவது பொட்டிலுப்பு மண்ணில் பிரீதி ஜாஸ்தி.

கத்திரியின் வகை:—

கோழிமுட்டைக்காய், செங்கழிநீர்க்காய், கொடிக்கால்காய், முள்ளிக்காய், பச்சைக்காய் எனக்காய்களில் பலவகையுண்டு. இவற்றுள் கோழிமுட்டைக்காய் சுத்த வெள்ளை நிறம் உடையதாயிருக்கும். செங்கழிநீர்க்காய் என்பதுசெம்மை அல்லது ஊதாநிறம் உடையதாய், சிலகாய்கள் உருட்சியாயும் சில நீட்சியாய் இருக்கும். முள்ளிக்காய் என்பது மிகச் சிறியதாய் முட்கள்/செடிகளிலும் காய் அடியிலும் செறிந்திருப்பதுடன் பச்சைநிற முடையதாய் இருக்கும். இதைப்

பிராமணர்கள் விசேஷமாய் கிரார்த்த தினங்களில் உபயோகிக்கிறார்கள். கொடிக்கால்காய் என்பது மிக நீளமுடையதாய் பச்சை, வெள்ளை, செகப்பு முதலிய தனித்தனி பல நிற முடையதாய் இருக்கும். பச்சைக்காய் என்பது பச்சையும், வெண்மையும் கலந்ததாய் உருண்டை, நீட்சி முதலிய பல உருவங்களுடையதாயும் இருக்கும். சில ஜாதி செடிகள் நிறைந்த முட்களை உடையதாயும், சில மூட்களே இல்லாமலும் இருக்கும்.

பூமிகள்:—

இந்திரிய வஸ்து ஜாஸ்தியாயுள்ள பாதிவளி பாதிமணல் சம்பந்தமுள்ளவளமான தளிநிலம்தான் இப்பயிருக்கு ஏற்றது. கனிநிலமாயிருக்கும் பட்சத்தில் சுபாவத்திலேயே பூமியின்கீழ்வடி கால்வசதி இருக்கவேண்டும். இவற்றைக்கிராமந்ததங்களிலும் கொல்லைகளிலும் உண்டாக்கலாம். கொடிக்கால் தோட்டங்களின் கரைகளிலும் இது உண்டாக்கப்படுகிறது.

நாற்றங்கால்:—

12 அடி நீளம் 12 அடி அகலமுள்ள 4 பாத்திகளை கன்றாய்க்கொத்தி வெட்டிவாங்கி சுத்தம்செய்து சாம்பல், மடித்த சாணம் முதலிய எருக்களால் உரப்படுத்தி, சுமார் 1 பவுண்டு விதையை மணலுடன் கலந்து ஒத்தாப்போல் அதிக நெருக்கமன்னியில் தெளித்துவிட வேண்டியது. வைக்கோல் புல் முதலியவைகளால் மூட்டம்போட்டு ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்

கொண்டுவரவேண்டும். சுமார் 6 அங்குலம் உயரமிருக்கையில் அதாவது சுற்று 6 முதல் 8 வரம் உள்ளதாயிருக்கையில் குடுங்கி நடலாம். நவம்பர் டிசம்பரில் விதை விதைக்கப்படுகிறது.

தோட்டம்:—

சுமார் 3, 4 தரம் உழுது அல்லது 1½ அடி ஆழம் நன்றாய் வெட்டி வாங்கி புல், களை, நீக்கி கட்டிசளை உடைத்து கிரவி ஏகர் 1க்கு 20 டன் மடித்தசாணத்தினாலும் சாம்பலினாலும் உரப்படுத்தி பூமிபுடன் கலந்து, பாத்திகளும் கண்ணிகளும், நடப்புப்பாதைகளும் உண்டாக்கி பாத்திகளில் முகடுகள் உண்டாக்கி முகடுகளில் சுமார் 3 அடிக்கு ஒருதரம் 2 கன்றுகள் விதம் நடவேண்டும். முகடுகள் 3 அடிக்கு ஒருதரம் இருக்கவேண்டும். சிறுதரமான செடி மாதிரிகளை இன்னும் கிட்டவும் நடலாம். மேகடைசியில் விதை தெளித்தால் ஜூலை கடைசியில் குடுங்கி நடலாம். கத்திரி விதையும் மிளகாய் விதையும் அநேக இடங்களில் நவம்பர் டிசம்பரில் விதைக்கப்பட்டு ஜனவரியில் குடுங்கி நடப்படும்.

பின் செய்நோக்கி:—

2, 3 தடவைக்குக் குறைபாமல் கொத்தி, 7, 8 தடவைக்குக் குறைபாமல் களை எடுக்கும்படி நேரிடும். மழைநாள் தவிர பாக்கி காலங்களில் வாரத்திற்கு ஒரு முறை விதம் தண்ணீர்பாய்ச்சிக்கொண்டு வரவேண்டும். பயிர் கன்றாய்வேறுன்றின பிற்பாடு கொ

த்தி மண் அணைக்கவேண்டும். 2வது 3வதுகொத்தலில் உரம் அணைக்கலாம். பொட்டிலுப்பு மண்ணை ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 500 பவுண்மீம். பிண்ணாக்காயிருந்தால் 1000 பவுண்மீம் உரம் அணைத்து மண்ணால் முடிவிட்டால் நல்ல பலனைக் கொடுக்கும்.

வயசு, கண்டு முதல் :—

இதை ஒருவருஷத்துப் பயிராகக்கொள்ளலாம். ஆகஸ்டுமாதம் முதலில் நட்டால் அக்டோபர்மாதம் கடைசியில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். ஜனவரி பிப்ரவரியில் நட்டால், ஏப்பிரல் மேயில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். அது முதல் கொண்டே அனேக மாதங்களுக்குக் காய்த்துக்கொண்டே இருக்கும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உரம், செய்கோத்தி என்றாய் இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஜாஸ்தி வரும்படி கிடைக்கும். 3, 4 நாளைக்கு ஒருதரம் பழுக்கப்பழக்க காய் பறிக்கப்படுகிறது. நல்ல பூமியில் ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 7000 பவுண்டு காய் கிடைக்கும். இதன்விலை சுமார் ரூபாய் 160 ஆகலாம். ஏக்கர் 1க்கு சாகுபடிச்செலவு சுமார் ரூபாய் 100 செல்லும். செலவெல்லாம்போக ஏக்கர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 50, 60 க்கு குறையாது வரும்படி கிடைக்கும்.

கத்திரிச்செடி மிளகாயைப்போல இலைகளும், கிளைகளும், சில விதார ரூபத்தை அடைவதும் உண்டு. அப்பேர்ப்பட்டவை-காய்க்கா. ஏதாவது பூச்சி தொந்தரவுசெய்தால் அதற்குப் பொட்டிலுப்பை ஜலத்தில் கரைத்து பயிரில் தெளித்தால் அது போய்விடும்.

குழிவெட்டி சேங்கொட்டையை எரித்து புகை உண்டாக்கினால் பூச்சி போய்விடும்.

கத்திரிப்பயிர் பண்ணின் பூமியில் அடுத்த வருஷம் கத்திரிப்பயிர் பண்ணினால் முதல்வருஷத்து வரும்படி 2வது வருஷத்தில் கிடைக்கிறதில்லை. ஆகையால் சாதாரணமாய் அதே பூமியில் ஒரு வருஷத்துக்குமேல் பயிர் செய்கிறதில்லை. சிலவேளை நல்ல உரத்தினாலும், பாசனத்தினாலும், முதல் வருஷத்துப் பயிரிலிருந்தே 2வது வருஷத்துப் பயிரும் உண்டாக்குகிறார்கள்.

தக்காளிக்காய்.

Tomatoes.

இதை ஒரு கறிகாய்ப் பயிராகவும் பழப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். நால் நேய், அஜீணம், வயிற்றுப் போக்கு முதலியவைகளை கிரம்ப சாக்தப் படுத்துமாய். கத்திரியைப் போலத்தான் இதன் சாகுபடி எல்லாம். ஆகஸ்டி செப்டெம்பரில் காற்றங்காலில் தெளிக்கப்பட்டு வாரத்துக் செல்லாம் 3 அடிக்குள்ள வரிசைகள் ஏற்படுத்தி, வரிசையிலேயே 1½ அடிக்கு ஒரு தரம் காற்றைப் பிடுங்கி நடப்படுகிறது. பயிர் வளருகையில் ஊன்றுகோல் கொடுத்து ஊன்றுகோலில் வளரவிடுவது வழக்கமுண்டு. ஊன்றுகோல் நடுவதினால் பழங்கள் சேதப்படுவதில்லை. சாகுபடியில் கவனக்குறைவு இருந்தால் காய்கிரம்ப சிறியதாய்ப் போய்விடும். பாக்கிவிஷயங்கள் எல்லாம் கத்திரியைப்போலத்தான். மலைப்பிரதேசங்களில் இப்பயிர் நன்றாய்வரும்.


கொடியிலிருந்து உண்டாகும் கறிகாய்ப் பயிர்கள்.

—:0:—

இவைகளாவன:—

பாங்கி, பூஷணி, தக்கரி, வெள்ளரி, சுரை, பிரித்தை, புடலை, பாகல் முதலியன. இந்தப் பயிர்களின் காய்கள் கறிகாய்ப் பதார்த்தமாய் உபயோகப் படுத்தப் படுகின்றன. இவைகளில் ஆண் மலரும், பெண் மலரும் தனித்தனியாக வீருக்கும். இவைகளுக்கெல்லாம் நல்ல வளமான பூமியும், ஏராளமான எருவும் எதேஷ்டமான பாசனமும் வேண்டும். விதைகளினுல்தான் இவைகள் உண்டாக்கப் படுகின்றன. இப்பயிர்களின் காய்களின் தசையில் சுசுப்பான பேதி உண்டாக்கக் கூடிய ஒரு வஸ்து இருக்கிறது. ஆகையால்தான் இக்கறிகாய்ப் பதார்த்தங்கள் நீர்வடிய வைக்கும் குணத்தை உடைத்தா யிருக்கிற தென்று சொல்லுகிறார்கள். இக்கறிகாய்ப் பயிர் சாகுபடி செய்யும் பூயிகள் மேட்டுப்பூமியாயிருக்கவேண்டும். ஆனால் கொஞ்சம் கைப்பா யிருப்பது நல்லது.

பாங்கி, பூஷணி, சுரை.



பாங்கி

பூஷணி.



பூஷணி.

சுரை.



சுரை.

இவைகள் பெரிய விள்திரணத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுவதில்லை. கிராமத்தங்களிலும் கொல்லைகளிலும் அங்குமிங்கும் குழிகள் உண்டாக்கி விதைகளை ஊன்றி கொடிகளை கூரைமேல் வளரவிடுவது வழக்கம். சில சமயங்களில் இதரப்பயிர்களுடன் கலந்து வயல்களில் தெளிப்பதுண்டு. சிலக்கடலைப்பயிர்பூக்களை பூமியில் அழுத்துவதற்காக, இவைகளை அதோடு கலந்து தெளிப்பதுண்டு. கரும்போடும் முத்துச்சோளத்தோடும் தெளிப்பதுண்டு. இந்தப்பயிர்கள் பூமியை விட்டிக் கிளம்பி நிழல்படுத்துவதற்கு முன்னால் கொடி பூமியைவிட்டி கிளம்பி விடும். ஜூலைமாதம் விதைக்கத்தகுந்த காலம். 12 அடி நீளம் 12 அடி அகலமுள்ள ஒரு கொல்லையில் 2 குழிகள் உண்டாக்கி குழிக்கு 2 விதைகள் வீதம் ஊன்றி கொடியை கூரைமேலாவது அல்லது பூமியிலாவது மேடான இடங்களில் ஒயிம்படி விட்டால் விதைத்த 4 வது மாதம் முதல் 6 வது மாதம் வரையில் காய்கள் பறிக்கலாம். சுரையும் பரங்கியும் சுமார் 5 மாதத்துப்பயிர். பூஷணி சுமார் 6 மாதத்துப்பயிர். நல்ல வளமாயிருந்தால் 144 சதுர அடிக்கு பூஷணியில் சுமார் 10 காயும், 144 சதுர அடிக்கு பரங்கியில் சுமார் 10 காயும் அதேவிள்திரணத்தில் சுரையில் சுமார் 20 காயும் கிடைக்கும். ஒரு ஏக்கருக்கு பரங்கி பூஷணியில் சுமார் 1,000 காயும் சுரையில் 1 ஏக்கருக்கு சுமார் 2,000 - 3,000 காயும் கிடைக்கலாம். பரங்கி பூஷணியில் செலவுபோக ஏக்கர் 1 க்கு சுமார் ரூபாய் 30 கிடைக்கலாம். களத்துப்பொருக்கிலும்,

வயல் கரைகளிலும் இவற்றை உண்டாக்கலாம். கரைக்காய் காய்ந்தால் ஒருவித குடுக்கைப் பாத்திரம் பண்ணலாம். வீணை முதலிய வாத்தியங்களுக்கும் பிரயோஜனப் படுகிறது.

புடவல.




புடலை.

புடலை.

273


இதுவும் சிறுபான்மையில் குறுகிய விலங்குகளில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. 144 சதா அடியில் 2 குழிகள் உண்டாக்கி குழிக்கு 4 விதை விதம் ஜூலைமாதக் கடைசியில் போட்டு ஊன்று கோல்கள் ஊன்றி, கொடிகளை வளரவிட்டு பந்தல்போட்டு வளரும்படி செய்து விட்டால், விதை ஊன்றிய 3 மாதத்துக்குல்லாம் காய்களைப் பறிக்கலாம். 144 சதா அடிக்கு சுமார் 30 காய்கள் கிடைக்கும். இது சுமார் 4 மாதத்துப்பயிர். கோடைப்புடலும் உண்டு. இதில் ஒரு மாதத்துக்கு முந்தியும் ஒருமாதத்துக்குப் பிந்தியும் இரண்டு விதைப் பாய் விதைத்தால் இன்னும் ஒருமாதம்கூட காய்த்துக் கொண்டிருக்கும். ஒரு ஏக்கர் மேட்டு பூமியில் அநேக குழிகள் போட்டு விதைகள் ஊன்றி பெரிய பந்தல் போட்டால் செலவெல்லாம் போக இதில் ஏக்கர் 1 க்கு சுமார் 30 காய்கள் கிடைக்கலாம்.

கக்கிரி.



கக்கிரி.

இதையும் ஐடி புடலைபைப் போல சாகுபடி செய் தால ஐடி விஸ்தீரணத்துக்கு சுமார் 50 காய்கள் கிடை க்கும். இது சுமார் 5 மாதத்துப் பயிர். விதை ஊன்றி 4 வது மாதம் முதல் காய்க்கும். இதற்கும் பந்தல் அவ் சியம். இதுவும் ஜூலை மாதத்தில விதைத்து நவம் பர், டிசம்பரில் கொடி அமிக்கப்படுகிறது.



வெள்ளரி.

இதை கோடைப் பழமாகவும், மாரிகாலத்துப் பழமாகவும் சாகுபடி செய்யலாம். இதன் கொடி பூயிலே யேபடரும். இது சுமார் 4 மாதத்துப் பயிர். இது 3 வது மாதம் பூக்க ஆம்பித்து 4 வது மாதம் வரையில் காய்க்கும். ஒரு ஏக்கருக்கு சுமார் 15,000 காய்கள் கிடைக்கும். இரண்டு மூன்று தடவைபாக விதைகளை விதைத்துக் கொண்டு போனால் இன்னும் 2, 3 மாதம் நீடித்துக் காய்த்துக் கொண்டிருக்கும். கோடையில் பிப்பிரவரி மாதம் கடைசியிலும், மார்ச்சுமாதமத்தியிலும், கடைசியிலும் இப்படி 3 தரம் தெளித்தால், ஏப்பிரல், மே, ஜூன், இந்த மூன்று மாதங்களில் காய்க்கும். இக்காலத்து வெள்ளரி சுற்றாக இருக்கும். ஜூலை மாதத்தில்தெளித்தால், செப்டம்பர், அக்டோபரில் காய்களைப் பறிக்கலாம். இக்காலத்துக் காய்கள் பெரிதாக இருக்கும். கோடையில் பாசனம் செய்யவேண்டும். ஒரு அடிக்கு ஒரு தரம் வரிசையாக விதைகளை ஊன்ற வேண்டும்.

பீர்க்கை.



பீர்க்கை.

இதில் 2 தினசிகள் உண்டு. அவை கரம்புள்ளதும், கரம்பில்லாததும். இது சுமார் 5 மாதத்துப் பயிர். தெளித்து 5 வது மாதம் முதல் 5 வது மாதம் வரையில் காய்க்கும். ஏகர் 1 க்கு சுமார் 30,000 காய்கள் காய்கும். ஜூலையில் தெளித்தால் செப்டெம்பர், அக்டோபரில் காய்கள் பறிக்கலாம். 2, 3 விதைப்பு விதைத்தால் இன்னும் 2, 3 மாதம் நீடித்துக் காய்க்கும். வரிசை வரிசையாக வெள்ளரியைப்போலவே தெளிக்கவேண்டும். இது மாரிகாலத்துப் பயிர். இதை மரத் தின்பேரிலாவது கூரையின் பேரிலாவது வளரவிடுவதுண்டு.

பாகல்.



பாகல்

இதில் அநேக மாதிரிகளிருக்கின்றன. எல்லாம் ஆகிருதியையும் உருவத்தையும் பொருத்ததாக இருக்கின்றன. மழைக்காலத்து மாதிரி கொம்புப் பாகலென்றும் கோடைகாலத்து மாதிரி மீதிபாகலென்றும் பெயர். கோடைப் பாகலுக்கு பூமிவளமுள்ளதாக இருக்கவேண்டும். பிப்பிரவரி மாத கடைசியிலும் மார்ச்சிலும் தெளிக்கலாம். பூமிகளில் வரிசை வரிசையாக 2 அடிக்கு ஒரு தரம் 2 விதை வீதம் ஊன்றி விடவேண்டும். பூமி கொடிகளால் மூடுகிறவரையில் வாரத்துக்கு 2 தரம் வீதமும் பிறகு வாரத்துக்கு ஒரு தரம் வீதமும் ஐலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். பிப்பிரவரிமாதக் கடைசியில் தெளித்து ஏப்பிரல் மாதக்கடைசியில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். மே, ஜூனிலும் காய்க்கும். மார்ச்சு மாதத்தில் தெளிப்பது இன்னும் ஒரு மாதம் கூடக்காய்க்கும். கொம்புப் பாகல் ஜூலை மாதத்தில் தெளித்தால் கொடிகள் படருவதற்கு ஊன்று கோல் போடுவதுண்டு. செப்டெம்பர் முதல் நவம்பர் வரையில் காய்க்கும். இது சுமார் 5 மாதத்துப் பயிர்.

பாகலின் வகை. (1) கொம்புப் பாகல். (2) மீதி பாகல். (3) காட்டுப் பாகல்.

கொம்புப் பாகல் என்பது கொம்புகளிலும், மலாறுகளிலும், பந்தல்களிலும், ஏறிப்படர்ந்து காய் நீளம் நீளமாகக் காய்ப்பது. காய் வெண்ணிறமாயும், பச்சையாயுமிருக்கும். கொம்புகளில் ஏறிப்படர்வது கொம்புப் பாகல்.

காலால் நிதிக்கப்படும் தரையில் படர்ந்து காய்ப் பது மிதிபாகல். இதன் காய் சிறியதாயும் சற்று உருண்டை வடிவமாயும் இருக்கும்.

காட்டுப் பாகல் என்பது காடுகளில்தானே முளைத்து மரம், செடி முதலியவைகளில் படர்ந்து காய்ப் பது. இதன் காயும் கொம்புப்பாகல் காய்போல இருக்கும். ஆனால் சற்றுக் கசப்பு அதிகமாயிருக்கும். இதையும் சற்செய்து சாப்பிடுவதுண்டு. இது பித்த ரோகத்தை நீக்கும் என்பர் வைத்திய நூலோர்.

பட்டாணி.



பட்டாணி.

284 கற்காய்ப் பயிர்கள்.

இது வெள்ளைப்பூக்களுடன் ஒடும் ஒரு கொடிச் செடி. இதில் வெள்ளைப்பட்டாணி என்றும், பச்சைப்பட்டாணி என்றும் 2 மாதிரிகளுண்டு. இது மாசிகாலத்துப்பியர், செப்டெம்பர், அக்டோபரில் தெளித்து மார்ச்சில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. உளுந்து, அவரை, கொள்கு. இவைகளைப்போலத்தான் இதுவும் களிமூட்டில் உண்டாக்கப்படுகின்றது. ஆனால் நல்லவாகால்வசதியுள்ளதா யிருக்கவேண்டும். ஏகர் 1க்கு 25 முதல் 40 பவுண்டி வரையில் விதை தெளிக்கவேண்டும். பச்சைப்பட்டானியை கற்காய்க்குப் பிரயோசனப்படுத்தலாம். பாசனத்தில் ஏகர் 1க்கு 400 பவுண்டி, பாசனம் இல்லாத மூட்டில் சுமார் 200 பவுண்டித்தான் கண்கிழுகல் கிடைக்குமாம். செல வெல்லாம்போக ஏகர் 1க்கு 10 முதல் 15 ரூபாய் வரையில் வரும்படி கிடைக்கும். பச்சைப்பட்டானியை ஒரு அடி அகலம் இடைவிட்டு வரிசைவரிசையாய் விதைகளை நெருங்கப்படுதத்து அவைகள் முளைத்து வளரும்பொழுது களைபெயித்து, ஒரு விட்டி தண்ணீர் ஊற்றி, ஒவ்வொருவரிசையிலும் சிறுமலாறுகள் ஊன்றி, அவற்றின்மீது படாவிட்டால் சிக்கிரத்தில் நன்றாய்க்காய்க்கும். இக்காயைக்கறி செய்தால் அவரைக்காயைவிட நன்றாய் இருக்கும்.

205
கொத்தவரை.



கொத்தவரை 1.

இதை ஒரு கறிகாய்ப் பயிராகவும், பசுந்தழை உரத் துக்காகவும் பயிர் செய்யலாம். இது ஒரு தோட்டக் கால்பயிர். வட இந்தியாவில் இதன் விதை மாட்டுக் கும், குதிரைக்கும் தீனி ஆகிறது. ஒரு மாதிரி கொத் தவரை, கறிகாய்க்காகத் தோட்டங்களில் சொல்பவின் தீரணத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதைத் தனிமையிலும் சாகுபடி செய்யலாம். கம்பு, இஞ்சி, கக்கரி, முதலியபயிர்களுடனும் சாகுபடி செய்யப்படு கிறது. இஞ்சித்தோட்டத்தில் இஞ்சிக்கு நிழல் கொ டுக்கவும், பசுந்தழை உரத்துக்காகவும், கலந்து சாகு படி செய்யப்படுகிறது. இது சுமார் 4 அடி முதல் 10 அடி வரையில் வளர்கிற ஜாதிகளை உடைத்தாயிருக் கின்றது.

பூமிகள் :—


கறிகாய்க்காக சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில், கிராம நத்தங்களிலும், வளமான தோட்டக்கால் கொல்லை களிலும், பொலபொலத்த மணல் சம்பந்தமுள்ள தோட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம். குதிரை, மாமி இவற்றின் தீனிக்காகச் சாகுபடி செய்யும் பட்சத் தில் வடஇந்தியாவில் கம்போடு கலந்து மணல் சாரி யில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

வதைப்பு கண்டுமுதல் :—

பசுந்தழை உரத்துக்காகச் சாகுபடி செய்யும் பட்சத் தில் ஏகர் 1க்கு 40 பவுண்டு வீதம் ஜூன் மாதத்தில்

தெளித்து, ஆகஸ்ட்டு, செப்டெம்பர் மாதத்தில் பயி ரை மிதித்து பூமியை உரப்படுத்தி விடலாம். தானி யத்துக்காக சாகுபடி செய்யும் பட்சத்தில் ஏகர் 1க்கு 25 பவுண்டு வீதம் தனிமையிலாவது அல்லது கம்போ டாவது கலந்து ஜூன், ஜூலையில் தெளித்து அக் டோபரில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 1,000 பவுண்டு கண்டு முதல் செய்கிறார்கள். கறிகாய்க்குப் பறித்தால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 10,000 பவுண்டு கொத்தவரைக்காய் கிடைக்கும். இது சுமார் 4, 5 மாதத்துப்பயிர்.

வெண்டை.



வெண்டை.

இது ஒரு கற்காய்ப் பயிர். இது அநேகமாய் மாரி காலத்தில் தோட்டக் காவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. 3 அடிக்கு ஒரு தரம் ஒரு விதை ஊன்றினால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 5,000 செடி உண்டாக்கலாம். ஒரு செடியிலிருந்து சுமார் 20 காய்க்குக்குறையாமல் காய்க்கும். ஒரு பைசாவுக்கு 5 காய் வீதம் வைத்துக் கொண்டால் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 100 கிடைக்கலாம். செவ்வெல்லம்போக ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 40 தான் வரும்படி கிடைக்கும்.

வெண்டைத்தண்டிலிருந்து ஒருவித கார் எடுக்கலாம். இந்த கார் காகிதம் செய்வதற்கு உபயோகப்படுகிறதாம். இது சுமார் 4, 5 மாதத்துப்பயிர். வெண்டையிலுள்ள பிச்சிமருந்தாகப் பியோசனப்படுகிறது. வெண்டை, குட்டை வெண்டை யென்றும், ஆகாய வெண்டையென்றும் இரண்டுவகை உண்டு. இவற்றுள் குட்டை வெண்டையை மாரிகாலத்திலும், கோட்டகாலத்திலும் பயிர் செய்யலாம். ஆனால் மாரிகாப்பப்படுகின்றவிட கோடைப்பயிர் நல்ல பலனைத்தரும். இது முளைத்து ஏழு இலை விட்டால் உடனே காய்க்கத்தொடங்கும். காய் நிலத்தின்வளப்பத்துக்குத் தக்கபடி நீளமுடையதாயும், பருமனுடையதாயும் இருக்கும். இச்செடி சிறுசிறு கிளைகள் உடையதாய் இரண்டு மூன்று அடி உயரம் வரையில் வளரும். காய்க்கத்தொடங்கிய பிறகு கொஞ்சகாலம் தான் காய்க்கும்.

ஆகாய வெண்டை :—

இது அதிக உயரம் வளரும். விதைத்த 4 மாதத் திற்குப்பிறகுதான் காய்க்கத்தொடங்கும். ஆனால் அதிக நாள் காய்க்கும். காய் அதிக நீளமிராமல் பருமனாய் இருக்கும். காய்க்கு மேலே சுணை பிடித்திருக்கும். இச்செடி விசேஷமாய் நார் எடுப்பதற்காகவே பயிர் செய்யப்படுகிறது. செடி நன்றாய் முற்றின பிறகு அதை அடியோடு அறுத்துத் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு ஊறினபிறகு, மேல் பட்டைபை உரித்து நன்றாய்த் தேய்த்துக்கழுவினால் சுத்தமான நாரிடைக்கும். நாரினால் கயிறு, புரிமுதலியவை செய்வார்கள். நார் உரித்த தண்டு அடுப்பு எரிக்க உபயோகப்படும்.

அவரை.

இது ஒரு கறிகாய்ப் பயிர். ஜூலைமீல் 144 சதுர அடியில் 2 குழிகள் உண்டாக்கி குழி ஒன்றுக்கு 2 விதை விதம் 4 விதை ஊன்றி பத்தல் போட்டு விட்டால், நவம்பர் முதல் ஜனவரி வரையில் காய்கள் பறிக்கலாம். இந்த விஸ்தீரணத்துக்கு சுமார் 50 பவுண்டு காய் கிடைக்கும். ஏகா 1க்கு சுமார் 15,000 பவுண்டு காய்கிடைக்கும். இது சுமார் 7 மாதத்துப் பயிர். இதின் காய்கள், வெள்ளைக்காய், பச்சைக்காய், ஊதாக் காய், ஊதாரிறவரம்புகளையுடைய வெள்ளைக்காய் பச்சைக்காய், மொச்சையைப் போன்ற அவரைக்காய், ஆனைக்காய்க்காய், என்பவ்வகைப்படும். இவற்றுள் கணுக்கள் தோறும் பூத்துக் காய்க்கிற கொடிகளும், கதிர் கதிராய்ப் பூக்கள் தோன்றிக் காய்க்கிற கொடிகளும் உண்டு. கதிர் கதிராய்ப் பூத்துக் காய்க்கிற ஜாதிதான் நல்ல பலன் தரும். மரங்களில் படா விட்டால் பல வருஷங்கள் பட்டிப்போகாம லிருந்து கார்த் தினை அல்லது நவம்பர் மாதம் எடுக்கித் தொடங்கும்.



முள்ளங்கிப் பழிர்.

இது ஒரு கிழங்குப்பயிர். இது விதையிலிருந்து உண்டாகிறது. இதில் வெள்ளை முள்ளங்கி, செகப்பு முள்ளங்கி என இருவகை உண்டென்று தெரிகிறது. ஆகஸ்ட்டி செப்டெம்பரில் விதை தெளித்து, அக்டோபர், நவம்பரில், கறிபாக சமையல் செய்யத்தயாராகிறது. இது சுமார் 2½ மாதத்துப்பயிர். முள்ளங்கிக்கிழங்கும், அதின் கீரையும் வேகவைத்து கறிபாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதின் விதையும், இலை, கிழங்கு இவற்றின் சாறும் வைத்தியத்தில் பிரயோசனப்படுகின்றன. இது கலபமாய் சாகுபடி செய்யப்பட்டு சிக்கிரத்தில் ஜாஸ்திவருமடி கொடுக்கக்கூடிய கறி காய்ப்பயிர்.

சவுக்கு.

பயின் சுபாவம்:—

இது விறகுக்காக முக்கியமாக பயிர் செய்யப்படுகிறது. வேனிப் பயிராகவும் சாகுபடி செய்யலாம். இது உப்புத் தீனி. அகரவது நாம் சாப்பிடும் உப்பில் இதற்குப் பிரீதி ஜாஸ்தி. ஆகையால்தான் இது சமுத்திரக் கரையோரங்களில் நன்றாய் வளருகிறது. இதன் தழை பூமியில் விழுந்து பூமியை வளப்படுத்துகிறபடியால், இதை வளப்படுத்தும் பயிராகவும் கொள்ளலாம்.

தந்த பூய்கள்:—

சமுத்திரக் கரையோரங்களிலுள்ள மணல்சாரி மிகவும் மேலானது. உப்பங்காற்று சமீபமுள்ளதும் பாதி களிமண் பாதி மணல் சம்பந்தமுள்ளதுமான பூமியிலும் வளரும். நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள படுகை மண்ணிலும் வளரும். களறு நிலத்திலும் உண்டாக் கலாம்.

நன்றங்கால்:—

நல்ல முதிர்ந்த காயிலிருந்து விதைகளை எடுத்துப் பக்குவமாய் வைத்திருந்து 10 அடி நீளம் 5 அடி அகலமுள்ள பாத்திகளை உண்டாக்கி, வெட்டி, கொத்திவாங்கி, புல், களை, முதலியவைகளை நீக்கி சுத்தப்படுத்தி, மேடுபள்ள மில்லாமல் நிரவி, பூமியின் மேலாக ஒரு

பாத்தல் விதையைச் சுமாராகக் கலக்கத் தெளித்துவிட வேண்டும். விதைகளின் மேல் சாம்பல், சாணம் முதலிய எருக்களைத் தூவி வைக்கோல், இலை, கிளைகளினால் மூட்டம் போடவேண்டும். ஒரு பாத்தல் அல்லது ஒரு பவுண்டு விதையின் விலை சுமார் 8 அணா. ஒருபவுண்டு விதையிலிருந்து சுமார் 3,000ம் கன்றுகள் உண்டாகும். ஒரு அடி உயரம் வளருகிறவரையில் அடிக்கடி கொத்திக்கொண்டு வரவேண்டும். 1,000 கன்றுகள் 8 அணா முதல் 3 ரூபாய் வரையில் விற்கப்படுகின்றன. கன்றுகளைப்பிடுங்கி நடுவதில் அனாவசியமாய் அதிக உயரம் வளரவிடக்கூடாது. சுமார் 1 கெஜ உயரமிருக்கையில் பிடுங்கி நடவேண்டும். ஒரு ஏக்கராவில் கன்றுகள் புதைக்க சுமார் 3 பவுண்டு விதையை 10 அடி நீளம் 5 அடி அகலமுள்ள 2 பாத்திகளில் தெளித்தால் போதுமானது.

தோப்பு செய்யோத்தி:—

நன்றாய் உழுது, 5 அடிக்கு ஒருதரம் குழிகள் உண்டாக்கி, ஆறப்போட்டு, மடித்த சாணம், சாம்பல், வண்டல், பொருக்கு முதலிய உரங்களால் நிரப்பி, 6 மாதத்துக்குமேல் ஒரு வருஷத்துக்குக்குட்பட்ட கன்றுகளைப்பிடுங்கி நடவேண்டும். நடும்போது குழியில் நரமில்லாவிட்டால், (காடாரம்பத்தில்) குழியை நரப்படுத்திக்கொண்டு, அப்புறம் கன்றுகளை நடுவது வழக்கம். சாதாரணமாய் கன்றுகளை மழைகாலத்தில் நடுவது நன்று. அதாவது செப்டெம்பர், அக்டோபர்

மாதங்களிலாம். சவுக்குக்கன்றுகளுக்கு இளமையில் நிழல் கொடுக்கக் கொட்டமுத்துப்பசிரை இடை வெளியில் பயிர் செய்வது என்று. இல்லாவிட்டால் கன்றுகளுக்கு நிழல் கொடுக்கப் பனைமட்டை முதலியவைகளைச் சொருகவேண்டும். 5 அடிக்கு ஒருதரம் கட்டால் ஏகர் 1க்கு சுமார் 2,000 கன்றுகள் செல்லும்.

பாசனம் முதலிய பீஸ் செய்நீதி :—

இளங்கன்றுகள் வேரூன்றுகிற வரையில் தினம் அல்லது, 2 தினத்துக்கு ஒரு முறையும், பிற்பாடு ஒரு வருஷத்துக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறையும், 2 வது வருஷத்தில் 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறையும், 3 வது வருஷம் முதல் பாசன மன்னியில் விட்டுவிடலாம். பிறகு ஏதாவது பெருங்கோடையா யிருந்தால் ஏதாவது பாசனம் செய்தால் போதுமானது சமுத்திரக்கரைகளில் தண்ணீர் குடங்களில் தூக்கி ஊற்றவேண்டியது. முதல் 2 வருஷத்தில் ஏதாவது பயிர் உண்டிபண்ணி கொட்டை, கேழ்வரகு, கடலை முதலிய பயிர்களைப் பயிர்செய்து லாபம் அடையலாம். இப்படிப் பயிர் செய்தால் பூமி உரப்பட்டு நல்ல வளமையில் இருக்கும். இப்படிச் செய்யாதவரையில் வருஷவருஷம் கொத்தி உரம் அணைத்து வரவேண்டும். முதல் வருஷத்தில் சுமார் 45 தண்ணீர் ஆகும். 2 வது வருஷம் முதல், பக்கத்துக்களைகளை வருஷாவருஷம் தறித்து மரத்தை ஒழுங்காய் வளரவிடவேண்டும். 3 வது வருஷம் முதல் செலவுக்கும் வரும்படிக்கும்

சமுத்திரப் போய்விடும். தழைகளைக் கூட்டி எடுக்கும் படி விடக்கூடாது. பூமியிலேயே கொத்தி மக்கும்படி செய்யவேண்டும். ஏகர் 1 க்கு வருஷம் 1 க்கு சுமார் 1½ டன் தழை கிடைக்கும். இந்தத் தழை நல்ல உரமானதினால் பூமியிலேயே மக்கச் செய்யவேண்டும். 3 வது வருஷத்தில் கோணலான மரங்களையும், நெருக்கமான மரங்களையும் வெட்டி தோப்பைக் கொஞ்சம் கலக்கச் செய்யவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் ஏகர் 1 க்கு சுமார் 1,500 மரம் தேறலாம்.

கண்டிமுதல் :—


சமுத்திரக் கரையில், கட்டு 5, 6 வருஷத்திலேயும், உள் நாட்டில் 8 வது வருஷத்திலேயும் வெட்டப்படுகின்றது. இவ் சமயம் 15 வருஷங்கள்கூட வைத்துப் பிறகு வெட்டப்படுகின்றது. மரம் 1 க்கு 8 அணு முதல் 2 ரூபாய் வரையில் விறகுக்காக குத்தகையாய் வெட்டிக்கொண்டு போகிறார்கள். கிரம்ப நல்ல தோப்பில் ஏகர் 1 க்கு 100 டன் கட்டை கிடைக்கும். அதாவது 1,000 ரூபாய்க்குக்குறையாது. சராசரியில் ஏகர் 1 க்கு 8 வது வருஷத்தில் 500, 600 ரூபாய்க்குக் குறையாமல் கிடைக்கும். பேரட்டமுதலுக்கு ரூபாய் 100 க்கு ரூபாய் 24 க்குக் குறையாமல் வட்டி கிடைக்கும்.

பிரயோகம் :—

நல்ல மரங்களைப் பதப்படுத்தி உபயோகப் படுத்தினால், உத்தரங்களுக்கும், தூண்களுக்கும் உபயோகப் படுத்தலாம்.

மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

வெற்றிலை.



வெற்றிலைக் கொடி.

பயிர் கபாவம்:—

இது ஒரு மருத்துச்சாக்குப்பயிர். இது ஒரு கொடி. இதன் இலை போசனத்துக்குப் பிற்பாடு பாக்குடனும், ஏலம், சிறும்பு முதலிய வாசனை சாமான்களுடன் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு ஜீரணசக்தியும், குலை இனிமைப்படுத்தவும் சக்தியுண்டு. இதில் அநேக தினுசுகள் உண்டு.

தகுந்த பூமிகள்:—

நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள பாதி மணல், பாதி களிசம்பந்தமுள்ள பூமியும், களிமண்பூமியும், மேலானவை. வடிகால் வசதியுள்ள மேட்டுப்பாங்கான நஞ்சையிலும் வளரும். உரப்பான களியிலும் வளரும். இதற்கு அதிக காற்று கூடாததலால் நான்கு பக்கத்திலும் வேலி அடைப்பு இருக்கவேண்டும். நல்ல ஜலவசதியுள்ள இடமாயிருக்க வேண்டும்.

செய்நேந்தி, விதைப்பு, காலம், பாசனம் முதலியன:—

வடனில்லாக்களில், மே மாதத்தில் பூமி 2 தரம் உழப்பட்டு, கொள்ளு வாலும், குண்டக்காவாலும் வேலை செய்யப்பட்டு, 12 முதல் 18 அடி அகலமுள்ளவும், 50 முதல் 100 கெஜம் நீளமுள்ளவும், பாத்திகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 4 அங்குல ஆழத்திலும் சுமார் 1 அடி அகலத்திலுமுள்ள கண்ணிகளால் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும். ஒவ்வொரு பாத்தியும், மத்தியில் ஒரு பெரிய வரப்பால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த வரப்பும், கண்ணிகளும் ஒன்றுக்கொன்று சம்

மாகவிருக்கும். கண்ணியில் 3 அடிக்கு ஒரு தரம் ஒரு குச்சியை நிறுத்திப்பாத்திகளுக்குக் குறுக்கே கயிறுகளால் சமமாகக்கோடுகிழித்து, இந்த கோடுகளிலாவது அல்லது படைச்சால்களிலாவது அகத்தி விதைகள் ஒரு அங்குலத்துக்கு ஒரு தரம் ஊன்றி மூடப்படுகின்றன. ஒரு ஏக்கருக்கு சுமார் 40 பவுண்டு அகத்தி விலை செல்லுகின்றனவாம். இது சுமார் 5, 6 தினத்தில் முளை கண்டு விடும். 1 மாதத்துக்கெல்லாம் சுமார் 1½ அடி உயர மிருக்கும். 3 மாதத்தில் சுமார் 3 அடி உயர மிருக்கும். 3 மாதத்திற்குள் அடிக்கடி கொத்தி அகத்திக்கு மண் அலைப்பார்கள். 3 வது மாதத்தில் பாத்திகளின் கடுவரப்பின் மேல் பாசனக்கண்ணிகளும் ஏற்படுத்துவார்கள். ஆகஸ்டில் மாதத்தில் பாத்தியின் கடுவரப்புக்கும், வடிகால் கண்ணிக்கும் கடுவிலுள்ள ஒரு அகத்தி வரிசையில் 16 பதியன்கள் விதம் நடப்படுகின்றன. பதியன் கட்டவுடன் ஜலம் பாய்ச்சப்படுகிறது. பிறகு 4 நாளைக்கு ஒரு தரம் ஜலம் பாய்ச்சப்படுகிறது. தென் ஜில்லாக்களில் ஜூலை, ஆகஸ்டில், பூமி உழப்படாமல் 7 அடி வித்தியாசத்தில் 50 அடி நீளம், 1 அடி அகலமுள்ள கிடங்குகள் வெட்டப்படுகின்றன. முதலில் கிடங்குகள் 3 அங்குலம் ஆழமிருக்கும். 2 கிடங்குகளுக்கு மத்தியிலுள்ள இடத்துக்குப் பட்டமென்று பெயர். கிடங்குமீது, பட்டத்தில் ஒத்தாப்போல் போடப்படும். இப்படி ஒரு பட்டத்துக்கும் மற்றொரு

பட்டத்துக்கும் கடுவில் கிடங்குகள் இருக்கும். பட்டத்தில் கிடங்குக்கு வரிசையாக 2 அடி வித்தியாசத்தில் இரட்டை வரிசைகள் ஏற்படுத்தி ஒவ்வொரு வரிசையிலும் முக்கால் சாணுக்கு ஒரு தரம் 1 அங்குல ஆழத்தில் 4 முதல் 6 வரையில் அகத்தி விதைகள் ஊன்றப்படுகின்றன. இப்படி ஏக்கர் 1 க்கு சுமார் 20 பவுண்டு அகத்தி விதை செல்லும். விதை விதைத்தவுடன் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். பிறகு 4 நாளைக்கு ஒரு தரம் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். கிடங்கிலிருந்து ஊற்றுப்பட்டையால் தண்ணீர் இறைக்கப்படும். அக்டோபர், நவம்பர் வரையில் கிடங்குகளை ஆழப்படுத்தித் தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டுவருவார்கள். அந்தக் காலத்தில் ஒரு முழ நீளமுள்ள பதியன்கள் ஒவ்வொரு அகத்திக் கொத்திலேயும் 2 பதியன்கள் விதம் நடப்படுகின்றன. இந்தப் பதியன்கள் முக்கால் வாசி பூமியில் மூடப்பட்டு பாக்கி கால்வாசி அகத்தியில் விடப்படுகின்றன. ஏக்கர் 1 க்கு சுமார் 25,000 பதியன்கள் செல்லும். பட்டத்தில் பாசனக் கண்ணிகளுமேற்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

தலை அரிதல், கட்டல், எருந்தேல் முதலியன:—

நகதியாவில் பதியன்களை கட்டு 3, 4 மாதத்துக்கெல்லாம் அகத்திச்செடியில் கிளைகளைக்கிள்ளி 8 அடிக்கு மேல் உயர விடமாட்டார்கள். உச்சியில் மாதிரம் 2 அடிக்கு ஒரு கிளை வைத்திருப்பார்கள். கொடிகள் அகத்திச்செடியுடன் 4 மாதம் வரையில் கட்டப்படா

302 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

மலிருக்கும், பிறகு மாதத்திற்கு ஒருதரம் 2 கட்டு போடப்படும். இப்படி 2 வருஷம் வரையில் கட்டுகிறார்கள். அகத்தி விதைத்து, ஒரு வருஷத்துக்கெல்லாம் ஏக்கர் 1க்கு 50 வண்டி சாணமும் 3, 4 வண்டி குளத்துப்பொருக்கும் கலந்து அடிப்பார்கள். ஒரு அடித்தவுடன் ஜலம் பாய்ச்சுவார்கள். பிறகு அகத்திச்செடிக்கு ஊன்று கோலாக மூங்கில் சாரம் கட்டுவார்கள். வெற்றிலைக் கொடிக்காலில் வடலில்லாக்களில் அகத்தியும், வெற்றிலையும் தவிர வேறொன்றும் இராது. தென்னில்லாக்களில் புடலை, கருணை, கத்திரி, வாழை முதலியன கிடங்குகள் ஓரமாயும், வேலிகள் ஓரமாயும் இருக்கும். தென்னில்லாக்களில் அகத்திச் செடி 15, 18 அடி உயரமிருக்கையில் இரண்டிவரிசை அகத்திச்செடியை வளைத்து கூடாரம் போட்டுக் கட்டி அவைகளில் கொடியை வளரவிடுவார்கள். ஜனவரி, பிப்பிரவரியில் கொடியை அகத்தியோடு கட்ட ஆரம்பிப்பார்கள். ஆட்டுப்புழுக்கையும், கழுதைச்சாணமும் தோல் கிடங்கு எருவும், சாணம் முதலியவைகளை உரமாகக் கொடுப்பார்கள். இப்படி வருஷத்திற்கு 3 தரம் எங்கேயும் எடுக்கெடுத்து வருவார்கள்.

வயசு, கிள்ளுநல், கண்மீழநல் முதலியன:—

கொடிக்கால் தோட்டம் சுமார் 3, 4 வருஷமிருக்கும். அகத்தி விதை ஊன்றி ஒரு வருஷத்திற்கெல்லாம் வெற்றிலையைக் கிள்ளுவார்கள். இந்த வெற்றிலைக்கு இளங்கால் வெற்றிலை அல்லது கண்ணிப்பரி,

என்று பெயர். ஒரு கொடியிலிருந்து 100 முதல் 150 வெற்றிலை கிள்ளுவார்கள். கண்ணிப்பரியில் ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 50 ரூ. விலையுள்ள வெற்றிலை கிடைக்கும். இப்படி ஒரு தரம் பறித்தவுடன் அகத்தி இலையை உரமாகச் சிலவிடத்தில் கொடுக்கிறார்கள். சில விடங்களில் சாண உரம் கொடுக்கப்படுகின்றது. பிறகு சில விடங்களில் கட்டை அவிழ்த்துவிட்டு கொடிகளை வளைத்து கீழே ஊன்றியோ அல்லது சில விடங்களில் நுனியை அரிந்தோ அல்லது கொண்டையை வெட்டியோ, எறிந்து விடுகிறார்கள். பிறகு வெற்றிலைகள் கொடிக்கால் ஏணியால் மாதம் 1 தரம் தென்னில்லாக்களில் கிள்ளப்படுகின்றன. வருஷம் ஏக்கர் 1க்கு 40 பொதி வெற்றிலை கிடைக்கும். ஒரு பொதி வெற்றிலை சுமார் ரூபாய் 8 விலை. ஒரு பொதி சுமார் 4 லட்சம் வெற்றிலை. இப்படி சுமார் 3 வருஷத்திலேயும் சுமார் 750 ரூபாய் வெற்றிலை கிள்ளப்படும். சிலலரை வரும்படி, கத்திரி, கொத்தவரை, கருணை, அகத்தி, வாழை, முதலியவைகளில், 3 வருஷத்திலேயும், சுமார் 150 ரூபாய் கிடைக்கலாம். அதாவது வருஷம் 1க்கு வெற்றிலைக் கொடிக்காலில் சராசரியில் 300 ரூபாய் வரலாம். செலவு ஏக்கர் 1க்கு 200 ரூபாய் எனவதாலும் ஏக்கர் 1க்கு செலவெல்லாம் போக சராசரியில் 100 ரூபாய் கிடைக்கும்.

அகத்தி மாட்டுத் தீவனத்துக்கு நிரம்பதிறம். ஏக்கர் 1க்கு வருஷத்தில் 10 ரூபாய் இலை கிடைக்கும்.

304 மயக்கம் தொடுக்கும் பயிர்கள்.

இதைக் கறியாகவும் சமைக்கலாம். இதின் காய்ப்பு
களை துண்டிப்பதாகவும் உபயோகப் படுத்தலாம்.
கொடிக்கால் அழிக்கும்போது 100 வண்டி அதத்திக்
கழிகள் கிடைக்கும். இது சுமார் ரூபாய் 100 விலை.

கொடிக்கால் சாகுபடி ஏகதேசத்தில் ஒரு மனுஷிய
னால் செய்யப்படுவதில்லை. கொடிக்கால்காரர்களை
ன்றே இவன் சாகுபடிக்காக அலிக்கான் தனிவாயில்
இருக்கிறார்கள். இவர்கள் 20, 30 பெயர்கள் சேர்ந்த
ஒரு கொடிக்கால் தோட்டத்தை ஒப்புக்கொண்டு கட்
டுச் சாகுபடி செய்வார்கள்.

புகையிலை:



புகையிலைப் பயிர்.

பயின் சுபாவம்:—

இது ஒரு மயக்கம் உண்டாக்கும் பயிர். கமது இரா ஜதானியில் முக்கியமாய் கோதாவரி, கிருஷ்ணா, கோய முத்தூர், மதுரையில் சில பர்கங்களில் தான் ஏராள மாய்ச் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது. இலங்கைப்புகை யிலையும், திண்டுக்கல் புகையிலையும் பெயர் போனவை. இது ஒரு தோட்டக்கால் பயிர்; இதில் ஊசிக் கப்பல் என்றும், வாரக்கப்பல் என்றும், எருமைக் கப்பலென் றும் அநேக மாதிரிகள் இருக்கின்றன. வானமாரிப் புகையிலையும் இவ்விதமானியில் வழங்குகிறது. இது முக்கியமாய், சேலம், வட ஆற்காட்டில் சில பாகங்களில் தான் சாகுபடியாகின்றது. சில வாய்ப்புகையி லைக்காகவும், சில தூள் புகையிலைக்காகவும், சில சுருட்டிப் புகையிலைக்காகவும் சாகுபடி செய்யப்படு கின்றன. சில கொல்லைகளில் முதல் தடவை அடிக் கட்டையிலிருந்தும் இரண்டாவது போகும் சாகுபடி பண்ணப்படுகின்றது.

தத்த பூமிகள்:—

பொலபொலத்த பணல் சம்பந்தமுள்ள களிமண் பூமியிலும், களிசம்பந்தமுள்ள மணல்சாரியிலும் வரு ம். பொலபொலத்த மண்ணையுடைய கரிசலிலும், செவ்வலிலும் வரும். சாம்பல் சிறமுள்ள கிராமநத் தங்களிலும் வரும். படுகை நிலங்களிலும் ஆற்றுக் குச் சமீபத்திலுள்ள நிலங்களிலும் வரும். சுக்கான் சம்பந்தமுள்ள களியிலும், பொட்டிலுப்பு மண்ணு

டைய பூமியும் மிகவும் மேலானது. களியிலும் வரும்; ஆனால் இலைகள் கிரம்பியிருதுவாயிரா. இறைவைக்கு உவர்கலமுள்ள பூமி திறம். கல்ல மேட்டிப் பூமியாயும் வடிகால் வசதியுள்ளதாய் மிருக்கவேண்டும்.

சேய்நேத்தி:—

பூமியை 8 உழவுக்குக் குறைபாமல் உழவேண்டும். ஆழமான உழவு திறம். உழுது தூவாளி யாக்கி, வேர் வாரியால், களை, புல், பூண்டு, அடிக்கட்டை முதலிய வைகளை நீக்கி, சுத்தம் செய்து, மேடுபள்ளம் கிரவி, பாத்திகள் கட்டி, கண்ணிகள் உண்டாக்கி, வைத் திருக்கவேண்டும். 2 உழவுக்குப் பிற்பாடு சுமார் 25 வண்டி மடித்த சாணம் உரமாக அடிக்கவேண்டும். ஆட்டுக்கிடை வைத்தலே மேலானது. உழுத பூமி யில் கிடைவைத்து மறுபடியும் உழுதுவிடவேண்டும். சுமார் 2,000 ஆடு கிடைவைத்தால் போதுமானது. தினம் 200 ஆடு விதம் 1 வாரம் கிடைவைத்தால் போதுமானது. சுமார் 40 வண்டி குளத்துப்பொருக் கடித்தாலும் போதுமானது. கிராம நத்தங்களின் குப் பை, சாம்பல், உப்புமண், முதலியவைகள் ஏகர் 1க்கு 25 வண்டி விதம் அடித்தாலும் போதும். சப்பாத்திக் குக்கீழ் உள்ள மண்ணையும் உரமாக அடிக்கலாம்.

நாயங்கால்:—

ஒரு னெந்துக்குச் சமீபமுள்ள ஒரு துண்டு நிலத் தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது மேட்டிப் பூமியாய் மிருக்கவேண்டும். மர சிழலில் இருப்பது

திறம். ஒரு ஏகர் நாற்று நட, நூறு சதுர அடியில் 1 அவுன்ஸ் அல்லது ஒரு ஆழாக்கு விதை விதைத் தால் போதும். 1 அவுன்ஸ் விதையிலிருந்துண்டாகும் நாற்றுகளைக்கொண்டு ஒரு ஏகர் நடலாம். நாற்றங்கால் செய்நேர்த்தி நிரம்ப நன்றாயிருக்க வேண்டும். விதை தெளிக்கிறதற்கு 2 மாதத்துக்கு முந்தி அதாவது மார்ச்சு ஏப்பிரலில் நாற்றங்காலை ஒன்றரை அடி ஆழத்துக்கு வெட்டி வாங்கி, ஒரு வாரத்துக்கு முன் ஒரு வண்டி சாம்பல், சாணம், குப்பை, புழுக்கை முதலியவைகளைப் போட்டு, தெளிக்கும் முன் வெட்டி வாங்கி, சுத்தப்படுத்தி, நல்ல தூவாளி மண் பாத்தியாய் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த 10 அடி நீளம் 10 அடி அகலமுள்ள 100 சதுர அடி பாத்தியை மூன்று சிறு பாத்திகளாய்ப்பிரித்து, ஒவ்வொரு பாத்திகளிலும் 4, 5 நாள் இடைவெளிவிட்டு விதை தெளிக்கவேண்டும். விதை நிரம்பு சிறிதானதால் ஒத்தாப் போல் பூமியில் விழ மணலுடனாவது சாம்பலுடனாவது கலந்து தெளிக்கப்படும். தெளித்தவுடன் சாம்பலை மேலே தூவி பூமியைக் கொஞ்சம் அழுத்த வேண்டும். சில இடங்களில் விதையை 3, 4 நாள் ஈரப்படுத்தி வைத்திருந்து, பிற்பாடு அந்த அளவிற்கு இரட்டிப்பு மணலோடு கலந்து தெளிக்கப்படுகின்றது. சுமார் ஒரு வாரத்தில் முளை கிளம்பும். பாத்தியில் நிழல் இல்லாவிட்டால் மூட்டமாவது அல்லது தட்டிப் பந்தலாவது போடவேண்டும். இந்தத் தட்டிகளை

வேண்டும்போது எடுத்துவிடலாம். மழையிலிருந்தும் வெயிலிலிருந்தும் காப்பாற்ற இந்தத் தட்டிப்பந்தல் பிரயோசனப்படும். விதைத்தவுடன் பாத்தியைக் கொஞ்சம் ஈரப்படுத்தவேண்டும். நாற்றுநடப்பிடுங்குகிறவரையில் முதல்வாரத்தில் தினம் ஒருதாமும், 2 வது வாரத்தில் ஒன்றுவிட் டொருநாளும் பிற்பாடு வாரம் ஒன்றுக்கு இரண்டு அல்லது 3 தடவை விதமும் நிரம்ப ஜாக்கிரதையாக வாளியாலாவது அல்லது கையாலாவது ஜலம் பாய்ச்சி வரவேண்டும். களை எல்லாம் அடிக்கடி எடுத்துவிடவேண்டும். நாற்றுநிரம்ப அடர்த்தியாகிநூற்தால் சொத்தை சொட்டையைப் பிடுங்கிக் கலக்கச் செய்யவேண்டும். ஒவ்வொரு நாற்றுக்கும் ஒரு சதுர அங்குலம் இடம் வேண்டும். ஜூன் மாதத்தில் விதை தெளித்தால் ஆகஸ்ட்டு மாதத்தில் நடலாம். விதை விட்டு 1½ அல்லது 2 மாதமானவுடன் பிடுங்கி நடலாம். அதாவது செடியில் 4 இலை இருக்கும் போதும், செடி 3 அல்லது 4 அங்குல உயரமிருக்கும் போதும் பிடுங்கி நடலாம்.

தகுந்த காலம்:—

நாற்றங்காலில் ஜூன் 15-ம் தேதி வாக்கில் விதை விட்டால் ஆகஸ்ட்டு முதலிலேயாவது அல்லது மத்தியிலேயாவது நாற்றைப்பிடுங்கி வயலில் நடவேண்டும். வயலில் நடுவதற்கு முன்னால் நாற்றங்காலில் ஜலம் பாய்ச்சி, நாற்றைப்பிடுங்குவார்கள். வயல் பாத்திகளிலாவது அல்லது முகடுகளிலாவது சுமார் 2 அல்லது

3 அடி வித்தியாசத்தில் சாதாரணமாய் மப்பான மத்தியானத்தில் நடுவார்கள். முகடுகள் 3 அடி வித்தியாசத்திலிருக்கவேண்டும். புகையிலைநாற்றை முகடுகளில் 1½ அடி வித்தியாசத்தில் நடவேண்டும். நட்ட நாறுகளை வேப்பிலைகளினாலும் அல்லது இதர இலைகளினாலும் வேருன்றிறவரையில் மூடிவைப்பார்கள்.

பாசனம் கொத்தல் களைபிடுங்கல்:—

நட்டு முதல் வாரத்தில் தினம் அல்லது இரண்டு நாளைக்கொருதரம் ஜலம் பாய்ச்சவேண்டும். பிற்பாடு வேர் ஊன்றுகிறவரையில் இப்படி கவனமாயிருக்கவேண்டும். பிறகு இலை முதிர்கிறவரையில் காலத்திற்குத்தகுந்தபடி, 10 நாளைக்கு ஒரு தரம் அல்லது 15 நாளைக்கு ஒருதரம் ஜலம் பாய்ச்சவேண்டும். சுருட்டுப்புகையிலையைப் பார்க்கிலும், பொடி, வாய்ப்புகையிலை இவைகளுக்கு ஐந்து இறைவைவேண்டும். களை காண்கிறபோதெல்லாம் கொத்திப்பிடுங்க வேண்டும். பயிர் 1 அடி உயரமிருக்கையில் கொத்தி மண்ணைப் பதுடன், சாம்பலை உரமாயணைத்தாவது அல்லது பொட்டிலுப்பு கரைத்த ஜலத்தை ஒவ்வொரு செடியின் கீழ் உரமாகவாவது ஊத்தவேண்டும். ஏனெனில் பொட்டிலுப்பில் புகையிலைப் பயிருக்கு நிரம்ப பிரீதி. நட்டு 2 மாதத்துக்கெல்லாம் பயிர் பூக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போது பூ மொட்டுகளைக் கிள்ளி, எறிந்துவிடவேண்டும். இளம் இலைகளில் 2 முதல் 4 இலைகளைக் கிள்ளி எறிந்துவிடவேண்டும். இதற்குக் கொழுந்து

ஒடிக்கிறது என்று பெயர். இத்தக்காலத்தில் 10 முதல் 15 இலைகள் வரையில்தான் ஒவ்வொரு செடியிலும் வைத்திருக்கவேண்டும். இப்படி நுளியிலேயும் அடியிலேயும் கொழுந்து ஒடிக்கப்பட்ட இலைகளை வயலைவிட்டு அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் புகையிலைகளுக்குக் கெடுதல் சம்பவிக்கும். கொழுந்தொடித்த பிற்பாடு சிம்புகள் பக்கங்களில் வெடிக்கும். இப்படி பக்கங்களில் வெடிக்கும் சிம்புகளை வாரம் ஒருமுறைவீதம் 2, 3 தரம் நீக்கும்படியாயிருக்கும். இதற்கு சிம்படிக்கிறதென்று பெயர். புகையிலைக் கொல்லையில் கொத்தல் அனைப்பிடுங்கல் கொழுந்தொடித்தல் சிம்படித்தல் முதலிய வேலைகளை எல்லாம் காலவேளையிலேயே நடத்தப்படுகின்றன. கொழுந்தொடித்தல் சிம்படித்தல் முதலியவைகளால் இலைகள் பெருத்து காத்திரமாயிருக்கும்.

வயசு, வறுப்பு கண்டுழல்:—

இது சுமார் 6 மாதத்துப் பயிர். நட்டு 4 மாதத்துக் கெல்லாம் அறுக்கலாம். ஐ-டுனில் நாற்றங்காலில் விதை தெளித்தால் ஆகஸ்ட்டில் நாற்றை வயலில்நட்டு, டிசம்பர், ஜனவரியில் அறுக்கலாம். பயிர் முதிர்ந்ததற்கு அடையாளம் இலைகளில் மஞ்சள் பொட்டுகள் தோன்றும். கையால் அதுக்கினால் சத்தம் உண்டாகும். இலைகள் முறியத்தக்கதாயும், பிசுபிசுப்பாயும், கனமாயுமிருக்கும். அறுப்புக்கு முதல்காள் வயலில் ஜலம் பாய்ச்சி முழுப்பயினை அடியோடே வெட்டி, பனியில் போட்டு

விடுவார்கள். சில இடங்களில் இலைகளை மாத்திரம் தனி மையில் அறுத்து வைக்கிறார்கள். ஏகர் 1க்கு சராசரி சுமார் 800 முதல் 1,000 பவுண்டு பாடம் பண்ணின சுருட்டுப் புகையிலை கிடைக்கும். உப்பு ஜலத்தில்லாமல் நல்ல ஜலத்தில் சாகுபடி செய்தால், பொடிப்புகையிலையிலேயும் இந்தக் கண்டு முதல்தான் கிடைக்கும். உப்பு ஜலத்தில் சாகுபடி செய்தால் பொடிப்புகையிலை ஏகர் 1க்கு 3,000 பவுண்டு பாடம்பண்ணினபுகையிலை கிடைக்கும். சுருட்டுப்புகையிலையில் ஏகர் 1க்கு நல்ல பூமியாயிருந்தால் ஜாஸ்தி கண்டு முதல் சுமார் 2,500 பவுண்டு வரையில் பாடம்பண்ணின இலைகள் கிடைக்குமாம். படுகைப் புகையிலையில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 1,000 பவுண்டுக்குள்ள்தான் கிடைக்கும். பவுண்டு ஒன்றுக்கு அனா நாலுவீதம் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 250 மொத்த வருமானம் கிடைக்கும். சாகுபடிச்செலவும், பாடம் பண்ணுகிற செலவும் சுமார் ரூபாய் 150 ஆனாலும் ஏகர் 1க்கு சராசரியில் எச்செலவுமேபோக சுமார் ரூபாய் 100 மீதும். சிலசமயம் 200, 300 ரூபாயும் கிடைக்கலாம். ஒரு ஏகர் பச்சையிலைகள் பாடம் பண்ணாமலே சுமார் ரூபாய் 60 முதல் ரூபாய் 100 வரையில் விலைக்கு வாங்கப்படுகின்றன.

கைத்தொழில்:—

புகையிலையிலிருந்து சுருட்டுகளும், வாய்ப் தூள்களும், மூக்குத் தூள்களும் பண்ணப்படுகின்றன. புகையிலையிலுள்ள காரவஸ்து, பொடிப் புகையிலையில் ஜாஸ்தி

தயாயிருக்கும். சுருட்டுப் புகையிலையில் அவ்வளவு ஜாஸ்தி யிருக்காது. சுருட்டுப் புகையிலையில் சாம்பல் உப்பு ஜாஸ்தியிருக்கவேண்டும்.

புகையிலை பாடம்பண்ணும் விதம்:—

பயிரை சாயங்காலம் அறுத்து, பனியில் போட்டு விட்டு, காலை யில் எடுத்து, காம்புகள் வெளியில் இருக்கும்படி 2 அடி உயரம் சக்கரமான குவியல்களாய்ப் போட்டு வைத்திருந்து வைக்கோல் அல்லது சிம்புகளால் குவியல்களை மூடிவைத்திருக்க வேண்டும். இக் குவியல்களை அறுத்த மூன்றாம்நாள் சாயங்காலம்வரையில் திறக்கக்கூடாது. பிற்பாடு இலைகளை பூமியில் கொஞ்ச நாழிகை பரப்பிவைத்திருந்து, பிறகு ஒரு கொட்டகையில் காம்புகள் மேலாக, இலைகளைத் தலை கீழாகக்கட்டித் தொங்கவிட்டு விடுவார்கள். இப்படித் தொங்கவிடுவதில், காம்புகளையெல்லாம் சேர்த்தாப் பேரில் நெருங்கத்தொங்கவிட்டு விடுகிறார்களாம். இப்படித் தொங்கவிடுவதினால் இலைகள் வாடி வதங்கும். தினம் இக்காம்புகளைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நெருக்கமா யிருக்கப்பட்டதை கலக்கச் செய்கிறார்களாம். அதிக நெருக்கமாய்த் தொங்கவிட்டால், இலைகள் கருத்து அழுகிப்போய்விடும். ஆகையால் கலக்கத்தொங்க விட்டு ஒத்தாப்போல் வாடவைப்பது திறம். பயிரைக் கலக்கத்தொங்கவிட்டும், இல்லாவிட்டால் தண்டை இரண்டாய்க் கிழித்துக் கலக்கத் தொங்கவிட்டும், ஒத்தாப்போலும் சிக்கிரமும் காயும்படி செய்வது திறம்.

314 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

மழை, அதிககூர்ந்துள்ள இடங்களில் பயிரைத்தொங்க விடக்கூடாது. இப்படி தொங்கவிட்ட 15 அல்லது 20 நாளைக்கெல்லாம், இலை துருப்பிடித்தாப்போல் சிவப்பு நிறமாயும், மஞ்சள் நிறமாயும் பச்சையாயும் நிறம்மாறியிருக்கும். தண்டுகள் நன்றாய்க்காய்ந்தவுடன் (நரம்புகள் பச்சையாயிருந்தாலும்) இலைகளின் தண்டு குறுக்க இருக்கும்படி சதுரமாக குவியல் குவியல்களாக அடுக்குவார்கள். இக்குவியல்கள் சுமார் 2 அடி உயரமிருக்கவேண்டும். இக்குவியல்களை இரண்டு மூன்று நாளைக்கொருதரம் திறந்து, புறட்டி, மறுபடி புதுக்குவியல்களாக அடுக்குவார்கள். இப்படி அடுக்குவதெல்லாம் காலவேளையில் செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் இலைகள் அப்போது சற்றுவுதங்கலாயிருக்கும். ஒருவித கருப்பு நிறமுண்டாவவுடன் இலைகளை நடுக்காம்பிவிருந்து உரித்து 1½ பவுண்டு அல்லது 2 பவுண்டு நிறையுள்ள 50 பாட்டம் பண்ணின இலைகளை சிறுகட்டிகளாகக் கட்டி, அம்பாரம் செய்வார்கள். இலையை உரிக்கிறதற்கு முன்னால், பாட்டம் பண்ணின இலைகளை வெல்ல ஜலத்தில் தோய்த்துக் கொஞ்சம் காய்த்தவுடன் இலையைக் காம்பிவிருந்து பிரிப்பார்கள். இலைகளை உரிக்கையில் நல்ல இலைகளையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகவும், நடுத்தரமான இலைகளையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகவும், மட்டத்தையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகவும், பிரித்து, தனித்தனியாய் கட்டவேண்டும். நல்ல நிறமுடைய பெரிய இலைகள் சுருட்டுப்புகையிலேக்குப்

அபினி அல்லது கசகசாப்பயிர். 323

இதைக் குடிகள் சுயேச்சையாய்ச் சாகுபடிபண்ண முடியாது. ஏனெனில் கவர்ன்மெண்டார் அபினி இலாகா என்று ஒன்று தனியாக ஏற்படுத்திக்கொண்டு அதில் சுதந்தரவர்த்தகம் ஏற்படுத்திக்கொண்டிருப்பதால், கவர்ன்மெண்டாரிடம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் மேற்பார்வையின் கீழ்தான் குடிகள் சாகுபடி செய்யவேண்டும். ஆகையால் சாகுபடிசெய்ய இஷ்டமுள்ளவர்கள் கவர்ன்மெண்டாரிடம் எழுத்து மூலமாய் லைசென்சு பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் குறிப்பிடுகிற இடத்தில்தான் அட்லான்சு பெற்றுக்கொண்டு சாகுபடி செய்யலாம். மதகுலை கவர்ன்மெண்டாரே வாங்கிக்கொள்ளுகிறார்கள்.

இதை தோட்டக்கால் பயிராகச் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதை மாரிகர்லப்பயிராகவும் கொள்ளலாம். இது அநேகமாய் தனிமையில் கிணற்றுக்குச் சமீபத்தில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. கிராமந்தங்களில் இதின் சாகுபடி விசேஷம். ஏகர் 1க்கு வருஷம் 1க்கு சுமார் 150 மணங்கு ஒரு அடிக்கிறார்களாம். நல்ல மணல் சம்பந்தமுள்ள களி நிலம் திறமாம். அக்டோபர் மாதத்தில் ஏகர் 1க்கு 3 பவுண்டு விதம் விதை தெளிக்கப்பட்டு, 4, 5 இறைவையிலும் 4, 5 கொத்தல், களைபிடுக்கவிலேயும், அறுவடைக்குப் பயிர் தயாராகிறது. பிப்பிரவரி மாதத்தில் நன்றாய்ப் பூக்கிறது. அப்போது கீழே விழுகிற, பூ, இதழ்களைப் பொருக்கி அனலின்மேல் காட்டி அழுத்திக் கட்டியாக்குகிறார்கள்.

324 மயக்கம் கெடுக்கும் பயிர்கள்.

இப்பூக்கட்டிக்களை கவான்மெண்டார் பாம் செய்வதற்காக (அபினியை அடக்கிக் கட்டுவதற்காக) வாங்குகிறார்கள். காய்கள் பெருத்தவுடன் ஒருவித ஆயுதத்தினால் அவைகளில் 4, 5 கீறல் சாயுங்காலத்தில் உண்டாக்கி அந்த கீறல்களிலிருந்து உண்டாகும் பிசுபிசுப்பான சாற்றை மறுநாள் காலையில் சுறண்டி எடுத்துச் சட்டியில் வைக்கிறார்கள். இச்சாறு இருகலானவுடன் அபினியாகிறது. அதாவது கசகசாப்பியிரின் பழக்காத காயிலிருந்து உண்டாகும் இருகின சாறுக்குத் தான் அபினி என்று பெயர். ஏகர் 1க்கு 9 சேர் அபினி கிடைக்குமாம். இத்துடன் 5, 6 மணங்கு கசகசா விதையும் 20 சேர் பூ இதழ்க்கட்டியும் கிடைக்குமாம். கல்ல பூமியிலிருந்து வரப்பட்ட வரும்படிக்கு கவான்மெண்டார் ஏகர் 1க்கு ரூபாய் 50 கொடுக்கிறார்களாம்.

ஒ ம ம்.



ஒ ம ப ம்.

326 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

இது ஒரு மருந்து சாக்குப் பயிர். இது மட்டமான கரிசலில் உண்டாகிறது. இதன் சாகுபடி புஞ்சைப் பயிருக்கு உள்ளதுபோலத்தான். ஏகர் 1க்கு 1½ படி அல்லது 2 சேர் விதம் செப்டெம்பர் கடைசியிலாவது அல்லது அக்டோபர் ஆரம்பத்திலாவது தெளிக்கப்படுகிறது. முளைகாண சுமார் 9 நாள் செல்லும். பயிர் முதிர்வதற்கு சுமார் 6 மாதம் செல்லும். ஏகர் 1க்கு சுமார் 120 பட்டணம் படி கண்டு முதல் செய்யலாம்.

காப்பி.



காப்பிச் செடி.

பயிர் கபாவம் :—

இப்பயிர் மலைப்பிரதேசங்களில்தான் ஜாஸ்தியாக உண்டாகிறது. நீலகிரி, பழனி, குடகு, திருவாங்கூர் முதலிய மலைப்பிரதேசங்களில் நமது இராஜதானியில் காப்பி உண்டாகிறது. இது நத்தியாவுட்டை பூச்செடி போல் இருக்கும். காப்பியில் காப்போதக் காப்பி என்றும், கோடைக் காப்பி என்றும் இரண்டுவிதமாக உண்டி. காப்போதம் டிசம்பர் முதல் மார்ச்சுவரையில் செக்கரிக்கப்பட்ட காப்பிகள். இதுதான் சர்வசிலாக்கிபம். கோடை காப்பி சூலை, ஆகஸ்ட்டில் அறுவடை செய்யப்படுகிற காப்பிகள்.

பூமிகள் :—

மலைப்பிரதேசங்களில் அதிக உயர்ந்த இடங்கள் நீக்கி, சூரிய உஷ்ணம் செவ்வையாகப்படுகிற இடங்களிலும், பனி கிழாத இடங்களிலும் உள்ள கரிசல் பூமிகளும் சோலைகளுமே தஞ்சை பூமிகள்.

நாற்றங்கால் :—

நன்றாய் பழுத்த பழங்களை எடுத்து, ஒரு சதுர செஜம் நீள அகலமும், ஒரு அடி ஆழமுமுள்ள குழிகளை நல்ல உயர்ந்த பூமியில் தோண்டி, அவைகளில் ஆட்டுப்பழுக்கை, சாம்பல், மண், இவைகள் கலந்து நிரப்பி பூமி மட்டத்துக்கு மேல் பாத்திரள் கட்டி, அவைகளில் பழங்களை ஊன்றி, அவைகளின் மேல் எருகலந்த மண்ணை மூடி, மூட்டம்பேர்த்து, தினம் தண்ணீர் விட்டுக்கொண்டு வந்தால், ஒரு மாதத்தில் முளை

கண்டு விடும். பழங்கள் டிசம்பர், ஜனவரியில் ஊன்றப்படுகின்றன. 6 மாதத்தில் தனிதோடும், சிம்புகளோடும் பயிர் ஓர் அடி உயரமிருக்கும். அப்போது பிடுங்கிவிடத் தகுந்தகாலம்.

வயல் செய்யேற்றி :—

பூமியை நன்றாய் உழுது 6 அடிக்கு ஒருதரம் ஒரு அடி நீளம், ஒரு அடி அகலம், ஒரு அடி ஆழமுள்ள குழிகள் தோண்டி, அவைகளில் ஆட்டு உரம், மாட்டு உரம், பிண்ணாக்கு உரம் முதலிய உரங்களைக் கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு நீற்றுடன் கலந்து நிரப்பி இப்படி ஏக்கர் 1க்கு சுமார் 1,200 செடி ஐ-ஒன், ஐ-ஒலையில் நடப்படுகின்றன.

பிச்சு செய்யேற்றி :—

நட்டு 3 வருஷம் வரையில் சுமார் 18 தடவைக்குக் குறையாமல் களைபிடுங்கி, கொத்திவிட வேண்டுமாம். வருஷா வருஷம் களை கபாத்தும் செய்யவேண்டும். கோணலான களைகளையும், பெட்டுக்குத்தலாக வளரும் கொம்புகளையும், தாய்க்கொம்பு 4 அடிக்கு அதிகம் வளர்ந்துவிட்டால் அவைகளின் தலைகளையும் வெட்டிக் கொண்டே வரவேண்டும். இப்படி வருஷத்தில் இரண்டு தடவை களைகபாத்து செய்யவேண்டுமாம். காப்பிச் செடிக்கு நிழலைக் கொடுக்கிறதற்காக 60 அடிக்கு ஒருதரம் பலாமரங்களையும் இன்னும் சில விருட்சங் களையும் பயிர் செய்கிறார்களாம்.

அறுப்பு வயது, தண்ணீர்தல் முதலியன:—


இது சுமார் 5 வருஷத்துப் பயிர். டிசம்பர் மாதத் தில் காய்கள் பழுக்க ஆரம்பித்துவிடும். மார்ச்சுமாதக் கடைசிவரையில் பழங்களைக் கொய்து ஒருவித எந்திரத்தில் கொடுத்து தோலை நீக்கிக் கழுவி காயவைக்கிறார்கள். 3வது வருஷத்தில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். அந்த வருஷத்தில்வரும்படி சொல்பவ்தான். 4 வது வருஷத்தில் பயிரைச் சுற்றிவா தோண்டி. பிண்ணாக்கு உரங்களை நிரப்பி, தண்ணீர் தங்குவதற்கும், வளையங்கள் கட்டிவிடவேண்டும். 3 வது வருஷத்தில் நல்ல செய்கேர்த்தியில் ஏகர் 1க்கு சுமார் 450 பவுண்டு காப்பிப் பழங்கள் கிடைக்குமாம், 4 வது வருஷத்தில் 1,000 பவுண்டுக்குக் குறையாதாம். அதாவது 4வது வருஷத்தில் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 1,000 வரும்படி கிடைக்கும்.

செலவுபோக வரும்படி:—

ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 400 செலவாகும். வரும்படி சராசரி சுமார் ரூபாய் 800 ஆக வைத்துக்கொள்ளலாம். செலவுபோக வரும்படி சுமார் ரூபாய் 400க்குக் குறையாது. வருஷம் ஏகர் 1க்கு சுமார் ரூபாய் 100க்கு வரும்படி குறையாது.

கீலகிரியில் படுகர் என்கிற ஏழை ஜாதிகள் சிநிய காப்பித் தோட்டங்கள் வைத்து அதாவது சுமார் 500 செடி, 400 செடியுள்ள தோட்டங்களை நன்றியுடன் சிரமப்பட்டுப் பாதுகாத்துக் கௌரவமாக காலகேழ்ப்பு செய்து வருகிறார்களாம்.

தேயிலை.



தேயிலைச் செடி.

பயிரின் சுபாவம்:—

தேயிலை ஒரு பிரமை உண்டாக்கும் அல்லது மயக்கம் தரக்கூடிய சத்தை உடைத்தாயிருக்கும் பயிர். இது காடுகளில் வளர்த்தமாய் வளர்ந்து விருட்சமாயிருக்கும். சாகுபடி செய்து செடியாகவும், புதராகவும் உண்டாக்கலாம். தேயிலையை கஷாயம் வைத்துப் பானமாகவும் அல்லது பர்மாவில் பண்ணுவதுபோல எண்ணெயில் சிலபதார்த்தங்களோடு கலந்து வதக்கிப் பணியரசரமாகவும், சாப்பிடப்படுகிறது. இது மலைப் பிராக்தியங்களிலும், குளிர்ச்சியான காடுகளிலும் விசேஷம். தேயிலையில் அநேகமாதிரிகள் இருக்கின்றன.

332 மயக்கம் கொடுக்கும் பயிர்கள்.

தகுந்த பூமிகள் :—

காட்டிலுள்ள செவ்வல் நிலம் அதிக சிலாக்கியமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. மலைப்பக்கங்களிலுள்ள தோட்டங்களிலும் உண்டாக்கலாம். காடுகளில் ஏதாவது ஆறு ஒழினால் அந்த ஆற்றங்கரை ஓரங்களிலும் உண்டாக்கலாம். தேயிலைத்தோட்டம் கொஞ்சம் சிதலுள்ளதாக இருந்தால் திரும்.

செய்நேர்த்தி, விதைப்பு, நடவு முறையின :—

காடுகளிலுள்ள சிறுமரங்களையும், புதர்களையும் அழித்துப் பூமியைக் கொத்தி நிரவி 1 கெஜத்திற்கு ஒருநரம் கூர்மையுள்ள குச்சியால் குத்தி, சிறு குழிகள் உண்டாக்கி குழி ஒன்றுக்கு 3, 4 விதைகள் வீதம் ஊன்றி மூடி செடி உண்டாக்குகிறார்கள். ஒரு விதைக்கு மேல் ஜாஸ்திவிதை ஊன்றப்படுவதெல்லாம் நடுவில பழுது அல்லது வெளி இல்லாமலிருப்பதற்காகத்தான். நாற்றுகள் உண்டாக்கியும் நடவாமாம். தோட்டங்களில் நாற்றுகள் உண்டாக்கி ஒரு வருஷம் முதல் சில வருஷம் வரையிலுள்ள நாற்றுளைப் பிடுங்கி மழைக்காலத்தில் பூமியில் நடப்படுகின்றனவாம்.

பிச் செய்நேர்த்தி :—

கட்டிப் பிற்பாடு இலை பறிக்கிறவரையில் புழ்ப்புண்டுகளை அடிக்கடி நீக்கிக்கொண்டு வரவேண்டும். சில விடங்களில் கொத்தல், கபாத்துசெய்தல் முதலியவைகள் செய்கிறதே சிதையாது. ஏதாவது புல்லுருவி ஏற்பட்டால் அப்போதுதான் கொத்தலும், கபாத்து

தும் செய்யப்படுகின்றன. கோடை காலங்களில் புல், பூண்டுகள் நெருப்புப் பிடித்துக்கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டுமாம். மழைக்காலத்தில் பூண்டு செடி முதலியவைகளை களை வெட்டிவிட்டு வேண்டுமாம்.

கபாத்து செய்நல் :—

தேயிலைக்குக் கட்டாயம் கபாத்து செய்யவேண்டும். ஏனெனில் தேயிலைப்புதர் ஜாஸ்தி உயரம் வளர்ந்து விட்டால், ஒரு மனுஷன் சின்றபடியே இலைபறிப்பது கஷ்டமாகும். ஆகையால்தான் ஒரு ஆள் செளகரியமாய் பறிக்கிறதற்குள்ள உயரத்துக்குமேல் கபாத்து செய்துவிடவேண்டும். புதர் கிரம்ப அடர்த்தியாய்ப் போய், கொத்தல், களை பிடுங்கல்களுக்கு கஷ்டமாயிருக்கும்படியும் விட்டுவிடக்கூடாது. கிரம்ப அடர்த்தியாகப்போனாலும் கபாத்துசெய்யவேண்டும். கபாத்து செய்கிறது சிதானமாயும் ஒழுங்காயும் இருக்கவேண்டும். அதிக ஜாஸ்தி கபாத்தும் கூடாது. பட்டுப் போன கட்டைகளையும், கோணலான கிளைகளையும், புல்லுருவிகளையும், நொவுபிடித்த கொம்புகளையும், இன்னும் பயிருக்கு இடைஞ்சலானவைகளையும் கபாத்து செய்யவேண்டும்.

வயசு, வறுப்பு, கண்டேழுதல் :—


கட்டு 3, 4 வருஷத்துக்கெல்லாம் இலைபறிக்க ஆரம்பிக்கலாம். பூமி சுத்தமாயில்லாமல் களைத்தொந்தாவுகள் ஜாஸ்தியிருந்தால் இலைபறிப்பது கொஞ்சம் கடினமும். 8 வது வருஷத்தில் விதை பிடிக்க ஆரம்பிக்கும்.

ஆனால் 15 வருஷத்தில்தான் நன்றாய்ப் பூத்து விதைகள் எதேஷ்டமாய்க் கிடைக்கும். தேயிலை மரம் சராசரியில் சுமார் 40, 50 வருஷகாலம் பூமியில் இருக்கும். சுமார் 75 வருஷமுள்ள தேயிலை மரமும் இருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. இம்மாதத்திலிருந்துதான் இலைவரும் படியும், விதை வரும்படியும், ஜாஸ்தியாகக்கிடைக்கிறதாம். நடுத்தரமான வயதுள்ள மரத்தை அடிக்கட்டையினைவத்துவிட்டு வெட்டிவிட்டால் அடிக்கட்டையிலிருந்து தளிர் உண்டாகுமாம். விதைத்தேயிலை என்றும், இலைத்தேயிலை என்றும் இரண்டு தினுசான்ப்பயிர்களில் இலைகளை எப்பிரல், மேசிலும், ஜெலே; ஆக்ஸ்டிலும், செமடெம்பர்; அக்டோபரிலும் பறிக்கிறார்களாம். முதலில் பறிக்கிற இலை கிரம்ப சிலாக்கியம். தளிரில் ஒரு இலையைவிட்டு பாக்கி இலைகளைக் கிள்ளிவிடுவார்களாம். இலையைக் கிள்ளி கொதிக்கிற வெந்நீரில் போட்டுவிடுவார்களாம். இலைகள் மஞ்சள் நிறமாய் மாறுகிறவரையில், அதிலிருக்குமாம். பிற்பாடு ஜலத்தைக்கொட்டி தேயிலைகளைப் பாயில் போட்டு சுருட்டி விடுவார்களாம். சுருட்டின உடனே, வியாபாரிகளுக்கு விற்குலும் விற்பனிடலாம் அல்லது வைத்துக்கொள்ள வேனுமென்றிருந்தால் பூமியில் மூங்கிலபாய் சுருட்டலேபிட்டு வைத்து வைத்திருந்தாவது, அல்லது மூங்கில் குதாயில் போட்டு, தண்ணீர் வடிய தலைகீழாக வைத்துப் பூமியில் வைத்திருப்பார்களாம். 100 வீசை (நதல் பறிப்பு) இலை ரூபாய் 16ம்,

(இரண்டாம் தரம், 3ம் தரம் பறிப்பு இலை) ரூபாய் 12-8-0 யும் தேரட்டங்களில் விற்கப்படுகிறதாம். விதை எடுக்கும் பட்சத்தில் அக்டோபர், நவம்பரில் எடுக்கப்படுகிறதாம். சுமார் 14 வீசை நிறை உள்ள ஒருகூடை விதை சுமார் ரூபாய் 4, 5க்கு விற்கப்படுகிறதாம். இலைவரும்படி 60 அடி உயரமுள்ள மரங்களிலிருந்து கொடுத்தபோதிலும் கூட நல்ல இலைகள் இளஞ்செடியிலிருந்துதான் கிடைக்கின்றன. பூமியில் புதைத்து வைத்திருக்கும் தேயிலைகளை, தரக்களுக்கு விற்கும் போது வீசை ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறதாம்.

தேயிலைச்சரக்கு அல்லது காய்ந்த தேயிலை, மூங்கில் பாயில் சுருட்டின வேகவைத்த தேயிலையை வெய்யிலில் காயவைத்தால் சரக்குத் தேயிலை உண்டாகிறது. சாயுங்காலம் பொருக்கின இலைகளை உடனே ஆவியில் வதக்கி, அல்லது வேகவைத்து, மறுநாள் காலையில் வெய்யிலில், காயவைத்து சரக்குகள் போட்டலங்களாகவாவது அல்லது தகரடப்பியிலாவது அடைத்து விற்பனைக்கு தயாராக்கப்படுகின்றன.

வேலிப்பயிர்கள்.



கொருக்காப்பள்ளி.

வேலிப்பயிர்களின் பிரயோஜனம்.

பயிர்களிலும் தோட்டங்களிலும் ஆடுமாடுகள் உள் ளே வராமல் தடுப்பதற்கும், திருடர்களும் அன்னியர் களும் எல்லை கடந்து பிரவேசிப்பதைத் தடுப்பதற் கும், பயிர்களுக்கும் மரங்களுக்கும் பெருங்காற்றின் வேகத்தினுண்டாகும் கெடுதலைத் தடுப்பதற்கும், பச்சையைக்கண்டு ஆடு மாடுகள் அனாவசியமாய்க் கூட்டங்கூடி மேயவருவதைத் தடுக்கவும், நல்ல உர மாகிய சாணத்தை முட்டைதட்டி விராட்டிக்காக உபயோகப்படுத்தவதை நீக்கி விறகு கொடுக்கும்படி செய்யவும், நார் கொடுக்கவும், மாட்டுத் தீவனத்திற் காகவும், இப்படி அனேகவித சௌகரியத்திற்கும், லாபத்திற்கும் வேலிப்பயிர்கள் சாகுபடி செய்யவேண் டும்.

2. வேலிகளில் உயிருள்ள வேலியென்றும், உயி ரில்லாத வேலியென்றும் இரண்டு வகையுண்டு.

(a) உயிரில்லாத வேலி :—

முங்கில் முள்ளினால் படல்போட்டு உண்டாக்கும் வேலியும், கருவைமுன், காரைமுன், இலக் தைமுன், முதலியவைகளால் அடைக்கப் பதும் வேலியுமாகும்.

(b) உயிருள்ள வேலியாவன :—

1. கொறுக்காப்பள்ளி. 3. கருவேல்.
2. முட்கிளுவை. 4. கிறுமுங்கில்.

5. முள் முருங்கை. 17. கத்தாழை.
6. கழக்கோடி. 18..ஜிமிக்கிச்செடி.
7. மருதாணி. 19. ஆதானை.
8. திருகுள்ளி. 20. பேய்க்கரும்பு.
9. துப்பாக்கிக் குள்ளி 21. முள் குசம்பா அஸ்
அல்லது பிரம்மதெ வது செத்துருக்கை.
ண்டம். 22. மாவள்ளி.
10. சப்பாத்திக்கள்ளி. 23. அழிஞ்சில்.
11. கொடிக்கள்ளி. 24. குமிளஞ்செடி.
12. கண்ணாடிக்கள்ளி. 25. தூரா.
13. ஆடாதொடை. 26. தூதுனை.
14. காட்டாமணக்கு. 27. ஆதண்டை.
15. புனிமஞ்சி அல்லது 28. ஈச்சஞ்செடி.
புனிச்சை. 29. சீயாக்காய் முதலி
16. கொச்சி. யனை.

3. இவைகளைத் தனித்தனியாய் எடுத்து வீவரிக்கும் முன், வேலிப்பயிரி விருக்கவேண்டிய முக்கிய குணங்களைச் சொல்லுவது அவசியமாயிருக்கிறது. அவையாவன :—

1. அதிகேக்கிரத்தில் ஒரு வேலிப்பயிராகவேண்டும்.
2. நீடித்த வயதுள்ளதா யிருக்கவேண்டும்.
3. சீக்கிரத்தில் பழுது பார்க்கும்படியா யிருக்க வேண்டும்.
4. ஒத்தாப்போல் வளரவேண்டும்.
5. பொழிக்குள்ளடங்கி யிருக்கவேண்டும்.

6. அடக்கமாயும் அழுத்தமாய் மிருக்கவேண்டும்.
7. ஆடுமாடுகள் துணுத்து உள்ளே போகாம விருக்கும்படியாக முட்களுடன் பலமாயிருக்க வேண்டும்.
8. ஆரம்பத்தில் அதிகச் செலவின் றிச் சீக்கிரத்தில் உண்டாகவேண்டும்.
9. எந்தப் பூமியி லுண்டாக்குகிறோமோ அந்தப் பூமிக்குத் தகுந்ததா யிருக்கவேண்டும்.
10. அதிக வறட்சியினாலும் அதிக குளிரினாலும் சேதமடையாததா யிருக்கவேண்டும்.
11. குளிர் காற்றுக்களைத் தடுத்து மாடுகளுக்குப் பாதுகாப்பா யிருக்கவேண்டும்.
12. தரைக்குச் சமீபமாகத் தளிர்விட்டு நாய் நரி கள்கூட துழையக்கூடாமல் அடர்த்தியா யிருக்கவேண்டும்.
13. பூச்சிபொட்டுகள் அதிகமாய் அடையக்கூடாததாயிருக்கவேண்டும்.
14. காளான் முதலிய நோவுகளுக்கு இடங்கொடுக்கக்கூடாததா யிருக்கவேண்டும்.
15. வேர்கள் அக்கம்பக்கத்து வயல்களில்போய்ப் படர்ந்து கெடுதல் பண்ணக்கூடாததா யிருக்கவேண்டும்.
6. கால் நடைகளால் சலபமாய்த் தின்னக்கூடாததாயிருக்கவேண்டும்.

17. வயதானவுடனே வெட்டப்பட்டு, பூமிக்குச் சமீபமுள்ள அடிக்கட்டைகள் தளிர்ந்து வேலிக்கு உதவும்படியா யிருக்கவேண்டும்.

4. வேலிப்பயிர் உண்டாக்குவதில் சாசுவதமான நன்மையை உத்தேசித்து உண்டாக்கவேண்டுமே தவிர தற்சமயம் ஏற்படுகிற நன்மையைக் கருதி உண்டாக்கக் கூடாது. பிரத்தமமான பிரயோஜனத்தை, அற்பப்பிரயோஜனத்தைப்பார்க்கிலும் ஜாஸ்தியாய்க் கவனிக்க வேண்டியதாதலால் குடிகள் இறுதிவரையில் கவனக் குறைவாயிருப்பதை நீக்கவேண்டும்.

5. வேலிப்பயிர்களைத் தரைமட்டத்திலேயாவது, அல்லது கரைகள் போட்டு அவைகளின்மேலாவது உண்டாக்கலாம். தரைமட்டத்திலிருந்துண்டாக்குவது தான் சிலாக்கியம். வேலி யோர்மாக அவசியமான இடங்களில் வடிகால் ஏற்படுத்தலாம். சாதாரணமாய் வடிகால் வசதி இருந்தபோதிலுங்கூட, கால்டைகள் வேலியை எழும்பித்தாண்டாமலிருப்பதற்காகச் சிறு கால்களும் வெட்டிவைக்கிறதுண்டு. இப்படிக்கால்க ளுண்டாக்குவதினால், பயிர்களின் அஸ்திவாரம் இடிந்து விழாமலிருக்கும் பொருட்டு வேலியிலிருந்து கொஞ்ச தூரத்திற்கப்பாலேயே வைக்கவேண்டும். பயிர்கள் நுனியைப்பார்க்கிலும் அடியில் பலமாய் மடர்த்தியாய் மிருக்கவேண்டும். கரைகளின்மேல் ஏற்படுமபட்சத்தில், கரைகள் செங்குத்தாயிருக்கக் கூடாது. அடியில் அகலமாயும் உச்சியில் குறுகலாயும்,

தகுந்த சரிவுடன் போடவேண்டும். வேலிப்பயிர்களை உண்டாக்குவதற்கு முன்னால் தரையில் பூமியை $4\frac{1}{2}$ அடியகலத்திற்கு வெட்டிவாங்கி, சுத்தப்படுத்தி ஓரங்களில் $1\frac{1}{2}$; $1\frac{1}{2}$ அடியகலம், 1 அடி ஆழத்திற்கும், நடுவில் $1\frac{1}{2}$ அடியகலத்தை 2 அடி ஆழத்திற்கும், கொத்தித் தூவாளியாய் வைத்து இருக்கவேண்டும். இதில் விதைகளை நான்கு சமமான வரிசையில் போட்டாவது, அல்லது பதியன்களை நடடாவது பயிர் உண்டு பண்ணலாம். அடிக்கடி உரங் கொடுத்தால் பயிர் சீக்கிரம் வளரும். மழைகாலத்தில் நடடால் ஆரம்பத்தில் இறைவைக்கு அதிகச் செலவு ஏற்படாது. நாற்றங்களில் விதைகளைவிட்டு நாற்றைப் பிடுங்கி வரிசையாக மத்தியில் நடுவது சிலாக்கியமாகவும் கொள்ளப்படுகிறது. சிலபயிர்களுக்கு இரண்டுவருஷ நாற்றைப் பிடுங்கி நடப்படுகிறதாம். நாற்றங்கால் செய்கோத்தி நல்லதாயிருக்கவேண்டும். நாற்றங்காலி வடர்த்தியாய் விதைக்கக் கூடாது. காலடிப்படாமலிருக்குபபடி சிறு பாத்திகளாக உண்டாக்கி, அவைகளில் ஒத்தாற்போல் ஒரு அங்குலத்திற்கு ஒருவிதையாக விதைக்கவேண்டும். ஒருவருஷமானவுடன் நாற்றைப் பிடுங்கி பயிரின் உச்சியில் 2, 3 அங்குலம் வெட்டி, வெட்டிவாங்கி யிருக்கப்பட்ட இடத்தில் அடிக்கு ஒரு வரிசையாக நாலாவரிசையும், வரிசையிலேயே 4 அங்குலத்திற்கு ஒருதாமும் நடவேண்டி மாம். ஒற்றை வரிசையைக்காட்டிலும் இரண்டு அல்

வது அதற்கு மேற்பட்ட வரிசைகளில் உண்டாக்கு வது திறம். கட்ட இளகாற்றுகளையும், பதியன்களையும் ஆடுமாடுகள் தின்னும்படி பாதுகாத்துக்கொண்டே வாவேண்டும். வேலி பெரிதாகிறவரையில், முட்களால் இளம்பயிரை அடைத்துவைக்கலாம். பெரிதாய்ப் போனவுடன் பிரித்தெறித்துவிடலாம். அடிக்கடி கொத்திக் களைப்பிடுகி எறித்துவிடவேண்டும். அப்போதுதான் வேலி கன்றாயும் அடர்த்தியாயும் வரும். பயிர் 4, 5 அடியுபயம் வந்தவுடன் வருஷா வருஷம் ஒத்தாற்போல் அழகாய்க்கத்தறித்து வைத்துக்கொள்ளலாம். கத்திரிப்பெல்லாம் மழைகாலத்தில் செய்யவேண்டும். வேலி கன்றாய் ஊன்றிப் போனவுடன் போனவை வந்தவைகளை வருஷா வருஷம்பழது பார்த்து எப்போதும் இடைவெளியில் லாமல் ஜாக்கிரதையாகப் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். வளருகையில் ஒன்றோடொன்று சேணத்து அடர்த்தியாய் வைத்திருக்கவேண்டும்.

கொறுக்கப்பயிர்.

எமது இராஜகூடனியில் உயிருள்ள வேலிகளில் இதை நிரம்பச் சிலாக்கியமாகச் சொல்ல வாம். வேலிக்கு வேண்டிய சகல குணங்களும் இதற்குப் பொருத்திருக்கின்றன. இதை விதைகளினாலும், காற்றுகளினாலும், அடிக்கட்டை வேர்களினாலும் உண்டாக்கலாம். 3 சமமான வரிசைகளில் கட்டலாம்.

ஆறு மாதத்திற்கெல்லாம் பயிர் கன்றாய் வளர்த்துவிடும். 2வது வருஷம் முதல் களைகளைக் கழித்து விற்றுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம். ஆனால், 3வது வருஷம் முதல் சரியாய் வருஷாவருஷம் சழித்துவருவதே உத்தமம். வருஷம் 2 தரம் கழிக்கலாம். அழகுக்காகக் கழிக்கும் பசுத்தில் 3 தாரும் கழிக்கலாம். சாதாரணமாய் விவசாயிகள் ஒருதரங் கழித்தால் போதுமானது. ஒரு மையில் தூர்முள்ள வேலியை வருஷா வருஷம் கழித்தால் 30, 40 வண்டி விறகுக்குக் குறையாமல் கிடைக்கும். பயிருக்குச் சுற்றிலும் இவ்வேலி விருக்கும் பட்டத்தில் வேர்கள் மிகவும் தூரமாய்ப் பரவிப் பயிருக்கு இடஞ் சூண்டாகும். ஆகையால் இதற்கு அடுத்தாற்போல் சிடங்குகள் வெட்டிவைப்பது உலாம். இதன் தழைகளை ஆடுமாடுகள் தின்னும்.

கிருவை.

இது சாதாரணமாய்ப் பதியன்களால் சமமான வரிசையில் கட்டவேண்டும். இதன் இலை ஆடுகளுக்குத் தீவனமாகிறது. இதற்கும் வேலிப் பயிருக்குள்ள சகல குணங்களும் உண்டி. சீயாக்காய்ப் பயிரும் இப்படியே சகல குணங்களையும் உடைத்தாயிருக்கிறது.

வேலிப்பயிர்கள்.

கந்தாழை.

3. இது பெருங்காற்று வேகத்தைத் தணித்து பயிருக்கு அனுகூலத்தை உண்டாக்காது. விறகுக்குப் பிரயோஜனப்படாது. இது கரையின்மேலுண்டாக்கப்படுகிறது. ஒரு கஜ நீளம் கரைபோட ஒரு அணு செவ்வா கிறது. 7, 8 வருஷம் இலைகளை வெட்டாம விருந்தால் பிறகு வருஷா வருஷம் வெட்டி நார் எடுக்கலாம். 40 மணங்கு இலைகளுக்கு ஒரு மணங்கு நார் கிடைக்கும்.

கருவேல்.

4. இது வேலியாசிருப்பதுடன், இதன் இலை ஆட்டிற்கும், மரம் விறகிற்கும், வண்டி வேலைகளுக்கும், உழவு கருவிகளுக்கும் பிரயோஜனப்படும்.

கள்ளி திலுககள்.

5. முட்களுடன் டர்த்தியா யிருப்பதால் வேலிகுப் பிரயோஜனமாகும். இவைகளிலிருந்து வரும்படியொன்றங் கிடைக்காது.
6. ஆடாதொடை, காட்டாமணக்கு, ஆதாளை இவைகளைப் பசுந்தான் உரத்திற்கும் பிரயோஜனப்படுத்தலாம்.
7. புளிச்சை அல்லது புளிமஞ்சி இவைகளிலிருந்து நீள நாரும் எடுக்கலாம். கிரையைச் சமையலும் செய்யலாம்.

வேலிப்பயிர்கள்.

8. முட்குசம்பைப் பயிரிடுதல். 345.
புச் சாயமும் எடுக்கலாம். விதை நிவர எண்ணெயும் கிடைக்கும்.
9. மேலே சொல்லியிருக்கிற மற்றவைகளும் கிலுணங்களுடன் வேலிக்குப் பிரயோஜனமாகும்.

கொழக்கட்டைப்புல்கள்.

கொழக்கட்டைப்புல்.

இது சாம்பல்மண் என்று சொல்லப்படுகிற சாம்பல் வர்ணமுள்ள களிமண் பூமியில் நன்றாய் வளருகிறது. அடுத்தபடி தாவாளியாகியிருக்கப்பட்ட செவ்வெல் களியிலும், மணலிலும் வளருகிறது. பருத்தி பயிரிடும் கரிதல் காட்டிலும், சுக்கான் பாறைகளின் சிதைவு அல்லது கரைவினால் உண்டாகும் பூமிகளிலும் அடுத்தபடி வருகிறது. பழைய கிராமந்தரங்களிலும், அல்லது சில பூமிகள் கிராமங்களுக்குச் சமீபமாக இருப்பதால் குடிகளால், மல, சல உபாதைகளை நீக்க உபயோகப்படுவதால் அவ்வித நிலங்கள் கூட சர்வ சிலாக்கியம். இந்தப்புல்லுக்குக் கட்டுத் தண்ணீர் அல்லது தங்கு தண்ணீர் முக்கியமாய்க் கெடுதல் பண்ணும்; உரப்பாண களி நிலங்களில் இப்பயிர் வராது.

மேற்படி புல் சாகுபடி செய்யவேண்டிய மேய்ச்சல் பூமியை, மலைக்கிடுவை அல்லது கள்ளி, சப்பரத்தி முதலிய உயிருள்ள வேலிகளால் அடைக்கப்படவேண்டும். மேய்ச்சல் பூமியின் விஸ்தீரணம் 100 ஏக்கர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டிருக்கலாம்.

கொழக்கட்டைப்புல் கிரம்ப உயரமாகும், கம்பிபோன்றதாயும், கொத்துக் கொத்தாயும் வளரும்.

மேற்படி புல் விதை தெளிக்கப்படும்போது ஆட்டுக்கிடையால் சாதாரணமாய் பூமி உரப்படுத்தப்படுகிறது; பிற்பாடு அதே வருஷத்தில் அநேக மாதம் மாடுகள் மேய்வதனாலும், நிலம் உரப்படுத்தப்படுகிறது.

கோடை மழைகளில் பூமி உழப்படவேண்டும். கொழக்கட்டைப்புல் விதை தனிதாகவாவது அல்லது சோளம், எள்ளுடன் கலந்தாவது தெளிக்கப்படுகிறது. கீழ்காற்றாமழை ஒத்துக்கொண்டால் பின்வரும் ஜெனவரி மாதத்தில் மாடுகளை மேய விடலாம்.

கொழக்கட்டைப்புல் பூமிகளில் அநேக கணுக்களுடன் ஒடி ஒவ்வொரு கணுவிலிருந்தும் கிளைகளாகப் புற்கள் வெளியில் வருகின்றன. கணுக்களின் மத்தியிலுள்ள பூக்கங்கள் பூமியில் மண்ணுக்குள் மறைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு கணுக்களும் தனிமையில் வேர்கள் விடுகின்றன. பயிர்கள் நன்றாய் வளரும் பட்சத்தில் ஒரு புல் 50 முதல் 100 கணுக்களுக்குக் குறையாமல் விட்டு, கணுக்களின் கீழ் வேர்களும், மேல்புறம் புல்லு களுமாயிருக்கும்; ஆகையால் ஒரு கொத்தில் 50 முதல் 100 புல்லுக்குக் குறையாமிருக்கும்.

இப்பயிரை இதன் வளர்ச்சியின் எக்காலத்திலும் பயமில்லாமலும், பிடுங்கி எடலாம். கிரீட நீடித்த வறட்சிக் காலங்களில் இப்பயிர் காய்ந்து பட்டுப்போனும்போல் கண்ணுக்கு புலப்பட்ட போதிலும் கூட ஒரு நல்ல மழை பெய்தால் பிறகு எல்லாம் தளிர்ந்து

விருத்தித்தப்புல்லின் வேர்கள் நிரம்ப குட்டை. விழைய மேய்ச்சல் நிலங்களில் கூட அதாவது வெகு நாள் கொழக்கட்டைப்புல் சர்குபடி செய்து வரும் நிலங்களில் கூட வேர்கள் 3 அங்குலத்துக்குமேல் ஓடக்காணும். இப்புல் விதை, பூமியின்மேல் எப் போதும் தெளிக்கப்படுகிறது. பிற்பாடு விதையை மூடுவதும் கிடையாது; பூமியைக் கொத்தி விடுவதும் கிடையாது. விதை ஒரு வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட விதையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு ஏக்கருக்கு 10 பட்டணம் படி விதை தெளிக்கவேண்டும்.

விதை தெளிக்கிறவன் தன் இடது கையில் ஒரு கூடையில் விதையை வைத்துக்கொண்டு, வலது கையால் கூடையிலிருந்து விதையை எடுத்து, தன் இடது பக்கத்தில் 2 அடி விதை பரவும்படியாய் தெளித்துக் கொண்டே நேராகப்போகிறான். விதை நிரம்ப லேசானதால் அதிகதூரம் போய்விழாது. இப்படி தெளித்துக்கொண்டு நேராய்த் தலைமாட்டுக்குப் போனவுடன், இடது பக்கமாய்த்திரும்பி தலைமாட்டில் 4 அடி நேராய் நடந்து, அங்கிருந்து நேராய் இடது பக்கம் திரும்பி விதையை 2 அடிக்குத் தெளித்துக்கொண்டு நேராய்ப்போய், அந்த 4 அடி அக்லமுள்ள தட்டில் எங்கும் விதை சரியாய் விழுப்படி செய்கிறான். இப்படியே நிலம் முழுவதும் தெளிக்கப்படுகிறது.

பூமியில் தேவையான ஈரம் இருக்கும் பட்சத்தில் விதை தெளித்த 6 நாளைக்கெல்லாம் முளை கிளம்பும்.

ஒருபாட்ட மழை, இப்பயிரை பூமியில் கன்றாய்ப் பிடிக்கும்படி செய்து விடும்.

முதல் வருஷத்தில் ஆடாவது மாடாவது இப்புல்லை மேயாமலிருக்கும்படி வெகு ஜாக்கிரதையாகப் பாதுகாத்துக் கொண்டு வரவேண்டும். கார்ப்பிருவத்தில் விதையைத் தெளித்தால், டிசம்பர், ஜனவரி மாதங்களில் மரட்டைவிட்டு மாச்சகமாதம் வரையில் மேய விடலாம்; பிற்பாடு அடுத்த கார்மழையினால் தளிர்ந்துப்பிராக ஒரு மாதமாகிற ஊரையில் மாட்டை மேய விடக்கூடாது; பிறகு ஜூலை, ஆகஸ்டில் மழைபெய் கிறவரையில் மேயவிடலாம். பிறகு ஒரு மாதத்திற்கு மரட்டை மேயவிடாமல் வைத்திருந்து பிற்பாடு பிப்ரவரி, மார்ச்சுமாதம் வரையிலும்கூட மேயவிடலாம்; மேய்ச்சலுக்கு மிஞ்சக்கூடியதாக புல் இருக்கும் பட்சத்தில் முதிர்வதற்கு முன்னால் அதாவது, பூவிட்டவுடனே அறுத்துவிடவேண்டும்.

மாட்டுத் தீனிகளில் கினிப்புல் லின் Guinea Grass, முக்கியம்.

இந்தப்புல் அநேகருக்குத் தெரிந்திராது. கோடை காலத்தில் கமது காட்டில் பசுந்தாள்களே அடிப்படுவது அரிது. அங்காலத்தில் அதைச் சாகுபடிசெய்து கறவை மாடுகளுக்குக் கொடுத்தால் கல்லுப் பூற்கறவை கிடைக்கும். இது சென்னைக்கு அடுத்த சைதாப்பேட்டை கவர்னமெண்டு பண்ணையில் சாகுபடி பண்ணப் பட்டிருக்கிறது. இப்போது பூஞ்சுவர்னமெண்டு பண்ணையில் வருஷா வருஷம் சுமார் 11 ஏக்கர் சாகுபடி பண்ணப்படுகிறது. இந்தப்புல் சுமார் ஒருமுழ நீளமிருக்கும். கொத்துக் கொத்தாய் அடர்த்தியாய் வளரும் சுபாவமுடையது. குறைந்தபட்சம் மூன்று வருஷம் ஒருவடலில் தங்கியிருக்கும். வானத்தையுண்டாக்குவதுபோல, பக்கத்துப் போத்துகளின் வேர்களைப் பிடுங்கி கட்டால் பயிருண்டாய்விடும். இப்புல் விதைகளிலிருந்தும் உண்டாகும். ஆனால் வேர்களிலிருந்து (propagation by roots) உண்டாவதுபோலச் செழுமையாய் வளருகிறதில்லை. வயல்களை முகடுகளாகவும், படைச்சாலைகளாகவும் (Ridges and furrows) பிரித்து, படைச்சாலைகளில் எருவைப்போட்டு நிரப்பிவிடவேண்டும். நிரப்பியானவுடன் பழைய முகடுகளை உடைத்து படைச்சாலைகளாகவும், பழைய படைச்

கினிப்புல்.


351

சாலைகளை முகடுகளாகவும் பண்ணிவிடவேண்டியது. இப்புது முகடுகளில் அதாவது எருத் திரப்பிய முன் படைச்சாலைகளில் புல்லின் அடிக்கட்டைகளை நடவேண்டும். கீழ் காற்று மழையில் பயிரை கட்டுவிட்டால், பாசனச் செலவு அதிகயிருக்காது. அப்படி நடாமல் பாக்கிக்காலங்களில் கட்டால் பாசனச்செலவு ஜாஸ்தியாகும். கிவிதில் கையால் நடக்கூடாது. ஒரு குச்சியை யெடுத்து ஒரு முனைசூர் பண்ணி, இந்தக் கூராவ் முகடுகளில் குத்திடவேண்டும். இதற்கு இங்கிலிஷில்—(Dibbling) என்று பெயர். வருஷா வருஷம் 3 அல்லது 4 அறுப்பு அறுக்கலாம். இது குறைந்த பட்சம் 3 வருஷப் பயிராதலால் 3வது வருஷத்தில்தான் கண்டுமுதல் ஜாஸ்தியிருக்கிறதாம். ஒன்று இரண்டு அறுப்புக்குப் பிறகு, களைபிடுங்கவும், பயிர் வளருவதை சீக்கிரப்படுத்துவதற்கும், வயல், முகடுகளுக்குக், குறுக்கே உழப்பட வேண்டும். இப்படி உழுதுவிட்டால் வயல்முழுவதும் சிறுதூள் தூளாகியிருக்கும். ஒவ்வொரு குன்றிலும் (hill system) புல் அடர்த்தியாய் வளர்ந்து ஒங்கி சிறக்கும். ஒருவருஷத்தில் முதல்தாம் கண்டுமுதலில் சுமார் 37,000 பவுண்டு புல் கிடைக்கும். சென்ற 7 வருஷ காலமாய் பூஞ்சுவர்னமெண்டு பண்ணையில் சாகுபடிசெய்யப்பட்டு வருவதில் வருஷச் சராசரி வரும்படி சுமார் 17,534 பவுண்டு புல் ஆகிறது. இந்தப்புல் சாகுபடிபண்ண ஏக்கர் 1க்கு செலவு சுமார் 60 ரூபாய் ஆகிறது. ஒரு ஏக்கர் வரும்மானப் புல்லின் விலை 91 ரூபாய் ஆகிறதாம். ஆக எச்செலவுமேபோக

352 சிலவகை மாட்டுத் தீ வனப் புல்கள்

ஏகா 1க்கு வருஷா வருஷம் சுமார் ரூபாய் 30 கிடைக்
கூறும். கறவை மாடுகளுக்கு இது சிலாக்கியமென்று
அறியப்பட்டிருப்பதால், பூனா கவர்னமெண்டுப் பண்
னைக் கறவை மாடுகளுக்கு இதை உபயோகிக்கிறார்
கள்.

பட்டுப்பூச்சிகளை விரந்தியாக்குதல்.



பட்டுப்பூச்சி முட்டையிலிருந்து
புழுக்களுண்டாக்குதல்.


பூச்சிகளுக்குள் கிரம்ப சிறேஷ்டமானவை பட்டுப் பூச்சிகள். பூச்சிகளிலிருந்துண்டாகும் உற்பத்திகளுக்குள் கிரம்ப முக்கியமானது பட்டு. முதல் முதல் சீன தேசத்தில்தான் பட்டு லைகத்தொழிலா லுண்டாக்கப் பட்டது. ஐரோப்பாவிலுண்டாக்கப்படுகிற எல்லாப் பட்டுகளும், சீன, இந்தியா தேசங்களிலிருந்து மிகுதியாய் உண்டாகிற எல்லாப் பட்டுகளும், சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சிகளிலிருந்துதான் உண்டாகின்றன. ஆனால் இந்தியாவில் ஏராளமான பட்டுகள் இன்னும் அநேக விதப் பூச்சிகளின் கூடுகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன. சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சிகள் முசுக்கட்டைச்செடி அல்லது பட்டுப்பூச்சிச் செடி (Mulberry tree) களில் இலைகளை ஆகாரமாகக்கொண்டு லீ வித்து விருத்தியடைகின்றன. அநேகவிதப் பட்டுகளை உண்டாக்கும் இதரப்பூச்சிகள் ஆமணக்கு இலை, சவுக்கு இலை, தேக்கு இலை, வாதாம இலை, இலந்தை இலைமுதலிய இலைகளைத் தின்று லீவித்து விருத்தி யடைகின்றன. முசுக்கட்டைச் செடியிலை (Mulberry leaves) களினால் விருத்தியாகிற பட்டுப்பூச்சிகளின் பட்டு எல்லாவிதப் பட்டுகளையும் பார்க்கிலும் கிரம்ப விலையுயர்ந்ததாகையால் இவைகளைப்பற்றித்தான் கீழ் விவகரிக்கப்படும்.



முசுக்கட்டைச் செடி அல்லது பட்டுப்பூச்சிச் செடி.

சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சி சீன, பொகாரா, ஆப்கானிஸ்தான், காஷ்மீரம், பெர்ஷியா, தென் ருஷியா, துருக்கி, இலிப்டு, ஆஹ்ஜிரியா, இடலி, பிரான்சு, ஸ்பெயின் முதலிய இடங்களில் பழக்கப்பட்டிருந்த போதி


லும், மைசூர் இராஜங்கத்திலும் பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் நமக்கு இதைப்பற்றி எழுதவேண்டுமென்கிற ஆவலுண்டாயிற்று. இந்தப் பட்டுப்பூச்சி வருஷம் ஒன்றுக்கு ஒரே ஒரு விளைச்சலைத்தான் கொடுக்கும். இப்பூச்சி நூல்தூற்றும் கூடோ மிகவும் பெரிது. இங்கூட்டின் பட்டுநூலோ மிகவும் உத்தமமானது. வெள்ளை நிறம் அல்லது தங்கக்கைபோலொத்த மஞ்சள் நிறத்தை உடைத்தாயிருக்கும்.



பட்டுப்பூச்சிப் புழுக்கள் இலைகளை ஆகாரமாக உட்கொள்ளும் சட்டிகள்.

சாதாரணப் பட்டுப்பூச்சியின் உறுமறுதல்.—(Metamorphosis) பட்டுப்பூச்சியின் முட்டைகள் (Egg or ovum) சாம்பல் வர்ண முள்ளதாயிருக்கும். சீதோஷணக்கருவியால் 60 டிகிரி F. உஷ்ணத்தில் சுமார் 10 தினம் இம்முட்டைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தால், இவைகள் வெளுத்து உடனே சிறுபுழுக்களாய் மாறிவிடுகின்றன (Larva). இப்புழுக்கள் பிறந்தவுடன் சுமார் ஒரு அங்குலத்தின் இருபதில் ஒருபாகம் நீளமுள்ளதாயிருக்கின்றன. இவைகளின் உடல் நீளமாயும், மிருதுவாயும், சாம்பல் வர்ணமுள்ளதாயிருக்கிறது. முன்பக்கத்தில் ஒரு தலை, இரண்டு கண்கள், ஒருவாய் இருக்கின்றன. தலைக்குப்பின் ஒன்றின்பின் ஒன்றாய் 3 வட்டங்கள் தோன்றும். இவைகள்தான் மார்பு அறை. ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் ஒரு ஜதை சிறு பாதங்களைப் பார்க்கலாம். இந்த வட்டங்களுக்குப்பின் வயிறிருக்கிறது. இவ்வயிற்றின் இறுதிப்பக்கத்தில் ஐந்து ஜதைச் சதைக்கணுக்கள் காணப்படும். இவைகளும் பாதங்கள் தான். ஆகையால் பட்டுப்புழுவுக்கு மார்பில் 3, வயிற்றில் 5, ஆக 8 ஜதைப்பாதங்களுண்டு. இப்புழுக்கள் முசுக்கட்டை இலைகளை (Mulberry leaves) மண்டும். இவைதான் அவைகளுக்கு ஆகாரம். பட்டுப்பூச்சி, புழுவாகவே சுமார் 34 நாளிருக்கிறது. இந்தக் காலத்தில் நான்குதடவை தோல்உரிக்கின்றது. முதல்கருப்பாயிருக்கின்றதை வெள்ளையாகவும், வெள்ளையை மஞ்சள் நிறமாகவும், மஞ்சள் நிறமுள்ள தோல்போய் பச்சைநிறமுள்ள தோலாகவும் இப்படி நான்குதடவை


தோல்கள் மாறுபடுகின்றன. தோலுரிக்கு முன் கொஞ்சம் மீள்தயாரும் இலைகளைக் கொஞ்சகாலம் தின்னும்லுமிருக்கும். சுமார் 31வது நாள் இலை புசிப்பதை நிறுத்தி வேறு உருவமடைய வேண்டியதற்குள்ள ஏற் பாடுகளைச் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. அப்போது உடம்பு மிருதுவாய்ப்போய் வாயிலிருந்து பட்டு நூலை விட்டுத் தன்னைச் சுற்றி அங்கும் இங்குமாய் நூலை நூற்று ஒரு புழுக்கூட்டை உண்டாக்குகிறது. ஒரு பட்டு நூலின் நீளம் சுமார் 1,100 அடிக்குமேலிருக்கிறதாம். புழுக்கூடு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நிறை ஜாஸ்தியாயிருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீளம் அதிகரிக்கும். பொதுவாக ஒரு புழுக்கூடு முடிவுபெற 4-5 தினம் செல்லுமாம். புழுக்கூடு முடிவடைந்தவுடன் திறந்து பார்த்தால் முன்னிருந்த புழு காணப்படுகிறதில்லையாம். இப்போது (Chrysalis Stage) ஊதாநிறமாய் மாறிப்போய் முட்டை வடிவமாய்க் காணப்படுகிறதாம். தலை, தாடை என்கிற வித்தியாசம் தெரிகிறதில்லை. முன்பக்கத்தில் ஒருவளைந்த கட்டு (Band) காணப்படுகிறது. இந்தக் கட்டித்தான் பிறகு இறகுகளாய் மாறிவிடுகின்றது. இப்படி இந்தப் புழு தன்கூட்டில் சுமார் 20 நாளுக்கு கிறது. பிறகு தன்வாயில் ஊறும் நீரால் கூட்டின் ஒரு ஓரத்தில் நனைத்து அதுவழியாய்த் துவாரம்செய்து கொண்டு வெளியில் பட்டுப்பூச்சியாய் (Perfect Insect) வருகின்றது. இப்போது கூட்டுப்புழு வெள்ளைச் சிறகுகளுடன் காணப்படுகிறது. புழுவாக இருக்கையில் வாயில் தாடைகளிருப்பதுபோல இப்போது கிடை



கட்டுகளுக்குச் சமீபத்தில் இப்பேர்ப்பட்ட களைகளை ஒரு அடி வித்தியாசத்தில் வைத்தால் அவைகளில் புழுக்கள் தங்களைச் சுற்றி நூல் நூற்று கூடுகள் உண்டாக்கும்.

தோல்கள்
கொஞ்சம்
மைலுமிரு
கிறுத்தி தே
பாடுகளைச்
மிருதுவாய்
தன்னைச்சு
புழுக்கட்டை
நீளம் சுமார்
எவ்வளவுக்
அவ்வளவுக்
வாக ஒரு பு
புழுக்கட்டு
நிருந்த பு
(Chrysalis)
டை வடிவம்
என்கிற வித்
ஒருவளைந்த
கட்டித்தான்
இப்படி இத்
கிறது. பிறகு
ஒரத்தில் நீ
கொண்டு வெ
வருகின்றது.
சிறகுதளுடன்
யில் வாயில் தி

யாது; ஆனால் வாய் உருண்டைவடிவமாயும் முறுக்
குள்ளதாயும் நீண்டுவிடுகிறது. கால்களோ மெலிந்து
நீண்டுவிடுகின்றன. உள் அவயவங்களும் மூன்றிருந்த
தற்கு வித்திபாசப்படுகின்றன. வெளித் தோற்றங்
களும் அப்படியே. இப்படிப் பூச்சியாய் (Perfect In-
sect) வெளிவந்தவுடன், ஆணும் பெண்ணுமாய்க் கல
ந்து 24 மணி நேரம் சேர்த்திருக்கின்றன. ஒருநாள்
கழிந்தவுடன் ஆண்பூச்சி பெண் பூச்சியின்மேல் செத்
துக்கிடக்கிறது. பெண்பூச்சி ஆண்பூச்சியைவிட அதிக
நாள் உயிருடனிருக்கிறது. ஆண்பூச்சி காலமானவுடன்
பெண்பூச்சி தன் முட்டையிடும் காரியத்தைப் பார்
கிறது. ஒரு பெண்பூச்சி 500 முட்டைக்கு மேலிடும்.
பெண்பூச்சி தான் கூட்டினிருந்து வெளிவந்தபிறகு 10,
20 நாள் வசித்து உயிரை இழந்துவிடுகிறது. இக்காலத்
தில் ஆகாரம் ஒன்றும் உட்கொள்ளுகிறதில்லை. பட்டுப்
பூச்சிக்கு இவ்விதம் நான்கு மாறுருவங்களுண்டு. முதல்
முட்டைகூடாகப் பத்து தினமும், இரண்டாவது புழு
வாக (Larval stage) 34 தினமும், புழுக்கட்டுக்கட்ட
4 தினமும், பட்டுப்பூச்சியாக (Chrysalis stage) 20
தினமும், பட்டுப்பூச்சியாக 15 தினமும், ஆக நான்கு
மாறு உருவங்களிலேயும் சுமார் 83 நாளிருந்து நமக்கு
முக்கியமான வஸ்துவாகிய பட்டையளிக்கும்படி
சிறுஷ்டித்திருக்கிற பசுவானை இடைவிடாது துதிசெய்
வோமாக.



பட்டுப்பூச்சியும், அதின் முட்டைகளும்.

பர்மா தேசத்துப் பட்டுப்பூச்சியும்
பட்டுப்புழுக்கட்டிலிருந்து நூல்தூறும்
கைத்தொழிலும்.

பர்மாதேசத்தில், மாக்வி (Magwe) என்கிறதாக ஒரு ஜில்லா இருக்கிறது; அந்த ஜில்லாவில் 15, 20 கிராமத்தார்கள் பட்டுப்பூச்சியை வளர்த்து, அவைகளினை ஹண்டாகும் பட்டைக்கொண்டு ஜீவனம்செய்து வருகிறார்கள். அவர்களுடைய அனுபோகத்தைக் கீழ் உரைக்கப்படும்.

முதல்முதல் சீனாதேசத்திலிருந்து பர்மாவுக்குப் பட்டுப்பூச்சி முட்டைகள் கொண்டுவரப்பட்டன. பட்டுப்பூச்சிக்கு நான்கு அவதாரங்களுண்டு. முட்டையாகவும் பிறகு புழுவாகவும் அடித்தபடி கூட்டுப் புழுவாகவும் கடைசியில் திறகுடன் பூச்சியாகவும் ஆக இப்படி நான்கு மாறுபாடும் கொள்ளுகிறதைப் பார்க்கலாம். பர்மா தேசத்துப் பட்டுப் பூச்சியின் முட்டைகள் புழுவாகிறதற்கு 8 தினங்கள் பிடிக்கின்றன. இப்புழுக்கள்தங்கள் வாழ்நாளாகிய 44 தினங்கட்குள் நான்கு தடவை தங்கள் தோல் அல்லது சட்டைகளை உரிக்கின்றன. புழுவான பிறகு 6-வது, 14-வது, 22-வது 30-வது தினங்களில் அதன் தோல் உரிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு தடவைபிலும் சட்டைகள் நிறம் மாறுகின்றன. புழுக்கள், ஒவ்வொரு சட்டை மாறுங்காலத்தில் இரண்டு தினம் மந்தமாயும் ஆகாரம் உட்கொள்ளா

மலு மிருக்கின்றன. கடைசிச் சட்டையை உரித்தவுடன் 12 தினம் முகக்கட்டைச் செடி யிலைகளைப் (Mulberry leaves) புசித்து மஞ்சள் நிறமாய் மாறிப் புழுக்களிகள் கட்ட ஆரம்பிக்கின்றன. பர்மா தேசத்தார்கள் முட்டைகளைப் புழுவாக வேண்டியதற்குள்ள சிதோஷணத்தில் 8 தினம் சாக்கிரதையாய் வைத்துப் பிறகு 3 அங்குலமாமும், எங்கு பார்த்தாலும் 3 அடி 5 அங்குலம் அகலமுள்ள தட்டிகளில் புழுக்களை எடுத்து வைத்து விடுகிறார்கள். இத்தட்டிகளில் தினம் நான்கு தடவை ஆகாரமாக முகக்கட்டை யிலைகளைப் புழுக்களுக்கு வைப்பார்கள். புழுக்கள் இவ்விலைகளைத் தின்றுவிடும்.

புழுக்கள் பாலியமா யிருக்கையில் ஒருவித ஈ இவைகளைக்கொட்டிக் கொன்று விடுகிறதாம். இதைத்தடுக்கும் பொருட்டு தட்டிகளைத் துளியால் மூடிவைப்பது வழக்கம். புழுக்களுக்கு வயதானவுடன் தட்டிகளைத் துளியால் மூடிவதில்லை. வயதான புழுக்களை அந்த ஈ கொத்தாவு செய்கிறதில்லையாம். ஒரு தட்டி 800 முதல் 1000 புழுக்களைக் கொள்ளும். இத்தத் தட்டிகளுக்குப் புழுக்கட்டிகள் என்று பெயர். புழுக்கள் மஞ்சள் நிறமாகும்போது இத்தட்டிகளிலிருந்து எடுத்து வேறு 1 அங்குலம் ஆமும், 5 அடி 5 அங்குலம் எங்கு பார்த்தாலும் அகலமுள்ள பெரியதட்டிகளில் வைப்பது வழக்கம். இத்தட்டிகளுக்குப் புழுக்கூடுத் தட்டிகளென்று பெயர். இத்தப் பெரியதட்டியில் 30 அடி நீளம் 3 அங்குலம் அகலமுள்ள மூங்கில் பாய் ஒன்றை

மடக்கி மடக்கி 3 அங்குலத்துக் கொருதரம் கூடுகள் கட்டிவைத்திருக்கிறார்கள். பெரிய கட்டியில் புழுக்களை எடுத்துவைத்து மூன்றாள் ஆனவுடன் அவைகளைச் சுற்றிச் சுற்றி கூடுகள் கட்டியாய்விடுகின்றன.

கூடுகள் முடிந்தவுடன் இவைகளை எடுத்துப் புழுத் தட்டி அல்லது சின்னத்தட்டிகளில் மறுபடியும் வைக்கிறார்கள். கூடுகள் பின்ன ஆரம்பிக்கையில் பெரியதட்டியில் வைக்கப்பட்டு, கூடுகள் முடிந்தவுடன் (அதாவது 3 நாளைக்கெல்லாம்) சின்னத்தட்டியில் மூன்று நாள் வைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆறுதினத்துக்குள் புழுக்களின் அங்குலட்சணங்கள் மாறுகின்றன. (புழுக்களுக்கும் கூட்டிற்குள்ளிருக்கும் புழுக்களுக்கும் அவயவங்களில் வித்தியாசமிருக்கின்றது, இரண்டாவது அவதாரமான புழு இப்போது 3 வது அவதாரமாகிய கூட்டுப் புழுவாய் (Pupa) மாறிவிடுகின்றது. புழுக்கள் வாயிலிருந்து பட்டுதூல் விட்டுத் தங்களைச் சுற்றிக்கூற்றிக் கூடுகள் கட்டுகின்றன.

மூன்றாவது அவதாரத்து புழுக்கூடுகள் வெந்நீர்ச் சட்டியில் ஜலத்துடன் போட்டு கொதிப்பிக்கப்படுகின்றன. இப்படிக் கொதிப்பிக்கையில் வீட்டிக் கிழவிகள் கொரடுகளால் புழுக்கூடுகளை எடுத்துச் சிலநூல்களைப் பிரித்து இராட்டினத்தில் சுற்றுகிறார்கள். ஒரு கிழவி ஒருகடவையில் 5 முதல் 7 கூடுகளைப் பொறுக்கி கையால் சில நூல்களைப் பிரித்துச் சட்டிமேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு மூங்கில் சட்டத்தின் வழியாக இந்நூல்களைவிட்டுப் பிரகு இதற்குமேல் வைக்கப்பட்

புழுக்கும் ஒரு மூங்கில் உருளைவழியாகக் கொண்டு போய் இத்துடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு இராட்டினத்தில் மேற்கூறிய நூல்கள் சுற்றப்படுகின்றன. இவ்விதமாக எல்லாக் கூடுகளும் நூல்களாக நூற்கப்படுகின்றன. ஆறு சின்னத்தட்டி புழுக்கூடுகள் அதாவது சுமார் 4,000 புழுக்கூடுகள் ஒரு வீசை பட்டைக் கொடுக்கின்றனவாம். ஒரு வீசை சுமார் 3½ பவுண்டு அவவிடங்களில் ஒரு வீசை பட்டு விலை சுமார் ரூபாய் 16 புழுக்கூடுகளின் ஓரங்களிலிருந் துண்டாகும் கச்சாப்பட்டு (Refuse silk) வீசை 1க்கு ரூபாய் 10 ஆக விற்கப்படுகிறதாம்.

புழுக்கூடுகளெல்லாம் நூலானவுடன் சட்டியில் தங்கியிருப்பது பாக்கிப் புழுக்களும் வெந்நீர் ஜலமுந்தான். இப்புழுக்களை யெடுத்து நெய்யில் அல்லது எண்ணெய்யில் பொரித்து உண்ணப்படுகின்றனவாம். பர்மா தேசத்தார்களுக்கு உருசிகரமான பதார்த்தங்களில் இது ஒன்றும். இப்போது நாம் ஷை புழுக்களின் அவதாரக் கதையைத் தொட்டுருவோம். மூன்றாவதுவதாரத்தில் அநேகமாய்க் கூடுகள் நூலாய் நூற்கப்படுகின்றன. சந்ததி விருத்திக்காக அதாவது முட்டைகளுக்காகச் சில புழுக்கூடுகள் தனியாய் எடுத்துவைக்கப்படுகின்றன. இந்தக்கூடுகளில் புழுக்களிருக்கின்றனவல்லவா? இந்தக்கூட்டுப்புழுவுக்கும் புழுவுக்கும் அவயவபேதமிருக்கின்றன வென்று முன் தெரிவித்திருக்கிறோமல்லவா? இந்தக்கூட்டுப்புழு கூடுகட்டி முடிந்தவுடன் ஈட்டாவது நாளில் கூட்டைவிட்டுப் பூச்

சியாக வெளிக்கிளம்புகிறது. ஆண் பூச்சியும் பெண் பூச்சியும் சேரும்படி ஒரு தட்டியில் பூச்சிகள் வைக்கப் படுகின்றன. புணர்த்தவுடன் இரண்டும் பிரிகின்றன. இப்போது பெண் பூச்சிகளை பனை ஒலைகளால் செய்யப்பட்ட பத்தாயங்களில் (Bills) வைக்கிறார்கள். ஒரு பத்தாயம் 1 அங்குல ஆழம், எங்குபார்த்தாலும் 3 1/2 அங்குல அகலமுள்ளது. ஒரு பத்தாயத்தில் 25 பெண் பூச்சிகள் வைக்கப்படுகின்றன. ஒன்றரை நாளைக்குள் இவைகள் முட்டைகள் இடுகின்றன. பிறகு பெண் பூச்சிகளை யெடுத்தெறித்து விடுகிறார்கள். 10 பத்தாயங்களின் விலை ரூபா 1. எவர்களுக்குப் பட்டுப்பூச்சிகளை வாங்கித்தொழில் செய்யவேண்டுமென்று இஷ்டமிருக்கிறதோ அவர்கள் முட்டைகளை வாங்கித்தொழில் செய்கிறார்கள்.

முசுக்கட்டைச் செடித் (Mulberry gardens) தோட்டங்கள் ஆற்றங்கரைப் படுகைகளில்தான் விருத்தியாகின்றனவாம். குன்றுகள் பக்கங்களிலேயும் விருத்தியாகுமாம். பதியன்களால் (Cuttings) பயிராக்கப்படுகின்றனவாம். ஒரு தோட்டம் 2 வருஷம்முதல் 5 வருஷம் வரையில் மல்பரிச்செடிகளை உடைத்தாயிருக்கும். செடி பெரிதாகிவிட்டால் இலைகள் அதிகமிராது. பெரிதானவுடன் வெட்டித் துண்டங்களைடுத்துப்பதுத் தோட்டம் போடுவது வழக்கம். செடி இளமைபாயிருக்கையில் தான் அதிக இலைகளைக் கொடுக்கும்.

சென்னை இராஜதானியிலுள்ள முக்கிய பயிர்களின் சாகுபடி விவரம்.

		விவரம்.	
பயிர்கள்		(ஒரு வருஷத்தில் ஒரு போகத்துக்கு ரேல சாகுபடி செய்யப்படும் விவரம் ணமும் அடங்கி உள்ளன.)	
கெல்	...	...	70,00,000 ஏக்கர்.
கோதுமை	...	...	18,000 "
சோளம்	...	...	45,00,000 "
கம்பு	...	...	30,00,000 "
கேழ்வரகு	...	...	15,00,000 "
முத்துச்சோளம் அல்லது மக்காச்சோளம்	...	...	7,50,000 "
கொத்துக்கடலை	...	...	1,31,000 "
இதர தானியப் பயிர்களுக்கும்	...	...	55,00,000 "
ஆளிவிதை	...	...	40,000 "
எள்ளு	...	...	7,50,000 "
இதர எண்ணெய் விதைப் பயிர்கள்	...	...	10,00,000 "
சுவை அதிகரிக்கச்செய்யும் பயிர்கள்	...	...	3,73,000 "
கரும்பு	...	...	57,000 "
இதர சர்க்கரை கொடுக்கும் பயிர்கள்	...	...	82,000 "
பருத்தி	...	...	17,50,000 "
இதர காகொடுக்கும் பயிர்கள்	...	...	44,000 "

அவுரி ... சுமார் 4,42,000 ஏக்கர்.

இதர சாயுத கொடுக்கும்
பயிர்கள் ... 1,446 ,,

கசகரா ... 17 ,,

கட்பி ... 59,000 ,,

புகையிலை ... 1,25,000 ,,

மாட்டுத்தீவனப் பயிர்கள் ... 83,000 ,,

தோப்புகள், பழத் தோட்
டங்கள், தோட்டக்கால் ... 6,50,000 ,,

ஆக மொது இராஜதானியிலிருந்து பாக்கத்துக்கு மேல்
சாகுபடி செய்யப்படும் விஸ்தீரணத்தையும் சேர்த்து
மொத்தம் சாகுபடி விஸ்தீரணம் சுமார் 2,75,00,000
ஏக்கர்.

மேற்கூறிய சாகுபடி விஸ்தீரணத்திற்கு சுமார்
25,00,000 ஏக்கரைப் பிரயோசனப்படுத்தப்படு
கின்றன.

சென்ன இராஜதானியின்

கால்நடைகளின் தலைகளுக்கள்

எருதுகள்	... சுமார்	45,00,000
பசுக்கள்	... ,,	37,50,000
எருமைக்கடா	... ,,	10,00,000
எருரை	... ,,	15,00,000
செமாரி ஆடு	... ,,	85,00,000
வெள்ளாடு	... ,,	50,00,000
எருநரிக்களும்	}	45,00,000
பசுவின் கன்றும்.		



11751
10/11/51
10/11/51