

L9C
~~N25~~
1.00939

OFFICE OF THE RAJAH
9-JUN-1925
MADRAS

குருமருந் துசாவஸ வைத்திய
குறிப்புளும்,
பெற்றோர்கள் பிள்ளிகளை
வளர்க்கும் விஷயங்களும்,
ஸ்திரீகளின் விஷயங்களும்.

பெரிய துசாவஸ,

பெருந்துசாவஸ, நிருச்சிபுப்பள்ளி.

விலை ரூ. 10.

30. இவ்வாறு குடித்த பால் திறந்த வாய்க்கொண்டு, மலத்தி
லுண்ட போகாமல், சுண்ணாம்புத்தூசி தன்மையாக, போய்ச்
சுத்த பாலில் சேர்த்த உபயோகிக்கவேண்டும். அப்படி எஞ்சியிருக்க
வாய்க்கு இரண்டு நாளை சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும்.

Light & Air.

சுத்த உதாசமுதம் - சுவாஸ்தமுதம்.

பின்னாலாகிய அனாதக்குப் போதுமான இடம் பெய்ச்செய்தவண்ணிடு
(விவாகத்தின் வெளிச்சிதாவலு) உத்தமரே வெயிலே அழகாகவேண்டியதாயின.
அப்படி இவ்வாறு தரிசுக்காரிக்கு வளரும் பின்நிதாவருத்த. பெயர்நீளும், தந்தம்
குணத்தினை வளம் தரும் வரையு உண்டாகும். உத்தமரே வளம், பெயர்நீளும் த
தண்டமரே, அப்போதும் குதவரையு உண்டாகும்.

அம்மை குத்துதல்.

5. ஆம்மை குத்தியிருந்தால் காலங்களில் அதிகத் தாத்தாகாது. உத வாக, குளிர்த்தது காலங்களில் உதவாது. அதிக குளிர்த்த தண்ணீர் குடித் தால் உடலுக்கு இரத்த காலங்களில் கொஞ்சகாலி, ஐயுறாமல், உயர்ந்த சந்தைகளை உண்டாக்கு. 100-க்கு 90 பேருக்கு இவ்வித தொத்தாவுகள் வருவதுண்டு. அது விஷயமாக சந்தை ஐக்கியமையாயிருந்தால் மெலிய போவ்விடும். கலையினமைய இருந்தால் தடுக்கம் குறையுமென பிரகாச அயல்வதற்குக் கொண்டுவிடுகிறது. சோத்த ஆவி, மெல் ஆவியும் உதவாது. இப்புத்தகத்தின் பிற்பாகத்தின் மிகமுக்கிய குறிப்புகள் இருத் திற்று. தொத்தகொண்டவரும்.

பஸ் ஸ்தோத்ரம்

இது அமேகம் அமுக்கவல்லது ஒரு தந்தையாகவும் குழந்தைக்குரிய
பன் ஸ்ரீரங்கபுரம் இரீர் தந்தை என்று விரும்பும். அந்நி வலி இருக்கும்
வகை வடிவம், செகம் வகை இருக்கும், தன அநி ருபாயிருக்கும்,
அமர்ந்து நித்திரை செய்யாது அமர்ந்த நிதிக்கிடு, வகை நெய்திரை
கை வகை, வகை, வகை இருக்கும் நித்திரை வகை வகை, செகம் வகை
கை வகை ஸ்ரீரங்கபுரம் அமர்ந்து இவ்வகை ஸ்ரீரங்கபுரம் நித்திரை
ஸ்ரீரங்கபுரம் 4 அல்லது 5 வகைக்கு முன்னமேயே தரப்படும்

8

டாக்டர் மருதம், திருச்சித்ருப்பள்ளி.

பெரிய அளவு கொடுக்கவேண்டும். அந்தஸ்தரத்தில் எவ்வளவு வயதான குழந்தைக்கு எவ்வளவு பால் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அறியுதல் (Teething necklace) பின்னாலும் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும். ஒரு வயதான குழந்தைக்கு எவ்வளவு கொடுக்கவேண்டும் பால், கொட்டி, காய்கறிகள் என்று கொடுக்கவேண்டும். வேதவீதம் தவிர்ப்பதற்கு பால் குழந்தைக்கு எவ்வளவு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல். வயதான குழந்தைக்கு எவ்வளவு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல். (Dr. N. Edward.)

பால் குழந்தைக்கு எவ்வளவு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

(Dr. N. Edward.)

SLEEP. நித்திரை.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டிய பால் குழந்தைக்கு கொடுக்கவேண்டும் என்பதை அறியுதல்.

உங்கள் வியாதிக்கு எந்த மருத்துவ வாக்சி சாப்பிடவேண்டும் என்று தெரியாத விஷயத்தில் தெரிவிக்கவேண்டியது.

ஸ்திரீகளின் வியாதியைப்பற்றி

தெரிவிக்கவேண்டிய குறிப்புகள்.

1. ஸ்திரீகளின் பெயர், வயது, கலியாணம் ஆகாது?
2. பிள்ளைகள் எத்தனை? பால் குடிக்கும் கைப்பிள்ளை உண்டா? ஊட்டி பிள்ளையின் வயது என்ன?
3. குடும்ப சரிவா, அல்லது ஆகுமா? கிறிம்-குணம் என்ன? வயத்திலுள்ளும் வேறே குணங்கள் உண்டா?
4. சீரம் புஷ்டியானதா அல்லது வரட்டியானதா?
5. தனக்குட்கிற வியாதியின் குணங்கள் என்ன? முதுகாவது தூய் பித்த வியாதி என்ன? இப்போது இருக்கிற குணங்கள் என்ன? வரிகைக்கிரமமாய் விபரம் வேண்டியது. இப்போது இம்மை குணங்கள் என்ன? தன்னை வெளியேப்படுத்தி தப்பப்படுத்தித் திரை ரோகனாக குறிப்புகள் என்ன? என்ருய்த் தெரிவாய் எழுதவேண்டியது.
6. பெண்களும்-அது உண்டா? எவ்வளவு காலமாக? இதை மேற்படி வியாதிக்கு முன்னமே உண்டா அல்லது இடைவிட்டோராது?
7. பட்டபட்டியலங்கள் உண்டா? வியாதிக்குப்பின் திரேகம் மெலிதானா? மெலிதில் வாய்வு அடைந்தல் உண்டா?
8. கைக்கண்-கண்பட்டைகளில் சத்தம் சரியானபடி ரோகனா?
9. கலம் குணம் என்ன? எத்தனை தடவை மலப்போக்கு போகும்? வித்தியாசமிருந்தால் விபரமாய் எழுதவேண்டும்.
10. சீரின் கிறிம்-குணம்-அல்லது என்ன? இரவில் எத்தனை தடவை போகும்? விபரமாய் எழுதவேண்டும்.
11. மருத்து அனுப்பவா? எந்தவிதவாதத்திற்கு? (தபால் அட்டன்.

இந்த ஒருவர் பருகண்ட வியாதியைப்பற்றி எழுதும்போது ஒரு மொருவரின் பெயர், வயது கிட்டமாய் எழுதவேண்டும்.

புண்கள் வியாதியைப்பற்றி

தெரிவிக்கும் குறிப்புகள்.

1. பெயர், வயது, கலியாணம் ஆகாது? பிள்ளைகள் உண்டா?
2. இப்போது தனக்குட்கிற வியாதியின் குணம் என்ன? இந்த வியாதி எவ்வளவு காலமாக இருக்கிறது? எந்த வியாதியிலிருந்து ஆரம்பம்? இந்த வியாதி செய்யும் முகவிய இம்மைகள் என்ன? இந்த குணங்களில் எது முதுகாவது உண்டானது? வியாதியின் குணங்களை வரிசைக்கிரமமாய் தெரியப்படுத்த வேண்டியது.
3. திரேகம் மெலிதா? ஸ்தூல சீரமா?
4. திரேகத்தின் வந்தப் பாகத்திலாவது கவி-குத்தல் இருக்கிறதா? கீக்கமுண்டா? உடமட முடியுமா?
5. வியாதிக்குப்பின் திரேகம் எப்படி?
6. கண் பரிதிபனம் உண்டா? ஜீரணம் சரியானபடி ஆகிறதா?
7. அகதி-பெண்களும் உண்டா? இது எவ்வளவு காலமாக இருக்கிறது?
8. கண்பட்டை-கைக்கண் மெருரி சத்தமில்லாமல் ரோகனா?
9. புண்-அறையாப்பு-வெள்ளை வந்ததண்டா? இது எவ்வளவுகாலம் தான்ப்படுத்தினது? இப்போது ஏதாவது இருக்கிறதா?
10. தாய் தப்பப்பண்ணாக்கு இந்த மேகரீச் சம்பந்தமுண்டா?
11. மலப்போக்கு எப்படி? கிறிம்-குணம் என்ன? எத்தனை தடவை போகும்?
12. சீர் கிறிம்-குணம்-அல்லது என்ன? இரவில் படுத்தியின் எத்தனை தடவை போகும்? வேளை ஒன்றிற்கு சரார் அல்லது என்ன?
13. மருத்து அனுப்பவா? எந்த விவாதத்திற்கு? (தபால் விவரம்.)
14. இதற்குமுன் இந்த ரோகங்களை சாப்பிட்ட மருத்தங்கள் என்ன?

ஸ்திரீகள் அறியவேண்டிய

சில குறிப்புகள்.

- (1) செற்பம் மாதவிடைக்கு முன்னும் உண்டாகும், மாதவிடைக்கு பின்னும் உண்டாகலாம்.
- (2) அப்படி மாதவிடைக்கு முன் செற்பம் உண்டானால் மாதவிடைக்கு 4 அல்லது 5 நாட்களுக்கு முன்னுள்ளதான் உண்டாக முண்டு. அப்படி உண்டானால் அந்த விவக்கம் கொஞ்சகாலம் மறைந்துபோகும்; அதாவது ஒரு பகல் அல்லது ஒரு பகலா இரவும் கண்டு விந்துபோகும்.
- (3) மாதவிடைக்குப் பின்னும் செற்பம் உண்டாகும் படித்தல் அந்த மாதவிவக்கம் பூராவாய் வராமல் தடைபட்டுப்போகும். ஏனென்றும் செற்பம் ஸ்பாயில் செற்பத்தினால் மாதவிவக்கம் உண்டாகி விவக்கம் உண்டாகாமல் விந்துபோக போதுமான காலம் கற்படுகிறது.
- (4) ஐந்து நாள் ஆறு நாள் விவக்கம் காணக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்கு 6 நாள் மட்டும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றிருந்தால் கூடமே தவிர கவனித்தல் அந்த காலிலிருந்து அல்லது அதற்கு 4 அல்லது 5 நாட்களுக்கு முன் செற்பமுண்டாகியிருக்கிறதாக்க கவனிக்க வேண்டியது.
- (5) போன விவக்கம் எழக்கூடாது என்பது அதற்கு பித்தின விவக்கம் தான் காணவில்லை என்று சொல்லுகின்றால், விவக்கத்திற்குப்பின் செற்பமுண்டானதாகக் கவனிக்கவேண்டியது. அதாவது போன மாதவிடைக்குப்பின் ஒரு வாரம் அல்லது 12 நாள் கழித்த செற்பமுண்டானதாகக் கணக்குப் பண்ணவேண்டும். இப்படி கணக்குப்பண்ணிக்கொண்டு பின் காட்டிய அட்டவணைப்படி பார்த்தால் குழந்தை பிறக்கும் காலத்தைத் திட்டமாப் கவனிக்க வேண்டுகும்.
- (6) முட்டி கொன்னதில் விவக்கத்திற்கு 4 அல்லது 5 நாட்களுக்கு முன்னமே செற்பமுண்டானதாகவும், பித்தின கணக்கில் விவக்கம் முடிந்தபின் 8-12 நாட்களுக்குள் செற்பம் உண்டானதாகவும் கணக்குப்பண்ணி அட்டவணைப்படி பார்த்தலாம்.

பிரசவ காலத்தை கணக்கிடும் முறை.

- (7) ஸ்டெசி விவக்கம் அந்த தேதியில் துவக்கினதோ (முடிந்ததோ பல்ல) அந்த துவக்கின் தேதியுடன் 7 நாளைக்கூட்டி பின்பு அதிலிருந்து 8 மாதத்தை பின் தள்ளி பார்த்தால் அந்த மாதம் அந்த தேதியான் பிரசவ காலமாகும். இதில் 4 அல்லது 5 நாட்கள் முன்னே அல்லது பின்னே பிரசவம் இருக்கலாம்.

உதாரணமாக:—ஸ்டெசி விவக்கம் துவக்கின தேதி ஆகஸ்டு 10 அத்தடன் 7 நாளைச் சேர், ஆகஸ்டு 17 ஆகும். இதிலிருந்து 8 மாதத்தை பின் தள்ளி, மேய் 17 ஆகும். இந்த மேய் 17 தான் காலமாகும். இதில் 4 அல்லது 5 நாட்கள் முன்னே பின்னே பிரசவம் ஆகலாம். (Naegele's Method.)

- (8) விவக்கம் கண்டு கின்ற தேதியிலிருந்து 278 நாட்கள் கணக்கிடு வேண்டும். எப்படி என்றால் விவக்கம் கண்டு கின்ற தேதியிலிருந்து 9 மாதத்தை கூட்டு 275 நாட்களாகும். [பிராவரி மாதம் கடுவில் வந்தால் 278 நாட்களாகும்] கூட்டியவந்த தேதியுடன் 3 அல்லது 5 நாட்களைக் கூட்டு. அந்த தேதியிலிருந்து 4 அல்லது 5 நாட்கள் முன்னே பின்னே ஆகலாம். (Mathew's Method.)

உதாரணமாக:—டெம்பர் 10ஆயுடன் 9 மாதத்தைக் கூட்டு, செப் டெம்பர் 10ஆ இத்தடன் 4 அல்லது 5 நாட்களை சேர்த்துக் கொள் செப்டெம்பர் 14 அல்லது 15ஆ.

- (9) பிரசவ காலத்தைக் கணிப்பதற்கு பலவிதமான முறைகள் இருக்கிறது. எல்லாம் மொத்த அடக்கம் என்னவென்றால் 278 அல்லது 280 நாட்கள் தாயின் வயற்றிலே சிசு இருக்க வேண்டும். அதுதான் பூரண செற்பம்.

பின் வரும் அட்டவணை.

- (10) ஒவ்வொரு மாதத்தையும் மூன்று பாகம் பண்ணியிருக்கிறது. முதல் பாகம் தழந்த உண்டான தேதி, இரண்டாவது பாகம் தழந்த துடிக்க வல்லது புழங்க துவக்கும் காலம் முன்னாலது பாகம் பிரசவம் ஆகக்கூடிய காலம்.

JANUARY. ஜனவரி.			FEBRUARY. பிப்ரவரி.			MARCH. மார்ச்சு.		
செப்டம்பர் அட்டவணை தேதி.	பிப்ரவரி அட்டவணை தேதி.	மார்ச்சு அட்டவணை தேதி.	செப்டம்பர் அட்டவணை தேதி.	பிப்ரவரி அட்டவணை தேதி.	மார்ச்சு அட்டவணை தேதி.	செப்டம்பர் அட்டவணை தேதி.	பிப்ரவரி அட்டவணை தேதி.	மார்ச்சு அட்டவணை தேதி.
Jan. ஜனவரி	May. மே.	Oct. அக்டோ.	Feb. பிப்.	June. ஜூன்.	Nov. நவம்பர்.	March மார்ச்சு.	July. ஜூலை.	Dec. டிசம்பர்.
1	20	8	1	20	8	1	18	6
2	21	9	2	21	9	2	19	7
3	22	10	3	22	10	3	20	8
4	23	11	4	23	11	4	21	9
5	24	12	5	24	12	5	22	10
6	25	13	6	25	13	6	23	11
7	26	14	7	26	14	7	24	12
8	27	15	8	27	15	8	25	13
9	28	16	9	28	16	9	26	14
10	29	17	10	29	17	10	27	15
11	30	18	11	30	18	11	28	16
12	31	19	12	July.	19	12	29	17
13	June.	20	13	1	20	13	30	18
14	1	21	14	2	21	14	31	19
15	2	22	15	3	22	15	Aug.	20
16	3	23	16	4	23	16	1	21
17	4	24	17	5	24	17	2	22
18	5	25	18	6	25	18	3	23
19	6	26	19	7	26	19	4	24
20	7	27	20	8	27	20	5	25
21	8	28	21	9	28	21	6	26
22	9	29	22	10	29	22	7	27
23	10	30	23	11	30	23	8	28
24	11	31	24	12	Dec.	24	9	29
25	12	Nov.	25	13	1	25	10	30
26	13	1	26	14	2	26	11	31
27	14	2	27	15	3	27	12	Jan.
28	15	3	28	16	4	28	13	1
29	16	4	29	17	5	29	14	2
30	17	5	30			30	15	3
31	18	6	31			31	16	4
	19	7					17	5

APRIL. ஏப்ரல்.			MAY. மே.			JUNE. ஜூன்.		
செப்டம்பர் அட்டவணை தேதி.	பிப்ரவரி அட்டவணை தேதி.	மார்ச்சு அட்டவணை தேதி.	செப்டம்பர் அட்டவணை தேதி.	பிப்ரவரி அட்டவணை தேதி.	மார்ச்சு அட்டவணை தேதி.	செப்டம்பர் அட்டவணை தேதி.	பிப்ரவரி அட்டவணை தேதி.	மார்ச்சு அட்டவணை தேதி.
April. ஏப்ரல்.	Aug. ஆகஸ்ட்.	Jan. ஜனவரி.	May. மே.	Sep. செப்.	Feb. பிப்.	June. ஜூன்.	Oct. அக்டோ.	March. மார்ச்சு.
1	13	6	1	17	5	1	18	8
2	14	7	2	18	6	2	19	9
3	15	8	3	19	7	3	20	10
4	16	9	4	20	8	4	21	11
5	17	10	5	21	9	5	22	12
6	18	11	6	22	10	6	23	13
7	19	12	7	23	11	7	24	14
8	20	13	8	24	12	8	25	15
9	21	14	9	25	13	9	26	16
10	22	15	10	26	14	10	27	17
11	23	16	11	27	15	11	28	18
12	24	17	12	28	16	12	29	19
13	25	18	13	29	17	13	30	20
14	26	19	14	30	18	14	31	21
15	Sep.	20	15	Oct.	19	15	Nov.	22
16	1	21	16	1	20	16	1	23
17	2	22	17	2	21	17	2	24
18	3	23	18	3	22	18	3	25
19	4	24	19	4	23	19	4	26
20	5	25	20	5	24	20	5	27
21	6	26	21	6	25	21	6	28
22	7	27	22	7	26	22	7	29
23	8	28	23	8	27	23	8	30
24	9	29	24	9	28	24	9	31
25	10	30	25	10	March	25	10	April.
26	11	31	26	11	1	26	11	1
27	12	Feb.	27	12	2	27	12	2
28	13	1	28	13	3	28	13	3
29	14	2	29	14	4	29	14	4
30	15	3	30	15	5	30	15	5
	16	4	31	16	6		16	6
				17	7			

JULY. ஜூலை.			AUGUST. ஆகஸ்ட்.			SEPTEMBER. செப்டெம்பர்.		
செந்த காலம்.	பிந்த புதற்கு காலம்.	பிரை செந்த.	செந்த காலம்.	பிந்த புதற்கு காலம்.	பிரை செந்த.	செந்த காலம்.	பிந்த புதற்கு காலம்.	பிரை செந்த.
July. ஜூலை.	Nov. நவம்பர்.	April. ஏப்ரல்.	Aug. ஆகஸ்ட்.	Dec. டிசம்பர்.	May. மே.	Sep. செப்.	Jan. ஜனவரி.	June. ஜூன்.
1	17	7	1	19	8	1	28	8
2	18	8	2	20	9	2	29	9
3	19	9	3	21	10	3	30	10
4	20	10	4	22	11	4	31	11
5	21	11	5	23	12	5		12
6	22	12	6	24	13	6		13
7	23	13	7	25	14	7		14
8	24	14	8	26	15	8		15
9	25	15	9	27	16	9		16
10	26	16	10	28	17	10		17
11	27	17	11	29	18	11		18
12	28	18	12	30	19	12		19
13	29	19	13	31	20	13		20
14	30	20	14		21	14		21
15	Dec. 1	21	15	Jan. 1	22	15	Feb. 1	22
16	2	22	16	2	23	16	2	23
17	3	23	17	3	24	17	3	24
18	4	24	18	4	25	18	4	25
19	5	25	19	5	26	19	5	26
20	6	26	20	6	27	20	6	27
21	7	27	21	7	28	21	7	28
22	8	28	22	8	29	22	8	29
23	9	29	23	9	30	23	9	30
24	10	30	24	10	31	24		31
25	11	May. 1	25	11	June. 1	25	10	1
26	12	2	26	12	2	26	11	2
27	13	3	27	13	3	27	12	3
28	14	4	28	14	4	28	13	4
29	15	5	29	15	5	29	14	5
30	16	6	30	16	6	30	15	6
31	17	7	31	17	7	31	16	7

OCTOBER. அக்டோபர்.			NOVEMBER. நவம்பர்.			DECEMBER. டிசம்பர்.		
செந்த காலம்.	பிந்த புதற்கு காலம்.	பிரை செந்த.	செந்த காலம்.	பிந்த புதற்கு காலம்.	பிரை செந்த.	செந்த காலம்.	பிந்த புதற்கு காலம்.	பிரை செந்த.
Oct. அக்ட.	Feb. பிப்.	July. ஜூலை.	Nov. நவம்பர்.	March மார்ச்.	Aug. ஆகஸ்ட்.	Dec. டிசம்பர்.	April. ஏப்ரல்.	Sep. செப்.
1	17	8	1	20	8	1	19	7
2	18	9	2	21	9	2	20	8
3	19	10	3	22	10	3	21	9
4	20	11	4	23	11	4	22	10
5	21	12	5	24	12	5	23	11
6	22	13	6	25	13	6	24	12
7	23	14	7	26	14	7	25	13
8	24	15	8	27	15	8	26	14
9	25	16	9	28	16	9	27	15
10	26	17	10	29	17	10	28	16
11	27	18	11	30	18	11	29	17
12	28	19	12	31	19	12	30	18
13	March 1	20	13	1	20	13	May. 1	19
14	2	21	14	2	21	14	2	20
15	3	22	15	3	22	15	3	21
16	4	23	16	4	23	16	4	22
17	5	24	17	5	24	17	5	23
18	6	25	18	6	25	18	6	24
19	7	26	19	7	26	19	7	25
20	8	27	20	8	27	20	8	26
21	9	28	21	9	28	21	9	27
22	10	29	22	10	29	22	10	28
23	11	30	23	11	30	23	11	29
24	12	31	24	12	31	24	12	30
25	13	Aug. 1	25	13	1	25	13	Oct. 1
26	14	2	26	14	2	26	14	2
27	15	3	27	15	3	27	15	3
28	16	4	28	16	4	28	16	4
29	17	5	29	17	5	29	17	5
30	18	6	30	18	6	30	18	6
31	19	7				31	19	7

பொதுவாக முத்திப்பித்த செம்பம் பிடிப்பதும், பிரசவம் குறிதாம் சொற்ப வயதின்வரையிலுள்ள செம்பத்திலும், ஜாஸ்தி வயதின்வரையிலுள்ளவருள்ளும் நாமதித்த செம்பம் பிடித்த குறிப்பிட்ட நேரக்கு பித்தி பிரசவிப்பார்கள் என்று அறிவோம்.

வயற்றில் குழந்தை இறந்தால் குறிப்புகள்.

(1) அடிவயறு கனத்த கெம்பம் இருக்கும், (2) வயறு குளிர்ந்த போய், (3) கொண விதையல் தோளும், (4) குழந்தை புரளமாட்டாது, (5) வயறு உறுதியாய் உருண்டையாய் தோளாவதற்குப்பதிலாவது தோல்வாய் உண்டாவதற்குள்ளும், (6) புண்ணு படுதல் ஒருபக்க மிருத்த மறுபக்கம் புண்ணு கெம்பம் விரிவாகாத தெரியும், (7) தொப்பின் வெளியே தள்ளிக்கொண்டிருந்த உட்குழந்தை குழி விரும், (8) வயறு கிடைத்த தெரியும், (9) நார்வந்தி தொண்டையாய் மாறியும், மாரில் பாலின்வாய் மறைத்த போய், (10) கண் குழித்த ஒருவழியும், (11) ஆயாசமும், சோர்வும் தோளும், உட்குழந்தை உட்குழந்தை கொண்டு வந்த பிரசவத்தைக் கொள்வோம்.

கெற்பமும், உதிரமும்.

சில செம்ப கித்திரங்கு கெற்பத்தோடே மாதிரிதான் கொள்வோம். இதைப்பற்றி பார்ப்போம்.

சில செம்ப கித்திரங்கு 7-வது 8-வது மாதத்தில் கிடைத்த உதிரம் காணும். இரண்டோரு வாரின் மறைந்த பின்பு 10, 15 நாட்களுக்கு கொஞ்சமாவது கித்திரங்கு உதிரம் காணும். சில இடம் மறிப்பதும் உண்டு. இரண்டாவது வாரின்: ஒருகொடியானது கெற்ப வாயில் உற்பத்தியாகி இருப்பதற்கு. கெற்பப்பை விரிய விரிய அதன் ஒட்டிவிட்டி உதிரம் பாயும், இப்படி ஜாஸ்தியான உதிரம் கண்டால் உட்குழந்தை கொண்டு வந்த பிரசவம் கொள்வோம். 400, 500-ல் ஒரு வருக்குத்தான் இப்படி உற்பவிக்கும். பரிசுவையிலே இருக்கவேண்டும்.

கெற்பமும், வலிப்பு.

மலம்-சீர் குறைந்த வந்தாலும், முகத்திலே நெருக்கி வந்த போய் குறையும், தீவ் குறிப்புடன் தோளாவதற்கு குறியில் அறிப்பு அந்த குறிக்கி அந்த கீர் விடும்போது கிரிச்சல் தோளாவதும் இவ்வித குறிப்பு கோ முன் ஜாஸ்தியான கித்திர கோலித்த உட்குழந்தை பிரியவும் அடிக்கடி குழுகு செய்துகொண்டவென்றது. சற்று வயதில் வாயில் விட்டால் வலிப்பு உருவாகும். பிரசவமும் கவந்திற்று முத்தி கொள்ளும் - பிரசவகொண்டவாவிடும் கித்திரவாயிலுள்ள மேற் கொல்லிய கண குணங்களும் மகா கெற்பம். முகத்தில் கிரிப்புகளும் சீர் குறைந்தாலும் மலம் உற்பவிக்கவேண்டாம்.

சாதாரண பிரசவம்.

பிரசவத்திற்குரிய குறிப்புகள் ஆரம்பித்தபொழுதும் ஒரு பிரசவம் மும் செய்யக்கூடாது. மலத்தைக் கழிக்கக்கூடிய பிரசவமும் ஒன்று மட்டும் செய்துகொண்டவென்றது. பிரசவம் சாதாரண ஆகும். சிலநேரம் கண் உறுக்கட்டாயமாய் முத்தி தவிக்கிறதென்று. இது கொம்ப கெற்பம்.

குரு மாதிரி, பைப் பிஸ், கோரோஜனை மாதிரி இவையாக உபயோகம் செய்யலாம்.

பன்னீர்க்குடம் உடைத்து பிரசவம் 4, 5 மணி கோராய் சீர்தப் போயிருந்தாலும்கூட உட்குழந்தை உட்குழந்தை கொண்டு வந்த போய்க்கொண்டவென்றது.

இது தலைப்பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாள், குரான் தாள்கூட வாகைப் படுவார்கள். பன்னீர்க்குடம் உடையாதவகையாய்மேயில்லை.

பிரசவமானபின் ஸ்திரீகள் கைக்கொள்ளவேண்டிய காரியங்கள்.

குறியை:—முதல் 4 அல்லது 5 நாட்களுக்கு காதலில் படுக்கையாய் இருக்கும் மற்ற வியாதியுக்கு என்னென்ன ஆகாமல் எப்படி எப்படி கொடுப்போமோ அப்படியான கொடுக்கவேண்டியது. கைகளுக்கு, கப்பி, பால், கொட்டி, குழம்பொன்றை சாதம் ஒரு பிடியும், கொஞ்சம் தண்ணீரும் இப்படிப்பட்ட ஆகாமல் தான் பிறந்த கிழிவும் முதல் கொடுக்கலாம். கொம்ப பெண்ணின் வியாதியுக்கு கொடுக்குகோ பிரசவம், மட்டும் பிரசவம், தடைக்கறி பிரசவம் செய்துகொடுக்கலாம். 4 நாள் ஆன பிற்பாடு வழக்கம்போல் குடான ஆகாமல் சாப்பிட்டு கொடுக்கலாம்.

கந்தம்:—பிரசவித்த அகல வெகு கத்தமாய் யாதொரு காயின்வாய் இருக்கவேண்டும். தினம் இரண்டு மாதம் உட்குழந்தை ஒன்றும், விரிப்புக்கு ஒன்றும் இருக்கவேண்டும். இருக்குப் போகும்போதெல்லாம் பிரசவித்த பாக்கியெல்லாம் கந்தம் கந்தம் கொடுக்கலாம். வெளியே உபயோகம் செய்யவேண்டும். கந்தமே பிரசவம். கத்தபிறந்தால் வயறு பழுக்காது, தந்தைந்தாண்டாது, ஜாரம், ஜன்னி வரமாட்டாது. தினம் மலகத்தி ஆகப் பார்த்துக்கொண்டும். இதற்கு நகு பைப் பிஸ் பிரசவமானது கந்தம்.

படுக்கை:—மலக்கத்தான் படுக்கவேண்டும். கொம்பவும் சரித்த படுக்கைகூடாது. கெற்பப்பைவானது பெரிதாயிருந்த சதந்திலும் போது ஒருபக்கம் புண்ணு கெற்பவிட்டால் அந்த திருப்புகது பிரசவம் யானகாரியமாவிக்விடுதது. சிறுக்கு அதுமுதல் கெற்பம் தக்காமலேகூட போகிறது. சிலர் வயற்றின் அடிபாகத்திற்கு தண்ணீரைக் கந்தி தண்ணீர் கொடுத்துக்கொண்டு கெற்பப்பை ஒதுக்காதபடி வெகு ஜாஸ்தியாய்ப் படுக்கிறதென்று, இப்படி 1 வாரம் பத்திரமாய் கெற்பத்தென்றது உத்தமம்.

பிரசவத்திற்குபின் வரும் காச்சல்.

- (1) பால் காச்சல்: இது சாதாரணம்.
- (2) விஷ காச்சல்: பின்வரும் குணங்களை கவனிக்கவும்.

பிரசவத்திற்குபின் காச்சல்.

3 முதல் 5-வது நாட்களுக்குள் தவக்கம்: பிடரிவலி, குளிருடன் காச்சல், தலைவலி, மிகுதியான தாகம், காத்து வாட்டி, காத்தில் கருப்பு மலக்கட்டு, பின்பு வயற்றோட்டம், அழுத்த திடீரென்று சிந்து தண்ணீர் போவதும், அதில் மிகுதியான பேருக்கு காற்றம், வயற்றில் அழுக்கிலும் வலி, தொட்டாலும் வலி, வயற்றில் காற்றடைப்பு, மார் வற்றி பால் மலந்தபோகும். கண்டிப்பான காச்சல் இருந்த ஒரு வாரத்திற்குள் மரணம். இதனால் 10 நாட்களுக்குமேல் போனால் சொல்லாது.

சிகிக்கை:—உடனே செதப்பையை தினம் 2 அல்லது 3 தடவை தண்ணீரில் கழுவு ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். ஒவ்வொரு ஆராத் தடவையும் 2 கரண்டி பிராந்தி அல்லது சாராயம் கொடுக்கவேண்டும். தலைவலி இல் வட்டி அல்லது துளியை தண்ணீரில் களைத்து வெற்றியில் விடாமல் போட்டுக்கொடுவேண்டும். மற்ற மருத்துவனும் கொடுக்கவேண்டும். டாக்டரை கொண்டு பிரயத்தனங்கள் செய்தால் உண்டாகும்.

ஸ்திரீகளுக்கு மிகவும் அருமைமான மருந்து
தம் குரு சத்தான சொர்ணம் என்று அறியவும்.

வயது பழுத்தால், ஜாஸ்தியான மாநிலிலக்கம், குதக வயற்றுகை
கவலத்திற்கும் ரோம்ப அருமைமானது.



சீர்த் மலடி என்ற சொல்லுபெயர்களின் வாயை அடைத்திடுத ஏத
சத்தான சொர்ணம்.

சொர்ணம்

யாவருக்கும் உபயோகமான சில வைத்திய குறிப்புகள்.

1. Acne.—முகத்தை கெடுக்கிற பருக்கள். இது கொஞ்சம் முதலு, தோள்பட்டைகளிலும் உண்டாகும். இது சாதாரணமாய் ஜீரணக்கருவிகளில் சீர்கெடு உண்டாவதனால் உண்டாகலாம். 15 முதல் 21 வயதுவரை தான் மிகுதியாய் உண்டாகிறது. ஸ்திரீகளுக்கு விலக்கத்திற்கு இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு முன்னும் உண்டாகப் பார்க்கலாம்.

நிலாசனம்.—ஜீரணக்கருவிகளின் தொந்தரவை மாற்றவேண்டும். எல்லா சோப்பு வைத்த முகத்தைக் கழுவுவேண்டும் அவ்வது கிளிசரீன், தெந்தாம், சாராயம் முதலான மருந்துகள் சேர்த்து போட்டுவந்தால் கவர் தியாகும். இவைகளில் கட்டுபடாவிட்டால் டாக்டருக்கு தெரிவிக்கவும். முகப்பரு மருந்து ஒன்று இருக்கிறது அனுப்பலாம்.

2. Alopecia.—வட்டம் வட்டமாக தலையிர் கொட்டிப்போய் வருகையிருக்குதல். இது கர்ப்புகளின் பெலவீனத்தால் மயிர்காம்புகளுக்கு பெலன்குன்றி இப்படியாகிறது. பூச்சி வெட்டினாலும் இப்படியாகும். இதற்கு அந்த இடத்தில் சில மருந்துகள் போட்டு, உளுக்கு சாம்பு பெலவீனத்தை மாற்றக்கூடிய மருந்துகள் சாப்பிட்டால் உகமாகும். பிரம் தண்டு என்ற மூலிகையின் பால் அடித்தால் மயிர் வளரும். அதற்குரிய டாணிக்கு மருந்துகள் சாப்பிடவேண்டும். குருசுழிம்பு, ஜீமா இவைகளை வைத்த தேய்க்க மயிர் முளைக்கும்.

3. Anemia.—(எனரிமியா) நிரோகத்தில் எத்தகையவையிருந்தால் இப்பேர் சொல்லப்படும். இது உண்டாகிற காரணம் சரியான சாப்பாடு அல்லது போதமான சாப்பாடிவந்த குறை அல்லது சத்த ஆகாயகுறைவு, மலக்கட்டு இவைகளே. இந்த வியாதி பொதுவாய் ஆண்மனிதர் பெண் களுக்கு அதிகம். சவுக்கிய குறைவுள்ள வீட்டில் பெண்களுக்கு இது ஏற்படும்.

குறிப்புகள்:—நிரோகம் வெளுத்திருக்கும், உதடி, கண்டிப்பை, கக்கை, இவர் எவ்வாம் வெளுத்திருக்கும். களைப்பு, பெலவீனம் தோற்றம். பட்டாப்பு, தலைவலி, முதுகுவலி, கெஞ்சில் வலி இருக்கும். தோசாரணம்: மேற்கொல்லிய காரியங்களை வலிக்குத் தீவர்த்தி செய்யவேண்டும். எல்லா ஆகாரம், இரு ம்பு சத்தங்கள் சேர்க்கவேண்டும். டாக்டரையும் யோசித் துக்கொள்ளலாம். இது ஓர் விஷ பூச்சியினால் உண்டாகிற தாகக் கண்டிப்பிடித்திருக்கிறார்கள். அதற்கு அலாதி யான மருந்து இருக்கிறது. குருமருத்துவசாஸ்திரம் எழுதவும்.

4. Angina.—இரத்தாசயத்தில் நிரோகம் உண்டாகும். கவலம். இடதுபக்கம் கொஞ்சக்குந்தான் இரத்தாசயம் இருக்கிறது. இது மிகவும் இம்சிக்கிற வியாதி. மூச்சுமட்டி குலையில் வலியுண்டாகி மரண அபாயத்தை செய்யும் பயங்கரமான வியாதி. நிரோகம் உயிர்போம்.

பரிசாரம்.—ஜீரணசத்தியை எப்போதும் சரிபார்த்தவரேனும், அயிர்வைப்பன், ஹைட்ரேட் ஆப் கிரிசுலான் இவ்வித மருத்துகள் ஆச்சரியமான குணத்தைக் கொடுக்கிறது. இவ்வியாதி அடிக்கடி உண்டாகிறது என்பின் கைவரம் இந்த இரண்டு மருதகளும் இருக்கவேண்டும். உயத்தில் உள்ள வாய்வினாறும் இவ்வித கைவரம் வரும். அது பொய் குளோரேடி. இது மலச்சித ஓழுங்கானால் போய்விடும். பரிசாரம்:—வாய்வுக்குறிய மருத்து சாப்பிட்டால் கைவரம் வரும். மேற்சொல்லிய மருத்துகள் கைவரம் எப்போதும் இருக்கவேண்டும். ஆபத்தக்குதவும் மருத்து.

3. Anus.—மலத்தகாரம். இதுதான் குடலின் ஹைட்ரேட் அந்தம். இதில் அரோ தொத்தாவான விபாதிசன் வரக்கூடிய இடம். அராவத பவுத்திரம், சிரச்சன், வெடிப்புசன், அண்டிதன்சன், மூலமுக்கன், புண்புத்தன் முதலானவை உண்டாகும் சொம்ப இம்மைசுருண்டாகிறது. கான் பட தொத்தாவுபன்னி அஜீரணம், மலப்போக்கு, ஆசனக்கிப்பு, சேம் கொட்டுதல், காக்ரை, ஐரம் உண்டாகி. மான விபாதிசை உண்டாகி விடுகிறது.

6. Apha.—வாயில் வெள்ளைப்புக்கென்போல் உண்டாகும் கான்சன். இது உயத்திலுள்ள செரோட்டை காண்பிக்கிறது. இது மிச்சைரி செக்களுக்கு வரப்பாடுக்கலாம். உயதாட்டுக்கு சாகுமும் இப்படிப்பட்டவைகள் உண்டாகுவதன்மேல். பரிசாரம்:—பொராக்சன் (பொரிசாரம்) அதில் வைத்து தேய்க்கவேண்டியது. மற்ற செரோட்டையும் கவனித்து அதற்குரிய பரிசாரங்கள் செய்யவும். செக்களுக்கு வேலால் கவனிக்கவும்.

7. Asthma.—இது மத்தாசாரம் என்ற பெயர். தலைமேலின் குழாய்களில் உண்டாகும் வியாதி. மூச்சுவிடமுடியாமல் பிச்சென்றும், பூனைக்குரல்போலும், வாத்விட இடைக்கென்போலும் சந்தத்தடன் இருமலும், மூச்சுமூட்டலும் உண்டாகும். பரிசாரம்:—மத்தியப்பாது. மூச்சுமூட்டல்தான் சொம்ப இம்மைசுரையிருக்கும்.

பரிசாரம்:—ஜீரணசத்தியை சரிபார்த்த அந்தரு பரிசாரம் செய்வது. வெடியுப்பை கிடைக்கவேண்டும், கைமத்தம் பூ புதை பிடிக்கலாம் அவ்வது குளோரோபார்ம் என்ற மருத்தை தனியின் பிடித்த கவனித்தலாம். பெல்வடோகு குடும், அயின் சம்பத்தமான கைவரங்களை கொடுக்க தடவி ஒத்தனமிடவும். ஆஸ்திரா திராவம், சயவகாரிஷி வேதியம் சாப்பிடுவேண்டும். கான்பட்டதும் கவனமாகும். தானக பக்கபம் கவனது.

8. Bed.—படுக்கையானது வாலிபருக்கும், காதலர்களுக்கும் உதவியாய் இருக்கலான படுக்கையாக இருக்கவேண்டும். பெலவீனமுள்ளவர்களுக்கும், விருத்தாப்பியருக்கும் வெகு மெதுவாக இருக்கவேண்டும். விருத்தாப்பியர்களுக்கு அப்போததான் வேண்டிய உஷணத்தைக் கொடுக்கும்.

9. Bed Room.—(படுக்கை அறை) கவனம் தீத்திய இருக்க வேண்டிய இடம் இடம் பதும் சாற்றோட்டவசதியாயிருக்கவேண்டும். படுக்கை அறையில் அதிக சாமான்சன் இருக்கக்கூடாது. ஜன்னல்களில் பா தொரு சாமானமும் இருக்கக்கூடாது. தந்தலத்தில் இதை முக்கியமாக கவனிக்கவேண்டும். சாற்றோட்ட வசதி இல்லையானால் அரோ வியாதினை உண்டாகும்.

10. Bile.—பித்தம். பித்தத்தை உற்பத்தி பண்ணும் கால். (குரு கால்) சரியாய் வேலை செய்வாவிட்டால் பித்தம் உடம்பில் தங்கி குணபேத முண்டாகும். பித்தத்தான் சாப்பிடும் கொழுப்பு, உலகத்தனை ஜீரணம் பண்ணும். மலக்கட்டு, பித்தத்தை அகிசுப்பித்தம் பித்தமானது திரோச கித்தையும் கொடுக்கும் இப்படிப்பட்ட பித்த தொத்தாவுகளுக்கு டாக்சிசிகம், போடாபிலின், காலமெல் இப்படிப்பட்ட மருதகளை உபயோகிக்க வேண்டும். (குரு பித்த மாத்திரையையும் கவனிக்கவும்.)

11. நாய்கடி, மற்ற மிருகங்களின் கடித்கள்:—கடிப்பட்டவுடனே தண்ணீர் ஹற்றி உடனே கண்ணு கழுவுவேண்டும். கையு போட்டு கடிக்கு மேலும் கீழும் கட்டவேண்டும். பின்பு கடிவை கால்குக்குச்சியால் கட்ட வேண்டும். கடிக்காரம் அவ்வது பழுக்க காய்த்த இருமபால் கட்டலாம். பாய்புகடியாயிருந்தால் அந்த இடத்தை வட்டமாய் கழமாய், அறுத்து அடித்த வியவது கவனது. அதன்பின் மருத்துகளும் வைக்கலாம். பொட்டாசியம் பெர்மாகாநீஸ், விஷமைசன், கடி இவைகள் கவனது. ரத்தத்தை கசக்கி பிழித்துவிடவேண்டும்.

12. Bronchitis.—இது துறை கால் குழாயிலுள்ள ஜலகோஷம் அவ்வது காணவேகம். இது லோகாய் போவதுமுண்டு தவ்லது தாச்சல் முதலானதண்டாகி பெருந் கஷ்டத்திற்குள்ளாகும். அதன் துணைகள்: இருமல், சளி, மூச்சுவிட சற்று வருத்தம் இவைகளை. வேறு வியாதிகளுடன் சம்பந்தப்பட்டு கத்தால் சொம்ப கண்டிப்பான் வியாதியாகிவிடும். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உண்டாகி கீமோனியா என்ற கபவாதஜூச மாயுக்கிவிடுவதுண்டு. கீமோனியா ஓர் மோசமான வியாதி.

நோய்நணம்:—கொஞ்சில் ஒண்ணைகள், போல்மென்சன் போடவேண்டும். உள்குத்து இப்பிக்காக, ஆண்டிமோனியல் உலவிலுள், கரிச்சிலுக்கு டையபோசெட்டிக் (Diaphoretic) மருத்துகள் கொடுக்கவும். தண்ணீர் போன்ற கல்வ ஆகாரங்கள் அடிக்கடி கொடுக்கவேண்டும். மலச்சித தாரான மாய் இருக்கவேண்டும். (குரு மாத்திரை, பைல் பிள்ஸ் அவ்வது மெதுவத சாட்டி, குரு தைவம் இவைகளை கவனிக்கவும்.)

13. Cancers.—இது கெட்டியான (hard) கழலையாக வெகு காலி குத்த பின்பு புண்ணாகி, புத்தாகி உயிரைக் கொல்லக்கூடிய வியாதி. இது அசேகமாய் குடும்ப வாரியாயுண்டாகிறது. கந்திரிகளுக்குத்தான் மிச்சமாய் உண்டாகப் பார்க்கலாம், உயதும் 80க்குப்பின்தான், அவ்வித கழலையாக தயக்கத்தில் சரிவர எடுத்தப்போவதுதான் உத்தமம். கான்பட்டால் கடுத்தாலும், திரும்ப உண்டாகிவிடும். இவ்வியாதியை மருத்துகளினால் சவுக்கியம்புண்ண வெகு பிரயத்தனங்கள் செய்கிறார்கள்.—உடலில்லை.

14. Carbolic Acid.—சர்பாலிக் ஆசிட். இது புண்ணுக்கு சொம்ப கிற்றந்த மருத்து. ஆசிட் ஒரு பந்தும், எண்ண 15 or 10 பங்காக கலந்த போடவேண்டும்.—இது சர்பாலிக் ஆயில் என்பது, அவ்வது தண்ணீரில் கலந்தால் 1-க்கு 40 பங்காக கலந்த உபயோகிக்கலாம்.—இது சர்பாலிக் லோஷன். இவை புண்ணுக்கு சொம்ப பிரயோஜனமான மருத்து.

யம், 1 அல்லது 2 மணிவிலிருந்து 4 அல்லது 5 மணிசேரம்முக்கும் பின்பு விட்டுப்போம். அதுகே வேர்வை, மிச்சமாய் இரவில். பலமுத கையுடன் உண்டு. தொண்டை கூயம். (சத்தம் என்றால் கம்மிப்போகும்) துணைகூயம், குடல் கூயம், உயர்ந்த கூயம், இன்னம் கூயபோகும் துவக்கும் இடத்திற்கு தக்கதாகவெல்லாம் பெயருண்டு. எல்லா கூயமும் உடலு சாப்பிட்டிலேயும். சாயத்திரம் காச்சல் வந்துகொண்டிருக்கும். முக்கிய குறிப்புகள் இதுவே. கூயம் இருக்கும் இடத்திற்குத்தக்கதாக அந்தந்த சூழல்களில் சூழப்படுங்கள் உண்டாகும்.

42. Pneumonia—கபிசாந்த ஜூரம்.—தலை நரவில் கண்ணாண் கணம் உண்டாகவருள் உண்டாகும் வியாதி. இது பெலினை சேரத்தில் திடகொன்று குவித்தாற்று. செஞ்சல் அடித்த உண்டாகிறது. துண்டுகள் லாஸ்தியான காச்சல், முகம் கிளசினப்பாயிருந்தால், சிறு இருமல், இளைப்பு போன்ற கற்றுக்கொண்ட அவசர சூழ்ச்சி உண்டாகிறது. பின்பு அழுக்குநீர்மான சளிவிழ ஆரம்பிக்கிறது. செஞ்சில்கலி, வேசான புலப்பம் உண்டாகிறது. 10 தினத்தில் வியாதி கமர்பட்டுவிடும். செஞ்சில் ஒத்தணக்கன், போல்டிசன் கன் வைத்துக்கட்டவேண்டும். உயர்ந்தல் கணியிலாததும், ஆனால் கல்ல பெலன் கொடுக்கக்கூடியதுமான ஆகாரங்கள், குப்பு முதுகான வந்தகன் கொடுக்கவேண்டும். நமோனியாவில் கச்சையின் கலாயம், பக்காச்சவனை கலாயம், பண்ணப்பால் முதலானவைகளை ஆகாரமாகக் கொடுத்தால் சிதைக்காத என்று சொல்வதும் பிரச்சிதம் அதுபோகும். நீர் திற்ப்பு.—இருமி சளிவயத்தப்ப சலாமலும் சளி காக்கடன் ஒட்டிக்கொண்டு துணி யால் துடைத்த எடுத்துப்படியாயிருந்தால் பிரத்யப்த இரண்டாம்பகம் என்று அறியவும் முந்தையம் கவனிக்கவும். கஸ்தூரி, பருத்தி 3 அல்லது 4 காண்டி அள்ளாக இடைக்கிடையே உபயோகிக்கவேண்டும். காச்சலை அமர்த்தவேண்டும். சபத்தை இளக்கும் மருந்துகளைக் கொடுக்கவேண்டும். அத்தடன் நியாத ஒண்ணம் கொடுக்கவும் டாக்டரைக்கொண்டு பார்க்கப்பட வேண்டும்.

43. Puerperal Fever.—பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கு வரும் தடித்த தான காச்சல்.—பக்கத்திலிருந்து உதலிசெய்யும் ஸகாயின் கலாயினா களிஞலும் பிரசவித்த ஸ்திரீயின் கலாயினா களிஞலும் இவ்வித ஆபத்தகன் உண்டாகிறது. எல்லாம் சத்தாயிருந்தால் இவ்வித வியாத் வராத அடிக்கடி அடிப்பாக்களை தானே சுழலி சத்த வந்திரம் மாற்றி வந்திருத் தால் ஒருபோதும் இப்படி உண்டாகாது. மலவிர்த்தி தினம் போகவேண் டும். அடிப்பாகம் நன்றாய் சுழலப்படவேண்டும். நீர் போகுமபோதெல் லாம் ஒரு செம்பு தண்ணீர்விட்டு சுழலவேண்டும்.

(உடைய திரவகம் அநாவத பிராவ சாய திரவகம் கட்டியம் முதல் 8 நாடும் கொடுக்கவேண்டும்.)

44. Shingles.—அக்கி.—இது தற் கொத்தவான சோல் வியாதி. முதலில் ஜூரம் உண்டாகி கொப்பணங்களை முதலில் தவக்கி வயறு வரை பறவுகிறது. அதில் வலியும், எரிவும் மிச்சமாய் உண்டாகிறது. நிரோகத்தின் மற்ற பாக்கிசிறு அக்கியானது உண்டாகிறது என்று இது தண்ணீர் கொப்பணமாக உண்டாகி வலாவது வளில் உடைத்த 14, 15

காலத்துக் பக்குவைத்து வைசுரி தழுப்புவோன் விடுகிறது. சருப்பு கிற மான சிலருக்கு பண்ணமான தழுப்பு உண்டாகிறது.

பரிசாரம்.—இதற்கு எல்லா ஜூரம் செய், பாதுடன் கொடுக்கவேண்டும். திச்சட்ட புண்களுக்குப்போடக்கூடிய மருந்தாய் போட்டு காற்றுப்பாமல் பஞ்ச வைத்திக் கட்டவேண்டும். பன்றிசெய் கொம்ப சிலாக்கியமானது. (சலா ரண்கழிப்பு) இன்னும் சில மருந்துகள் இருக்கிறது எழுதவும்.

45. Snake Bite.—பாம்பு கடிக்கு சிகிச்சை.—கடித்தலிடத்திற்கு மேல் வயறுபோட்டு உடனே கட்டவேண்டும். உடனே கட்டுவதுகடன் கொம்ப ருக்கியம். கத்தியால் பல்பட்ட இடத்தை கிழித்த தண்ணீரால் சுழலவேண்டும். (அச்சுகளையே சிலர் யுத்தியாய் அறைக்கயற்றை அறத்தக் கட்டி முத்திரத்தில் சுழலிலெவார்கன்.) புண்தின் தோலுக்குள் எட்டிக் கொட்டை சந்தை உள்செலுத்தி அடிப்பது மிகவும் உத்தமம். கிழித்த வாயில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனீஸ் என்ற உப்பை வைத்து தேய்க்க வேண்டும். இவ்வித பக்குவங்களினால் எல்லா பாம்பு கடியுக்கட அநோககட தப்பியிருக்கிறார்கள். சலவிற பாம்புக்கும் இதுவே சிறந்த வைத்தியம்.

46. Spitting of Blood.—வாய்வழியாக சத்தம் விழுதல். இது உயர்ந்திலிருந்து வருகிறதாவென்றும், துணைகலிலிருந்து வருகிறதாவென் றும், தொண்டைபிலிருந்து வருகிறதாவென்றும் அறியவேண்டும். உயற் றிலிருந்து வந்தால் உயர்ந்திலுள்ள ஜூரத்தடன் காத்தியில் விழும். துணை கலாலுள் இருமி இருமி தப்புகொண்டிருக்கும், இதில் திடகொன்று உயிரும் போய்விடும். பரிசாரம்.—டாக்டரைக்கொண்டு பார்க்கவேண்டும், டாக்டர் வரும்வரை கிண்டடி தின்னவேண்டும். கிண்டணைச் சூடிக்க வேண்டும். அகிக தலான வஸ்துகள், கலாயகன் செய்த சாப்பிடவும்.

47. Tape worm.—சாடாப்புச்சி. இதுசாம் தின்னின்ற நீனியழி யாவே உள்செய்யுகிறது. சாடாப்புச்சியே சில வஸ்துகளில் உண்டா கிறது. பன்றிசரி, கன்றயவேசாத பழையகரி, கெட்டுப்போன மீன், கரு வாகு, உப்புக்கண்டுகள் கலாப்புச்சி உண்டாகிறது. கன்றய் சமைக் கப்படாமல் தின்னிறதே காரணமாகும். இத்த பூச்சிக்கு தலைதான் வெளி யேறவேண்டும். அதின் சுழத்துவாக்கும் அறத்தாலும் அதிலிருந்து உடலும் காலும் திரும்ப வளரும். அதன் நீளம் 20 அடிக்கட இருக்கிறது. இத்தகு எல்லாமருந்து—8 மணி சேரம் ஒன்றும் சாப்பிடாமலிருந்து இரவில் மேல்பான் என்ற மருந்தை 1 டிராம் சாப்பிட்டு பின்பு மறுகலாயில் விளக் கொண்ண சாப்பிட்டு மத்தியானவேளையில் கன்றய் அவித்து சைக்கிள் உருகாக்கிதற்கு 2 மகோப்பை சாப்பிட விழுத்துவிடும்.

48. ஒருத்தலைநோவு.—இது விட்டுவிட்டு வருகிற தலைவலி, ஒரு பக்கமாய்தான் வலிக்கும் திடகொன்று வந்த திடகொன்று போய்விடும். செயலு மருந்தும் எல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் போய்விடுகிறது. இது இன்ன இடத்தில் இன்ன சாம்பிலிருக்கிறதென்று சொல்வமுடியாத, வாத க்ரிஞலுண்டாகும் தலைவலிக்கு அந்தப்பக்கத்தே சரம்புடன் தடித்த வீக்கி விடும். மற்ற தலைவலிக்கு இவ்வித குறிப்புடன் கிடையாது. முக்கியமாய் விட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறவர்களுக்குத்தான் அகிகமான ஒருத்தலைவலி

(ii) Syphilis.—முற்றிலும் குக்குறே விதம்:—ஆண்களானால், பெண்ண்களானால் இதில் 5 நிமிஷத்திற்குள் வியாதியின் விஷம் திரோ கத்திலேறிவிடும். ஆனால் 2, 3 வாரத்திற்குப் பின் தான் வியாதியின் குதிப்பு காணும். ஆண்குறி தோலில் அறிப்பு, பின்பு அதில் சிறு புண் உண்டாகும், பின்பு கண்ணலான அறையாப்பு, அது உடையாத, அமுக்காத. பின்பு ஒரு மாதம் கழித்த திரோகத்தில் புன்சளி புன்சியாய் புண்சன், வட்ட வட்டமாய் சிரச்சி, பற்றகச், தடிப்புடன் உண்டாகும். பின்பு ஏதும்பிச் சார்ந்த முாடுகடும், மொழியில் முாடுகள், மூக்கு, தொண்டைகளில் புண்சன், அறித்தகொண்ட ஏதும்பை தின்னும் புண்சனும் உண்டாகும். கண், காய், மூக்கு, கால் இவைகளே செடுத்துப்போகும். வியாதினா விட்டி விட்டால் கம்ச வரம்பரையாய் 4 தலைமுறைக்கு உடல் பரவிச்செல்லும். குழந்தைகள் ஒரு வயதிற்குள் சாகும். பிண்டங்கள் தப்பாமல் கையில் விழுந்தவிடும். முழு குழந்தைகள் செத்தும் பிறக்கும்.

நிவாரணம்:—(i) எங்கள் வென்ற வெட்டை மருத்த 1 அல்லது 2 புட்டியில் சமைக்கும். உபயோகியுங்கள் வியாதிக்குத்தக்க தின்னும் மற்த மருத்தானும் செய்யலாம்.

இது முதல் தனுசுக்கு.

(ii) Syphilis.—கேட்ட நோய்க்கு:—திரிபுரை, செந்துரர்கள், பல்புள்கன், திராவக மருத்தகன் செய்த வியாதியை குணம்பண்ணலாம். எல்ல மருத்தகன் இருக்கிறது. இருத்தம் குணத்தை வைத்தியருக்கு திட்டமாய் மறைக்காமல் தெரியப்படுத்தவேண்டும். இவ்வியாதிக்கு எல்ல மருத்தகன் இருக்கிறது. வியாதியை அடியோடு துரக்கவேண்டும். டாக்டருக்கு எழுதலாம். வம்சவிருத்தியை காசம்பண்ணும்.

அங்கமோக சாஸ்திர குறிப்புக்கள்.

இரத்தாசயம்.

இரத்தாசயமானது சத்தக்கையவிடக்கூடாக்கும் அனுப்பும் ஓர் குருதி திரோல் இருக்கிறது. அதில் உத்த சேரும் சத்தத்தை பலமாய் அமுக்கி (pump) பம்பு செய்ய உச்சி தட்டி உள்ளகால்வரை செலுத்தி அதன் சத்தம் ஸ்பட்டி என்ற இரண்டி அசைச்சொற்போல் இருக்கும். முதல் சத்தம் ஸ்ப பலமாயும், கீழையிருக்கும்; இரண்டாவது சத்தம் பட்டி வட்டையாகவும், சட்டென்றும் இருக்கும். குடும்:—முதல் சத்தம் கண்ணு வேக்குமிடம் இடது மார்காம்புக்கு வயப்பக்கமாய் 1 அங்குலம் தள்ளி செட்கும். இரண்டாவது டப் என்ற சத்தம் கண்ணு வேக்குமிடம் வலது காணா ஏதும்பின் உள் அத்தத்திற்கு 1 அங்குலம் திரோகக் கோட்டும். செட்கின் கிடுக்கோட்டுக்கு வயப்பக்கமாய் காணா ஏதும்புக்கு.

அதன் வேலையின் அளவு.

இரத்தாசயமானது 1 அடிக்கு 830 கிராம் மீட்டர்

24 மணி நேரத்திற்கு 80,000 கைலோகிராம் மீட்டராகிறது.

அதாவது முழுவேலை செய்யும் ஒரு உலியாளின் வேலையில் என்னில் ஒரு பங்கு வேலையின் கணக்காகிறது. கவனிக்கவும்:—இந்த இரத்தாசயம் அவ்வளவு தன் பலத்தை வெவ்வு செய்யிறது.

இரத்தாசய துடிப்பின் கணக்கு.

ஒரு வாலிபனுக்கு	நிமிஷத்திற்கு	65—75 வரை
செறப் செவிற்கு	"	150-200 "
பிறத்த செவிற்கு	"	140 "
2 வருஷம்வரை	"	110 "
5-வது வருஷ கட்டியில்	"	100 "
14-வது	"	86 "
21-வது வருஷம்	"	75 "

இதனால் ஏற்பட்ட விதி. ஆனால் இது இருப்பு, அசைவிற்குத்தக்க தாச வித்தியாசப்படும். அதாவது படுத்திருப்பதைவிட உட்கார்ந்த இருக்கும்போது 5 துடிப்பு அதிகம்.—உட்கார்ந்திருப்பதைவிட நிக்கும்போது 10 பீட் அதிகம். இந்த ஒவ்வொரு நிலைமையிலும் சமத தகையின்வேலை அதிகமாக இருப்பதால் பீட்டன் அதிகமாகிறது. திரோக அப்பியாசம் செய்யும்போதும், சாப்பாடு தீரணித்தகொண்டிருக்கிறபோதும், மனம் பதடிடப்படும்போதும் இருதயம் அதிகம் துடிக்கிறது.

ஆகாரம்.

ஒரு யந்திரத்திலுள்ள பாகங்கள் தேய்வுகொள்வதுபோல சமத திரோகத்திலுள்ள தகை மாமிசங்களும் தேய்வுகொள்ளுகிறது. அதோடுகூட தகைசெய்யும் வேலையால் சமத சத்தவரும் வெளியேறிவிடுகிறது. உஷ்ணம் வெளியேறும்போது சில சத்தங்களும் சிலவாகிறது. ஒரு கறுசுறுப் பாள வாலிபனுடைய தகை மாமிசங்கள் அதிகமாய் தேய்ந்து குறைகிறது. மூளையின் அம்சங்களும், திரோகத்திலுள்ள கிண்கோளங்களுக்கும், சத்த பிஷ்களுக்கும் அடிக்கடி புதுப்பித்தல் வேண்டியதிருக்கிறது. அதனை ஹுடைய வேலைகளுக்கு வேண்டிய சில வஸ்துக்களால் போஷிப்பம் நடக்க வேண்டியதிருக்கிறது. திரோகத்திற்கும் அதன் வளர்ச்சிக்கும், போஷிப்புக்கும் புது வஸ்துக்கள் அவசியமாகியிருக்கிறது. தகை மாமிசங்களின் தேய்வுகளால் ஏற்படும் கழிவு வஸ்துக்களும், திரோகத்தில் உள்ள சில அம்சங்களில் சாயண சேர்க்கை ஏற்படும்போது (Chemical change) உண்டாகும் உஷ்ணத்தால் ஏற்படும் கழிவுகளுக்கும் தகையினின் மூலமாயும், தோலின் வழியாகவும், மூத்திரம் உற்பத்தி செய்யும் குண்டிக்கையின் வழியாகவும் வெளியேறும் கழிவுகளும்.

ஒரு வாலிபனுடைய திரோகத்திலிருந்து 24 மணி நேரத்தில் வெளியேறும் கழிவுகளின் கணக்கு அடியிற் காட்டுகிறோம்.

தர்க்கியம்=காட்டிரோஜன்	20 கிராம்
கரியமல வாய்வு (கார்பன்)	280 "
உப்புடன்	20 "
தண்ணீர்	2000 "

இவ்வளவு கஷ்டத்திற்கும் பதில் ஆகாரம் வேண்டியது.

உட்சேலுத்தேண்டிய புகை நுகைகள்.

- (1) நச்சியை உடனடி பதார்த்தங்கள் (Nitrogenous) அல்லாத மாமிச அம்ச பதார்த்தங்கள்.
- (2) கொழுப்பு பதார்த்தங்கள்.
- (3) சர்க்கரை பதார்த்தங்கள் (அரிசி பதார்த்தங்கள்)
- (4) தாவர பதார்த்தங்கள் (சாய்க்கறி பதார்த்தங்கள்).

மாமிச அம்ச பதார்த்தங்கள், திரோத்தின் தரை அமைப்புக்கு ரொம்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது. மமத திரோத்தின் மாமிச சதைகளும், சந்தமும் சேர்த்த திரோத்தின் சதையில் பாதி இருக்கிறது. ஆகவே திரோத்தின் தரையின் கட்ட வறியான சரிபண்ணுவதற்காக மாமிசம்தான் மிகுதியாக வேண்டியிருக்கிறது.

மாமிசம்.

மாமிசத்தில் இருக்கும் அம்சங்களாவன:—முட்டையின் வெள்ளைச் சருபோன்ற வஸ்துக்கள், மாமிசப்பிசின், கொழுப்பு, உப்புக்கள் இன்னும் மற்ற வஸ்துக்கள். உப்புகளில்: பொட்டாசியம் உப்பு, சோடியம் உப்பு இவைகள் முக்கியம்.

மாமிசத்தை சமைத்தாப்பிட்டால் வாய்க்கு ருசியாகவும், வேசாய் ஜீரணிக்க வதவாசியிருக்கும். மாமிசத்தை பொதியால் செய்த சாப்பிடுவதான உசிதம். ஏனென்றால் அதுமுள்ள சத்திப்பதார்த்தங்கள் சேர்த்துப் பசுமன் அகிலேயை அடங்கியிருக்கும். ஆகவே அதிகப்பெருமன் ஆகாமலும், மற்ற வஸ்திமான சமைப்பதும் அம்ச சத்தைக்குறைக்கும். மாமிசத்தை ருப்பெய்யும் போது அதை சிறு துண்டுகளாக அறிந்து கொடுத்தி தண்ணீர்போட்டு கொடுக்க வேண்டிய பாக எறிக்கவேண்டும். அதை அவசரமாக கொடுக்கவேண்டுமாயினால் அதுமுள்ள அப்பெருமன் அகிலேயைத் தவிர இருக்கி தண்ணீரில் சத்தி இறக்காமல் மாமிசத்தையே கின்று கொள்ளும். மாமிசத்தை ஒரு ஜாடியில் போட்டு அதை தண்ணீரில் சிறுத்தி வேகவைத்தால் மாமிசத்தின் சகல சத்துகளும் தண்ணீரில் இறக்கி விடும்.

முட்டைகள்.

முட்டையில் மமத திரோத்தை வளர்க்கவேண்டிய சகல அம்சங்களும் அமைந்தவை இருக்கிறது. முட்டையிலிருந்துதான் ஒரு உயிருள்ள பிராணி உண்டாகிறது. அது ஒரு முழு உயிர் அதை சாப்பிட்டால் திரோத்திற்கு போஷிப்பு உண்டாகும். ஆகவே, மாடு இவைகளின் மாமிசம் பல பெயர்களுக்கு பக்காகும் ஒரு உயிர். முட்டையின் மஞ்சள் சருவிய்தான் ஜீரண உண்டாகும். அதில் ஜீவ அம்சம் இருக்கிறது. கால் வேக்காடுவேகவைத்த முட்டைதான் ஜீரணத்திற்கு வேகாவும், ஜீவ அம்சம் கொடாமலுமிருக்கிறது.

பால் கட்டி-Cheese.

பால் கட்டியில் மாமிச அம்சமும் கொழுப்பும் இருக்கிறது. இதுவும் மாட்டின் மாமிசத்தான். பார்வைக்குமட்டும் சத்தவாணியில்லாமல் இருக்கிறது. புதிதாய் உறைத்த பால்கட்டி வேசாய் ஜீரணமாகும். கெட்டியாய் உறைத்த காய்த்தபோன பால் கட்டியானது எளிதில் ஜீரணமாகாது.

மரக்கரிகளில்

மாமிச அம்சமுள்ளது தோதமை அதில் 100-க்கு 11 பங்கு மாமிச அம்சம். ஒட்டில், கல்ல அரிசி, உருளைக்கிழங்கு இவைகளில் முட்டையின் வெள்ளைச்சருவியின் சத்த இருக்கிறது. காய்த்த பயறு வகைகளில் 100-க்கு 20 வீதம் வெகுமன் என்ற மாமிச அம்ச சத்த இருக்கிறது. ஆனால் பயறு வகைகள் ஜீரணிக்க கஷ்டமான ஆகாரமாக இருக்கிறது. வாயுவை மிகுதியாய் உண்டாக்குகிறது. எனவே எப்படி இருந்தபோதிலும் கலப்பான ஆகாரங்கள் தான் மமத திரோத்திற்கு ரொம்ப உசிதமானது.

பால்.

மாட்டுப்பாலுக்கும், மனுஷ பாலுக்கும் இருக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் என்னவென்றால்: மாட்டுப்பாலில் ஆடைபாகம் ரொம்ப அதிகம். அது வேசாய் திணைக்கடியது. சர்க்கரை மனுஷர் பாலில் அதிகம்.

ஒரு சாதாரண வேசையுள்ள வாலிபனுக்கு மாட்டுப்பாலையே ஆகாரமாக கொடுப்பதாக வைத்தத்கொண்டால் 8 பயிண்டு அதாவது 160 அவுன்ஸ் கொடுக்கவேண்டும். இப்படி பாலையே கொடுத்தும்போது மிகுதியான தண்ணீர் குடிக்கிறான் என்றாலும் இது வேசாய் ஜீரணமாகிற ஆகாரமாய் இருப்பதால் இது வியாதியைக்குக்கு ஒர் எல்ல ஆகாரமாகிறது.

ஒரு சாதாரண வெள்ளைக்காரனுக்கு ஒரு சாதாரண ஆகாரத்தின் கணக்கு அடியிற் காட்டுகிறோம்.

ஒரு நாள் ஆகாரம்.

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) ஒரு பவுண்டு ரொட்டி | |
| (2) மாமிசம் | $\frac{1}{2}$ பவுண்டு. |
| (3) கொழுப்பு வஸ்துக்கள் | $\frac{1}{2}$ " |
| (4) உருளைக்கிழங்கு | 1 " |
| (5) பால் | $\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{4}$ பயிண்டு. |
| (6) முட்டை | $\frac{1}{2}$ பவுண்டு. |
| (7) பால்கட்டி | $\frac{1}{2}$ பவுண்டு. |

பற்கள்.

ஒரு மனுஷனுடைய ஆயுசு காலத்தில் இரண்டு செட்டு பற்கள் தோன்றுகிறது.

- I. பால் பற்கள் 20. II. நிலையான பற்கள் 32.
பால் பற்கள் முதல் இரண்டு வயதிற்குள் தோன்றுகிறது.

முன் பற்கள் 2 }
பின்பு பற்கள் 1 } 5 இடவாயின் ஒரு கால் பாகத்தில்.
கடவாய் பற்கள் 2 }

அதாவது மேல் கடியில் வலப்பக்கம் 5; இடப்பக்கம் 5 = 10.
கீழ் கடியில் வலப்பக்கம் 5; இடப்பக்கம் 5 = 10.

இவை 6 வயது ஆகவுடன் விழு ஆரம்பித்த நிலையான பற்கள் முளைக்கிறது.

பால் பற்கள் முளைக்கும் வரிசை கீழேயும், மாதங்களுந்.

முதல் செட் கீழ்க்காடி 80 முன் பற்கள் 2: 6-8 மாதம்.
2-வது செட் மேற்காடி முன் பற்கள் 4: 8-10 மாதம்.
3-வது செட் கீழ்க்காடி முன்பற்களில் பக்கப்பற்கள் 2
முதல் கடவாய் பற்கள் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக
மேற்காடி 2, கீழ்க்காடி 2 = 6: 12-14 மாதம்.
4-வது செட் பின்பு பற்கள் 4: 14-20 மாதம்.
5-வது இரண்டாவது கடவாய் பற்கள் 4: 20-30 மாதம்.

இவைகள் 6 வயது வரைக்கும் இப்படியே இருக்கிறது. 6 வயதிற்குப் பின்புதான் இவைகள் விழுந்து நிலையான பற்கள் முளைக்கிறது.

Saliva-எச்சில்

எச்சிலின் உபயோகம்.

(1) அரிசி பதார்த்தத்தைத் தண்ணீரால் கரைத்தலிலும், பின்னால் அதை டெஸ்டினைன், மாஸ்டோசைன் அதை மாற்றியும்விடுகிறது.

(2) சுவைப்பதற்கும் விழுந்ததைத் தரும் வேலை இருக்கும்படி சாப்பாட்டை உணைக்கிறது.

(3) ஆகாரங்களை உரைப்பதற்கும், உருவியின் உணர்ச்சிக்கு தேவையான மாக இருக்கிறது. அதாவது அப்போதான் கல்ல உருவியோடு இருக்கிறது.

சுருமருந்து சாப்பாட்டில் 3-ல் 2 பங்கு அரிசி சத்த சாப்பாட்டாக (Carbo Hydrote) இருக்கிறது. அதை பச்சையாய் சாப்பிட்டால் எச்சிலானது கிரியை செய்கிறதற்கு உஷ்டப்படுகிறது. ஆகவே சமைக்கப்பட்ட அரிசியையிருந்தால் வெகு எளிதில் அதை ஜீரணிக்கவைக்கிறது. சோளமாவது அல்லது அரிசியாவில் செய்யப்பட்ட கரியை கொஞ்சம் எடுத்து அதில் எச்சிலைச் சேர்த்து பின்பு நமது திரேசும் இருக்கக்கூடிய அளவான குட்டில் வைத்தால் வெகு ஜலத்தில் அந்தக் கரியானது தண்ணீரால் கரைந்து இருக்கிறதைப் பார்க்கலாம். வேறே எவ்விதமான ரசாயன மாறுதல்கள் (Chemical changes) உண்டாவதற்கு முன் இப்படி தண்ணீரால் ஆகியிருக்கிறதை பார்க்கலாம். பின்பு அது சர்க்கரையாக மாறிப் போய்விடுகிறது.

இறைப்பையின் ஜீரண ரசம்.

Gastric Juice.

இது கலர் இல்லாத லேசான புளிப்புள்ள ஜலம். அதன் கன இடை (Specific Gravity) 1001-1010. அதில் 100-க்கு 1 அல்லது 1 வீதம் கட்டிபதார்த்தம் சேர்க்கிறது. அதன் அளவு நான் 1க்கு 10 முதல் 12 பயின்படுகிறது. அதில் சேர்மானமாகியிருக்கும் அம்சங்கள்.

- (1) பெப்சின்.
- (2) தயிராக துறைக்கச்செய்யும் வஸ்து.
- (3) ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் என்ற தனி புளிப்பு.
- (4) மியூசின் என்ற கோழை வஸ்து.
- (5) உப்பும, ஜலமும்.

முட்டையின் வெள்ளைக்கருபோன்ற பதார்த்தங்களில் இறைப்பை ரசம் செய்யும் வேலை என்னவென்றால் அந்த வஸ்துக்களைப் பெப்டோசைன் மூற்றுகிறது. நாம் கைபாகமாக ஜீரணரசம்செய்து அதில் தகை நரம்புகளையுடைய போட்டி 38-0, டிகிரி உஷ்ணத்தில் வைத்து வைத்தால் முதலாவது அவைகளைல்லாம் கறை பொதுயிப்போகிறது. பின்னால் ஊடுருவி பார்க்கக் கூடியவிதமாய் கண்ணாடிபோலாகிறது. பின்பு கறைந்துபோய்விடுகிறது. இவ்விதமாக அவ்வித முட்டையின் வெள்ளைக்கருவை மெல்லிய தட்டாக அறுத்து அந்த ரசத்தில் கறைவைத்தால் முதலில் ஓரக்கால்கள் கல்லாம் கண்ணாடிபோலாகிறது. கடைமையாக முழுவதும் கறைந்து காணாமல் போகிறது. இவ்விதமாக ஜீரணம் மெதுவாக நடக்கிறது. 24 மணி நேரத்திற்குப்பின்னும் நாம் சாப்பிட்ட ஆகாரங்கள் அறைகுறையாய் ஜீரணமாகித் கொண்டிருக்கும் வஸ்துக்களைப் பார்க்கலாம்.

மீனும், முட்டையும இறைப்பையில் 1 1/2 மணி நேரத்தில் ஜீரணமாகிறது. மாட்டுக்கறி, ஆட்டுக்கறி, கோழிக்கறி இவைகள் 2 1/2 முதல் 3 1/2 மணி நேரத்தில் ஜீரணமாகிறது. அரிசி சத்தானது இறைப்பையில் ஜீரணமாகிறது. இறைப்பையின் ஜீரணசத்துக்கு அரிசிபதார்த்தத்தையும், கோழை எச்சிலையும், கீண்டு சுறாக்கும் தன்மையுள்ள தகை நரம்புகளையும் ஜீரணிக்க அதால் கூடாது. ஆகவே இறைப்பையில் இவை ஜீரணமாகாது.

பாலில் ஈடக்கும் கிரியை.

இறைப்பையின் சக்தியில் துறைக்கவைக்கும் தன்மையுள்ள வஸ்து இருக்கிறது. அது பால் சாப்பிடும் இளமைப்பருவமுள்ள மருகர்களில் விசேஷமாக இருக்கிறது. அது பால் துறைக்கவைக்கிறது.

வயற்றில் ஜீரணமாகும் விதம்.

ஒரு முயலின் வயற்றில் பால்ச் செலுத்தி ஒரு மணிநேரம் செலுத்து அதைக்கொண்டு கொஞ்சம் உஷ்ணமான இடத்தில் 2½ மணிநேரம் வைத்து, அதன் வயற்றை அறுத்து சோதித்தல் பார்த்தால் அந்த மிருகத்தின் உள் ஜுவல் முழுவதும் ஜீரணமாகியிருக்கிறதைப் பார்த்தலாம். ஒரு வயின் வயற்றை நீறி இறைப்பையின் ஒரு பாகத்தை இழுத்து தூவல் இருக்கச் சட்டி அந்த வயின் மணி நேரங்கள் உயிரோடு இருக்கும்படி செய்தால் சட்டப்பட்ட அந்த இறைப்பையின் பாகம் அப்படியே ஜீரணமாகியும், ஆனால் உயிரோடு இருக்கும்போது அந்த இறைப்பையானது ஜீரணமாகிப் போகிறதில்லை. என? உயிரோடு இருக்கும்போது உப்பு சக்திகள் சத்தநீட்டமானது வந்து போய்க்கொண்டிருக்கிறதனால் அப்படியாகிறதில்லை. சத்த ஒட்டமில்லாமல் இருக்கச் சட்டி விட்டவுடன் அது ஜீரணமாகிறது. அந்த மாவிகத்தை ஜீரணித்தவியெனது என்ன ஆச்சரியம். நெய்வத்தின் சிருஷ்டிப்பின் மகத்தவத்தைப் பாருங்கள்.

பித்தம்.

பித்தமானது சர்ப்புள்ள மஞ்சள் வர்ணமான உப்பு சத்தங்கள் நீர். அதன் (Sp. Gravity) ஊநிறை 1025 to 1030 அதில் 100-க்கு 15 வீதம் கெட்டி பதார்த்தமுள்ளது. அது பித்தையில் சேராமாகும். ஆகாரம் வயற்றிலிருந்து குடலுக்கு இறங்க இறங்க அது ஊநிறிக்கொண்டேயிருக்கும். 2½ மணி நேரத்தில் 30 முதல் 40 அவுன்ஸ் உண்டாகிறது.

பித்தத்தின் உபயோகம்.

- (1) இறைப்பையின் ஜீரண சக்தியின் புளிப்பை மாற்றுகிறது.
- (2) அரிசி சத்தை சர்க்கரையாக வயிற்றில் மாற்றும் தன்மையுள்ளது.
- (3) கொழுப்பு வஸ்துக்களை அம்சங்களாக பிரித்து, உடைத்து சோப்புபோல் பாவாக்கிவிடுகிறது.
- (4) கொழுப்பை குடல் உறிஞ்சிக்கொள்வதற்கு இதுவே உதவி செய்கிறது.

(5) குடல்களின் செனியும் தன்மையை (Peristaltic action) அதிகப்படுத்துகிறது.

(6) பித்தமானது இறைப்பை ஜீரண சக்தியின் புளிப்பை மாற்றுவதால், பான்சிரியாட்டிக் என்னும் ஜீரண சகமானது தன்வேலையைச் செய்ய இடங்கொடுக்கிறது, அதாவது பித்தம் ஊநிறுவரவில்லையானால் பான்சிரியாட்டிக் ஜீரணசகம் வேலைசெய்யாது என்பது அர்த்தம்.

(7) குடல்களின் உள் ஜுவல்கள் பித்த நீரால் நனைக்கப்படும்போது அதன் வழியாக கொழுப்பு லேசாய் உறிஞ்சிக்கொள்ளப்பட ஏதுவாகிறது.

(8) குடல்களின் செனியும் தன்மையை அதிகப்படுத்துவதனால் மலக்கட்டு இல்லாமலும், வாய்வுகட்டு, வாய்வு பொறுமல்கள் இல்லாமலும் உடத்திவருகிறது.

(9) மஞ்சளாமாலை என்னும் வியாதியில் பித்தமானது குடல் ஊளுக்கு இறங்காததால் மேற்சொல்லிய தொந்தரவுகள் பெல்லாம் உண்டாகுகிறது. மலமும் வெள்ளையாய் இருக்கிறது. பித்தமானது சத்தத் திவேறி திரேகமே மஞ்சளாகிவிடுகிறது.

வாயில்

ஆகாரங்கள் சக்தி உடைக்கப்பட்டு எச்சிலோடு சம்மந்தமாகிறது. அநேகமாக அரிசி சத்து எச்சிலால் வாயில் ஜீரணமாகிறது.

இறைப்பையின்

ஆகாரத்தின் புளிப்பாக்கப்படுகிறது. இங்கே அரிசி சத்துக்கள் ஜீரணமாகாமல் சின்று இருக்கும். கொழுப்பு மணிகளை பிடித்துக்கொண்டிருக்கும் தகையதிகள் ஜீரணிக்கப்படும்போல் கொழுப்பு மணிகள் சட்டிவிழ்க்கப்படுகிறது. மாமிச அம்சபதார்த்தங்கள் ஜீரணமாகி பெப்டோன்சாகமாறுகிறது. ஆகவே, முட்டையின் வெள்ளைக்கருபோன்ற சகல வஸ்துக்களும் ஜீரணமாகி பெப்டோன்சாக மாறின மாமிச அம்ச பதார்த்தங்களும், தண்ணீரான கொழுப்புகளும், வாயில் ஜீரணமான அரிசி சத்துக்களும் எல்லாம் சேர்ந்து பால்போலாகி இறைப்பையையிட்டு குடலுக்குச் செல்லுகிறது.

குடல்களில்

மேற்சொல்லிய ஆகாரப்பாலானது பித்த நீருடனும், பான்சிரியாட்டிக் சக்திதடனும், குடல்களின் ஜீரணசக்திதடனும் கலந்து சகலவித ஜீரணமும் முடிவடைகிறது. பின்பு மலக்குடலில் வந்து தங்கி, மலம் இருக்கி வழிவாக வெளியேறுகிறது.

பித்த ஈரல்-Liver.

இது எமது திரேகத்திலுள்ள கோளங்களில் பெரியது. அதன்நிறை 50 to 60 அவுன்ஸ். சிசுக்களுக்கு இந்த ஈரல் சிசுக்களின் திரேகத்தைவிட மீதானபடி சொம்ப பெரிதாக இருக்கும்.

பித்த ஈரல் அநாவது கரு ஈரலின் வேலை. Liver.

- (1) ஆரோகிய நிலையில் இரத்தம் கிடைக்கவேண்டிய என்னும் சர்க்கரை உண்டி பண்ணுவதும்.
- (2) சத்தத்தில் சேரும் சர்க்கரையை ஒழுங்கு படுத்துவதும்.
- (3) பித்த நீரை உற்பத்தி செய்வதும்.
- (4) செற்பத்தில் உயரத்தில் உள்ள செல்லுக்கு சத்தத்தின் வெள்ளை பிளாஸ்கை (White corpuscles) உண்டாக்குவதும்.
- (5) வெள்ளைக்கருபோன்ற ஆரோகிய நிலையில் செய்யும் கிசியையுமே.

Diabetes-நீரிழிவு.

உணவுக்கு மிடுகின் சர்க்கரை நீரில் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. அந்தக் குறையை காரணம் என்னவென்றால் பித்த ஈரலில் உள்ள கிடைக்கவேண்டிய என்பது அப்படியே முழுவதும் சர்க்கரைவாகவே மாறிவிடுகிறது.

பித்த நீரின் பிரயோஜனம்.

- (1) கிடைத்திலுள்ள கலர் வஸ்துக்களை எடுத்துவிடும் ஓர் ஏது வாகவும்,
- (2) ஜீரண விஷயத்தில் உதவி செய்யும் ஓர் முக்கிய ஜீரண சாமானியிருக்கிறது.

மூத்திரம்.

மேது வயற்றினால் முதலில் பர்கமாய் இருக்கும் இரண்டு குள்களில் காய்க்காரன் மூத்திரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. மூத்திரமானது மஞ்சள் நிறமான ஓர் ஜலம், அதன் கனத்தை 1020, இது ஓர்வித வந்தமும் புளிப்பும் உண்டது. அது ஒயாமல் (குண்டாகாமல்) கிடையாது செட்டி கொட்டாக உற்பத்தி செய்து வெளியேற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. கான் 1-க்கு 52 அவுன்ஸ் வெளியேற்றுகிறது. அதிலுள்ள செட்டியான சர்க்கரை பாகம் 100-க்கு 4 விதம் அதில் முக்கியமாக வெளியேறும் உப்பு திரியல் என்பது. 24 மணி கொத்தில் 500 கிரேயின் அளவது ஒரு அவுன்ஸ் நிறை. இது பிளாசுக் 24 மணி கொத்தில் கீர்லிடும். அளவு 10 அவுன்ஸ் கனத்தை 1003 to 1008. வெயில் காலத்திலும், அதிக வெப்பமையான சமயத்திலும் கீர் குறைவாகவும், அதிக தண்ணீர் குடித்தாலும், குளிர் காலத்திலும், சில மருந்துகள் சாப்பிட்டாலும் கீர் அதிகமாகவும் போகும்.

Spleen-கவரோட்டி ஈரல்

இது விலாவின் இடது பக்கத்தில் அமைந்திருக்கிறது. இது சத்தத் திலுள்ள வெள்ளை பிளாஸ்கை உற்பத்தி செய்கிற ஓர் பந்திரம். சத்தத்தை வழங்கும் (Filter) பிளாஸ்கவும், பண்ணுடையாகவுமிருக்கிறது. வியாதி காலங்களில் இது சுற்று பெரிதாகவேயிருக்கும். அதில் அரோக வியாதி களின் விஷயங்கள் வடிவப்பட்டு தங்குகிறது. மலை ஜுரத்தில் காச்சல் கட்டி உண்டாகும்போது இந்த ஈரலே பெரிதாகி பருத்த இருக்கும். மலை ஜுரத்தின் விஷயம் எல்லாம் இதில்தான் தங்கிவிடுகிறது. நமக்கு உயிர் மோசமில்லாமல் இந்த ஈரல் எடுத்தப்போட்டுவிட்டு ஜீவிக்கலாம். சாமர்த்தியமான டாக்டர்கள் மட்டும் இதை ஆப்பரேஷன் செய்து எடுத்து விடமுடியும்.

குழந்தைகளுக்கென்றிய விஷயங்கள்.

பால் நிறுத்துதல்.

பால் நிறுத்தம் காலம் பொதுவாய் 9 முதல் 12 மாதம் வரை. இதை கணக்காக வைத்தக்கொள்ளவேண்டும் அதுதான் கல்வது. ஒரு பலமுள்ள ஸ்திரீயின் பால் 12 மாதத்திற்குப்பின் சத்தற்றதாகிவிடும். 12 மாதத்தின் குழியின் பால் கொடுப்பாளானால் அவன் சுகம் கெட்டுப்போகும். நம் காட்டுவந்திரன் ஒரு வருஷம்வரை பால் கொடுக்கலாம். ஆனால் ஜீரோப் பிய ஸ்திரீகளுக்கு அது அநேகமாய் சாத்தியப்படுகிறதில்லை. ஒரு வருஷத் திற்குமேல் பால் கொடுத்தால் கவனத்தை உண்டாக்கும்.

பால் முகூர்த்து சங்கடப்பெடும் காலத்திலும், வயற்றை சங்கடமுள்ள காலங்களிலும், பால் நிறுத்த முயலாமல் சுகமாயிருக்கும் சமயம் பார்த்து நிறுத்தவேண்டும். உடனே நிறுத்திவிடாமல் கத்திராமாய் நிறுத்தவேண்டும். முதலாவது இரவு பால் கொடுப்பதை நிறுத்தவேண்டும். பின்பு காலை-மாலை இரண்டு தடவைமட்டும் கொடுக்கவேண்டும். அப்படிச்செய்தால் வேகாய் தாய்க்கும் பால் வற்றிவிடும்.

ஒரு வருஷத்திற்குமேல் பால் கொடுத்தல்.

பால்தான் குழந்தைக்குரிய ஆகாரமாகவும், தாயின் வேலையே பால் கொடுப்பதானால் என்றும் இருந்தேபோகிறது அதிக காலம் பால் கொடுத்தால் தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் தரேக சவுக்கிய குறை ஏற்படும்.

தாயைவருகிட்டு-நரம்புலக்க வியாதிகள் ஏற்படும், பசி குறையும், ஜீரணக்கருவிகளின் வேலையையும், மனோ உற்சாகம் குறையும், தலைவலி வியாதிகள் உண்டாகும், கிரேசம் மெலிகடையும், காது இறைச்சல்சுள், மலக்கங்கள், கெஞ்சுத்தடிப்பு, ஸ்தனத்திலவலி வியாதிகள் உண்டாகும். இவைகளில் ஏது உண்டாலும் கவனித்து பால் நிறுத்தவேண்டும்.

பிள்ளைகளில்:—பிள்ளைகள் எத்தபுஷ்டியில்லாமலும் திரோகம் தொன
தொனப்பாய் ஆதும். உடம்படவணியாமல் விட்டு பின்பு ஒருக்குப்படுத்த
பிரபந்தனப்பட்டாலும் லேசாய் எத்தபுஷ்டியுண்டாகாது. உயது பெறத்
தும், முகம் சுண்டி சுறித்த முகமாயிருக்கும். (Pinched face) சதா தொந்
நாஸபண்ணி அழும். இவைகள் எல்லாம் பெரும் வியாதியை காட்டும்
குறிப்புக்களாகும்.

குழந்தைகளின் போஷிப்பை காட்டும் அட்டவணை.

எவ்விதமான போஷிப்பு.	100 கேடுகளில் காணப்பட்ட தீர்மானம்.
(1) தாய்ப்பால் மாதிரி	63 நன்றாய் விர்த்தியான சீராம்.
9—12 மாதம் வரை	23 மத்திய தேர்ச்சி.
	14 திரோகம் செட்டுப்போனது.
(2) தாய்ப்பாலும் தாய்ப்பால் கு றைவுள்ள சமயமற்ற ஆராய் கவணிகரூப் போஷிப்பு.	57 விர்த்தியான சீராம்.
	26 நெத்தாய்—மத்திய தேர்ச்சி.
	16 செட்டுப்போனது.
(3) தாய்ப்பால் தொம்ப குறைவு, பிறப்பு முதல் மற்ற ஆராய் மிருகியாய் கொடுபட்டது.	27 எல்லவிர்த்தி.
	26 நெத்தாய்—மத்திய தேர்ச்சி.
	48 செட்டுப்போனது.
(4) பிறப்பு முதல் ஆராய்வுகளை கொடுக்கப்பட்ட குழந்தை கள்.	16 எல்ல விர்த்தி.
	26 நெத்தாய்—மத்திய தேர்ச்சி.
	63 செட்டுப்போனது.

இவ் குழந்தைகளை விட்டதற்குப் பின்வருகின்ற விட்டதற்குப் ஒத்தபார்க்கலாம்
முதல் விட்டதற்கு எல்லவிர்த்தி 63, 4-வது விட்டதற்கு 63 செட்டுப்போ
னது. ஆகையால் இவ்விருந்த சமயமற்ற நிரலாகியும்.
கை ஆராய்வுகளால் 100-க்கு 63 வீதமுடையோனது.

வயதிற்கு தக்கபடி வியாதிகள்.

1 முதல் 6 மாதத்தின்தான்:—1000 குழந்தைகள் மரணமானால் 200
ஆற மாதத்திற்குட்பட்ட குழந்தைகள் அநாவது 3 பாகம். வியாதிகள்
வயற்றோட்டம், வலிப்பு, பெலவீசம் முக்கியமாய் வயற்றோட்டம் தான்
முக்கியமான வியாதி.

6—12 மாதத்தின்தான்:—1000 மரணத்தில் 150 குடும்பப்பற்றிய வியாதி
தான் இந்த வயதில் குடும்பப்பற்றிய வியாதி தான் அதிகம். இந்தக்காலத்
தில் சரியானபடி குழந்தைகளைத் தூரமாகக் கொடுக்காமல் அதனால்
பெலவீசப்பட்டு, வியாதிப்பட்டு மரணமாகிறது. இந்தக் காலத்திலும்
வயற்ற சந்தைக்கள்தான்.

1 முதல் 1½ வயது:—1000-த்தில் 124 வயற்றோட்ட மரணத்தால்
தான் முக்கிய மரணம்.

1½ முதல் 2 வயது:—முந்தின் மரணத்தைவிட முன்றில் ஒரு பங்
காகிவிடும். இவ்வயதில் குழந்தையின் குடல் சற்று வலுவடைந்திருக்கும்.

தெ வயதில் 1 மாதம் முதல் ஒரு வருஷம் வரை, குழந்தைகளுக்கு
பொருத்தாததும் மரணத்திற்கு ஆஸ்பதமான ஆகாராதிகள், பிந்தின் காலத்
தில் லேசாய் ஜீரணிக்கவும் திரோகத்திற்கு பொருத்தக்கூடியதமாகிவிடு
கிறது. இதை கவனிக்கவும்.

வியாதிப்பட்ட சிக்கல்களை சோதிக்கும் முறை.

குழந்தைக்கு தனக்கு என்ன செய்கிறதென்று சொல்லத் தெரியாது.
ஒரு வித்தியாசமான உணர்ச்சிமட்டும் இருக்கிறதாக பாடிக்குமேயொழிய
வேறல்ல அதை நன்றாய் கவனித்த அதன் வழக்கங்கள் என்னவென்று
தெரிந்தவர் மட்டும் குணங்களைக் கண்டுகொள்ளலாம்.

ஒரு சகமான குழந்தையின் கைகள்கள் உறுதியாயும், கீட்டமடக்க
லேசாயிருக்கும். ஆனால் அவை பிகுத்தமாயிருந்தால் ஏதோ வியாதி
யிருக்கிறதாக அறியவும். கடின வியாதிகளில் பிந்தின் மெலியும், தைசகன்
எல்லாம் கொள கொளப்பாகிவிடும். காங்கடந்த வியாதிகளில், தைசகன்
எல்லாம் தொங்கட்டமாரும், உடல்மெலியும் இவை எல்லாம் மென்மேலும்
விர்த்தியாகும்.

அப்போதும் வழக்கமாய் குழந்தைகளின் தால் கைகள் குளிர்க்கிருக்கு
மரணம் எத்த ஒட்டகுறைவு இருக்கிறதாக அறியவும். சிவயுக்கும், குழந்தை
களுக்கும் நாமபுலர்க்கம். அங்க உணர்ச்சியுள்ளதாக இருப்பதால் ஜூரஸ்
களில் அதிக உணர்ச்சியுள்ளதாகவிருக்கும். வலிப்பும் வரக்கூடியது. ஆனால்
நாஸடவில் பெலவீசப்பட்ட குழந்தைகளில் நாமபுலர்க்கத்தின் தன் உணர்
ச்சி என்னும் தன்மை குறைவுபட்டிருக்குமாதலால், அவ்வித குழந்தைகள்
ஜூரஸ் முதலான வியாதிகளில் அசதியாக, கண்டிறவாமல் இருக்கும்.
அதிக உணர்ச்சியுள்ளதாகவிருக்காது. இது நாமபுலர்க்கங்கள் அசந்துபோ
னதை குறிக்கும்.

முகத்தி:—முக்குறிதான் முதலாவது குழந்தையின் வியாதிக்களைக்
காட்டும்.

கீனத்த முகம்:—அல்லது வெளுத்த தளர்ந்த முகமும், விளைவாடல்
பிரியவில்லாதிருத்தல், அடிக்கடி கோப்பட்டு அழுதல், தொந்தரவு செய்
தல், தூக்கிக்கொண்டே அலையச்சொல்லும் குணம் இவைகள் வியாதி
வைக்காட்டும் குறிகள்.

வயற்றில் வலி:—அல்லது வயற்றில் நணரோகமிருக்குமானால் குழந்
தை எல்லாக்கப்படுத்து காலை தூக்கிக்கொள்ளும், கீழ் உதட்டை உள்வே
இழுத்துக்கொள்ளும் அல்லது கவலிக்கொள்ளும், நெற்றியை கறுக்கி,
காணப்பிடித்து இழுக்குமானால் தலைவலி யிருக்கிறதாக அறியவும்.

குழந்தை பரிசுரையிருக்கும் வியாதிகாலத்தில் தமையியில்லாமலும் பெருவியை உள்ளவனாகத் தன் மடக்கொண்டிருக்கும்போது அத்துடன் அடிக்கடி தடுக்கிட்டு குழந்தையின் உயிப்பு வரப்போகிறதை குறிக்கிறது.

ஒரு குழந்தை கமராவிருக்கும்போது 1½ கண் அளவது கோயல் கண் பார்வை உண்டாகுமாளு அமைக்குறித்த பாய்ப்படவேண்டும்.

ஒரு குழந்தைக்கு செஞ்செவியுடன், காக்கலும் கபலாத இருத்தி விருத்தமானால் மூலம் கருத்து, தரிதமுக்கவிட்டு உதட்டை சேர்ந்தாமல் விரித்து, மூக்கையும் விரித்து இருக்கும். கொஞ்ச அனுபோகமுள்ள துப்கள் திட்டமாய் கண்டுகொள்ளுவார்கள்.

குழந்தையானது தொண்டையப்பிடித்த இழுக்குமாளால் தொண்டைக்கட்டு வியாதி (croup) அதாவது வெவ்வே சத்தமான இருமல், மூச்சு விடக்கஷ்டம், எச்சிசு விழுங்கக்கஷ்டம் இப்படிப்பட்ட வியாதியால் கஷ்டப்படுகிறது என்று அறியலாம்.

உறியும், கண்ணைக்கற்றியும் கருத்து இருக்குமாளால் கவராவதில் சத்தகத்தி சரியாய் உட்காமலிருக்கிறதாக கவனிக்கவும்.

கண்ணைக்கற்றியும், கவராவதில் கமராய் கிறமாதியிருக்கும்போது சத்த ஒட்டத்தில் பெலயினியிருக்கிறதோ அறியவும்; அல்லது பெலயினமான குழந்தையின் கிரணவட்டியிருக்கிறதோ அறியவும்.

உக்கித்தி:— பள்ளப்படுமாளால் குழந்தை பல்வகையான கிரணப் படைத்திருக்கிறதாக கவனிக்கவும். அதற்குமேலிய ஆராய்தலும், உற்சாகப்படுத்தும் மருந்துகளும் கொடுக்கவேண்டும்.

அந்த உக்கித்தியானது வெளியேவெளிதான் உச்சி தூக்கியடித்து, தடித்து வானால் மூலையில் சத்தசொறை உண்டாகியிருக்கிறதோவும், அதை விவர்த்தி பண்ணும்படியாக பேதி மருந்துகளும், தலையில் மசம் (Irrubation) உம் திரவத்தில் பஞ்சைக்கொண்டு (Spongy Bath) தண்ணீரால் களைக்கவும்.

அழுகை:— அதில் கமரான அழுக்கை, பலத்ததாய், விரிவாய் வீரிட்டு இருக்கும்.

உக்கியினமான அழுகை:— அடிக்கடி உச்சிவிட்டு, வீரிட்டு சத்தமானால் தலக்குள்ளே ஏதோ வியாதியிருக்கிறது. கிண்டலிதமானதும், அமர்த்த வண்டலிருக்குமானால், அதை பாராவும் அமர்த்த முடியாத உச்சி ஏதோ கண்ணோக்கிருக்கிறதைக் காட்டுகிறது.

சாதாரண அழுக்கையாய் வீரிட்டு சத்தமானால் அதை யாரும் அமர்த்த முடியாமலிருக்குமானால் அப்போது உயறு உப்பிசமாகி, உயற்றை வலித்து சத்தகிறது என்று அறியவும்.

ஒரு சிசவுக்கு முதல் 3 or 4 மாதம் வரை அழும்போது கண்ணீர் வராது. ஆனால் கண்ணீர்விட ஏற்பட்டுவிட்ட பின்பு வியாதிகாலத்தில் அழும்போது கண்ணீர் வரவில்லையானால் வியாதியின் பயங்கரத்தை காம் கவனிக்கவேண்டும். பின்பு கண்ணீர் வர ஆரம்பித்தால்தான் வியாதி பின் கடுமை விட்டு வருகிறதாக அறியவும். அனுபோக முறைகளை கவனியுங்கள்.

சாது வலி, சாது குத்து குழந்தைகளுக்கு வருவது சொம்பக்கலும், சாது வலி குத்தால் குழந்தை விடாமல் உச்சிவிட்டு கதரும்.

தூக்கம்.

(1) அமைதியான தூக்கம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்டது.

(2) அமைதியான தூக்கமில்லாமல், உருண்டு, பிரண்டு தூங்கு மாறலும், தரிதமுக்கலனும் தூங்கும்போது தடுக்கிட்டு திடுக்கிட்டு விளக்குமாளும் ஜாமிருக்கும். அல்லது சொப்பனமாக இருக்கலாம்.

(3) கிடைசொன்று திடுக்கிட்டு, பல்வகையான குழந்தைகளால் கஷ்டம் உச்சி திடுக்கிட்டு உணர்ச்சியால் அப்படி செய்கிறதென்றும், அதற்கு காரணம் கண்ணென்றும் கண்டு பிடிக்கவேண்டும்.

அயர்ந்த வெகு கோம் யாதொரு வித்தியாசமான காரணமுமில்லாமல் தூங்குமானால் எழுப்பி தொந்தரவுண்ணவேண்டாம்.

மலம்.

(1) மலமானது சிசுக்களுக்கு ஏற்படும் குடல் வியாதிகளையும், குடலில் கிரியையுமே திட்டமாய் காண்பித்தவிடும். சிசுவின் மலம் முதல் 2 or 3 நாட்களுக்கு சத்த கருப்பாக இருக்கும். பின்பு அதிலிருந்து கல்க மஞ்சளான தண்ணீர் மலமாக இருக்கும். தூய்ப்பால் குடிக்கும் காலம் அல்லது பாட்டிலில் பால் குடிக்கும் காலத்தில் 2 or 3, 4 தடவைகூட மலம் கழியும். பின்பு தூய்ப்பால் கின்றபின், புட்டி பாலும் கின்றபின் மலமானது உறுவாகி பிரவுன் கலரில் போகும். (இது சாதாரண மலத்தின் கலர்.)

(2) பக்கைநாணமலம்:— குழந்தைகளுக்கு கிரண கஷ்டம் உண்டாகும்போது பச்சையாகப் போகும். அதிக பித்தம் உற்பத்தியாகி, அது அதி சீக்கிரம் வெளியேறுகிறதால் பச்சையாக இருக்கும். பின்னும் வேறு குற்றங்களாலும் பச்சையான மலம் போகும். பால் கிறைந்த கட்டிகளையும், சித்தையையும், இந்த பித்தம் உண்டாக்கிவிடும். பின்பு சீதமும், சத்தமும் உண்டாகி குடல் கண்ணாமூல்கிவிடுகிறது. பின்பு கஷ்டமான குடல் புண்ணுக்கு சிசிச்சை செய்யவேண்டியதாகிவிடுகிறது.

- (3) பொது பொது என்று வெண்ணையாகப் பொருமானால் அது நான் வியாதியால் பித்தரீச குடலுக்கு இறங்காததால் மலம் அப்படியிருக்கும்.
- (4) மலம் காந்தமாயிருக்குமானால்: ஜீரணக்குறைவினாலும், ஜீரண சக்திகள் குடல்களில் சரியானபடி வேலை செய்யாததாலும் காந்தமுண்டாகி விடுகிறது.
- (5) ஜுவர்த்தோடு மலத்தில் சந்தையிருக்குமானால் காய் கவனமென்ற வேண்டிய நிலைமையைக் காட்டுகிறது.
- (6) வயது பொதுவி, தொட்டால் வலி உண்டாக்குமானால் வயத்திற் குள் சென்ற ஜீரணங்கள் அழுதி சுரனும் தவிர்த்த வாயுவுண்டாகி ஜீரண சக்தி தப்பிப் பித்தரீசுகிறது என்று அறியவும்.
- (7) கைதப்படுத்த அடியவற்றக்குழிக்கு சற்றுமேலாக தொட்டால் வலி இருக்குமானால் வியாதி மேல்போகப் பறக்கிறது என்று அறியவும். தீக்கடன் கொண்டு வயதெடுத்தும் அகந்த கான்பட்ட வயதற்றவர்ப்பு இருக்குமானால் கவனமாய் பார்க்கவேண்டும்.
- (8) (Abdominal Breathing) முச்சுவிற்போது தொஞ்சு அகல வந்து இருக்க வயதாமட்டும் தூக்கி முச்சுவிர அகலமுடனது இருவிட வியாதியிருக்கும். கவனமாய் காத்திட்டுச் சொல்லவேண்டும்.
- (9) வயது பெருக்கு கவனிக்கத்தக்கதாக கழிந்திருக்கிறதால் தெரியுமானால் தப்பித்தான் ஜுவரத்தினால் உண்டாயிருந்தபோதிலும் அதுவும் தப்பித்தான்.
- (10) ஆனால் சொல்லு சாதாரணமாய் வயது சற்று முன் தள்ளிச் கொண்டோனிருக்கும். அதை மறக்கவேண்டி.

Urine.

சிலரின் மூத்திரம் சத்தமாகவும், தெளிவாகவும், அநிமாதவாயிருக்கும். இவையிருந்தால் நீர் சதுக்கமாகவும், அடிக்கடி யும் போகும். அது தனி தன்மை பெற்று விடும். உதாரணம் அல்லது குளிர்த்திரிணை சிவன் மூத்திரத்தின் அநிமாதவாய்வு காரணம். ஒரு சிலரின் குணபேத மிருக்காது. மூத்திரத்தின் மூலதனம் உண்டு. ஒவ்வொன்றையும் அவையுங்கள்.

வாந்தி.

- (1) தாய்ப்பால் சாப்பிடுவதில்லாததில் வாந்தி குழந்தைக்கு உண்டாகிவரும் சாப்பிடாமல் சாப்பிட்ட அநீதத்தை உடனே கவனிப்பேன்.

- (2) தப்பிதமான ஆகாராபிகளை சிவ குடிக்கக் கொடுத்தால் தண்டிக்கப்படும். வயற்றோட்டமும் உண்டாகும்.
- (3) குளிர் துாரம் உண்டாவதற்கு ஏதுவாகவும் வாக்கி உண்டாகும். ஆனால் சீக்கிரம் நின்றுபோகும்.
- (4) சிவவுக்கு விடாத ஒக்கானமும் வாக்கியிருக்குமானால் வயற்றிற் றள்ள காரணத்தவிட தலையின் காரணமாக தலையிருக்கலாம். அப்படி யானால் மோசமானது.
- (5) முதலாவது வெரும் ஒக்கானமும், வாக்கியிருக்கும்போது கொள்ளையும், வயற்றில் வலியும் இருக்குமானால் வயற்றிற் தலையிருக்க லீருக்கும். மற்றபடி தலையின் காரணமாகும்.
- (6) வயற்றில் காரணமானால் அசேகமாய் வயற்றோட்டம் சேர்க்கி குக்கும்.
- (7) தலையின் காரணமாக வயற்றில் வலியும் இருக்கும். இது குக்கிற் குறிப்பாகும். ஆகவே வாக்கி ஒரு சமயம் கொம்பு ஆய்ந்த கவனிக்க வேண்டிய வியாதாக இருக்கலாம்.

False-coin mg.

சினக்களத்து லை நாடி சேராய் கண்டுகொள்ள முடியாததாக இருக்கும். சொற்ப பதத்திலும் சிவலின் நாடியை பூரணமாய் பேதப்படுத்திவிடுவது பரமாய் சாடி பார்க்காத ஒருவர் வாயிலால் சொல்லி கற்றுக்கொள்ள முடியாது. நீடித்த அனுபவமாய்தான் கண்டுகொள்ள முடியும். பொது மாய் சிவலின் நாடி போன்ற இருக்ககருது இன்று இருக்கும் வித்தியாசம் களை கண்டுகொள்வது எளிது. ஹைதாடியின் கணக்கு வாயிலிருந்து தக்கதே கரும் தடிப்பு இருக்கும்.

பிறந்த காலத்தில்	...	130—140	வரை கிமிஷத்திற்கு.
வளர்ப்பம் முடியும்போது	...	115—120	"
2-3 வயது	...	100—105	"

இந்த கணக்கு சுமமாக இருக்கும் காலத்தில் உள்ளது. ரொம்ப தாமதமாக அடிக்குமாண்டு அது செலவுக்கு இயற்கையாயிருக்காது.

(Dr. Southey) டாக்டர் சவுதி என்பவர் சொல்வது: சத்த ஒட்டும் விஷமையிருப்பதாலும், தோலானது மெல்லினமாகவும், சத்தம் குழாய்கள் விநியோகவுட்குப்பதால் திரேக உஷ்ணம் சீக்கிரம் மறைநயம் அதாவது குறைநயம். விபரமாய்ச் சொல்வதென்றமொன்று குளிருக்கே தவான விஷமங்கள் அதிகமாகவும், உஷ்ணத்தைப் பத்கிரப்படுத்தவதற்கான ஏதன் கள் குறைநயமாகவுட்குக்கிறது. அதாவது தளர்ச்சிக்குரிய ஏதுக்களே தரேப் பத குறைந்தசலாக சிசுக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதை முக்கியமாய் உவமித்து அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

இந்த மிகிரியானது ஒரு காலத்திலிருந்து ஒரு வாரம்வரை, விரைவில் 10 மிகிரியானது ஏறிகொண்டே வருமானம் அது வியாதி உண்டாகிப் பாதிரை என் மறியலும். 10 மிகிரிக்கு அங்குமே ஏறிகொண்டு போனால் சூப்பது என்று அறியலும்.

(5) தர்மாவீட்டில் 95 மிகிரிக்கு நிரோம் உஷ்ணம் இறங்கியிருந்தது அபூர்வம். பெலிஷப்படுத்தும் வியாதியில் அப்படி இறங்கியேனாலும் நிரோத்தை உஷ்ணப்படுத்தி உதராகப்படுத்தும் பிரயத்தனங்கள் அரிதாய் செய்பவையெனும். கல்ல ஆராய்க்கன் சொத்தவேண்டும்.

(6) நிரோத்து கலம் ஜூம் அமத்தால் மல ஜூரத்தை குறிக்கும் அல்லது வெயிலிஷ (Sun stroke) மட்டு உண்டாகும். உடனே பிரயத்தனங்கள் செய்வாவிட்டால் வலிப்பு வந்தலும். மெதுவாய் ஏறி கலம் ஜூம் அமத்தமானால் நிரோமாய் வலிப்பு உண்டாகிவிடும். நிரோத்து ஜூம் உயர்ந்து அடிக்குமாலும் வலிப்பு உண்டாகவது சான்று.

(7) ஒரு வியாதிவிலிருந்து புரண கலம் உண்டாகவேண்டுகாலாக காலாண் உஷ்ணம் 3, 5 காலாளுக்கு யதார்த்தத்தில் வந்து அந்நேரம் விதானத்தில் திறவேண்டும்.

(8) ஜூர் வியாதிவிலில் காலியிடு குப்பதவிட சாயத்திம்மதி. குறைந்திருப்பதாலும் அது கல்ல குறிப்பாகும்.

(9) கொச்சியில் சொற்ப காலணங்களிலும் ஜூம் உண்டாகியில் ஜூம் ஏறி இறங்குகிறதைப்பற்றியும், கல்லவது ஏறி வயுவது இறங்குகிறது என்றும், எடுத்த கோக்கில் ஏறி இறங்குகிறதென்பதைப்பற்றியும் திட்டமாய் குறித்த வைப்பத கல்லது. கல்பட்ட ஜூர் வியாதிவில்திட்டமாய் கண்டுபிடிப்பதற்கும் ஏதாவதும்.

ஜூரத்தை தணிப்பதற்கு முறைகள்.

(1) கலையான அரோஜ ஜூம் அரோஜெத்க்காலும், மானக காலும் உண்டாகிவிடுமாய்க்காலும் அதை கலம் ஜூரத்தை மாற்றியமைக்கவலும்.

(2) 10 அல்லது 15 கிரிஷ்வகை, தண்ணீரில் உட்காணவைக்கவேண்டும். குளிப்போல் கல்கம் உண்டாகலும் தண்ணீரில் விட்டு வெளியேற்றி அணிகளால் குடி படுக்கவைக்கவேண்டும். தண்ணீரில் விட்டு வெளியேற்றவும் குழந்தை கண்ணல் கத்தியைசெய்ய ஆரம்பிக்கும் குழந்தையானது வியாதிப்பட்டதற்குள் அவயித கலமான ஜூம் அறிகிறதற்குள் அப்படிப்பட்ட கலமான ஜூம் உண்டாகும். பின்னும் 4, 6 அல்லது 8 மலி கோம் கட்டி உயர்படியும் ஜூம் எழும்பலாம். அப்போது கண்ணெடுக்கவேண்டும். மதுபடியும் அப்படியே தண்ணீரில் வைக்கவேண்டும்.

(8) Prof. White என்னும் பெர்போன வைத்தியர் சொல்வது:—மானாவிரல் உடியதில் பாதிக்குபாதி இவ்வித தண்ணீர் வைக்கவலும் கிட்டிருக்கிறது. இது என் அனுபேகம் என்கிறது.

Sir William Broadbent என்னும் வைத்தியர் சொல்வது:—மருத்துகளை கொடுத்து ஜூரத்தை தணிப்பதுவிட இந்த தண்ணீர் காலா மே சொம்ப மேலாவது என்கிறது.

Sponging.—தண்ணீரும் கலையாடியும் கீர்த்த நிரோத்தை பூக்கும் யாதமாய் கலந்து உஷ்ணத்தை மாற்றலாம். கலப்பட்ட ஜூரத்தைக்கு இந்த முறை சொம்ப கலையிருக்கும்.

Wet pack.—தணியை தண்ணீரில் கலந்து புடவைச் சுற்றுவது சொம்ப பிரச்சாரமான முறை. ஒரு டபல் துணிப்பு வெதுவதுதன் யான ஜலத்தில் கலந்து நிரோத்தைச் சுற்றி அதற்குமேல் பிளிப்பாட்டு மூடவேண்டும். 10 கிரிஷ்வம் இப்படி மூடலால் கலா தமாவது. பின்பு கண்ணுய துடைத்து வேற பங்கையில் வைக்கவேண்டும்.

குளித்த தண்ணீர் குடித்தல்.—இதவும் ஜூரத்தை குறைக்கும்.

தலைமீள் ஜல் வைப்பது.—ஜூம் இறங்கும்வரை விடாமல் வைக்கவேண்டும்.

ஜூரங்களில் முக்கியமாய் கவனிக்கவேண்டிய 2-வது பாகம்.

Rest-அமைதி.

குழந்தைகளில் இது இரட்டிப்பாய் கவனிக்கவும். நிரோத்தின் கலம் அக்கள் ஜூரத்திலும், மிதமாய் நிரோ அப்பியாசத்தினாலும் அழிந்து குறைவும். ஆகையால் ஜூரத்தில் மிகுந்த அமைதி சொம்ப அவசியம்; அது இரட்டிப்பாய் முடியுது. அமைதி என்றால் நிரோமும் மனமும் அமைதியாக இருக்கவேண்டும். நிரோத்தின் அசைவுகள் நிரோத்தின் வஸ்துக்களை கலவியம் செலவு செய்கிறதே அதேமாதிரி ஒவ்வொரு மனதின் உழைவும் நிரோத்தை செலவு செய்கிறது. அமைதியாய் இராலிட்டால் ஜூம் கலம் கீழ்க்கும் அல்லது வலிப்பு வரும்; அத்துடன் சூப்பத்தாகும் உண்டாகும்; சூப்பத்தான ஆயாக்கள் உண்டாகி திணைக்கும்படியாகியிடும். கொட்டு அடாவது அமைதியால் நிரோம் போஷிக்கப்படுகிறதென்றே சொல்லலாம். அமைதியாய் இராமலிருந்தால் கலையாகும் வஸ்துக்கள், அமைதியாயிருப்பதால் கலையாகாமல் இருக்கும். ஆகவே அது பின் உபயோகத்திற்காக பாதுகாக்கப்படுகிறது. சில குழந்தைகளுக்கு அமைதியை உண்டாக்கும்படியில மருத்துகளை உபயோகிக்கலாம். உபயோகிக்கவேண்டிய அலகியமும் உண்டாகும். குளோரல், பொட்டாசியம் புரோமைட் என்னும் மருத்துகள் தான் கிரோஷ்டமானது.

அவைகளின் பிரிவுகள்.

துடித்த விடாமல் அடிக்கும் காக்கல்:—ஒரு காலாவது முழுநாள் ஜூரம் விடாமல் ஒரே தடர்ப்பாய் அடிக்கும் காக்கல். அவைகளை உன்: டைபாயிட் காக்கல் or (பித்தவாத ஜூரம்). டிப்திரியா, திம்புலா வன்சா காக்கல், மூலக் விபாதிபால் ஏற்படும் ஜூரம், வாதவாத ஜூரம், காலா அசா. etc., etc.

Erruptive Fevers-அழ்மை காக்கல்கள்.

திடீரென்று கடுமையான காக்கல் உண்டாகும்; வெள்ளைகளுக்குப் பின் தோலில் வைகுரி குறிப்புடன் போனும். அம்மை தடிப்புகள் மலவியான புடன் காக்கல் இறங்கிப்போகும். அவைகளாவன: மின்ன அம்மை, (Measles) ஜெர்மன் மின்ன அம்மை, கச்சாட்ட காக்கல், (Scarlet Fever) பெரியவைகுரி, (கோழி அம்மை, கஞ்சி அம்மை, கொப்பளிப்பான் அம்மை) டெங்கியூ அசாவது (முட்டைம்மை, கொழி முறிக்கான் காக்கல் என்பது) இந்த டெங்கியூவிதம் அம்மை மாதிரி மலவியேதம். கரிசி பிண்ண (படர்ந்த செவலும் கண்ணாத்தெட்டன் காக்கல்)

Remittent & Intermittent Fevers.

ஒரு காளில் அசாவது 24 மணி நேரத்தில் இவ் குறிப்பிட்ட கோக் களில் காக்கல் பூராவாய்விட்டு அல்லது காக்கல் உண்டாகத்தொடர்ச்சியாய் 99 or 99½ டிகிரி வந்து மறுபடி எழும்பி அடிக்கும் ஜூரம்.

காணல்:—தெரியப்படாத இவ் ஜூரங்கள்.

Typhoid or Enteric Fever.

டைபாயிட் or பித்தவாத ஜூரம். வயற்றோட்ட ஜூரம்.

இது 3 வாரங்கள் வரை விடாத ஜூரமாகும் தன்மையுள்ள காக்கல். வயற்றின், தோலில் மின்ன அம்மை தடிப்புகள் போல காணலாம். 8 முதல் 12 நாள் வரை இது காணப்படுகிறது. வயற்றோட்டம் அநேகமாக உண்டு. இவ் கோக்களில் மட்டும் மலக்கட்டு உண்டு. இந்த ஜூரத்தின் இருப்பிடம் நெருடலின் தாள்: அந்த குடலில் பெரிய வைகுரி புணர் போல் உண்டாகும். இந்த ஜூரம் உண்டாகவேண்டாமென்று 12 or 14 நாட்களுக்கு முன்னாலே இந்த விபாதியின் விபாதிருபி ஒருவர் உடலில் சேர்ந்த, பின்புதான் ஜூரமாக வெளியே புறப்பட்டு அதன் குணங்களை காண்பிக்கும். இதில் இரண்டிலிதம் ஒன்று வேரானது மற்றொன்று கடுமையான விதம்.

வேரான விதத்தின்:—குழந்தை விளையாட பிரியமில்லாமல் காக்கல் போய், மடுத்தகொண்டதான பிரியப்படும். இரவில் தொத்தரவு பண்ணும், தூக்கம், திரோம் உட்சியாக இருக்கும். நெர்மாயிட்டன் வைத துப்பார்த்தால் 100 டிகிரியேன் இருக்கும். பின்பு வரவா ஜூரம் திரோ

வண்ணம் அதிகப்பட்டுக்கொண்டேபோகும். வாய் நாரும், அழகார்து அதிக வெள்ளை படர்ந்திருக்கும், துணி நாகும் காக்கின் ஓரமும் சிவந்திருக்கும்.

மலம்:—அநேகமாய் குழம்பாய் இருக்கும், நார்தமாய் மஞ்சள் வண்ண மாயிருக்கும், வயறு ஊத்தமாகவே இருக்கும். மூச்சு துடிதமாக இருக்கும். ஒருவித வரட்சியான இருமல் இருக்கும், காலையில் கொஞ்சம் ஜூரம் இறங்கும், சாயந்திரத்தில் ஏறிவரும், முகம் (Face flushed) சிவந்தா இருக்கும். இரவில் தூக்கமிருக்காது, புலப்பாடுக்கும் அசாவது பித்தம் தும், வயறு இறையும், ஆகாரத்திற்குப்பின் இவ்விதம் கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். வலதுபக்கமாய் அடிக்குடல் பக்கத்தில் அமுக்கினால் கவக்கும், அடிக்கடி வேர்வையிடும் ஆனால் அதினால் ஜூரம் தனியாக இருக்கும்.

விபாதி அதிகப்படுவதற்கு தறிப்புகள்: வெள்ளையாயிருக்கிற காக்கு விரவுன் (Brown) கலராக மாறும், வயற்றோட்டம் அதிகப்படும், வயற்றில் அம்மைபோன்ற சிவப்பு புள்ளிகள் உண்டாகும். திரோம் கொம்ப மெலி கடைபும். வயறு உயர்ந்த டம் டம் என்று விம்மலாக இருக்கும்.

Commencement of recovery.

கமமாகி வருவதற்கு தறிப்புகள்.

1-2 அல்லது 3 வாரத்திற்கு கடுமையாக இருந்த காக்கல் இறங்கும், காலை டிகிரி கொம்ப குறையும் 99 or 100-க்கு வந்தவிடும். அப்படியே சாயந்திர டிகிரியும் காளுக்கு காள் குறைந்து வரும். எல்லா குறிப்பாளும் குறைந்துவிடும். மெலியும், அதிக பெலவியும் மீட்டும் இருக்கும்.

அழ்மை போன்ற தடிப்புகள்:—அநேகம் பித்தர்களில் இந்த தடிப்பு கள் உண்டாகிறது. இது வந்து வந்து மறையும் 4 நாள் இருக்கும் பின்பு மறையும், திரும்ப உண்டாகும் இப்படியாக உண்டாகிறது. 8-12 நாட்களில் ஆரம்பிக்கும்.

II. கடுமையான டைபாயிட் ஜூரம்.

தவக்கும்போதே கடுமையான துடிக்கும். ஆயாசம், அசதி, வார்த்தி, சிலருக்கு துளிர் கடுக்கத்தான் ஆரம்பிக்கும். ஜூரம் 4 or 5-வது காளில் 105 or 108 டிகிரியை உயரும். புகப்பம், முகாயில் குழப்பங்கள் உண்டாகும். மூக்கில் சத்தம் உண்டாகுவதும். காக்கு வரட்சியாயும், வயறு ஊதியும், தொட்டால் வலியுமாக இருக்கும். வயற்றோட்டம் அடிக்கடி இருக்கும். அநங்கிறம் எல்லாம் பயறு அவித்த தண்ணீர்போல இருக்கும். மலம் கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். உடல் திடீரென்று மெலியும், இடது பக்கத்தாள் (Spleen கவரோட்டி நாள்) கொம்ப பெரிதாக ஆகும். விபாதிபால் அவன் கடுமையான அசதியிலிருந்து எழும்புவது உஷ்டமாக இருக்கும். காதும் மந்தமாகிவிடும். விபாதி மூற்ற முற்ற பல்லினம், உதட்டிலும் சருப்பு அழகு ஏதும், இருமல் சளியுடைய உண்டாகும்.

டாக்டர் மதறம், திருச்சிஞ்ஞப்பள்ளி.

டைபாயிட் விவாதங்களில் இருக்கக்கூட குணம், மெம்பர்பாடக தெரியும். எவ்வளவு கவனப்படுன் பார்த்தாலும், பெஸினம் கொம்ப ஜாதிதான் ஸ்திரீ. இங்குதான் இருந்தபோதிலும் ஜாததின்னும் குழந்தைகளுக்கு உருவ வளப்பு உண்டாகாததினாலே, சூன்வீதமான மேட டைபாயிட் ஜோம்பி மெதுவாய்தான் கைதாளுக்கு வரும்.

இந்த ஜூரத்தின் கிச்சல் டிகிள் குறிக்கும் சீட்டு.

பீட்டிஸ் தின்பயடி குறித்திருப்பதை பார்த்தால் முதல் கார்த்திக்
வணிகபாஸ் 103 or 105 டிசெரி உயருகிறதகளை தினம் 1 டிசெரியாக ஒரு
வாரம் அல்லது 10 நாள் கறித்தொண்டிட வந்திருக்கும்.

2nd Week: இரண்டாம் வாரம் காணும்-மாயும் ஒரே நிதியாம் விடாமலிருக்கும். இப்படி ஒரு வாரம் இருக்கும். ஜாஸ்தானது எதிலும் இடத்தில் இறங்காமல் நிக்கும். இப்படி ஒரு வாரம்.

3-ம் வாரத்தின் அப்படி எனியடி எதினதோ அப்படி ஒவ்வொரு
புகிரியாக இடையிடையேயுண்டாகும்.

4-ம் வாரத்தில் முதல் பாதியில் காலை மிகிரிமட்டும் சாதாரண நிலைமைக்கு சமரசமாகிவிடும். சாயத்திரை 10 மீட்டர் வரையில் இருக்கும். மலை வாரத்தின் பிற்பாதியில் காலை 12-மணிக்கும் சாதாரணமான நிலைமை உண்டாகத்தக்க வரலாகும்.

கவனிப்பு.

முதல் காதலில் இருக்கும் விசேஷ நூல்களைச் சொன்ன விவரத்தை
யைச் சுண்டிப் படிக்கலாம். தவறாத கிலேயே சொப்பம், சொல்லம், குறில்
காய் தினம் ஒரு பிள்ளை எதிர்பார்த்து, வயற்றைப் பொருமலினாலும்,
வயற்றோட்டத்தினாலும், மிகுந்த பெண்கள் தன்மைகளிலும் கண்டெடுக்க
லாம். இரண்டாவது காதலில் விவரம் பல்லுளில் சந்தைப் பூதங்கள்
இருவரால் சொல்கின்றபோது திடமாய் கண்டெடுக்கலாம். மோகம்
விவரத்தில் 1 or 2 சொட்டு சந்தம் குழலில் கலந்து அதை பூதங்கள்
இருவரால் பரிசோதிக்கலாம்.

பொதுவாக இந்த ஜாதிக்கு குழந்தைகளில் வேராக வளம்பெற்றதால்
ஜாதிக்காரையுடன் ஆராதம் கொடுத்தால் மிகச்சான்ற குழந்தைப்பாக்கு
பற்றில் சம்பாதிக்கும். ஆராதம் கொடுப்பதில் மிகுந்த ஜாக்கிரதையுடன்
ஆராதம் தண்ணீர்போலவே இருக்கவேண்டும்.

நல்ல குறிப்புகள்.

விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேலைகளை, வயற்றுப்பந்தம்
இல்லாதிருந்தால், வயற்றில் கொட்டை கொடுக்காமல் இருந்தால்
பின் 101 or 102 டிபார்ட்மென்ட் போரையிடப்பட்டது. மாண்புமிகு 103-ல்

மேல் போகாமலும், நாக்கில் போதுமான நீர் இருந்தாலும், பின்னும் 3-ம் வார்த்தையில் சுலபாட்சை முதிரிலையவிட காலையில் 3 மணி இரக்கமாக இருத்தல், சாயந்தரமும் காளுக்கு நீள் குறையும். இந்த குறிப்புகளுக்கு விசேஷதமாயிருந்தால்மட்டும் கவலைக்கு இடமாகிறது.

இரத்த மலம் தவ்வுது பெரும் சோர்வு இருக்குமானால் சொம்பவும் கம்பிகளையற்றதாகும்.

மிருதியான கோசுளில் கிசிச்சை ரொம்ப வேசு. பிள்ளையை துறை
தியாய் இருக்க வைக்கவேண்டும். உயிர்வைத்ததை கவனத்தோடு கவனிக்க
வேண்டும். ஆகாரத்தை நிதானப்படுத்தவேண்டும். முக்கியமாகக் கவனிக்க
வேண்டியது ஆகாரம். ஆகாரத்தினையும், போஷிப்பதையும் சரியாய் கவ
னித்து நடக்கவில்லையானால் டாக்டர் தான் என்ன செய்யமுடியும்? சிக்
களியின் ஜீவன் முழுபுறம் ஆகார வேலையை நடத்தும் ஆபீசில்தான்
இருக்கிறது. இந்த விஷயங்களுக்கு ஆகாரம் செலுத்தும் டீயானாவன் அல்
லது டீச்சானாவன் புத்தியுள்ளவராயும், விஷயத்தின் தன்மை என்னவென்று
தெரிந்தவனாய் இருக்கவேண்டும்.

9௬ பக்கத்தில் இந்த வியாதியில் வியாதியைத் தவிர்த்துக் கொடுப்பதற்குப் பெண் மனைவியாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அடுத்த பக்கத்தில் குடல் பழுதப்பட்டு புண்பட்டிருக்கிறதால் என்பதை மறக்கக்கூடாது. ஆகையால் எப்படியப்பட்ட ஆகாரத்தினால் கொடுக்கலாம், எப்படி எப்படி ஊட்டலாம் என்று ஆரக்கிரகத்தையுடன் கண்டு கொள்ளுதல்தான் நான் அரசு அவசியம். உயர் விம்மும்படியாகச் சத்த தண்ணீர் குடி கொடுக்கலாகாது. சுறுக்கம் சுறுக்கமாய் அடிக்கடி கொடுப்பதே தான் விதியாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

மருந்துகள்.

சூடல் புண்ணை ஆற்றும் மருந்துகள்தான் மூக்கியம் வேண்டியது. சூனோணையின் வாவு தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கவேண்டும். தைமால் காலோமெல் பவுடர் $\frac{1}{2}$ கிரேயினுக்க கொடுக்கலாம்.

ஜூசும் தணிய திரோத்தில் தண்ணீர் பூசவேண்டும். தலையில் ஐஸ் கட்டி வைத்துக் கட்டவேண்டும்.



பிரசவ அறை வெகு சுத்தமாயும், காற்றோட்ட வசதியாகவும் இருக்க வேண்டும். இதன் மிக முக்கியம். அப்படி இவ்வாறவிடங்களில்தான் தாயின் மாணமும், சுகமாணமும் அதிகமாக இருக்கிறதாக கண்டி கண்க்கிடிக்குக் கிருக்கன். இதை கவனிக்கவும். கழுத்தைக் காத்த வஸ்துவும் அங்கு அறையின் இருக்கப்படாத. மாற்ற தினம் 2 கொடுக்கவேண்டும். பிரசவ அறையின் தட்டி முட்டு சாமான்ன இருக்கவேண்டாத.

15 நாள் குழிதாக்க ஒரு தடவைக்கு 1½ அடிவால் தூரம் கொடுக்க வேண்டும்.

மேட்டிப்பாட்டு	...	...	4	ம. கண்ணடி
தண்ணீர்	...	...	7	"
சுண்ணாம்புத் தண்ணீர்	...	...	1	"
சோடா ஷைட்டிங்ஸ் (Soda Citars)			2	செயின்
பாலின் சர்க்கரை			10	
பச்சை பாலின் வெண்ணை பாகம்			10	செயின்

இதனால் விதிப்படியுள்ள ஆராமமும்.

தாய்ப்பாலுக்கும் மற்ற மிருகங்களின் பாலுக்குமுள்ள
தாரதம்மியம்.

பாலின் சத்துக்கள்	மனுஷர் பால்,	மாட்டின் பால்,	செழுநீரின் பால்,	சுட்டின் பால்,
மாமா அம்ச சத்து	2.0	4	1-8	8.7
கொழுப்பு	3.5	8.5	1.0	4.2
சர்க்கரை	7.0	4.0	5.5	1.0
தாதுவச்சம்-Mineral	0.2	0.0	0.4	0.5

[illegible]

பேதிக்கு தாய் மருந்த சாப்பிட்டால் செவந்தும் மலம் இடைவா
பேசுவதைப்பார்க்கிறோம். ஏனெனில் அந்த மருந்த பாலின் சூசைமா

பிள்ளைக்குப்போய் சேருகிறது. ஆகையால் ஆட்டுப்பால் கொடுத்திறவர்
கள் ஆட்டையும், மாட்டுப்பால் கொடுத்திறவர்கள் மாட்டையும் கட்டி
ஒழுங்கான ஒரே ரீதியான ஆகாரம் கொடுக்கவேண்டும்.

நாயகனாவதும்:—ஒழுக்கினுமான தீனி, வாய்வு பதார்த்தங்கள் அள
யிடுகி தின்று குழத்தைக்கு கஷ்டமுண்டாக்காமல் ஒழுங்கான கிதா
ன தீனியும், வாய்வு பதார்த்தங்களை அளவுக்குயிடுகி தின்று குழ
தைக்கு கஷ்டமுண்டாக்காமல் குழங்கு, கிணரைச் சுவப்படி. அளவும்
படி சாப்பிடுவதும்: இதற்காக சில தாயகர்களோ பயந்து, பத்தியுட்
கிட்டுக் குழத்தைக்கு சத்த இல்லாத பாலுக்கொடுத்த குழத்தைக்கு கால்
வளைத்து, செஞ்சுகடிகட்டி, தலை பெருத்து, வயறு பெருத்த, கால்கள்
சிறுத்த, பெலன் குன்றி திருக்கிற குழைக்காயும் கால் பரக்கிறோம்.
நாயகனவன் தனக்கு பொருத்தவிற என்னா ஆகாரத்தையும் நிதானமாய்
அளவுப்படி சாப்பிடுவதும்:—இது அவசியம். குப்பு முதலானவை சாப்பிட்டு
தன்னை வெப்பப்படுத்தவேண்டும். நாயகனவன் வெவ்வேறுதிறய ஆகாராதிகள்
ஒழுங்காய் சாப்பிட்டு தன் பாலு விர்த்திசெய்யவேண்டும்.

Artificial Respiration.

கையினால் சுவாசாசய துருத்தியை மனதுதல்.

சூழத்தை பிறந்தவுடன் மூச்சு விடாமலிருக்கும்மாளுக்குப் பச்சைத்தண்ணீர் முகத்தில் தெளிக்கலாம். வெக்கிறிலும், பச்சைத்தண்ணீரிலும் மாற்றி. மாற்றி மூழ்க களைக்கலாம். ஆனால் தலையையும், முகத்தையும் உள்ளே மூச்சுவிடாமல் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டும். இவைகள் எல்லாம் சாத்தியப்படாவிட்டால் சூழ்ந்நையைப் பலமாக கட்டிலில் அல்லது மேஜை வில் படுக்கவைத்து சூழ்ந்நை அண்ணாரச்செய்து வைத்துக்கொண்டு இரண்டு கைகளையும் தலைக்குமேலாக இழுத்து, நெஞ்சை விரித்த இழுத்த மறு படி அந்த புஜங்களைக்கொண்டே நெஞ்சை அமுக்கவேண்டும். இப்படி நியிவத்திற்கு 30 முதல் 40 தடவை வீதமாக அனாமணி நேரம் பிரயாசப் படவேண்டும். இது எப்படி என்றால் கண்ணை வைத்துக் கருத்தி ண்தவது போல் காற்றை நெஞ்சுக்குள் செலுத்தி பின்பு அமுக்கவே சுகாகம் வெளி யேற்றுகிறது. இப்படியாக தருத்தி ண்தவதுபோல் செய்யவேண்டும். அச்சமும் வெக்கிறிப் களைத்த தண்ணீர் மடித்து நெஞ்சில் குவி உண்டாக போட்டுக்கொண்டே பிரகந்தவேண்டும். அனாமணி நேரம் கழித்துக்கூட சிசுக்கள் உயிர் உண்டாகியிருக்கிறது. இது அனுபோகம்.

சீகந்தனின் மரபில் பால்—அதை மெதுவாய் பிதுக்கி எடுத்தலிடு
வெணும். மூட்டுத்தனமாய் பூபோன்ற சிகயின் மாரின் சதைமைய கசக்கி
கசக்கி பின்பு அதை வீக்கி சுவம்பிடித்த அறுத்த எடுக்கும்படியாக் கவிடு
கிறார்கள். எச்சரிக்கை, மெதுவாகவே சதையும் செய்யவேணும்.

தாயின் தூதரம்:—முதல்நாள் காப்பி, கொட்டி, திக்கை ஜவ்வரிசி கஞ்சி, வெண்ணை கொட்டி பசிக்குத்தக்கதாக தினம் 2 or 3 தடவை ஆகா ரம் சாப்பிடலாம். அதிக ஆராய்சியிருந்தால் இப்பு, மட்டன்பிராத்த கொஞ் சம் சாப்பிடலாம் இப்படி 2 or 3 நாளைக்கு மட்டாயிருக்கவேண்டும்.

4-ம் கான் முதல் யாதொரு குழப்பமும் இல்லையானால் வழக்கமான ஆராமம் காப்பிட எத்தனிக்கலாம். ஆனால் சைபாசும் மட்டும்தான் காப்பிடவேண்டும். ரொட்டி, சாதம், கால் அலியல் முட்டை, முட்டையுடையாலும், கொத்தின கறி, வேகான குழம்புடன், காப்பி, ரொட்டி, வெண்ணெய் காப்பிடலாம். இது கிரேப்பியர் வகையாகும் முறை.

கம் இரத்தியர்கள் 8 காலைக்கு ஆராமம் கொடுத்தால் அரை உயிராகி விட்டுவிடுகிறார்கள். பொதுவாய் இவர்களின் அப்பியாயம் என்னவென்று சொல்லமுடியாது. காலைக்கு காலைமென்று உண்டு இருக்கக் கூடாது. அப்படியும், அதிக காலைப் பெருகினால், அத்தான் சைபாசும் காலையிலேயே புத்தன் விவாதிக்கு மிகுதியான காணமாகிறது. பெருகினதற்கு விவாதி வேகாய் பற்றிக்கொள்ளும். பஸர், சத்தம், காந்திரட்டைகளை இருந்தால் தான் 100க்கு 95 பங்கு ஜன்னி, ஜாசம் வரவொட்டாமல் தடுக்கும். சத்தத்தை மிகுதியாய் கவனிப்பேனாம். சிறானமான ஆராமம் முதல் ரொத்திலிருந்தே பிடி அவசியம்.

இந்தியர்களுக்கு தினம் 24 மணி:—காலையின் ரொட்டி காப்பி பின்பு 10 or 11 மணிக்கு 2 மணி ரொட்டி வெண்ணெய் அல்லது ரொத்தமே சைவக்கூடு 1½ ல் காப்பிடலாம். சாயந்தரம் ஒரு சிறு காப்பி, 1 பிஸ் ரொத்தம், இரவு சைவக்கூடு திங்கை ஒரு ல் அல்லது காப்பிடலாம். 4-வது காலைக்கு ஆராமத்தை அதிகப்படுத்தக்கொள்ளலாம். ருப்பி ரொட்டி, ருப்பி சாதம், மத்தியானம் ஒருவேளை ரொத்தத்தொண்ணாள். மற்ற வேளையில் முன் சொன்னபடி கஞ்சி, ரொட்டி, காப்பி, காப்பிடிக் கொள்ளவேண்டும். 11-வது காலைக்கு இரண்டுவேளை சாதம் குதம்பு காப்பிடலாம். அல்லது சைவக்கூடு காப்பிடவேண்டும். 15-வது காலைக்கு கறி, ருப்பியல், ரொட்டி, வெண்ணெய், பால் குதவடன் காப்பிடவேண்டும். (பெண்ணையான காலை விவாதிக்கு காப்பி ஆராமம் கொடுப்போமோ அப்படி முதல் 8 காலை கொடுக்கவேண்டும்.)

முக்கியமாய்:—தினம் மலகத்தியாகப் பார்க்கவேண்டும். இது பிடி முக்கியம். முதல் காலைக்குத் தினமலகத்தி இருக்கவேண்டும்.

சுத்தம்.

சாயானவன் திருக்குப்போரும்போதெல்லாம் ஒருசெம்பு வெள்ளைக்கூடுகொடுத்தல். அந்த இடத்தில் ஊக்கன் வெடிப்புடன் இருக்குமாறு மருந்தான் போடவேண்டும். காலைமலக வெள்ளையிலில் வைத்து வெகுநேர தனி மாதற்கு கொடுக்கவேண்டும். சிவகம் சத்தமாக இருக்கவேண்டும். தினம் குளிப்பாட்டவேண்டும். ரொப்பியின் காத்தை கண்ணாடி அல்லது கறிப்பாவது, 'போரிப்படி'வது போடவேண்டும். குழந்தையின் கழுத்த, கை, கால், வயது, தடை மடிப்புகளில் (Toilet Powder) படிபு போடவேண்டும்.

பிரதம அறையும் வெகு சத்தமாயிருக்கவேண்டும். எவ்வீத அடிக்கு அந்த அறையுள் போகக்கூடாது. அவன் திரைக்கதை மட்டும் கண்ணுக்குக் கொண்டு வந்த தாயைமாய் வந்ததற்குக் கடிது ஜன்னின்

கண்ணுக்குத் திறந்திருக்கவேண்டும். வெயில்காலத்தில் தனி, வெட்டுப்போகவை இருந்தால் போதுமானது. சத்தமும், சத்த ஆராமம் வெகு சிறப்பானம்.

மிகுதியானபேர் முடத்தனமாய் அந்த அறையை இருட்டாக்கி, சிறு துவாக்கையையும் அடைத்து முச்சுப்போகக்கூட இடமில்லாமல் தனையும், பின்னாலையும் வதை செய்கிறார்கள். இப்படிச்செய்வது கொலைபாதத்திற்குச் சமமானம். அசத்த ஆராமத்தால் அரோகம், குழந்தைகள் சாகிறது. தாய்க்கு ஜன்னி, ஜாசமும் உண்டாகிறது.

அந்த அறையுக்குப் போகிற எல்லாரும் சத்தமாக இருக்கவேண்டும். விசேஷமாய் மருத்தவச்சியானவன் வெகு சத்தமாக பரிசுத்தமர்க இருக்கவேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியம்: கவனித்தக்கொள்ளவேண்டும்.

தண்ணீர்.

ஆராமத்தினில் தண்ணீர் ரொம்ப முக்கியமானபாகம் குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் தண்ணீர் கேட்கும்போது தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்கவேண்டும். திரைக்கத்தினின்று கழியவேண்டிய கழிவு வஸ்துக்களை கழுவி விடுவதற்காக தண்ணீர் ரொம்ப அவசியம். அந்த கழிவு வஸ்துக்கள் முத்திரத்தின் மூலமாயும், வெர்வையின் மூலமாயும் கழுவப்படுகிறது. சில குழந்தைகள்மட்டும் அதிக தண்ணீர் குடிக்கும் அப்பியாசத்தை உண்டாக்கிக் கொள்வதன்மூலம் ஆனால் அறை சிறுத்தவேண்டும். ஜாசமயம் தண்ணீர் குடித்தால் திரைக்க உஷணம் குறையும் என்று அறியவும்.

பற்கள் முளைப்பதின் வயதும், ஏழுங்கும்.

- (1) கீழ்க்கடி முன்பற்கள் இரண்டும் 7 or 8-வது மாதத்தில்.
- (2) மேல்க்கடி முன்பற்கள் மேற்படிக்கு ஜோடி 7½ or 8 மாதம்
- (3) இந்த கடிப்பற்களுக்கு பக்கத்தப்பற்கள் கீழ்க்கடியில் 8-வது மாதத்தில்.
- (4) மேல்க்கடி பக்கப்பற்கள் 10-வது மாதத்தில்.
- (5) கீழ்க்கடியில் சைவக்கும் முதல் பற்கள் 12 or 13-வது மாதத்தில்.
- (6) அரோபடி மேல்க்கடியில் முதல் சைவக்கும் பற்கள் 14-வது மாதத்தில்.
- (7) 4-வது பற்கள்=மேல்க்கடி 2, கீழ்க்கடி 2: 16-20 வது மாதத்தில்.
- (8) சைவக்கும் பற்களில் 2-வது செட்டி-மேல்க்கடி 2, கீழ்க்கடி 2: 20—30-வது மாதத்தில் பக்கத்திற்கு ஒன்று.

ஆக பற்கள் 20-ல் பால் பற்கள் என்று சொல்வது. (Milk Teeth or Temporary Teeth) என்றும் பெயர்.

பற்கள் 32-ல் மீதம் 12 நிலையான பற்கள்,

அவை முனைக்கும் காலம்.

(9) 6 or 7 வயதில் சைவக்கும் உடைய பற்கள் (Grinders)
அடுத்த சாறுமேல் 2 } 4 முனைக்கிறது.
பின்பு 2 } 4 முனைக்கிறது.

(10) 10 or 12 வயதிற்குப்பின் மேல்செண்டி 4 சைவக்கும் பற்கள்
(Back grinders) முனைக்கிறது. ஆக 28 ஆகிறது.

(11) பின்பு வயது 17-21 வயதில் முனைப்பற்கள் என்ற
சொல்லப்படுகின்றன. (Wisdom Teeth) மேல் வயில் 2, கீழ்
வயில் 2 ஆக 4 பற்கள் பக்கத்திற்கு ஒன்று ஒன்று முனைக்கிறது.
 $28 + 4 = 32$ ஆகிறது.

பல் விழுதலின் முழுக்கு.

6 or 7 வயதில் சைவக்கும் பற்கள் முனைத்தபின் உடனே பால் பற்களில் முன்பற்கள் விழ ஆரம்பிக்கிறது. எப்படி உண்டானதோ அதே நிகழ்வு விழுதலுமாகிறது. அதாவது விழுதுவக்கும் காலம் 6 or 7 வயதில்.

(1) 6 முன்பற்கள் மேல் 2, கீழ் 2 விழ ஒருவருக்கொன்றாக.

(2) முன்பற்களின் பக்கப்பற்கள் மேல் 2 கீழ் 2, அடுத்த ஒருவருக்கொன்றாக விழுதலுமாகிறது = 4. (7-8 வயதில்)

(3) முன்பு வயது ஒருவருக்கொன்றாக (9-10 வயதில்) சைவக்கும் பற்கள் மேல் 2, கீழ் 2 = 4.

(4) பின்பு இரண்டாவது சைவக்கும் பற்கள் அடுத்த செட்டி.

(5) பின்பு 9½ to 12½ வயதில் செட்டிப்பற்களும் விழுதலுமாகிறது = 4
ஆக 20 பற்களும் இந்த காலத்தில் விழுதலுமாகிறது.

பால்பற்கள் முனைக்கும் காலத்தில் எத்தனை செட்டியும், செட்டியும் அருகில், இரண்டு செட்டியும், எதையும் கடிக்க ஆகாப்படுகின்றன. இது தெரிந்த பின்பு பால்பற்கள் விழுதுவாய் வயதுடன் சாதாரண ஆரோக்கியம் மட்டுமே கொடுக்கவேண்டும்.

வெகுகை:—குழிச் செட்டிப் பாலம் பார்க்கவேண்டும். பல்முனைக்கும் ஆரம்பித்த பின் தனிப்பால் அல்லது வேறான தண்ணீர் போன்ற பால் கொடுக்கலாம். (குரு பால்புடர் கொம்ப உதவியாக இருக்கும்.) பற்கள் 3 முனைத்தபின் செட்டி, பின்பு செட்டிவர்கள். சாதாரண கொடுக்கலாம்.

DIAGRAM OF MILK TEETH

பால் பற்கள் 20



(20 in Number)

Upper { "FRONT" TEETH (Incisors) 4
"EYE" TEETH (Canines) 2
"DOUBLE" TEETH (Molars) 4

முன்பல்-4

சைவக்கும் பல்-4

சைவக்கும் பல்-4



Lower { "FRONT" TEETH (Incisors) 4
"EYE" TEETH (Canines) 2
"DOUBLE" TEETH (Molars) 4


முன்பல்-4

சைவக்கும் பல்-4

சைவக்கும் பல்-4


பற்களின் படம். மேல்செட்டியில் 10. கீழ்செட்டியில் 10.
முன்பற்கள் 4 + 4 = 8 செட்டிப்பற்கள் 2 + 2 = 4.
சைவக்கும் பற்கள் 4 or இரட்டை பற்கள் 4 + 4 = 8.

ஆக 20 பற்கள் அடங்கிய பால் சாட்டியிருக்கிறது. முனைக்கும் வரிசை—செட்டி—செட்டி—விழுது வரிசை—செட்டி—செட்டி—பின்பு நிலையான பற்கள் முனைக்கும் கரிசை—செட்டி—செட்டி—எல்லாம் விபரமாக இப்பகுப்பதில் காட்டியிருக்கிறது. சற்றே கவனத்துடன் வாசித்த அறிந்தவர்கள்.



மனிதனின் எலும்புக்கூடு.

ஒரு மனிதனின் எலும்புகள்-விவர எலும்புகள்-கழுத்து எலும்புகள்-முதுகு எலும்புகள்-இடுப்பு எலும்புகள்-பிட்டி எலும்புகள்-கைகளின் விரல் எலும்புகள் கைகளையும் கால்களின் தசைகளையும் ஒன்றுக்கொன்று எப்படி இணைகள் அமைந்திருக்கின்றனையும் கவனிக்கவும்.



இது இரத்த ஓட்டத்தைக் காண்பிக்கும் படம்.


இந்த படமானது இரத்தாசயத்திலிருந்து மேலே துறையீரலுக்கும்-தலைக்கும்-பின்பு டிமே வயறு குடல்களுக்கும்-கிட்டி என்ற கீழ் உற்பத்திக் காய்களுக்கும்-அடியில் தடை கால்களுக்கும் இறங்கி-ரத்தம் பாயும் குழாய்களைக் காட்டுகிறது.

H = H = இரத்தாசயம்.


A = அயோட்டர் என்னும் பெரிய ரத்தக்குழாய். இந்த அயோட்டரிலிருந்து பிரிந்துதான் துறையீரலுக்கு இருபக்கமும் செல்லுகிறது. அதிலிருந்து மேல் கிளைகள் தலைபாகத்திற்குச் செல்லுகிறது.

V = V = V = என்று போட்டிருப்பது எல்லாம் கருப்பு ரத்தம் அகாவது திரேசத்தின் பல பாகத்திற்குவந்து கெட்ட ரத்தமாக திரும்புகிற ரத்தக்குழாய்கள். இந்த கருப்பு ரத்தக்குழாய்கள் மறுபடி இரத்தாசயத்தின் வல பக்கத்திற்குச் செல்லுகிறது. அங்கிருந்து துறையீரலுக்கு தள்ளப்படுகிறது. துறையீரல்தான் ரத்தத்தைச் செய்து கிவப்பு ரத்தமாக்கி மறுபடி ரத்தாசயத்திற்குள் இடப்படும் வந்து பின்பு பல பாகங்களுக்கும் தள்ளப்படுகிறது.

X = கிட்டி மூத்திர உற்பத்திக்காய்.



இதில் மேல் இரண்டு குண்டுகளையே பார்ச்சுமும். அவை இரண்டுமே உதவி எடுத்தலிருந்து முத்திரையாக எழிவு ஜலத்தைப் பித்தி எத தத்தை சுத்தப்படுத்திவதை. இந்த முத்திரையானது இருபக்கமும் இருக்கிற யூட்டர் என்னும் குழாய்கள் வழியாக சீர்ப்பை வற்றும் படிக்கு சொட்டு சொட்டாக வந்தகொண்டேயிருக்கும். பின்பு இந்த அப விவரத்தால் வெளியேற்றிவிடுகிறது. இந்த குண்டுகள் கப்பல் ஊரோசப்பட்டால் நீர் உற்பத்தியாகாமல் வீக்கம் உண்டாகி ல்லும். அப்போது முத்திரை முகவராக வீக்கம்தோணும். 24 மணி ரோத்திரதன்னைக திரோசமென்றும் வீக்கமுண்டாகிவிடும். Bladder என்னும் முத்திரையிலுள் ஊரோசப்பட்டால் அங்கு 1 சொட்டு நீர் உடனடியாகவே தத்தெறித்து 2 நிமிஷத்திற்க்குள்ளும் 11 நிமிஷ வேண்டியதற்கு.




இந்தப்படத்தில் ஊரூட் என்னும் எந்தையம் அசுவது மாக்ஸியம் திரி 80 செஞ்சில் இடபாரிசமாய் காண்கிறோம்.

நுரை நரல்கள்: இரண்டு பக்கமும் டைலாபரம் உள் விரிந்த இருக் கிறதை காண்கிறோம்.


டையாபரம்: இது கொஞ்சிற்கும் வயற்றப்பாகத்திற்கும் ஒர் தடுப்பு சுவராக இருக்கும் ஸ்கிரீன்போன்ற பலத்த ஜவவு. 4 இது குடைபோல உருண்டை வடிவமாய் சிற்தும்.

வயறு: டையாபரத்திற்குமேல் கொஞ்சம், அதனுள் சுவாச கருவிகளு மிருக்கின்றன. டையாபரத்திற்குமேல் வயறுமற்ற ஜீரணக்கருவிகள் அசுவது இறைப்பை, கருவீரல், குடல்கள் இருக்கின்றன.



ரத்த பிள்ளைகள்.

எத்தமானது உமது சாதாரணமான கண் பார்வைக்கு ஜலரூபமாக இருக்கி றது. புத்தகன்னுடிவைத்துப் பார்த்தால் இப்படி பிள்ளைகளாகவே யிருக்கிறது. அதிலும் சிவப்பு பிள்ளைகளும், வெள்ளை பிள்ளைகளும் கலந்தேயிருக்கும். திரோசத்தில் எத்தம் குறைந்து வெளிராக இருந்தால் சிவப்பு பிள்ளைகள் குறைந்தும், வெள்ளை பிள்ளைகள் அதிகமாகவுயிருக் கும். எத்தபடி குறைந்தால் சிவப்பு பிள்ளைகள் குறைந்துபோகும்.



இந்த படத்தில் காண்கையெண்ணிய விஷயங்கள்.

இனறுப்பை = இது உயற்றின் இடப்பக்கமாக இருக்கிறது.

பெருந்திண்டு = குடவின் துவக்கம்; இதில் உண் பித்த சரம் பான்மிடிக் சரம் வந்த ஆராரிசுடன் சேருகிறது.

சிறு தடல் = இது சமையலாக இருக்கிறது.

அப்பெண்டிக்ஸ் = இது பெருக்குடலும், சிறு குடலும் சேரும் இடத்தில் உள்ள ஓர் வால் போன்றது. நல்லெண்ணெய் ஓர் விபாதி உண்டாகி மாணமாகிறது. இதை வண்டவுடன் ஆப்போஷன் பண்ணி வெட்டி எடுத்துப்போடவேண்டும்.

கோலன் = பெருங்குடல் = இதயம் மலக்குடல் இதில் மலம் தண்ணீர் போல இருக்கும்.

ஆகன் டுவாரம் = இதனால் மலம் வெளியாகிறது. இதிலிருந்து 8 அங்குலத்திற்குள்ளதான் மூலமுமாக உண்டாகிறது என்பதாம். இவற்றிலே இடப்பக்கமாக வளவுக்கு வந்ததான் மலம் இருக்கிறது.

குழந்தைகளின் நிறை.

வயது.	உயரம்.	நிறை.
பிறந்தவுடன்	19½ அங்குலம்	7½ பவுண்ட்.
முதல் மாதம்	20½ "	10½ "
5-வது மாதம்	23½ "	14 or 15 "
12-வது மாதம்	27 "	22½ "
2-வது வருஷம்	30-32 "	27 to 28 "
8-வது வருஷம்	32-35 "	32 "

மீன்பு 10 வயதுவரை வருஷம் ஒன்றுக்கு 4 பவுண்ட் நிறை கூடுதலும், 2 or 3 அங்குலம் வளர்ச்சி கூடுதலாக இருக்கும். பிறந்தவுடன் இருக்கும் நிறைக்கு 5-வது மாதத்தில் இரண்டு பங்கு நிறை கூடுதலாகிறது. முதல் வருஷம் பூர்த்தியாகும் பிறந்ததற்கு 3 பங்கு கூடுதலாக இருக்கும்.

குழந்தைகளுக்கு ஆகார அட்டவணை.

வயது.	தண்ணீர் சேர்க்கவேண்டிய அளவு.	2½ மணி சேர்த்தில் எத்தனை தடவை.	தடவை ஒன்றுக்கு அளவு.	2½ மணி சேர்த்தில் மொத்த அளவு.
2-7 நாள் 1க்கு 3 தண்ணீர்		10 தடவை	1 அவுன்ஸ்	10 அவுன்ஸ்
1 மாதம்	1-க்கு 2	10 "	2 "	20 "
2 மாதம்	1-க்கு 1½	9 "	3 "	27 "
3 மாதம்	1-க்கு 1	8 "	4 "	32 "
4 மாதம்	1-க்கு ¾	7 "	5 "	35 "
6-7 மாதம்	1-க்கு ½	6 "	7 "	42 "
8-9 மாதம்	உயமாய்	6 "	7 "	42 "

இப்படியாக பாலையே கொடுக்கவேண்டும். அது ஒத்த வகுப்பாக செய்யவேண்டும். குழந்தைக்குரியது பால்தான். சில காரணங்களால் பால் பொருத்ததாக தெரிந்தால் வெஸ்ட்ஸ் மால்டெட் மில்க், மெல்லின்பூட் பால் சேர்த்து கொடுக்கவும். அரிசி தண்ணீர், பார்லி தண்ணீர் பாலில் சேர்த்து கொடுக்கலாம். எவ்விதம் ஆகாரத்தினை சமயந்தக்குத்தக்கதாக மாற்றினாலும், குடல் சரிப்பட்டபின் பாலையே திரும்பவும் ஆகாரமாக கொடுக்கவேண்டும். குழந்தைக்கு ஏற்பட்டது பால்தான். இதை ஒக்கிய மாய் கவனிக்கவும்.

குழந்தைக்கு இரண்டு வயத முடியும் வரை மாட்டுப்பாலேயே மிகுந்தபடி ஆராய்ச்சிக்குட்படுவதும், அந்த மாடுகளின் கொடுதலும் முக்கியமாகப் பாலாவேயிருக்கவேண்டும். மற்றபடி குழந்தைகள் பெய்து தாட்டாமையுடையது. இது நினைவும், பவலியாற்றுகளும் வரும்.

குழந்தைக்கு குடல் பெலினைமாயிருந்தால், அந்த ஆராய்ச்சியைத் தீர்விட அந்தப் பால் செல்லும். வயற்றுவலி, வயற்றுப்பொறமல், வயிற்சுட்டம் முதலான உண்டாகுமாறு தீர்விடும் மருந்தாகும், இவைகளுவிடப் பெண்படுத்தம் மருந்தாகும் கொடுக்கவேண்டும். குழந்தைகளை வாய் ஒரு தடவை நிறை பார்த்துக்கொள்ளும். நிறை குறைவாக வாய் என்னவென்று கண்டுபிடிக்கவேண்டும். பின்னும் இது விவரமாக ஆராய் குறைவாக, பெருமையாக, மலக்கட்டாமென்று பார்த்து அதற்குப் பரிசாரகன் செய்யவேண்டும்.

குழந்தைகளின் வயத்திய எல்திரிசுத் பழுதான என்னவென்றால் குழந்தைக்கு முயற்சியானது தாய்ப்பால், அதற்கெடுத்த பவலிப்பால் தான். மேலெந்த பெட்டெண்டு ஆராய்ச்சியும் இவையாக வந்த திட்டமாய் எழுதினார்கள். இவ் வாய்வுகளாக ஆராய்ச்சி மாற்றி குழந்தை அமைவாயே ஸ்தாபித ஆராய்ச்சி கீழ்த்தல் கொடுக்கவேண்டும். அமைவாய் என்னும் கண்ணாடி மாற்றி மறுபடியும் பாலாவே கொடுக்கவேண்டும். தனிப்பால் அல்லது பந்துபாண்டம் மற்றபடி ஆராய்ச்சி என் 1 பாலுமாக வந்தால் அல்லது தனிவாய்ப்பாடு கொடுத்தாலும் இந்த விதார்ப்படி கொடுக்கவேண்டும். ஒரு வாய் முழுவதும் கொடுத்த ஆராய்ச்சி விதார்ப்படிப்பார்த்தால் 1 பாலம் பாலாக இருக்கவேண்டும்.

முதல் 10 வாய் முடியும் வரை ஆராய்ச்சி தனிப்பாலாகத்தான் இருக்கவேண்டும். 10 வாய்த்திருப்பின் முட்டைபின் மல்குள் ஒரு அரை மல்கு எடுத்த பாலில் வந்த ஒரு தடவை கொடுக்கவேண்டும். 12 வாய்த்திருப்பின் பால்சேர்த்தபடி 10 மல்கு, உருவாக்கிமுடிவாக வந்து அளித்த மல்கு. அதி குழம்பின் பிடிக்க 10 மல்கு கொட்டப்படப்பார்க்கு கொடுக்கவேண்டும். இவையிப்பின்னைகள் எல்லாருக்கும் இதை ஒரு வேளை ஆராய்ச்சி கொடுத்தவருக்குதான். பின்னும் ஒரு வாய் அல்லது நிற கொட்டி தண்ணீர் பாலில் வாய்க்கத்த கொடுக்கவேண்டும். பொதுவாக பார்த்தால் முக்கிய ஆராய்ச்சி இருக்கவேண்டும்.

இரண்டு வயதிலிருந்து வந்து பெந்த அமைக்கப்பட்ட சிறி, உருவாக்கிமுடிவாக ஒரு கொ ஆராய்ச்சி கொடுக்கவேண்டும்.

வாய் வயத முடியும் வரை பச்சையான கொடுக்கவேண்டும்.

உட்படி.

இது எவ்வித ஆராய்ச்சிக்கும் வேண்டிய ஒரு உணவுப்பொருள்.

சர்க்கரை.

இது கண்ணாடி உபயோகிக்கவேண்டிய ஒரு உணவுப்பொருள். இதை அனைத்துமிருகி உபயோகித்தால் வயற்றில் புளிப்பு, பொறுமல், அக்கினி மத்தம் உண்டாகி படியும் குன்றிப்போகும். சர்க்கரை வஸ்துக்களில் பிரியப்படும் குழந்தைக்கு கொழுப்பு, செய், வெண்ணைகள் பிரியமாய்வு. கவனிக்கவும். அதற்காக கட்டாயப்படுத்தவேண்டாம். அநேகம் குழந்தைகள் கொழுப்பு வஸ்துக்களில் பிரியப்படாதது அது ஒத்தக்கொண்டும் செய்வது.

பழச்சாறு.

ஆராய்ச்சிக்குப்பின் கொஞ்சம் பழச்சாறுகள் கிடைத்ததொடுத் தால் வலி. ஆரஞ்சுச்சாறு, ஆப்பின் பழச்சாறு, மாதளம்பழச்சாறு இவைகளில் ஒரு மல்கு எடுத்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்பும்படி செய்யவேண்டும்.

அம்மை குத்துதல்.

வைகுரியானது ஒரு கொடிய விவாதி. பின்னைகள் எல்லாருக்கும் நிறவயதினாலேயே முதல் 10 வாய்த்திருந்தால் அம்மைகுத்தியாகவேண்டும். விவாதியிலிருக்கும்பொது குத்தவேண்டாம். எகமாயிருக்குமாறு குத்த வேண்டியது மிக அவசியம். ஒருவருடைய ஜீவியகாலத்தில் 7 வருஷத் திற்கொருதடவைவாக 3 தடவை குத்திக்கொள்ளவேண்டும்.

Death Rate by small-pox.

வைகுரியால் மாணவிகித ஜாபிதா.

இதை முக்கியமாய் கவனிக்கவேண்டும்.

தேர்வாத பேதமையான ஜனங்களுக்கு சொல்லுவதேவேண்டும்.

100 வைகுரிகண்ட கேசில்,

அம்மை குத்தாததில் ...	...	...	35 மாணவ.
அம்மை குத்தியும் தழுப்பு இல்லாதவர்களில் ...	...	...	23 1/2 "
ஒரு தழுப்பின் குழந்தை ...	...	...	7 1/2 "
இரண்டு " ...	...	...	4 1/2 "
மூன்று " ...	...	...	2 "
கால தழுப்பின் குழந்தைகளில் ...	...	...	1 "

அதாவது 200 ரூபிள் ஒன்றாக மானக் கலாம். என்ன அதிகாரம் இது. இதை பெற்றிருக்கின்ற ரோம்பலும் எவ்வளவுக்குவதும்.

அம்மை குத்தி குழந்தைகள் ஜீவனத்திற்கும், காக்கு மெய்க்கார டாக்டர் மானம் கொடுத்த மானம் எவ்வளவு. உலகம் முழுவதும் புத்தகத்தை உலகம் புத்தகமாக.

ஆயிரம் எண்ணிக்கையில் டாக்டர் ஜெயன் 1749 ரூபிள் மோர் பிறந்தவர், 1786 ரூபிள் இதை எண்ணிக்கையில். அவர் மரித்தார் அவர் பெற்றிருந்த பூதப்படுத்தி. வைகுரியால் மானம் அமெரிக்கா தொலைந்தது.

இவ்வாறில் வட்டம் மானத்தில் 3141 வைகுரியால் மானம் உண்டாகிறது.

பின்பு அம்மை குத்தலதை வட்டாயம்பண்ணியின் 272 வீதம் வட்டம் மானமாகிறது.

பெர்லினில் (ஜெர்மனி) பலவிதமான கலாம் 1000 மானத்தில் 108 வீதம் வைகுரி மானம் இருந்தது.

ஜெர்மனியில் முழுவதும் வட்டத்தில் 3422 வைகுரி மானம்.

வட்டம் அம்மை குத்தலதை வட்டாயிந்தபின் 176 வீதம் வட்டம் வைகுரி மானமாகிறது.

ஆயிரம் டாக்டர் ஜெயன் வைகுரித் தூதராக வந்திருக்கிறார். அம்மை வைப்பதில் பயனுடைய வட்டம் ஜெர்மனிக்குள் மாறியமைப்பில் பத்திய உலகம் கிடைத்தது. டாக்டர் ஜெயன் ஒரு பெரிய விமோசனம் காட்டுகிறார். எவரும் மறக்கத்தக்கவன்.

நக்குவான்.


இது ஒருவருக்கு ஒரு பாக்டீரியா விவாதி. விவாதி யுள்ள பின்பு அம்மை விவாதிக்கும் பின்பு ஒருவருக்கு வட்டம் வட்டம். உடம்பித் தாக்கி உலகத்தில் இருமல் ஆகியிருக்கும். பின்பு என்னம் என்னமாம் அறிப்பதும்.

3 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ரோம்பலேசாய் தொற்றிக்கொள்ளும். 5 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வருவது அபாயம். 10 வயதிற்கு மேல் அமெரிக்கா வருவது உலகமும் 1 or 2 பெயருக்கு உலகம். பெண்ணுக்கு ஆண்களைவிட வேசாய் தொற்றிக்கொள்ளும். மொத்தத்தில் பார்த்தால் பெண்கள் தாக்கான் அதிகம். குப்பு முதலானவை ஆண்கள், முட்டை ஆண்கள் செய்து கொடுத்த உலகமும் உலகம் மிட்டாய்கள், பாக்டீரியா இவைகள் கொடுக்கவேண்டும்.

வெள்ளைப்பூண்டு சடு பாலில் போட்டு சற்றை அவித்த சாப்பிட வேண்டும். 1 or 2 பூண்டை வேசாய் வறுத்து அதன் காசமான காசை புடன் சாப்பிட்டு வரவேண்டும்.

குருமருத்துவத்தை தொண்டையின் வெளிப்புறத்திலும், கொஞ்சிலும் தேய் து வரவும். எப்போதும் அதை முகந்தொண்டிருக்கும்படி செய்ய வேண்டும். தொண்டைக்குள் தினம் 4 தடவைகள் ஒரு மருத்தை தடவ 10 தினத்தில் சமராகி வருகிறது. அது குருமருத்துவசாலையில் இருக்கிறது. எழுதிக்கொடுத்தும். வேறு உள் மருத்தானும் இருக்கிறது. முதிர்க்கொடுத்தும்.

மருத்துவ குறிப்புகள்.




செம்ப முட்டையை மூடி பத்திரப்படுத்தும்விதத்தைக் காட்டும் படம்.
முதல் படம் முதல் 10 இனத்திற்குள் இருக்கும் விதத்தைக் காட்டுகிறது.

2-வது படம் முதல் மாதத்தில் 3 பாகம் முடப்பட்டுப் பத்திரப்படுத்தி
கொடுக்கிறது.

3-வது படம் இரண்டாவது மாதத்தில் முழு வளம் அடைப்பட்டு பத்திர
படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. செம்பட்டையில் இடமிருக்கிறது.

முன்னாவது மாதத்தில் செம்பட்டை முழு வளம் அடையவில்லை என்பதைக்
காட்டும்.



செம்பட்டை 20 வாரங்கள் முட்டையின் மஞ்சள் கருபொலி மஞ்சள்
கருபொடியும், தண்ணீர்ப்பையும், கஞ்சுக்கொடியும், அந்தக்குதியாகத்
குழியாகவும், சிவவின் அங்கமும் உண்டாகிவிடுவதைக் காட்டுகிறது.



இது 25 வாரம் செம்பம் எப்படி உருவாகிவிட்டதென்று தவனியுக்கீன்.

Foetus.-சிக.

முதல் மாதம்: கன்னடி கொங்குபோன்ற வஸ்துவாகிவிருக்கும். சகல
தோற்றத்திலும் கொங்குபோலவே. இந்த காலத்தில் செம்பம் கலையும்
போது கண்பார்வைக்கு அகப்படாதபேரம்.

இரண்டாவது மாதம்: கருவானது 3 அல்லது 4 அங்குல நீளமுள்ள
தாய் கருண்டு மடிந்ததாய் 60 டிரெயின் நிறையுள்ளதாயிருக்கும். தலையும்,
கைகளும் தெளிவாய் தெரியும். கண்ணானது இரண்டாம் கருப்பு புள்ளி
வாய் தலையின் இருபக்கத்திலும் காணப்படும்.

மூன்றாவது மாதம்: கருவானது 2 1/2 அல்லது 3 1/2 அங்குல நீளமுள்ள
தாய் உடலிலிட தலையானது பெரிதாய், பெரும் கண்களாய், விரல்களெண்
பது தெளிவாய் தெரிகிறது. கழுத்தும் தலாம்பாறாய்த் தெரியும். கண்
கருமம், வாயும் மூடியிருக்கும்.

நான்காவது மாதம்: 6 அங்குல நீளம்; ஆண்-பெண் என்பது தெரி
யும், புனை மயிர்களை மயிர்கள் தலையிலும், கிரோத்குன் மற்ற பாகம்
களிலுமிருக்கும். செம்பம் கலந்து விழுந்தால் சிவவிற்கு சில மணிநேரம்
கண் உயிரிருக்கும்.

ஐந்தாவது மாதம்: 8 அல்லது 10 அங்குல நீளமிருக்கும்; தலையில்
அதிக மயிரிருக்கும்; விரலில் நகங்களுண்டாக ஆரம்பிக்கும். தோலெறுதி
வாய் உண்டாயிருக்கும். கிடை 10 அவுன்ஸ் இருக்கும்.


ஆறாவது மாதம்: கிடை 1 பவுன் இருக்கும். மயிர் கருப்பாகவும்,
கண் இமை மயிர்களும், புருவங்களும் உண்டாகிவிருக்கும். நகங்கள் விர
லின் துணிவரை வளர்ந்திருக்கும்.

ஏழாவது மாதம்: கிடை 2 அல்லது 3 அங்குல இருக்கும். நீளம்
13 அல்லது 15 அங்குலமிருக்கும். தோலில் பாலாடைபோல் ஒட்டியிருக்
கும்; அகற்சுப் பெயர் (Vernic Caseosa) இமைகள் திறக்கிருக்கும்.
குழாவது மாதம் கடைசி விசேஷமாகத்தான். அந்தக்காலத்தில் குழினை
பிறந்தவிட்டால் பிள்ளை உயிரோடு ஜீவிக் காரணங்கள் உண்டு.

எட்டாவது மாதம்: கிதை 5 அல்லது 5 பவுன் இருக்கும். கீசம் 18 அல்லது 18 அக்குவியுக்கும். கைகள் பூண்டாய் உண்டாகியிருக்கும்.

கிதை மாதத்தில்: கிதை 8 பவுன். கீசம் 18 அல்லது 20 அக்குவியுக்கும், கைகள் மயிர் தடிப்பமாகவும், கீசமாகவும், அடர்த்தியாகவுமிருக்கும். கிரேக்கத்தின் மயிர் மறையும். தடை எலும்பின் அடிப்பாதத்தில் 8 இரத்தெலும்பு எலும்பாக மாறும். இந்த ஒன்பதாவது மாதத்தில் இது தான் முதிர்வுக்கு வரும் குருத்தானது எலும்பாக மாறிறது. ஒன்பதாவது மாதத்திற்கு இது ஒர் முதிர்வுமான அடையாளம். இதை வரையும் கைகளிலும் படிவாக இருக்கும்.

மற்றவர்களைக்கொண்டு வெளிப்பார்வை, காது ஸ்பரிசு சோதனைகளால் அறியக்கூடிய குறிப்புகள்.



கண்ணாத்தித் தெரியும் குறிப்புகள்: வயருவது மாதத்திற்கு மாதம் பெரிதாகிவருவதோடு போகிறது. தலக்கமான மாதங்களில் வெளி ரேகைகளுக்கு புலப்படாமல் செற்பு தலக்கத்தின்வழியால் ரேகித்தாங்கியிருக்கின்றனவாம்.

பூக்குவது மாதக் கடைசியில்: மர்மந்தான எலும்புக்குமேல் எழுந்திருக்கிறது.

தாண்டுவது மாதக் கடைசியில்: பூட்டானது மர்மந்தான எலும்பிற்குமேல் பூண்டு விரைண்டவளவு மேலே எழும்பியிருக்கும்.

இந்தாவது மாதக் கடைசியில்: மர்மந்தான எலும்பிற்கும், தொப்பிக்கும் மத்தியில் கைகளாம்.

பூக்குவது மாதத்தில்: தொப்பிக்கு மேல் அல்லது தொப்பின் உயரம் இருக்கப்பார்க்கலாம்.


ஏழாவது மாதத்தில்: தொப்பிக்கு மேல் இரண்டு அக்குவியும் உயர எழும்பியிருக்கப் பார்க்கலாம். அப்போது தொப்பினானது பன்னமாய் இருப்பதற்குப் பதிலாக வெளியே தள்ளியிருக்கப் பார்க்கலாம்.

எட்டாவது மாதத்தில்: தொப்பிக்குமேல், தொப்பிக்கும் கெஞ்சு பன்னத்திற்கும் மத்தியாக இருக்கும்.


ஒன்பதாவது மாதத்தில்: பின்னும் பெருத்த செஞ்சுப்பன்னம் அது கெஞ்சுக்குழியை: பிரேவத்திற்கு 8, 10 கை வளை எழுப்பிக்கொட்டோபாய் செஞ்சுப்பன்னம்வளை எழும்பும் பின்பு பிரேவத்திற்கு 1 வ, 10 கைகளுக்குப்போது செற்புப்பையானது இறங்குகிறது. அதற்குக் காரணம் பிரேவத்திற்கு முன்னதாக எலும்புக்கிடும், மற்ற மெதுவான பக்கங்கொல்லாம் தளர்ச்சி கொடுக்கப்பெய்யாததான். இப்படி இறங்கினவுடன் அவளுக்கு உடம்பு வேராகவும், சற்று வற்றியிருக்கும்: கிதைந்த பையானது இனக்கமைய்த்தோணும். இது அவளுக்கே கவனித்தத்தக்கதாக இருக்கும். செற்புப்பையுள் குவித்துவிடும்.




எஞ்சானது தாலாய் வரும்போது தாலாயின் கத்தானை பக்கம் முலையம், கொடியின் பக்கம் அதாவது (மெல்லிய உழுவழுப்பான வெள்ளை இயங்குவருக்கும் பக்கம்) உள்ளாகவும் கத்திருக்கிறதை கவனியுங்கள். இப்படித்தான் வரவேண்டியது நியாயம்-கிரமம்.




இப்படி நொடியை பிடித்த இழுக்கெட்டாத. இப்படி இழுக்கும்போது நொடியும், சிவலின் பக்கமும் அல்லாத முன்கொல்லிய நொடிபாகம் நுண்ணுல் வெளியேறி வருகிறதை கவனிக்கும். இப்படி இழுக்கும் போது உதிரப்பெருத்த உண்டாகும். எப்படி அழுக்க பவமாய் ஒட்டி யிருக்காமாளுல் கவனமயத்தில் தொப்போக இழுப்பதி கத்ததை உறிஞ்சி இழுக்கும் தன்மையுண்டாகிவிடும். செதப்பவையும் உள் பாகம் வெளிப்புறமாய் இழுக்கப்பட்டு எப்போது புறணி பிதக்கி விடும். அல்லாத பணியைய உட்புறத்தை வெளிப்புறமாக புறப்பி ல்வதபோலாகிவிடும். இப்படி இழுக்கெட்டாத மோசம் போகும்.



முடிக்கால் உதயம்: அதை பிரப்பிக்கும் முறையும் காட்டுகிற படம் நலையை மேல்நோக்கிதள்ளி கால உதயபாகமாக இழுக்க முயல்வது



கால் உதயம்: அதை பிரப்பிக்கும் முறை.



கை உதயம்: முதுகு தாயின் முன்புறம், தலை தாயின் இடபுறம்.

இப்போது வலத்தை வெளியேறும். இதில் உ விதமுண்டு முதுகு தான் விரும்ப தலை இடபுறமாய் இருந்தால் இடத்தை வெளியே தள்ளி விடும். முதுகானது பின்பாகமாகிய இருந்து தலை வலப்புறமாயும், பின்பு இடபுறமாய் இருக்கிறதண்டு, அப்போது எப்படியிருக்கும் என்று கிரகணித் துக்கோள்ளவேண்டியது.



நக உதயம்: பிள்ளையின் முன்பக்கம் தாயின் முன்பக்கமாய், பிள்ளையின் தலை தாயின் வலப்பக்கம். இதில் பிள்ளையின் முதுகு பின்பக்கமாய் இருக்கிறது. முத்திரை படத்திலும் வலக்கை இதயம். தலையோ இடப்பக்கமாயும், வலப்பக்கமாயும் இருக்கிறது. சந்திர தானமாய் வலனிக்கவும்.



இதனால் இவ்வகட்டில் வேபரில் வேகு சாதாரணம். இது பிரசவ விதத்திற்கு படங்களைக் கவனிக்கவும். பிட்ட உதயம் தலையோ பிட்ட உதயமாகப் பிரசவிக்கிறது. பிட்டமே பிரசவிக்க முடியாது என்பதையும் கவனிக்கவும். பிரசவிக்கவேண்டும்.

Circulation of Blood in the Placenta.

நஞ்சின் ரத்த ஓட்டத்தைப்பற்றிய விபரம்.

செவின் சத்தமானது நஞ்சுக்கொடியின் சத்தக்குழாய்கள் வழியாக தாயின் சத்தத்தாடன் கலந்து நிரும்ப செவுக்கு வேண்டிய பேரவிப்புக்களை யெல்லாம் வாங்கிக்கொண்டு நஞ்சுக்கொடியின் கருப்பு சத்தக்குழாய்கள் (வெயின்) வழியாக செவுக்கு (செவின் தொப்பின்புறியாக) செல்லுகிறது. செவுக்கும் தாய்க்கும் நேரான சத்த ஓட்டமில்லை. செவின் கஞ்சிலுள்ள முளைகள் (Villi) தாயின் சத்தத்திற்குள் தன்னுள் துறைத்துக்கொண்டிருக்க அசைவழியாக சத்தம் செல்லுகிறது. இது எப்படியென்றால் குடல்வெளி வுள்ள சன்னமுளைகள் குடல்வெளி வுள்ள ஆகார துகளில் தன்னுள் கிணத்தக் கொண்டு சாரங்களை உறிக்கிறதோ அதைப்போலதான்.

அதில் உண்டாகும் மாறுதல்கள்.

நஞ்சின் மூலமாய் செவின் சத்தமானது பேரவிப்புக்களையும் பிரசவ வாயுக்களையும் பெற்றுக்கொண்டு சிறிது வஸ்துக்களையும், கரியமல வாயுக்களையும் கழித்துவிடுகிறது. நஞ்சின் சத்தமானது செவின் சிறிதுவஸ்துக்களையும், கரியமல வஸ்துக்களையும் பெற்றுக்கொண்டு தன்னிலுள்ள பேரவிப்பு வஸ்துக்களையும், "பிரசவ" வாயுக்களையும் இழந்துபோகிறது. ஆகவே தாய் தன்னிலுள்ள பிரசவவிக்களை செவுக்கு கொடுத்ததொன்றேயிருக்கிறது.

பூல் உற்பத்தி.

ஸ்திரீயின் பாலிலுள்ள வெண்ணை வஸ்து மார்பின் சதை அம்சக் களில் உட்கரும் மாறுதல்களினால் உண்டாகிறது. பாலில் உள்ள வெண்ணை சத்துக்கள் மாமிச அம்சத்தார்த்தங்களை சரப்பிடுவதால் உண்டாகிறதெயல் வாமல் அவன் சரப்பிடும் கொழுப்பு ஆகாரங்களுக்கு தக்கதாக உண்டாகிற நிலை. பாலின் ஊதந் நரம்புக்கள்களின் சத்திக்கு தக்கதாக இருக்கிறது. பாலின் அனலும்-அதன் குணமும் மன ஸ்திதிக்குத் தக்கதாகவும் தாய் சரப்பிட்ட ஆகாரத்திற்கு தக்கதாகவுமிருக்கிறது.

குருமருந்துகளை, எவத்திய துரிப்புகள் முற்றிற்று.

குருமருந்துகளின் ஜாபிதாவும், அட்டவணியும்.

—சுருஷம்—

1. குரு மாத்தினா இத ஓர் மகா சஞ்சீவி.

பெரியவர்களுக்கு: குரு மாத்தினையை உபயோகிக்கும் முறைகள் கீழ்க்கண்டிருக்கின்றன 1-12 பக்கத்தில் விவரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

- அத்தியாயம்: I. மலபத்தம் கீழ்.
- II. கெபேதிக்கு சர்ப்பிசம் முறைகள்.
 - III. சைவ ஜாத்தினாப்பற்றிய விவரம்.
 - IV. பித்தாம்பத்த ஜோகன். பக்கம் 5-6.
 - V. கைபத்தியகன். பக்கம் 6-7.
 - VI. சைவ வாய்வுகள்.
 - VII. மூலஜோகன்களுக்கு. பக்கம் 9.
 - VIII. மோகி விவாதிசுக்கு மாத்தினா பிரயோகம்.
 - IX. குருமாத்தினா கொடுக்கும்பொது கவனிக்கவேண்டிய விஷயங்கள்.
 - X. ஜன்னி 13, காதம் 80-க்கும். [விஷயங்கள்]

மலபத்தம்: (1) மலபத்தம். (2) ஜன்னி-வலிப்பு-சர்க்கார் கன்செர்வெட்டர்-தொகுதி-கொண்டிப்பு. (3) மத்தம்-மத்த வயற்றோட்டம்-மத்த ஜாஹ். (4) இலக்கிட்டு வாய்க்குள்ளிருக்கிறது. (5) சளி-இரு கன் ஜாத்திக்கு. (6) சைவ இருமலம்-சைவ கட்டி நித்திரிசென்ற ஜாத்திக்கு வாய்க்கும் குழைகளுக்கும். (7) கைபத்தியகன் இருமல் கட்டுப்பாடுக்கு. (8) சைவ ஜாத்தினாக்கு. (9) பெரியவர்களுக்கு. (10) கைப்பாணாக்கு. (11) சிவந்தாளுக்கு. (12) மோகிக்கு. (13) சைவமாத்தித்திற்கும் பக்குவகன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பக்கம் 13-17.

விதிகளுக்கு: குரு மாத்தினா. பக்கம் 17-20.

- (1) பிரேவலி. (2) கெப்பாந்திரிசுக்கு பொய்வலி. (3) பிரேவலி கெப்பாந்திரிசு கவனிக்கல். (4) பிரேவலி கெப்பாந்திரிசு காதல். (5) குலகிசன். (6) பாக்ஷி அரண் உண்டாக்கி காரம். (7) கயறு பழுத்தல். (8) கண்டெயி-மலபத்தவலி. (9) அநிச உதிரம்.

விஷயங்களுக்கு: குரு மாத்தினா பிரயோகம். பக்கம் 21-22.

சொல்ப அருமையான குணமுண்டு. அம்மருந்தின் விபரத்தில் சொல்லிய முறைப்படி செய்ய ஆசிரியமான குணமுண்டு. விஷயங்களுக்கு நித விஷயம் உள்சுக்கு கொடுத்த மத்த பக்குவகனும் சொல்ப குருமாத்தினையைப் போலவே குணமுண்டென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

மிருகங்களுக்கு: குரு மாத்தினா பிரயோகம். பக்கம் 22.

2. குரு தைலம். பக்கம் 23-26.

210 வியாதிகளுக்கு இது மகா சஞ்சீவியாய் விளங்குகிறது. புரீசு ரிஷிசனாலும், மகான்களாலும் புகழப்பட்டதும், பாடப்பட்டிருக்கிற துமான மகா மூலிகைகளாலும் தந்தால் 38 ரோப்பிய சாஸ்திர முறைப் படியுள்ள சில மருந்துகளுடனும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மகா சஞ்சீவி இதுவே.

ஜன்னி-13-வாத வகைகள் 80-சைவ வாய்வு ஜோகன்-சைவவித தலைவலி-தலைவாதம்-சைவ இடி-பிரடி இழுப்புடன்-மூத்தகால் வாத ஜோகன்-சைவ கணுக்களின் வியாதிகள்-பல் வலி-பல் அசைக்கம்-மத்தருகில்க்கும் இதுவே சஞ்சீவி. புத்தசம்பாடி உபயோகியுங்கள். ஸுணப்பொழுதில் குணத்தரும்.

தேன்கடி பறக்கும். சைவ சிவ விஷங்களும் குணமாகும்.

மொழி அடி-சைவ பிரட்டல்-சத்தக்கட்டுக்கும் அருமையானது.

எந்த வியாதிக்கும் இதை உபயோகியுங்கள் - குணமுண்டாகும். குரு முறைப்படி செய்யப்பட்டிருக்கிற தைலம், ஆசிரியமான குணங்கள் உண்டு. ஒரு தைலமும் இதற்கு நிகராகிறது.

3. குரு டைகர் மாத்தினா பக்கம் 27-30.

விஷபேதிக்கு சஞ்சீவி. சைவவிதமான வயற்றோட்டங்களும் உடனே கடிப்பதும். விஷபேதி காலங்களில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய ஆபத்து சஞ்சீவி. உடனே பிடிக்கும் கடிவுகூறும்.

4. மூக காப்பூர்த்து அரோசேமான்களுக்குள்ளது. அஜீரணம்-மத்தம்-வாய்வு பொருளம்-வயற்றோட்டம்-ஜலதோஷம் இவைகளை கண்டிக்கும். விஷபேதி காலங்களிலும்-குளிர காலங்களிலும் இது வைக்க மிகுந்தவேண்டிய மருந்து. ஒரு புட்டியைக்கொண்டு ஒரு பிஞ்சு பாட்டில் மூத்திராவகம் செய்துகொள்ளலாம். ஒரு பிஞ்சு புட்டி கடி தண்ணீரில் இத்த புட்டி சத்தை கலத்தவைக்க மூத்திராவகமாகி விடும். சாதாரண மூத்திராவகத்தைவிட மிகச்சிறந்தது. பக்கம் 31.

5. குரு பல்பொடி இதற்கு நிகரான பல்பொடி வேறு கிடையாது. உபயோகித்தால் அதன் உண்மை தெரியும். கமது வாயில் 28 விதமான பூச்சிகள் கட்டமாடக்கூடியதாக இருக்கிறது. அவைகள் எல்லா வற்றையும் கொல்லக்கூடிய மருந்தாகச் சேர்மானமாகியிருக்கிறது.

6. பல்வலி சோட்டு மருந்து பக்கம் 32.

7. குரு ஹெல்த் மாத்தினா Guru Health Pills பக்கம் 32-33.

அனை விட்டு சிவக்களுக்கு பக்குவகன், முறைகள். பக்கம், 33. சிவக்களுக்கு வாந்தி-சைவவித-சருகிசாதி-இவைகளுக்கு பக்குவகன். பக்கம் 34.

26. பீத்த மாத்ரீனா பச்சம் 51-52.

பித்தரோகத்தை உண்டாக்கும் - பித்தத்தை மலத்தில் கழிக்கும் - இராமாத்ரீனாயாக சாப்பிட்டால் அதிசூரியம் மலத்தையும், பித்தத்தையும் கழிக்கும். கெற்பஸ்திரீன் பிராவத்திக்கு 10 காசுகளுமுன் தினம் 1 வீதம் சாப்பிட்டுவந்தால் பிராவம் பெருகேகராக ஆகும். இவர்கள் ஒன்றுவிட்டு ஒருவர் இரவு சாப்பிடலாம் அல்லது காலைப் சாப்பிடலாம். வெறுவயற்றில் பிராவித்த பித்தமும் மலத்திற்காகவும், கெற்பஸ்திரீனாக உண்குதலத்தாலாகவும் 3, 5, 8, 11 காசுகளில் ஒன்ற சாப்பிட்டுவரவேண்டும். எல்லா ஜாதர்களிலும் மலத்திற்காக சாப்பிடலாம். மிக அருமையான மருந்து.

27. பீத்தகாந்தி தீராவகம் Liver Drops பச்சம் 53.

28. வயற்றங்குப்பு மருந்து பச்சம் 53.

29. மூலமுளை மருந்து பச்சம் 54.

இரத்த மூலம்-மீன் மூலம்-மூல அறிப்புடன் இதில் கொக்கும்.

30. மூல லேகியம் பச்சம் 54.

சகல மூல ரோகத்திற்கும் உன் மருந்து. மூல வல்லாதி என்று அழைக்கப்படும்.

31. ஜீவாட்சாமித்த லேகியம் பச்சம் 54-55.

மல சத்தியை கெடப்படுத்தாததற்கு இந்திய ராஜாக்கள் உபயோகித்த லேகியம். உங்கும் சத்தமாய் கெடப்படுத்தாமல் ஒரு தடவை சாப்பிட்டால் ஒரு தடவை மட்டுமே மலம் கழியும். இதை வாரம் திரும்பி தடவை ராஜாக்கள் உபயோகித்த வந்திருக்கிறார்கள். குடவகை சத்தப்பண்ணுதலில் இது உறு மருந்தாகும்.

32. ஆயுள்வேத லேகியம் பச்சம் 55.

சகல இருமல்-இரோப்பு-கெடுக்கலி-இதில் குணமாகும்.

33. ஆஸ்த்மா டிராபஸ் பச்சம் 56.

மந்தரரோகம்-இரோப்பு-இருமல்களுக்கு இது சஞ்சீவி. 2 மொண்டி மணிக் கொருகாள் சாப்பிட எவ்வளவு இரோப்புத் தீரும்.

34. ஆஸ்த்மா பவுடர் பச்சம் 56.

மந்தரரோகத்திற்கு புணர்ந்த மருந்து. இரோப்பு உடனே தீரும்.

35. காதவலி தைலம் அருமையான மருந்து. பச்சம் 56.

36. சார்பீன் பச்சம் 57.

சகல மலம்-மலத்தில் பி-அன் மாக இதைக்கு இதைப்போட்டு உன் சகமாகும்.

37. கனா வியாதிக்கு பலவிதமான மருந்தை இருக்கிறது. விபரங்கள் தேவை. கருத்து அறிந்துகொள்ளத்தக்கதாய், விபரமாய் எழுதவேண்டும். பச்சம் 57.

38. குரு ஸ்கானத் தைலம் பச்சம் 58.

39. மனோரமா கூந்தல் தைலம் பச்சம் 58.

40. மலையாளம் கூந்தல் தைலம் பச்சம் 58.

உத்தமக்கு இதைவிட மேலான தைலம் எங்கும் கிடைக்காது. இதை அறியவும். தினம் 1 or 2 டி காண்டி எண்ணையை நிலையில் கஞ்சுப் தேய்த்து பின்பு ஸ்கானம் பண்ணி வந்தால் கபால உஷ்ணத் போம். புத்திதீண்டையும் உண்டாகும். கண்ணுக்கு குளிர்த்தி உண்டாகும். காதமந்தம் போம். ஜலதோஷம், மூக்கு வரட்டு, காக்கு வரட்டு எல்லாம் சகமாகும்.

41. குரு மேகரணிக் கழிம்பு பச்சம் 59.

சகலமான மேகப்புண்கள்-காஷ்பட்ட புண்களுக்கு இது சஞ்சீவி.

42. குரு கழிம்பு பச்சம் 59.

சகல பற்றுகள்-படரும் பற்றுகள்-அறிப்புள்ள பற்றுகளுக்கு இதை விட மேலானது ஒன்றுமே கிடையாது. உபயோகித்தபின்பு அதன் குணத்தை தெரியப்படுத்துங்கள். மற்றக்கழிம்புகளைப்போல கிரோக வேண்டாம்.

43. சுகிரணிக் கழிம்பு பச்சம் 59.

சகல புண்கள்-செங்குகள்-காயங்களுக்கு அருமையான கழிம்பு.

44. தேள்கடி மருந்து தேள்கடி பறக்கும். பச்சம் 60.


45. குரு விஷமை பச்சம் 60.

சித்தர்களுக்கும், சிவபிரான்களும், கண்டிபிடிக்கப்பட்டு புஷ்பப்படுகிற விஷமை இதை உன்னுக்கு சாப்பிட சகல பாம்பின் விஷமும் எல்லா விஷக்கடிகளும் கெடப்படுத்தும் சஞ்சீவி.

46. மதுமேக நிவாரணி-கீழ்வி அபரோ.

Diabetico Abreka. பச்சம் 61.

6 வயதில் கீரில் போதும் சர்க்கரையானது கின்றுபோம். கீர் சர்க்கரையாகிவிடும். அனாயுசு குறையும். அருமையான குறை. உபயோகித்தபின்பு குளிரும். வியாதி தீரும்பு உண்டாகாதபடி எம்மை எம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ளவேண்டும்.



நருமருத்திகள்
 வினாபாதிச் சிறந்த பத்ருவிகள்.
 கலாநிபுடைய வைத்திய டிப்ளோமாபெற்றவர்
 லண்டன் ஹெமிக்கா கெமிக்ஸ் சொஸைட்டி
 மெம்பர் இரக்தம்

என்பவரால் செய்யப்படுகிறது.

இரண்டு தலைமுறையாய் ஐரோப்பிய வைத்திய
 பட்டம் பெற்றவர்கள்.

இக்க தலைமுறையாய் ஆஷ்வீதமுறை
 வைத்தியப் பண்டிதர்கள்.