

த.ப. 101698

புனைச்சொல்லுக்கான

புனானி வைத்திய

மருகல்

1952.

LD
N52
101698

யூனாணி வைத்திய முறைகள்.

அட்டவணை.

பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
1.	சிரசு சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	1
2.	சிரசு சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	27
3.	தாது சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	61
4.	பல்வேறு விஷயங்களுக்கு பல்வேறு விதிக்கைகள்.	98
5.	மூலத்திற்கு பல்வேறு பாகங்கள்	106
6.	சூர்த்து சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	115
7.	காச சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	118
8.	தோல் சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	125
9.	சிரசு சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	145
10.	தோல் சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	147
11.	சிரசு சம்பந்தப்பட்ட கோய்களுக்கு	166
12.	பல்வேறு கோய்களுக்கு	170
13.	கோய்களின் விசிறு அட்டவணை	276
14.	அளவு விளக்கம்	282



 * A. சே. ம. லே. க. *
 * செப்பனிடவதற்காக எடுத்தல் *
 * கொள்ளப்பட்ட *
 * மாதம் 6ம் வருடம் 1992 *
 * செப்பனிட முடிந்த *
 * மாதம் 6ம் வருடம் 1992 *
 * ராய்ச்சி உதவியாளர் *
 * கையொப்பம் *
 * 143 *

முருளி லக்ஷத்திய முனாக்கள்.

இக் து

அய்யம் பேட்டை

அப்துல் முஜாஹ் ஸாஹிபவர்களால்

பல உருது இதாபுகளி விருத்த

சேகரித்து, தமிழில்

மொழி பெயர்க்கப்பட்டதை

சென்னை, திருவள்ளூர்க்கேணி

உராஜி M. A. ஷாஹுல் ஹமீது & வன்ஸ்

அவர்களால்

தயாராக

ஷாஹுல் ஹமீது தியாயா பீஸில்

அச்சிடப்பட்டது

(நிழலிட எடுப்பு)

முதல் பதிப்பு.

1952.

[தமிழ்]

[க. 4]



Copyright, 1952, by
Hajee M. A. Shahul Hamood & Sons,
Publishers.

No part of this book may be reproduced in any manner whatsoever without written permission, except by a reviewer who may quote brief passages in a review to be printed in a Magazine or newspaper.

For information address

Hajee M. A. Shahul Hamood & Sons,
20, HIGH ROAD, TRIPPLICANE,
Madras 5.

3

யூனனி வைத்திய முறைகள்.

சிரசு சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு.

அனா தலைவலிக்கு

(1) இஞ்சி அல்லது சுக்கு இறை கொஞ்சம் ஜலத்தில் அரைத்து சாற்றை இரண்டு காசித் துவாரங்களிலும் மூம்மூண்ட துளி விடவும், முகத்தை சூரியனும் சேதிரில் வைத்து உட்காரசவும்.

(2) மரத்தில் தொங்கும் பழைவைக் கூட்டை கொண்டு வந்து தண்ணீர் கிட்டைத்து, தலைகில் மொத்தையாய் பூசிக் கொள்ளவும். பின்பு அந்த மருந்தையே 2, 3, துளி காசித் துவாரங்களில் போட்டதும் போடவும்.

(3) சுக்கு, ஆரணக்கச் செடியின் வேர், வென்லை சந்தனம் இம்மூன்றையும் தண்ணீரில் அரைத்து தலைகில் தடவவேண்டும்.

(4) எருக்கன் தலைகில் எண்ணெய்த் தடவி அணையில் வாட்டி பிழியவும், பிழியப்பட்ட சாற்றில் 2, 3, துளி எருக்கன் போட்டதும் தும்மல் ஏற்பட்டு வலி நீங்கும்.

(5) சீமை அழுவளி விதைகைய எண்ணெயினையில் வறுத்து அந்த எண்ணெயை தலைகில் தேய்த்து வெய்க்கில் சந்து போட உட்காரச வேண்டும். அல்லது அந்த எண்ணெய்க்கைய கொஞ்சம் இளஞ் சூடாக்கித் தேய்க்கலாம்.

மேற் சொன்ன விதை 11 மரவா (கிட்டத்தட்ட 1 கோலா) எடைக்கு எண்ணெய்க்கைய 5 செரில் எரித்து உபயோகிக்கவும்.

(6) குங்கமப்பூ, கொட்டமூந்து, வகைக்கு கொஞ்சம் எடுத்து கண்ணும் அரைத்து பொடி செய்யவும், அப்பொடியை 2 மரவா அனா தலைகில் தீரும்.

ஜலதோஷத்திற்கு

கைச்சாரம், கண்ணாம்பு இரண்டையும் தூள் செய்து கைகளை ஜலோய் முகந்தாற்றிவிட்டு கிணத்தில் ஜலதோஷம் அற்றுப்போகும்.

சூரியக்கு வலிமை

(1) சோலின் இரைச்சி இடைவிடாது சில நாட்கள் சாய்விட்டு வந்தால் சூரியனுக்கு சக்தி உண்டாகும், புத்தி நிலையாகும் அநிலகமும்.

(2) கெதாவி இரைச்சியும் சூரியச் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்வதில் இன்றியமையாததாகும்.

(3) குங்கம்பூ, உப்போகம் சூரியக்கு மனதிற்கும் பலததைத்தரத் தக்கதாகும். முகந்து வருவதாலும் அத்தனையை குணம் உண்டு. 1½ மாதம் முதல் கொண்டு 3½ மாதம் வரையில் குங்கம்பூ உட்கொள்ளலாம்.

(4) துடிமாவை தூள் 3½ மாதம் வரை தினசரி குங்கம்பூ குங்கம்பூ தின்று வந்தால் சூரியக்கு சக்தி ஏற்படும்.

(5) கறுப்பாட்டின் சூரிய செயலில் வறுத்த தலைமேலே வைக்கலாகும். இதனால் வருவது மட்டுமன்றி அந்த செயலை தலைக்கும் தொடரிக் கொண்டால் மேலே செயலாக சூரியமையும் மேலேக்கு மாகக்காக்கி விடும்.

சூரிய தலைவலிக்கு

கருவம்பிதின் 3 மாதம், 6 சந்தி குங்கம்பூ, அரிசி 1 மாதம் 7 சந்தி இம்முள்ளையையும் பன்றி விட்டதைத் தர்த்துப் போடலாம்.

மறதி

இந்த சோய் எப்பதென்பதில் கண்டுகூத்தல், தலை வருவதும் குக்கிக்குத் தர்த்து கொண்டு மிகுக்கும், தந்தினை அநிலகம் ஏற்படும், கைகளுக்கு உயிர் தீர் வந்தபடியாக இருக்கும்.

மாதவின் பாலையை வந்த மேலேயும் இத்தகு கை மருந்து வந்த தாளை 6 சந்தி வரை தினமும் உப்போகலாகும். மாதவின் மொலைய செயலுமுறையில் தக்கவைப்பது, துடிமாவை, குங்கம்பூ,

வகைக்கு 3 தோள் 2½ மாதம் வரை, விதை எடுத்த சீன திராட்சை 3 தோள் 4½ மாதம் வரை இவைகளை இடித்து 1 கோரி தோள், 5 மாதம் வரை யுள்ள நேரில் வேகவைத்த பொடி, மிகுக்கும், வளங்கப் பட்டை மஞ்ச கடுக்காய்த் தோள், வால் மீன், செல்லிச் சாய்த்தோள் வகைக்கு 7½ மாதம் இவைகளை எல்லாம் இடித்து வந்திசகாட்டு செய்து கல்ல நேரில் கலந்து கொள்ளலாம்.

காலையில் 3 மாதம் 6 சந்தி எடைவளவிற்கு சாப்பிட்டு வரலாம்.

உப்புக் கண்டம் அகந்து சூட்டின் வறுத்த இரைச்சி உபயோகிக்கலாம்.

தலைமேல் உண்டாகும் காயம், கொப்பளம்,

சொங்கு புண்களுக்கு

(1) கொட்டை முதல் செடியின் இலைகளின் துணியை கொண்டு வந்து அத்துடன் கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்து, பட்டு போல் அகற்றி புண்களின் மீது இலேசாய் தடவி வரலாம்.

(2) மீனகை எண்ணெயில் கரித்து சிம்மன் அதை வற்றும் அரைத்து பூசி வரலாம்.

(3) கயிர், மருதோல்தீர் தலை, ருத்தர் சிங்கு, மாதவன் பட்டை, மாசிக்காய் மஞ்சள், துங்கொண்டம் 10½ மாதம் வரை இவைகளைவரும் வற்றும் இடித்தபின் வந்திசகாட்டு செய்யலாம். வேண்டிமேழுறு 1½ தோள், கிஞ்சகி 6 தோள், கோதுமையை 6 தோள், இம்முள்ளையும் அடிப்பிசெற்றி உருகிய மேழுருடன் கலந்து கொண்டு அப்பால் மேற்சொன்ன சாக்குகளின் இடித்த துணியும் கலந்து, கவிம்பு ருபத்திற்கு கொண்டு வந்து தலைமேல் தடவி வர உபயோக சீர்தி விடும்.

(4) வந்தித்தகை விதைமேல் கொண்டு வந்து (சேர்த்துக் கருவையின் பட்டையிலுள்ள சதைவை அப்புறப்படுத்திய) வெறும் பட்டையின் அந்த விதைகளை சிறப்பி, ஜலத்தில் விதைகளை கழிந்த துணியை 2, 3, கற்றுக்காக அதன்மேல் கற்றி, சாமாது விடத்தின், 3 நாள் வரையில் வைத்திருக்கவும், 3 நாட்கள் கழிந்த பின் அந்த இரண்டையும் வற்றும் அகற்றி அப்படியே தலைமேல் வைத்து 3, 5, சாழிவை சேரம் வகையில் எட்டி விடலாம்.

தேவநகர வியாபார நிகழ்ச்சிகள்

இந்த நெருக்கடி கொண்டு கருவி விட்டும். ஒரு வருஷ 2 மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை வந்தால் பூங்காருமாம் அகலாய் பெற தர.

(5) மாதவன் பறந்தேரல், மலர், பூந்தாசினி, மஞ்சள், திணைக்காலம் போல் அகலத்தா பூங்காவின் மேல் பூசும்.

(6) குதிரைக் குளம்பை என்னென்னவோ கட்டித் தந்து அதை வண்டியைப் தடவ வேண்டும்.

(7) எட்டிக்கொட்டை, அழகானதை, சிவகம் இவற்றை எதையும் என்னென்றால் சரிதது, சென்னை வளவில் அகலத்தது, அதனை திரைக்காய் பூவின்தான் தலைவாங்குகிறது கன்னுண்டவர்க்கும், கசகண்டருக்கும்.

(8) கட்டு, அழகானதை கட்டித் தந்து மாதவன் கிணைக்கி கொடுத்த கன்னுய் போகச்சென்று கொன்னதும். மருகு கம்பி பிப்பா வாய் கன்னென்னையில் கசககி ஒருவாங்கி 2, 3 தடவை காயல் கன்னிப்பை பூசுகவரும்.

தலைவாங்கும் (கருவிருப்பாக்கு)

வெள்ளைச் சந்திரன் 9 மாதவன் பன்னிர் விட்டனதது கட்டகன் குருக்கலம்.

பறந்தேரல்

(1) இவர்கள் ஸ்பீ அளவன் கட்டிப்பெற்ற வந்த மாதவன் கொடுத்த கட்டித் தந்து மாதவன் கிணைக்கி கொடுத்த கன்னுய் போகச்சென்று கொன்னதும். மருகு கம்பி பிப்பா வாய் கன்னென்னையில் கசககி ஒருவாங்கி 2, 3 தடவை காயல் கன்னிப்பை பூசுகவரும்.

(2) மாதவன் பறந்தேரல், மலர், பூந்தாசினி, மஞ்சள், திணைக்காலம் போல் அகலத்தா பூங்காவின் மேல் பூசும்.

(3) குதிரைக் குளம்பை என்னென்னவோ கட்டித் தந்து அதை வண்டியைப் தடவ வேண்டும்.

விரை சமமத்தப்பட்டு நோய்களுக்கும்

நித்திரை விராதிருக்க

(1) மீனகை பகிவரின் கச்சலில் தேய்த்து காய்வு சமயம் கன்னிப்பையில் பூசு வந்தால் கித்திரை விராதிருக்க.

(2) மீனகு, கலதாபு, மஞ்சள், மருகை, இவற்றை கலக்கி கொள் போடச்சுந்தாபுல காய்ப்பட்டு வந்தால் காய்க் கட்டித் தந்து கித்திரைப்பைப் போகுகிறீர்கள்.

நித்திரை வருவதற்கு.

கல்லாத்து கிணை, தாமம், அரிணி ஒவ்வொன்றும் 2 மாதவன், இவற்றை கலக்கி கொள் போடச்சுந்தாபுல காய்ப்பட்டு வந்தால் காய்க் கட்டித் தந்து கித்திரைப்பைப் போகுகிறீர்கள்.

மூக்கு இரத்தத்திற்கு.

(1) கருவாக்கி சாணந்தைப் பிழ்த்து அதன் கிணைக்கி கொடுத்த கன்னுய் போகச்சென்று கொன்னதும். மருகு கம்பி பிப்பா வாய் கன்னென்னையில் கசககி ஒருவாங்கி 2, 3 தடவை காயல் கன்னிப்பை பூசுகவரும்.

(2) கருவாக்கி கருக்கி இரண்டு கிணைக்கி கொடுத்த கன்னுய் போகச்சென்று கொன்னதும். மருகு கம்பி பிப்பா வாய் கன்னென்னையில் கசககி ஒருவாங்கி 2, 3 தடவை காயல் கன்னிப்பை பூசுகவரும்.

சளி, ஜலதோஷம்.

கொடுக்கக் கட்டிக்கிணை. கலச்சாரம், இரண்டு கலக்கி 9 மாதவன், கக்கு 10 மாதவன், திராட்சைக்காயில் கலந்து அதன் கன்னுய் போகச்சென்று கொன்னதும். மருகு கம்பி பிப்பா வாய் கன்னென்னையில் கசககி ஒருவாங்கி 2, 3 தடவை காயல் கன்னிப்பை பூசுகவரும்.

தலைவாங்கும் (இரப்பல் கல்திணி)

மஞ்சள் கடுகாய்த்தேரல், எப்பிக்கெய் கலப்பு கொத்த மலர் கலக்கித் தோலா 1-இவற்றை கலக்கித் தந்து கிணைக்கி கொடுத்த கன்னுய் போகச்சென்று கொன்னதும். மருகு கம்பி பிப்பா வாய் கன்னென்னையில் கசககி ஒருவாங்கி 2, 3 தடவை காயல் கன்னிப்பை பூசுகவரும்.

தலைவலிக்கு ஆலிப் புனை மூலம் சிகிச்சை

செங்கல் அல்லது மண்கட்டியை கெழுப்பில் போட்டு சரிவான படி குடேற்றிக்கொள்ளவும். பற்கெழு மண்கட்டியிலே அல்லது செம்புச் சுட்டியிலே ஓரளவிற்கு இலம் வைத்தவும். இலச்சுட்டி தலைவலிக்காரருக்கெதிரில் கொண்டு வந்து வைத்ததும் அவரை உட்காரவைத்து போர்வையைக் கொண்டு (சுட்டி உள்பட) அவரை போர்த்து விடவும். இனி குடேற்றப்பட்ட கல்லைக் கொண்டு வந்து அந்த இலத்தில் வைக்க, குவிர் என ஆலி மிளம்பு மல்லவா? அதை சிறிது நேரம் போர்வைக்குள் நிறுக்குமாறு போர்வையை இலக்க முடிவிலேயே மட்டுமன்றி, கீயாடியைத் தொத்தில் அந்த ஆலிபடுமடியான ஓரளவிற்கு அவரை உட்கார வைத்து குவியச் செய்யவும், சிறிது நேரமழித்து போர்வையை எடுத்து விட்டு கியர்வையை துடைத்து விடவும். இப்போம், தலை வலி முதலியன சீங்கும். ஆலிபெடுத்தானதும் கோவாவி உடனே காற்றில் செல்லுகாது.

மூளைக்கு வலுவைவந்தரத்தக்க ஹரீரா (பாயாசம்)

(1) உறுத்தகொண்டகடலின் மேல் தேலி நீரில் பருப்பு திரம் 9 அரைத்து மாவாக்கிக் கொள்ளவும். அப்பாசி துடை 12 திரம் பாதாம் எண்ணெயில் வறுக்கவும். கொதுமை மாவு 2 திரம், கலகலா வெள்ளை 9 திரம், சேனி 4 திரம் எண்ணெய் செர்த்து பகம் பாலில் பாயாசம் காச்சி. பிச்சை 9 திரம் வெள்ளை தாலித்துக் கொள்ளவும்.

(2) மல்லி, கலகலாத்து விதை நலித் தலியே திரம் 1-ஐயம் விட்டதாறத்து, இலத்தாடல் வடிசட்டி, கொஞ்சம் சர்க்கரை, செர்த்து, இலகொல் விதை தோல 1 அடில் கலத்து பருவவும், சர்க்கரைக்கு பதின்ச பாமலா ஒப்பத்து 2 தோலா கலத்து உப்பு மெக்கலாம்.

நீர்ப்பிச்சை தலைவலிக்கு உதிகா.

கிப்பியை வடியில் இலுத்து இரண்டு காதுகளுக்கு இலும் பந்து போடவும். கதிரும், சர்க்கரம், பச்சை முதல் இரண்டு சர்க்கரையும் பச்சையில் அரைத்து திசு ஓலிகளை முயலில் விடவும்.

அண்ணாத்தலைவலிக்கு

(1) பூர்தி கொட்டலில் தேலி நண்ணீரில் காராய் கலந்து விழியவே அதை வரும். அதை வழித்து சற்று மூடாக்கி 24 அணி மாவாசில் எழில் வைத்து மூடவும்.

(2) பாலம், குடுவ்வைகள் குவித்த வாகனாவையும், காலக் குவிச்சி மூன்றோர் மூடாள் அத்தர் முதலிய வாகனாவையும் முறைத்து வாகனம் மூலாககு சத்தி மூட்டாகும்.

தலைவலிக்கு பல்வேறு சிகிச்சைகள் :—

(1) சோளம்பு எண்ணெயில் அலிசியை உறைத்த போடவும்.

(2) காலி சிகிச்சையை நாளாசிலோ அல்லது பன்னிலோ அரைத்து தடவ வேண்டும்.

(3) பொருளியை அரைத்து கெற்றியில் தடவியால், உஷ்ணத்தால் உண்டாகும் தலைவலி கிவர்த்தியாகும்.

(4) கலகல கொட்டை முத்து எண்ணெயில் உறைத்து தடவ குவிச்சியால் வரும் தலைவலி நீங்கும்.

(5) கொட்டை முத்து, சுக்கு, ஒமம் தண்ணீர் விட்ட உறைத்து, சற்று கொடுக்க வைத்து தடவவும்.

(6) பூரம் விழியை நண்ணீரில் அரைத்து உண்ண காலில் வறுதலியைப் போல் பூச சிலை தலைவலி நீங்கும்.

(7) ஆட்டில் எண்ணெய் தடவ, குவிச்சியால் உய்ப்பட்ட தலைவலி செளக்கியமாக விடும்.

(8) கட்டிப் புழுவின வச்சத்தைக் கொண்டு வந்து அதை எடுகுடல் செத்தவரைத்து பத்துப் போட கால் பட்டி அதை தலைவலி நீங்கும்.

(9) பாதாம் பருபவை கெடு எண்ணெயில் அரைத்து போடவும்.

(10) கிரிபிராசம், கொட்டை மாவாக்கு இரண்டையும் தண்ணீரில் அரைத்து தலைவலி பந்து போடவும்.

(12) இத்தகைய சோயு நிரல் 4. உண்டாகும் தான். நிரல் 5-ல் மூன்று கோர் துண்ணீரில் காய்ந்தி, குவாந்தில் ஒரு பாலு தண்ணீர் மீதில் விநாற்குழை போல ஆனது கடி கட்டி, அதில் 3 கோவர தேன் விட்டு கலக்கி சாப்பிட. வர்.

செவ்வாய்க்கிழமை 29.11.

[illegible]

சுபை உலகம் 1977

[illegible]

განმარტებული საზღვარი

[illegible]

(2.) உயர்வைத் தர வேண்டி இத்தேர்தல்களிலிருந்து பொய்ச்சிதை
 (3) தவிர்த்தல், சான்றிதழை அளித்தல் போன்ற சீர்திருத்த நடவடிக்கை
 எடுக்க வேண்டும். அத்துடன் தேர்தல் கமிட்டி சட்டங்கள், கமிஷனர்களால்
 நிறைவேற்ற சட்டம், இவ்விதமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால்
 கமிட்டி இவற்றைச் செயல்படுத்த, சற்று மந்திரிசை, உயர்வைத் தர (தேர்தல்
 சட்டம்) அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு இத்தேர்தல் வேண்டி

காங்கிரஸ் துண்டிதல் செய்து கொள்ள முன்வருகிறேன். காங்கிரஸ் கீழ்
பிரிவித்துவ கொள்கை இதைச் சோட்டா தடுத்தது. அதை இரண்டாம்
நேரம் காங்கிரஸ்.

(3) Chandrar Veng - Area - Area 20 Area 50
Chandrar Veng - Area - Area 20 Area 50
Chandrar Veng - Area - Area 20 Area 50

(4) மனது 7 மணிக்கு நேரத்தில் கிழக்கு கார்டர்
பார்க்கப்பட்டது.

(5) தன்தொகுப்புகள் செயலாளரின் தலை மேல் வைக்கப்படும்போதும், செயலாளர் தலைமையிலே நடைபெறும் போல் செய்துபோதும் தனிப் பள்ளவிற்கு மெனல் சொல்லப்படாது என்பது.

(6) பண்டைய பழங்கால கொஞ்சம் எதிர்த்து அடிதடி சிலை
தோல் திரிவதாக கூறுகிறது. காசித் துறையாளர்களில் அனைத்து மாவட்ட
கொஞ்சம் மீர் பிணங்குகள். இரண்டு மாவட்ட டிரைவ் துறையாளர்கள்.

(7) துணி 1 மீட்டர்கள், கம்பளத்து கிழை 1 மீட்டர்கள், பூக்காய் 1 மீட்டர்கள், இவற்றை அரைத்து கலந்து பரிமாசை மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை வாயில் அடக்கிச் சாப்பளவும்.

(3) சமுதாயப் பண்பாட்டை நுகர்வதில் விரிவாக்கம்
காண்பதில் சேலத்துப் பள்ளியில்

(9) உயிர் காப்பகம், வந்தவன் பூங்கா 2 இடை,
வா. 3 இடை இவ்வாறு இருக்கலாம்.

(10) சிவசுந்தரம் கவிதையை சொந்தம் காப்பதில் கவிதை
கிணறு சிறிது வறத்தது. துணியில் கட்டி, குடிசையில் போட்டு, குடிசை
கொண்டு போ.

(11) 1953-1954 1954-1955 1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 1959-1960 1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-222

(1) Official Confidential Secret Top Secret
 (2) Official Confidential Secret Top Secret

(13) ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-09-2001 BY SP-6 JAC/jac

காச்சாவும், அப்பால் உடனே கோமாளியைப் பெரிசெய்யவைப்போர்த்து புலக விடுக்கவும், ஜலதோஷம் பூவித்து விடும்.

(14) சுதிகரம் 6 மாஷா, குன்றுமணி வித்து 4 மாஷா, என்கு 2 மாஷா, கம்ச்சாரம் 1 மாஷா யாகந்தையும் இடித்துப் புதித்தும் மூக்குத்துப்போடவும் வழங்கி அளந்தருக உத்திராவும். இது அதிக காரமாயிருக்கும். ஆக்கிரித்து நூலில் கடித்து உபயோகம் செய்யும். காட்டு வாகைகள் வித்தை உண்டாய் அளந்தருக மூகா சலிபுறியும்.

மூக்கின் நூல் தாழ்த்திற்று.

(1) இது மூக்கைக் கெடுதலின் காரணத்தாலும் மூக்கினால் காய் மேற்படுவதைக் கெண்டும் ஏற்படுத்தாது. காயத்தால் ஏற்பட்டிருந்தால், காப்பு கரைக்காரியின் ஒரு துண்டைப் பிழித்து அதன் சாற்றை மூக்கிலிடவும்.

(2) கழுதையின் மூத்திரம் 1, 2 துணி மூக்கில் போடவும்.

காய் பழுது.

(1) காய் அளிகம் வகுதல் கூடாது. சுத்தந்தாபரண அளவிற்கு வகுதலின் பின்னே தேவ ஆரோக்கியத்திற்குரிய அறிவுப் பரக்கும் சிவச் சாறுகளை உபயோகிப்போம். எச்செய்க்கொத்தமல்லி தலைமுட்டை சந்தனத்தையும் மூக்கில் போட்டு உத்திராவும்.

(2) ஆட்டிசுதோஷ உரித்த தாபடமாய் மெருப்பினால் மெல்ல ஒரு ஓட்டில் வறுக்க அதிலிருந்து ஒருவித கசிய உண்டாகும். அதை கட்டுத்து சில கொட்டு காசியை விடவும். இது பால்களுக்கு உரிய தாமதமாகக் கல்லது.

இது கங்கு, திப்பிலி, காலிசி, தனித்தனியே ஒருதிரம், பனையம் மெல்லம் 24 திரம் கங்குமும் ஒன்றாக உயர்த்து பரத்திகா சா செய்து கொள்ளலாம். இரண்டு மாஷா அளவிற்கு இரண்டாய் உபயோகம். இரண்டு சுத்தந்தாபரணங்கள் ஒன்றுக் கொன்று மூத்திரம் அளவைத்துக் கொள்வதற்கும், சிவசமயம்மணித் தளரணி மூல் பருக்கையும் மூக்கிலிருந்து வெளி வருவதையும் இது கண்டுகொள்க.

(3) மூக்கிலிருந்து நூலாற்றம் வந்தால் மூகாவதான மூகாத்திரம் சாறாய் துவித்து கழுதையின் மூத்திரத் துளிகளில்

மூலம் சுத்தம் செய்யவும். இதற்கு ஜடாமாசியை அளந்தருக மூக்குத் துளரணங்களுக்குள் பூசவும்.

மூக்கின் வாட்டிக்கு

(1) இது உஷ்ணம் பித்தம் கம்பந்தமாக இருந்தால் மூக்கின் ஒருவித எரிச்சலைப் போன்ற உணர்ச்சி இருக்கும்; சித்திகா காலா, தாகம் அதிகம் இருக்கும். அப்போது பருப்புக் கிளையின் சாற்றில் பாதம் எண்ணெயைக் கலந்து மெத்தியில் பூசவும்.

கண் டோஷம்

கண்ணிமைகளில் தடிப்பும் சிவப்பும் ஏற்படுமளின் கோழி முட்டையின் வெள்ளைக் கருவு பருப்புக்கிளைய இலைச்சாறு கோஜா எண்ணெயில் சேர்த்து கண்ணிமைகளில் தடவி வந்தால் குணம் ஏற்பட்டு விடும்.

ரோகனேனாலு செய்யும் முறை.

முதல் சுவந்த கோஜாப்பருபம் 4 தோலா 8 மாஷா 2 ரத்தி எண்ணெய் 31 தோலா, 3 மாஷா திசுத இரண்டு சங்கு கிளையும் ஒரு சீசாவில் போட்டகடத்து 40 கான் வெய்யிலில் கைக்கவும். அல்லது, அரைப்பிடி கொண்ட புஷ்பத்தை ஒரு உயர்ச் ஜலத்தில் அடுப்பின் மேல் கொடுக்கவைக்கவும். அரைப்பரு ஜலம் கண்டிப்போனதும் அதை வடிக்கடி எண்ணெய் தனியே தனிப்போரும் களையில் கண்டவைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

கண் வலி.

வெள்ளை சிரசும், பருகாரம், இரண்டையும் இடித்து சேர்த்துக் கங்குமழையின் உட்சதை (செவ்வளை கழுவி, கழுவின ஜலத்தை இடித்திவிட்டு) புடன் சந்து பிளசுத்து, சுத்தமான கஸ்திரத்தில் முடித்து, அந்த முடிச்சை கண்ணின் மேல் சூத்திக்கொண்டிருக்கவும். இரவில் படுக்கும்போது அதைக் கண்ணின் மேல் வைத்தபடியே தூங்கவும், 3 தினத்திற்குள் வரகவே கண்கள் சௌக்கியப்பட்டு விடும்.

குணற்போன கண் பார்வைக்கு

கம்பாது கீழ் காட்கள் களையில் கலந்ததில் பின்னர் அதற்கு கம்பாது எண்டில் கலந்த முண்ணிலையைச் சேர்த்து காய் இடித்து

கமர் 3 தேவர் சாதனை புனைந்தவையெனப் போதிக்
கொண்டு வந்தால் முத்திலும் கண்பர்வை இழந்திருவருந்த
பர்வை சத்தியினாலும் அடைவப் பெற்றதாக ஸ்வராயப்பட்டுருத்
திருது.

எத்தனைகூட கண்ணியாநீயும் விராகலிருக்க.

(1) இரவு படுக்கைக்குப் போகும் சமயம் சோம்பு 7 மணி அங்கண்டு 7 மணி இடத்து நான் செய்து சாப்பிட்டு ஸ்தலம் எல்லாவித கண்ணோக்கங்களிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளுகிற அளவு சோம்பப்பட்டிருக்கிறது.

(2) வேளாண்மைத் துறை, தேய் இயல்பையும் கலக்கி இரவு பகல்வாங்கும் போதும் போது இரண்டு கவர்னிமென்ஸி ஹாட்ஸ் லாப்தால் ஏகன் வித கவர் வேளாண்மையும் நடுத்தர வரும்.

100-100000-100000

(1) சாதாரண சதுப்பு கல்மா 1 டோனா என்பதே பங்கு 1 டோனா, கிராம்பு 18, இதர வகையை 18, இயங்கப்படும் பள்ளிகளில் ஆகாதது கொள்ளப்படக்கூடிய ஆவணக்கு மாத்திரிகையாக உருட்டிக் கொள்ளவும். ஆவணமேன போன்ற கண்காணிப்புகளில் பூர்த்தி தகவல்களையாகவோ அல்லது ஆதிப்பு, கண்காணிப்பு வகுதல் குதலிய உபயோகத்தின் கண்டுபிடிக்கும்.

(2) வேளாண்மை உயிர் (உட்களை வேளாண்மை மற்றும், மஞ்சள்
 னாக்கிவிட்ட தக்கையினவிற்கு) மஞ்சள், இந்த 2 சரக்குகளையும், கண்
 றாய் அமைத்து தானாகக்கொண்டு அதனைக் கண்ணாண்டவர்களை
 பூசுவதும், இந்த பரணை சக்திவாய்ந்ததாயும், இவை இவை அனேகவித
 களை சேர்த்துக்கொள் திரைதும்.

(3) 7 வார்த்தைக்கு வெண்கொம்பு, வெண்கலங்கு, மதுரை, அரைத்த கொத்திலும், தலைமீட்டும் பூசலும். ஆகாசம், கோபுரம், கொட்டி, பம்பாய், ஜின்ஸ், பூசலும், சாகசலும், அலங்காரத்தின் மேல், மாத பாலி, இட்டு குடிசையும், பாதகம், பத்திரம், எடுக்கிதகம், சேவலும், கை பதகலை, சிகரம், கைகலம், பாதகம்.

(4) சமீபத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் தலைவர் பதவிக்கு வந்தபோது, இவருக்குப் பின்புள்ளவராக, கனகசபைத் தேர்வு செய்து, தலைவர் பதவிக்கு வந்தார். இவரின் தலைவர் பதவிக்கு வந்தார்.

44-38861-6

(3) 臺灣省立圖書館藏
臺灣省立圖書館藏

(2) மருத்து நுரிகையா தவிசின் கோழிக்குலையத்து கண்களின் மேல் காவத்து துணியினால் கட்டி, வளர்வதற்கு கவனமாக.

கனியாபாஸகம் + சிவபத் தரும

சூரதம்புரம் முன்பாக விட்டதைத் தம் மனப்போல்
கொள்கிற தீவிர பாரணை அகதி மிகுந்ததும்.

கனம் செட்டியங்குமார் எஃச் ச லுக்கும்.

24. 8. 1960 年 11 月 17 日 星期四 11:00 时 分 在 11:00 时 分 在 11:00 时 分

在 11:00 时 分 在 11:00 时 分 在 11:00 时 分 在 11:00 时 分 在 11:00 时 分

மாண்புமிகு உறுப்பினர் குறி

நாளைப்பகுதியி, நெல்லைச் சிறைக்கு, பத்துபத்து திரைகள்,
சுற்று, மீளாது உயர்வென்றும் விசும் காலம் சான்றிருக்கை கனகமும்
இப்பத்து காலத்திரைகளைச் செய்து இரண்டு பத்து காலம், காலம்
தேவியை கனகத்து நெல்லைக்கு.

(2) மீனாடி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, வேலூர், (கேரளம்) இவ்விடங்களில் தனித்தனியாக 1 திரை சந்திரனாகியே அமைந்தது, 1 திரை சந்திரனாகியே அமைந்தது கலந்து வந்தது என்பது.

Ref: 100-100000-100000

(1) அரசர் தம்பியாகிய பெரிய சேயுறு ஆயுத சாதல் துணை
பெரிய நன்மையே தருவிக்கெழுந்திருக்கலும், குடும்பமேயுடைய அந்நிலை
குத்துநூறு விதம் வந்துவந்தவை வெளிவரலும். அந்நிலை வந்து நூறுகளை வந்த
கூடல்களில் தடவி வரலும்.

சென்னை, 19.12.2019

(1) செய்துள்ள பங்களிப்புகள் கீழ்க்கண்டவற்றை (அ) (1) பகுதியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இவ்வாறு செய்யப்படுகின்றன.

குக்களும். அதிலிருந்து இரண்டொரு ஊனி கண்ணில் பட்டா உயம் பட்டும்.

(2) புலிய இலை, - காட்டுவாகை இலை, மஞ்சள், படிசாரம், வலகக்கு 1½ திரம் எல்லாம் இடித்து ஒரே முடிசலில் கட்டி ஜலத்தில் கலிசைத்து கண்களுக்குமேல் ஒத்தி ழுத்தி எடுக்கவும், அதன் கில் துளிகளை கண்களிலும் போடலாம்.

(3) வெள்ளை சீசகம், பொரித்த படிசாரம் ழுளவிற செடுத்த பட்டை உரித்த சேற்றுக் கற்றாழையின் துண்டென் பிசைத்து கண்டிரத்திரத்தில் முடிச்சிட்டு, தண்ணீரில் கலிசைத்து, ஒத்திவரவும்.

(4) அபிணி மாஷா 1, பொரித்த படிசாரம் மாஷா 2, புலியக் தலை மாஷா 10 எல்லாம் சன்னமாக அரைத்து முடிச்சிட்டு ஒத்தி வரவும்.

(5) வேப்பத்துறையை சசக்கி, அதன் சாற்றை காதில் பிழிய வும் ஒரு கண்ணில் வலிவிருத்தால் ஒரு காதிலும் இரண்டில் இருக் கால் 2 காதுகளிலும் சாற்றை 2, 3 ழுளி பிழியவும் தனிமே ஒரு கண்ணில் வலிவிருத்தால் வலது கண்ணிற்காக இடது காதிலும் இடது கண்ணிற்காக வலது காதிலும் சாற்றை பிழிய வேண்டும்.

(6) கண்வலி கண்டிதமே வலாததை தலைமுலை பிழித்து மேல் சொல்லிய படி காதில் பிழிய குணமெற்படும்.

(7) தேவ் வீக்கிய சேற்றுக் கற்றாழையை அரைத்து தூங்கப்போகும் சமயம் சாற்றை கண்ணில் சற்று பிழியவும்.

(8) மஞ்சளை தண்ணீரில் கவரால் அதைத்து வலது கண் ணிற்கு இடது காதிலும் இடது கண்ணிற்கு வலது காதிலும் சில சொட்டுகள் விடவும்.

(9) கதுமிச்சம் சாற்றை இரும்பு பாத்திரத்தில் போட்டு அதை இரும்புத் தடியால் கடைத்து அதற்குதேற்படும் கறுப்பு கிற் முள்ள பாகையை கண்களைச் சுற்றிலும் தடவ வேண்டும்.

(10) வேப்பத்தலை, கக்கு, கமரக்கட்டித்த இரண்டையும் கலித்தனியே அதைத்து அப்பால் இரண்டையும் சேரித்து கட்டைப் பரிமாணம் மாத்திரை கருட்டும் கொள்ளவும். தேவைவரான சமயம் ஒன்று மாத்திரைதான் தண்ணீரில் அரைத்து பதற் போடவும்.

(11) கருவப் சின் ஒரு போலா கரியோனம் போஷா இடித்ததைத்து சேற்றுக் கற்றாழைச் சாற்றில் கலந்து மேலே பூச வேண்டும்.

(12) கண்ணிமைகளின் துடிப்பிற்கு மருதம்பட்டை, தூதிக் காய் இத்த 2ம் சம்பங்கி எண்ணெயில்வைத்து கண்ணிமைகளில் பூசி வரவும்.

(13) கண்ணில் சந்தவளரிற்று விழியை மூடிக்கொண்டிருக் தால், பருத்தி வித்தின் மருப்பெடுத்து எண்ணெய் எடுத்துக் கொள்ளவும் கடல் துறை சாற்றியை 11½ தோலா எகாடயுள்ள எண்ணெயிற் சேத்து பூசி வரவேண்டும்.

(14) செவிக்காய் 7 மாஷாவை சுத்த ஜலத்தில் 2 ழுளி சேரம் வகையில் வலதவைத்த பின்பு அதை பிழித்து விட்டு அந்த ஜலத்தை 3 முறை கண்ணில் போட்டு வரவேண்டும்.

காது நோய்க்கு

(1) இஞ்சி சாறு, கல்லெண்ணை, தேன், கல்லாப்பு இவை களை நுளறும் கலந்து கொண்டு அடுப்பின் மேல் வைத்து இளஞ் சூட்டுடன் கூடிய துளிகளை காதில் விடவும்.

(2) பருத்த எருக்கன் இலையின் ஒருபக்கங்களிலும் கெய் தடவி இலைக்கு குறி வறியதும் அதை எடுத்து சசக்கி, இளஞ் சூட்டின் போதே இரண்டு துளிகள் காதில் விடவும்.

(3) கரியோனத்தை சம்பங்கி எண்ணெயில் கலக்கி சூட் டின் போதே காதில் சில துளிகளிடவும்.

(4) சுத்தமான தேனின், சில சொட்டுகள் காதில் விட்ட போதிலும் சீழ் வருதல் சின்று விடும்.

(5) மசில் திவகை இடித்துக் கொள்ளவும். கெய், காது விணந்து துலம் இவை வலகக்கு 1½ சேர் மாலற்றையும் அடுப்பின் மேலேற்றி எடுக்கவும். துலம் கண்டும் போய் தனியே வைலம் தங்கும் வகையில் எடுக்க வேண்டும். அச்சுதலத்தை துலி கணக் கில் சரதில் விட்டு வந்தால் வாய் வலி, குளிர்ச்சி மேல் ஏற்பட்டவகி கவரத்தியாகி விடும்.

(6) பச்சை மீனாகக் கொண்டு வந்து மெருப்பின் மேல் வைக்கவும். அப்போது அந்த மீனிலிருந்து ஒருவித வாதம் வெளிவரும். அதை எடுத்து 3 நாட்கள் வரை காதில் விட்டு வந்தால் காது வலி கண்டிப்பாய்த் தீரும்.

காது மத்தத்திற்கு

முலைப்பாலில் பூங்காங்கியைத் தேய்த்து காதில் இரண்டொரு துளி இடைவிடாது விட்டு வரவும்.

காதுக்குள்ளிருந்து புண், சீழ் வருவதற்கு

உருட்டன் கூடிய கதையை பூச்சி கால்சேர், கவத்தின் சென்னை அரைத்து அசற்கு சமனடையாக கல்லெண்ணெய் கலக்கவும். அப்பால் இந்த இரண்டிற்கும், 4 மடங்கு அதாவது 2 பேர் நுலத்தை ஊற்றி அடுப்பில் எரிச்சவும், ஜலம், கண்டிப்போலும் கண்ணெனைய எடுத்து காதில் துளித்துவிடக் விட்டு விடவும். (தண்ணீரைச் சேர்க்காமல் தனியே கல்லெண்ணெயிலும் உத்தரவை எரித்துப் போடலாம்)

காதில் பூச்சி துழைந்து போகுதல் அல்லது பூச்சி லிழுதலுக்கு

(1) கரியபொனத்தை அருளி இலைகளின் சாற்றில் இலுத்தி காதில் சில சொட்டுகளினை விட்டு வந்தால் சொந்தமாகி விடும்.

(2) மன்னங்கித்தனாழ்ச் சாறு 3 பங்கு, எண்ணெய் 1 பங்கு இரண்டையும் சேர்த்து காய்ச்சவும். தனியே எண்ணெய் தனித்தனியும் அதை எடுத்து வடிக்கடி காதில் சில துளிகள் விடவும்.

(3) ஜலதோஷத்தால் உண்டான காதுவலிதாக்குக்கும் குணம் தருமா:—சீமை அழுவணி விதை, வாதுகுலை ஜலம், சம அடை எண்ணெய்களில் காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.

(4) சீமை அழுவணி விதை, கக்கு இரண்டும் சமம் அடை அரைத்து மொத்தையாய் எடுத்து உடுகண்ணெயில் காய்ச்சி காதில் சில துளிகள் போடவும்.

(5) வேண்டர், கோபுரம் தாக்கி, காய் விளக்கம், அழுகு சாக் பிழங்கு, மஞ்சள், கண்டி மஞ்சள், சம்பாது விதை, அத்தி

விதை, சீமை அழுவணி விதை, கோங்காயம், கக்கு, மீனகு, கண்டிக்கு ஒரு திரம் எண்ணெய் சேர் 2, சமக்குகியாவும் இடித்து 3 சேர் நுலத்தில் இரவு முழுதும் ஊரவைத்து காதில் காய்ச்சவும், அப்பால் எண்ணெயையும் சேர்த்துக் காய்ச்சி, ஜலம் காயும் கண்டிப்போய் தனி எண்ணெய் தக்கி விட்டதும் அதை பெடுத்து காதில் துளித்துவிடக் போட்டு வரவும்.

(6) பூண்ட இடித்து, அதை மிழிந்து தனிச் சாற்றையே பிழிந்த கையுடன் காதில் விடவும்.

(7) பழுத்த கோப்பந்தை (கொஞ்சம் போல்) ஜலம், மஞ்சள் இம் குணமையும் பெண்ணெயின் மூத்திரத்தில் அதைத் துவித்துக் காதில் 2, 3 துளி விடவும்.

(8) மாதுலைச் சாற்றைப் பிழித்து நுடனோ காதில் குட்டென் போடலாம்.

(9) பால் குடிக்கும் குழந்தையின் மூத்திரமும் குட்டென் காதில் போட வலி உங்கும்.

(10) மலித உரோமத்தைச் சுட்ட சாம்பல் கோஜா எண்ணெயிற் கலந்து காதில் விடவும்.

(11) கொஞ்சம் போன்ற அவினியை மெருப்பில் எரித்து அதன் சாம்பலை 4 அறிவி எடை எடுத்து கோஜா எண்ணெயை கலந்து காதில் விடவும்.

(12) ஈ, உடைய எச்சத்தை கொஞ்சம் தண்ணீரில் தேய்த்து, தேய்த்த கிழிஷத்திலேயே காதில் விடவும்.

(13) ஸப்ஜா (தண்ணாம்பு பச்சை) இனியை பிழித்து காதில் சாற்காண்ட காது வலி தீரும்.

(14) பசுமாட்டின் பித்தத்தை காதில் கொஞ்சம் போல் பிழியவும்.

(15) தோழிமட்டையின் வெளிக் கருவை (முட்டை உடைந்தவுடன்) சில துளி போடவும்.

(16) கக்கு எண்ணெய் காதடைப்பை நீக்கும். பத்தத்தை கிவர்த்திக்கும்.

(17) காதில் உஷ்ணத்தால் ஏற்படும் வலிக்கு பருப்புக்கொயில் சாறு பிழிய குண மேற்படும்.

(18) வெள்ளைப் பூண்டில் ஆட்டுப் பித்தத்தைச் சேர்த்து எண்ணெயில் எரித்து தூவஞ் சூட்டுடன் காதில் சொட்டு விடவும். இது காதடைப்பைப் போக்கும்.

(19) செவியுறும் சக்தி குன்றிப் போவிருந்தால் ஓட்டையில் மூத்திரம் 2 சொட்டு விட கல்ல குணமளிக்கும்.

(20) புதிதாய் பறித்த சூரட்டிக்காயை கல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி அந்த எண்ணெயை 2, 3 துளி காதில் போடவும்.

(21) காதுக்குள் புண் உண்டாகி காதிக்குள்ளே சீழ்முதலியன வர ஆரம்பித்தால் உலர்ந்த மருத்துவலைக் கொண்டு சிகிச்சை செய்வது மேலாகும். அசல் தேயிலை காதில் துலித்துள்ளி விடுவதும் அல்லது திரியை தேனில் கலந்து காதில் வைப்பதும், காதில் உள்ள அசடுகளை வெளிப் படுத்திவிடும், வலியையும் கண்டிக்கும். வெப்பத்தையின் புகைப் பிடிப்பதும் காது அசடுகளை வெளிப் படுத்தி கரவை சுத்தப்படுத்தும்.

(22) வெங்காயச் சாற்றை முட்டையில் வெள்ளைக் கருவில் கலந்து போடவும்.

(23) வெப்பெண்ணையுடன் தேயிலைக்கலந்து திரியைகளைத்து காதில் வைக்கவும்.

(24) அப்போதே கறந்த ஆட்டுப் பாலில் சில துளிகள் காதிவிடவும்.

(25) ஆண்பிள்ளை மூத்திரத்தில் மாதாவாய் பழத் தோலை காய்ச்சி காதில் விடவும்.

(26) வெத்தயம், பாலில் நுகறவைத்து பிழித்து வடிக்கடி அந்தப் பாலில் காதிவிடவும். இது சீழ் போய்வதை கிழத்தி விடும்.

காதில் கிருமி உண்டாகுதல்

(1) சில சமயங்களில் ஆட்டின் நாரணமால் காதிக்கிருமிகள் உண்டாய் விடுகின்றன. அதற்குரிய சிகிச்சை—கரிய பொனம் தண்ணீரில் குழைத்து காதில் விட்டு சற்று நேரம் அப்படியே விட்டு வைத்தால் பூசிகளை மாண்டு விடும். அப்பால் தலைசாய்த்து காதினை துத்தனை வெளிப்படுத்தவும்.

(2) கஞ்சன் ஒருதுண்டு, தேயிலைத் தாம்பேப்பத்தையுஞ் சாறு கடுகெண்ணெயில் கலந்து எரிக்கவும், தனி எண்ணெய் கட்டிதும் 2 சொட்டு காதில் விடவும்.

(3) எண்ணெயை அல்லது வெங்காயச்சாறு தனித் தனியே காதில் துலித்துள்ளி விட்டபோதிலும் பூசிகளைக் கொத்து மெனக் கறப்பட்டுள்ளது.

(4) சாராயத்தின் துளி காதில் விட்டால் வலியை சீக்கி காதினுள்ள அசடுகள் யாவும் கிண்கி விடும்.

(5) காதில் அரிப்பு ஏற்படுவதற்கு—எண்ணெயும், காடியும் சேர்த்து காய்ச்சி காதில் சொட்டு விட அரிப்பு சீக்கும்.

வாய் நாற்றத்தைப் போக்க

(1) பொடிஞ் தண்ணீரைக்கொண்டு வாயைக் கொப்பளித்து வாய் நாற்றம் அற்றுப் போகும்.

(2) கந்தூர், கோஷ்டம், அநிமதிசம், செல்லிக்காய் வற்றல் இவைகளை அரைத்து துளக்கி ஒரு நெயர்த்தினைகளைக்கி கொள்ளவும், ஒருமாத்நினை ஐந்தில் போட்டுகலக்கி எங்கொப்பளிக்கவும்.

பல் நோய்க்கு

(1) பற்பொடி—கொட்டைப்பாக்கு, வெள்ளைக்கத்தையம், இத்துப்பி, ஒவ்வொன்றும் 1½ தோலா, மந்தகி 1½ தோலா, மிளகு ½ தோலா, கொட்டைப்பாக்கை மட்பாத்திரத்தில் போட்டு அரிப்பி செய்தி கண்ணூர் சுட்டு விடவும், பிறகு மேற்சொன்ன சாக்குகளையும் அத்துடன் கன்றும் அரைத்துக் கொள்ளவும்.

(2) மாசிக்கார, படிக்காரம் வகைக்கு 1½ தோலா, வெள்ளைக் கத்தையம், அத்தா, இத்த இரண்டும் தனித்தனி போஷா. ஐத்தத்தா அது சரிவெள்ளை யாகும் கரையில் போரித்துக் கொண்டு நெரு இதர எல்லா சாக்குகளையும் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும், பல்விளக்கினவுடனேயே வாயில் தண்ணீர் வாய்க் வேண்டாம்.

பல் இரத்தத்திற்கு

(1) பால் சாம்பிராணி, எரித்து அதன் பொடியுடன் எரித்த படிக்காரத்தோ சம அடைவாக கலந்து கொள்ளவும். அத்துடன்

ஒன்றிற்கு சாதாரண உபயோகம் அரைத்து சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

(2) நாய் விளக்கத்தை நீக்கி, வலியை விவர்த்தித்து பற்களைக் கெட்டிப்படுத்தும்:--

கக்கு, குரத்து சிவாவரை, வாய்க்கிளக்கம், கத்தகாம்பி, வரைக்கு தேவா 1½ சுத்தி செய்த துத்தம் மாஷா 5 வாஷத்தையும் பொதுவாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.

ஆறும் பல்வெட்டிப்பதும், வலி நீங்கும்

(1) போர்த்தபடிசாரம், சாதாரண உப்பு இரண்டையும் அரைத்து பல்விளக்கிவரவும்.

(2) வாய் விளக்கத்தை இடித்து துணியில் சிறிய முடிச் சாகக்கட்டி வலியுள்ள பல்லின் அடியில் வைத்து சுற்றுசொல் தவளிக் கொண்டிருக்கவும், உலிழை அவ்வப்போது துப்பி விட வேண்டும்.

பல்வலியை உடனே கண்டிக்கும்

திராட்சை 3 அல்லது 5 கொஞ்சம் பஞ்சில்வைத்து, தண்ணீரில் களைத்து அப்பால் அதை சுத்தம் செய்து வலியுள்ள பல்லின் கிழவைத்து அமுக்கவும்.

பல்பூச்சியை வெளியாக்கும்

(1) வாய் விளக்கத்தை இடித்து 5, 6, முடிச்சகனாசக்கட்டி தண்ணீரில் கொடுக்கவைக்கவும். ஒரு முடிச்சியின் ரூபி ஆறும் வரையில் அதை வலியுள்ள பல்லின் கிழவைத்து கடித்துக் கொண்டு இருக்கவும், ரூபி ஆறிலுடன் மற்றொரு முடிச்சை வைக்கவும், பூச்சிகள் அவற்றுள் வந்து விடும்.

(2) கத்தகாம்பிவைத்து கொஞ்சம் பஞ்சில்வைத்து வலியுள்ளவிடத்தில் வைக்கவும். இது இரப்பற்களின் மேல் படர்ந்த படிவாக்கியதைப்போல இருக்கவேண்டும், இந்திராவகம் காவை, வில் பற்களின் சக்தியை குறைவைக்குமா தலாந்தூக்கிவைதபாச உபயோகித்தல் அலாயசம்.

(3) அரிசி சுமர்சாத்தல் வலியுள்ள பல்லின் மீது வைக்க சொத்தாப்பற்றின பூச்சிகளைக் கொல்லும்.

(4) மிளகு, அப்பொலாசம், பெருங்காசம், பூண்டுநிலகு, உப்பு வள்ளம், சமசகட்ட அரைத்து, தேனில் மாத்திரைபாசம் கருட்டி கிழலில் உலர்த்திக்கொள்ளவும், அசுரிலயான பொது துரு மாத்திரை வலியுள்ள பல்வெட்டிவைத்து பல்லிழை அழுத்திக் கொள்ளவும்.

(5) எதுமிச்சம் நனுகலை இடித்து வலியுள்ள பற்களின் அடியில் வைத்து கடிக்க வலி விவர்த்தி வரவும்.

சது விக்ரமம் பல் வலிவந்திருக்கும்

(1) சுத்தி செய்த துத்தத்தை செய்கின்ற தானாக்கி தாக்கிதல் பொதுமைப் பெல் தடவவும், ஆனால் அதன் உரித்திருந்த கொண்டு கொண்டிருக்கும் இறங்காமலும் அல்லது தாதுகிதை உரிசாங்கலின் மேல் படர்ந்தும் பர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், உரித் திப் பூசாவையும் துப்பிவிட்டதற்குப்பின்னர் தாம்பூலம் அறுத்தலாம்

(2) கருஞ்சிவந்தா அரைத்து விளக்கியில் வைத்து வலியுள்ள விடத்தில் அடுவத்து வைக்க பல்பூச்சிகள் வராமற்போம்.

(3) குங்கிலம்பு, மாதாஸத்தோல், மாசிக்காய், முதல் இரண்டு சாக்குகளும் வரைக்கு தேசர், மாசிக்காய் சேர் 1, படிசாசம் 1 சேர், இதை 4 வரைக்கலையும் கல்லபடிபாச பொடி செய்து பற்களின்மேல் பூசவும். சது (சுறுத்து பந்தரினப்பட்டா ரூப்பின் வேறுபட்ட இகழ்ச்சும் மாதாஸபு இசுங்கரும் ஒன்றாகச்சேர்த்து கடிக்கி துங்கொரு இரவும் படுக்கைக்குச் செல்லுமுன் படுக்கையில் கிதிது சேரம் அழுத்திவைத்திருந்து துப்பிகிட்டப்படுக்கவும்.

(4) நாகனியிருத்து இரத்தம் கத்தால் மாசிக்காய், கருவப்பி சிஸ், கள்ளர் படிசாசம் சமசகட்ட எடுத்து தானாக்கி பற்களை துலக்கிவரவும்.

(5) மாதாஸ்சாம்கிரகனியை இடித்து வெங்காயச்சுத்தும் தேனிலுள் கிடைத்து சதுகனில் தேய்த்து வர இரத்தம் கருவத்தை கிழத்திவிடும்.

(6) அரைந்த பஞ்சன் துணை துணித்துய் பெளதில் கட்டி வரவதாய்க்க பல்லின் கிழவைத்துக்கடிக்க வலி நீங்கும்.

(7) தானி தூசை, மிளகு இரண்டையும் அரைத்து மேற் சொல்லியபடி செய்யவும்.

(8) அத்திப்பாலை பஞ்சில் கலந்து பல்வலிக்கு வைக்கலாம்.

(9) இங்கோல் விதைகளை காடியில் உறைவைத்து அமுக்க வலி விலக்கும்.

(10) செங்காயம், கருஞ்சிவகம் இரண்டையும் உக்கரலில் வைத்து சுருட்டைப்போல் புதை இழுத்துக் குடிக்கவும், வாயிலிருந்து கசிவுதீர் வவா துப்பிவிடவும்.

(11) அக்கிராகாரம், குமரகந்தகி இரண்டுடன் கொஞ்சம் தேன் மெழுகைக் கலந்து சுட்டியவளிற்கு மாந்திரை செய்து பல்வலிக்கைத்து உமிழுதுப்பி விடவும்.

(12) உலர்த்த கண்டங்கந்திரியை தறுக்காரியின் வைத்து புதைஇழுத்து அதை சற்று கெரம் வாயிலிடக்கவும்.

(13) வேலகாரத்துடன் மெழுகுடன் கலந்து பூச்சியின் பல் இடுக்குகளில் வைக்க அது சம்பந்தமானபல் வலியை சிலந்திக்கும்.

(14) புதைகிலை இரண்டு பங்கு, மிளகு ஒருபங்கு இரண்டையும் அரைத்து பல்லுக்கு தேய்க்கவும், குளிர்ச்சியின் மேசேற் பட்ட வலிசொஸ்தமாகும்.

(15) சுத்தி செய்த படிக்காரம் ஒருபங்கு, தாத்தம் 3 பங்கு கத்தகம்பு 1½ பங்கு இவற்றை இடித்து வஸ்திரகாயத்து செய்து பற்பொடியாக உபயோகிக்கவும்.

(16) கொட்டைப்பாக்கு செங்கொட்டை மாசிக்காய் இவ்வுருத்தையும் களையும் கொடியில் சுட்டு பற்பொடியையப் போன் இலை காய் தேய்க்கவும். எச்சில் துறைவாணமாய் வெளிவரும், வலி உடனே தீங்கி விடும்.

தேவத்தின் பேசில் உண்டாகும் பல்வலிக்கு :—

(17) சுக்கு, மஞ்சள், இந்துப்பு, மிளகு, மூக்குநீர்வை வஸ்தாய் சமளடை அரைத்து வலியுள்ள பற்களின் மேல் தேய்த்து, உமிழை துப்பிக்கொண்டிருக்கவும், ஒருமணி கோந்தித்துப்பின் தாமழும் அருந்தவும்.

(18) படிக்காரம் 2 திரம், உப்பு 1 திரம் இரண்டையும் அரைத்து தேய்க்கவும்.

பல் இரத்தத்தை நீறுத்தும் :—

(19) கோய்யா விதைகளை எரித்து அதன் கரியை அரைத்து தேய்க்கவும்.

(20) ஜடாமாசியை அரைத்து அதன் துளை பற்களின்மேல் தேய்த்துவா சமுகன் கெட்டிப்படும், வாய் உலர்ந்ததைப் போக்கும்.

(21) வானப் பிசினுடன் மிளகையும் சேர்த்தவைத்து பல் திட்டிவா பற்கள் கெட்டிப்படும்; பல்வலி விலக்கும்.

(22) சம்பங்கேத்தலை, ஒருபடி, சீமை அறுவலி விதை 1½ தோலா, 1 சேர் தண்ணீரில் கொதிக்க வைக்கவும், 4 சேர் கண்டி, 4 சேர் அளவிற்கு மீதியாகிருக்கும் போது அரைக்கொண்டு வாய்க் கொப்பளிக்கவும்.

எலுகளில் சிழ் வறுத்து

(1) படிக்காரம், பாசிக்காய் இரண்டையும் ஜலத்தின் கள்ளும் கொதிக்க வைத்து கொப்பளிக்கவும்.

(2) கவுக்கு மாத்தின் காய்சலி ஜலத்தில் கொதிக்க வைத்து வாய் கொப்பளித்தால் வலி விலத்தியாகும்.

(3) காகசொசிலி, மகளிம்பட்டை இவைகளையும் தனித் தனியே தண்ணீரில் கொதிக்கவைத்து கொப்பளித்தால் பல் உபாலை தீக்கும்.

உறுவீக்கம், பல்வலி சேர்த்துப் போல் சொஸ்தமாகும்

மஞ்சள், கடுக்காய்த்தோல், மல்லி, சீமை அறுவலி விதை வகைக்கு 2 மிள்கால் எடை பொஸ்தகா தோல் 2- ஓரம் 3 திரம் அரைச்சேர் தண்ணீரில் எரித்து அரைவாசி காய்வுப்போன போது அதை இடுக்கி கொண்டு வாய் கொப்பளிக்க கொண்டும்.

இருமலுக்கு:—

(1) காக்கடா சிந்து இரத்தம் சலித்து, மிளகு அளவிற்கு மாத்திரைச் செய்து ஒரு மாத்திரை வாயில் அடக்கிக் கொள்ளவும். இது உபசம்பந்தமான இருமல்க் கண்டிக்கும்.

(2) ஆதிமதுரம், பாதாம் மரின், கிஷ்கந்தா (கோதுமைமா) கக்கன்டு எல்லாம் சமளடை, அறைத்து கடலையளவிற்கு மாத்திரிகைச் செய்து வாயில் அடக்கிக் கொள்ளவும்.

(3) மிளகு, சர்க்கரம், வறுத்த கொண்டம் கடலையளவிற்கு எல்லாம் சமளடை எடுத்துக்கொண்டு, இஞ்சி சாற்றில் மாத்திரிகைகள் செய்து கொள்ளவும்.

(4) குரோவாத்தில் இருமலைப் போக்கும்:—மஞ்சள் திரம்—1, வெள்ளை சர்க்கரம் திரம்: 2 இடித்துச் சலித்தும் கலவைத் திரைத்து சிறிய இலகைப்பழம் அளவிற்கு மாத்திரிகைகள் உருட்டி வாயிலும், மாலையிலும் ஒரு மாத்திரிகை உட்கொள்ளவும்.

(5) மிளகு, காக்கடாசிற்கு, கிரம்பு, படிக்காரம், கடுக்காய்த் தோல், இத்துப்பு எல்லாம் சமளடை பெடுத்து அதற்குச் சமளடையாக கக்குத்துவைச் சேர்த்து, அறுமிச்சஞ் சாற்றில் செவ்வனே அறைத்து, சிறிய இலகைப் பழம் அளவிற்கு மாத்திரிகை தயாரித்து படுக்கைக்குச் செல்லும் போது ஒன்று அல்லது இரண்டு மாத்திரிகைகள் விழுங்கிக்கொள்ளவும்.

(6) சிறுவர்களின் கபந்தோடுங் கடடிய இருமதுக்கு:—வெள்ளைக் காரம் வறுத்து அதற்குச் சமளடையாக மிளகு தூவாச்சேர்த்து, சேத்துக் கஞ்சுழையின் சாற்றில் அறைத்து, கடலைப்பரிமாணம் மாத்திரிகைகள் தயாரித்துக் கொடுக்கவும்.

(7) மஞ்சள், கடுக்காய்தோல், காக்கடா சிக்கு, மிளகு அரிமதுரம், சமளடை அறைத்து கடலையளவிற்கு மாத்திரிகைகள் உருட்டி வாயில் அடக்கிக் கொள்ளவும்.

(8) வறுத்த கல்கலாவை அறைத்து அதனுடன் கொஞ்சம் இத்துப்பும் மிளகும் சேர்த்து, ஒரு மாஷா அளவிற்கு, கான்—1க்கு மூன்று வேளை சாப்பிட்டு வாயும்.

(9) ஆதிமதுரம், மிளகு, வறுத்து அதற்குச் சமளடையாக கக்கன்டையும் சேர்த்து வைத்து, கடலையளவிற்கு மாத்திரிகைகள் தயாரித்து, இரண்டு இரண்டு மாத்திரிகைகள் உட்கொள்ளவும்.

(10) காயத்த காயை இலையை எரித்து அதன் சாம்பலுடன் கொஞ்சம் உப்பையும் அறைத்துச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். கான் மூன்று சில தடவை உபயோகிக்க இருமலைப் போக்கும்.

(11) காக்கடாசின் எச்சத்தை மிதையதோர் பையில் போட்டு முடிச்சாகக் கடடி, சிறுவர்கள் எழுந்தில் கடடிக் கொடுக்கிடவும். இது சிறுவர்களின் இருமலை அளவியும் கண்டிக்குமென உபயோகிக்குமாறு.

(12) இருமதுக்கு பாயாசம்:—கோதுமை உயி நண்ணீரில் வறுத்துப் பிஸைத்து அதில் அறைத்த பாதம் கிஷ்கந்தா, சிலிரெல்லம் ஒன்றும்ச் சேர்த்து பாயாசம் தயாரித்து, உட்கொள்ளவும்.

(13) மாஷாத்தோல்; (சீமைமாஷா சமளடைத்தால் மேலாகும்.) இவ்வேலைக் காக்கடாசிற்கு தனிமே தோலாது, இத்துப்பு தோலாது, கடுக்காய்த் தோல் தோலாது எல்லாம் அறைத்து கான் திரையாக் செய்து கான் 1க்கு பலதடவை புசித்துவரவும்.

(14) கடுகு அறைத்து தேனில் குழைத்து, காகடின் தடவி விடவும்.

(15) சிறுவர்களின் கப சம்மந்தமுள்ள இருமதுக்கும் காகடாபாச சபத்தத்துக்கும்; காக்கடாசிற்கு அறைத்து தேனில் அறை குழைத்துவாயில் தடவி விழுங்கச் செய்யவும்.

மருத்தின் அளவு பிராயத்திற் வேறுபடாது.

(16) கிஷ்கந்தா, காக்கடாசிற்கு; அரிசித்திப்பிலி இம் குழைதும் மூன் போல் செய்யவும்.

(17) கோவைச் சிதறாது; அரிமதுரம்; இரண்டையும், அறைத்து கொஞ்சம் தேனில் கலந்துக் கொடுக்கவும். சிறுவர்களுக்கு கொஞ்சம் தாய்ப்பால் குழைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(18) இருமதுக்கு கஷாயம்:—காஷாயம் மிளகால் 1—சோம்பு திரம் 1—அரிமதுரம் திரம் 4—போல்தா—1 பெரிசு கருவளி திரம் 1 கிள திரையை 11—கக்கன்டைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.

(19) கோதுமை திரம் 4— 1 சேர் ஐந்தில் கொதிக்க வைத்து, அதில் இத்துப்பு இரண்டொரு மாஷா போடவும். குழையில் இரண்டு பங்கு ஐதம் கண்டி விட்டப் பிறகு கடி கடடிக் குடிக்கவும். ஒரு வாரத்தில் இருமல் கிளத்தியாகும்.

(20) கிஷ்கந்தாத்தின் பெரிசு உண்டாது இருமதுக்கு போல்தாவை அதன் கான்மீலித்து சுத்தப்படுத்தி காகாது உருப்

படி எடுத்துக் கொள்ளவும்- இத்துப்பு மாஷா 2-இரண்டுகால் ஆமாக்கு ஜலத்தில் காய்ச்சவும். மூன்றில்லொருபங்கு ஜலம் அளவு வந்ததும் அதை எடுத்துப் பிழிந்து வடிசட்டிக் கொள்ளவும்.

இரவு படுக்கைக்குப் போகுமுன் குடித்துக்கொள்க.

இருமலுக்குச் சூணம்:—

(1) கடுகாயத் தோல்; தாவிக்காய்; செல்மி வத்தல்; இத் துப்பு; மாலுனத் தோல்; இவை யாவும் சம எடை. அரிசித்திப் பிலி; மினு; ஒவ்வொன்றும் அரை பாகம்—காலை, மாலை ஒரு மாஷா உட்கொள்ள மூன்று காலில் இருமல் சொந்தமாகும்.

(2) அக்கிராகாயம் மிளகு, மாலுனத்தோல் அசந்தா மூலம், மூலத்தில் தலை, கருவேலன் பட்டை, கல்லுப்பு, சாம்பர் உப்பு, வரைக்கு ஒவ்வொரு டாஸ்க் அபினி மாஷா, 2-எல்லாவற்றையும் மூன்றாய் அரைத்து இஞ்சி சாற்றில் கட்டிப் பரிமாணம் மாத்திரை செய்து வாயில் வைத்து சப்பித்தபடியே அதன் சத்தை விழுங்கி விடவும். உஷணம், குளிர்ச்சி இரண்டித்குரிய இருமலும் சிவா சணமாகும்.

குழந்தைகளின் கவரக தோய்க்கு

(1) கருவேலன் பிசின் தோலா 1 கிரியபோளம் மாஷா-1 இரண்டையும் அரைத்து, சோற்றாக் சற்றுமூசு சாற்றில் கலந்து, கொஞ்சின் மேல் பற்று போடவும்.

(2) மலாசா எருக்கன் அரும்பு சேர் $\frac{1}{2}$ மூலம் சேர் $\frac{1}{2}$, வெண் ணம் சேர் $\frac{1}{2}$ எல்லாவற்றையும் அரைத்து, கிழலில் உர்த்தி காலை யில் ஒரு பிடி தின்னவும். பத்தியம்:—வரவு பதாந்தல்கன், புளிப்பு, உடாது. இருமல் மட்டுமன்றி மார்பு உபாதைகள் பெரும் பாதுகா கிவர்த்தியாய் விடும்.

(3) ஆட்டுக் கிட்னியின் கொழுப்பு, சம்பங்கி கனகனெய், சம்பங்கி எடையில் எடுத்து கொருப்பின் மேலேற்றி சத்து காய்ச்சி மாசின் மேல் தேய்க்கவும். கொஞ்சடைப்பை நீக்கி உன்லின் கோழை வயத்தை இருமல் மூலம் வெளிப்படுத்தி விடும்.


(4) காட்டுப்பு புழுவைச் சுட்டி அதன் எலும்புகளில் சாம்பலை 2 மாத்திரை கொண்ட அளவிற்கு தாம்பூலத்துடன் அரைத்தவும்.

(5) மாலுனம் பழத்தோல் 3 பங்கு- சுக்கு 2 பங்கு, கல் லுப்பு 1 பங்கு எல்லாம் அரைத்து தாளாக்கி, வேளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தின்னவும்.

சரீர சம்மத்தப்பட்ட தோய்கள் முற்றம்.



சரீர சம்மத்தப்பட்ட தோய்களுக்கு



தெஞ்சுவலி, முதுகு வலி, விலாபக்க வலி, வாயுவலி, வாதம் முதலிய வியாதிகளுக்கு

(1) குளிர்ச்சியின் பேரில் உற்பட்ட வலிக்கு சாம்பிராணியை தண்ணீரில் அரைத்து வலியுள்ள மிடத்தில் சூசி ஒற்றடம் கொடுக்கவும்.

(2) முட்டையின் வெள்ளைக் கரு; தேன் தோலா 1½; வெண் காயச் சாறு தோலா 1½ வெந்தயம் வரையைத்த நீர் தோலா 1½ எல்லாம் சேர்த்துக் குடித்துவா இருதய வலி திரும்.

(3) வரலுருகை; வரலித்தகரை விதை கார் போர் அரிசி தலையே முட்டையுடன் வரலுன் விதை மூன்றுக்கும் சம எடை ஒவ்வொன்றையும் சுத்தமாக கொடுத்து ஒன்றாய்க் கலந்து, இடிக் காமலேயே அதிகாலையில் ஒரு கைப்பிடி ஜலத்துடன் தின்னவும். தாது விர்த்திக்கும் இது சிறந்தது. ஆனால் அதற்காக காட்டு சோதனை மட்டும் சேர்க்க வேண்டாம்.

வாயிற்றுக் கட்டிக்கு

(1) செல்லிக்காய் கந்தகம் 4 ரத்தி எடை தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கவும், ஆனால் ஆரம்பிக்க வேண்டிய விதம் யாதெனில் முதல் முதல் ஒரு ரத்தியி லிருந்து ஆரம்பிக்கவும். சிறுசுச் சிறுசு அதிகரித்துக் கொண்டு போகவும். ஆனால் 4 ரத்தி அளவுக்கு மேற்பட்டு உபயோகிக்க வேண்டாம். அதுவே கடைசி அளவு.

(2) கமச்சாசம் 2½ மாஷா மூன்றன்மிக் காசுநீர் கலந்து உட்கொள்ளவும். மூன்றன்மிகும், எண்ணும் அழைத்து சற்று கொடுக்க வைத்து கட்டியின் மேல் பூசவும். 3 நினைத்தில் கட்டி கழறத்து விடும்.

(3) அத்திப் பழம் 4, காசுநீர் மயிசுத்து நினைம் காசுநீரில் தின்று கட்டியை கட்டிட மீசுமிகும் சற்று வாயி ஏற்படக்கூடிய அளவிற்கு தேய்க்கவும்.

(4) எதுபரிச்சம் சாறு நோலா 1½ வெள்ளை வெங்காயம் சாறு நோலா 1½ இரண்டையும் சேர்த்து 14 நாட்கள் வரை விக் அகிலையில் குடிக்கவும், இலேசான ஆசாரம் புசித்து வர வேண்டும்.

(5) பூண்டை இடித்து 6 நோலா அடையுள்ள தனிச்சாறு எடுக்கவும், வெய் நோலா 6 வெல்லம் நோலா 4, கோதுமை மாவு நோலா 4, கல்லாம் சேர்த்து பாயாசம் காய்ச்சவும். முதலில் பூண்டு சாற்றை உட்கொண்டு அதிதபடியாக பாயாசம் குடிக்கவும். நேர காலில் உபாபை தீர்த்தும், கட்டி கழறத்து விடும்.

(6) கீற்றை கண்ணாம்பு கண்ணாய் அழைத்து தூண்டி தேனில் கலந்து கொண்டு கட்டியின் மேல் பற்று போட்டு அதன் பேரில் ஆமணக்குத் தலை கட்டி விடவும்.

(7) மூலம் சேர் 1½, கச்சு அடியடயம் குராசானி சேர் ½, அக்கிரகாரம், நோலா 3, சச்சிபனி மாஷா 9 இவற்றுள் இடிப்ப தற்கு காயக்கான சாக்குகளை இடித்து சோம்பு திரவத்தைய் போல் காசுநீரில் திரவாகம் இறங்கிக் கொள்ளவும். காலை மாலை கவதித் சேர்ப்படி 3 நோலா குடிக்கவும். கயிற்றுக் கோளாறுகளை வாயும் கண்ணுக்கும் கயிற்று உட்புரத்தையும் போக்கி விடும்.

(8) சச்சிகாரம், மாஷா 9, சிறுவர் கட்டி காஷா 3 எண்ணும் அழைத்து பழைய வெள்ளத்தில் ஸயத்து 21 நாள் கொடுத்து வாயும், பத்தியம் 1—புளிப்பு வாயு பதார்த்தங்களும் கூடா. கயிற்றுக் கட்டி கிவர்த்தியாய் விடும்.

(9) கமச்சாசம், வெங்காயம், பொட்டி துப்பு, மீளகு எல் கமச்சம் கடை வாய்க் சேர்த்து கட்டுவதில் பிசைத்து நோலா கிட்டு வெடுத்து வாயும் அதித காலில் சேர்த்து கட்டுவதாய்

அளவை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக் கொள்ளவும். பூஞ்சாறு யான் அழைக்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம். இதே மீசாரம் 7 நாள் கொடுத்து வர வேண்டும். கைகண்ட பாகம்.

(10) கோயாளி சகிக்கக் கூடிய அளவிற்கு காலை மாலை மூலம் தின்னச் செய்யவும்.

இடுப்பு வலிக்கு

கச்சு, ஆமணக்கு வித்தின் பருப்பு வகைக்கு நோலா 1 பசு வெய், சற்கண்டு இத்த இரண்டும் தனித்தனியே நோலா 12 பசுயின் பால் சேர் ½ முதலில் கக்கையும் பருப்பையும் வெய்யில் வறுக்கவும் அப்பால் பாலைச் சேர்த்து காய்ச்சி பசு குப்பத்திற்கு வந்ததும் சற்கண்டு தூளைச் சேர்த்து கலக்கி கோயாளியின் தேக கபாவத்திற்குத் தக்கவாறு கொடுத்து வரவும். இடுப்பு வலியை கிவர்த்திப்பதுடன் இடுப்பிற்கு பலத்தையும் தந்தருளும்.

இடுப்பு வலிக்கும் வாதத்திற்கும்

(1) முருங்கப்பட்டை நோலா 3½ பூண்டு நோலா 1½ வெய் நோலா 1½ வெல்லம் நோலா 8½ கோதுமை உயி நோலா 17 பசும்பால் சேர் 1½ பசு வெய் அவசியத்திற் சேர்ப்படி. யாவற்றையும் சேர்த்து பாயாசத்தைபோல் தயாரித்து காலை மாலை உட்கொள்ள வேண்டும்.

(2) வெள்ளை அருளிச் செடியின் பட்டை, வெள்ளைக் குன்றுமணியின் பருப்பு, கறு ணமத்தை இலை ஒவ்வொன்றும் மாஷா 7 எல்லாம் அழைத்து மொத்தையாக்கிக் கொண்டு கால்சேர் கண்ணெனையில் எரிக்கவும். மருத்து மொத்தை கருவிப்போய் அதில் உள்ள புகைச்சல் அற்றுப்போகும் வரையில் எரித்த பின் அந்த எண்ணையை வடிகட்டி பத்திரமாக எடுத்துக் கொள்ளவும். இடுப்பு கோய் வாத வலிகளுக்கு செவ்வனே தேய்த்து வெய்யிலில் கோயாளியை கொஞ்ச கோத்திற்கு உட்கா வவைக்கவும்.

(3) கை காலில் கவி ஏற்பட்டிருப்பவர்களுக்கும் அல்லது கைகால் முடக்கு உண்டா யிருப்பவர்களுக்கும் ஆமணக்கு வித் தின் பருப்பு முதல் காலில் ஒன்றும், இரண்டாவது காலில் இரண் டும், இதே மீசாரம் 7 நாள் வரையில் ஒவ்வொரு பருப்பை அறி து கொண்டு போக வேண்டும். 7 நாட்கள் முடிந்தவுடன்

அளவே எப்போதும் உபயோகப் படுத்தலாம். அதுவே போதும். பத்தியம் ஒன்றுமில்லை. பசி திபனத்தை யுண்டாக்கும், வாயுரோகங்களை அதன் செய்து விடும்.

மூச்சுப்பிடிப்பு வாயுவு வாத உபாதைகள்

(1) மூச்சுப்பிடி ஜூரத்தின் மேல் கண்டிருந்தால் அதன் சிவிகைமிகக் குன்றிவருவதாக செய்தல் வேண்டும். ஜூரமில்லாமல் தனிமே வாயுவின் மேல் மூச்சுப் பிடியின் உபாதை ஏற்பட்டிருந்தால், எருக்கஞ் செடியின் கீழ் பட்டை 1 பங்கு, சச்சிகரம் 1 பங்கு இந்த திராண்டையும் பையன் மூத்திரம் விட்டதைத்து உபாதையுள்ள விடத்தில் பூசி, வெயிலில் சோயாவியை உட்காரச் செய்ய வேண்டும். வெயில் இல்லாவிட்டால் விசாட்டியின் கடுகம் பனைக் கொண்டு ஒற்றடம் கொடுக்கவும்.

(2) மிகு 7 பகவின் மித்தத்தில் வைத்து 3 நாள் கிழலில் உலர்த்தவும். அது அகத்தமாய் விடும். அப்போது அதை வலி ஏற்ற விடத்தில் தேய்த்து, பழைய பஞ்சை அதன் மேல் வைத்து கட்டி விடவும். 3 நாள் வரை கட்டை அவிழ்க்கக் கூடாது. வலியை வாய்நுதலில் இந்த சிவிகை இன்றியமையாதது.

(3) ஜாதிக்காய், கற்கண்டு, கக்கு இம்முறையும் சமனடை யெடுத்து எல்லாம் அரைத்து வேலை 1க்கு 9 மாகா அளவிற்கு உட்கொள்ளவும்.

(4) சவுக்குப்பிசின் ஸுனித்துன் டோன்றில் வைத்து அணலின் மேல் பிடிக்க அது உருகும். அப்போது அதை அதே ஸுனியால் தடவி வலியுள்ள விடத்தில் கட்டி விடவும். ஆனால் அந்த விடத்தில் விக்கம் இருந்தால் எட்டக் கூடாது.

(5) அரை நிரோகம் கரணை யந்தரப் போதல், வாய்க்கோணிய் போதல் உபத்தின் அதிசரிப்பினாலேயே இச்சேய் ஏற்படும்.

சோய் கடுமையாக விருந்தால் 7 நாள் வரையிலும் சாதம் கொடுக்கக் கூடாது. ஆரம்பத்தில் 2, 3 நாள் சோயாவியை பட்டிலி விடக்க விட்டு தேன் ஒரு பங்கு ஐலம் 2 பங்கு கொதிக்க வைத்து, இரண்டு பங்கு ஐலம் கண்டிப் போனதும், இறங்கி வடி கட்டிக் கொள்ளவும். தேன் கிடைக்காத விடங்களில் வெள்ளத்தை

செய்தால் கொள்ளவும். புது ரும் உலது தினத்தி விருந்து கொடுக்கலாம்.

(6) சோம்பு சிமாஷா, சோய விதை 1 தேலா, ஐலம், சாமா துமம், மும்மூண்ட மாஷா, துடா மாசி 4 மாஷா, காவிரி க்கை 1 தேலா, குலங்கு 2 தேலா, 1 1/2 படி துத்தில், 3ல் 2 பங்கு கண்டிப் போனதும் இறங்கி வைத்து, தினத்தோதும் உப போலித்து வரவும்.

(7) திபரின் பண்ணை காலத்திய வைத்திய முறையை யனுசரித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது:—

(1) வாதானுவை, துரித்தாயலா, அரிதே திபரின் தனிமே மும்மூண்ட திரம், கிப்பனம் கிழங்கு 15 திரம், கக்கு 15 திரம், சுத்தி செய்த சேர்வனம் 4 திரம் யாகற்றையும் அரைத்து மிளகு அளவிற்கு மாத்திரை செய்து வேலை 1க்கு 2 மாத்திரை கொடுத்து வரவும்.

(2) கக்கா தோல் சிலி யகமத்து தேலில் கலந்து அக்க சோய் அளவிற்கு மாத்திரை செய்து தினத்தோதும் 2 வேலை சாய் விடவும். இதை உபயோகித்து வரும் காலங்களில் மேற் கொடுக்கிய தேன் கலந்த ஐலத்தையே கொடுத்து வரவும்.

வாத நோயாளிக்கு ஆஸி முலை சிவிகை.

பூண்டு 1 திரம் கக்கு 1 திரம், மலிகேம்பு, சோயி துவத்தில் தழைகள் வைக்கு 1 சேர். கக்கா கக்கிக் கொண்டு இரா வக்கா சாக்குவியும் இரண்டு சேர் ஐலத்தில் கொதிக்க வைக்கவும். அரை பங்கு ஐலம் கண்டிப் போனதும் சோயாவி மேல் போர்வை போர்த்து புனை பிடிக்கவும்.

வைகால் கிழந்து போன வாதத்திற்கு எட்டிக்

கொட்டையின் பாகம்.

இது இடுப்பு வலியைப் போக்கும், விரோதத்திற்குள்ளினை கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் கல்ல குணம் தரும்:—

16 எட்டிக் கொட்டை, 15 எட்டிகள் வரையின் துள்ளி லில் வைக்கத்து 15 காட்டாருக்கும் பின்னர் எடுத்துக் கொள்ளவும். ஆனால் 3 காட்டாருக் கொருமுறை தண்ணீர் மாற்றில் கொள்ளவும் எனவும், 15 காட்டாருக்கும் பின்னர், அது மிகுதலாய் விடும்,

அப்போது அதன் தேன் உறித்து உலத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்பால் அதன் புனை முற்றிலும் அந்தப் போளும் வகையில் அந்தக் கொழுப்பி லேற்றி கூட வேண்டும். அதன் பின் கூட்ட வாயுடன் சம அளவிற்கு மிளகாய்ச் சேர்த்து கன்றும் அரைத்து மிளகின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் சென்று காய்ச் தேளும் ஒரு மாத்திரை உட்கொள்ளவும்.

குறிப்பு :—கோயாவிற்கு உணர்மையான பரி ஏதாவும் வகையில் ஆகாரம் தரக் கூடாது. அதே போல் தரவும் எடுக்கும் வகையில் தேன் தண்ணீரையும் கொடுக்க வேண்டாம். ஆன்றும் வியாதின் தரை இருண்ட விட்டில் இருக்கச் செய்வதே மேலாகும். சாத்தும் அநிகம் செல்ல திருக்க வேண்டும். ஜூதத்துடன் கூடிய வாத கோயாவிற்கு உஷ்ணமான மருத்துவமையும் கொடுக்கலாகாது. மூதலில் ஜூதத்தை கிறுத்திக் கொண்டு வாதத்திற்கு பரிசாரம் தேட வேண்டும்.

வாதத்தால் வாய் கோணரிப்போவதற்கு :—

(1) பெரிய வாய்க்கப்பட்டை 20 திரம், சுக்கு கருஞ் சோகம் தணித்தனியே 7 திரம், தேன் 100 மின்சால் எல்லாம் தேனில் வலத்து தினத்தோறும் ஒரு மின்சால் சாப்பிடவும். இம்மருக்கை உபயோகிக்கும் வகையில் தேன் தண்ணீரை குடித்தல் அனர்பியம்.

(2) அரிவட்டயம் 10 திரம், மிளகு, பொதினா, சோகம் கருஞ் சோகம் ஒம்பொன்றும் 3 திரம். கால் சேர் தேனில் ஏத் தானவே யுள்ள குறைப்படி நயவர் சென்று கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 2 மின்சால்.

(3) காலி, அக்கிராசாரம் இரண்டையும் அரைத்து தேனில் குறைத்து காலின் மேல் தேய்க்கவும். இது வாதத்திற்கு சர்க்கை.

(4) திரபல ஜாலிஸ்தான் சோகலி கிருக்கிஞ்சு :—

மிளகாய் அரைத்து எண்ணெயில் கலந்து கோயாவின் காக்டில் தடவி வருவதைக் கூட்டி. ஹம் கொடுத்த வல்ல மருத்தும் கொடலாகாது.

(5) பட்டுப்பூக்கி (மலாடக்) காலத்தில் பூயிபி கிருத்து மேலே வருவது குறைவாக விடிந்து அதன் கிது கால்களையும் தலைமையையும் மின்சால் எறித்து விட்டபின் மீதியான பாகத்தை தாய்மூல உடயத்துடன் கலந்து கோயாவிலும் அருக்தச் செய்யவும்.

வாத சம்பந்தமான நோய்களுக்கு மேல் உபயோக
வைதஸங்கள்.

(1) வெள்ளை அருளி மேலின் மேல் பட்டை, வெள்ளை குண்டி மலரினின் பருப்பு, கலப்பு வகைத்தையின் இலை, இவையையும் வலமக்கு இரண்டு தரம், எல்லாவற்றையும் இடித்தும் சலித்தும் 1 சேர் எண்ணெயில் எரிக்கவும். மருத்து சர்க்குகள் மலையும் எரித்து கருவிப்போனதும் கொச்சுது, கீத்துப் போனவுடயம் எடுத்துத் தேய்க்கவும். இந்த எண்ணெயால் தாதுமும்படி மேல் படக்கடிகம்.

(2) எண்ணெய் 1 சேர், கோஷ்டம் கருஞ்சோகம் தணித்தனியே 2 தரம், இரண்டையும் கல்லெண்ணெயில் எரித்து அந்த எண்ணெயை மேலுக்குத் தேய்க்கவும்.

(3) ஆமணக்கிலை, வகைத்தையின் இலை முருங்க இலை, கொக்கி இலை எல்லாம் நூசை அளவில் வாய்க்கி இடித்து அரைத்திற் சாடுகித்து, எண்ணெய் சம வகையில் எரித்து, சாடுகிசாரம் சேலா கண்டிப்போளும் சமயத்தில் சுக்கும் கோஷ்டமும் சேர்த் தேய்த்துக் கொள்ளவும். இதுவும் மேலுக்குத் தேய்க்கத்தகுரியது. வாதத்தாகக் கேட்கும், தரம்புகளுக்கு சக்தியுண்டுபயன் றுறும், வாய்வுவைக் கண்டிக்கும்.

(1) கோஷ்டம் திரம் 2 ஹடாமாகி 1 மாகா, தாவிசபத்திரி, அக்கிராசாரம், சுக்கு தணித்தனியே 1 திரம் இடித்து தண்ணீரில் வைவைக்கவும், காலையில் யாவற்றையும் சட்டி.வில் போட்டு எரித்து மூன்றில் ஒருபங்கிற்கு வந்ததும் எடுத்து உபயோகிக்கவும்.

(2) புதிய சேமை சாமத்தி 2 பங்கு, கொத்தயம் ஒருபங்கு எண்ணெய் 5 பங்கு பாட்டி.வில் அடைத்து 40 கால் வெயிலில் வைக்கவேண்டும்.

(3) சோர் கோச்சண்ட புஷ்பத்தையும் கொத்தயத்தையும் 10 பங்கு ஹத்திற் தணிசெண்ணெய் தங்கும் வகையில் எரிக்கிஞ்சுகள்.

(4) புதிய வாதப் இலையுடன் எண்ணெய் சேர்த்து புட்டி.விடைத்து 40 கால் வெயிலில் வைத்தபின் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம்.

(5) கருஞ்செகம், துமம், அக்கிரகாரம், சீலம் ஆறாவன விரைத, உப்பு எல்லாம் சமனடை, இடித்து 3 பங்கு ஐந்தில் எரிக்கவும். 3 பங்கிற்கு எட்டியதும் ஆறாத வடிக்கட்டி, சமனடை கொண்ட எண்ணெயில் சேர்த்து மறுபடியும் எரிக்கவும். தனிவே எண்ணெய் தங்கிவிட்டதும் ஆறாத வெடுத்துக் கொள்வாம்.

(6) காட்டு செகம் 3 செர், துமம் கருக் 1 1/2 தாம், இடித்துத் தட்டி, 2 1/2 செர் கொண்ட ஊமந்தைச் சாற்றில் கலந்து 3 செர் எண்ணெயில் விட்டு நிரும்பு தாக்கி பொன்நில் எரிக்கவும். போட்ட சாக்குகளுக்குள் போனவுடன் எடுத்து வடிக்கட்டி மேலுக்குத் தேய்க்கவும்.

(7) பெரும் பூண்டு 1 1/2 செர், தோல் உரித்து பானில் கனரூய் காய்ச்சவும், பூண்டு கலந்தது போனதும் ஆறாத பாகாகக் காய்ச்சி காமத்தி, கக்கு, மினு, திப்பிலி, கடுங்காய்த் தோல், அக்கிரகாரம் சித்ததத்தை, ஒவ்வொன்றும் பொடி செய்து பானில் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

மனது துடிப்புக்கு

குட்டியுள் பேரில் ஏற்படுங் குளிக் கொடுப்புக்கு சந்தன மெய்யம்:—

சந்தன சக்கை 20 மில்லாய் இரவில் பன்னிரண்டு அல்லது ஐந்தின்கு ஊரவைத்து காலை 10 அடையின் மேல் ஏற்றி எரிக்கவும். பிறகு ஆறாத வடிக்கட்டி, ஆறாத செர் ஜீனியில் பாகுப் படுத்தவும். பாகு இரண்டாக இருத்தால், அதற்குப்பெயர் சந்தனச் சூர்ப்பத்து. ஆறாத புனிப்பாக்க வேண்டுமானால் அதனுடன் சந்து எதுமிச்சு சந்தனச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

காதுஜபான் வற்பத்து:—

இது மூலிகையும் மனதிற்கும் வலிமையைத்தரும். கதுஜபான் (பசுக்கிழை) 3 செர், ஜீனியேர் 1. மேற்கூறியபடி வற்பத்து தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

பருத்திப்பூவின் வற்பத்து:—

இது இருதயத்துக்கு வலிமைத்தரும்; உற்சாகத்தை வளர்க்கும். சித்த பேதத்தின் ஆரம்ப நிலையைப் போக்கும்.

மலர்ந்த பருத்திப் பூ பன்னிரில் அல்லது ஐந்தில் காய்ச்சி, அரைவாசி கண்டியப் பின்னர் ஜீனியைச் சேர்த்து பாகுபடுத்திக் கொள்ளவும். வேகி துண்டுக்கு 20 தாம் உபயோகிக்கவும்.

ஆன்னுசி பழத்தின் வற்பத்து:—

ஆன்னுசிப்பழச்சாறு ஒருபங்கு, ஜீனி 2 பங்கு எடை சேர்த்து பாகு தயாரித்துக் கொள்ளவும். அத்துடன் கொஞ்சம் பன்னிரும், ருங்கமப்பூ சித்தனவுக்கு சேர்த்துக் கொண்டால் மனோரமிய வலிமையும்.

வெற்றிலை வற்பத்து:—

இது இருதய குளிக்கியைத் தணித்து வலிமைத்தரும். மந்தி, சுபம், அஜீரணம் இவற்றை கண்டிக்கும். பருத்த மஞ்சள் திரவான வெற்றிலை 100—எடுத்து செவ்வனே இடித்து ஐந்தில் போட்டு எரித்து வடிக்கட்டி ஆறாத செர் ஜீனியில் பாகுபடுத்தவும். இதில் கொஞ்சம்போல் புளகிர் கலத்தால் இன்னும் விசேஷம்.

வேறு

விவப்புச்சத்தனம், செல்லிக்காய், கொத்தமல்லி இவை மூன்றும் கலக்கு 5 மாதா, 3 படிதலத்தில் ஊரவைத்து காலை 10 வடிக்கட்டி, 2 தாம் அளவு ஜீனியைச் சேர்த்து பருசவும்.

மன துடிப்பிற்கு கஷாயம்:

கருஜபான் 2 தாம், கொடி—4. இரண்டையும் காய்ச்சி கொஞ்சம் ஜீனியை கலந்து குடித்து வரவும்.

மன துடிப்பிற்கு திகாந்த பரிகாரம்:

துக் மேரைதான் (சப்ஜாவிகை) ஒரு தோலா தூர் இரவு ஐந்தில் ஊரவைக்கவும். ஊரவைக்கும் பாத்ரத்தின் வரவை காற்றுப் படும் படியான இடத்தில் வைக்கவும். காலை 10 தாம் சர்க்கரைவை சேர்த்து விழுங்கிவிடவும்.

கடலைப்பருப்பு 4 தாம்— 5, 6 தாம் தண்ணீரில் ஊரவைத்து காலை 10 ஆறாத கனரூய் பிசைத்து சர்க்கரைச் சேர்த்து பருசவும்.

பத்தியம்:— புனிப்பும் வாகுசம்பந்தமான பதார்த்தங்களையும் தயாரிக்கவும்.

வெட்டிலேர் பாகம்

வெட்டிலேர் காதலை எடுத்த உபயோகத்தால் குட்டிகளும் கற்பகம் குழிசை கொடுப்பதும் மலச்சிக்கலுக்கும் கல்ல குணத் ததைத் தரும்.

இதன்சாற்றை எடுத்த அதில் சர்க்கரை (வெள்ளை) சேர்த்து குடிக்கவும். அல்லது அதை வேகியமாக சேர்ந்து சாப்பிடலாம்; அத்துடன் கொஞ்சம் பேரண்ட வெட்டிலேர் அத்தனையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம், இது குழிசை கொடுப்பை அடக்குவதுடன் நாய்ச் சலிசுக் உண்டாகக்கூடிய நேச உஷ்ணத்தையும் தணித்தலாகும்.

கொத்தமல்லி கஞ்சாயம்

இது இருதயத்திற்கு உறுவைத்தரும், குழிசை கொடுப்பை தணிக்கும்.

(1) மேல் தோல் கீக்கிய கல்லி, காய்ந்தபின் இதில் தணித் தலையே 2 தோலா, கல்கி சம்பங்கிப்பு, கோதுப்பு, சர்க்கரைகளைக் கலக்கி 5 தோலா, கண்டூரி 1 மாஷா, அகர் 1 தோலா, உண்டாகக் 5 கோர் எல்லாம் சேர்த்து திரவாகம் இரக்கிக்கொள்ளவும்.

(2) வெவிலிக்காய் கொத்தமல்லி இந்த திரவாகமையும் இரத்த தில் போட்டு ஒர் இரவு ஊரவைக்கவும், பாத்நிரம் சாற்றை காயில் இருக்கட்டும். காலைநில் அதை இரத்தை மாத்திரம் இரத்த திக்கொண்டு அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரைட்டு குடிக்கவும். இது உஷ்ணத்தாலெற்பட்ட உடிய செஞ்சுறுடிப்பை நிவர்த்திக்கும்.

மணச்சோரடிக்கும் அடிப்பித்தும்

பன்னிர் தோலா 3 அக்கண்டி மாஷா 5 இரத்த திரவாக மையும் ஒரு வெவிலிப் பாத்நிரத்திற் போட்டு குழைப்பு அறுவலின் மேல் வைக்கவும், அறுவலிக்கு இரம் சாண்டப்போனதும் அதை எடுத்த, ஆறவிட்டு குடிக்கவும்.

இரப்பை தோய்கள்.

இரப்பையில் கலி, உப்புசம் குதலிய கொணாடகன் ஆகாத்நிரம் மாசைத்தால் சாப்பட்டிருப்பின் அமை நற்காலிக மலக்கை அகற்செய்யலாம்.

காயுலின் கசாணத்தால் உண்டான வலி யமீதில் குரிடத்தி யிருந்து மற்ருரிடத்திற் மாநிமாநி வரும்.

கலித்து உப்புசம் அடுகலித்து கஷ்டம் சடுக்கொண்டிருக்கும் தால் வெக்கில் உப்பை கதைத்து உட்கொண்டால் வாக்திவரும். அதுதான் அத்தனையும் கஷ்டம் கிங்கும்.

கஷ்ட சமயத்தில் கத்தலைய உணாவாமிருப்பினும் அளவுக்கு மேற்கொண்டு புளிக்கலாகாது.

பலி எடுத்தபின்னரும் தீரணிந்ததற்கு இலேசான ஆகாசமே சாப்பிடவேண்டும்.

காயுலின் பேரில் கலித்துக் கொண்டிருந்தால் கோதுமையுடைய உப்பு அல்லது கம்பு அல்லது வாதாறுவை தூணியில் கட்டிக் கொண்டு அதில் தனி மணலிச் சுட்டோ ஒத்தடம் கொடுக்க வும். இவ்விதமாகத் தனியே குடிப்பது கல்லதே.

வால்மீனா ஐவாரிஷ்.

இது காயுலைய கண்டிக்கும், தீரண சக்தியைத் தரும் தாது டிஷ்டி உண்டாகும், ஹரீசை இரப்பையையனிடும் கொலிப்படுத்தும். 5 திரம் கால் விளகை அதைத்து 1 சேர் சர்க்கரைப் பாகில் இரத்த கொள்ளவும்.

சக்கு ஐவாரிஷ்.

காயுலு கோனாது, இரப்பையின் கலையைப் போக்கும். தீரண சக்தி உண்டாகும். மந்தி கிங்கும். இரப்பையையும் இருதயத்தையும் தீரண சமயத்தமக உபாதைகளை விட்டும் காத்நு கதாதப்பாக வைக்கும். கக்கை அகாத்து 5 பிங்கால் காயு டுள்ள அதன் தூயிர் சர்க்கரைப் பாகில் கலந்து கொள்ளவும். கிள் கக்கை அறுவிச்சம் பாத்நிரத்திற் 3 கோர் கதைவைத்து உஷ்த்திய கிளகர் அதை பொடிபாக்கி பாகில் கலக்கிநூசல்.

இஞ்சி ஐவாரிஷ்

20 திரம் தோல் உரித்த இஞ்சை அதைத்து 1 சேர் சர்க்கரைப் பாகில் கலந்து கொள்ளவும்.

சாம்பிராணி ஜவாரிஷ் புளிப்பும் இளிப்பும்

இரப்பைக்கு வஸிஸைத் தரும், ஜீரணசக்தியைப் சாக்கும். பால் சாம்பிராணி அரைத்து 3 சேர் சர்க்கரை பாகில் போடப்படும். அரை புளிப்பாக்க வேண்டுமாயின் எலுமிச்சம் பழச்சாறு அதில் அகலிபத்திற் சேற்றவாறு சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

பாங்கி சாம்பிராணி ஜவாரிஷ்

கோழை சுயம் சம்பந்தமாய் ஏற்பட்ட உலப் போக்கை கிழித்துத் தரும். ஆகாந்தை விரலில் ஜீரணிக்கச் செய்யும். பாங்கிசாய்வி ராணி, பெரிவாலக்காய் தனித்தனியே 2 திரம், சுக்கு, சித்தரத்தை, ஒமம், துடாமாசி, கருஞ் சீரகம், கோல் உரித்த சிறிய ஏலக்காய், மிளகு வகைக்கு ஒரு திரம். சர்க்கரை பாகிற்சேற்றவாறு.

தெல்லிக்காய் ஜவாரிஷ்

இரப்பைக்கு சக்தியைத் தரும் தெல்லிக்காய், கொட்டைவாய் எடுத்த பின்னர் அதை அம்மியில் அரைத்து உடுமாவின் பங்கி லைச் சேர்த்தோ அல்லது ஜலத்துடனே கலந்து சாந்தை எடுக்கவும். அச்சாந்தை 3 சேர் சர்க்கரைப் பாகில் கலக்கவும். பூரூ பதந் தின் கடைசியில் 5 திரம் மஸ்தகி அரைத்து கலந்து கொள்ளவும்.

ஒமம் ஜவாரிஷ்

பசி தீபனத்தையுண்டாக்கும், ஜீரண சக்தியைத் தரும், வாயு வைப் போக்கும்.

ஒமத்தை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் கலந்துவைத்து உலர்த்தி 10 திரம் அரைத்து 3 சேர் சர்க்கரைப் பாகில் பதப்படுத்தித் கொள்ளவும்.

சித்தரத்தை ஜவாரிஷ்

இது சாதாரணமாய் வாயுவை கண்டிக்கும், உணர்வை விரலில் ஜீரணிக்கச் செய்யும். இரப்பைக்கும் இருதயத்திற்கும் சக்தி உண்டாகும். புளியேற்பம். அண்டவாயு உபாதை இவைகளுக்கு உரியது அரைத்த சித்தரத்தின் தூள் 5 திரம், 3 சேர் சர்க்கரைப் பாகில் கலந்து கொள்ளவும்.

கருஞ் சீரகம் ஜவாரிஷ்

உபத்தா அறுக்கும். வாயுவைப் போக்கும், இரப்பைவின் உப்புசத்தை நீக்கும், வாயு இரத்தங்களின் விடிசம்பந்தமான கோளாறுகளையும், வெந் தாய் கழக்கும் கல்ல குளாம் செய்யும். இரப்பை யின் பூச்சிக்களைச் சொல்லும், மல ஜல உபாதை முதலியவைகளையும் போக்கும். இருபால்க்குரிய மரம் உதானவளியை விவர்த்திக்கும். கோழை சுயம் சம்பந்தப்பட்ட பகைய ஜூரங்கலையும் கண்டிக்கும். 6 திரம் கருஞ் சீரகத்தை ஓர் இரவு முழுதும் சாடியில் வைத்து அதைத் தேநீரில் அலுத்து உலர்த்தி, அப்போம் அதை டுட்டில் சற்று சுட்டு 3 சேர் கொண்ட சர்க்கரைப் பாகில் கலந்துகொள்ளவும்.

பொறிஞ் ஜவாரிஷ்

வலித்து வளியைக் கண்டிக்கும். பொறிஞ்ஜலஜர் திரம், சுக்கு ஒமம், கருஞ்சீரகம், துவ்வொன்று 3 திரம், வலிவி, கோம்பு, மிளகு தனித்தனியே 2 திரம், ஜீனி மூன்று பங்கு.

ரூமிசோம்பு ஜவாரிஷ்

இரப்பைக்கு கல்ல சக்தியைத் தரும். பசிதீபனத்தை வலி டாக்கும். வலித்துப்புகம், வாயு நீக்கும். ரூமிசோம்பை சாடியில் கலந்துவைத்து உலர்த்திசொன்ன வேண்டும். சிறகு சற்று சுட்டியில் வைத்து 10 திரம் தூள் செய்து 3 சேர் தேனில் பூரூ படுத்தித் கொள்க.

இதர்பல் கபீர்

இரப்பைக்கு வஸிஸைத் தரும், உப்புசத்தை நீக்கும், தேஜஸை உண்டாக்கும். பெரிய கடுக்காய்த்தோல், கற்பு கடுக்காய்த்தோல், தெல்லிவற்றை இவைவாயும் இடித்து வெயில் அழகியவைத்து, கால் மிளகு, மிளகு வகைக்கு 6 திரம், சுக்கு, வெண்ணிற்சீர ஒமம், வெப்பாலிசி தித்திப்பு, உடைத்த எள்ளு, கைகலா, கதகண்டு வகைக்கு 2 திரம், 3 பங்கு தேனில்

ஆகாரம் சிக்கிரம் ஜீரணமாகுப பரி எடுக்கும்.

கோதுப்புப்பம் 6, சோகாசுழங்கு 5 திரம், வலிவி 4 திரம், துடாமாசி சித்தரத்தை, தாவிசபத்திசி, மஸ்தகி, கருஞ்சீரகம்,

1 மாதத்தினாலே இவருக்கு உடனடி சிகிச்சை செய்யப்படும்.

வயிற்று கோளாறுகளுக்கு சூதானம்

(1) பசி திபணத்தை உண்டாக்கும், தீவிரமாகத் திணைக்கொடுக்கும்.

தூய்மை, சித்திரம் முதலில் கவனத்துடன் 1 திரம், திப்பிலி 2 திரம் மஞ்சள் மஞ்சளாய்த்தோல் 2 திரம், சுக்கு 12 திரம் கெந்தி உப்பு 10 திரம் ஒன்றொன்றையும் சுத்தமாய் பொறுக்கி எடுத்து, எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் ஒன்றுக்குவின ஒன்றாக 3 தடவைகளில் அரைத்து உலர்த்திக் கொள்ளவும். வேலை 1 க்கு 2 திரம்.

பசிக்காக இன்றியமையாத சூதானம்

(1) சாதாரண பழுத்த மிளகாய் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் 40 காய் தொடர்ந்தாற்போல் அரைத்த மிளகாய், 2 கத்தி அளவிற்று வெற்றிலையுடன் உட்கொள்ளவும்.

(2) சுக்கு, 2 திரம், சோம்பு 1 திரம் பெருங்காயம் 3 திரம் எலுமிச்சம் இடித்தனாத்து, எலுமிச்சம் சாற்றை விட்டனாத்து மிளகாய் காய் தட்டிக்கொள்ளவும்.

பின்பு உட்கொண்ட அடிப்படுகேற்றி சத்து குடிநீரோடு இடித்து மிளகாய் அடிக் கொள்ளவும்.

கவனத்துடன் போனதும் எடுத்து அளவாகக் கொடுக்கத்தக்கதாய் சாப்பிடவும்.

இரப்பை வலிப்பு நிவர்த்திக்கும்

(1) சாட்டு வாகையின் தலைமுள், மிளகு 12, சோம்பு 10 அரைத்து குடிக்கவும்.

(2) தூய்மை, பெந்தி உப்பு கையாக்கின சாற்றில் அரைத்துக் கொடுக்கவும்.

(3) தூய்மை முதலில் சோற்றுக்கருவியின் சாற்றில் அரைத்து உலர்த்திவிடவும். அப்பின் எலுமிச்சம் சாற்றில் அரைத்து உலர்த்தி, தேக்கபாவத்திற்கேற்ப சாப்பிடவும்.

வாயு, அழிதானம் நிவர்த்தியாகும்

(1) சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி சம எடை எடுத்து அரைத்துக் கொண்டு சரீரம் செய்தும் உட்கொள்ளவேண்டும்.

(2) தாமிசபத்திரி, சிவசாக்ப்பு, எலக்காய் சம எடை அரைத்து அரைத்து சம எடை தீயிற் சேர்த்து சாப்பிட்டு வர இரப்பையில் உள்ள வாயுவைப் போக்கும். வலக்கப்பட்டை, சோம்பு மஞ்சள், எலகி, கந்தகம் இவை யாவும் இடித்து தூள் செய்து சாப்பாட்டற்குரியன 2, 3 மாதம் சாப்பிட்டுவர இரப்பைக்கு கல் கத்தி உலர்த்தும். பாவைக்கு 1 மாதம்போதும்.

(3) தாமிசபத்திரி குடித்துக் குடித்து தனிமே வலிப்பு மட்டும் வெளியில் தளவிடத்தகு போலாகிருக்கும் முறிமோருக்கும், குறிப்பாக சிவசாக்ப்பு குடித்துக் குடித்து, சுத்தமான தேன் 1½ தோலாகில் 4 தோலாக சுத்த தூய்மை கலந்து நின்று காலம் கொடுத்த வந்தால் அந்த நுரை சிவியிட்டுக்.

(4) சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, பெரிய கவனக்கப்பட்டை, தூய்மை, சோம்பு, கல்லுப்பு யாவற்றையும் ஒன்றாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.

வயிற்றுப்புசம் நீக்கும்

(1) எலுமிச்சம் சாறு கத்த தூய்மைடன் சேர்த்து அரைத்துக் கொண்டு கல்லுப்புடன் தூள் செய்து கலந்து சாப்பிட்டு வரவும்.

(2) பசி எடுக்கும் வலிப்பு அசைக்கி வெளியிடுகிற விதிம்:—தாமிசபத்திரி, கெந்தியுப்பு, சூரத்து சிவசாக்ப்பு, எலக்காய் சம எடை வாகை எலுமிச்ச சாற்றில் அரைத்து மாதத்தினாலே செய்து கொள்ளவும். தேவைப்பட்ட சமயங்களில் குடித்துக் குடித்து ஒரு தோலா எடை மாதத்தினாலே அல்லது அரைத்துக் குடித்து மேற்பட்ட அளவிற்று பசிக்காகப் போது வெளியேற உட்கொள்ளவும்.

பசி எடுத்து ஆகாரம் ஜீரணிப்பதற்கு

(1) சுக்கு எலுமிச்சம், சோம்பு 1½ தோலா, பெருங்காயம் 1 மாதம், எலக்காய் சாற்றையும் இடித்து பொடி செய்து எலுமிச்சம்

பாலை குறைக்க

சோதனையு மரவு, மொச்சை மரவு, இந்த இரண்டும் ஒன்றாக வைக்கி அரிசி கொஞ்சம் கொட்டும் தண்ணீரையும் விட்டவழிதான் அரைக்காவின மார்பின்மேல் பற்றுப் போடவும், குட்டி உடம்பமான அரிசு நான் வாய்க்கவந்த இன்னொரு விதை துலத்தில் வைத்து பூசவும்.

மார்பு தளராதிருக்க

(1) மார்பை அதிகப் பெருக்க விடாமலும் அரைத கருக்கியும் உட்பிடிப்பதிலும் செலுத்தால் வைக்க விரும்பும் மார்பு தளர முடியாது மாத விடாவின் போதுள்ள குருக்கத்தை வெட்டுவதால் பின்மேல் தேய்த்து விடும்பட்சத்தில் அரைவ ஒரே நிலைமையில் இருக்கின்றன.

(2) சோகத்தை தண்ணீரிலாவது அல்லது விழுநிலிப்பிராவது அரைத்து 3 நாள் அல்லும் பதனும் மார்பின் மேல் தேய்த்து வரவும்.

(3) தித்திப்பு மாதனைத் தோல் 1 சேர், கடுகெண்ணெய் 3 சேர், 2 சேர் தண்ணீரில் வைத்து காய்ச்சவும். இலும் கண்ணடிப் போய் தலை எண்ணெய் தக்கிவிட்டதும் அரைத கெடுத்து இவ்வழி குட்டியை போதே மார்பின் மேல் தேய்க்கவும். இந்த எண்ணெய் ஆடலின் மரபுதான் தன்னை கரம்புகளுக்குக் கூடியவைநிறகும்.

(4) வகத்தெரர் கிழிவினமார்புகள் அதிகவும் கிறுத்து தெரி வாதனவிற்கு இருக்குமோ அதற்கு கருவாய் பாலை இவ்விரண்டின் கொழுப்பையும் சம அளவுடில் எடுத்துக் காய்ச்சி இவ்வுரு குட்டியிலேயே குறித்த மாதநிலையில் தேய்க்க சிறிது காலத்திற்குள் மார்புகள் பெருக்க ஆரம்பிக்கும்.

(5) அழுக்குகாக்கிதற்கு திப்பிலி, எண்ணெய்ப்பட்டை, கரட்டு எண்ணெய் எல்லாம் ஒரே கிளையில் எடுத்து போடி கொத்து கருவாய் எண்ணெயில் குழம்பி மார்பின் மேல் பற்று போடவும்.

(6) மார்பைப் பற்றுதோல் பெரிய சேர் 1, இடித்த மாவில் காய் 2 சேர் இந்த இரண்டையும் 4 பங்கு குடி தண்ணீரில் கொதிக்கவைக்கவும், 1 சேர் அளவிற்கு கஷாயம் கண்ணாடியிலே கொதித்து கரம்பான அளவில் எண்ணெண்ணெய் சேர்த்து காய்ச்சவும்.

கிரோலாசம் கண்ணடிப்போளதும் பூத எண்ணெயை எடுத்து பூசி வரவும்.

(7) இலும் விழுது பூயின் மேல் இறங்கி அரைத தொரி அதற்கு முன்னமே அதாவது விழுதை துயிரிலேயே கொண்டு வந்து உகர்த்தி துலத்தில் அரைத்து பூசவும்.

வயிற்று வலிக்கு பூச்சு

வாய்வு சம்பந்தமான வயிற்று வலிக்கு இரண்டிற்குத் தலைத கவிள சாற்றை கொடுத்து அதற்குச் சரியான அளவிற்கு அதன் எண்ணெயைச் சேர்த்து எரிக்கவும். இலும் கண்ணடிப் போனவுடன் எண்ணெயை எடுத்து வயிற்றின்மேல் தேய்க்கவும்.

மேற் பூச்சு

சோய்க்கோயின் சாறு ஒரு பங்கு எண்ணெண்ணெய் ஒரு பங்கு இரண்டையும் சேர்த்தெரித்த எண்ணெயை தனிப் படுத்திக் கொள்க. கிசர் தீப்பங்கு எண்ணெய் சேர்த்து காய்ச்சுகிறார்கள்.

நக்கிக்கி (பாகம்)

உலர்த்த கக்கிக்கி சேர் 4. இதை அரைத்துசலித்துக் கொள்க. பின்னர் அரைத ஒரு சேர் இஞ்சி சாற்றில் அரைத்து பில்லை தட்டிக் கொண்டு 10 சேர் நெய்யில் வறுக்கவேண்டும். வறுவிலேற்பட்டதும் கொய்யை கடிக்கட்டிக் கொண்டு 2 மாடா சாப்பிட்டு வரவும். பிச்சில்லாதவர்களுக்கு கல்ல பசி உண்டாகும்.

தல்ல பசி உண்டாகும் கங்கு குரணம்

இரப்பைக் கோளாறுகளை கிவர்த்தித்த பசி தீபனத்தை அளிக்கும்.

கங்கு 10 திரம், சோம்பு 5 திரம், மலந்தரி 3 திரம், கற்கண்டு சம எடை சேர்த்து சாப்பிடவும்.

குரத்து கிலாவிலா, மஞ்சள் கடுக்காய்த் தோல், கெத்தி உப்பு எல்லாம் சம அடை இடித்து என்டிர காயஞ் செய்து குரணம் சாப்பிட்டுவா, வசீத்து வலி கீறகும். சிந்தம், கபம் சம்பந்தமான ஹர்சீலா வெகிப்பெற்றி கிடும். அரைவு — 2 தோரை வெக்கிருடன.

(2) முகவரிகள் 6 மாதம் அல்லது மேலாகி இருக்காதவர்கள், விவாகம் எடுக்கப்படும் போதும்.

(3) குருவன் தனக்கு வார்டி பேறி கண்டது என்று உணர்ந்தவுடன் கன் இறு கிரைப் பிடித்து குடித்து விடுவானாகில், அங்கோயின் தாக்கிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வானென சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. பாயா ஜனங்களுள் சிலர் இப்படி செய்வதையும் தெரிவித்தனர்.

(4) கண்ணம்மா கடை யளவிற்கு மாத்திரை செய்து அதன் மேல் மஞ்சள் தூளைத் தடவி விட்டு, 2 மாத்திரை கோயா லிக்குக் கொடுக்கவும். என்னெண்ணிலாவில் ஐதிக்ராய் தூளைச் சேர்த்து தேகத்தின் மேல் தேய்க்கவும்.

(5) கருவப்பின் 1 மாஷா தின்பது கோயாலியை கோவை விட்டும் காத்துக் கொள்வதாகும்.

(6) சிறிய வலக்காய் தேல் 1, அல்லது 2 தோலா ஜலத்தில் வேக வைத்து, கோயாலிக்குக் கொடுக்கவும்.

தாகமும் வறட்சியும்

(1) அதிக தாகம் பெரும்பாலும் சூட்டின் காரணமாய் ஏற்படுவதாகும். பருப்பு கோ, சிவின்ஜரின் சாதா, இப்பகோல் னாறவைத்த தண்ணீர், இதில் ஏறேனும் ஒன்றை தாமரை ஷர்பத் தில் கலந்து கொடுக்கலாம். ஏறியிச்சம் பழ ஷர்பத்தும் தாகத்தைக் கட்டுப் படுத்துமா.

தாக்கத்தை அடக்கும் ஒமட்டலை நீங்கும்

அரசு மாத்தின் பட்டையைச் சுட்டு குடிக்கும் ஜலத்தில் அதன் சாய்ப்பைக் கலந்து விடவும். சிறிது கோத்திற்கு அப்பால் சாய்ப்பு பாத்திரத்தின் அடியில் தங்கி சுத்த ஜலம் கித்துப் போனதுமீ, அதை இறுத்து குடிப்பாட்டவும்.

பாலர்களின் தாக வறட்சிக்கு

(1) இது கோடை காலத்தில் பாலர்களுக்கு அதிகம் ஏற்படுவதுண்டு. தாமரை ஷர்பத்தின் சாயைக் கொண்டு வந்து கஞ்சி, குடிஜலத்தின் பாத்திரத்தில் போட்டு வைத்து, அதில் உள்ள ஜலத்தைக் குடிக்கச் செய்யவும்.

(2) வேப்பந்தழையை சிசைத்த செம்மண்ணில் வைத்து உருட்டி, அந்த உருண்டையை சூடுபிட்டு போட்டு எரிக்கவும்.

கன்றாய் சுட்டு சிவந்து போனவுடன், அதை குடி ஜலத்தில் வைக்கவும். அப்பாசு, அந்த ஜலத்தை சுத்தமாக எடுத்து குடிக்கக் கொடுக்கவும்.

(3) கெல்லி சுற்றலும், வெண்டி சுத்த கார்ப்புச் சேர்த்து, காயில் அடக்கி வைப்பது, தாசத்தைத் தணிக்கக் கூடியதாகும்.

சிற்பேதி இரத்த பேதி

இது குடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய், வயற்றுக் கழிச்சல், சிற்பேதி, இரத்தபேதி, வசித்துக் கடுப்பு என பல்வேறு உபாதைகள் ஏற்படுவதுண்டு.

பூலாங்கிழங்கு ஜவாரிஷ்:—

இது வாயுவு சம்பந்தமாயுள்ள கோளாறையும் கண்டிக்கும்:— வெண்டி சர்க்கலா 1 சேர், பூலாங் கிழங்கு 5 நிரம் அரைத்து ஜவாரிஷ் தயாரித்துக் கொள். உபயோகிக்கும் விதம்:—வேலை 1க்கு 2 தோலா. கெல்லிக்காயின் சாதாரண ஜவாரிஷ் கூட இக் கோய்க்கு இன்றியமையாத மிகச்சரியாகும்.

தெல்லிக்காய் முறை

(1) கெல்லி சுற்றல் ஒரு தோலா கொஞ்சம் ஜலத்தில் வைக்கவும். னாறவைத்து கெட்டி கட்டு ஜவாரிஷ் சேர்த்து சேவலனை அரைத்து இலையைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகளை தயாரித்து, காலை மாலை ஒவ்வொரு மாத்திரை சாப்பிடவும்.

(2) மாதுளம் பழத்தைக் கொண்டு வந்து; மண் உருண்டைக்குள் வைத்து அதை எரியும் அடுப்பின் சாய்ப்புக்குள் வைக்கவும். மண் வெந்து போனதுமீ அதை எடுத்து, மண்ணை எடுத்தெறித்து, தனிப் பழத்தை அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். காலை மாலை ஜவாரிஷ் கொடுக்கவும்.

(3) சோம்பை வெயில் பொதி செய்து அரைத்து அதற்குச் சம எடை ஜீனியைச் சேர்த்து கொடுக்கவும். கிளவு:—வேலை 1க்கு 1 மாஷா குவித்த ஜலத்துடன்.

(4) புளிப்பு மாதுளை வித்து, கருஞ்சோம் 5 நிரம் கெல்லி சுற்றல் 1 மிஸ்கால், ஸா கட்டி அரைத்த மல்லி 4 நிரம், கருவப்

விசினி 1 திரம் எல்லாம் அறைத்து ஞானமரக்கி கொண்டு வேளை 1 க்கு 2 திரம் சாப்பிடவும்.

குழந்தைகளின் வயற்றுப் போக்கிற்கு

(1) மாறளை மொட்டு, கருவூலை, பெரித்த கோம்பு, நுல் வொன்றிலும் கொஞ்சம், எரித்த போஸ்தகா கொஞ்சம் எல்லாம் அறைத்து வயிற்றெற்றவாறு கிதானமாய் கொடுக்கவும்.

(2) வயிற்றுப் போக்கை கிழத்தும். முன்றோர்வளின் அறு பவழறை வளச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—கொண்டைக்கட்டியை வறுத்தவாறு அறு மாலை 1 திரம் எடுத்துக்கொண்டு அதற்குச் சமமான அளவில் எலிப்புழக்கையைச் சேர்த்து அறைத்து வயிற்றை வயிற்று செய்து கொள்ளவும். வயிற்றுப்போக்கு கடுமையாகிருந்தால் 6 மாஷா அல்லது 4 மாஷா உபயோகிக்கவும்.

(3) அநிசுடயம் சற்றேறக்குறைய 1 மாஷா, தண்ணீரில் அறைத்து கொடுக்கவும். தும்ப 1 தோலா வலையில் அபாவத்திற் கேற்றவாறு கொடுத்து வயிற்றுப் போக்கை கிழத்தி விடும்.

(4) இரக்கைப்பழம் ஒருசட்டிகிலோ அல்லது கலயத்திலோ கீரப்பி அதன் வாயை அகலிக் கொண்டு மூடி, சிலேமன் செய்து, கெரூப்பில் வைத்து எரிக்கவும். பழம் எரித்து போனதும் அதை யெடுத்து காவியில் ஒருபிடி திண்ணவும். ஆகாரம்:— கஞ்சி, மோர், பயறு அல்லது அதன் பருப்பு தூவையம்.

தெல்லிக்காய் விற்பத்

இது வயற்றுப் போக்கை கிழத்தும். எலிக்காயுடன் சாப்பிட ஒமட்டலை நீக்கும். செய்யும் முறை:—தெல்லிக்காய் 4 திரம் இடித்து 3 பேர் ஐஸ்தில் வறவைத்து காய்ச்சவும். 3 பங்கு ஐசும் கண்டிப் போரும் தறுவாயில் கால் சேர் சர்க்கரையைச் சேர்த்து ஷப்பர் பாகிக்கு தயாரித்துக்கொள்க.

நாகப்பழம் விற்பத்து

வயிற் றொட்டலை கிழத்தும். இசுத்தபேதி, சித்பேதி, மூலக் கோனாறுகளைப் போக்கும். தேர்த்த நாகப் பழங்களை கிழித்து அளந்தின் சாற்றை கடுமையில் பண்ணிர் மூலமாயும் இல்லையெல் தண்ணீர் சம்பந்தமாயும் எடுத்துச் சாற்றின் கால் பங்கிற்கு நீரிலைவச்

சேர்த்து விற்பத்து காய்ச்சவும். பாகின் கடைசியில் மூங்கிலுப்பு, பண்ணிர் கீட்டறைத்த சந்தனம் கலத்து கொள்ளவும்.

மலப்போக்கை கிழத்தும் கஷாயம்

மெல்லி, கோரைக் கிழங்கு, வெட்டிபேர், சுத்த ஓவ்வொன்றும் 2 பூங்கா. யாவற்றையும் இடித்து அரைப்படி ஐஸ்தில் காய்ச்சவும். மூன்றிலொருபங்கு மீதியிருக்கையில் எடுத்து வடிவட்டி குடிக்கவும். பயறு, அல்லது மஞர் பருப்பு உபயோகிக்கலாம். தீர்த்த மருத்து மூன்று காவில் குணம் செய்யாவிடில் 2 வாரம் கொடுக்கவும். ரூட்டி உடம்புக்காரர்களுக்கு ரூட்டின் கொடுமை அதிகம் ஏற்பட்டால் கஷின் அளவை சற்று குறைத்துக் கொள்ளவும்.

மலப்போக்கை கிழத்த மேல்பூச்சுகள்

(1) மாமரத்தின் புட்டயை மோரில் அறைத்து தொப்பினிச் சுற்றிலும் பற்று போடவும். சில வைத்திய கிபுணர்கள் மேற்கூறிய சர்க்கரை காடியிலும், புளியிலும் அமைத்துப் பூசும்படி அறியுள்ளார்கள்.

(2) கெல்லிக்காய், வேயில் அறைத்து தொப்புள் சுற்றிப் பூசவும். அப்பால் அறைச் சுற்றியே இஞ்சி சாறு பூசவும். மலப் போக்கை கிழத்தி விடும். இது உபரிய சிகிச்சை.

(3) அத்தி மாத்தின் துளிர் தோலா 1, அறைத்துக் குடிக்கவும்.

(4) கெல்லிக்காய் செய்யில் வறுத்து தண்ணீரில் அறைத்து, தொப்பினிச் சுற்றிப் பூசவும். கொஞ்சம் போவற அபினியை இஞ்சி சாற்றில் குழப்பி 2, 3, துளிகள் தொப்பினிச் விடவும்.

(5) அத்திமாத்துப்பால் ஒரு மாஷா உட்கொள்ளவும்.

(6) முன்னங்கி விதைவை வறுத்து, ஒன்பது மாஷா எடை யுள்ள தேனில் கலக்கி சாப்பிடவும்.

(7) சேவாளத்தின் மருத்து உட்கொண்டதிலிருந்து வயிற் றப்போக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் 3 திரம் பாதம் பிசின் தலில் அறைத்து உட்கொள்ளவும். கருவம் பிசின், கருவம் கித்து சம கடை அறைக்கவும். ஸப்ஜா விதை அறைக்காமலேயே 1 தோலா, வீரக கஷாயத்தில் சேர்த்து குடிக்கவும்.

குடல் வேக்காட்டிற்கும் இரத்தபேதியுக்கும்

பாதாம் பிசின், கீரைமான் கொம்பு, இரண்டையும் சுட்டு சாம்பலாகிக் கொள்ளவும். வேளை 1 க்கு 1 மிளகாய் சாம்பிடவும்.

தேத்தினால் உண்டாகும் வளிக்கு

(1) ஸப்ஜாவிலைத ஐந்துதோலா, 4 சேர் பன்னிரிலோ அல்லது 3 சேர் தண்ணீரிலோ சாய்ச்சவும், அரை பங்கு தண்ணீர் களையும் போனவுடன் விலைதகளுடன் உட்கொள்ளவும்.

(2) பிஞ்சு கதிகசாய், வெம்பிச் வதுத்து சுக்கு, சோம்பு களையு 1 தோலா (இரண்டையும் சுட்டு) ஜீனியைக் கலந்து கொண்டு நேர காலத்திற்குத் தகுந்தாற் போல் கொடுக்கவும்.

குடல் வெந்திருந்தால்

(1) வில்வப்பழம், கத்தகாய்ப் சமனடை வரங்கிலவற்றை ஐரண்டாம் தயாரித்து கொடுக்கவும்.

(2) கருவப்பிசின் திசுத்தோலும் 3 மிளகாய், 11 சாய் வகையில் பொடி செய்து உட்கொள்ளவும். போக்கு கடுமையாக இருந்தால் போஸ்தகலைய பொடியாய் அமைத்து இரண்டொரு மிளகாய் எலையுத்துடன் பருகலாய், அத்துடன் கொஞ்சம் கருவம் கிசுதியும் சேர்ப்பது நல்லது.

வாய் நுங்குபெருக்கு மாத்திரைகள்

சுக்கு, சோம்பு, கலையகலா துண்டையும் வதுத்து, 2 திரம் அளவித்து அளவறையும் அரைந்த துண்டில் வெல்லுக்களையும் செய்வதாய் சேர்த்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்க.

குடல் வேக்காட்டிற்கு

(1) மங்கிக்காய் 2 திரம், அரிணி 1 திரம் கருவப்பிசின் 1 திரம் இலையகலா அரைத்து மிளகுக்குச் சரியான அளவில் மாத்திரைகள் தயாரித்துக்கொள்க. முறிபொருக்கு 2 மாத்திரைகள், பால்கருக்கு 1 மாத்திரை, கொடுக்கவும்.

(2) மங்கிக்காய் 4 பங்கு, அரிணி 2 பங்கு துமம் 1 பங்கு, கலையகலா அரைத்து உயிலை அல்லது வாய்ப்பறு அளவித்து மாத்திரைகள் உபயோகிக்கும் விதம்மா காலையில் ஒரு மாத்திரை,

(3) கருவிகாய் 1 திரம் அரைத்து கொஞ்சம் மோர் கலந்து கொடுக்கவும்.

(4) மாதாபித்தலையன், துருகுலிக் கொண்ட ஜனத்தில் அரைத்துக் குடிக்கவும்.

(5) பாதாம் பிசின் தண்ணீரில் கலையவைத்து காய்ச்ச கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து பருகவும்.

(6) பெரியகதுவளித் துளிரிகளை அரைத்து மாத்திரைகளாய் உருட்டிக் கொடுக்கவும்.

(7) கொட்டைப்பாக்கை சுட்டு தவிரில் கலந்து உட்கொள்ளவும்.

(8) ஸப்ஜா விதைகளை மண்பாத்திரத்தில் போட்டு, அதன் மீது 2, 3 துளி எண்ணெய் கறந்தி அடுப்பில் மோல் வைத்து சுற்று கிளக்கச்செய்து கொள்ளவேண்டும். இதை சாப்பிட்டிலா வாய்நுங்கிப்பெயும் அதனுலேற்பட்ட மலப்போக்கையும் சுட்டுப் படுத்தும்.

(9) ஜீரகத்தை அரைத்து தவிரில் மறதித்து கொடுக்கவும்.

(10) கருவப்பிசின் 4 திரம், ஜனத்தில் அரைத்து உட்கொண்டால் அதுவாயிற்றின் கடுப்பின் போதுள்ள ஆரம்ப நிலை காலத்தில் குணமாகிக்கும்.

வில்வப்பழத்தின் கந்திரபத்து

மலப்போக்கைதடுத்த இரப்பைக்கு கல்ல சக்தியைத்தரும்— வில்வப்பழத்தின் சதை 1 சேர் தண்ணீரில் கலையவைத்து காய்ச்சவும். இலம் 1 பாகம் கண்டப்போனவுடன் ஜீனியைச் சேர்த்து ஒப்பத்து தயாரித்துக் கொள்க.

வில்வப்பழக் கந்திராயம்

வில்வப்பழச் சதை காய்த்திருப்பினும் சரிஅல்லது பச்சையா கிருப்பினும் சரி ஒரு இரவுதண்ணீரில் கலையிட்டு அதிகாலையில் கந்திராயம் காய்ச்சிக் கொள்ள வேண்டும்.

பால்கருக்கு பல்முனைக்கும்போது வெளிக்கிப்போவதற்கு

(1) வில்வப்பழத்தின் சதை, கத்தகாய்ப், மாதாணப்பழக் கொடி கல்லாய் துண்டும் அளவற்று வண்டியைச் செய்த மிளகாய்

பால் வயதிற் குத்தக் காது கொடுக்கவும். பெரிய வலம்சப்பட்டை 6½ தோலா இடித்ததைத்து, 1½ தோலா சர்க்கரையில் தலத்து கொண்டு அதை ஒன்பது பாகமாய் வகுத்துக் கொள்ளவும். ஒரு பாகம் காலையில் மோருடன் சாப்பிடவும். மலப்போக்கு அதிகமாக இருந்தால் மாலையிலும் ஒரு பாகம் சாப்பிடவும்.

(2) ஜாதிகாயம், மாம்பழத்தின் பழையகொட்டைப் பருப்பு, வில்வப்பழத்தின் சதை, ஒவ்வொன்றும், அவசியத்திற்கேற்ப எடுத்துக்கொள்ளவும். அவைகளுடன் அபினியும் கொஞ்சம் போல் சேர்த்து வயிற்றின் மேல் பூசவும்.

(3) வறுத்தமுள்ளங்கி விதை 6 மாஷாவை அரைத்து, அதற்கு சமளடையாக தேனைக்கலந்து சாப்பிடவும். இது வயிற்றுக் கடுப்புக்கு தகுந்தமருத்து.

(4) பழையமாகக்கொட்டைப் பருப்பை எடுத்து அதற்கு சமளடையாக சோம்பைச் சேர்த்து பழைய சர்க்கரையுடன் சாப்பிடவும்.

(5) பழக்குத்தவாயிலுள்ள மாதுளங்காய் ஒன்றை கொண்டு வந்து அதை இரண்டாகப் பிளந்து, அச்சுறுன் ஜாதிகாய் ஒன்றைவைத்து அதில் கொஞ்சம் அபினியும் அடைத்து விடவும். பிறகு மாதுளம்பழத்தை ஒரு கயிற்றினால் அழுத்தமாகக் கட்டி செய்யில் பொரிக்கவும். சற்று முருவல் கொண்டவுடன் அதை எடுத்து, அரைத்து 9 மாஷா ஜாதிப்பத்திரி அதில் சேர்த்துக்கொள்க. இனி இலக்கைப்பழம் அளவிற்கு, மாத்திரைகள் தயாரித்து, காலையில் ஒரு மாத்திரை சாப்பிடவும், இரத்தப்போக்கு கீங்கும். மல உபாதையைத்தடுத்தும்.

(6) சுக்க, சோம்பு சமளடையறுத்ததைத்து தண்ணீருடன் தேவைக்குத் தக்கவாறு ஓர் சிதானமான அளவிற்கு சாப்பிடவும்.

(7) சுக்கு, சோம்பு வில்வப்பழத்தின் சதை, ஒவ்வொன்றும் 9 மாஷா, வெள்ளை கற்கண்டு 10 மாஷா எல்லாம் இடித்ததைத்து முதல் எண் 7 மாஷா, இரண்டாவது எண் 10 மாஷா, மூன்றாவது எண் 1½ தோலா தண்ணீருடன் கொடுக்கவும்.

குழந்தைகளுக்கு பச்சை நிறமாய் வெளிக்குப்போவது

(1) வெப்பத்தையுடன் மஞ்சள் வைத்ததைத்து சினை உருண்டையாக உருட்டி ஆசன வாயில்வைக்கவும்.

(2) காகப் பழத்தின்விதையை அரைத்து 4 தோலா எடுத்து அதற்குச் சரியான எடையில் சர்க்கரைச் சேர்த்து காலையில் 1½ தோலா, மாலை 1½ தோலா கொடுத்து வந்தால் 3 நாட்களில் வந்தகையை சித்பெதியும் சொஸ்த மாகிவிடும்.

(3) சோம்பு, மல்லி, கற்கண்டு மூன்றையும் அரைத்து சினை தோர்வைப்படியின் அளவிற்கு சாப்பிடுவதால் இரத்தம் வெளியாவதை சிறுத்தும், கபத்தை அறுக்கும், ஜுவாயிருத்தாலும் சிறுத்திடும்.

(4) வயிற்றுக்கடுப்பு, வெளிக்குப்போதல் கபம் தொல்லை முதலியவைற்றை உடனே கண்டிக்கும்:—தோல் கீக்கிய புளியல் கொட்டை ஐக்கையெடுத்து கனராய் அரைத்து விடவும், எலுமீச் சம்பழம் ஒன்றின் மேல் பாகத்தை அறுத்து அதன் விதைகளை எடுத்தெறித்து அதில் இந்த புளியல் கொட்டைமாவை அடைக்கவும், அடுத்தப்படியாக அதை அளவின் மீது வைக்கவும். பழத்தினால் ஒருநாள் கொடுப்பு உண்டானதும் அதை எடுத்து சோயாசிக்கு உறிஞ்சச் கொடுக்கவும்.

(5) எந்த மருந்தைக் கொண்டும் கீங்காமலிருக்கும் வயிற்றுக் கடுப்பின் போக்கையும் ஆண்டவன் கிருபையைக் கொண்டு கீறுத்திடும். தான்நீக்காய், ஒமம், சீரசம், ஒவ்வொன்றின் எடை 2½ தோலா வறுத்துக் கொண்டு அப்பால் செவ்வனே இடித்துக் கொள்ளவும். வடிக்கட்டி பிழித்தெடுத்த தயிர் சக்கையில் கொஞ்சம் பேரன்ற கன்றுப்பையும் பொடி பண்ணி சேர்த்து சாப்பிடவும். கொஞ்ச வேதிற்குப்பின் மூன்று பிடி சாதம் தயிர் விட்டு சாப்பிடவும். வெக்கிறை கன்றாய் ஆற்றி குடிக்கவும்.

இரத்த பேதிக்கு கைகண்ட பாகம்

பழக்காத மாதுளையைக் கொண்டு வந்து அதில் உள் விதைகளை எறித்து விட்டு, சீரத்தை அதில் அடைத்து மீண்டும் அதன் பிளவை மாவினால் அபினைத்து இட்டிவிடவும். இட்டிவிட்ட பின்பு

அதை கெடுப்பிலிட்டுச் சடவும். சுட்டான பின்பு ஒட்டினை மாவை அப்படிப்படுத்தி விட்டு, சாவைத் தழுவில் 4 அல்லது 5 தழைகள் மாதுறியுடன் சேர்த்து அறைத்து இலக்கையளவிற்கு மாத்திரைகள் உருட்டிக் கொள்ளவும். சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப உபயோகிக்க வேண்டும்.

இரத்தம் ஷணமே தின்று விடும்

கறகிச் சோட்டையை இறைத்து இறைக்கப்பட்ட சந்தை கொஞ்சம் தயிருடன் ஊட்டவே இரத்தம் வருதல் கின்றுவிடும்.

இரத்த பேதிக்கு

(1) ஜாதிக்காய் ஒன்றை நுண்ணமாய் சீவி அதை முட்டையில் வெள்ளைக் கருவுடன் கலக்கி தின்று செய்யவும். ஆகாரம்:—மோர் சாதமே கொடுக்க வேண்டும் பால்கட்கு பிராயத்திற்கேற்ற அளவில்.

(2) ஆட்டுப்பால் $1\frac{1}{2}$ சேர், ஒரு கிளான் டம்ளரில் ஊற்றி, அதில் எலுமிச்சம்பழம் அலாவாசியின் சாற்றைப் பிழித்து குடிக்கவும்.

(3) பச்சை மாதளம் பிஞ்சை (6 பிஞ்சுகள்) தண்ணீரில் அறைத்து இலேசான மசாலாவைக் கலந்து குழம்பாகச் செய்து அதிசி சாதத்துடன் சாப்பிடவும்.


(4) உலர்ந்த கருவம் பிசின் 10 மாஷாவை என்றும் அறைத்து கோதுமை மாளில் கலத்து ரொட்டி கட்டு, அதில் போதிய அளவிற்கு பசும் கெய்கை தடவி கொடுக்கவும். அல்லது பிசின் தண்ணீரில் காய்ச்சி அதில் சாதத்தை போட்டு கஞ்சிபோல கொடுத்தாலும் மலப்போக்கு கட்டுப்போம்.

(5) கருவப் பிசின், பாதாம் பிசின், இஸ்கோல் கிதை வகைக்கு 3 தோலா சர்க்கரை $1\frac{1}{2}$ தோலா எல்லாம் அறைத்து தூன் கெய்கை காவையில் 7 மாஷா அளவுக்கு குளிர்ந்த ஜலத்துடன் சாப்பிடவும்.

(6) வில்வப்பழம், முன்லெவப் பிசின், பழைய மாக்சோட்டைப் பருப்பு வகைக்கு $1\frac{1}{2}$ தோலா, ஜாதிக்காய் 1 அமினி கொண்டர் கடலியை, எல்லாம் அறைத்து குண்ணமாகி அரை

யமானபோது ஏறக்குறைய ஒரு கை கொண்டு அளவிற்கு உட்கொள்ள வகிற்றுப்போகவை கிடைத்திவிடும்.

சரீர சம்மத்தப்பட்ட நோய்கள் முற்றிற்று.



தாது சம்மத்தப்பட்ட நோய்களுக்கு

தாது நலத்தம்

இது ஆண் தன்மை குன்றிப்போவதாகும். இந்திரியம் குளிர்ச்சியின் பேரில் உறைத்து போயிருப்பதில் கஷ்டத்துடன் வெளி யாவதே அதற்குரிய அற்துறியுள். ஆண் தன்மை குன்றிப்போயிருப்பின் அகடக்கலால் குருணியாகித்தனையும் முட்டைகளையும் சாப்பிடலாம்.

தாது புஷ்டிதேக சுபாவத்தைச் சார்ந்துள்ளது. தேகபோக வியம் கல்ல கிளையில் இருந்து இராது கருவிகளும் சரிவர வேலை செய்யுங்கால் தாது புஷ்டியுடைய நிலையையும் சீர்கேடு அடைவாதிருக்கக் கூடும். இவ்வேபேல் தாது புஷ்டிக்கும் பவலினை ஏற்படுத்தல் இயற்கையாகும்.

சித்தினையில் இந்திரியம் கமேச்சையாம் வகவிதமாய் விடுவதுண்டு. இத்தகைய கோளாறு இந்திரிய கெட்டிப்படாமற் போவதைக் கொண்டுள்ளது. இத்தகைய கோளாறு உள்ளவர்கள் ஷூசாதத்தில் புருக்குஞ்சு, கக்கு, ஜீரகம் அகிகை சேத்துக்கொள்ள வேண்டும். உஷ்ணமான பதார்த்தங்களை உபயோகிக்க வேண்டும். சிதன பதார்த்தங்கள் கூடாது. உதாரணமாக கக்கு, தேன் போல் மலம் குடான பதார்த்தங்கள். பருப்புக் கோ, கோஜா புஷ்பம் முதலியன சிதன முன்னவை.

தாது புஷ்டிக்கு குரணங்கள்

(1) லக்ஷியக்கு நுயல்: வால்மினையை பாலில் கொடுக்க வைக்கவும், பால் கண்டிப் போனதும் அதை எடுத்து உலர்த்தி,

அமைத்து ஞானஞ் செய்யவும். ஐடாயசியை உலர்த்தி யமைத்த பின்னர், அதற்குச் சரிபாண அளவில், சர்க்கரைச் சேர்த்து, அது தினமும் 1 தோலா எடை பசும் பாலுடன் சாப்பிடவும். இதனால் தாதுவிர்த்தி உண்டாகும்.

(2) மிஸ்தா பறுப்பு 2 தோலா, கங்கண்டு 2 தோலா புதிதாய் அமைத்த சுக்குத்துள் 6 மாஷா, ஒன்றாய் சுலத்து கொண்டு தினம் 1 தோலா தேனில் மத்தித்து உடுமாயின் பங்கா ஓர் சிறித அளிற்கு அதன் மேல் தூவி 3 நாள் சாப்பிடவும்.

வினாவில் வங்கலிதமாவதற்கு

(1) கருவமரத்தின் பச்சைக்காய் கிழலில் உலர்த்தி அத் துடன் கீர்முள்வி விதை, கருவம் பிசின், வறுத்த கடலைமாவு, யாவும் சம எடையாகச் சேர்த்து சம எடையான கங்கண்டுடன் காலையில் ஒரு பிடியளவிற்கு சாப்பிடவும்.

(2) பாஸ்பழச்செடியின் பட்டை பெரியவளவப்பட்டை பிசின் பட்டை எல்லாவற்றிற்கும் சமமான எடைக்கு சர்க்கரை வேலை 1க்கு ஒரு தோலா பசும்பாலுடன் சாப்பிடவும்.

உடைத்த தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும் மாத் திரை

(1) புளியங்கொட்டை 3, 4 தினங்கள் வரையில் தண்ணீரில் ஊறவைத்து அதன் தோலை நீக்கிய பின்னர் உலர்த்தி அதன் தூவின் கடைக்கு வேலைச் சர்க்கரையைச் சேர்த்து கடலியளவிற்கு மாத் திரைகள் உருட்டிக் கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 2 மாத் திரைகள்

(2) கருவ மரத்தின் பட்டை, அதன் காய், அதன் பிசின், அதன் தூவிர் எல்லாம் அமைத்து வஸ்திரகாரஞ் செய்து, சர்க்கரையைச் சேர்த்து வேலைக்கு ஒரு தோலா எடை உட்கொள்ள திரை ஸ்கலிதத்தை கிளர்த்திகளும், தாது கெட்டிப்படுத்தும்.

(3) அத்திரைத்தின் வேர்கள், பூமிக்குள் திமக்கி கிருப்ப சுற்றின் மேல்பட்டை, மெருஞ்சி, கீர்முள்வி விதை, தாமரைவிதை வகைக்கு 5 தோலா பாதாம் பிசின் 3 தோலா, இடித்தவைத்து அதன் ஞானம் ஒருபிடி பசும்பாலுடன் சாப்பிடவும். இது கீத்து பிசின் தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும்.

(4) கடல்பாசி, ஓபம், தனித்தனிமே 5 தாம், சுட்ட சிமை அழுவானிவிதை 3 தாம் எல்லாம் இடித்து ஞானமாக்கி, ஒரு தாம் அளவிற்கு காலே மாலை ஜலத்துடன் உட்கொள்ளவும். சாப்பிடும் வரை பத்தியம்:- புளிப்பும் வாயுபதார்த்தங்களும் தள்ளுபடி.

(5) சமுத்திரப்பச்சை, கீர்முள்வி, வய்வானிவிதை, ஒவ்வொன்றாய் 5 திராம் அமைத்து ஞானமாக்கி வேலை 1க்கு 2 தாம் அளவில், அதிகாலையில் பன்னிளக்கிவுடன் சாப்பிட வேண்டும். பத்தியம்:- புளிப்பும் வாயுசம்பந்தமான பதார்த்தங்களுமே.

(6) எரிலில் உள்ள பாசியை படிக்காரத்தின்மேல் வைத்து. (கொம்பின்மேல் வைக்கப்பட்டுள்ள சட்டியில் போட்டு) எரிக்கவும் எரித்துள்ள சாம்பல் அளவிற்கு சர்க்கரையைச் சேர்த்து, தினம் 4 மாஷா சாப்பிட கீத்த தாதுவை இறுத்தும்.

(7) ஆலமரத்தின் பழத்தைக்கொண்டு வத்து உலர்த்தி, பசும் பாலுடன் சாப்பிட தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும்.

(8) அளவற்ற தாது புஷ்டியைத் தரும். சம்போகத்திற்குப் பின்னர் சேர்வு ஏற்படாது. தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும் கை உண்ட முறை எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:

சிமை அழுவானி விதை 5 திராம் அரைவாசியில் வறுக்கவும். போஸ்தகா, என்னு இவையாவும் வகைக்கு 2, திராம் பழைய வெல்லம் 20 திராம், முதலில் மூன்று சாக்குகளையும் சுத்தமாய் எடுத்ததைத்து வெல்லத்தின் கன்றாய் இடித்துக்கொள்ளவும். அப்பால் அதை ஏழுபாகமாகச் செய்து ஒவ்வொரு பாகத்தின் ஒவ்வொரு மாத் திரை செய்துகொள்ளவும். சம்போகத்திற்கு முன் ஒரு மாத் திரை உட்கொள்ளவும்.

(9) ஊமத்தைவிதை 6 மாஷா, மிளகு 6 மாஷா இரண்டையும் அமைத்து வஸ்திர காயஞ் செய்து அத்துவரினின்றும் மாத் திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். கால்தோறும் ஒரு மாத் திரை சோம்பு கஷாயத்துடன் உட்கொள்ளவும். இதுவும் கீத்த தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும். கான்பட்ட கோளாறையும் ஒரோகாலில் ஞானப்படுத்தும்.

தாதுவிர்த்திக்கு தாக்குப் பூச்சி பாகம்

சாக்குப் பூச்சியைக் கொண்டு வந்து அதன் உள் வசடை எடுத்து சுத்தம் செய்து உலர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். அதன் 6 தாம் கடைபடின் ஓரம் 2 தாம் சேர்த்து அறைத்து, 4 தாம் வெள்ளை ஆடல் கலந்து ஒரு தோலா கடைபுள்ள மரத்தி ளாகக் கருட்டி, வேலை 1க்கு 1 மாத்திரை வீதம் 21 நாள் சாப்பிடவும்.

வேறு

(1) கெருஞ்சியை சர்க்கரை, பசு நெய்வில் சேர்த்து கொஞ் சம் தேனுடன் உட்கொண்டதும் அதன்மேல் பசும் பாலும் குடிச் சவும், குடித்த இரவே தாது புஷ்டியின் உணர்ச்சி தேரியத் தொடங்கும்.

(2) கரும் காமத்தையில் பூக்கியைக் கொள்வென்று உலர்த்தி கடலியளவுக்கு மாத்திரைகள் தயாரித்து வேலை 1க்கு ஒரு மாத் திரை விழுங்கிக் கொள்ளவும், இது தாது புஷ்டிக்குரியது.

(3) கச்சிக்கரி, நிலப்பனங்கிழங்கு தண்ணீர் விட்டான். கிழங்கு, சுக்கு எல்லாம் ஒரே எடைமில் வாய்சி, ரூரணம் செய்து கொண்டு, தினம் ½ திரம் பசும்பாலுடன் அருந்தவேண்டும். தாது விர்த்திக்கும்

தாது விர்த்திக்கு

வெல்லம் ½ சேர், என்னு 2 தாம், சுட்ட அமுக்குராக்கிழங்கு 4 தாம், சுடாத மேற்படி கிழங்கு 4 தாம் எல்லாம் ஒன்றாக இடித் தறைத்து 14 உருண்டைகளாக உருட்டி நிளசரி ஒன்றை சாப் பிடவும்.

தாது விர்த்திக்கு

ஓமத்தின் உயி ½ சேர், முன்னங்கி விதை, வறுத்தக்குந்து கடலை, என்னு தனித்தனியே ½ சேர் அறைந்து ரூரணஞ் செய்து அதுநிளவும் 1 தோலா சாப்பிட்டு வரவும்.

நீத்துபோன தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும்

(1) புளிமங்கொட்டைமாவடி அருவேலமரத்தின் இரண்டையும் அறைத்து சர்க்கரை பாகுடன் உலர்வ தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

உயமோகிக்கும் அளவு 1 முதல் 2 தோலா வரைவின்

(2) ஆளவிலுது, ஆலாமரத்தின், பலாப்பழச்சேடி வேரின் பட்டை, பெரிய நறுவளி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு யாவும் சாமரடை அறைத் ரூரணத்தைத் வேலை 1க்கு 1 தோலா பசும் பாலுடன் புதிக்கவும்.

தாதுபுஷ்டிக்கு திராசை பாஜூதின்

மூன் எலவன், சாலாமரீ, சுருத்திராப்பச்சை, நிலப்பனங் கிழங்கு, பாதம் பழுப்பு வளைக்கு 5 திரம், சுக்கு, சிந்திரைத் தனித்தனியே ½ தாம், ½ சேர் திராசை, ஜிவி சேர் 1 பாது செய்து மேற்கூறிய சாக்குகளுடன் பாஜூதின் (வேகம்) தயாரித் துக் கொள். 2 தோலா முதல் 3 தோலா வரைவின் பசும்பாலுடன் சாப்பிடவும்.

வாதுருவை மாஜூதின்

வாதுருவை, தாளமபுரிதை, கிராம்பு, குங்கமப்பூ வளைக்கு 1 தாம் சிமை அழுவளி விதை ½ தாம், கஸகா வெள்ளை 5 தாம் வெள்ளை என்னு 4 தாம், முட்டையில் மஞ்சட்கருவு 5, தேனும் ஜிவியும் சாக்குகளின் கிளவக்கு 4 பக்கு; முறைப்படியே மாஜூதின் தயாரித்துக்கொள்ளவும்.

வாதுருவை இரண்டாவது பாகம்

வாதுருவைவை கையாத்துரைச் சாத்தின் வறவைத்து ஜலத் திரம் பசும்பாலுடன் காய்ச்சவேண்டும். பாக்சண்டிப்போளவுடன் அதை எடுத்து அறைத்து தேனில் மாஜூதின் செத்துக் கொள் ளவும்.

முதல் காள் ½ திரம், அடுத்தநித்த காஸிக்குந்து இறைப்போல் அரைவரைதிரம் கட்டிக்கொண்டு 8 திரம் அளவுக்கு எட்டி விடவும். 40 நாள் சாப்பிட்டு வர வயோதிகரும் மௌனம் பரு வத்தை மடைவர்.

மாஜூதின்

அக்ஷிரகாரம், கிராம்பு, சுக்கு தனித்தனியே 2 தோலா, கொழி முட்டையில் மஞ்சட்கரு 25, தேன் தாது திரம், மாஜூதின் தயா ரித்துக் கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 4 திரம்.

வெங்காய மாஜுவின்

வெள்ளை வெங்காயச் சாறு ரே 1, தேன் ரே 1, அடுப்பின் மேசேற்றி பாகு எடுத்ததும், சாலா மிஸ்ரீ, சுக்கு, வெங்காய விதை, ரீர் முள்ளி விதை, நிலப்பனம் கிழங்கு, தண்ணீர் விட்டாங்கிழங்கு வகைக்கு 1 சேர் இடித்து தேனில் மாஜுவின் தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

பூசனிக்காய் மாஜுவின்

தீவிரங்குறித்ததற்கு இன்றியமையாதது

தற்பூசனி விதை, தண்ணீர் விட்டாக் கிழங்கு, பூசனிக்காய் ஒவ்வொன்றும் 1½ சேர், சிது சுற்றாழை சதை 2, வால் மிளகு தேலா ½ யாவற்றையும் அறைத்து ½ சேர் சர்க்கரை பாகுடன் மாஜுவின் தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

வெள்ளைப் பூண்டு மாஜுவின்

தேசக் குளிர்ச்சி புள்ளவர்களுக்கு கல்ல குணம் தரும்; தாது புஷ்டி உண்டாகும். வாத நோய்களுக்கும் அரிய பாகம். 1 சேர் வெள்ளைப் பூண்டை உரித்து பாலில் கொதிக்க வைக்கவும். பால் சுண்டிப்போனதும் அதை எடுத்து மெயில் வறுத்து தேனில் மாஜுவின் தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

வைகலித்தந்திற்கு மாஜுவின்

இது தாதுவை செட்டிப் படுத்தும்.

பிஞ்சு சடுக்காய், தான்றிக்காய், கேலிக்காய், பொறித்த கஜுலிர் காய், சாலா மிஸ்ரீ, மைதா, கெருஞ்சி, தண்ணீர் விட்டான், நிலப் பனங்கிழங்கு, ஐடாமாஸி, பூனைக்காலி விதை, தாமரை விதை, பெரிய கதுவளி, வெப்பா எரிசி, புளிகுங்கொட்டை மாவு வகைக்கு 2 திரம். பூ மாதிரை, ஓயம், மல்லி, மூங்கிலுப்பு, ஆலந்துளிர், சிமை அழவணி, பெரிய லவங்கப் பட்டை, அழுக் குரா, முள்ளிவெ, கருவக்காய், தாமம் கித்து வகைக்கு 1 பின் கால், ஜீனி மூன்று பங்கில் பாகு செய்து மாஜுவின் தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

தாது புஷ்டிக்கு குணம்

வெல்லம் திரம் 2, என் 7 திரம், கசகசா 5 திரம், பருத்திக் கொட்டை பருப்பு, பெரிய லவங்கப் பட்டை, வெப்பாலரிசி, வகுதாம், கற்கண்டு தீர்த்த யாவற்றிற்கும் 30 எடை வாரி. எல்லாவற்றையும் அறைத்து குணமாகிக் கொள்ளவும்.

மேலே 1க்கு ஒரு தோலா, பகம் பாதுடன் உட்கொள்ளவும்.

கோழி முட்டை ஹல்வா

தாதுவை செட்டிப் படுத்தும். கோழி முட்டை 2, ஜீனி திரம் 2, மெய்நீர் சுலக்கிக் கொண்டு அடுப்பின் மேல் ஏற்றி காண்டியைக் கொண்டு கிளிக் கொண்டிருக்கவும். தயாரானதும் எடுத்து ஆசனிடெத் தின்னவும்.

இவைகள் சுவைற்ற தாதுபுஷ்டியைத் தரும்.

(1) கடலைப் பருப்பு 2 தோலா தண்ணீரில் சாறு வகுத்து, அத்துடன் சுக்கு 1 மாஷா, தலகஸா 1 மாஷா, எல்லாம் அறைத்து தேனில் கலக்கி காலையில் சாப்பிட்டுவா தாது விரித்திற்கும்.

(2) கடலை வறுத்து அதற்கு சம எடையாக பாதாம் பருப் பைச் சேர்த்து அறைக்கவும், கால் மாலை சாப்பிட தாது விரித்தி யாகும்.

(3) சர்க்கோலா பருப்பு, திராட்சை இல்லிரண்டையும் ஓர் இரவு துலத்தில் ஹலவைத்து, கொஞ்சம் சர்க்கரையுடன் தின்று வந்தால், அதிகரிக்கத் தக்கவாறு குணமறிவலாம்.

(4) தேனை கொதிக்க வைக்கவும், அதன் மேல் உண்டாகும் அழையை எடுத்து அதில் முள்ளங்கி விதைகளைச் சேர்த்து காலே யிலும் இரவு படுக்கைக்குச் செலுவும் போதும், சாப்பிட்டு வரவும்.

(5) 4 திரம் அழுக்கராக் கிழங்கை சிவி துண்டித்து, 1 சேர் பாலில் வேகவைத்து பின்னர், 10 திரம் கற்கண்டைச் சேர்த்து காலே மாலை சாப்பிட்டு வந்தால், தேசத்தில் மேலரி ஏழ்வுகேது டன் தாது புஷ்டியும் அதிகரிக்கும்.

(6) சம்போகத்திற்குப் பின் 4 திரம் வெல்லத்தைத் தின்று தேசத்தில் சேர்வு இருப்பதாகத் தெரியாதேன கொல்லப் பட்டிருக் கிறது.

(7) ஆமணக்குச் செடியின் துளிர் 1½ சேர், ½ சேர் இறைச் செவ்வெள்ளை வெங்காயத்துடன் சமைத்து 8 நாள் சாப்பிட்டு வரவும்.

(8) கஸ்கலா தோலா 2, சுக்கு நிரம் ½ அறைத்து, தேன் 4 தோலாவுடன் 40 நாள் சாப்பிட்டு வரவும்.

(9) 2 தோலா பருத்தி வித்தை ½ சேர் பசும் பாலில் காய்ச்சி உட்கொள்ளவும்.

(10) இலத்தப் பழத்தின் கொட்டையை அரைத்து அதை பசுமைய வெல்லத்தில் சேர்த்து சாப்பிட்டு வரவும்.

(11) பத்தாஷா அல்லது ஜீவியில் சில துளிகள் ஆலம் ரசில் கிட்டு சாப்பிடவும்.

(12) கஸ்கலா 2 தோலா, தேன் 4 தோலா, சுக்கு நிரம் ½, ½ சாக்கு இரண்டையும் தூள் செய்து 40 நாள் சாப்பிட்டு வரவும்.

(13) மரம்பழச் செடியின் மேல் பட்டை, பெரிய கறுவளி பட்டை, மரம்பட்டை ஒவ்வொன்றும் சம எடையில் எடுத்து வரும் அரைத்து அதற்குச் சமமான எடையில் சர்க்கரையைச் சேர்த்து தண்ணீருடன் சாப்பிடவும்.

(14) ஒமம், என்ரு, சம எடை கஸ்கலா, ஒவ்வொன்றில் மூன்று பங்கு பின் வெல்லத்தில், 3 சாமாணையும், அரைத்து உட்கொள்ளவும். வேலை 1க்கு ஒரு தோலா எடை சாப்பிடவும்.

(15) ஒவ்வொரு நாளும், காலை 10 மணிக்குத் தித்திப்பான மரம்பழம் சாப்பிட்டு அதன் மேல் பசும் பால் குடிக்கவும். அதை பானில் 2, 3, கதுலிர் காயும் சேர்க்கலாம். அது சுக்கு வேக வலத்த பாலாக விருந்தால், மேலாகும்.

மரம்பழ ஒற்றல்வா.

(16) தித்திப்பான மரம்பழங்களின் சாற்றை எடுத்து, 3 சேர் தனிப்படுத்திக் கொண்டு, ஜீவரி 1 சேர், பசுமேய் ½ சேர், பசும் பால் 1 சேர், தேன் ½ சேர், சுக்கு 1 தோலா, வால்மிளகு ½ தோலா, தாண்டிர் விட்டசுங் கிழங்கு 1 தோலா, காலாமில்லி, பாதாம் பருப்பு ஒவ்வொன்றும் 4 தோலா, சித்தரத்தை 6 மாஷா

பாமனே சுருக், பாமனே சுபேக், ஒவ்வொன்றும் 1 தோலா கன்ருக் அரைத்து முசலில் 1 தோலா மரம்பழச் சாற்றையும், சர்க்கரையையும், பாலையும் சேர்த்து, வர்பத் காய்ச்சிக் கொள்ளவும். மிகு, சாக்குகளை மெய்ந் வறுத்து அதை வர்பத்தில் சேர்த்து, ஹர்வா தயார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஆண்மை யற்றவர்களுக்கும் ஆண்மைத் தனத்தை

ஆளிக்கத் தக்க பாகம்

(1) அரிணி, போஸ்தா தனித்தனியே 3 திரம், ஒமம், சுக்கு, ஜாதிக்காய், அக்கிராசாரம், கிராம்பு, திப்பிலி, மிளகு வகைக்கு 1½ தோலா, குரா சாணி ஒமம், வாதாஞ்சை, கோரைக் கிழங்கு வகைக்கு 3 தோலா மரம்பழமும் அரைத்து, மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். இம்மாத்திரைகளை வேலை 1க்கு 7 மாஷா வகையில் கொடுக்கலாம்.

(2) கெருஞ்சி அரைத்து சர்க்கரை, பசுமேய், தேன் எல்லாம் ஒன்றாகக் கலந்து சாப்பிட்டு அதன் மேல் பசும் பால் குடிக்கவும்.

நாறு புஷ்பத்திற்கும் பசுக்கும்

(1) வெல்லிக்காய் கத்தகம் மூக்கொட்டை சாற்றை விட்டி அது தடிப்பான பதத்திற்கு வகுளவும் அரைக்கவேண்டும். தினசரி 1 அரிசி எடை 15 நாள் சாப்பிட்டு வரவும்.

(2) கொழி மூட்டை உடைத்த மூட்டை வேண்டிய அளவு விற்ற எடுத்து தண்ணீரில் வரவைக்கவும். அப்பால் அதன் உள்ளில் படர்ந்து மூட்டையிருக்கும் சுவை அப்படிப்படுத்திவிட்டு அதில் எதுமிச்சம் பழச்சாற்றை சிறைத்தனன்றித் திழியவும்; அதாவது சாறு ஏறக்குறைப லுர் அங்குலம் திருக்கவேண்டும். சாறு முழுதும் மூட்டை மூக்கில் கவர்த்து போகும் வரையில் அதை முடி பத்திரமாய் வைத்திருத்தல் வேண்டும். இம்மாத்திரைகள் முசலில் சாற்றை 3 தடவைகளில் விட்டு எடுத்த பின்னர் மேற்படி சாமாணை ஒரு மண்கலையில் போட்டு சீமைன் செய்து 3 தடவைகளில் அக்கலையத்தை விட்டி கலையில் போடும் வைத்து எரிக்கவும். 3 தடவைகளில் அவ்வாறு செய்த பின்னர் அது வெள்ளை பஸ்பமாகி விடும். அதை எடுத்து 2 ருந்து மணி எடை தேனில் குறைத்து சாப்பிடவும். பத்தியம்:—வாஷு பதார்த்தங்களும் புஷ்பமும்

கூடாது இது கீத தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும். விசையில், ஸ்கலித மாவதை கிதுத்தும். எதிரியின் மர்மஸ்தானத்தையும் குறுகலாக்கும்.

(3) எருக்கன்கூடும் ஊமத்தையப்பூ, கிலப்பனாகிழங்கு, அழகணைவிதை வகைக்கு 5 டிரைக் புதுமைத்து மெய்யில் கலந்து கொண்டு 15 டிரைக் தேனேக்கொடுத்து ஒரு டிரைக் அளவிற்கு சாப்பிட்டு அதன் மேல் பால் குடிக்கவும். இது தாதுவை கெட்டிப்படுத்தும்.

தாது தஷ்டத்தால் ஏற்படும் நரம்பின் சேர்வுகளுக்கு மேற் பூச்சுகள்.

(1) ஆண் குறியின் சேர்வை கீக்கும் :—

பூண்டை அலசி எண்ணெயில் வேகவைத்து, கொதிப்புக்கு வந்ததும் அதை இறக்கி, கடுகு, எலுமிச்சம் விதை, வாழைநூலை ஒவ்வொன்றும் இடித்துப்போட்டு அந்த எண்ணெயை எரித்து, அதை ஆண்குறியின் மேல் தேய்த்துவா சேர்வு கிங்கி வீடும்.

(2) ஒரு சாண் தீன்முள்ள வஸ்திரத்துண்டி டிரைண்டி சேர் ஊமத்தைத் தாற்றில் 21 வள்ளலையில் ஊமவைக்கவும். சாறு அத் துணித்துண்டி கலந்துகிடும். அப்புறம், 5 திரை கல்லெண்ணெயில் அதை போட்டு அடிப்பி மேற்றி இலேசாய் எரிக்கவும். பிறகு வஸ்திரத்துண்டை வெடுத்து மாதொரு இரும்புமயிரில் தொங்கவிட்டு அதன் சிழாக ஒரு சிறு வாய்கன்றை கோம்பையை வைத்து விடவும் இனி அத்தாண்டை கொளுத்தி விடவே அத் துண்டிலிருந்து தைலம் சொட்டு சொட்டாய் கசிந்து பாத்திரத்தில் விழும். அத்தைலத்தில் 2 சொட்டை எடுத்து இடைவிடாது 4 நாள் வரையில் மர்மஸ்தானத்தின் மேல் தேய்த்து வருக.

(3) வசகவி 2 திரை முள்ளங்கி மிகை ½ திரை, தேர்வாளம் பருப்பு ½ திரை எல்லாம் 1½ சேர் எண்ணெண்ணெயில் கன்றாக அறைத்து அதனை மேலுக்கு பூசுவாவும்.

(4) கல்லெண்ணெய் 6 திரை இள கெருப்பில் எரித்து பூரி திரை சிலப்பு, ½ திரை அறைத்து அதில் கலக்கவும். அசுரகுப் பின்னர் வெங்காரம் கேட்டிடம் கசப்பு, தனித்தனியே 1 திரை அதில் சேர்க்கவும். அடுத்தபடியாக சம்பங்கித்தழைகளின் சாற்றை

கலக்கி அத்துடன் எரிக்கவும். மீர் கண்டிப்போன பின்னர் தைலத்தை தேய்த்து அதன் மேல் வெற்றிலை வைத்து கட்டி விடவும்.

(5) சில தேனிக்களை கல்லெண்ணெயில் எரித்து அந்த எண்ணெயை ஆண்குறியின் மேல் தேய்த்துவா காரம்புகளுக்கு விசேஷ சக்தி உண்டாகுமென வரையப்பட்டிருக்கிறது.

(6) கண்டங்கத்தரி இலைகள், கடுகு எண்ணெய், தனியே 4 திரை, கட்டு வாய்க்காலி இல்லையேல், எத்தகைய தேன், ஆயிலும் சரியே முதலில் எண்ணெயை எரித்து இலேசாக அறைத்த பிள்ளைகளையும் தேனையும் அதில் போட்டு எரித்து துணியைக்கொண்டு வடிகட்டிக்கொள்ளவும். இந்த எண்ணெய் ஒரேயொருரத்தியளவிற்கு வெற்றிலையில் தடவி ஆண்குறியின் மேல் கட்டி வரவும்.

(7) அடக்க ஸ்தலங்களிலும் மாமரங்களின் மீதும் சஞ்சரித்துவரும் கட்டெறும்புகளைப் பிடித்து சம்பங்கி எண்ணெயில் போட்டு, எண்ணெய் வைக்கப்பட்ட பாட்டிலை, கார்க்கெய்து கார்பது கான் வெய்யிலில் வைத்தெடுத்த பின்பு அக்க எண்ணெயை தேய்த்து வரவேண்டும்.

புஷ்டியைத்தரும் இன்ப உணர்ச்சி ஏற்படும்.

(1) வெள்ளை சம்பங்கி புஷ்பச்செடியின் தழைகளை அறைத்து அதன் சாற்றை எடுத்து, கல்லெண்ணெயில் எரிக்கவும், தனி எண்ணெய் தங்கி விட்டவுடன் அதை எடுத்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வைக்கவும், சம்போகத்திற்கு இரண்டொரு மணி சேர்த்திரு முன் அதை மர்மஸ்தானத்தின் மீது தேய்த்து அதன் மேல் வெற்றிலைக்கட்டி விடவும்.

(2) மீர் அட்டைகளை பிடித்துக்கொண்டு வந்த அவற்றுள் 7 அட்டைகளை 1½ சேர் எண்ணெண்ணெயில் போட்டு எரித்து அந்த எண்ணெயை வடிகட்டி மேற்சொல்லியபடியே தேய்க்கவும்.

தாதுவிர்த்திக்கு மேல் வஸ்திரக் கட்டு

(1) ஒரு மெல்லிய வஸ்திரத்தை திருக் கள்ளிப் பாலில் 3 முறை களைத்து உலர்த்திக் கொள்ளவும். அப்புறம் 3 முறை வெங்காயச் சாற்றில் களைத்து உலர்த்திக் கொள்ளவும். பிறகு அந்த

துணியை அல்லி எண்ணெயில் ஓர் இரவு முழுவதும் ஊறவைத்துக் கொள்ளவும். இனி தனியின் பாகத்தைச் சலித்து ஆண்டுரின் எண்ணெயில் வெண்ணெயைத் சேர்த்து அந்த எண்ணெயைத் துண்டை 4 மணிதோறம் வரையில் கட்டியெண்ணெயை விட்டுவைக்கவும். அவசியமாயின் மூலநிலைமும் அவ்வாறே செய்யவும். துணியை எவ்வேறும் அவசிய எண்ணெயில் களைத்திருக்கச் செய்யவும்.

(2) எருக்கன்பால் சேர் ½, சுத்தமான தேன 1½ செர் இரும்புத் தாச்சியில் போட்டு இரும்பு உலக்கையைக் மேன்மேலும் அறைத்துக் கொண்டு போகவும். பிசுபிசுபிசு காரணத்தால் தாச்சி குதலையில் ஓட்டிப்போட்டி தளையிலிருந்து மேலே கிளம்பும் வகையில் அறைக்கவும். 'பிறகு அதில் அரிணி 4 மாஷா போட்டு அறைத்து அவசியமானபோது குறியின் தலையை ஒதுக்கி தேவை வேண்டும். அதன்மேல் வெற்றிலைச் சுத்தி கட்டவும். ஒருமணிதோறம் சென்றபின், கழலி விட்டு, பசுமேய் பூசுவேண்டும். 3 நாள் இப்படியாகச் செய்துசொல்லும்.

(3) ததுவை தவயம் தேர்ப்படுத்திக் கொண்டவர்களுக்கும் அதன் பரணத்திற்கும் அடியில் கண்ட மூலநிலைமையோடு மாறும்:—

எருக்கன்பால், பசுமேய் அதற்கு சமளடை, இரண்டையும் சேர்த்து 12 ஜாமம் அறைத்து ஓரேயொரு மத்தி அளவிற்கு குறியின்மேல் தடவவும். சிலர் அதில் தேனையும் கலந்து கொள்ளுகிறார்கள், வேறுசிலர், 2 தாம் எருக்கன் பாலில் ஒருதாம் கெய்யைச் சேர்த்து எரித்து ஒரு குச்சியால் கிளறித் கொண்டிருந்து, பால் கண்டிப்போனதும் அறைத வடிவட்டி. அதில் 3 ஆக்திஷா சாராயத் தைக் கலந்தவற்றதின், அதனை குறியிடை தேய்த்து அதன் மேல் பெரிய மயவளிக் தளையையக் கட்டி ஒருமணி தோற்றிக்குப்பின் அளித்து விடும்படியாகவும் சொல்லி யிருக்கிறார்கள்.

(4) லோடி சோக்கடிப பிராயத்திற்கு எட்டிராத கறுப்பு சேலை வந்தா செய்து (அயத்து) அதன் துரித்தத்திற்கு சமளடையாக சரியான பிராயமுள்ள கழுத்தை இரத்தத்தையும் கலந்து குறியின்மேல் தேய்த்து காற்றில் உலரச் செய்யவும். 3 தடவைகளில் இப்படியாகச் செய்யவேண்டும். முதல் தடவை அதில் எரிச்சல் உண்டாகும். இரண்டாவது தடவையில் எரிச்சல்

குறைவாக விருக்கும். மூன்றாவது தடவை எரிச்சலே இராது. ஆனால் சலிக்கொண்டுத சக்தியின் உணர்ச்சி ஏற்படும். ஆயினும் அவ்வுணர்ச்சி ஏற்பட்ட முதல் காளிலேயே அதற்கு இடங்கொடாமல் சிலகாட்களுக்கு பின்னர் சம்போசம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

(5) காக்குப்பூச்சி தோலா-1 பசுமேய்-2 தோலா, இரண்டையும் சேர்த்து 2 ஜாமம் கலவத்திலறைத்து அதில் கொஞ்சம் பிபாஸ் எடுத்து குறியின் மேல்தேய்த்து அதன்மேல் அருளிஇலை அல்லது ஆமணக்கிலை கட்டிவிடவும்.

(6) விசேஷ இன்பத்தைத் தரும்:—உயிருள்ள பட்டுப்பூச்சி அதன் எடைக்கு தேன்குடி (மெழுக்குதுடை) இரண்டையும் என்னெண்ணெயில் அறைத்து பூசவேண்டும்.

(7) ரசம் 3 தாம், பசுவின் பித்தம் 12, ½ செர் கையாத்துரைச் சாத்தில் இரும்பு தாச்சியில் போட்டு இரும்பு உலக்கையைக் கொண்டு அறைக்கவும். அறைக்கும் காலின் துலையில் காலறு செய்யு காலைய மொன்றையும் அமைத்து 6 நாள் வரையில் அறைக்க வேண்டும். மாத்நிலைகள் உருட்டிக் கூடிய பதத்திற்கு வந்ததும் காட்டு இலத்தைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்நிலைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். அவசியத்தின் போது ஒருமாத்நிலை எச்சலில் தேய்த்து பூசவேண்டும்.

(8) தலையில்வளிக்கும் தவளை மொன்றைப் பிடித்து அதைக் கொண்டு சிழலில் உலர்த்தி அதன் தலையையும் வயிறையும் அறுத்து கன்றாய் தூள்செய்து, ஐதிக்காய் 1 குங்கமப்பூ 2 மாஷா, இந்த இரண்டு சரக்குகளையும் சேர்த்துறைத்து மாத்நிலைகள் தவாரித்துக் கொள்க, தேவைவான சந்தாப்பத்தில் தலிக்குறியின்மீது கிடனி களைத் தவிர்த்து பூசவேண்டும்.

(9) கிணற்றில் வசிக்கும் பெரிய தவளையொன்றைப் பிடித்து அதன் ஆசனவாயைத் தைத்துவிட்டு, 3 திரம் ரசம் அதன் வாயின் வழியே ஊற்றிவிடவும். தவளை காய்த்துபோன பிறகு அதன் வயிற்றைக் கிழித்து மாத்நிலையாக அமையப் பெற்றுள்ள அந்த சக்தை எடுத்து பத்திரமாய் வைத்துக் கொள்ளவும். சம்போசத் தின்போது அந்த மணியை வாயில் அடக்கி வைத்திருந்தால் அதை வயிலிலிருந்து வெளிப்படுத்தாத வரையில் எவ்விதமாகாதெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(10) பசுவின் பித்தத்தை தேனில் சேர்த்து குறியின்மேல் தேய்த்து வெக்கிஞல் கழுவி விடவும். 15 நாள்வரையில் இவ்வாறு இடைவிடாது செய்துவரவும்.

(11) காட்டுப்புருவின் எச்சத்தைக் கொன்வெத்து அத்துடன் அதன் கொழுப்பு, இரத்தப்பு, தேன் இத்த 4 சரக்குகளையும் கல்ல விதமாக அரைத்து அதை ஆண்குறியின்மேல் தடவி சம்போகத்தில் ஈடுபட இப்பம் அதிகரிக்கும்.

(12) அருளிரேர் போடிசெய்து கண்டங்கத்திநிச் சாற்றில் அரைத்து சில நாட்கள் குறிமேல் பூசுவா தாதுபுடி உண்டாகும்.

(13) ஆண்குறியை ஒவ்வொரு திரவும் புதிய பாலைக்கொண்டு தேய்த்து, ஏற்கனவே உராவைத்து அரைத்துள்ள காக்குப்பூச்சித் தூளையும் அதன் மேல் தேய்க்கவும். இது குறியின் மெலியை மிக்கி அதை தடிக்கச் செய்யும்.

(14) வெப்பாக்கி 2 திரம், எருமைவின் புதுப்பாவில் வைத்து 4 ஜாமம் அதனை அரைத்து குறியின் மேல் வைத்து கட்டிவிடவும். கட்டிக்கட்டின துணியுடன் பிடுத்து காலையில் வெக்கிவைக்க கொண்டு சூழவி விடவும். சிலநாட்கள் வரையில் இப்படியே செய்துவரவும். மேற்சொல்லிய குணமே இதற்கும் உண்டு.

(15) அழுக்குராக் கிழங்கின் வேரை கக்கி கரும் ணமத்தைச் சாற்றில் 20 தடவை எனைத்து உலர்த்தவும், பிரா அரைத்து அரைத்து குணப்படுத்திக் கொண்டு அவசியத்தின்போது எச்சளில் கலத்து குறிமேல் பூசவும். ஒருநாழிக்குப் பிறகே சம்போகத்தை மேற்கொள்ளலாம், அதன்பின்னர் பசுசெய்குறிமேல் தடவவேண்டும். இதுவகவித சாடிணியாகும்.

(16) சம்பங்கி எண்ணெயில் கடுகு அரைத்து பூசலாம்.

(17) கல்ல வேளைவதை 2 பங்கு, அசுள் பட்டை ஒருபங்கு, என்றும் இடித்து கல்லெண்ணெயில் 4 ஜாமம் அரைத்து பூசவும்.

(18) கிராம்பு, சமுத்திரப்பச்சைவின் சத்துதேனில் அரைத்து பூசுவாவும்.

(19) கல்லெண்ணெய், ஆமணக்கொட்டையின் பருப்பு தனித்தனியே சேர் 1 இத்த இரண்டையும் கன்றாக எரித்து, கக்கி

விட்ட பின்னர், ஒரு புட்டியில் அடைத்து வைத்து அதிலிருந்து அதுதனை மம் கொஞ்சம் எடுத்து ஆண்குறியின் மேல் தேய்த்து, வரவேண்டும். கையூட்டிக் கொளறினால் ஏற்பட்ட குறைகளை இது தவிர்த்திக்கும்.

(20) வேளவால் இரத்தத்தைத் தேய்ப்பதும் தாது வித்திக்கு அதிக பலனைத் தரக்கூடியதாகும்.

(21) உருவை எணப்படும் மச்சத்தின் கொழுப்பை தடவி வருவதும் கல்லகுணம் செய்யத் தக்கதாகும்.

(22) எலிப்புழக்கைகளை தேனில் குழைத்து ஆண்குறியின் மேல் தடவி வருவதிலிருந்தும் தாதுவித்தி ஏற்படும்.

(23) 1 திரம் 2 தேன் திரம் 2 இரண்டையும் இருப்புப் பாதிரத்தில் இரும்பு உலக்கையைக் கொண்டு தேய்த்துக் கலக்க வேண்டும். இரண்டும் ஒன்றாய் கலத்து கொண்டதும் குறியின் மீது துணியில் தடவி கட்டி விடவும். சக்தி உணர்ச்சி ஏற்பட்டதும் சம்போகத்தில் ஈடுபடலாம். ஆனால் மருத்தை அதற்கு முன்னரே கீக்கிவிட வேண்டும். உருவை மின் பூசியும் மேற்கூறிய இரண்டு சரக்குகளில் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளல் மேலாகும்.

(24) கிண்கடம்பு அப்போதே கலத்த ஆட்டின் பாவில் அரைத்து சதா ஆண்குறியிது தடவிவந்தால் தாதுபுடிக்கு மிகக் சாதகத்தைத்தரும்.

(25) குறிசேர் வடைக்கிறுப்பின் முன்னகி விதை 10 திரம் கல்லெண்ணெயில் எரித்து ஒரு தினத்தில் இருவேளை தேய்த்து வரவும்.

(26) முந்தாசிம், கோழிபித்தத்தில் சேர்த்தவைத்து ஆண்குறியின் மேல் தடவி சம்போகம் செய்யுங்கால் ஸ்கலிதமாகாதெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(27) ஸ்திரியின் தலை ரோமத்தைக் கட்டு அதன் சம்பங்கி எண்ணெயில் கலத்து குறியிது தடவவும். அத்துடன் புரு எச்சத்திமுள்ள வேண்ணிறமான எச்சாதையும் சேர்த்துக் கொண்டால் அதிக பிரயோஜனமாகும். இதனால் இப்ப உணர்ச்சி அதிகரிக்கும்.

(28) தினிர் கங்கித்ததை தடுப்பதற்கு—வெள்ளைக்கன்கிப் பால், பசும்பால் இரண்டையும் சமமானவில் எடுத்து ஒருவாள் முழுதும் வெறிலில் வைக்கவேண்டும். இரவு படுக்கைக்குச் சென்று முன் கொஞ்சம் எடுத்து உன்னம் சாக்களில் தேய்க்கவும். உலர்த்தி, மீட்டரி கோத்திற்குப் பின்னர், ஈடுபடலாம்.

(29) கையாந்துகாச் சாற்றைப் பிழித்தெடுத்து இரண்டு கனுகால் களிமம் தேய்க்கவும். கவர்த்தும் ஈடுபடவும்.

(30) சாதிரிங்கம், முள்ளவன், அபினி வகைக்கு 4 மாஷா வெங்காரம் 1 மாஷா இவைகளை மறைத்து மிளகு அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து சம்போகத்திற்கு முன்னர் ஒரு மாத்திரை உட்கொள்ளவும்.

(31) போஸ்தகா, சித்திரை மூலம், பனை வெல்லம் சுவ்வொன்றும் 2 சேர், கன்றாய் இடித்தும் அரைத்தும் அது தினமும் ஒருபிடி தின்று வந்தால் தாது புஷ்டிக்குத் தகுந்த முறை யாகும்.

(32) விசேஷ தாது புஷ்டி உண்டாகும், கல்ல பசியையும் தரும். இந்த மருத்தை ஒரு வருஷம் வரையில் தின்றுவந்தால் கப சம்பந்தப்பட்ட ரோகங்கள் தீர்ந்து தேகத்தில் மெனி உண்டாகும் :- வெல்லிக்காய், கடுக்காய் 90½ திரம் தகவிலை 20 திரம், கையாந்துகா 60 திரம், மஞ்சிட்டி 22 திரம், பழைய வெல்லம் 2½ சேர், இந்த எல்லா சரக்குகளையும் சரிவா அரைத்து வெல்லத்தையும் சேர்த்து 360 மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்க. தினசரி 1 மாத்திரை சாப்பிட வேண்டும். ஒரு வருஷத்திற்குள் மாறத்தோறும் இதன் பலனையறியலாம்.

(33) ஆன்மைச் சத்தி குன்றிய போயிருப்போர் பின்வண்ட முறையை உபயோகிக்கலாம்.

(34) வெல்லிக்காய் கத்தகம் மூக்கொட்டை மூலிகைச் சாற்றில் தடிப்பு ஏற்படும் படியான பதத்திற்கு அரைக்கவேண்டும். இவ்வாறு 4 முறை, சாற்றை ஊற்றவேண்டும். முதல் தடவை விடேயே அதற்கைய பதமேற்பட்டு விட்டபோதிலும் போது மானது மூக்கொட்டை வெள்ளை கடைக்காமற் போனது,

கறுப்பை உபயோகித்தாக் கொள்ளலாம். சாப்பிட வேண்டிய அளவு ஒரு அரிசி எடை 2 வாரம் சாப்பிட வேண்டும்.

(35) தாதுவிர்த்தி உண்டாகும். கீத்த இந்திரியத்தை கெட் டிப் படுத்தும்:—

மீர்பூன்னி, மமதா, தனித்தனியே தோலா 7½, கக்கு பூனைக் காளி விதை, முள்ளவன் கிளப்பனம் மிழங்கு, ஒவ்வொன் டும் 3 தோலா வைக்கப்பட்டை, ஜாதி பத்திரி ஒவ்வொன்றும் 1½ தோலா அரிசிதிரும். ஆத்தி விதை தனித்தனியே 9 மாஷா, காய் கால் சேர், சர்க்கரை கால் சேர் ஆட்டுப்பால் அசல் சேர் 1 நித்திப்பு சற்று கடுதலாக்கிக் கொண்டாலும் பாதகமில்லை.

மேற்பூச்சு.

(1) வெள்ளை அருவிச் செடி சின் பட்டை, வேர், அரும்பு தனித்தனியே 3 தோலா, கற்பூரம், அபினி தனியே 6 மாஷா ஊமத்தை, அழகா தனித்தனியே 1 தோலா சாக்குகளையாவும் கண்டங்கத்திரி சாற்றில் அரைத்து கடலை மயனிக்கு மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். தினம் வேளைக்கு ஒரு மாத்திரையாக 3 மாத்திரைகளை தண்ணீரில் அரைத்து குறியின் மேல் பூசிவரவும், சோர்வு, கசுமுட்டி போன்றவை சீர்படுத்தும்.

(2) கஞ்சாவை ஆமணக்கெண்ணெயுடன் அரைத்து, துணித்துண்டொன்றில் தடவி 7 வான் குறிமேல் கட்டி வரவும், ஆமணக்கெண்ணெய்க்கு பதிலாக எண்ணெயையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். ஆஞ்சல் முதன் உபயோகத்தால் சற்று வரிச்சல் உண்டாகக்கூடும்.

(3) கற்பூரம், வெங்காரம் ஒவ்வொரு மாஷா, கிராப்பு 12, மிளகு 16, எல்லாம் கைய அரைத்து, தண்ணீர் சேர்த்து மாத்திரைகள் உருட்டிக்கொள்ளவும். அருவியமான கோத்தில் தண்ணீரில் கறைத்து குறிமேல் பூச வேண்டும். ஐலம் விட்டுக் கழுவிஞலன்றி சத்தி குன்றாது.

(4) சேங்கொட்டை, கண்டல் சத்தியிப் பழுத்தின் சாறு, மாதுளைச் செடியின் பட்டையிலுள்ள சாறு, எல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்டி அசத்தின் பாகத்திற்கு எண்ணெயைச் சேர்த்து

இன கெடுப்பில் எரிக்க வேண்டும், ஜலம் கண்டிப் போய் தரவே தங்கிவிடும் எண்ணெயை பெடுத்து பூசி வரவும்.

(5) ஸர்ஸும் கடுகு வெள்ளை பெரிய கண்டங்கத்தி அழுக்கா இவற்றின் சேர்க்கை சம எடையாகக் கொண்டு அகலகலி திடித்து கொஞ்சம் ஜலத்தில் கரை போட்டு அகதக்கொண்டு குழியை கழுவி வர வேண்டும். ஜலம் காய்த்து போகும் சமயத்தில் கையால் தேய்த்து மருக்கை அப்படியப்படுத்தவும். ஒரு காலில் 3, 4 தடவை இப்படிச் செய்து வருவதால் சோர்வு நீங்கி குழி வீசும். ஸர்ஸும் வெள்ளை கிடைக்காவிட்டால் மஞ்சள் சேர்க்கலாம்.

(6) மருதம்பட்டையை ஆட்டுப்பாலில் அரைத்து குழியேன் பூசி ஓர் இரவு விட்டு வைத்து காலைமீள்வெந்தீரூர் கழுவிவிடவும்.

(7) காட்டுச்சுத்தரிக்காய் ஒன்று, வால் மிளகு 65 ரூ சுத்திரிக் காலில் குத்தி விடவும். குத்தி விட்ட பின்னர் காயை எங்கேனும் கட்டித்தொங்க விடவேண்டும். அது காய்த்து விட்டதும் என்னென் செய்? சேர் இரும்புச் சட்டியில் போட்டு எரிக்கவும். சரைய லும் அதில் போட்டு விடவும். (காயை போட வேண்டிய சமயம் எண்ணெய், சரியானபடி கொடுப்புக்கண்ட நெரு தாள்.) மழைக் காலத்தில் தோன்றும் மொத்த காக்குப்பூச்சிகளைப் போலொத்த 4, 5 காக்குப் பூச்சிகளையும் அந்த எண்ணெயில் போட்டு எரித்துச் சொல்வதுடன் உரித்த பூண்டின் இரண்டு பக்கங்களும் எண்ணெயில் போடவும். அப்பால், யாவற்றையும் ஒன்றாக அரைத்து புட்டியில் போட்டுக் கொள்ளவும். வேலைக்கு ஒரு மாஷா எடுத்து குழியேன் தேய்த்து வரவேண்டும். 14 நாட்கள் தேய்த்துப் பார்த்தால் இதன் அப்புத சக்தி கன்கு வெளியாகும். தேய்ப்புக்கு மேல் ஆலந்தைழ அச்சுது பெரிய கறு வளித்ததைழச் சுற்றி கட்டி வைக்கவும்.

(8) கோழி முட்டை 4, ஆட்டின் இளக்குட்டி ஒன்று 1 இரண்டையும் சேர்த்து வேகவைத்து அதில் இஞ்சி சாறு 10 திரம் பொதிசூ சாறு 10 திரம் ஊற்றி, பசு சேய்யுடன் கோழி முட்டை குழம்பைப்போல சமைக்கவும். இவக்கும் சமயத்தில் பிரம்பு, வலங்கப்பட்டை மிளகு, ஒவ்வொன்றும், கிரீதகவிற்சு அதில் சேர்த்து சாப்பிடவும். அதற்கு மேல் ஒரு பிடி அல்லது இரண்டு பிடி கொண்டனவிற்கு ஓமம் தின்னவும். கோரோசனை, அருணி சேர்ன் மேற்பட்டை, வெள்ளை சுய்க்குச் சேடிசிக் சேர்,

பீனதிராணை, யாவற்றையும் சம எடை எடுத்து, தீடிச்சுத் தருக்க சாக்கை இடித்தால் வேகவைக்கத் தருக்கதை வேக வைத்துப் பிச் கண்டிய பின்னர் சேக்கச் சேர்த்து மாத்திரைசான் உருட்டிக் கொள்ளவும். இதில் ஒரு மாத்திரை தேனில் குழைத்து குழியேன் மேல் பூசி வர 20 நாட்களுக்குள் சம்பந்த தளர்ச்சியை சேர்ப்பித்தி லீரும்.

(9) விட்டு வேளவால் 7 எள்ளெண்ணெய் சேர், 1 குழி மந்தி 1 தோலா, வேளவாலின் கால், காது, ஈர்க்கு தீத்தடியவாய் கலி அறுத்து விட்டு எண்ணெயில் போட்டு எரிக்கவும். வெந்து போன பிங்கு, மந்தி சேர்த்து கண்ணாய் எரித்து எண்ணெயை புட்டியில் போட்டு வைத்துக்கொள்ளவும். இந்த எண்ணெய் ஒரு அரிசி எடை செத்தியுடன் (செத்தியில் தடவி) உட்கொள்ள வும். காலொன்றில் 10, 15 வடயங்கள் உட்கொள்ளலாம். குழி அதிகரித்தால் எண்ணிக்கையாகைய குறைத்துக் கொள்ளலாம். அதாவது 7 நாள் வரையில் 21 வடயங்கள், அப்பால் காலையில் ஒன்று மாலை 7 நாள் பூண்டி குணம் தெரியாவிடில், மேற்கொண்டு வராமல் 1 உபயோகிக்கவும்.

(10) பெரிய தவிரைக்குள் 3, 4 தவிரைகளை உலர்த்தி கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் விட்டு வைக்கவும். தவிரைகள் குதித்த வெளியித் செல்லாதவாறு பாத்திரத்தை தகவற் பாட்டில் கிழ் வைத்து அதில் கரல் சேருக்கு மேலதிகமான காக்குப் பூச்சிகளை அதுதின்னும் போட்டு வசவும். காக்குப்பூச்சிகள் தவிரைகளுக்கு இரையாக விருக்கும். அதனுடன் அவைகளுக்கு குடிக்கத் தண்ணீரும் ஒரு தளிர்ப் பாத்திரத்தில் வைத்து விட வேண்டும்; 40 நாள் வரையில் அவைகளின் பாத்திரத்தில் அடைந்து வளத் திருக்கு அதற்கப்பறம் அவைகளை அரைத்து எய்வித்ததிலேனும் அத்தனையினையிருந்து வதனத்தை எடுக்க முயற்சித்தல் வேண்டும். அதை எடுப்பதற்கான கருவான முறை யாதெனில்:—அரண்டுகளை தண்ணீரில் கொதிக்கச் செய்யவும். இரவு முழுதும் தண்ணீர் கொதிக்க கொதிக்க அதைத் தண்ணீருக்கு மேல் மிதந்து கொண் டிருக்கும், காலைமீள் அதை எடையால் வலித்தெடுத்துக் கொள்ளவும். இதை குதிமேல் தேய்த்து வந்தால் இவ்விபலையாத புஷ்டியைத் தரும்.

(11) வெப்பஸிசி 7 மாஷா அட்டிப் பாலில் ஹைதைத், இரவில் அறைத்து, அறைத்த ரூட்டென் குறிமேல் பூசவும், குறிமீனும், முறக்கேதும் சீதும், பூசினதும் துணியைச் சுத்தி, விடவும், காலையில் வெக்கிறைக் கொண்டு கழுவி விடவும். சில இரவுகள் இப்படி மே செய்து வரவும்.

(12) சும்பலி எண்ணெய் 10டி மாஷா, திருக்கன்னிப்பிசின் 3டி மாஷா, கண்டூரி 1டி சத்தி, இரண்டு காமாணையும் சும்பலி எண்ணெயில் அறைத்து சற்று மெருப்பின்மேல் கொடுக்க வைத்து குறிமேல் சேர்த்த பூச பாசத்திற்கும் அறைத் தடவி ஒரு கிமிஷ நேரத்திற்குப் பின் படுக்கையை மேல் கொள்ளலாம். சத்திக்கு இதுவும் விசைந்த பாசம்.

(13) அக்ஷிகாரம் 7 மாஷா, வெங்காயச்சாறு 3 தேலா இரண்டையும் அறைத்து ஸ்காஸ அறைக்குள் சேன்று முதலில் குறிமேல் வெக்கிறைக் கொண்டு, அது கிலத்துப் போகும் படியான அளவிற்கு, அரழுத்தித் தேய்க்கவும். பிறகு ஏற்கனவே காக்குப் பூசியை ஒவ்வெண்ணெயில் எரித்து எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள எண்ணெயை, கையால் குறிமீது தேய்த்து வர, அது பருகும் நிலை.

(14) கரும் ஹமத்தை விதை, காட்டி ரோகம், தகா விதை இவை மூன்றும் சமகாலம் ஆமணக்கு விதை 3 பங்கு எல்லாம் அறைத்து, கழலவி மளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து வேளை 1க்கு 1 அல்லது 2 மாத்திரைகள் சாப்பிடவும்.

(15) பங்காச் செடியை அதன் வேர் இலை, விதை உள்பட கீழயில் உலர்த்தி, இடித்ததைத்து, சிவப்புச் சர்க்கரையுடன் கொஞ்சம் போல் உட்கொண்டால் தீவிரஸ்கலிதத்தைத் தடுக்கும்.

(16) பெருங்காயத்தை அறைத்து தேனில் குழைத்து தேய்க்கவும். பிறகு மேலுக்கு வந்திரத்தைச் சுத்தி கட்டி விடவும். இதன் உபபாசந்தாலும் குறிமீண்டு பருக்கும்.

(17) சாதாரண கக்கன் 7 (அவற்றின் சிறகுகளை அப்புறப் படுத்தி விட்டு) வெள்ளை எத்த காயடி, சுழியம் இவ்விருண்டும் வரைக்கு 4 ரத்தி, இம்மூன்றையும் அன்று படுத்தி குறிமேல் தேய்க்க வகலிதத்தை நடுக்கும். ஆராய்ச்சிப் பெற்றது.

) மாணைத் தத்தத்தை மாணை தூள் 1 சேர், சாதாரண 3 தேலா இரண்டையும் கலந்து 1 பாசத்தை ஒரு வந்திரத்திலும், இதர 1 பாசத்தை மற்றொரு வந்திரத்திலும் முடிச்சாக கட்டி விடவும். இரண்டு சேர் பசும் பால் கொண்டு வந்து ஒரு மண் சட்டியில் ஸத்தி அதன் மேல் மண் மூடினால் மூடி விடவும். அந்த மூடியின் மத்தியில் பெரியதோர் துவாரம் விடவும். மூடியை சுத்தியுமுள்ள ஓரங்களை உளுத்தம்மாலைக் கொண்டு கெட்டியான விதமாய் அடைத்து விடவும்.

இனி மூடியில் உள்ள துவாரத்தின் மேல் ஏற்கனவே மருந்து கட்டிய மூடிச்சை வைக்கவும். சட்டியை அடுப்பின் மேலேற்றி அடுப்பில் இளஞ் சூடான மெருப்பு எரிக்கவும். முடிச்சுக்கு குறிமீனவுடன் அதை எடுத்து குறிமேல் ஒற்றடம் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு முடிச்சின் குறிமீனதும் இன்னொன்றை அம்மா திதியே வைத்தெடுத்த மெது மெதுவாக ஒற்றடம் எப்புறமும் கொடுக்கவும், 7 நாள் இது விதமாக செய்து வரவும். குறிமீன் காமபுகளுக்கு முறக்கேதும், இச்சை அதிகரிக்கும், கையால் கிண் சேதத்தை யுண்டாக்கிக் கொண்டவர்களுக்கும் சுகைசின்ப் போலாகும். பசிட்சிக்கப் பட்ட முறை.

(18) கக்கின் சேர் 1, வெப் சேர் 1. முதலில் கக்கின்வினை 5 சேர் பாலில் மாய்ச்சவும், பால் கண்டிப் போன பின்னர், வெப் ஒரு சேரில் வறுக்கவும். அடுத்தாற் போல் 1 சேர் சர்க்கரை, 1 சேர் தேனில் பாசு பித்திக் கொள்ள வேண்டும். பாகானதும் வைக்கப் பட்டை வால் மீளரு, ஒவ்வொன்றும் மாஷா 3 அறைத்து பாலில் சேர்த்து காலையில் காலறா அளவு உட்கொள்ளவும்.

(19) எருக்கன் வேர், பங்கா விதை, வெள்ளை அருவி வேர் மூன்றையும் களராய் இடித்ததைத்து, ஹமத்தை சாற்றைச் சேர்த்து, மாத்திரைகள் செய்து கீழயில் உலர்த்திக் கொள்ள. அவசியமான போது உபயோகிப்போர் தம் மூத்திரத்திலே மாத் திரை உறைத்து ஆண் குறிமீன் மேல் தடவி வர தீவிர ஸ்கலிதத் தைக் காக்கும்.

(20) சிட்டுக் குருவி இரத்தத்தை மருர் மாவுடன் பிசைத்து கட்டியின் மேல் உட்கார்த்து கொண்ட படியே உள்ளன்காலில் தேய்க்க வேண்டும். காய்த்து போனதும் சம்போசகத்தில் சூடி

படலாம். இது சுட்டியின் மேலி விருந்து இறங்கி காலை தரை மேல் வைக்காத வகையில் எச்சரிதம் ஆக விடாது.

(22) கிராம்பு, ஜாதிக்காய், மிளகு, குங்காப்பூ, மஸ்தகி, ஜாதி பத்திரி, லவங்கப்பட்டை, சுக்கு, தனித்தனியே 7 மாஷா கற்பூரம் 3½ மாஷா யாவற்றை சரிவர இடித்துத் துறைத்துத் திருபத்து தேனில் குழைத்து அவசியமான போது கடலை மணலிற் று உட்கொள்ளவும்.

(23) வெள்ளை மிளகு தாமம் தனித்தனியே 6 தோலா, அமினி 2½ தோலா, குங்காப்பூ 1½ தோலா, ஐடமாரி, அக்கிரா காரம் வகைக்கு 3½ மாஷா தேன் 3 பங்கு எடுத்து மாஜூன் தயாரித்துக் கொள்ளவும். வேளை 1க்கு ½ மாஷா, (சம்போகத்திற்கு முன்)

(24) எட்டுக் கொட்டை, வெள்ளை அருளியேரின் பட்டை கரும் மணக்கை இலை, இம்முன்மையும் சம எடைமாக எடுத்து காராயத்தை விட்டறைத்து குறிமேல் தேய்க்கவும். எச்சரித்ததை சுட்டிப்படுத்தும். சிக்கிரம் ஆய விட வேண்டுமென் மென் மெண்ணிலும், தேய்த்த இரண்டொரு மணி வேந்திற்குப் பின் வெக்கிரால் கழுவி விடவும்.

மதன உகிர்தலேப் வெவ்வேறு முறைகள்.

(1) லவங்கப் பட்டை, லால் மிளகு, அக்கிராகாரம், கிராட்சை தனித்தனியே 9 மாஷா, அசல் கஸ்தூரி, சொப்பளவு, யாவற்றையும் இடித்து அவைகளுடன் சுக்குத் தூள், தேன் இரண்டையும் சேர்த்துக் கொள்ளவும். தேவைவரான சமயம், அதில் கொஞ்ச மெடுத்து எச்சலில் குழைத்து குறிமேல் தேய்த்து சடு படவும்.

(2) 'தூத்' 'தூத்' என வழங்கும் மரம் கொந்திப் பழையின் இருசயத்தை உலர்த்தி அத்துடன் சர்க்கரையைச் சேர்த்து மிளகுல் இரு பாலரும் இன்றியமையாத துன்பத்தை யடைவர்.

(3) பட்டுப் பூச்சிகளை கெய்வில் வறுத்து அவசியத்தின் போது அதன் துளை குறிமேல் தேய்த்து சடு பட்டால் சுகானுப வந்ததைப் பெறலாம்.

(4) கந்திர் தலை சிலும் போது கொட்டிப் போரும் உதோ மங்களை எடுத்து அவைகளின் கரித்த சாம்பலை தேனில் குழைத்து பூசின பின்னர் சடுபடுவது சொல்லொண்ணாத இன்பபந்தைத் தரும்.

(5) அக்கிராகாரம், சுக்கு லவங்கப்பட்டை எல்லாம் சம எடை எடுத்தவைத்துக் கொள்ளவும். பின்னர் கருவம் பிசின் ஹை வைத்த தண்ணீர், தேன் இவ்விரண்டையும் அதில் விட்டறைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொண்டு அவசியமான கோத்திற் மாத் திரை வாயில் போட்டு அதன் உயிழ் கிரை குறிமேல் தேய்த்து சடு படவும்.

(6) புருஷச்சம், கஸ்தூப்பி இவ்விரண்டையும் பொடியாக அறைத்து தேனில் குழைத்து குறிமேல் தேய்க்கவும்.

(7) மிளகு ஒன்றை சத்தனத்துடன் அறைத்து தேய்த்த போதிலும் அப்போதுள்ள சுகானுபவத்தைப் பெறலாம்.

(8) சாதினிக்கம், முன்சலவன், அமினி ஒவ்வொன்றும் 4 மாஷா, வெங்காரம் 1 மாஷா எல்லாம் அறைத்து மிளகின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து சம்போகத்திற்கு ஒரு மணி முன்னர் ஒருமாத்திரை விழுங்கிக்கொள்ளவும்.

(9) காட்டுமுருங்கை இளஞ் செடியின் வேர் கொண்டு வந்து கழங்கி, கிழலில் உலர்த்தி, நும உயி உருத்தமாவு முன்மையும் சம எடைமாக எடுத்து, பனைவெல்லத்தில் சேர்த்து, அக்கொட்டைகள லிற்கு உருண்டைகளை உருட்டி, தினந்தோறும் காயில் ஒரு உருண்டை உட்கொள்ளவும். தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

(10) லவங்கப்பட்டை செடியின் மேல்பட்டை 1 தாம், என்றாய் இடித்து முடிச்சாக்கட்டி ½ சேர் பாலிலும் ½ சேர் துளத்திலும் காய்ச்சவேண்டும். கீர் கண்டிப் பால் தக்கிலவுடன் சர்க்கரை சேர்த்து பருகவும். இதில் 2, 3, கஜூர் இடித்து காய்ச்சினால் துன்பம் விடுகோமே.

நெயிரண்டுகலித்ததை தடுக்க

முன்னோர்களின் பல்வேறு அனுபவங்கள்

(1) பூனைக்காலிச் செடியின் வேர் விரலின் ஓர்த்துறுவள லிற்கு வாயில் அடங்கிச் செண்டு சம்போகத்தில் சடு பட்டால்

அது வாயில் இருக்கும் வரையில் ஸ்கலிதமாகாதெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(2) சொப்பனத்தில் தன்னிச்சையாய் ஸ்கலிதமாகாதிருக்க ஒட்டகத்தின் ரோமத்தால் கயிறு திரித்து அதை தொடையில் கட்டி வைக்கவேண்டும்.

(3) படிக்காரத்தை இடுப்பில் கட்டிவைத்திருந்தாலும் அச்சமயத்தில் பலன் தாத்தக்கதாகும்.

(4) குாயற்றுக்கிழமையன்று குதிரை கோவேறிக்கழுதை இவ்விரண்டின் வால் ரோமங்களை அதாவது வகைக்கு ஒன்று கொண்டு வந்து, மஞ்சள் கிறமுள்ள பலவர்க்கையில் துவாரம் செய்து, அத்துவாரத்தில் அந்த இரண்டு ரோமங்களையும் சேர்த்துக் சேர்த்து, வலது புயத்தில் கட்டிக்கொண்டு ஈடுபட்டால் ஸ்கலிதம் ஆகவே ஆகாது.

(5) முஞ்செலியின் கிட்டினியை தோல் துண்டொன்றில் சுற்றி வைத்து அதை ஈஷாபந்தனத்தைப் போல் இடுப்பில் கட்டிக் கொண்டாலும் அதே குணமேதரும். ஆனால் அதை இடுப்பின் பக்கத்திலிருந்து வயிற்றின் பக்கம் திருப்பினதும் ஸ்கலிதமாய் விடும்.

(6) எட்டிக்கொட்டையை, இரண்டு முறை வாலையில் இறக்கப்பட்ட சாராயத்தில் அறைத்து, இளசலாகவே கைகள் மீது தடவி, உலர்த்திப்பின்பு ஈடுபட்டால் சம்போகரோம் கீடிக்கச் செய்யும்.

(7) கனர்க்கி இலைகளின் சாற்றை எடுத்து உள்ளங்கைகளிலும், உள்ளங்கால் களிலும் தடவி 4 மணிசேர்த்து ஈடுபட்டால் கீடிக்கும்.

(8) காய்களின் புணர்ச்சி சமயத்தில் ஆண் காயின் வாலே அறுத்து அதை 40 காய் வரையில் பூமிக்குள் புதைத்து வைக்கவும். சதை மடித்து எலும்பு மாத்திரம் இருக்கையில் அதை எடுத்து நூலில் கோர்த்து காலில் கட்டிக்கொண்டு ஈடுபட்டால் விசேஷ குணம் அறியலாம்.

லிரைவாய்வுக்கு

(1) பொரித்த வெங்காரம் 6 மாஷா, அறைத்து பழைய வெள்ளத்தில் சேர்த்து மூன்று மாத்திரைகள் செய்து காலையில் ஒருமாத்திரை உட்கொண்டு அதன் மேல் கொஞ்சம் எருக்கின மேல் குடிக்கவும், பத்தியம் உப்பில்லாத ஆகாரம்.

(2) கஜூர் விதை சிமைத்துவிட்டு விதை, இரண்டையும் அறைத்து காடியில் குழைத்து விரைகவின மேல் பற்றுப் போடவும்.

(3) ஆட்டுப்புழுக்கையைச் சுட்டு அதன் எடைக்கு சரியாக குராசானி ஓமத்தை தண்ணீர் விட்டறைத்து அப்பால் இரண்டையும் ஒட்டில் போட்டு கொஞ்சம் அணலில் ரூடேற்றி இளஞ் சூட்டுடனேயே பற்றுபோடவும்.

(4) ஆமணக்கு பருப்பை காடியில் அறைத்து இளஞ்சூட்டுடன் பற்றுப் போடவும்.

(5) ஆவாரம் வேகிய பட்டையை கிழலின் உலர்த்தி, என்றாக அறைத்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து 7 மாஷா துளை சுத்த ஜலத்துடன் சாப்பிடவும், அண்டவாயுவுக்கு மட்டுமன்றி தொப்புழ் வலியையும் கண்டிக்கும்.

(6) மாசிக்காய், அழுக்குரா இரண்டையும் தண்ணீர் விட்டறைத்து இளஞ்சூட்டுடன் விரைகளின் மேல் பூசவேண்டும்.

(7) பூலங்கிழங்கை அறைத்து உடனே பற்றுபோட்டு அதன் மேல் வெற்றிலையைச் சுற்றிகட்டவும்.

(8) விரைகளில் ஏதேனும் அடிபட்டிருந்தால் கொஞ்சம் மஞ்சள் அறைத்து அதைகோழிமுட்டையின் மஞ்சள் சருவுடன் கலக்கி என்றும் தடவி விடவேண்டும்.

(9) சோகம், மிளகு இரண்டையும் ஒன்றாய் அறைத்து அடுப்பிலேற்றி, சற்று சூடேற விட்டு உபாபையுள்ளஸ்தானத்தின் மேல் பூசவும்.

(10) வெற்றிலையின் தேனைத்தடவி அதை வலியுள்ள விடத்தில் கட்டி விட்டால் அது கரம்பின் விசிறை கீக்கும்.

(11) காட்டு வாகையின் பட்டையை தண்ணீரில் அறைத்து பற்று போடவிரைகளில் ஏற்படும்படியான அரிப்பை தீவிரத்திற்கும்

லிஸா வீக்கத்திற்கு

(1) எப்போதாவது தண்ணீரில் அழைத்து பூசு வீக்கம் கிவரணமாகும்.

லிஸா வீக்கத்தின் மேல் உண்டாகுப காபங்களுக்கு

(1) கருவம் பட்டை இடித்து ஜலத்தில் சொதக்கவைத்து அதைக் கொண்டு அதாவது அந்த ஜலத்தினால் காயத்தை கழுவவும்.

(2) கமேலாமாவு என்னென்னவெனில் கலக்கி மேலுக்கு அதாவது காயம் வீக்கத்திற்கு பூசவும்.

(3) காட்டுக் கொள்ளை பொடியாய் அழைத்து காயத்தின் மேல் தூவி வரவேண்டும்.

(4) ரூடல் ஏற்றத்தின்போது ரூடல் ஏறி இருப்பதாகத் தெரிந்தால் ஓமத்தை செவ்வனே இடித்ததைத்து அத்துடன் ரூட்டையின் வெள்ளைக்கருவு கலந்து பூசுவா சீர்பட்டு விடும்.

நீரிழிவுரோகத்திற்கு

(1) கறுப்பு எள்ளு, ஓமம் சம எடை அழைத்து வெல்லத்தில் சேர்த்து மரத்திலைகள் தயாரிக்கவும். வேளை 1க்கு 9 மரவா உட்கொள்ளவேண்டும்.

(2) கோரைக்கிழங்கு 4 மரவாபொடியாய் அழைத்து தின்னவும்.

(3) கிட்னியின் பறையினத்தின் மேல் ஏற்பட்ட நீரிழிவிற்கும் கொடுக்க வேண்டிய பாகம் :—

பெரிய கறுவலித்துலிச் கொஞ்சம் கொண்டு வந்து கிவப்புச் சர்க்கரையைச் சேர்த்து சாப்பிட்டுவா 2, 3 தினத்தில் குணம் தெரியவரும்.

(4) கற்கண்டு, இது மாகப்பூ திப்பிலி சீசம் மாதிரிவிதை, பிரம்பு எல்லாம் பொடியாய் அழைத்து தேனில் குவழ்த்து சாப்பிடவும்.

(5) கோழிமுட்டையின் மேல் ஓட்டை பசு வெயில் வலத்து அழைத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகத்தின் அளவு :—அதுதிகம் ஒரு திரம் அதாவது 1/2 நாசா

(6) மஞ்சட் கடுக்காய்த்தோல், தான்றிக்காய்த்தோல், செல்லி வற்றல் இவைகளை வெயில் வறவைத்து, பூ மாதிரி கோரைக்கிழங்கு தனித்தனியே 2 மிஸ்கால், பறங்கிச்சாம்பாணி ஓமம் இவை இரண்டும் சனிச்சனியே 1 மிஸ்கால் தேனில் சேர்த்து ஜுவாசித் தயாரித்து உபயோகிக்கவும்.

ஜுவாசித்

(1) கோரைக்கிழங்கு 5 மிஸ்கால் இதை கன்றாய் அழைத்து, கடியில் சேர்த்து பின்னர் 3 என் தேன் விட்டு வைத்து அப்பால் அதை உலர்த்தி கால் சேர்ச்சக்கரையில் பாருபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இது வாய்வுவையும் கிக்கும்.

ஜுவாசித்

(1) பாய்கி சாம்பிராணி, பூ மாதிரி தனியே 1 மிஸ்கால், மஸ்தகி 1 திரம் குன்றையும் இடித்ததைத்து தேனில் கலந்து கொள்ளவும். வேளை 1க்கு 3 மிஸ்கால் எடை சாப்பிட்டுவரவும்.

(2) எள்ளு 2 பங்கு ஓமம் 1 பங்கு இரண்டையும் குரண மாக்கி 1 1/2 மிஸ்கால் அளவுக்கு சாப்பிட்டு வந்தால் நீரிழிவுக்கு கல்ல குணம் செய்யும்.

(3) மேற்சொல்லிய குரணத்துடன் பனை வெல்லத்தைச் சேர்த்து மரத்திலை களாக்கி 1/2 திரம் அளவிற்கு சாப்பிடலாம். பெரிய உறுவளி இலை (கொழுத்து) 1 தோலா எடுத்து அதை சாறு சுப்பிழித்து 1 தோலா சர்க்கரையைக்கலந்து பருக வேண்டும்.

(4) புரியக்கொட்டைபருப்பு, முருங்கக்கீரை இரண்டையும் அழைத்து தொப்பழுக்குக்கீழ் ஒவ்வொரு நாளும் பூசி வந்தால் கீர் ரோகத்தைப்போக்கும்.

(5) கருவமரத்தில் உள்ள பச்சைக்காய் கொண்டு வந்து அதை உலர்த்தி இடித்து வஸ்திகாயஞ் செய்த பின்னர் வெயில் வலத்து செடுத்து அதை சர்க்கரையுடன் சேர்த்து காலை மாலை 12 திரம் தின்னவும்.

(6) சித்தரத்தையை குளிர்த்த ஜலத்துடன் தின்று வந்தால் கீர் ரோகத்தை வியக்கத்தக்கனவில் கிவர்த்திக்கக் கூடிய தானும்.

(7) படுத்தபடுக்கையிலேயே நித்திரையில் சிறு கீர் வெளி யாய் விடுவதற்கு புரு எச்சத்தை மானில் பிடித்துச் சொட்டி எட்டுக் கொடுக்கவும்.

(8) ஆட்டுக்கடலின் கொம்பை சுட்டு சாம்பலை தேனில் கலந்து தின்றால் கல்ல குணத்தரும் (வேளை 1க்கு தாம் 2)

நீர் தடைபட்டுப்போனால் அதை பிரித்துக் கொண்டு

(1) கெடு குச்சியுப்பு ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாஷா, சர்க்கரை இக்க இரண்டிற்கும் சம எடை.

இது 2 வேளை மருத்து, காலைமீல் சாப்பிடவும், கிணைப் பிரித் தெடுக்கும்.

(2) செண்டிப்பு இதழ்கள் தோலா இரண்டு தீண்டினாடன் சாறு எடுத்து கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து பருக கீர் பிரியும்.

(3) எலிப்புழுக்கை, தாம் 2, ஜலத்திலைறந்து, அறைந்த குட்டென தொப்புழின் அடியில் பூசவும், கீர் பிரியும்.

(4) கீர் அலாரத்தில் கொஞ்சம் போன்ற சுத்தூத்தை வைப் பதினாறும் கீர் பிரியும்.

(5) எருமைமீன் காநில் படித்திருக்கும் அழுக்கைக்கொண்டு வந்து கோவாளியின் தொப்புழின் கீழ் தேய்க்கவும்.

(6) ஆட்டின் பாலில் காய்ச்சி அது இளஞ்சூடாகிருக் கையில் அதில் மூத்திரா ஸ்தானத்தை கீரைக்கச் செய்யவும்.

(7) ரோவல் சீனி சோம்பு திராவகத்தில் அறைத்து தொப் புழிச் சுற்றி பற்று போடவும்.

(8) பூசினிக்காவை யறைத்து தொப்புழின் மேல் பற்று போடவும்.

(9) மொகக்கட்டான் சாற்றில் குச்சியுப்பு அறைத்து தொப் புழுக்கடியில் பூசவேண்டும்.

(10) குட்டியேர் தாம் 1 ஜலத்தில் காய்ச்சி பருகவும்.

நீரில் இரத்தம் வருவதற்கு படிக்கார பீல்பிகள்

(1) பொரித்த படிக்காரம், எரித்த கிலோன் கொம்பு, பாதம் பிசின் காலி பூமாதுன், எருவம் பிசின் வகைக்கு தாம் 1 இடித்

தலைத்து பீல்பிகள் தயாரித்துக்கொள்ளவும். பருப்புக் கிணைலை மீன் கஷாயத்துடன் உட்கொண்டால் போளும். வேளை 1க்கு 1 பீல்கால எடை. இது வெட்டைக்கும் கல்ல மருத்து.

(2) கருங்காணம் 21 மணி பொடியாய் இடித்து தின்னவும். அரண் மேல் சந்தனச்சக்கை வரையைத்த ஐலம் குடிக்கவேண்டும்.

வேள்கை வெட்டைக்கு.

(1) கல்கண்ட, வெள்ளரிமீன், வெள்ளைத்தகடா தலையே 5 திரம், சிறிய கெருஞ்சி, கருவேலன் பிசின், பாதம் பிசின் தலையே 2 திரம் எல்லாம் அறைத்து இஸ்கோல் விதை கலவையைத் தலத்தலை விட்டு மாத்திரைகள் தயாரிக்கவும். இது கீர் எரிச்சலைப் போக்கும்.

(2) பாதம் பிசின், வறுந்த கடலை மாவு இரண்டையும் அறைத்துக் கொண்டு பின்பு அதில் பன்னீர், ஐலம் இரண்டையும் சம எடையாக விட்டாறத்து மாத்திரைகள் தயாரித்த பின்னர், ஒரு மாத்திரை கெருஞ்சி கஷாயத்துடன் சாப்பிட்டு வரவும்.

(3) படிக்காரம், காலி, ஒவ்வொரு திரம் சர்க்கரை சமஎடை மூன்றையும் ஒன்றாய் அறைத்து தினக்தோறும் 7 மாஷா பகம் பாடாடன் உட்கொள்ளவும்.

தேள தேகத்தோரின் வெட்டை நோய்தீர.

(1) முருங்கப்பிசின் ஒரு தோலா காலைமீல் அறைத்து 7 காட்கள் வரையில் சாப்பிடவும். அப்பிசினை தவிராடன் கலக்கி உட்கொள்ள வேண்டும்.

(2) மஞ்சள் ஓளவிற்கு இடித்தலைத்து வண்டிரகாஞ் செய்த பின்னர், அதன் அளவிற்கு சர்க்கரையைச் சேர்த்து, ஒரு தோலா எருது கொண்ட ஜலத்துடன் சாப்பிட்டு வந்தால், சமீப வெட்டையை 1 வாரத்தில் கிவர்த்திகரும். குறைந்தியாவிற்குத் தால், 2 மாதம் வரையில் உபயோகித்து வரலாம்.

(3) வெட்டையில் எரிச்சல் கிடை சிழ் இருக்கக் கண்டால் வெள்ளை சூங்கிலியத்தை அறைத்து அதன் எடைக்கு சுத்தகண்டைச் சேர்த்து 5 திரம் அறுதினமும் 18 கள் சாப்பிட்டு வந்தால் சொஸ்தமாய் விடும்.

(4) பொட்டி லுப்பு ஏலக்காய், குந்துமணி வகைக்கு ஒரு திரம் இடித்ததை 6 பங்கு செய்து கொண்டு அதில் ஒரு பங்கு காலை மாலை ஜலத்தோடு சாப்பிடவும். 4வது தினத்திலிருந்து 2, 3 திரம் சூரணத்தை 60 காட்களில் விளைத்த அரிசியை நீ ஜலத்தில் ஊறவைத்த ஜலத்துடன் காலை 3 நாள் வரையில் சாப்பிடவும்.

(5) ஆலம்தாவிரை கிழலில் உலர்த்தி அதன் எடைக்கு சர்க்கரையைக் கலந்து கொண்டு பசும்பாறுடன் காலை 7 நாள் சாப்பிட்டு வரவும்.

(6) 2 தோலா நிகாந்தாலை ஒரு டம்ளர் ஜலத்தில் இரவில் கறைத்து விடவும். காலை 3 வாய் கொப்பளித்ததும் அதை பருகவும்.

(7) தோல் உரித்த கொண்டக் கடலை $\frac{1}{2}$ சேர், டேசு புஷ்பம், சோகம்; 1, 2 தாம் இவைகளை 1 சேர் ஜலத்தில் 8 ஜாமம் ஊற வைக்கவும். $\frac{1}{8}$ சேர் அந்த ஜலத்தை காலை 3 வாய், $\frac{1}{8}$ சேர் மாலை 3 வாய் பருக வேண்டும், தண்ணீர் அற்றுப் போனதும் மறுதண்ணீர் அதில் ஊற்றி விடவும்.

(8) 2 தாம் எடையுள்ள மாம்பட்டையை இடித்து இரவில் $\frac{1}{2}$ சேர் ஜலத்தில் ஊறவைத்து காலை 3 வாய் அதை பிசைத்து வடிகட்டி 1 வாரம் வரையில் உபயோகித்து வரவும்.

(9) பூத்திகொட்டை ஒரு தோலா இரவில் ஊறபோட்டு காலை 3 வாய் அதன் தெளிவான ஜலத்தை பருகவேண்டும்.

(10) கிட்னிப்புண்ணை ஆற்றும், கீர் எரிச்சலை நீக்கி கீரை தாராளமாய் வெளிப்படுத்தும் :— வெள்ளரினிகை 4 தாம் பருப்புக் கீரைகளை பட்டை மீனை அதிமதுரம் (இடித்து) கஸகஸா வெள்ளை, வகைக்கு 3 திரம், பூபாதாம் பிசின், கருவப் பிசின், பூங்காவி வகைக்கு 2 திரம், அசம்தா மும் 1 திரம், அரிசரி $\frac{1}{2}$ திரம் எல்லாம் சரிவர இடித்தும் அறைத்தும் இஸ்கோல் விதை ஊறவைத்த ஜலத்துடன் கிழுகிற பிஸ்கனாக்கிக் கொள்ளவும். வேலைக்கு ஒரு தாம் உட்கொள்ள வேண்டும்.

சொற்ப காலத்திய வெட்டை தோய்க்கு.

(1) அச்சு மல்லி புஷ்பம் தோலா 1 இரவில் ஜலத்தில் ஊறவைத்து காலை 3 பிசைத்து வடிகட்டி அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து பருகவும்.

(2) வேப்பந்தலை சம்பந்தித்தலை இரண்டையும் ஜலத்தில் கன்றாய் கொதிக்க வைத்து அடுப்பிலிருந்து இறங்கிக்கொண்டு ருஷூபி இளஞ்சூடாக இருக்கும்போது ஆண்குதையை அதில் ஊலவைத்தெடுக்கவும். (அடுப்பிலிருந்து இறங்கிவருடன் முதலில் அதன் புசைப்பிடித்தாலும் பிடிக்கலாம்) அவை மணிகோங்குறித்து அதிலேயே ஒன்றுக்கு இருக்கவும். இந்த விதமாய் மூன்று நாள் செய்ய வேண்டும். வெள்ளை வெட்டைக்கு இது சிறந்த சிசிச்சை.

(3) கீரையால் தவாரிக்கப்பட்ட பந்தாஷா மிட்டாயை ஆலம்பரலில் கவினத்து 3 நாள் காலை 3 வாய் சாப்பிடவும்.

(4) கருவேலன் கொழுத்து தோலா 1 கொஞ்சி தோலா 1 இரண்டின் சாற்றை எடுத்து கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து குடிக்கவும்.

(5) காட்டு வாகை இலைகளை தண்ணீரில் அறைத்து தேக கிலக்குத்தக்கவாறு கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து குடிக்கவும்.

(6) மஞ்ச கடுக்காய்த்தோல், தாண்டிக்காய், கொல்லிதனியே 1 திரம், துருசு $\frac{1}{2}$ திரம், எல்லாம் இடித்து இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைத்து காலை 3 வாய் அந்த தண்ணீரை பிச்சம் குறாய் மூலம் உபயோகிக்கவும்.

(7) பிசின் பட்டை ஆவரம் பிசின் முருகம் பிசின் மூன்றையும் சமளடை எடுத்தலைத்து காலை 3 ஆட்டுப்பாறுடன் சாப்பிடவும்.

பத்தியம் :— உப்பிந்தாத ரொட்டி கெய்யுடன் 21 நாள். வெள்ளை கொட்டைகள் கஷ்டம் நீவர்த்தியாய் விடும்.

(8) வறுத்த கடலை, கருவம் பூ, வெள்ளை சர்க்கரை ஒன் கொண்டும் 3 மாஷா காலை 3 வாய் சாப்பிடவும்.

(9) காலாயிச்சி, காட்டு வாகைப்பருப்பு கருவினவால் பிசின் மூல்கொண்டும் 2 தோலா எல்லாம் அறைத்து $\frac{1}{2}$ சேர் ஆலம்

பாலை ஜலத்தில் கலந்து அதைக் கொண்டு மீண்டும் கலவத்தி லுறைத்து, இலக்கைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தாபாரித்துக் கொள்ள வேண்டும். காலையில் ஒரு மாத்திரை 7 களவையில் சாப்பிடவும். பரிட்சிக்கப்பட்ட முறை இது வெட்டைப் போக்கை கட்டுப்படுத்தும்.

(10) அலகி விதையை வறுத்து ஒரு பிடி சாப்பிட்டு வர கல்ல குளம் செய்யும்.

(11) சாலா மீஸி 5 மாஷா, சுத்தமாக எடுத்திவைத்து ½ சேர் பசும் பாஸுடன் சாப்பிடவும். பின்னர் 2 மணி ரோஷ சூழித்து அறைத்த கீர் முன்னி விதை, வெள்ளை சர்க்கரையுடன் 3 தோலா உபயோகிக்கவும்.

இந்த குறைத்திருப்பின்னர் முதல்இரவு ஊற வைத் த கடலை 4 தோலா சாப்பிடவும். இத்திரிய போக்கையும் வெட்டை உபத்திரவத்தையும் சொஸ்தப்படுத்தும்.

(12) பசும்பால் 1 சேர் அல்லது ½ சேர் திரேக கபாவத் திற்சேற்றாது கொண்டுவந்து அதில் 2 மடக்கு லுளம் சேர்த்து, சுஜூர் 4 ணன்ட்கட்டாரா பட்டை 1½ தோலா அதில் போடவும். பால்லுளம் சுஜூர் இம்முன்றையும் கன்றாய் வேகவைக்கவும் இடித்த பட்டையை ஹஸியில் கட்டி பாலில் போட்டு விடவேண்டும். தண்ணீர் அளவு சுண்டி. பால் அளவு வத்ததும் அதை எடுத்து சாப்பிட்டுவந்தால் வெட்டை குறைவேகிச்சி, தேகத்திற்கு கல்லதோர் புஷ்டியைத் தாத்தக்க தாகும்.

(13) வசியில் படித்துள்ள பாசியைக்கொண்டுவந்து சட்டியில் போட்டு அடிப்பிலேற்றி வறுக்கவும். பிறகு அதற்கு சமவடை சர்க்கரையைச் சேர்த்து 4 மாஷா அல்லது அதற்கு சற்றுமேற்பட்டு காலையில் நின்றுவும்.

(14) கெட்டிவளி, திடுப்புலவி, தீரும்; மீதம் இத்திரிபந்தை கெட்டிப்படுத்தும் புலியங் கொட்டை தோலா 1, ஆவாரம் பிசின் 1 தோலா, கிஷாந்தா தோலா 1, கற்கண்டு குன்றுமணி 3 தோலா, மெய் 4 தோலா. முதலில் செய்வைக்காச்சி அதில்கிஷாந்தா வறுத்து கொள்ளவேண்டும். அதெத்தாற்போல் புலியங் கொட்டை ஆவாரம் பிசின் போடி செய்து கலக்கவும். கற்கண்டை தண்ணீரில் கலக்கி

பின்னர் யாவற்கறையும் நால்வா ருபத்தில் தயாரித்துக்கொள்ளவும். இது ஒரு வேளைக்குரிய றுல்வா 3 காண்க்கக் குறைபாமல் 5 களவையில் சாப்பிட்டு வரவும்.

(15) எட்டிக் கொட்டை மீள்கு சமவடை இரண்டையும் இடித்து 2 அல்லது 4 ஜாமம் கலவத்திலுறைக்கவும்; அதாவது லுளத்தை விட்டவறத்து ரோவபணி அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். அந்த மாத்திரையை முதல் கார் ஒரு மாத் திரையும் இரண்டாவது காலிலிருந்து கார் 1க்கு நவ்வொரு மாத்திரை அடிகரித்துக் கொண்டும் போக வேண்டும். 9 வது கார் 9 மாத்திரைகள் கணக்கு வந்து விடும்.

ஒருவர் ஒருவருடும் வரையில் இந்த மாத்திரைகளை உட் கொண்டு வந்தால் பெளவனப் பருவத்தை யடைந்து விடுவார், பிரமேசம் இடுப்புலவி, சோற்ப காளில் அற்றுப்போகும். இந்த மருந்து குளிர்ச்சியுள்ள திரேகத்திற்கு பொருத்தமாகும். எட்டிக் கொட்டை சிக்கிரம் பொடியாகாது. அதை ஜலத்தில் றுறப்போட்டு கர்மையான சுத்தியால் வெங்காயத்தைப்போல் அரித்துக்கொண்டு, கிழலில் உலர்த்தி இடித்துக் கொள்ளவேண்டும். இதுதான் அமை இடிக்கவேண்டிய முறை.

(16) லும சித்தல், கடுக்காய், தாந்திக்காய், வளைக்கு 11½ மாஷா, இவற்றை இடித்து ½ சேர் லுளத்தில் காய்ச்ச வேண்டும். ½ பங்கு லுளம் சுண்டிப்போனதும் 1½ தோலா தேனை கலந்து இளஞ்சூடாகவே குடிக்கவும்.

(17) கீர்முன்னி,—ஆவாரம் பிசின்,—கிஷாந்தா சமவடை எடுத்து இடித்த பின்னர் அதற்குச் சரியான அளவிற்கு மிளப்புச் சர்க்கரையைசேர்த்து சாப்பிடவும்.

(18) மல்லி, கோம்பு தனித் தனிமே 9 மாஷா, கோக்குர் ½ மாஷா முன்றையும் இடித்து புதிய மண் குவளை மொகத்தில் போட்டு அதில் தண்ணீர் ஊற்றி லுர் இரவு முழுவுதும் றுறவைக்கவும். காலையில் அதை பிசையாமலேயே பருகிக்கொள்ள வேண்டும். மேகலெள்ளை கோயால் கோடிய உபாதைக் குட்பட்டிருந்த ஒரு கோயாளிக்கு இந்த மருந்தை கொடுத்து வந்தபோது 12 நாட் களில் அவருக்கு பூரண குணமடைபப் பெற்றது.

(19) முன்னங்கித் தழை 8 சேர் இடித்தால் அதிலிருந்து 4, 5 காலஞ் ஈடைக்கு சாறு வெளியாகும், அதில் 1 அல்லது 2 மாஷா பொட்டித்துப்பைக் கலந்து 3 நாள் சாப்பிடவும். இந்த மருத்து தாயானமாய் கிரை பிரித்து விடக் கூடியது. கீர் எரிச்சல் குத்தல் சிவர்த்தியாய் விடும்.

(20) எக்த மருத்தைக்கொண்டும் சிவர்த்தியாகா திருக்கும் படியானவெட்டை உபத்திரவத்திற்கு இன்றியமையாத பாகம்:

பொரித்த படிக்காரம் 1 மாஷா, கற்கண்டு 1 மாஷா, இரண்டையும் பொடியாய் அரைத்து ஒன்றுக்கு போனதும் சாப்பிட்டு அதன் மேல் லஸ்ஸி (தண்ணீரும் பாறும் கலந்தபானம்) குடிக்கவும். 5 நாள் வரையில் இவ்வாறு செய்து வரவேண்டும், தீவிர குணம் தெரியவரும். இது எர்பட்ட வெட்டையையும் போக்கிவிடும். வாலிப சேயானிக்கு படிக்காரம் 2 மாஷாவரையில் கொடுக்கலாம். அதாவது பொரித்த படிக்காரம் 1½ தோலா, கற்கண்டு 1½ தோலாவுடன், 7 பாகமாகி தினம் 4 மாஷா உபயோகிக்கவும். ஒன்றுக்கு போரும் சமயத்தில்தான் கொடுக்க வேண்டும். கொடுத்ததும் லஸ்ஸி குடிக்கவேண்டியது அவசியம். லஸ்ஸி ½ சேர்வரையில் குடிக்கலாம். பத்தியம்:—புளிப்பு வாயுவு பதார்த்தங்களும் கூடாது.

(21) உயி கீக்கிய உருத்து, புளியங்கொட்டை இரண்டையும் வறுத்து, இரண்டின் ஈடைக்கு சர்க்கரையைச் சேர்த்து ஒவ்வொரு காலையும் ஒருசைப்பிடி அளவு உட்கொண்டு அதன் மேல் பசும்பால் குடிக்கவும். மேகவெள்ளை, எரிச்சல் கீர்,—எரிச்சலுடன், சொட்டு சொட்டாய் கசிவுதல், இவ்வித குறைகண்யாவும் சிவர்த்தியாய் விடும்.

(22) கீர் எரிச்சல் குத்தல் முதலியவை சிங்கும்: குட்டை தணிக்கும்: மஞ்ச சந்தனம், மேற்படி வெள்ளை, மேற்படி சிவப்பு இம்மூன்றும் கலக்கக் 2 ரத்தி, கால்சரி, கற்பூரம் தனித்தனியே 4 ரத்தி 2 தோலா கற்கண்டை ஜலத்தில் கறைத்து மேற்கொண்ட சர்க்கரையினை கன்றாய் அரைத்து, எற்கண்டு ஜலத்தில் கலக்கிக் உட்கொள்ளவும்.

(23) மேகவெள்ளை வெட்டையின்போது இரத்தம் வெளியாவதும் அல்லது புண் ஏற்படும்படி பிழகண்ட பாகம் அரைத் திவர்த்தியாகக் கூடியது.

மருவெண், மல்லி, சோம் வெள்ளை, வெள்ளை, அபிஷயம், வெள்ளைவிதை, காளாரி, கொஞ்சி, சோந்து சீனி, சோலாபுஷ்பம், சிவாந்தர தனித்தனியே 1 தோலா, எல்லாம் இடித்தாறத்து வெள்ளை சர்க்கரையைச் சேர்த்து 6 நாள் வரையில் தினந்தோறும் சாப்பிட்டுவரவும். பத்தியம்:—புளிப்பு வாயுவு பதார்த்தங்கள் குடைய உணவு உட்கொள்ளலாகாது.

(24) சதாப் விதைகளை தூள் செய்து அரண் அளவித்து சர்க்கரையைச் சேர்த்து காலை தோறும் 1 தோலா புதிதிலும்.

(25) கக்கு, போஸ்தகா, மெருஞ்சி, பிஞ்சு கடுக்காய், குந்தாவா, வரைக்கு 3 தோலா, சர்க்கரை அல்லது நற்றாண்டி சர்க்கருக்கு சம ஈடை, எல்லாம் அரைத்து 6 மாஷா அளவு மேற்பட்டு, அவசியத்திற்கேற்றவாறு ஜலத்துடன் கொடுக்க வேண்டும்.

(26) வெட்டை கீச்ச்கருக்கிற்கு ஒரு பெரியதின் அறுபது சிசுக்கள்:— வெள்ளை ருன்று மணியை பாகநாசந்த தலையின் சாற்றில் கன்றாய் அரைத்துக் கொள்ளவும். அப்பால் கன்னத்தி யொக்றை திரித்து அதன் மேல் அரைத்த மஞ்சராவைத் துடை, சிறிது நேரம் கீர் துவாரத்தில் வைத்து விடவும். நல்ல குணம் செய்யும்.

(27) மேக வெட்டைக்காக அடியிற்கண்ட மருத்தை தயாரித்து இரண்டு வரம் சாப்பிட்டு வரவும். வால் மீளகு தோலா 1½ அரைத்து தூளாக்கிக் கொள்ளவும். கெட்டியான நயினா ஒரு துணியில் கட்டி தொங்க விடவும். தலையில் உயிர் துலம் யாவும் எடுத்து போய் தயிர் சக்கை மட்டும் தங்கி விடும். அப்போது அரைத யெடுத்து தூள் செய்த வால் மீளகை அடிக் கலக்கி துணை யலைப் போல் அரைத கலவைக்கச் செய்யவும். வெட்டை கீச்ச்கும். கீர் தாயையில் இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருப்பின் கீண்டி விடும். இந்த மருத்தில் ஒரு திரம் கோயானிக்கு கொடுத்து அரைத சாப்பிடச் செய்யவும். பத்தியம்: புளிப்பு வாயுவு பதார்த்தமும் நன்றும்படி.

(28) கீர் தாயையிலிருந்து சீழ், இரத்தம் வருவதையும் சொஸ்தப்படுத்தும், வெட்டையையும் கண்டிருக்கும்:— கம்பி பொட்டுவப்பு, காட்டு ஏலக்காய், தனித்தனியே 1½ தோலா இந்த சர்க்கரையும் கன்றாய் அரைத்து 6 வெட்டைகளை

மிகத்துக்கொள்ளவும், வேலை 1க்கு 1 பொட்டலமாக காலை மாலை
ஜலத்துடன் உட்கொள்ளவும். 3 நாட்கள் அடிவாதுடன் 60 காலில்
விசைத்த கொல்லின் ஆர்பி இரவில் தண்ணீரில் கலக்கலாற்று காலையின்
அந்த தண்ணீரை கொஞ்சம் போலம் குடிச்சுச் செய்யவும், ஆர்பி
ஸ்பெய் கொஞ்சம் அரைத்துக் கொடுத்தாலும் கல்லது. ஆர்பி
ஜலம் 3 நாள் கொடுக்கவும். உப்பும் புளிப்புகே பத்தியும்.

(29) புளியங்கோட்டை $\frac{3}{8}$ சேர் ஊவக்கி; 4 $\frac{1}{2}$ சேரை மூங்கிலுப்பு, துவற்றிற்கு சமமாக சர்க்கரை, எல்லாம் சேர்த்துரைத்து, 2 சேரை சூரனாத்த, பசும் பாலுடன் சாப்பிடலும்.

(30) மஞ்சள் 6 மாஷா, கெல்லிக்காய் 1 தோலா, இரவில் ஜலத்தில் போட்டு காலையில் அடுத்த மனறின் ஜலத்தில் 2 தோலா கேளை கலக்கி சாப்பிடவும்.

(31) கரு வேலன் பிள்ளை, தாகூர் பிள்ளை, கருஞ்சீரகம் எஸ்
லாம் சமீ எஸ்ட் இலைத்து அந்த பாண்டிக்குச் சரியாகச் சர்க்கரைச்
சேர்ந்து 2 தோலா ½ சேர் பசும்பாறுடன் சரப்பிடிலும். படு
வைக்குப் போகும் போது 6 மாவூ கொடுக்கவும்.

(32) சுதரம் விதை 10 மாஷா அசும்தா கும் 10 மாஷா, சம்பங்கிவர் 7 மாஷா மாதுளை மொக்கு 24தோலா கோதா புழியம் 24தோலா எல்லாம் இடித்ததைத்து 7 மாஷா தயிருடன் கலந்து கொடுக்க வேண்டும்.

(33) சாலா மீஸ்டி 6 தோலா, அழுக்காக்கிழங்கு 6 தோலா
 ஜாதிப்பத்திரி 6 தோலா, கிராம்பு 8 மாஷா, அக்கிராகாசம் 2மாஷா,
 கற்கண்டு 9½ தோலா, எல்லாம் இடிந்தசுறைத்து 20 பாகங்கள்
 செய்து வேகை 1க்கு 1 பாசம் சாப்பிடவும், அதுக்குமேல் பசும்
 பால் (1½ சேர் காய்ச்சி மூன்றில் ஒரு பங்கு இரும்புகாரில்) குடிக்க
 வேண்டும்.

(34) பாதுகாமை தோல், மஞ்சள் பருப்பு, கருவகையம், சம்பு, சந்தனம், ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சன் கொஞ்சமாக கூட்டுத்து தண்ணீரில் காய்ச்சவும். அவைவாகி தண்ணீர் களைடிப்போனதும் அதில் கீர் தர்ப்பைபடுமப்புயான விதத்தில் உட்காந்து கொள்ளவும். கீர் தர்ப்பையிலிருந்து இரத்தம் வருவதை மட்டுமே ஸ்திரீகளுக்கும்

[illegible]

(35) மதுரையில் கடுக்காய்தேவால், தாண்டிக்காய்தேவால், செல்லி வற்றால் தலையோ திரும்பினாலும் 4 திரும்ப, எல்லாம் இடித்து இதலில் ஜலத்தில் கறைபோட்டு வாணியில் அடிக்க ஜலத்தை பிச்சாய்குழாய் மூலம் பிரயோகம் செய்ய வேண்டாம். உபத்திரம் விவரணையாகும்.

(36) வாங்கியிருந்த 7½ மாஷா, பங்கு (கம்பி குத்தா) 1½ தேவல இரண்டையும் பொதுமான் அளர்த்து, அதற்கு எவ்வளவு கற்கண்ட செத்தா, 3 மாஷா இந்த மருத்திலிருந்து, 3 தேவல தவிரட்டல் கலந்து சாப்பிடவும். வாயடி பதார்த்தம், புளிப்பு தண்ணீர்ப்படி.

(37) காவல்துறை அதிகாரி 14 தேரை இடித்ததைப்பற்றி பங்கு செய்வதும், பங்கு ஏற்று 7 மாதம் காவல் இருக்க வேண்டும். தண்ணீருடன் கலந்து மாத்திரை கொடுப்பதும், ஒரு மாதத் திரை விழுந்தால் கற்கலாடிடல் தடுப்பான் என்பதற்குமேலே குடிக்க வேண்டும்.

(38) தாதேயரில் பூமுதல்காரன் ஒருபந்தாஷாவுடன் சரப்பிடவும், இதே விதமாக கான் இரு ஒவ்வொரு பூ மேலதிகமாக 5 கான் வரையில் திண்டி கொண்டு போய், 6 வது காலிக்குத்து ஒவ்வொரு பூ குறைத்தால் கொண்டு வந்து ஒரு பூ கணக்கித்து வந்து விடவும். அந்த வன் இருபையால் கொண்டு பெட்டைடைவது கண்டித்தே தீராம்.

(39) கருணம் பிள்ளை, கிஷோர்தா இன்ஸ்டிடியூட்டில் முதல் பரீட்சையில் கனக்கி இன்ஸ்பேக்டர் விஸ்தா கனதலாவந்த ஜலத்தில் அடிவந்தது. குழியின் மேல் தாடவ மூன்று மணிக்கு அங்கு வந்தது.

(40) எத்தனையோ பேர், மூர்த்தாசனம் கருவம் பிசின் பூங்காவின், ஒன்றோடொன்று இரே மனையில் எடுத்து, பொடியாய் அடித்து, மெல்லியதோர் திரியின் மேல் பூதிநீர் தாணாக்குள் வைத்தெடுக்கவும், வாரி இருந்தால் அபிஷேகமாயும், எரிச்சல் இருந்தால் கத் பூதத்தையும் கூட்டிப் கொள்ள வேண்டும்.

தமிழ் அறிஞர் சங்கம்

பல்வேறு விஷயங்களுக்கு பல்வேறு சிகிச்சைகள்.

சென்னை, 19-1-1947

(1) விஷம் அருகத்தியவனுக்கு பெரியோர் சொற்படி. வெந் தீர் சம்பந்தப்பட்ட பரணத்தினால், வசத்தி எதிர்க்கச் செய்யாதே உத்த மம். பல தடவைகளில் வெம், பால் கொடுக்க வேண்டும். விஷமில் எச்சத்தை ஜலத்தில் கலந்து கொடுத்தால், உடனே வசத்தியாய் விடும். குடான குவமுன்ன மருத்து வந்தகைய விஷத்தில் கலந்து கண்டிக்கும். சங்காமி (குப்பைக் கிணர்) மின் வெர் காயத்திற் பின் 1 தேரலர், காயத்திருந்தால் 6 மரஷர், ஜலம் கீட்டிவைத்து, பசும் வெண்ணிலில் கலந்து கொடுக்கவும்.

(2) மூக்கிலர் விதை (மல்லியைப் போன்றவை) 3 மரஷர், 6 ரத்தி கசக்கி, 1 டம்பலர் ஜலத்தில் காய்ச்சவும். ஆலா பாகம் ஜலம் கண்டிப் போனாலும், அழைத வடிவட்டி. வெண்ணி சர்க்கலா 3 தேரலர், 1 1/2 மரஷர் கலந்து, அதனுடன் வடிவூண் கலம்மெய் அல்லது, வெம் 7 மரஷர்வைக் கூட்டிக் கொண்டு இளஞ் சூட்டின போதே உட்கொள்ள வேண்டும். சரப்பாடு பசும் பாண்டலே புதிக்க வேண்டும்.

(3) கஞ்சண்ட வேயாமிக்கு பொரித்த வெங்காயத்தை பல வெயிலே அல்லது, இதர பிராணிகளின் வெயிலே கலந்து இளக்காய் குடிக்கச் செய்யவும். சற்று வேரத்தில் வசத்தி எடுக்கும். அப்பால், இதர மருத்துவகோ கொடுக்கலாம். பல தடவைகளிலாவ 1 செர் வெங்காயத்தை ஊட்டிவிட வேண்டும்.

(4) பல வெம் 10 திரம், இச்சுப்பி 2 திரம், இரண்டையும் சேர்த்து கொடுக்கவும். இது பாம்பு கடிக்கும் கலந்து. பாம்பு கடித்தாலும், கடித்த இடத்தில் மூன்றுக்கு திருக்கவும், விஷம் ஏறமாட்டாது.

(5) கண்டல் கத்தியை அழைத்துத் தின்றால், விஷத்தை நீக்கும்.

(6) எருக்கன் வேர், பருத்தி வேர் இரண்டையும் தண்ணீ ரில் அழைத்து, விஷம் தின்றியலாகவைக் கலக்கக் கொடுக்கலாம்.

பல்வேறு விஷயங்களுக்கு பல்வேறு சிகிச்சைகள் 99

(7) காட்டிக் கொட்டை, மிளகு இரண்டையும் அழைத்து, கித்தளவிற்கு உட்கொள்ளவும், பாம்புக் கடி காய்ச் கண்டிக்கும்.

(8) கூடற் தேற்காய் 1 மரஷர் அழைத்துக் குடித்தால், சகல விஷங்களையும் போக்கிவிடும்.

(9) பூங்காவின்கீழ் தின்பதும், விஷத்தை கிவர்த்திக்கு மெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(10) பாம்பு கடிக்கு:— காட்டு வாகைத் தழையின் சாற் றைப் பிழித்து, விஷக்கடி யுள்ள இடத்தை 21 தடவைகளில் தீர் சாற்றைக் கொண்டு கழுவி விடவும். பின்னர், வெண்ணி மிளகின் பொடிவை கண்ணிமைகளில் பூசவும், அல்லது சூக்கல் பொடி வைப் போல், உறிஞ்சச் செய்யவும். அப்படியும் இல்லையேன், அழைத ஜலத்துடன் குடிக்கச் செய்யவும். பாம்பு கிடும் திரும், பிரக்கை ஏற்பட்டு விடும்.

(11) ஆட்டிப் புழுக்கையை கூட்டு உபயோகிக்கவும். இதை உன்றும் வெளியும் உபயோகிக்கலாம். அதாவது: வெளியில் பற்று போடலாம், உன்றுக்கு சரப்பிடலாம்.

(12) மூத்தைத் தின்றால், அது பற்பல விஷங்களை கிவர்த் திக்கக் கூடியதாகும்.

(13) எத்த காம்பு 2, 3 தேரலர், தண்ணீரில் கறைத்து, உட்கொள்வ தாலும், விஷத்தை கிவர்த்திக்கக் கூடும்.

(14) வெண்ணிக் கடுதாசி ஒரு முழுத்தான், மிளகாய் இரண் டையும் தண்ணீர் விட்டறைத்து பருகினால், பாம்பு விஷத்தை நீக்கி விடும்.

(15) தேன் கடிக்கு ஒரு பெரியர் எழுதி யுள்ளார்:— வெங்காயம் அல்லது கமச்சாரம், அதற்கு சம எடை கீத்தாத கண் னாம்பு, அல்லது கீத்தின கண்ணாம்பு, இந்த இரண்டையும் கிருது வாய் இடித்து, இரண்டு கைகளிலும் வைத்து, குடேறத் தேய்க்க வும். முதல் தேய்ப்பில் முதல் தடவையும், இரண்டாவது தேய்ப்பில் இரண்டாவது தடவையும் மூன்றாவது தேய்ப்பில் மூன்றாவது தடவையும் ஆக மூன்று தடவைகளில் முகா, தேன் விஷம் கிவர்த்தியாய் விடும்.

(16) பருத்தித் தழையை பசு பெய்யில் அறைத்து, தேன் கொட்டி இடத்தில் சுத்து தேய்த்து விட்டு பந்து போட, தேன் விஷம் கீழ்க் கிடும்.

(17) எருக்கன் பால் அல்லது கன்னிப் பால், கொட்டு வாயில் தேய்க்க தேன் விஷம் இறங்கி விடும்.

(18) எலுமிச்சம் பழத்தின் சாற்றை தவிராமலோ அல்லது கண்ணம்புடன் கலந்தோ, தேன் கொட்டி இடத்தில் பூசவும், உடனே விஷம் கீழ்க் கிடும்.

(19) பூனிக் காயைப் பிழிந்து அதன் சாற்றை கஞ்சண்ட வஞ்சுக்குக் கொடுக்கவும். பிசங்கை யற்றிருந்தால், சாற்றை தொண்டைக்குள் சிறுகச் சிறுக ஊற்றவும், வாந்தி உண்டாகி குணமேற்பட்டுப் போகும்.

(20) கஞ்சண்டவரின் விஷத்தை வாந்தி மூலம் வெளிப் படுத்துவதாயின் தாமரை வித்து 1 மாஷா, துருகு 2 ரத்தி இரண்டையும் ஒன்றாய் அறைத்து வெங்கீரில் கலக்கிக் கொடுக்க, உடனே வாந்தி உண்டாகி விஷம் வெளிவந்து விடும்.

(21) வெள்ளை குன்று மணி தழைக்குக் கீழான தண்டை தண்ணீரில் உறைத்து பாம்பு கடித்தவரின் கண்களின் பூசுவதுடன் கடிவாயிலும் பூச, விஷம் இறங்கி விடும்.

(22) பங்கா விதைகளை தேன் மெழுகில் சேர்த்து கரித்து, அதன் புகையை தேன் கொட்டு வாயில் படுமபடி செய்ய வேண்டும்.

(23) அபிணி/உட்கொண்ட, விஷத்தை கீக்குவதாயின் ஆற னாக்கு விதையை அறைத்து, காப்பியுடன் சேர்த்து பருகவும்.

(24) அபிணி விஷத்திற்கு:- பெருங்காயம் 2 மாஷா எடை மை, 2; 3 தட்டைகளில் கொடுத்து வரவும்.

(25) அக்கரோட் பருப்பு, அபிணி விஷத்திற்கு தக்க கிவா நீர்மமாகும்.

(26) பசு பெய்யும், பாடும் அப்படியே.

(27) ஊமத்தை விஷத்தின் கிவர்த்திக்காக, கத்தரிக்காயை ஆண்டு குண்டாக்கி, ஜலத்தில் கண்ணாய் பிசைத்து கொடுக்கவும்.

கத்தரிக்காய் கிடைக்கா விட்டால், அதன் இலைகளையாவது அல்லது வேரையாவது, தண்ணீரில் அரைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(28) மேற்கண்ட விஷ கிவர்த்திக்காக, பருத்திக் கொட்டையையும் தண்ணீரில் அறைத்துக் கொடுக்கலாம்.

(29) துருகு 9 மாஷா பொடியாய் அறைத்து, அறைத்த ஊளை, இரண்டாய் அறுத்தெடுத்த எலுமிச்சம் பழம் ஒன்றின் அடைத்து, அதை உறுஞ்சி தொண்டைக்குள் சாற்றை இறக்குவதற் குள் வாந்தி கண்டு பாம்பின் விஷம் இறங்கி விடும்.

(30) பருத்திக் கொட்டையின் பருப்பை 1/8 சேர் அளவிற்கு இடித் தறைத்து கொஞ்சம் தண்ணீரில் போட்டு செவ்வனே பிசைத்த பின்னர் அந்த தண்ணீரை வறடிக்கி உட்கொண்டால், பாம்பு விஷம், அல்லது வேறெந்த விஷமாயினும் இறங்கி, நோயாளிக்கு கற்சிக்கை வந்து விடும். தாகம் அதிகமாய் இருந்தால் சுத்த ஜலத்திற்குப் பதிலாக பருத்திக் கொட்டை ஜலமே குடிக்கக் கொடுக்கவும்.

தேன் கொட்டுவாய், பாம்பு கடித்தவிடம் இன்னதெனத் தெரிய வேண்டுமாயின் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றை ஓர் உத்தேசமாய் பிழியவும். எந்த விடத்தில் கொப்பளம்போல் தோன்றுமோ, அதுதான் கடித்த விடம்.


(31) வேப்பம் பட்டை, சேவ மரத்தின் பட்டை, கழலகிச் செடியின் பட்டை, இம்மூன்றையும் கன்றாய் காய்ச்சி அதன் ஜலத்தை தேய்க்க சுகல விஷ ஜந்துக்களின் விஷத்தை கீக்குப்.

(32) பாகற்காய் விதையை அறைத்து கொட்டுவாயில் தேய்க்க தேன் விஷம் இறங்கி விடும்.

(33) தேன் கொட்டு வாயின் பேரில் சுத்தமான பிடித்து தேய்க்க உபாலை கீழ்க் கிடும்.

(34) ஓமத்தை செவ்வனே கொதிக்கவைத்து அந்த ஜலத்தை கொட்டு வாயின் மேல் தடவ விஷம் உபயோகம் இறங்கி விடும்.

(35) மருதோன்றித் தழைகளை இடித்து கொட்டு வாய்க்கு மேல் வைத்துக் கட்ட வேண்டும்.



(36) எருக்கன் வேரின் மேற் பட்டை, அதன் பூ, சார்த்தம் தகரையின் இலை, குகம் இலை, மயில் எச்சம், பச்சை மஞ்சள், மருதோன்றி இலை, எல்லாம் சமமாக எடுத்ததைத்து, பெரிய மணிகளாக உருட்டி, கிழலில் உலர்த்திய பின், பத்திரப் பித்தி வைக்கவும். தேன் கொட்டினவுடன் ஒரு மணியை தண்ணீரில் பாதி களைத்து, களைத்த பாகத்தை கொட்டு வாயின் மேல் கொஞ்ச சேரம் வைக்கவும். அப்போது மணியின் சரம் விடிந்ததை உறிஞ்சி விடும். ஆனால் உங்கள் சரத்தை மணியின் காய்க்க பாதியில் படாதவாறு கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(37) உப்பை நீரில் கரைத்து குடிக்கவும். விஷம் வாக்ஷியின் மூலம் வெளியாகும்.

(38) செத்துரம் உட்கொண்ட கோளாருக்கு, 7 கான் வரையில் இஞ்சை உப்புடன் தின்ன வேண்டும். பஞ்சுடன் சேர்த்து வாயில் அடக்கிக் கொண்டிருந்தால் அதன் சாறு தொண்டையில் இறங்கிக் கொண்டே இருக்கும்.

(39) சாதிவீங்கம், இரசம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளுக்கு ஜவான்ஸர் பச்சிலையை கொஞ்சம் தண்ணீரில் அரைத்து அதன் சாற்றை எடுத்து குடித்து வரவும்.

(40) ஆமணக் கெண்ணெய், 1/8 சேர் பசும் பரலில் கலந்து கொடுக்கவும்.

(41) சேங்கொட்டை உட்கொண்டதனால் சரீரத்தில் அரிப்பு, வீக்கம் முதலிய உபாதைகள் ஏற்பட்டிருந்தால் புனிய இலைகளின் சாற்றை எடுத்து குடிக்கவும் அல்லது அதன் கொட்டைகளை அரைத்து தின்னவும்.

(42) சேன் கொட்டை உட்கொண்ட கோளாறுகளுக்கு அக்க கோட் பருப்பு விசேஷ குணமுள்ளது. அதை சாப்பிட வேண்டும்.

(43) கெத்திப் பூச்சி விடித்திற்கு குப்பைகளை தண்ணீரில் அரைத்து குடிக்கச் செய்யவும்.

(44) பாம்பு கடித்தவர்களுக்கு கேர்வாளத்தை தண்ணீரில் அரைத்து கண்ணில் பூசவும். விடிந்ததை கிங்கி கண்களை விபத்தி வின்றும் காத்துக் கொள்ளும்.

(45) மயில் இறகை தறுக்காவில் உள்ள எலகாரில் வைத்து. தறுக்காவில் தண்ணீர் ஊற்றாமலேயே, புதை இழுத்து வந்தால், தேன் விடிந்ததை உடனே இறக்கி விடும்.

(46) திராட்சைத் தழைகளை இடித்து கொட்டு வாயின் மேல் வைத்துக் கட்ட தேன் கொட்டு உபத்திரவம் கிள்கும்.

(47) சுண்ணாம்பை, கோழி முட்டையின் மஞ்சட் கருவில் சேர்த்து தேன் கொட்டின விடத்தில் தடவினால் விஷம் இறங்கி விடும்.

(48) தேனை ரெய்யில் எரித்து, வடி. கட்டின பின்னர், அந்த வெய்யை கொட்டு வாயில் தேய்க்கவும்.

அதே ரெய்யில் தேனைக் கலந்து சிசுவின் தலை மேல் தடவி விட்டால் பின்னர் அது பெரிதாகி இறக்கும் வரையிலும் தேன் விஷம் அசற்கு ஏறுதா.

(49) கடித்த தேளைப் பிடித்து அதை அடித்த பின்னர், உப்பில் தேய்த்து, எரியும் விளக்கில் பிடித்து, கொட்டுவாயின் மேல் வைத்து கழுடி விடவும்.

(50) ஜவன்ஸ் பருப்பு, அத்திப் பழம், பூண்டு இவற்றை இடித்து காடியில் சேர்த்து உட்கொள்ள உடனே தேன் விஷம் இறங்கி விடும்.

(51) மணித பற்கடி அல்லது மணித ககம் பட்ட காயத் திந்து, கோபி என்ற மாக்கறியை தண்ணீரில் அரைத்து தேனில் கலந்து பூசவும்.

(52) பற்கடி, கக்காயத்திற்கு தேனில் உப்பைக் கலந்து தடவினால் கோளாறு ஏற்படா வண்ணம் தடுக்கும்.

(53) ஒரு பிடி பூக்கிக் கொட்டை சற்று அதிக ஜலத்தில் கன்றும் கலக்கவும். ஒரு டபள்ஸ் ஜலம் அளவிற்கு வக்கதும் 2 துளி எடுத்து கடி வாயில் தடவி கொஞ்சம் போல் கண்ணிலும் தடவவும், மீதியை குடிக்க வேண்டும். பாம்பு முதலிய விஷக்கடி மீட்ப் போக்கும்.

(54) பாம்பு கடித்தவருக்கு அதிக தலை வலியா விரும்ந்தால் சேப்பம் வித்தின் பருப்பை தண்ணீரில் அரைத்து குடிப்பதாட்ட.

வும், தெற்கில் மீதும் பந்து போடவும் தொடர்புபடுத்துக் கிழ வந்ததால் தாமரை விதைகள் தண்ணீரில் அழைந்து, பருகச் செய்யவும், கண்கள் நிறக்க முடியவில்லைபயின் மின்கை அழைத்து கண்ணில் பூசவும். காயிலிருந்து துறைவந்தால் சந்தனத்தை தண்ணீரில் இடைத்து பருகச் செய்யவும்.

(55) தேன் கொட்டி மெல் பூண்டின் காய்களை நடவிறல் உபாதையை கிட்டுகிறீர்கள்.

(56) காயுறிய (கிவப்பு) நேர் அல்லது தலைகொஞ்சம் போல் தேன் கொட்டி வளர் காயில்வைத்து மெல்ல உடனே விடும் திறக்கிறீர்கள். வேரை ஜலத்தில் இடைத்து கொட்டுவாயின் போதியும் நடவளரம்.

(57) கல்ல வேலைச் செடியின் விதை 5 திரம் அரைத்து உட்கொண்டால் எல்லாவிதமான விஷங்களாகும் இன்றியமையாத நிச்சயம் வளசொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(58) பாம்பின் விஷமேதியவன் பிச்சுக்குயற்றுப் போய் கை காக்கை அகக்க முடியாமல் போகிறதும் உயிர் மாந்திரம் இருப்பதாகத் தெரிந்தால், எட்டிக்கொட்டையை தண்ணீரில் அரைத்து அவன் தொண்டைக்குள் செலுத்தலாம். இன்னும் அரைத கொஞ்சம் அரைத்து கழுத்தின் பேரியும் நிரோகத்தின் மீதும் தேய்க்க, அவனுக்கு கற்கினை வந்து விடும்.

பாம்புகளுக்கு

(59) எருக்கன் துளிர் 3- பனஞ்சர்க்கரையில் சேர்த்து தின்னச் செய்யவும். அதன் மேல் உருக்கினை செய் பருகச் செய்ய வேண்டும்.

(60) எருக்கன் மொட்டு 4, மிளகு 7, குமட்டிக்காய் 1 மாஷா அரைத்துக் கொடுக்கவேண்டும். பாம்பு கடித்த விடத்தில் எருக் கன்பாலை சொட்டு சொட்டாய் விட்டுக் கொண்டிருக்கவும். உபா தைகள் உணர்ச்சி இழக்கும் வயரையில் கிழத்த வேண்டாம். விஷம் கிண்கிட்டதற்கு அடையாளம் எருக்கன் பால் கவர்த்து போகாமல் கின்று விடும். அதற்கப்பால் பால் விடவேண்டாம்.

(61) எருக்கன் வேரை ஜலத்தில் அரைத்து பாம்புகடிக்கும் கொடுக்கலாம், நெல் இதில் எருக்கன் பருத்தியையும் சேர்த்துக் கொடுக்கிறார்கள்.

(62) மிளகு, சேவ்வைப்பருப்பு, வளைக்கு 7 மாஷா, 3 எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் அரைத்து மிளகு அளவிற்கு மாத் திரைகள் தயாரிக்கவும். ஒரு மாத்திரை தண்ணீரில் கரைத்து பாம்பு கடித்தோரின் கண்களில் கையிடுவது போல் பூசி 23, மாத்திரைகள் உன்னுக்கு கொடுக்கவும்.

(63) பாம்பு கடித்ததால் மூட்டுப்புச்சியை வாயில் போட்டு கிழுகி விடவும்.

(64) எலியின் வயிற்றைக் கிழித்து எக்த இடத்தில் பாம்பு கடித்ததோ அக்த விடத்தில் வைத்துக் கட்ட விடத்ததை அது உறிஞ்சிக் கொள்ளும்.

(65) காட்டு வாகையின் மேற்பட்டை அதன் கெள் பட்டை விதை, பூ, ஒவ்வொன்றும் 1 தாம். ஒரு காண்டி பசு மூத்திரத் துடன் ஒரு காளில் சிதடவை, கொடுத்து வந்தால் பாம்பு விஷத்தை ழிதக்கி விடும்.

(66) காட்டுவாகை மரம் எங்கெங்குக் கெவ்வளவு பழைய கசமாக இருந்து அதன் மேல் பட்டையையும் கறுத்துப் போயிருக்கு மேலாவளவுக் கவ்வளவு அது விஷமிவர்த்திக் சேற்றது. வேலைத் காலத்தில் கடுமையான வெயில் எரிக்கும் போது வாகையின் பட்டையைக் கொண்டு வந்து 3 நாள் வரையில் காட்டி 60 காளில் விடாத்த அரிசிக்கழனியில் அரைத்து உட்கொண் டால் ஒரு வருஷம் வரையில் உட்கொண்டோருக்கு விஷக்கடி பயமே கிடையாது. தப்பித்தவரி யாதோரு விஷத்து அந்தகை யோகாக் கடித்தபோதிலும் அதனே இரத்து விடும். எம்விதமான விஷத்து கடித்தபோதிலும் சரியே கடித்தவிடத்தில் ஒன்றுக்கு இருந்தால் அநிக் பிசயோஜனத்தை தாத்தக்கதாரும்.

(67) சரத்தம் தசரகிதை 1 தாம் மிளகாய் 5 திரம் காய் விடவும்.

(68) 2 திரம் படிசாய் ஜலத்தில் அரைத்து பருகவும்.

(69) கலையன் கொம்பு வீட்டில் உள்ள கவத்திலே அங் கது வெடுத்த வீட்டத்திலே தொங்கவிட்டு வைத்தல்.

(70) ஆட்டுக்குளம்பு, அக்கிரகாரம் இவைகளை மரித்து முக்கப்போட்டால் பாம்புகள் ஒடிப்போம். கடுகுக்கும் அப்படியே குணம்.

(71) 3 தோலா பூண்டுச்சாறு, 3 தோலா தேன் தேன் கொட்டி னாலுடன் உன்னுக்குள் கொடுத்து, கொஞ்சம் போன்ற சேர் வானத்தை துடித்தெழுத்து மண்களில் தடவவும். அதை கொட்டு வாரிலும் தடவலாம்.

(72) ஸதாப் இலியின் சாற்றை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாய்க்குள் விடவும். சில தடவை இப்படிச் செய்தால் பாம்பு விடும், தேன் விடும் இரண்டுமே சிவர்த்தியாய் விடும்.

(73) தேன் கொட்டி னாலும் அதே தேனை அடித்து, கொடுக் குவோழாநீர்தேறியதின்மீது அதை கொட்டு வாரின் மேல் தேய்க் கவும்.

(74) மரிகாய் கந்தல், பூண்டு இரண்டையும் அரைத்து கொட்டிவாரின் மேல் தேய்க்கவும்.

வெறி நாய் கடிக்கு

கடித்த ஈயைக்கொண்டு அதை நுஞ்சுவத்தை கயிற்றில் கட்டு கடித்த ஆளுக்கு கொடுக்க கடிவிடும் உடனே திரும்.

பச்சை விழுங்குக்கு பச்சை கிசியர்கள் குத்திற்று.

மூலத்திற்கு பல் வேறு பாகங்கள்.

(1) பசும் பால் 3 சேர்க்குடிக்கவும். ஆஞல் பாய்டம்பலாரை வாய்க்குள் கொண்டு போனும் சமயத்தில் எதுமிச்சம் பழந்தின் சாற்றை பால்பில் சிழித்து உடனே குடித்து விடும்.

(2) மூலம் படித்திரத்திற்கு:—21 னாத்தி இலையின் மீது 21 எண்ணெயில் அரைத்து 7 மரத்திலைகள் தயாரித்து வாரியில் 1 மரத்திலையும், மரிகையில் 1 மரத்திலையும் விழுங்கிவிடவும்.

(3) பொட்டியப்படி, ரஞத் சமளடை அரைத்து, இவ் கைப்பழத்தில் அளவிற்று மரத்திலைகள் செய்யவும், இந்த மரத்தி லைகளை ஆசனவாயிறும் தடவலாம்.

(4) கடுக்காய் தோல் திரம் 1 கருஞ்சீசைம் 2 திரம் இரண் டையும் வறுத்து அப்பால் அரைத்து, குந்தகு தண்ணீருடன் மரத்திலைகள் வேளை 1-க்கு 1 மரத்திலை.

(5) மஞ்சள் கடுக்காய் தோல், தாண்டிக்காய், செல்லிக்காய், வரைக்கு 10 திரம் சுட்ட காய் மால்சொம்பு 1 திரம் ஓமம், குந்தகிவியம் இரண்டளவு தண்ணீரில் அரைத்து மரத்திலைகள்.

(6) கடுக்காய், செல்லிக்காய் சமளடை, ஜீனியும் இவ்வினை டுத்தும் சமளடை, பண்ணீர் அல்லது சுத்த ஓமம் விட்டமைத்து மரத்திலைகள் செய்யவும். வேளை 1-க்கு 2 திரம்.

(7) கவந்தி மூல உபாகத்தைகளையும் தவிர்த்திற்கும். தென்னன் கொட்டாலைக்கி யொண்ணை எரித்து பின்னர் அதை அரைத்து, அதற்கு சமளடை சர்க்கரையைச் சேர்த்து, அதனை 3 வேளை மருந்தாகிக் கொள்ளவும். இரத்தத்தை உடனே சிறுத்து, ஒரு வருஷம் காலையில் அப்போய் அதுகாது.

(8) வறுத்த சீமை அழுவளை விதை, வறுத்த கோதுமை, சமளடை அரைத்து வேளை 1-க்கு 3 மாஷா, 2 தோலா செய்யுடன் சாப்பிடவும்.

(9) வெப்பாலிலின் கசப்பு, தித்திப்பான வானைய மருந்து சரக்குகளைக்கொட்டி னாலும் இக்கொய்க்கு குணத்தில் சிறத்தாலும். அதுவினம் 6 மாஷா சுத்த ஓலத்துடன் உபயோகித்து வரவும்.

(10) குசம் கிதை மாஷா 3 தண்ணீருடன் உட்கொள்ள தீருவித மூலந்தையும் கண்ணுக்கும்.

(11) மூலங்களில் சிறுக்கை கொண்டு வந்து, அதைகத்தியாக் மெல்லிய கடுக்காய் சீனி, சிறுநீர் உலர்த்திக்கொண்ட வேண்டும். சிறகு அரை அரைத்துத் தூள் படுத்தி, சமளடை சர்க்கரையைச் சேர்த்து ஒருவிடி அளவித்து 40 வன் சாப்பிடவும்.

(12) கடுக்காய் விஞ்சு செயலில் வறுத்தெடுத்து, சர்க்கா னைச் சேர்த்து திரத்தோடும் 1 தோலா சாப்பிடவும்.

(13) “கல்லேலை” குரணம் எவ்வித மூலத்தையும் தவிர்த்துக் கூடிய தோல் கழப்பப்பட்டுக்கொள்ளப்படும்.

கல்லேலை விதை ஒரு பங்கு, சர்க்கரை இரண்டு பங்கு, இந்த இரண்டையும் சேர்த்து வேலை 1க்கு 2 மாஷா தின்னவும்.

(14) பொலியங்கொட்டை வலத்தகைத்து அந்த தூசுடன் மோர்ச் சேர்த்து கொடுக்கவும். தூசின் அளவு ஒரு மாஷா முதல் இரண்டு மாஷாவரை வரிக் கொடுக்கலாம்.

(15) காட்டிப் பருகின் எச்சம், கருவேலன் பூவில் உள்ள மஞ்சள் கிழங்கு பாகம் இரண்டையும் ஒன்றாய் அரைத்து காலையில் ஒரு மாஷா அளவிற்கு சற்று பன்னிரண்டு உட்கொள்ளவும். புளிப்பும், வாயுறுத்தார்த்தங்களும் விலக்கவும். மூன்றேநினைத் தில் குணம் தெரியவரும்.

(16) இரத்தத்தை கிழத்தம்:-பூங்காவி, சீமை கண்ணாம்பு சமனடை குங்கு சாதத்துடன் காலையில் 3 காள் சாப்பிடவும்.

(17) செல்லிக்காய், மருதோன்றிலி, வகைக்கு 10 தாம் 4 சேர் ஐவத்தில் இரவில் ஊறவைத்து அதிகாலையில் அந்த ஐவத்தை வடிகட்டி பருகவும்.

(18) மலவேம்பு மைசாட்டி ரகுத், கரியபாளம், மிளகு, காயி, இவைகளை மனத்தக்காளி இலைச் சாற்றில் அரைத்து இலக்கைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்து வேலை 1க்கு ஒரு மாத்திரை காலை, மாலை உட்கொள்ளவும்.

(19) மூலஇரத்தத்தை கிழத்திவிடும்:-ரகுத் 7 மாஷா விதை யுள்ள கீன திராட்சை 14 மாஷா பாதம் பின் 7 மாஷா, எல்லாம் இரத்தத்தை இலக்கைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரிக்கவும்.

காலையில் ஒருமாத்திரை விழும்பு அரை மால் செய்வில் தோய்த்த இரண்டு கொட்டித் தூண்டுகள் சாப்பிடவும்.

எவ்வித மூலத்திற்கும்.

(20) ரகுத் 2 பங்கு மாதுகித் தோல் 4 பங்கு வெல்லம் 8 பங்கு எல்லாம் அரைத்து மாத்திரைகள் செய்யுகொள்ள. வேலை 1க்கு 4 திரம் மாத்திரைகள்.

(21) வெள்ளை சர்க்காரம் 8 திரம் வெள்ளை கண்ணாம்பு 8 திரம் வறுத்த கடலை 8 திரம். மூலத்தையும் பனஞ்சக்கரையுடன் அரைத்து, 32 மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும்.

உபயோகம்:-வேலை 1க்கு 1 மாத்திரை (காலை மாலை)

(22) இரத்த மூலம், இரத்த மந்த மூலம், இருவகை மூலத் தையும் குணப்படுத்தும். மஞ்சள் கடுக்காய்த் தோல், தான்றிக் காய்த்தோல், செல்லிக்காய் மலமி தனித்தனியே ஒரு பங்கு இவை களை அரைத்து ‘கத்தலு’ பூவின் சாற்றில் விசைத்து மூன்று பங்கு தேனில் பாரு படுத்திக் கொள்ளவேண்டும்.

(23) ஸங்கோவெர் 1 மாஷா மிளகு 1 மாஷா இரண்டையும் பொடிசெய்து கலந்துசாப்பிடவும்.

மூலத்திற்கு இவற்றின் புலையும் பிடித்தல் என்று

(24) கழத்திக்காய் பருப்பை கன்றாய் அரைத்து அந்தோடு 12தோல் சர்க்கரையைச் சேர்த்து சாப்பிடலாம். இது சாப்பிடில் வலையில்செய் பால் அதிகம் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

(25) மஞ்சட் கடுக்காய்த் தோலை செய்வில் வறுத்து அதற்கு சமனடைபாக அரைத்த சோம்புத் தூளையும் சேர்த்திடித்து, ஊதித்தகைவிதை 2 பங்கு முழுதாவே சேர்த்து தினசீதோலும் 2 மாஷா எடை ஒரு சிறு கரண்டி சர்க்கரையுடன் மூலவியாதித் தருக்கு கொடுத்து வரவும்.

(26) கிலதேன்களைப் பிடித்து பாட்டில் ஒன்றிலடைத்து, அதில் கல்லெண்ணெய் ஊற்றி 40 காள் வரைவில் அரை வெயிலில் வைத்தெடுக்கவும். அப்பால் அதில் உள்ள எண்ணெயை ஆரவ வாயில் தடவி வரவும்.

(27) சிறு காகப்பூ, கந்தணி, இந்த இரண்டையும் சம எடையில் கடுத்தி 12 மாஷா அளவில் சாப்பிட்டு கத்தால், மூல இரத்தமும் வலியும் மின்று விடும்.

(28) எட்டித் கொட்டையை எரித்து அதிலிருந்து வெளி வரும் புகையை ஆசனவாயின் மீது படுமபடி செய்தால், வலிக்கு இரத்தம் கின்று விடும்.

(29) கரும் ஊரத்தைச் சாற்றிழித்து அதில் கல்லெண் ணெயை கலந்து எரிக்கவும். சாறு கண்டிப்பாய் எண்ணெய்

தங்கி விட்டதும் அதில் பஞ்சை சேர்த்து ஆசனவாயின் மீது வைக்கவும்.

(30) சுருஞ் சோகம் $4\frac{1}{2}$ தோலா, இதில் அரைபங்கு வறுத்தும், அரை பங்கு கழங்காததுமாக எடுத்து, இரண்டாயும் கலந்து, மூன்று பங்குகளாகச் செப்பி, தினத்தோறும் அதில் உள்ள ஒரு பங்கு உட்கொள்ளவும். அதற்கு மேல், 60 காலில் விளைய அரிசி மீன் சாதத்துடன் மோரை சேர்த்து சாப்பிடவும்.

(31) மூலத்தில் இரத்தம் வந்தாலும், கராவிட்டாலும் அடிசில் கண்டபாசம் அரை கண்டிக்கும் கடியதாரும் :—மூலத்தை கெல்லித்தலும், காண்கித்தலும், கற்கண்டு ஒன்னைனாலும் 5 தோலா, கந்தமான பாகப்பாசி 3 சேர். முதலில் மூன்று வகைத் தலையாலையும் இடித்து அன்றாடம் குழித்து சாது எடுத்துக்கொள்ளவும். தலையே பிழிந்திருந்து சாது வறுநல் சிரமமாயிருந்தால் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். சாற்றை எடுத்த பின்னர், முதலில் சாற்றை குடித்து அதன்மேல் பால் குடிக்கலாம். அல்லது தனிச்சாற்றை உட்கொண்டு சிறிது கோங்குழித்து பால் சாப்பிடலாம். 7 நாள் உபயோகித்தல் வேண்டும். புளிப்பு வாயுவு பதார்த்தங்களும் தள்ளு படி.

(32) பெருச்சாளியின் தோலை யாதொரு பாத்நிகத்தில் போட்டு சுக்கவும். அப்பாத்நித்தின் வாயின் மேல் ஒரு ஹஸி கைய இறுக்கக்கடி விட்டால் அதில் உள்ள புகை பாத்நித்திற் றுள்ளாகவே குழித்து கிழ்கு மல்லவா? அப்புகையை ஆசனவாயில் படுப்படியாகச் செல்கவேண்டும்.

(33) காக்கையின் எலும்பை எறித்து அதன் புகையை ஆசன வாய்க்கு விடக்கவும்.

(34) மூலத்தில் கொடுமையை கிவர்த்திக்கும் :—

குரத்து கிவர்த்தியின் வேரை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் இறைத்து ஆசன வாயின் மீது தேய்க்கவும்.

(35) பொட்டி துட்டைய கண்ணுப் பொடி செய்து ஆசன வாயின் மீது மெல்ல தேய்த்து விட்டபின்னர், இரண்டுபாகள பொருப்புகொண்டு அத்தம்தானத்தின்மேல் அணல் படுப்படி செய்ய வேண்டும். இவ் வட்டிகள் வரையில் இப்படிச் செய்ய வந்தால் ஆசனவாயின் மீதுள்ள பொடுக்கள் உதிர்ந்து விடும்.

(36) கோழிமுட்டைகளை வேகவைத்து ஒடுகளை உடைத் தெறித்த பின்னர் அஜீரணமேற்படாதவிற்கு எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவு பொடுகுவுடன் உட்கொள்ளவும்.

(37) புளியங்கொட்டையை வறுத்து பொடிசெய்து, ஜனத் தைப் பிழித்தெடுத்த தவிர்ச்சுக்கை 3 மாஷா எடையுள்ளதில் கலந்து 7 நாள் வரையில், காலை பல் துலக்கினவுடன் சாப்பிட்டு விடவும். புளிப்பு வாயுபதார்த்தங்கள், ஸ்திரீ சோகம் தவிர்க்க வேண்டும். மூலசோகம் கிவர்த்தியாய்விடும்.

(38) புளியங்கொட்டைதோலை இடித்ததைத்து கடையன் விற்கு மாத்திரைகளாகச் செய்து குறைந்த பட்சம் 3 நாள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் வரையில் கொடுத்து வரவேண்டும்.

(39) 'கல்லவேலை' மூலவாயிலையைக் கண்டிப்பதில் இன்றி யமையாததாரும். அதைக்கொண்டு வந்து தண்ணீரில் கொதிக்கவைத்து அந்த தண்ணீரைக்கொண்டு ஆசனவாயை காள் அலம்பும்போதும் இதர வேலைகளிலும் கழலிவரவும். கொதிக்க வைத்த தழைகளை மீண்டும் எடுத்து கீரை சமைப்பது போல் சமைத்து சாதாரண அரிசி சாப்பாட்டுடன் உட்கொள்ள இரத்த மூலத்தை போக்கி விடும்.

(40) போஸ்தகா, கிலேமெம்பு $1\frac{1}{2}$ தோலா மினு 3 தோலா, கற்கண்டு 9 தோலா எல்லாம் அறைத்து, காலைவில் 2 மாஷா மாலை யில் 3 மாஷா சாப்பிட்டு வரவும், புளி, வாயுவு பதார்த்தமே பத்திய மாகும்.

(41) மூலசோகத்தை ஒரே வாரத்தில் கீர் மூலமாக்கும், பச் கிலே பாகம். ஜக்மே ஹயாத் கொண்டு வந்து கிழலில் உலர்த்தி, அதை உலர விட்டதும் செவ்வனே அறைத்து துளாக்கி, ஒவ்வொரு இர விலும் படுக்கைக்குப் போகும் போது 6 தோலா எடை வெல்லத் துடன் கலந்து சாப்பிடவும். பத்தியம் :—புளி, வாயு சம்பந்த மான பதார்த்தங்கள் உடா. ஜக்மே ஹயாத், புல்வகையைச் சேர்க் தது. இது பூமியில் படத்திருக்கும். இது படர்த்துள்ள விடத்தின் கீழ் பூமி பிசு பிசுப்பாயிருக்கும். பெரும் பாலும் கோதுமைவயல் களிலும், ஆற்றோங்குகளிலும் முளைத்திருக்கும். இது இருவகைப் படும். ஒன்று மெல்லிய சிறு இலைகளைக்கொண்டது. மற்றொன்று

சந்த இடமாயினதும் தடித்ததுமான இலைகளைக்கொண்டது. இது கூட்டாது.

(42) ஜலத்தின் மேலுள்ள பாகியைக்கொண்டு வந்து ஆசன வாயின் மேல் வைத்து சுட்டி விடவும், சூட்டைத் தவிர்த்தும், மயிர்வை கண்டிக்கும்.

(43) பசுவையான மரத்தையைய கசக்கி அதை துண்டாகவில்லைவந்த புசையினைக்குப் பதிலாக குடிக்கவும். இரத்த மூலம், இரத்த மத்த மூலம் இரண்டிக்கும் குணமேற்படும்.

(44) பச்சை கொஞ்சி கொழுத்தை செய்வில் கொஞ்சம் உப்பைச் சேர்த்து வேகவைத்து கிளநீ சாப்பிடவும். கிரைக்கேற்ற கொழுத்து இல்லாவிட்டால் அதன் கஷாயத்தை எடுத்து உபயோகிக்கவும். சிறு காகப்பூ 3 தோலா, படிசாரம் 9 மாஷா—வெள்ளை சர்க்கரை 3½ தோலா— எல்லாம் இடித்தவைத்து 14 பொட்டலம் களில் மடிக்கவும்—காலை, மாலை ஒவ்வொரு பொட்டலமாக ஸாட்டி கஞ்சி (10 களில் விளைந்த அரிசியின் கஞ்சி) யுடன் உபயோகிக்கும். வறட்சி இருமலைக்கொண்டவர்களுக்கும் பலஹீன கவாசயம் பண்டத்தவர்களுக்கும் படிசாரம் கொடுக்கலாகாது.

(45) கடுக்காய், தான்றிக்காய் வண்ணிக்காய் மலை மேம்பு விதை எல்லாம் சம அளவில் எடுத்து, இடித்து இருமடங்கு சர்க்கரையைச் சேர்த்து, ஒரு லகப்பிடி காலைமில் தின்று வந்தால் இரத்த மூலம், சாதாரண மூலம் இரண்டையும் கண்டிக்கும்.

(46) ½ செர் படிசாரத்தை பொரித்து செய்வில் செய்வனை வலிக்கவும். களிம்பு ரூபத்திற்கு வருமளவும் கலக்க வேண்டியுமினசர் சதகுப்பையைதண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து, அதனை அரைத்து ஆசனவாயின் மேல் வைத்து சுட்டி விடவும். அதித்த பதவாக அந்த படிசாரகளிம்பை பெடுத்து பஞ்சில் துலைத்து மூலம் சுட்டை ஆழித்து அதே விடத்தில் வைத்து சுட்டி விட வேண்டும் சுட்டி காலை முதல் மாலை வரையில் வைத்திருந்தால் அருமியுண்டிவான் இடை விடாது இப்படிச் செய்து வந்தால் ஆசன வாயின் பேரில் தோன்றின மச்சங்கள் மறைந்துபோம்.

(47) அருளி விதை சுத்த ஜலம் விட்டதைத்து கொஞ்சம் பெரல் மூல கோயனி வெளிக்கிழுக்கும்போது வெளியில் தண்ணீர்

வரும் ஆசன வாயின் மேல் பூசவும். இதை பூச ஆரம்பத்தில் சத்துபோஷை வுண்டி மாறாது நோயாவாதினும் அரிசிய குணத்தினைத் தக்க கடியதானும்.

(48) ருட்டசத்தின் தோல் வீது சுட்டவர்களுடைய கருதன் மூல உபத்திரவத்திற்கு இவ்விதமானவாத பாகினைத் தாந்தகந்தாகுமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(49) துண்டாகவில்லை வான் வான் மட்ட தண்ணீர் (செட்டிப் போயினது) கொண்டு ஆசன வாயை கழுவுதலும் கண்டி குணத்தினைத் தரும்.

(50) ஆமணங்குருத் தண்ணீர் பச்சையை அரைத்து ஆசன வாயில் சுட்டி வரும்.

(51) மான்சொழுகிற தண்ணீர் விட்டதைத்து அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து குடிக்கவும்.

(52) சரத்தம் தவிர இலை 2 தோலா ½ செர் தண்ணீரில் அரைத்து சுடிசுட்டி அதில் 2, 3 மாஷா காளியைச் சேர்த்து பருகவும்.

(53) காவைக் கொழுத்து 2 நாம், சரத்தம் எடுத்து கொஞ்சம் பெரல் சர்க்கரையாக் சேர்த்து குடிக்கவும்.

(54) வெந்தயத்தின் கஷாயம் பருகி வருகின்றதாய் மூல கோத்தின் கொடியைத் தவிர்த்து விடும்.

(55) ஆசன விதைவை வரித்து அரைக்கி அந்தவனை ஆசன வாயின் மீதுள்ள புணர்வை மீது அரை காயம் ஆக்கிவிடும்.

(56) ஆட்டிக்கொழுத்து அதனை அதன் கொழு அல்லது ருட்டைத்தோல், அல்லது கவிதாவினை சுட்டி, துளை ஆசன வாயின் மேல் துளை விட்டவும். துளையுதற்கு மூன் அந்தவிடத்தை சுத்து சொலிந்து விட்டும் துளையுள் போலாகும்.

(57) - பொட்டி ஹப்பி, தாலை சபத்திர், சஞ்சந், கசர்கோட்டி, வகைக்கு 6 தோலா, பாணந்ஹயம் இடித்தவைத்து, கசகாந்துவைச் சரத்திற் கலத்து மாத்திரை தவிரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். அடியில் 1 மாத்திரை சாப்பிடவும். இது ஒரு பெர்மாரகல் பரட்சித் தட்டைட முறை என வகையப்பட்டிருக்கிறது.

(58) பெரிய கடுக்காய்த்தோல் பிஞ்சு கடுக்காய்த்தோல் தனித் தனியே தோலா 3, மாஷா 1½, சிகின் ஜபின் 11 மாஷா 2 ரத்தி வெண்டை கடுகு 7½ மாஷா எல்லாம் இடித்ததைத்து 4 தோலா, 8 மாஷா எடையுள்ள மைசாட்சி (9 தோலா, 4½ மாஷா எடையுள்ள கத்தளை கஷாயத்தில் கலந்துள்ளது) யுடன் சேர்த்து சிறு உண்டைகள் தயாரித்துக் கொண்டு காலை தோலும் 7½ மாஷா சாப்பிடவும், ஆகாரத்தில் ஆன்கோழி அதாவது சேவலின் சூப், பாலக்கிரா சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

(59) மைசாட்சி 9 தோலா, 4½ மாஷா கத்தளை கஷாயத்திலோ அல்லது வெங்கீரிலோ கலந்து 25 தோலா எடையுள்ள தேனில் பாகு பிடுத்திக்கொண்டு மஞ்சள் கடுக்காய்த்தோல், பெரிய கடுக்காய் தோல் - கெல்லிவற்றல், தனித்தனியே 3 தோலா 1½ மாஷா எல்லாம் இடித்ததைத்து மேற் கூறிய பாகில் சேர்த்துக் கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 3 மாஷா, 6ரத்தி முதற்கொண்டு 7½ மாஷா வரையில் சாப்பிடவும்.

(60) ஆசன வாயில் பித்தத்தால் வீக்கம் கண்டிருந்தால் இந்த பாகத்தை தயாரித்து சோயாளிக்கு பேதி மருந்தாகக் கொடுத்தால் பித்தத்தை கீக்கி சுகத்தைத்தரும்:— ரூர்த்து கிலா வரை 11 மாஷா 2 ரத்தி, புளி 3 தோலா, 1½ மாஷா, பனப்பா, ரோஜா மொட்டு காசினி விதை, இவை தனித்தனியே 7 மாஷா பெரிய கறுவளி 30 எல்லா சாக்குகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ஒரு பாத்திரத்தில் எரிக்கவும், அதை பாகம் ஜலம் சுண்டிப்போயிருக்கையில் அதை வடிகட்டி அதில் சாறுள்ள வீரகிஷத் (மேனா) 6 தோலா, 3 மாஷா, கலந்து இளஞ்சூட்டிலேயே பருகவும்.

(61) காயத்திற்கு களிம்பு:—தேன் மெழுகு 9 மாஷா 3 ரத்தி ஒட்டைத் தியிலின் கொழுப்பு (அதில் 4 தோலா 8 ரத்தி மைசாட்சி ஏற்கனவே கலத்திருக்க வேண்டும்) 3 தோலா 1½ மாஷா சிறையுள்ள கத்தளை கஷாயத்தில் 11 மாஷா, 2 ரத்தி மைசாட்சி கலந்து ஒரு முறை எல்லா வற்றையும் செவ்வனே அறைத்து களிம்பாகி உபயோகிக்கவும்.

(62) காண்டா மிருகத்தின் கொம்பை நெருப்பினிட்டு அதிலிருந்து புறப்படும் புகையை ஆசன வாயில் படிப்படி செய்தால் மூல உபாதை கீங்கும்.

(63) பச்சை அலுரித்தலுமையை கன்றாய் இடித்து சாறு எடுத்து என்னென்னோயில் செவ்வனே எரிக்க வேண்டும். சாறு சுண்டிப் போனதும் என்னொயை மேலுக்கு பூசவும்.

(64) பங்கா இலை, மலை வேம்பு, வேப்பந்தழை, ரொச்சு தழை, அவரி தழை இவையாவும் சமஅளவில் எடுத்துக் கொண்டு அவைகளை முதலில் இடித்து அப்புறம் சட்டியில் போட்டு வேக வைக்கவும் அதிலிருந்து வெளியாகும் ஆவியை ஸ்தானத்தின் மேல் பிடிக்கவும்.

மூலத்திற்கு பல்வேறு பாகங்கள் முற்றிற்று.

கழுத்து சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு

கண்ட மாலை

(1) கோட்டைக் காத்தை தோலா 3 கொண்டு வந்து தண்ணீரில் ஊறவைத்து அதிகாலையில் அதை பிசைத்து வடிகட்டி குடிக்க வேண்டும். சில மாதங்கள் வரையில் தொடர்ந்தாற்போல் கொடுத்து வரவும். சிறுவர்களாயின் 1½ வரையில் கொடுக்கலாம்.

(2) தொண்டை சப்தம் கட்டிப் போயிருந்தால், அரிசியை, வெல்லப்பாகில் சமைத்து கீத்திரைக்குப் போகும் சமயம் வசியு சிறைய சாப்பிட்டு, சற்றுரேத்திற்குப் பின்னர், இரண்டொன்றையள விற்கு வெக்கிரைப் பருகி பிடுத்துக்கொள்ளவும். வெக்கிருக்குக்குப் பின், குளிர்ந்த ஜலம் குடிக்கலாகாது. 2, 3 நாட்கள் வரையில் இப்படியே செய்து வரவேண்டும்.

(3) வாகையின் விதைகளை எடுத்து, ஒரு பங்கு எடைக்கு 2 பங்கு தேன் சேர்த்து இரண்டையும் ஒரு மண் ஜாடியில் போட்டு, அதன் மேல்வாயை மண் தட்டையாவடைத்து அதைச் சுற்றிலும், உளுத்தம்மாவை யொட்டி தட்டு ககாரதளவிற்கு செய்து, 14 நாட்கள் வரையில் பாத்திரத்தை வெயிலில் வைத்தெடுத்த பின்பு அதை திறந்து அதிலிருந்து 1 தோலா எடை கொடுத்து வரவும். ஆண்ட

பாசு நெருப்பைக் கொண்டு 1 வாரத்திற்குள் உபாசை முற்றியும் சிகிக்கிறது. இது பரிட்சிக்கப்பட்டுள்ள முறை.

(4) தொண்டையில் ஏதும்புத் துண்டு சிக்கிக்கொண்டிருந்தால், சைம் அழுவலின் விதைவை வெக்கிருடன் பருகச் செய்தால், சிக்கலை நீக்கி இரத்தி விடும்.

முள்ளங்கி விதைவை ஆட்டி, பாசில் அரைத்து உபாசைக்கு பற்று போடவும்.

(5) பெரிய துவளித்தலையின் மிகுதலான தலையகலை அகலத்து கொழுந்தை பறித்து வந்து, அவற்றை அணலில் வாரடி. 10 வார்த்தையில், குறித்த விடத்தில் மேல் வைத்து, கட்டி வர வேண்டும்.

(6) வார்த்தம் தகலையின் இலைகளை ஜாளலில் வளித்து, அலைகளுடன் மாங்கு மிளகுகள் சேர்த்து வைத்து பூசவும்.

(7) அகலை சிசுக்களுக்குப் பின்னரும் உபாசை சீக்கா விடல், கடுக்காய்ப் பிஞ்சு 4 மாடா அணலில் இடித்தவைத்து உட் கொண்டு வருவதுடன் குங்கியம் தோலா 1. மிளகு 3 மாடா காடி விட்டவைத்து, கவரம்பு ருபத்திலாக்கிக் கொண்டு மேலுக்கு பூசி வரவும்.

(8) மருர் பருப்பு, மல்லி காடி விட்டவைத்து பின், சத்து வார்த்தையில் போட்டுக் காலச்சி பூசி வரவும்.

(9) கக்கு திரம் 1 பசலில் மூத்திரத்தில் காலச்சி, ஆறு விட்டு பூசவும்.

(10) கண்டமாலைக்கு அரிய சிசுக்கா என்பதற்கு “காரபா தீனில்” வாரையப்பட்டுள்ளது. — பாதாம் பிசின் 5 பங்கு, ஓமம் 5 பங்கு, இந்த இரண்டையும் கன்றும் பொடி செய்த பின்னர், கொத்தபுலித்தலையின் சாற்றில் கலந்து கொண்டு, பற்று போட்டு வரவேண்டும்.

(11) ஆட்டிஷன் கொஞ்சேறுமலை கட்டவைத்து அதன் சாய்பலை 2 திரம் அணலிக்கு ஒரு வாரம் வரையில் சாய்பிட்டு வரவும். பசலின் குளம்பையும் கொம்பையும் எரித்து எண்ணெயில் கலந்து பூசவும்.

(12) மீது செடியின் கிளைகளை கொண்டு வந்து அலைகளை பசு அல்லது ஒட்டை மூத்திரத்தில் அரைத்து புதிய கிணர் அதன் மேல் வெற்றிலையை வைத்து கட்டி விட வேண்டும்.

(13) ஆலம்பாலை கண்ட மாலைபுள்ள விடத்தில் தடவிவர விக்கத்தை கலத்திக்கும்.

(14) கொத்தமல்லி, உரி கோதுமைகள் பொந்மா இரண்டையும் அரைத்து பூசி வந்தால், கலை குணமலிக்கும் எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(15) சீர் பீலிசத்தால் தொண்டை சத்தம் கம்மியிருப்பின் மூமத்தை தண்ணீரில் சொதிக்கவைத்து அதைக் கொண்டு வாய்க் கொப்பலித்து வந்தால் சந்தம் சரிபட்டு விடும்.

தொண்டைக் கம்பலை நீக்கும்:—

(1) இஞ்சி துண்டொன்றை எடுத்தி அதன் உட்கத்தை சீக்கி அதற்கு பதிலாக அதனுள் கொஞ்சம் பெரும்பாய்த்தையும் உப்பையும் அடைத்து அதனுண்டை, வந்திரத் துண்டொன்றின் வைத்துச் சுற்றி அதன்மேல் மர்வுபூசி, சுடு சாய்பலில் கொஞ்ச மேரம் வைத்தால் அதிலிருந்து கல்லதோர் மணம் வரத்தொடங்கும். அச்சமலம் அதை மீறித்தொடுத்து மேல், கம்மல் சிகிச்சி விடும்.

(2) வால் மிளகு, இஞ்சுப்பு, சம எடை எடுத்தி, இரண்டையும் பொடிவாய் அரைத்து, தேனில் கலக்கி மாத்லாகைச் செய்து கொள்ளவும். நினைத்தோதும் துரு தோலா எடையுள்ள மாத்லாகைகளை 2 வாரம் சாய்பிட்டுவா, கம்மலை வறவே முழித்து விடும்.

(3) உபத்தின் காரணத்தாலேற்பட்ட தொண்டை சம்ம துக்கு—வாதுறுவை, ஜாசாலி ஓமம், வால்மீனாரு இம்முள்ளையும் அலைத்து தேனில் கலந்து, காலை, மாலை கொஞ்சம் விரலால் எடுத்தி, கால்கில் வைத்து உமிழ் இலக்க வேண்டும்.

(4) கருண்டை சூடான காய்வுக்குள் துழைத்து வயத் திருந்து அப்பால் அதை எடுத்துச் சீவித் தின்னவும்.

(5) காசத்திற்கு:—அகலி, வெத்தயம், மிளதிராட்சா 7, ஒரு தோலா ஜுத்தின் சொதிக்கவைத்து வடிக்கடி ருபுக்கவும்.

(6) கோழியின் எச்சத்தை காடியில் கலத்து தொண்டை மேல் தடவ விக்கத்தை சேக்கும்.

(7) வெத்தயத்தையும் தேனையும் சேர்த்து காய்ச்சி கொதிப்பு கண்ட பிறகு அதை எடுத்துப் பருக கண்டமாலைக்கும் மார்பு வலிக்கும் கைகண்ட சிகிச்சை

கழுத்து சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் முற்றிற்று.

காச சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு

சுவாசகாசம்

(1) மலராத எருக்கன் மோட்டு 2 பங்கு திப்பிலி 1 பங்கு, இத்துப்பு 1 பங்கு, மூன்றையும் பொடியாய் அரைத்து இலத்தைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்து காள் 1க்கு 7 மாத்திரைகள் வரையில் கொடுத்து வரவும்.

(2) வால் மிளகு, மிளகு, வகைக்கு 1 திரம் காட்டா சிங்கி ½ திரம், சச்சிகாரம் வெள்ளை ½ திரம், அபிலி 4 ருன்று மணி எடை, யாவற்றையும் கன்றாய் அரைத்து இஞ்சி சாற்றில் கலத்து இலத்தைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து வேளை 1க்கு 1 மாத்திரை உட்கொள்ளவும். இஞ்சி கிடைக்க விட்டால் சுக்கு திரம் 5 அதற்கு பதிலாக சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(3) கரிய போளம், சச்சிகாரம் வெள்ளை மிளகு, மஞ்சள் எல்லாம் இடித் தலைத்து சோற்றுச் சுற்றழையின் சாற்றைச் சேர்த்து இலத்தை அளவிற்கு உண்டைகள் செய்து கொள்க.

வேளை 1க்கு 1 உண்டை இளஞ் சூடான ஜலத்துடன் கொடுக்கவும்.

(4) திப்பிலி ஒரு தோலாவை, நரமாண வஸ்திரத்தில் வைத்து அப்புறம் அந்த வஸ்திரத்தை அதன் மேல் சுற்றி, சூடான அடுப்புச் சாம்பலில் வைக்கவும். ஒரு மணி வேரதிற்குப் பின், அதை எடுத்து, வறுத்த, சித்தாத்தை, மிளகு, தனித் தனியே 1 மீன்சாம்பல்—கட்ட திப்பிலி 1½ பங்கு எல்லாம் ஒன்றுசேர்ச்

தலைத்து சோற்றுச் சுற்றழை சாற்றில் போட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி, செவ்வனே சூடாக்கின்ற பின்பு கடலை யளவிற்கு சிறு உருண்டைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

(5) மூங்கிலிவி வானைக் கோஷ்டம் காட்டா சிங்கி, மிளகு, கருஞ் சோகம் திப்பிலி, பாங்கி, கண்டன் சுத்திரி விதை எல்லாம் சம எடையில் எடுத்து இஞ்சி சாற்றை விட்டவைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். வேளை 1க்கு 1 திரம், உட்கொள்ளவும்.

(6) வார்த்தம் தகரையின் புதிய பழத்தை கட்டித் தின் பதாம் கல்ல குணமடைக்கும்.

(7) எருக்கன் இலை, போளம், சுத்த காய்ப்பு, மூன்றையும் தண்ணீர் விட்டவைத்து பத்துப் போடவும்.

(8) போளம், மெய் இரத்த இரண்டையும் சிறிய தோர் மண் கலயத்தில் போட்டு அதன் வாயை மூடி எரியும் அடுப்பில் வைக்க சாம்பலாய் விடும். அங்ஙனம் சாம்பலாய் விட்டதும் தினத்தோறும் ஒரு ரத்தி எடை தாமழலத்தில் தடவி அருந்தவும்.

சுவாஸ காசத்திற்கும் இருமலுக்கும்

(9) பழுத்த எருக்கன் இலைகள், அதாவது செடியி லிருந்து உதிர்ந்து விட்டவை 1 சேர், கண்ணாம்பு, உப்பு தனித்தனியே 2 திரம் இரத்த இரண்டையும் தண்ணீரில் அரைத்து, எருக்கன் இலைகளின் மேல் பூசி அவைகளை உலர்த்தி, பிறகு அவைகளை மண் பாத்திரத்தில் போட்டு விரட்டிகளை அடுக்கி ஒரு ஜாமம் வரை எரித்து புடம் வைக்கவும். பஸ்பமாலி விட்டதும் ஒரு ரத்தி உட்கொள்ளவும். தயிர் மோர், பால் புளிப்பு, இவைகள் பந்தியாம்.

(10) குளிர் காலத்தில் எருக்கன் துளிர் வெற்றிலையுடன் சேர்த்து அருந்தவும். 3 நாள் அருந்த வேண்டும். அதற்குப் பின் அதாவது காங்காவது காள் 1½ துளிர்—5 வது காள் 2 துளிர் இதே கணத்தில் 40 நாள் வரையில் அரை யரை துளிர் அதிகப் படுத்தி கொண்டு வரவும்.

(11) மலராத எருக்கன் அரும்புகளை வேண்டிய வரையில் கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு அரும்பிற்குள்வாகவும் ஒவ்வொரு

மிளகு வைத்து, அவைகளை யெல்லாம் புதிய மட்கலய மொன்றில் போட்டு, அவற்றிற்கு மேல் சாதாரண உப்பை பாப்பி, மட்பாத்திரத்தின் வாயை கல்ல விதமாக அடைத்து, அடுப்பின் சரியான நெருப்பில் ஓர் குறித்த நேரம் வரையில் எரிக்கவும். அப்பால், அதை எடுத்து அதனுள் இருக்கப்பட்ட பஸ்பத்தை தினந்தோறும் 4 ரத்தி எடை தின்னவும்.

(12) கவாச காசத்திற்கும், கபம் சம்பந்தமான இருமலுக்கும் :- ஏலக்காய், வாளுளுவை, தனித்தனியே ஒரு மாஷா எடை வாங்கி அப்படியே சேர்த்து விழுங்கி விடவும்.

(13) இஞ்சி சாறு, பூண்டு சாறு, சோற்றுக் கற்றாழைச் சாறு, தேன், இவை யாவும் சம எடையில் பலிங்கான் அல்லது கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில், வைத்து வாயை கன்றாய் அடைத்து, பூமிக்குள் அப்பாத்திரத்தை புதைத்து விடவும். மூன்று நாட்கள் கழிந்தவுடன், பாத்திரத்தை மேலே எடுத்து, ஒரு தம்பிடி அளவிற்கு தினந்தோறும் சாப்பிடவும்.

(14) புகைவிளையை எரித்த சாம்பலை மீண்டும் சுட்டு வெள்ளையாக்கிக் கொள்ளவும். அப்பால் அதை ஜலத்தில் கரைத்து ஓர் இரவும், பகலும் இருக்க விட்டு விடவும். ஆனால் தினசரி 3 தடவைகளில் அதை கலக்கிக் கொண்டு வரவும். பிறகு அதை வடிகட்டி ஒரு செப்புப் பாத்திரத்தில் காய்ச்ச உப்பாகி விடும். இந்த உப்பி லிருந்து 2 ரத்தி எடுத்து வெற்றிலையில் வைத்து சாப்பிட வேண்டும்.

(15) குடு, குளிர்ச்சி சம்பந்தமான எவ்வித கவாச காசத்திற்கும் கல்லது. இஸ்கோல் விதை ஒரு பிடி எடுத்து காலை மாலை 2, 3 மாதம் வரையில் விழுங்கி வந்தால், உபாதை கிவர்த்தியாய் விடும்.

(16) சமுத்திரப் பச்சை 2 திப்பிலி 4 இரண்டையும் சுட்டரைத்து 1 மாஷா அலுவதின்மும் உட் கொள்ளவும். இது உஷ்ணத்தைத் தாக்கடியதாக இருந்த போதிலும் உபாதையை கிவர்த்திக்கும்.

(17) ரேவல் சீனி, கரிய போளம், பெரித்த வெங்காயம் இந்த மூன்றையும் அரைத்து கார்த்தம் தகரை சாற்றில் கலந்து

கொண்டக் கடலை யளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து கொண்டு காலை மாலையாக வேளைக்கு ஒரு மாத்திரை சாப்பிடவும். புற இறைச்சி முதலியன ஆகாரத்தில் சேர்க்கவும்.

(18) வாசனைக் கோஷ்டம், பராங்கி, திராட்சை, அதி மதுரம் இவைகளை இடித்தறைத்து தேனில் கலந்து 2 மாஷா முதல் 4 மாஷா வரையில் சாப்பிட்டு வர காசம், இருமல் கிவர்த்தியாய் விடும்.

(19) சிப்பியை சுட்டு இஞ்சி சாற்றில் அரைத்து கடலை யளவிற்குரிய மாத்திரைகளை தயாரித்து உட்கொள்ளவும்.

(20) பசுவின் பித்தத்தை தனியே விழுங்கி விட்டு, அதன் இறைச்சியை வறுவலாக வறுத்து உட்கொண்டால் ஒரே காலில் கவாச காசம் கிவர்த்தியாய் விடும் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(21) கரிய போளம், மிளகு இவ்விரண்டையும் சமமாக எடுத்து இஞ்சிசாற்றில் அரைத்து மிளகு அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்துகாலை தோறும் 1 மாத்திரை சாப்பிடவும்.

(22) சுத்தி செய்த ஹருசு 1 மாஷா வெல்லத்தில் வைத்து மாத்திரையாக உருட்டி விழுங்கி விடவும். அவசியமாயின், அதன் மேல் கொஞ்சம் தண்ணீர் குடிக்கலாம். 7 நாள் வரையில் இப்படிச் செய்து வந்தால் 20 வருஷத்திய கவாச காசமேயும் அற்றுப் போய் விடும்.

ஆனால் அளவிறந்த குட்டின் பொருட்டு, ஒருவித ஆறு தலின்மை வர்ப்பும். வாந்தி எடுக்கச் செய்யுமா. இதை சமாளிக்கத் தக்க கோயாலியே இந்த முறையை உட்கொள்ள வேண்டும். கஷ்டமான சந்தர்ப்பத்தில் வயப்பயிற் சம்பந்தமான கிச்சடி சாதம் அதிக கெய்யை விட்டு சமைத்து சாப்பிடவும். முதல் 3 நாளைக்குப் பிறகு கஷ்டம் தோன்றாது.

(23) பெரிய கண்டன் சுத்தரிச் செடியின் வேரை துண்டு துண்டாகச் செய்துச் சேர் ஜலத்தில் போட்டு காய்ச்சவும். ஜலம் முழுதும் கனரகப்போய் ஒரு கோப்பையில் கொள்ளக் கூடிய அளவிற்கு வந்தவுடன், இறக்கிக்கொண்டு, கலக்கிவிட்டுக் குடிக்க, காசம், இருமல் இரண்டையும் கண்டிக்கும்.

(24) சோற்றுக் கற்றாழையின் சோற்றை 2 சேர் எடுத்து மண்சட்டி யொன்றில் போப்பிவிடவும். அதற்குமேல் 1 சேர் எடையுள்ள ஓமத்தை பாப்பிவைக்கவும். இதே விதமாக ஒன்றுக்குமேல் ஒன்றாய் 3 அதிகமாக பாப்பி விட்டபிறகு பாத்திரத்தை மேல் மூடி விட்டு அதன் ஓங்களை உருத்தம் மானினால் பலமாய் ஒட்டிவிட வேண்டும். அதாவது அதை கல்லவிதமாக சிலைமண் செய்தபின்னர், 8 ஜாமம் வரையில் அதை இளநெருப்பின் மேல் வைத்து எரிக்கவும். எரித்தானதும் ஓமத்தை தனிப்படுத்திக் கொண்டு கிழலில் உலர்த்தி, அதுகிளையும் 1 மாஷா எடை தின்றுவா, கோழை கபம முதலியவற்றை நெஞ்சிலிருந்து வெளிப் படுத்திவிடும். கிங்க, இதன் உபயோகத்தால் மலச்சிக்கலும் கீங்கிவிடும்.

(25) எலியின் பித்தத்தை கொஞ்சம் வெல்லத்தில் வைத்து உருட்டி தின்றுவிடவும். மூன்றே காவில் காசமனைய அற்றுப் போகும். எலி காட்டெலியாக இருந்தால் மேலாகும். இந்தமுறையை உட்கொள்ளுமுன் காசத்தை அதிகம் தூண்டக்கூடிய துறையில் பத்தியத்தை கவனியாது கடத்து கொள்ளலாம். அடுத்த காலிலிருந்து மேற்கூறிய சிகிச்சை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

பத்தியம் 7 கால்வரையில் உப்பில்லாத கோதுமை ரொட்டி ஸ்திரிபோகம் கூடாது.

(26) சிலந்தியின் வலையை அதில் உள்ள துண்ணிய மூட்டை வகைகளிலிருந்து சுத்தப்படுத்தி, வெல்லத்தில் சேர்த்து உருண்டை செய்து விழுங்கிவிடவும். ஆனால் இது அதிக ரூட்டை விளைவிக்கும். ஆகையால் இதை ரோயாளியின் தேகலையை நிதானித்துக் கொடுக்க வேண்டும்.

(27) சிறியகசப்பு சுரைக்காயின் உட்சதையை எடுத்து விட்டு அதனுள் ஓமம், சச்சுராம், கல்உப்பு, செந்திலப்பு சமமாகக் கொண்டு அடைத்து சிலைமண் செய்த பின்னர் நெருப்பில் எரிக்கவும். சுரைக்காய் சுட்டுப்போக வேண்டும். அதற்குப் பிறகு உள்ளடைக்கப் பட்டுள்ள மருக்கை எடுத்து தினத்தோறும் ஒரு சிட்டிகை கொடுத்துவரவும்.

(28) நீர் பிணம், குளிர்ச்சி இவை கடிபத்தப் பட்டுள்ள கவச காசத்தை கண்டித்துவிடும் :—

குராசானி ஓமம் இரண்டுபங்கு, அபிரி ஒருபங்கு, சிபைமாதுவினதையின் கஷாயத்தில் அறைத்து கம்பு அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்யவும். ரோயாளியின் தேகச்சத்தி தேகசுபாவத் திற்கேற்றவாறு கொடுக்கவேண்டும்.

பொதுவாக இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது மாத்திரை கொடுக்கவும்.

(29) கோதுமை தோலா 4, எருக்கன் பாவில் மூன்றுகால் ஊரவைக்கவும். அப்பால், அதை மண்கலயத்தில் போட்டு, வாயை யடைத்து சிலைமண் செய்து, புடம்வைத்து எரிக்கவும். எரித்து, குளிர்ந்ததும், கலயத்தை எடுத்து, அதில் உள்ள கோதுமையை அறைத்து, இரண்டு தாம் சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி, காலை யில் ஒரு உருண்டை உட்கொள்ளவும். பத்தியம் :— புளி, வாய்வு பதார்த்தங்கள் தன்னுபடி.

(30) காயுறுவின் செடியை எரித்து, அதன் சத்தான உப்பை எடுத்து, கொஞ்சம்போல் உட்கொண்டு வந்தால், நெஞ்சிலுள்ள கபத்தை கீக்கும். காசத்தைப் போக்கும்.

(31) எருக்கன் தழைகளை உலர்த்தியும், எரித்தும், இரவில் அவைகளை ஓர் பாத்திரத்தில் போட்டு, ஓளவிற்கு ஜலம் விட்டு வைக்கவும். காலையில் அந்த ஜலத்தை சுத்தம் செய்து காய்ச்சவும். காய்ச்சக் காய்ச்ச நீர் சுண்டிப்போய் அடியிற் தங்கிவிடும். உப்பை எடுத்து, கொஞ்சம் போல் கொடுத்து வரவும்.

(32) காசத்திற்கு பேதிமருத்து :—கேர்வானம் தோல் உரித் ததை விளக்கில் எரித்துச் சாம்பலாக்கி, அதை 4 பங்குகளாகச் செய்து, ஒரு பங்கை வெற்றிலையில் வைத்து, அருக்தவும்—மேற் கூறிய 4 பங்குகள் 4 காட்களுக்கு உட்கொள்ளவும்.

(33) பொரித்த படிகாரம், கற்கண்டு, சமளடையாக வாங்கி, இரண்டையும் எடுத்து தூளாக்கிக் கொள்ளவும்.

வேளை ஒன்றுக்கு, ஒரு மாஷாமுதல் 6 மாஷாவரையில் கொடுக் கலாம்.

(34) கோதுமை, அவசியத்திற்கு தக்கவாறு எடுத்து அதை எரித்து கரியாக்கிக் கொண்டு அதன் எடைக்கு சமமாக மஞ்சளைக் கலந்து கொண்டு கன்றாய் அறைக்கவும்.

முதல்கள் 5½ மாஷா எடையுள்ள ரூணத்தை வெக்கிர் அல்லது குளிர்த்த ஜலத்துடன் உட்கொள்ளவும். 2-வது நாள் ஒரு தாம் பிடி அளவிற்கு ஒருமாதம் 21 நாள் வரையில் உபயோகிக்கவும். ஒரு வாரமானதும் ரூணத்தெரியத் தொடங்கும்.

(35) இத்துப்பு, முதல்கள் 2 மாஷா அளவிற்கு அரைத்து, தூங்கும் சமயத்தில் உட்கொள்ளவும். அப்பால் அதுவினமும் அரை மாஷா அளவை அதிகரித்துக் கொண்டே போய், 6 மாஷா வுக்கு வந்ததும் கிடைத்திடவும். உப்பை உட்கொண்டதும் தண்ணீர் குடிக்கலாகாது. தாகம் கடுமையாக விரும்பின் இளஞ் சூடான தண்ணீர் குடிக்கவும்.

(36) கையாத்துரை, மிளகு, தேவதாரு, சுத்திசெய்யப்பட்ட கந்தகம், கக்கு யாவற்றையும் சமமாக எடுத்து, செவ்வனே இடித்தறைத்து, ஒரு திரம் எடை தேனுடன் கலந்து கொடுக்கவும்.

(37) காசத்தையும், கபசம்பந்தமான இருமலையும் கிழத்தும். படிக்காரம், அரிசிதிப்பிலி, தனித் தனியே ஒரு தோலா. முதலில் படிக்காரத்தைப் பொறித்துக் கொள்ளவும். அப்பால் அரிசிதிப்பிலியையும் சற்று வறுத்துக் கொண்டு இரண்டையும் அரைத்து ஒன்பது பொட்டலங் களாகச் செய்து அவசியத்திற் கேற்றவாறு ஒரு பொட்டலத்தை கொடுக்கவும். வைத்திய கிபுணர்கள் படிக்காரத்தை கொடுப்பதற்கு குறைந்த அனுமதி யளித்துள்ளார்கள். அநாவகைவை இந்நாமருத்துகளைக்கொண்டு வியாதி நீங்காத சத்தர்ப்பத்தினை இதை உபயோகித்துக் கொள்ளலா மென்பதாகும்.

இளை யிருமல் காலம் முதலிய உபாபைக்கு ஐவையால்:-

(1) அலசிவிதை, சிமைஅழுவளி விதை, இரண்டும் ஒரே அளவில் எடுத்து, கன்றாய் அரைத்து, இருமடங்கு தேனில் கலந்து கொண்டு, தினசரி அதிலிருந்து 1 தோலாவரையில் கவைத்து வரவும்.

(2) வறுத்த அலசி 30 திரம், மிளகு 10 திரம், 3 பங்கு எடையுள்ள தேனை சேர்த்து உபயோகிக்கவும்.

மிளகிற்கு பதிலாக பொதினா சேர்க்கலாம். அல்லது, அலசி ஒரு பங்கில் 3 பங்கு தேனை பாகு செய்து கலந்து கொடுக்கலாம்.

(3) கடுக்காய், தாந்திக்காய், சா எடை எடுத்தறைத்து, பனை, மாலை ஒவ்வொரு டானக் உட்கொள்க.

(4) கண்டக்கத்திரிவேர், சித்தல் இரண்டையும் அரைத்துக் கொள்ளவும். திப்பிலி, பாங்கி, காக்கா சிங்கு, பூலங்கிமுங்கு தனித்தனியே 3 மாஷா எல்லாம் 1 சேர் தண்ணீரில் கொடுக்க வைக்கவும். அரை பங்கு ஜலம் சுண்டிப்போனதும் வடிகட்டி குடிக்கவும். காசம், இருமல் தீரும்.

(5) ஆடா தொடையின் சிறியதோர் செடி ஒன்றை அதன் இலைகள் உள்பட கிழலில் உலர்த்தி, அப்பால் அதனை இடித்தறைத்து ரூணமான பிண்ணர், காவேரில் ஒரு கைப்பிடி யளவிற்கு தின்று வந்தால், காசமும் கொடிய இருமலும் குணமாகும்.

(6) எருக்கன் பட்டை, முருங்கப் பட்டை, ஒவ்வொன்றும் 3 திரம், சச்சிகாரம் 1 திரம், திப்பி 7 திரம் பொரித்த துருகு 1 திரம் எல்லாம் ரூணமாக்கிக் கொண்டு, வேலைக்கு 1 திரம் உட்கொள்ளவும்.

காச சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் முற்றிற்று.

தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு

சொரி சிவந்திற்கு பல வித பாகங்கள்

(1) சுத்தி செய்த கெல்லிக்காய் கந்தகம் மாஷா 6, பனை வெல்லம் தோலா 3, கோதுமை மாவு தோலா 3, ஒரு சேர் எள் எண்ணெய் விட்டு சேகியம் போல் செய்து, ஒரு வஸ்திரத்தில் வைத்து பிழிய வேண்டும். பிழிக் தெடுத்த எண்ணெயை திரேகத் தின் மேல், சொரியுள்ள இடங்களில் தேய்த்து, லேகியத்தைச் சாப்பிடவும். மூன்றே தினத்தில் சொரி சிவங்கு கிங்கிவிடும். ஆனால், அக்காலத்தில் மாயிசம் உட்கொள்ளா திருந்தால் மேலாகும்.

[சொரி சிவங்கின் சிகிச்சைக்காக, ரசத்தை சேர்க்கும் 3பாது, அதனை சுத்தி செய்ய வேண்டிய கிதம் யாதெனில்:-

ரசத்தை மருதோன்றித் தழைகளில் (தழைகள் பச்சையா யிருப்பினும் சரி, அல்லது உலர்ந்திருந்தாலும் சரி) கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அல்லது, எலு மிச்சம் பழச் சாற்றை விட்டு ரசம் பஸ்ப ரூபத்தை அடையும் வகையில் அரைக்க வேண்டும்.]

(2) வெடியுப்பை கடுகு எண்ணெயில் கலந்து, சொரியுள்ள இடங்களி லெல்லாம் தேய்க்க வேண்டும்.

(3) அசைந்த முதலில் வெற்றிலைச் சாற்றில் அரைத்துக் கொண்டு, அப்பால் அதை ரோஜா தைலத்தில் கலந்து பூசவும்.

(4) அரைத்த மருதோன்றியை பசுவினுடைய பழைய கெய்வில் கலந்து பூசவேண்டும்.

(5) காய்ந்த ஆலந்தழை, துவரை மெலாறு (அதாவது பட்டு தலையில் விழுந்து போனது) போஸ்தகா இம்முன்றையும் சம எடை வாய்வி எரிக்கவும். எரித்த சாம்பலை கடுகு எண்ணெ யில் சேர்த்து மேலுக்குத் தேய்த்து, ஒரு மணி கோம் வெய்வில் உட்கார்க்கிருந்த பின்னர் ஸ்கானஞ் செய்யவும்.

(6) கத்தகம் 5 மாஷா, கோழிமுட்டை 2 எண்ணெய் 3 தோலா, யாதொரு பாத்நிரத்தில் போட்டு அதாவது முட்டையை உடைத்து போட்டு அதன் மேல் தூள் செய்த கத்தகத்தை பரப்பி சமைக்கவும். அப்பால், முட்டையின் வெள்ளைக்கரு மஞ்சள் கருவை எடுத்து சொரிவுன்னவருக்கு தின்னக் கொடுத்து அந்த எண்ணெயை மேலுக்கு பூசி விடவும். முதல் காள் கமச்சல் அதிகமா யிருக்கும். இரண்டாவது நாளுக்குடைவிடும். மூன்றாவது காள் கமச்சலின் வடுத் தோல் கொட்டி விடும்.

(7) கத்தி செய்த கத்தகத்தை ரொட்டி மாவில் பிசைத்து, ரொட்டி கட்டு அளவிறந்த கெய்வைத் தடவி, மூன்று நாள் கொடுத்து வர, சொரி சிரங்கு கிவர்த்தியாய் விடும். கத்தகத்தின் அளவு, உட்கொப்பவரின் தேக சக்திக்கு ஏற்றவாறு இருந்தல் வேண்டும். திடகாத்திர முன்ன முதியோருக்கு 6 மாஷாவுக்குட் பட்ட அளவிற்கே கொடுக்க வேண்டும். சிங்க, இதை பராக்கிரம சாலிகளே உபயோகிக்கலா மொழிய, பலதிறன் சுபால முன்னவர் கள் உபயோகிக்கலாகாது.

(8) வெல்லம், ஓமம் இரண்டையும் ஒரே அளவிற்கு எடுத்துக் கொண்டு, பிறகு ஓமத்தை அரைத்து வெல்லத்தில் சேர்த்து 7 நாள் கொடுத்து வரவும், சேர்க்கப் படும் ஓமத்தின் அளவு 9 மாஷா இருக்க வேண்டும்.

(9) வெங்கார்த்தை பொரித்து, சம்பங்கி எண்ணெயில் கலந்து, சொரி சிரங்கு உள்ள இடங்களி லெல்லாம் தேய்த்து; ஸ்கானம் செய்யவும்.

(10) சம்பங்கி எண்ணெயையும், எலுமிச்சம் பழச் சாற்றை யும் கலந்து, அதை இடது உள்ளங் கையில் போட்டு, வலது உள் ளங் கையால், ரூடேந் துரை வரும்படியான விதத்தினை தேய்த்து, சொறிகளின் மேல் தடவி, ஒரு மணி கோம் கழித்து குளிக்கவும்.

(11) சீமை அழவணி விதை, மிளகு இந்த இரண்டையும் இடித் தரைத்து, கெய்வில் கலந்து, சொரியால் ஏற்பட்ட புண்கள் மீது பூசவும்.

(12) சாதா கத்தகம் தோலா 3, ரசம் 7½ தோலா, பொரித்த கருக 9 மாஷா இம்முன்றையும் 2 லாமம் கலவத்தி லரைத்து, 7½ தோலா கெய்வில் கலந்து, அதிலிருந்து கொஞ்சம் போல் எடுத்து மேலுக்கு தேய்த்து, கீழலில் உலர்த்த பின்னர், வெக் கீரினில் ஸ்கானஞ் செய்யவும், சொரி மட்டு மன்றி சர்மத்தின் மேல் படை தடிப்பு ஏற்பட்டிருப்பினும் தீர்க்கு விடும்.

(13) சம்பங்கி எண்ணெய் 7½ தோலா, எருக்கன் பால் 3 தோலா, கஸ்தூரி மஞ்சள் 9 மாஷா, முதலில் சம்பங்கி எண்ணெ யை இசேசாய் கொதிக்க வைத்து, கஸ்தூரி மஞ்சள் தூளையும், எருக்கன் பாலையும் எண்ணெயில் போட்ட பின்னர், அதை அடுப்பி லிருந்து கீழே இறக்கிக் கொண்டு உபயோகிக்கவும். இந்த எண் ணெயை 3, 4 நாட்கள் வரையில் மேலுக்கு தேய்த்துக் கொண்டு வெக்கீரில் குளிக்க வேண்டும். எருக்கன் பால் கிடைத்தல் சாத்திய மில்லையாயின் எருக்கன் தழைகளைத்தானே அந்த எண்ணெயில் எரித்து, எரித்ததும் அசுவகளை எடுத்தெறித்து எண்ணெயை சுத்தப் படுத்திக் கொண்டதும், கஸ்தூரி மஞ்சளை இடித்து அதில் கலந்து கொள்ளவும். அப்பால், 3 நாள் அதை வெசிலில் வைத்தெடுத்து, சொறி சிரங்குகளின் மேல் பூசுவா,

4, நாட்களுக்குள்ளாகவே சொறி சிரங்கு உபாதை முற்றிலும் குழிந்து விடும். இது பரிட்சிக்கப்பட்ட முறை.

(14) கத்தகம், ஊசித்தகா விறை, கஸ்தூரி மஞ்சள், ஜலம் இந்த சரக்குகள் வசைக்கு 1 மாஷா, எடையில் எடுத்து, யாலம்றை யும் இடித்து, 3 பங்கு களாகச் செய்து கொள்க. ஒரு பங்கை கொஞ்சம் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு, காலையில் அதை பருகச் செய்யவும். ஊறிப்போன மருத்து சரக்குகளை மன்றாய் அறைத்து, என்னென்னெய் அல்லது அதைப் போலொத்த வேறெந்த என்னெயிலாவது கலந்து மேலுக்குத் தேய்த்து, ரோயாளியை வெறியில் சற்று கோம் இருக்கச் செய்து, சுமார் ஒரு மணி கோத் திற்குப் பிறகு வெக்கீரில் ஸ்னானம் செய்விக்கவும். இனி, ஸ்னானஞ் செய்து முடிந்தவுடன் அரிசி சாதத்தில் பிழிந்த தயிரைப் போட்டு, வயிரா புகிக்கச் செய்யவும். மருத்தின் மீதியான இரண்டு பாகம் கலையும் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் ஒவ்வொன்றாக மேற் சொல்லிய விதமாய் உபயோகத்தில் கொண்டு வரவேண்டும்.

(15) கத்தகம், காப்போக் அரிசி, கஸ்தூரி மஞ்சள், தனித் தனியே 1½ தோலா, இவைகளை இடித்து 3 பங்குகளாகச் செய்து மேலே சொல்லப்பட்ட முறைப்படியே செய்து கொள்ளவேண்டும். தயிறு சாதமும் அவ்வாறே புகிக்கவும்.

குறிப்பு:— காப்போக் அரிசியும் இதைப் போன்ற சில மருத்து சரக்குகளின் உபயோகம் சில சமயங்களில் சர்மத்திற்கு கெடுதிகைய யுண்டுபண்ணுவதால் ரோயாளியின் தேக சுபாவத்தை யழிச்சித்து உபயோகித்தல் முக்கியம்.

(16) அபினியை ரோஜா எண்ணெயிலோ அல்லது என்னெண்ணெயிலோ எரித்து, எரித்த எண்ணெயை மேலுக்குத் தேய்த்து ஸ்னானஞ் செய்யவும்.

(17) ரோஜா எண்ணெய் அல்லது சம்பங்கி எண்ணெய் எது கிடைக்குமோ அதை வாங்கி, அதன் சம எடைக்கு திராட்சைக் காடியையும், பன்னீரையும் எடுத்து, முன்றையும் ஒன்றாகக் கலந்து கொண்டு, அப்பால் முதலாவதாக சொறி சிரங்கு களை வெக்கீரிலால் கழுவி விட்டு, அதன் மேல் இக்கலப்பை பூசவும், நாட்டுச் சொறிக்கு விசேஷ பலனைத்தரும்.

(18) கொடிசாக்குடாங்கு கந்தையை இடித்தமைத்து, 1 மாஷா அளவில் சர்க்கரையைச் சேர்த்து, வெக்கீருடன் முன்து கான் உபயோகித்துவர எவ்வித சொறி கலமச்சுதும் தீர்த்துவிடும். ஆனால் பேதி யாகும். சிலருக்கு வார்தியும் வடுப்பதும் உண்டி.

(19) வெந்தயத்தை அறைத்து காடியிலும், ரோஜா எண்ணெ யிலும் எரித்து, தேகத்தின் மேல் தேய்த்து, 1 மணி கோத் திற்குப் பிறகு வெக்கீரில் குளிக்கவும்.

(20) சரம் ஒரு பாகம், கத்தகம், துருக 2 பாகம், மாலப்பு 4 பாகம், பகவெய் இருபாகம், சரக்குகளை முறைப்படி அறைத்து, வெக்கீரில் சேர்த்து மேலுக்கு பூசவும்.

(21) ஊமத்தன் காயை யெடுத்து, அதன் தலைபாகத்தைப் பிளந்து, சிறிய சாதின்கள் கூட்டி, பொன்னை அத்துடன் வைத்து, சீலைமண் செய்து, செஞ்சுறில் வைத்து, எரிக்கவும். எரித்த பின்னர், அதனை வெளியில் எடுத்து, மன்றாய் அறைத்து என்னென்னெயில் கலந்து மேலுக்குத் தேய்க்கவும்.

(22) வெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், பிஞ்சு கடுக்காய், இம்முன்றின் ரூணத்தனுடன் கூட்டு சேகத்தையும் பொடியாக்கி தினம் 7 மாஷா தின்னவும்.

(23) வெப்பம் கொழுத்து 2 தோலா தண்ணீர் விட்டமைத்து 1½ நாட்கள் ஊரையில் குடித்து வரவும்.

(24) பிஞ்சுகடுக்காய் 20 திரம் (இடித்து) ஆகாசக்கொடி 5 திரம், ½ கோர் வெக்கீரில் ஊறவைத்து, காலையில் அதை இறுத்தி, 10 திரம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து தினம் இரண்டு தடவை குடிக்க வும்.

(25) தினத்தோறும் 130 திரம் பால் அதன் அதன் அள விற்கு சிசிஞ்சரின் சேர்த்து குடித்து வந்தால், சொறி கலமச் சமஸ்கு இதைவிட மேலான பாகம் கிடைசாதென இரண்டொரு வைத்தியபிபுணர்கள் வரைந்துள்ளனர் ஆனால் இவ்வாறொருக்கும் சாதாரணமாய் நீரணிக்கத் தக்கதல்ல. பயிர் வேளாண்மைக்காக உபயோகித்து வரும் சிசாணாசிகளுக்குக் கூடுதலாகும்.

கந்தக ஹதஸம்

(26) காலகாலித கலமச்சம் சொரிவதற்கும் கந்தத்திலேத்
மலம் படை தடிப்பதற்கும் ஆரிய பாகம் :—

கந்தகத்தை எருக்கன் பாலில் தோண்டு வன் ஹதஸில்
அரைக்கவும். அப்பால் அரைப் பிலேயாசத்தட்டி, கிழலில் உலர்த்தி
மறுபடியும் பாத்திரத்தில் போட்டு அதில் நண்ணீர் கிடை
வரத்தி 4 மணி கோல் இளஞ்சூடான கெய்யில் எரிக்கவும்.
நண்ணீர் கொதிப்படைந்தவுடன் அதன் மேல் மீதக் கூட வரும்
வதல்தை வழித்தெடுத்து அதனை மேலுக்குத் தடவ வேண்டும்

போளம் பில்லுகள்

சொறி சிரங்குளை மிவர்த்திக்கும்; கபந்தையும் மித்தத்தையும்
பொக்கும் :—

மஞ்சள் கடுக்காய்த் தோல் தாந்திக்காய், கொல்லிக்காய், தேரல்
கிக்கியவாய் விவந்தம், இலவங்காயும் சமமான எடையில் தனித்
தனியே ஒருபாகம் வெள்ளைத் தகடை 2 பாகம் எல்லாம் இடித்
தமைத்து அத்துடன் நண்ணீர் சேர்த்து மாத்திரைகள் தயாரித்து
கொள்ளவும்.

உட்கொள்ள வேண்டிய அளவு 3 திரம், மலவிர்த்தி அதிகம்
வேண்டுமாயின் 5 திரம் உட்கொள்ளவும்.

சொறி சிரங்கிற்கு லககண்ட பாகம்

எருக்கன் பாலில் இலகம் செய்து கிழலில் உலர்த்தி மீன்பு
வரித்து எரித்த கரியை கடுகு எண்ணெயில் சேர்த்து, சொறியுள்ள
விடங்களில் தேய்த்து வெகு கோல் வழித்தபின்னர் வெக்கில்
குளிக்கவும்.

முருங்கை வேரை கடுகு எண்ணெயில் எறித்து, அப்பால்
அந்த எண்ணெயை வடிக்கடித்ததும் செய்து, மேலுக்கு தேய்த்து
வரவும்

சொறி சிரங்கு சஞ்சிகை :—

சுரதாய் எண்ணெய் சொறி சிரங்கு சஞ்சிகை

(1) மஞ்சள் அரிதாரம் ஒரு பங்கு, எண்ணெய் 2 பங்கு.
முதலில் எண்ணெயை செவ்வனே காய்ச்சுகொண்டும், கிறம் கிவ

ததும் அரிதாரம் அரைத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் போட்டு,
மர அகப்பையால் அதை கிரைக் கொண்டிருக்கவும். இவ் கொஞ்சம்
பின் மேல் இருந்தல் வேண்டும். எண்ணெயின் கிறம் மாறி அதில்
தீப்பற்றினதும் அந்த செப்பு சட்டியின் மேல் காலை முடிவிலும்,
எண்ணெயில் அதில் பற்றின நீ அலைத்துவிட வேண்டும். இதே வித
மாக சட்டியை 5 தடவைகளில் திம்த்து 5 தடவைகளில் மூட
வேண்டும், கடைசியாக எண்ணெய் குடாரினதும் புட்டியில்
போட்டு வைத்து, அவசியமானபோது மேலுக்குத்தேய்த்து,
வெயிலில் உட்காரத்திருத்தற்குப்பின் வெக்கில் ஸ்காஸ்கு
செய்யவும்.

(2) ஊசித் தகரவிதை சேர் 1—கந்தகம் தாம் 1—பசும் பால்
சேர் 1—கெய் சேர் 1 எல்லாம் சேர்த்து காய்ச்சவும். பால் கண்
டிப்போய் கெய் தங்கிப்போனதும் அதை சுத்தப்படுத்தி மேலுக்
குத் தேய்க்கவும்.

(3) அருளி இலை 20, பறித்து வந்து அலைக்கீர் எண்ணெய்
கொயில் செவ்வனே எரிக்கவும். இலைகள் எரித்து போனதும்
அவற்றை எடுத்தெறித்து எண்ணெயை சொறியுள்ள விடங்களில்
மேலுக்குத் தேய்த்து வெக்கில் குளிக்கவும்.

(4) ஊசித்தகர விதைதிரம் 1—கந்தகம் 21 பாஷா—இரண்டை
யும் இடித்துக்கொண்டு, இரண்டு சேர் பசும் பாலிலும் 1 சேர் கெய்
மீது காய்ச்சவும். பால் கண்டிப்போய் கெய் மாத்திரம் தங்கி விட்ட
தும் அதை சுத்தமாய் எடுத்து, மேலுக்குத் தேய்த்து, குளிக்கவும்

(5) பாலக்கிண்கிதை, கலகலா இரண்டும் சம எடை
அரைத்து மேலுக்குத்தேய்த்து வெக்கில் ஸ்காஸம் செய்து வக்
தால் 2-3 தினத்திற்குள் கலமச்சம் திராரணமாகி விடும்.

(6) துப்பாக்கி கந்தகத்தை கடுகெண்ணெயில் கலத்து,
மேலுக்குத் தடவி சற்றுமேல் வெயிலில் காய்த்தபின்னர், ஸ்காஸ்கு
செய்யவும்.

(7) வேர்க்காத்தை, சம்பங்கி எண்ணெய், பண்ணீர், எலு
ய்ச்சம் சாது இம்மூன்றிலும் கலத்து மேலுக்குப்பூசி குளிக்கவும்,
கிவ் இதில் கொஞ்சம் போல் சுத்தாத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ளு
கிறார்கள்.

(8) செத்துரம், செல்லிக்காய், கத்தகம், முந்தாச் சிற்றூ, னுருக, இவையாலும் தனித்தனியே ஒரு தரம். எல்லாம் பொடியாக ஆனதனு பக கெய்தோலா 4,ல் கலந்து பூசவும்.

(9) னுருக, செல்லிக்காய் கத்தகம் கற்பூரம் தனித்தனியே தரம் 1—உருவின பக கெய்தோலா 3 ல்லாம் அனாதத்து கெய்கில் கலந்து கொண்டு மேலுக்கு நடவி கத்துகேரம் கெய்கில் உட்கார்ச் சிறுத்த பிண்டர் குளிக்கவும்.

(10) சம்பங்கி எண்ணெய் தோலா 1 உயரிய கற்பூரம் மாஷா 1½, இந்த இரண்டையும் சேர்த்து, படுகைக்குச் செல்லுமபோது தேகத்தில் சொரியுள்ள கிடங்கலில் தேய்க்கவும். இவ்வாறு மூன்று இரவுகள் உபயோகித்துவந்து புதுவாஸஸ்தானஞ்செய்ய வேண்டும்.

(11) சொறி சிறகு, வரட்ச்சொறி, கணமச்சல் ஆக எல்லா வற்றையும் சிவர்த்திக்கும் :—

முடிசெல்லிக்காய், கொட்டையுடன் கூடிய மஞ்சட்கடுக்காய், மும் மூன்று தோலா எடை, உமசாரம், கத்தி செய்தசகம் மாஷா— 10, இந்த சர்க்குடைய பெல்லாம் என்னெண்ணெயில் கசித்து மேலுக்குநடவி, தேகத்தை அணலில் குடுதெற்றவும். எது காரை லில் உடுமோ அதுவரைவிலி அடுத்தடுத்து எண்ணெய் தடவலாம். இந்த சிவச்சையால் மூரே இரவில் சொறி சிறகின் உபாதை அற்றுப்போகும்.

(12) செல்லிக்காய், தான்றிக்காய் பிஞ்சுகடுக்காய், கார்பேரக் அரிசி இம்மூன்றையும் அஷுரத்து, 7 மாஷா குணத்தை அது தினமும் சாப்பிட்டு வரவும்.

(13) கசித்தகாலிதை, தோலா—6, செல்லிக்காய் தோலா— 3, அறுபதாங்குருவை அரிசி தோலா 1½ மூன்றையும் இடித் தரைத்து, தண்ணீரில் சேர்த்து, தேகத்தில் தேய்த்து 3 மணி சொத்திற்குப்பின் வெந்நீரில் குளிக்கவும்.

(14) பனஞ்சர்க்கரை ஷாஸி சேர் 2, பகசெய் ஷாஸி சேர்— 2, குசுஷா ஷாஸி சேர் 1½, குசு அனாதத்து வஸ்திகா காயஞ்செய்து, இதா சர்க்குடையும் சேர்த்து மூன்று உருண்டை களாக்கிக் கொள் ளவும். உருண்டைகளுக்குரிய சரம் இல்லையாயின் கொஞ்சம் ஐந்தத்தை கலந்து கொள்ளலாம். இனி இந்த மூன்று உருண்டை

கனது. மூன்றை எடுத்து வகாஸப்பெடி உபயோகிப்பது போல் திரோகத்தில் உருட்டித் தேய்க்கவும். தேய்த்ததும் கொஞ்சகேரம் வெந்நீரில் காய வேண்டும். மனங்கொண்ட கனா குளித்த ஜலத்தில் குளிக்கலாம். இரண்டாவது கால் அனரிய பிஞ்சுதால் இரண்டாவது உருண்டையை உபயோகிக்கலாம். இரண்டே காலில் சொறி பரந்துவிடும்.

உள்ளவகையில் தோல் உயிர்நல், தடித்தல்

முதலிய உபாஸைகளுக்கு

(1) ஆடுபெயர் அல்லது பகம் பகம் சேர் ½ இதை மூன்று கொதிப்பு வரும் வகையில் காய்ச்சவும். பிறகு திராட்சைக்காய் 6 மாஷா அதில் போடவும், பால் வெடித்துப்போகும். அப்போது அனாத துணியில் வடிசுட்டி, பாட்டிலில் அடைத்து வைக்கவும். மேற் சொல்லிய உண்ணவை உபாஸைக்கு அதிலிருந்து கொஞ்சம் எடுத்து தேய்த்து வரவும்.

(2) னுருக்கள் பால் மட்டபாத்திரத்தில் போட்டு, அதில் அனாதத்த மீன்குணன் கொஞ்சம் கலந்து, அதிலிருந்து கொஞ்சம் போல் தொட்டு தேய்க்கவும்.

தோல் வெடிப்புக்கு

மருதோன்றியை தண்ணீரில் கலந்து மொத்தையாய் பூச வும். அப்பால் 2 மணிகொய்கறித்து அதை எடுத்து கீட்டி, அந்த விடத்தில் ஆமணக்கெண்ணெய் தேய்க்கவும். இதனால், நோயுக்கு வலிமை ஏற்படும், மேற்கொண்டு வெடிக்காமற்போகும்.

நக ரோகத்திற்கு

(1) கசம் முறித்துபோனல் அப்பண்ணின்மீது மாதிரி தழைக்கி அனாதத்து வைத்துக் கட்டவும். கைகள் முறித்து போயின், கீலவஸ்திரத்தைக் கற்றிக் கட்டிவிட்டு, அதன்மேல் சிறுசீர் விடவும்.

(2) கசம் முறிவுக்கு, —காடி 1 பங்கு, என்னெண்ணெய் இரண்டு பங்கு இரண்டையும் அடுப்பில் ஏற்றி உன்றும் கொதிக்க வைக்க வேண்டும். அத்துடன் கொஞ்சம் வச்சித்தையுள் போட்டு உருக்கி, அனாத கணிப்பு மூபத்தில் செய்ந்து, அந்த விடத்தில் தடவி விடவும்.

(3) கசத்தில் ஒருவித மதமதப்பும் அரிப்பும் ஏற்பட்டால், பேதிக்கு சாப்பிட்டேவிட்டு, அரிதாரம், கீன திராட்சை இத்த இரண்டையும் கன்றாய் அரைத்துப் பூசவும்.

மச்சங்களுக்கு சித்திசை

(1) மயில் பறவையின் எச்சத்தை காடியில் கலந்து மச்சத் திற்கு மேல் தடவி வந்தால் அது உதிர்ந்து போகும்.

(2) காய்ந்து கிடக்கும் காணத்தால் முதலில் மச்சத்தை தேய்த்து விட்டு, சச்சிகாரத்தை தண்ணீரில் கலந்து மச்சத்திற்கு மேல் பூசி வந்தால் இரண்டு மூன்று கால்களால் மச்சம் கீழ்விழும்.

(3) மயிலையை அரைத்து பூசுவந்தால், மச்சமும், வயிற் களும் கீழ்த்தியாய் விடுமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(4) பருப்புக்கிரையின் தழைகளை மச்சங்களின் மேல் தேய்த்து வர கல்ல குணஞ் செய்யும்.

(5) கிப்பியை எரித்து, காடியில் கலந்து பூசுவரும்.

(6) மச்சங்களுக்கு வியக்கத் தக்கதோர் சித்திசை:- காய்ந்த கோண்டக்கடலைகளை, பிறை முகல் தேநீரின்மீது மச்சங்களை எண்ணிக்கையிற் போட, அதாவது:-ஒவ்வொரு மச்சத்தை நுள் வொரு கடலையால் தொட்டு, தொடப்பட்ட கடலைகளை யாவும், ஒரு முடிச்சு போட்டு அந்த முடிச்சை கையில் எடுத்து, 2 கால் களுக்கு மத்தியிலிருந்து எகவையக்கொண்டு போய், தோள்களுக்கு மேலாக முதுகின் மின்பக்கம் அந்த முடிச்சுபோய் விழுகாது, விடு எறியவும். ஒரு மாதத்திற்குள் எல்லா மச்சங்களும் உதிர்ந்து விடு மென பரிட்சித்தவர் கூறியுள்ளார். இவ்வாறு, தொடர்ச்சியாய் ஒரு மாதகாலம் செய்து வரவும்.

(7) புலவர் கிழங்கையோ அல்லது தாண்டூர் மஞ்சளையோ ஜலத்தில் அரைத்து மச்சங்களுக்கு மேல் பூசுவா கிவந்தவராரும்.

(8) குன்றுமணியை என்னில் அரைத்து, அதனை படுக் கைக்குச் சொல்லுமபோது முகத்தின்மேல் பூசி காணியில் ஜலத்தால் சுத்தி செய்து விடவும்.

(9) குன்றுமணியிற்று, கல்லுப்பு இரண்டும் சமளவை இவற்றை செயலானே முகத்தில் அரைத்து, இரண்டு முகத்திலே

மேல் பூசி, காணியில் கழுவி விடவும். மச்சங்களுக்கு இது இன்றியமையாத சித்திசை. கல்லுப்பு தலையே உபயோகித்து வரினும் தக்க பயனளிக்கும்.

(10) வரவை மாதத்தின் மேல்பட்டை, என்னு இரண்டும் சம லவை காடியில் அரைத்து மச்சங்களுக்கு பூசவும்.

முடிப்பருவுகளுக்கு

(1) கொன்றை மாதத்தின் பட்டை, கல்தாசி மஞ்சள், கோலாக்கெழற்கு எல்லாம் சமளவையில் கொண்டு கன்றாய் அரைத்து, முகத்தின்பேல் தேய்த்து, உலர்ந்தபின்னர் முகத்தைக் கழுவி விடவும்.

(2) இவற்றைக் கொட்டையில் சத்தா அறிமதாரம், கோஷ்டம் இம்முன்னையும் தண்ணீரில் அரைத்து முகத்தில் தேய்க்க மச்சம் பருவு கீழ்கும்.

(3) பருப்புக்கிரையை பசுப்பையில் அரைத்து முகத்தில் எங்கும் தடவவேண்டும்.

(4) பூலாங்கிதங்கு, சமுத்திரப் பச்சை, இரண்டையும் ஜலம் விட்டலாத்து முகத்தில் தேய்க்கவும்.

(5) வெள்ளை குன்றுமணியின் கித்த இத்துப்பு இரண்டையும் அரைத்துக் கொள்ளவும். எட்டிக் கொட்டையை ஜலத்தில் கைவைத்து அந்த ஜலத்தில் பெற்கண்ட ரூரணத்தைக் கலந்து பூசவும்.

(6) மஞ்சள் பலகலையை அரைத்து எலுமிச்சம் காத்நில் கைவைக்கவும். சாமெல்லாம் அதில் கவர்த்துபொனவுடன், அரைத்து அரைத்துக்கொண்டு காணியை முகத்தில் தேய்க்க, முகத்தை பருக்களை விட்டும் கீச்சு மெனியைத் தரும்.

(7) அப்போகே கறத்த புதுராவில் கொளதானியத்தை அரைத்து முகத்தில் தேய்த்து வரவும்.

(8) மஞ்சிட்டி கிப்பி சத்தனம், மஞ்ச் பருப்பு, பூண்டின் தூள், எல்லாம் ஒன்றாக இடித்ததைத்து பருக்களின்மேல் தடவவும்.

(9) கொண்டக்கடலை, பருப்பருப்பு, பட்டாணிக்கடலையின் மாயு, இவைகளை அரைத்து, அதன் கலப்புமரவை முகத்திற்கு அடித்துப் பூசுவதே சத்தத்தைத் தரும்.

(10) முழுசொப்பரை கொள்ளுதல் கொண்டுள்ள அரைத் துண்டை கிதயதோர் துண்டிய செய்து அதனுள் குங்குமப்பூ தாம் 1, சாதிபத்திரி, தாம் 1 (சாதிபத்திரியை தண்ணீரில் அரைத்துப் போடவும்) இரண்டையும் போட்டு, அதைத் துண்டியே அதன் மேல் ஓட்டி, பசும்பால் 3 கோளில் கொதிக்கவைக்கவும். இதை இரண்டு கடனை கொடுப்பின் மேல் கொதிக்கச்செய்யவேண்டும். பால் முழுதும் கண்டிப்போனவுடன், கொப்பரையை எடுத்து அதனுள் இருக்கப்பட்ட மருந்தை வெளிப்படுத்தி அதை எல்ல விறகாக அரைத்து கடலை அளவிற்று மாத்திரைகள் நவாதித்துக்கொண்டு, காசியில் ஒரு மாத்திரை தாமபூலத்துடன் அரைத்துவேண்டும் மத்திரின் முகவகைத்திக்கு இது பரிட்சிக்கப்பட்ட பாகம் எல்ல தாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

(11) கருவப்பிசின், பாதம்பிசின், கிழங்குதா என்ற ரோதுவை மாவு, இம்முண்டையும் இன்சோர்விலை அரைவைத்து துலத்திலோ அல்லது பருப்புக்களோ அரைப்போட்ட தண்ணீரிலோ சேர்த்து முகத்தின் மேல் பூசிக்கொண்டு வந்தால் வெளிக்கொண்டு வராமல் ஏற்படக் கூடிய முகத்தின் கருப்பு கிறத்தை மாற்றியிடும்.

முகத்தில் தோன்றும் கரும் தேமையுக்கு

(1) தம்பூலிக்கையில் துளிக்கொண்டுவதில் அரிசி கிரப்பி, 1 காண்வைத்திருந்த நற்குப்பிலே, அந்த அரிசியை எடுத்து, உலர்த்தி, முகப்பவுடரைப் போல் உபயோகித்து வரவேண்டும்.

(2) மான்சொட்டைப்பருப்பு எகப்படுத்தின் விதை இந்த இரண்டையும் துலத்தில் அரைத்து முகத்தில் பூசி சமது கொள் சுழித்து சுத்தம் செய்து விடவும்.

(3) கித்தாந்தையை துலத்தில் அரைத்து, சில காட்கள் வரையில் தொடர்ந்து பூசிக்கந்தால், அது சர்மத்தில் உள்ள கருப்பை உறிஞ்சி விடும். அப்பால், அரிசியை அரைத்து முகப் பவுடரைப் போல் பூசுவா சர்மத்தின் கிறத்தை பூர்த்தி செய்து விடும்.

(4) குப்பைகளிலாச் செடியின் வேளையும் கொப்புளியும் எரித்து எரித்த கரியை தண்ணீர் விட்டவைத்து, கரும்பேமலின்

மீது தேய்க்கவும், அப்பால் ½ மணிசேரம் வெளியில் காய்த்து வெக் கீரைக் கொண்டு கழுவி விடவேண்டும்.

(5) காய்ந்த துளசி இலைகளை அரைத்து அதன் துளை மேன் மேலும் தேய்க்கவும்.

(6) பொட்டுலுப்பு, அரிதாரம் தனித்தனியே ஒருதிரம், இவ்வே 3 பங்கு களாகச் செய்து, ஒரு பங்கில் உள்ள துளை தண்ணீரில் கலத்து முகத்தில் பூசவும். ½ மணிசேரம் வெளியில் இருத்து விட்டு வெள்கிரிஞல் முகத்தை கழுவி விடவும். மூன்றே காட்களில் தேமல் போய்விடும்.

(7) கொடி எலும்பிச்சம் பழத்தை இரண்டாக அரைத்துப் பிளத்து கொண்டு, மஞ்சளை கலக்கி, அதன் துண்டுகளை அத்துண்டு களில் கிறப்பி அந்த இரண்டு துண்டுகளையும் மீண்டும் ஒன்றாகக் கட்டி, ஓட்டிவைத்து, ஒருவாரம் விட்டு விடவும். பிறகு மஞ்சளின் துண்டுகளை எடுத்து பழைய “சர்க்கல்” வேருடன் அரைத்து இரவில் இதை தேமலின் மேல் பூசி காசியில் வெக்கீரைக் கொண்டு கழுவிவிடவேண்டும்.

(8) தேன், காடி இரண்டையும் கலத்து கொண்டு பூசவும்.

(9) வெப்பம் விதைகளை காடியில் அரைத்து பூசலாம்.

(10) புருளச்சத்தை தண்ணீரில் அரைத்து முகத்தேமலுக்கு பூசுண மேற்படும்.

(11) வெள்ளைத் தேமலுக்கு :—மஞ்சர் பருப்பை எலும்பிச்சம் சாற்றில் கன்றாய் அரைத்து பூசுவாவேண்டும்.

(12) மஞ்சள், எள்ளு இந்த இரண்டையும் எருமைப் பாயில் அரைத்து பூசவும்.

(13) கனித்தகாவியை இடித்து, அதை மேலில் 2, 3 நாள் வரையில் வைவைத்தெடுத்து, கருத்தேமல் உள்ள விடங்களை செல்லாம் தேய்த்து வரவேண்டு செய்தவும்.

துடை சிறங்கிற்று கிடுக்கை

(1) இது பழுத்து உடையும் சமயம் கொடிய கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடியதாகும். சில சமயங்களில் அதை ஆப்போஷன் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. வரையறுத்தின்

வெர் கட்டையை மாலிடழந்திரத்தில் அழைத்து அழைத்து குட்டுடன் கொடுக்க மேல் வைத்துக் கட்டிவிடவும்.

(2) அசைன் தழைக்கை அவற்றின் முன்பக்கத்தில் அணல் காட்டி குட்டுடன் வைத்துக் கட்டவேண்டும்.

(3) பெரிய கறுவளி இலக்கையும் அவ்வாறே அணல் காட்டி கட்டி விடவும்.

(4) கெல்லி, பெரிய கறுவளி, புலி இம்முன்று செடிவளின் மேல் பட்டைகளை தண்ணீரில் அழைத்துக் கட்டவும்.

(5) பருத்திக் கொட்டையை உருட்டினால் அது உருண்டையாய் விடத்தக்களவில் இடித்து, அப்படியும் அதை பிள்ளையாகந்தட்டி, அணல் காட்டிக் கட்டவும். கட்டியின் ஆரம்பத்தில் சுண்ணாம்புடன் தேனாக்கலத்து ஒரு துணித்துண்டில் பூசி, அதன்மேல் கட்டிவிடவும். சுண்ணாம்பில் மூட்டையின் வெள்ளைக் கருவைச் சேர்த்துக் கொள்வதும் மேலாகும் வளச் செர் கூறியுள்ளார்கள்.

(6) கடுக்காய்த் தோலை ஆமணக் கொண்ணெயில் வறுத்தழைத்து, அப்படியும் அதை காடியில் கலக்கி பூசவும்.

(7) தோடைக் கட்டிக்கு தீவிரகுணத்தைத் தாக்கடிய சிகிச்சை :— துருசு அளரபாகம், தலாதுன், மஞ்சன், குங்கிலியம் வெள்ளை ஒருபாகம் மைசாட்சி 2 பாகம் வெள்ளம் 2½ பாகம் வல்லம் ஒன்றாக அழைத்து கட்டிக்குமேலே பூசவேண்டும்.

(8) கடலைமரசை மைசாட்சியில்சேர்ந்து பிள்ளையாகந்தட்டி அதன் மேல் வேப்பந்தழைக்கை அணல் காட்டி வைத்துக் கட்டி விடவும். வேப்பந்தழைக்கை மாத்திரம் மேலே கட்டினால் போதுமானது.

(9) எட்டிக் கொட்டையை சந்தனப் பதத்திற்கு இழைத்து அத்துடன் மிளகு பொடியையும் கலந்து இளஞ்சூடாக கட்டவும்.

(10) கடுக்கை வெக்கிநில் அழைத்து கட்டிக்கு மேல் பூசலாம்
மரீட்சிக்கப்பட்ட மேல் பூசு
மேலே தினத்தில் குணப்படுத்தும்

(1) வெக்காயத்தை கத்திரியைக் கொண்டு பொடியாய் அளிக்க, மேலாய்வித்குட்டப்பட்ட வையன் மூத்திரத்தில் காய்ச்சி,

வெக்காயம் வெந்து போனவுடன் அதை திரட்டி மொத்தையாகச் செய்து கட்டியின் மேல்வைத்துக் கட்டவும்.

(2) கக்கத்தில் ஏற்படுமீக்கம் கட்டிக்கு:— கடுக்கை வெக்கிநில் அழைத்து பூசவும்.

(3) துளசி இலை, அதன் சமஅளவிற்கு ஆமணக்குத்துளிர் செவ்வனே அழைத்து, அத்துடன் கொஞ்சம் போல் உப்பையும் கலந்து பூசவும். இதுகக்க வீக்கத்திற்கு மட்டு மன்றி, காதுகளுக்கும் உண்டாகும் வீக்கத்தையும் நீவர்த்திக்கும்.

சிறங்கு கட்டிகளின் வீக்கத்தை கறைக்கும் பூச்சிகள் -

(1) மாங்காயின் பச்சைக் கொட்டையில் உள்ள பருப்பை தண்ணீர் விட்டழைத்து சூடுகாட்டிய மிளகன், வீக்கத்திற்கு மேல் பூசவும்.

(2) ஆமணக்கம் பட்டை, மூக்கொட்டைப்பட்டை, சுக்கு இம்மூன்றையும் அழைத்து மேலுக்கு பூசவும். ஸமந்தையை வீக்கத்தில் மேல் வைத்துக் கட்டுவதும் கல்ல குணஞ்செய்யும்.

(3) ஆட்டிப் பூழ்க்கண்ணை வீக்கத்தின் மேல் பூச, பழைய வீக்கமாயினும் நீவர்த்தித்து விடும்.

(4) கக்கத்தில் ஏற்படுமீ வீக்கத்தை உடனே கறைத்து விடும்:—கத்தாய்ப்பு, முந்தார் மிளகு, தாலிசபத்திரி, சிவப்பு சந்தனம், இடித் தழைத்து தண்ணீரில் கலந்து வீக்கத்தின் மேல் பூச வேண்டும்.

வாலினைய நீக்கவும், கட்டியை பழுக்க வைத்து அதில் உள்ள அசடுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும், கைகண்ட பாகம்:—

(1) வயப்பயிறு, ஜவ்வரிசி, தட்டப்பயிறு, மஞர் பருப்பு, இவை நாலும் சமமாக எடுத்து காடியிலும் துவத்திலும் அழைத்து, பசையாகக் காய்ச்சி, கட்டிகளின் மேல் பூசவும்.

வாலி வீக்கத்திற்கு:—

(1) காட்டுவாக்கைத் தழைக்கை தினத்தோறும் சுற்று அழையில் வதக்கி, உபயோகக்கு மேலே வைத்துக் கட்டவும்.

(2) ஆலக் தழைகளை வெய்யில் தோய்த்து, அனல் காட்டி கட்டவும்.

(3) அத்தி இலைகளை செவ்வனே பிழிந்து சாந்தை மாலில் பிசைத்து கட்டவும்.

(4) மல்லியை மணித மூத்திரத்தில் அரைத்து, மேலுக்குப் பூசவும்.

(5) குமட்டி விரைகளை காடியில் அரைத்து, பற்றுப் போடவும்.

(6) இல்கோல் விதைகளை இடித்துப் பூசவும்.

(7) அரசும் பட்டையை கல்ல விதமாக அரைத்து, மேலுக்கு பூசி வர கட்டியை பழுக்க வைத்து அதனுடன் இருக்கப் பட்ட சீழ், இரத்தம் முதலிய அசுக்களை வெளிய்படுத்தி விடும்.

(8) வாதுவாறுவை இலை, புளிய இலை அரிசி நுல்வொன்றையும் ஓர் அளவில் எடுத்து, கொதிக்க வைத்து, அப்பால் அலர்ந்தை அரைத்து மேலே வைத்துக் கட்டி விடவும்.

(9) தோல் சிக்கிய புளியல் கொட்டைமையை கன்றும் வேக வைத்து, கட்டிகளின் மேல் வைத்துக் கட்ட சிவிரம் உடைத்து விடும்.

(10) சவுக்குத் தழை, பாசிப் பருந்தின் பருப்பு, புருவின் எச்சம் இவைகளை சற்று கோம் அடுபின் மேல் உள்ள ஒட்டிக் போட்டுக் கிடை இளகு குட்டிடனோமே சிரங்கின் மேல் கட்டி விட வேண்டும்.

(11) போட்டுக் கொள்ளும் புகையிலையை கொஞ்சம் தண்ணீரில் வேக வைத்து, சுண்டிப் போகும் சமயத்தில் அதை சிரங்கின் மேல் பூசி விடவும்.

(12) சகிசொன்றை உபரையுடன் சீக்கிரம் உடைவாமல் பாதிக்கும் சிரங்கு கட்டிக்கு கீழ்க்கண்ட பாகத்திற்கு வேறெந்த பாகமும் சுடாகாதென வரையப்பட்டிருக்கிறது:—

வாகை விதை, வலகன் விதை சங்கால் பச்சாச, வாகைக்கு 9 மாஷா வேலல் சீனி தோலா 1 வெங்காயம், மேப்பந்தழை நுல்வொரு தோலா—சரிய போளம் 6 மாஷா, மைச்சாட்டி, அரிசி

விதை நுல்வொன்றும் 7 மாஷா, அரிசுதாசம் 6 மாஷா, எல்லாம் குளராக அரைத்து காராயன காராயத்தில் கலந்து பூசவும்.

(13) புருவின் சிறகுக்கீழ் வரித்து, அதன் சாய்ப்பில் வெயிற் கலக்கி, பற்றுப் போட கட்டி உடைத்து விடும்.

(14) பிளின் பட்டை இலை திரை இடித்து, ஸ்பயன் மூத்திரத்தில் காய்ச்சி, பின்னர் அதை அரைத்து, துணியில் மெல்லவாகத் தடவி, உடைவா நிறுக்கும் கட்டியின் மேல் வைத்துக் கட்டி விடவும்.

(15) வழி கடத்து கடத்து உள்ளங் கால்களில் ஏற்படும் காய்ப்புக் கொப்பளங்களுக்கு:—குடான அரிசி சாதத்தில் தவிவா விட்டுப் பிசைத்து அதை உள்ளங் கால்களில் தேய்க்க குணம் மேற்படும்.

(16) சேன் கொட்டை புகைச்சலினால் ஏற்பட்ட வீக்கத் திற்கு:—அத்திப் பட்டையை தண்ணீரில் அரைத்து வீக்கத்தின் மேல் பூசவும்.

(17) மூத்தர் சிறகு அரைத்து பூசலாம் அல்லது என் கொண்ணைத் தடவவும்.

முக வீக்கத்திற்கு:—

(1) மஞ்சள், காலி, கஞ்சு சம உடை எடுத்து, செவ்வனே அரைத்த பிசை மலந்தக்காளி சாத்தல், கலந்து மேலுக்கு பூச வீக்கம் சீங்கும்.

வலி நீங்கும், வீக்கம் குறையும்:—

(1) நுரை பொடியால் அரைத்து சாதுவாய் சாறு அல்லது காடியில் சேர்த்து, சற்று காய்ச்சினதும் வீக்கத்திற்கு தடவ வேண்டும் அல்லது மேலே துணி போட்டு சந்தி விடவேண்டும்.

சரீரத்தில் நீ பட்டு வெத்து போனால்

(1) புளியல் பட்டை சந்தனம் போல் அரைத்து, பசு வெயிற் கலந்து பூசவும்.

(2) ஆலக் நுளிரை பனின் தயிரில் அரைத்து பூசவும்.

(3) ஆமணக்கஞ் செடியின் தழைகளைப் பிழிந்து அதன் சாந்தை தடவ வேண்டும்.

(4) முட்டையில் வெள்ளைக் கருவை எள்ளெண்ணெயில் கலந்து பூசவும்.

(5) மாதுளை தலைகளை அழைத்துப் பூசவும் அல்லது சிப்பியை தேய்த்து, தேய்த்த துளை முட்டையில் வெள்ளைக் கருவில் கலந்து பூச வேண்டும்.

(6) சரீர பாகம் நெருப்பினால் வெந்து வெள்ளை ரூபத்தை யடைந்திருப்பின், கடுக்காய், தான்றிக்காய், கெலிக்காய் இம்மூன்றுதையும் தண்ணீர் விட்டவாறுத் தூசி வாடும்.

(7) வீட்டுக் கரையின் பழைய ஊக்கோலை எடுத்து, அதை கன்றாய் அழைத்து, கடுக்கெண்ணெயில் கலந்து பூச வேண்டும்.

(8) தீப்பட்ட காயம் சரீரத்தின் மேல் இருந்தால், காகைத் தழையை அழைத்து அதன் மேல் தடவவும்.

(9) இலக்கைத் துளிக்கீள் தயிரில் அழைத்து தொடர்ந்தாற் போல் பூசுவா கல்ல குணம் செய்யும்.

(10) பெருங்காயத்தை தண்ணீரில் அழைத்து பூசினாலும் விசேஷ குணமளிக்கும்.

(11) வெள்ளைக் குங்கிலியத்தை செவ்வனே அழைத்து, கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் படியான எள்ளெண்ணெயில் போடவே அது உருகும். உருகி ஆநீனவுடன் எடுத்துப் பூசவும்.

(12) மருதோன்றி தழைகளை ஜலத்தில் அழைத்து தடவலாம், அல்லது அதை வெள்ளெண்ணெயில் கலந்து பூச இன்னும் கல்லது.

அடிப்பட்ட நோய்களுக்கு

(1) எங்கேனும் வீழ்ந்து போன தன் பேரிலே அல்லது வேறு எவ்விதத்திலாவது அடிபட்டு, அதன் பொருட்டு வீக்கம் அல்லது காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருந்தாலோ, காய்ச்சலுக்காக அவசியப் பட்டால் தனி சிகிச்சை செயலித்துக் கொண்டு வலி உபாபைக்காக அடிவிரல் கண்ட பாகங்களை உபயோகிக்கவும்:—

திப்பிலி இலைகள் 21 கொண்டு வந்து அவ்வகளை அழைத்து வெல்லத்தடவ் கலந்து, மாத்திரைகளாக உருட்டி, காலை மாலை ஒரு வரம் சாப்பிடவும்.

(2) கலைமான கொம்பை தண்ணீரில் தேய்த்து குடிக்கவும், பச்சை எதிரிக்காயை சர்க்கரையுடன் மென்று நின்னவும். சோம்பு வேரின் துண்டொன்றை அழைத்து அதன் மேல் பருகவும்.

(3) உப்பு மாஷா சீசெரி (குளவு) மாஷா சீ இரண்டையும் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால், வயிதும் வீக்கமும் கிரையின் தீச்சு விலும்.

(4) கோதுமையை எரித்து, அதற்கு சம எடைபாக வெல்லத்தைச் சேர்த்து அதை, கொஞ்சம் போன்ற செய்யும் கலந்து கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 1½ தோலா வகையில் தினந்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தால் மூன்றே நாட்களில் அடியால் ஏற்பட்ட கோவை அகிசவிக்கத்தக்கவாறு நிவர்த்தித்து விடும்.

(5) வலிப்பட்ட உணர்ச்சி நேகத்தில் எங்கேனும் கினை கொண்டிருப்பின்:— படியாகம் மாஷா, 1 அழைத்து வெயில் காய்ச்சவும். படியாரத்தான் காய்ச்சும் வெயில் அடியில் தங்கும். அது சமயம் பார்த்து மேல் உள்ள வெய்யை எடுத்து அதை சர்க்கரையிலும், மைதாமாலிலும் சேர்த்து, ஹல்வா தயாரித்து சாப்பிடவும். சிறிது அதே ஹற்பாலினின்று மாத்திரைவொன்றை உருட்டி அதனுள் வெயினடியில் தங்கி விட்ட அதை மூன்று பாகமாகச் செய்து பாகத்தின் படியாரத்தானை வைத்து வேலை 1க்கு ஒரு பாகமாக மூன்று நாட்கள் சாப்பிடவும். யாவற்றிலும் இது சிறந்த பாகம் எனக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

கருங்கிற்கும் அடிப்பட்ட உபாபைகளுக்கும்:—

(1) முருங்கைத்தழைகளை, அவ்வகளுக்கு சம எடைபாக எள்ளெண்ணெயில் எரித்து, கொழுன்னவிடத்தில் தேய்த்து, வெயிற் காய வேண்டும்.

(2) எள்ளின் பின்னாக்காக கன்றாய் இடித்து கொதிக்கும் வெக்கினை போட்டு விடவும். கன்றாய் கறைத்து போனதும் அதை ஒரு துளியில் தடவி கோயுள்ள விடத்தின் மேல் போட்டு உட்டி விடவும்.

கருக்கு வலியை உடனே நிவர்த்திக்கும்:—

கருக்குள்ள விடத்தை முதலில் வெக்கினால் கழுவி விட வேண்டும். அப்படி, முட்டையில் மஞ்சட் கருவு, கொஞ்சம்

அறைத்த காலி இரண்டையும் சேர்ந்து சற்று அடிப்பில் ஏற்றி கிளறிய பின்னர் சோயுள்ள விடத்தில் பூசு விடவும், பூசின விடத் திற்கு அணல் காட்டவும்.

அடிபட்டு அதன் நிமித்தம் தெறி கட்டியிருப்பினும்.

(1) கொப்பறை தேய்க்கையை இடித்து, அதன் ஓர் எடைக்கு மஞ்சள் காலு பங்காக அறைத்து, அத்துடன் சேர்ந்து, ஒரு முடிச் சாக கட்டிக் கொண்டு அதை அணல் காட்டி வலியுள்ள விடத்தில், முதலாவதாக ஒற்றடம் கொடுக்கவும். அடுத்தபடியாக அதையே சோயுள்ள விடத்தில் கட்டி விடவும். 2, 3 நாளைக்குள் சொஸ்த மாவினிடம்.

• சோர்வுக்கு சிகிச்சை

(1) என்னென்னெயை காய்ச்சி, இரண்டு ரூட்டின் போது அதை உள்ளங்கால்களில் தேய்த்து விராட்டியின் சுடுசாம்பலினால் ஒற்றடம் கொடுக்கவும்.

(2) எந்த என்னெனையாவது சற்று காய்ச்சிக் கொண்டு கஷ்களை அதில் தேய்த்தெடுக்கவும்;

(3) சோய்பை தண்ணீரில் கறைத்து, அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளையும் கலந்து கொஞ்சம் கடவைத்த பின்னர் அதை அடிபட்டவிடத்தில் தேய்க்கவும்.

(4) எருக்கன் பால் மாவா 9 ஆமணக்கெண்ணெய், பூங்கா எண்ணெய் தவித்தனியே ஒவ்வொரு தோலா 9 மாவா 9 இத்திரை மூலம், பிஷாசுத், கல்துப்பு, வகைக்கு 8 மாவா இத்த எண்ண சாக்குகளையும் ஒன்றாக அறைத்து, கட்டியில் போட்டு, அடிப்பின் மேலேற்றி, இரண்டு ரூட்டில் எடுக்கவும். எருக்கன் பால் கஷ்கடிப் போய் தனியே எண்ணெய் தவிவிட்டதும், அதை எடுத்து புட்டி கிடைத்து, பத்திரப் படுத்தவும். அடிபட்டு எத்தனைய வலி ஏற் பட்டிருந்த போதிலும் இந்த எண்ணெயை எடுத்து வலியுள்ள விடத்தில் தேய்க்க உடனே வலி தீரும்.

சரீர சம்பந்தந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு

வாய்வு வலிக்கு

(1) எந்த விடத்தில் வாய்வு மிடி ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அங்கே முருங்கை தூள் வாகை தூள் இரண்டையும் சம எடை எடுத்து, பசும்பாலிலோ அல்லது ஜலத்திலோ வேகவைக்கவும். அப்பறம் வேக வைத்த தூளைக்குடன் முதலில் அதன் ஆவியை வலி யுள்ள விடத்தில் படச் செய்யும். இரண்டாவதாக, வேகவைத்த தூளைக் கொண்டு உபாஸையுள்ள விடத்தின் மேல் வைத்து கட்டி விடவும்.

(2) கவர் சரிந்து அதன் யாதொரு கட்டி மேலே விழுந்து விட்டதினாலோ அல்லது தாளுகவே தவறி விழுந்து விட்டதன் காரணமாகவோ அல்லது யாதொரு சக்கை ஆணி குத்தியோ அல்லது உள்ளே எருமத்திற்குள் சென்று விட்டதனாலோ இரத்தம் தடைபட்டுப் போனதுடன் உள் எலும்பு கெட்டிப்பட்டு போய் காணாமலிருந்த போதிலும் அதை மிருதுவாக்கி, அதன் ஸ்தானத் தில் அமர்த்தி விடும்:—

மஞ்சள் 1½ சேர், பிசின் பட்டை 1½ சேர், சச்சிகாரம் 1½ தோலா, கோதுமை மாவா 1½ சேர், என்னென்னெய் ½ சேர், முதலில் எண்ணெயை காய்ச்சவும். அடுத்தார் போல் மாவதாவை அந்த எண்ணெயில் வறுத்துக் கொள்ள. பிறகு, இதர சாக்குகளை தவித் தனியே அறைத்துக் கொண்டு, முதலில் சச்சி, பின்னர் பிசின் பட்டை, பின்னர் மஞ்சள் தண்ணீரில் போட்டு காய்ச்சவும். தண்ணீர் சுண்டிப் போய் எண்ணெய் தவிவிடும். அதை ரூட்டி டன் எடுத்து தேய்க்கவும்.

மெலிந்த சரீரத்தை நடிப்பாக்க அரிய பாகங்கள்:

(1) இந்த பாகம் பெரும்பாலும் ஸ்திரீகளுக்கு குணமளிக் கும்.

அழகிராக் கிழங்கு, நிலப் பனம்பிழங்கு, தண்ணீர் விட் டான் கிழங்கு இம்மூன்றும் சம எடை எடுத்து, பசும் பாலில்

செவ்வளை வேகவைக்க வேண்டும். பால் கண்டிப் போனவுடன், வேகவைத்தவைகளை எடுத்து, குடி ஆறினவுடன் அவைகளை அரைத்து, அவற்றிற்கு சமமாக சர்க்கரையுடன் தினந்தோறும் 7 திரம், பகம் பாதுடன் சாப்பிடுவும்.

(2) பால் சாப்பாடு தேவந்தை பருக்கச் செய்யும் என சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(3) தித்திப்பான பாதாம் பருப்பு, கிஷாந்தா, பாதாம் பிசின் இவைகளை அரைத்து, சர்க்கரையுடன் வேளை 1 க்கு ஒரு தோலா பகம் பாதுடன் சாப்பிட்டு வரவும்.

(4) மிளகு, சுக்கு வகைக்கு 10 திரம், அரிசி, திப்பிலி 30 திரம், தோல் உரித்த எள், அக்கிராட் பருப்பு வகைக்கு 50 திரம் சர்க்கரை 2 கேர், தேன் வேகண்டிய அனவித்து எல்லாம் கிளிநி, வேகியம் தயாரித்துக் கொள்க. சாப்பிட வேண்டிய அளவு வேளை 1 க்கு 1 மின்சால்.

(5) அழகுராசு கிழங்கு, தோல் உரித்த எள் இந்த இரண்டையும் மீருதுவாக இடித்து, இவற்றின் எடைக்குச் சரியான பனஞ் சர்க்கரைச் சேர்க்கவும். கூடுமாயின் கொஞ்சம் இஞ்சியும் அத்துடன் கலந்து, மூன்று தோலா எடையுள்ள உருண்டைகளை உருட்டி, எள் 1 க்கு ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டு வந்தால், செவ்வளை சதை போடும்.

(6) பாதாம் பருப்பு, பொன்னுள் கொட்டை பருப்பு, கொப்பரை, கஸகஸா, உரித்த எள்ளு எல்லாம் வகைக்கு 6 தோலா, சர்க்கரை இவற்றின் எடைக்கு, சர்க்கரை எல்லாம் இடித்ததைத்து சர்க்கரையுடன் கலந்து கொண்டு, வேளை 1 க்கு தோலா 6 சாப்பிட்டு வரவும்.

அதிகம் தடித்தோரை மெலித்தோராய்க்

(1) காடி, மஞ்சர் பருப்பு முதலியன தின்பதும் தேவந்தை இனக்கச் செய்யும்.

(2) குஞ்சு சோகம், குமம் இந்த இரண்டும் தனித் தனியே 4 திரம், மக்ஸூல் 2 திரம், இவற்றை இடித்ததைத்து மூரண மாகி வேளை 1 க்கு 1 திரம், அல்லது 1 தோலா, கிசின் டூபின் சாதையுடன் உட்கொள்ளவும்.

(3) ஜாதக்காய் மரத்தடியிலோ, அல்லது கருவ மரத்தின் கீழோ உட்கார்ந்து இளைப்பாறுவதானும், சுமப்பு, புளிப்பு பதார்தங்கள் சாப்பிடுவதானும், குடான மருத்துவனை அடிக்கடி உட்கொள்வதானும், மெலிவு வர்பதும்.

பட்டினி டெத்தல், தலாமேல் படுத்திருத்தல், குவிரில் சரியான ஆடை இல்லாது கிருவாணியா மிருத்தல், இவைகளினாலும் தேகம் இளைக்கும்.

தோல் சம்மத்தப்பட்ட நோய்களுக்கு

வியர்வை தாற்றத்தைப் போக்க

அடிமுறிதண்ட. பாகம் வியர்வை காற்றத்தை போக்கும். இன்னும் கண்களுக்கு ஒளியைத் தரும்:—

(1) வெங்கை சந்தனம், குங்குமப்பூ, வெட்டி. வேர் இம் மூன்றையும் பொடியாய் அரைத்து நிரோகத்தில் தேய்த்து வர, வியர்வை காற்றம் கீங்கும், சருமம் மிருதுவாகும், தேஜுஸும் உண்டாகும்.

கக்கத்தில் தாற்றத்திற்கு

(1) கஸ்தூரி 14 மாஷா, வெங்கை சந்தனம் 2 தோலா, 4 மாஷா வாற்கொழுமை மாஷா 4 தோலா 8 மாஷா இவைகளை இடித்ததைத்து, தண்ணீரில் கலக்கி, 1 நாள் வரையில் இரவிலும் பகலிலும் கக்கத்தில் தேய்த்து, வெங்கிருள் கழுவி வர வேண்டும்.

(2) முத்தர் கிங்கு பழம் காடியில் உடைத்து கக்கத்தில் தேய்க்கவும். தேய்த்த பின்னர், வெங்கிருள் கழுவி வேண்டும். முத்தர் கிங்கை காடி, பன்லீர், ரோஜா என்னெய் இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றில் சேர்த்தே பூச வேண்டுமே யல்லாது, தனியே ஒரு போதும் பூசலாகாது.

(3) அப்பாது இலைகளை இடித்து கக்கத்தில் தேய்த்து வெங்கிரால் சுத்தம் செய்து விடவும்.

(4) முந்தாதி கிண்கு 4 தேலா, கண்டூரி 1 தேலா, அம்பர் அஷ்டமம் 6 மசஷா, வெங்கை மட்ட சந்தனம் 3 மசஷா, அம்பர் 3 மசஷா எல்லாம் இடித்தவைத்து, பொன்னுய் கொட்டலையில் அளவிற்று உருண்டைகள் செய்து கொள்ளவும். அலகியமான போது அசல் பண்ணீரில் சில ஐயின் விட்டு அதில் உருண்டை வையக் கறைத்து, கக்கத்தில் தடவித் கொள்ள வேண்டும்.

(5) கண்டூரும்பை அதிக தண்ணீரில் அறைத்து கக்கத்தில் பூசவும்.

(6) காயக இலைகளை தண்ணீரில் வேக வைத்து, அப்பால் அறைக் கொண்டு கக்கத்தை கழுவி வர வேண்டும்.

கை கால்களில் ஏற்படும் அதிக வியர்வைக்கு

(1) வயப்பயிதை வறுத்தவைத்து அதன் மாகாவ வியர்வை வெளியாகும் இடங்களில் தேய்த்து வரவும்.

(2) கத்திக்காய், போந்தா இரண்டையும் இடித்து, தண்ணீரில் வேக வைத்து, கைகால்களை அந்த தண்ணீரில் களைத் துக் கொண்டிருக்கவும்.

(3) கொள்ளு, அறைத்துக் கொள்ளவும். மஞ்சா பலவர்களை வும் அறைத்துக் கொள், அப்பால் இரண்டையும் துளிகை கலந்து தேய்த்துவர வேண்டும்.

(4) கரும் வைத்தைகளை கிடைக்கி எரித்தலாத்து காய் 1 க்கு ஒருமசஷா வீதம் ஒரு வரம் வரையில் சாப்பிட்டு வரவும்.

(5) இலம்பைத் தலைகளை அறைத்து அவற்றை அதிக வியர்வை காணும் விடங்களில் தேய்க்கவும்.

(6) உலக்குபோல கருவ இலைகளை அறைத்து கை கால்களில் தேய்த்து வரவும்.

(7) ஜடாமாசி அறைத்து பூசவும்.

(8) ஊன்ட் கட்டாராமலை வேரை உலர்த்திய பின்னர் அதை அறைத்து அதனுடன் ஒரு தேலா தேய்க்கலத்து 7 காய் உட்டுக்கொள்ளவும்.

(9) படிக்காத்தை தண்ணீரில் கறைத்து அந்த தண்ணீரை கைகால்களில் தேய்த்துவரவேண்டும்.

(10) வசகைக் கொழுத்தை அறைத்து உள்வா காலிலும், உள்வா கைகிலும் தேய்க்க வேண்டும்.

(11) சாதிலிங்கம், பூசனிக்காய் விதை தனித்தனியே தூவ் கொரு திரம், எரித்த வெப்பு பலகாளை 3 திரம் மிளகு 5 திரம், எல்லாம் இடித்தவைத்து கட்டாலுத் 2 திரம் சேர்த்து மிளகு அளவிற்று மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். வேளை 1 க்கு ஒரு மாத்திரை காலு மாரை சாப்பிட்டு வருக.

(12) எந்ததோர் புண்ணிலிருந்து சிழ் வெளியாகிறதோ அதற்குப் பெயர் கர்ஜா காற்பது காய் வரையில் ஆறது வரக் கூடிய புண் காஞ்சு என வழங்கப்படுகிறது. அருளி இலைகளை காய வைத்தப்பின்னர் அவற்றை அறைத்து காயத்தின் மேல் தூவிவர வும்.

(13) கழுதை மாமிசத்தை தேலாடன் கட்டு அதன் சாம்பலை புண்ணின்மேல் தூவிவந்தால் இரண்டே வரையில் உட்கறை தென்படத் தொடங்கும்.

(14) வரணயின் பட்டாடையை அறைத்து தூவினாலும் காயத்தை ஆற்றியிடும்.

(15) கோழியின் கிணை எரித்து அதன் சாம்பலை காயத் திற்கு மேல் தூவவும்.

(16) ஆமையின் தலையை எரித்து, அதன் சாம்பலை எடுத்து முதலில் புண்ணின்மேல் என்னென்றென சந்து தடவிவிட்ட பின்னர், அதன்மேல் அதை தூவிவிடவும். முன்றே காலில் காயம் ஆதிப் போகும்.

(17) எலுக்காத்தை தண்ணீரில் அறைத்து, அதில் சித் தளவிற்று காலியைச் சேர்த்து, கலிம்பாகச் செய்துகொண்டு, மேலுக்குத் தடவவும். சிலர், காலிக்குப் பதிலாக, அரிசிமாவும் சேர்ப்பதுண்டு.

(18) அழுக்குராக் கிழங்கை பொடியாய் அறைத்து தூவி வரவும்.

(19) வரணுயை இலைகளை அறைத்து காயத்தின்மேல் வைத்துக் கட்ட, காயம் சிகரம் ஆறியிடும். ஆறல் இலைகளை

அமைக்காமல் முழுதிலைகளாகவே வைத்துக் கட்டுவது இம்மூலம் கிதேஷம்.

(20) சவுக்குத் தழைகளை எரித்து சாம்பலை காயத்தின்மேல் தூவிவிடவும்.

(21) மஞ்சள் பொடியும் அமைத்து காயத்தின் மேல் தூவி ஆற்றிவிடவும். மரக்களையும் இறைப் போகலே.

(22) பதம்பி சாம்பலாகித் தூண் காண்பட்ட காயங்களை ஆற்றவும்.

(23) பாலின்மேலும் காயத்திற்கு :—கம்பலியுடன் ஆவும் தழைகளையும் எரித்து, அவற்றின் சாம்பலை வெயிற் சேர்த்து காயத்தின்மேல் பூசவும். சாக்குகளை இரண்டு மூன்று நாட்கள்.

(24) புண், கோப்பளம் முதலியவற்றை ஆற்ற இன்றியமையாத பாகம்-கத்திரம் 3 பாகம், காய்நூலினை 3 பாகம், கெங்காயத் தோல் ஒருபாகம் முதலில் எரித்துக் கொள்ளவும். அத்துடன் கட்டித் தீயை எரித்து பாகம் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்துக் காயத்தின்மேல் தூவி வேண்டும்.

(25) கொச்சிதிலை பாஷாதிலை சம்பந்திதிலை அமைத்ததிலே வைக்க ஒருநிசம், என்னெண்ணெய் 3 செசு, திலைகளை மாணையும் அமைத்து எண்ணெயில் சேர்த்து எரிக் கவும். எரிதும் போது, அகம் பையால், கெறிக் கொண்டு இருக்கவும். எரிந்துபோனதும், எண்ணெயை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு, மேலுக்குத் தடவவும்.

(26) புங்குதிலை, வேப்பம்திலை தனியே ஒருநாள் இடித்து பில்லியாகத் தட்டி என்னெண்ணெயில் வைக்கவும். அப்பால் அத்துடன் தூசு ஒருபாகம் சேர்த்து எல்லாம் ஒருமிக்க அமைத்துக் கொண்டு மேல் உபயோகத்தில் கொண்டு வரவும்.

(27) என்னெண்ணெய் 3 தோலா தேன்பெழுது எண்ணெய் 3 மாஷா, கத்திரம் 4 மாஷா, தூசு 3 மாஷா, கிளிஞ்சலை கட்டி சாம்பல் 11 மாஷா எல்லாம் ஒருமிக்க களிம்பாகச் செய்து 16 நாட்கள் ஜலத்தில் கழுவி மேலுக்கு உபயோகித் தடவவும்.

(28) வாய் விளக்கம், புங்குதிலை, வேப்பதிலை, முல்லையும் அமைத்து பில்லியாகத் தட்டி என்னெண்ணெயில் வைக்கவும். அப்பால் அத்துடன் எண்ணெயை வடிக்கட்டி மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

(29) கிளிஞ்சலை புண்ணை சிக் கிரம் ஆற்றிவிடவும் :—

கஞ்சர், செக்கிரம், கொட்டைப் பாகம், போஸ்தா, கைகளுக்கு 3 தோலா எடை, எரித்துக் கொள்ளவும். மிளகு தனியே 5, தூசு 1 மாஷா இத்த இரண்டு சாக்குகளையும் அத்த எரித்து சாம்பலுடன் சேர்த்தெடுத்து, வெயிற் கலந்து பூசவும்.

(30) கிளிஞ்சலை கட்டி சாம்பலாகி, பொரித்த வெங்காயத் தூளையும் அதனுடன் சேர்த்து, இரண்டையும் பசு வெங்கண்ணிற் கலந்து காயத்திற்கு மேல் போட்டுவந்தால் அது எந்தகைய காயமாக இருந்தபோதிலும் அதை அதிகரிக்கத்தக்கனவிலே ஆற்றிவிடும் எனச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

(31) சிவஞ் சுட்டியில் விளைவில் பழுக்க கைப்பதற்கு வைக்கப்பட்ட பாகம் :—இங்கோலினை எண்ணெயில் கலக்கி, மிளகு இலை எண்ணெய் 3 மாஷா, பொரித்த தூசு 3 மாஷா, செஞ்சாம்பல் 3 மாஷா, வெய் 3 செசு, சாக்குகளை முதலில் இடித்தெடுத்து உறுக்கினை வெக்கில் பாலிற் கலந்து வாய்க்காமதோத் பாதிரத்தில் கலத்து 21 நாட்கள் தண்ணீர் ஊற்றி, மிளகை கழுவி மேலுக்கு உபயோகித்து வரவும்.

(32) பிர்க்கல் தீலை பச்சையாயினும் சரி அல்லது உலர்ந்த தாமிரம் சரியே தண்ணீரில் அமைத்து காயத்தின் மேல் வைத்துக் கட்டி வந்தால் உபயோகித்த சிக் கிரம் ஆற்றிவிடும்.

(33) எண்ணெயை காயச்சுக்கு மருணைகளிலும் :— தூசு இரண்டு பாகம், கத்திரம் 3 செசு, 3 பாகம், தூசு பொரித்தெடுத்து அத்துடன் கத்திரம்பையும் கலக்கித் தீலை என்னெண்ணெயுடன் அமைக்கவும். என்னெண்ணெய்க்கு பதிலாக, கடுகெண்ணெயையும் சேர்க்கலாம். எல்லாம் அமைத்ததன் தும் கிடை உருண்டைகளாக உருட்டிக்கொண்டு, தேவைப்பட்ட சமயங்களில், எதுமிச்சம்சாறு அல்லது சுத்த ஜலத்தில் அமைத்து காயத்தின்மேல் பூசி வரவேண்டும்.

(34) துப்பாக்கி காயம் அல்லது எப்பதுகாள்வகையிலும் ஆருதிருக்கும்படியான காயம், அல்லது எண்ணெயை காயமாக இருந்தபோதிலும் சரியே ஆண்டவன் இருபயால் ஆற்றி விடும் என ஓர் வைத்திய சிபுஷர் எழுதியுள்ளார்.

காககட்டி 5 தோலா என்னென்னோய் 5 தோலா இனத்து ஐலம் 5 தோலா படிசாரம் 1 தோலா, 3 மாஷா, துருக் 1 தோலா, 3 மாஷா, வெள்ளை குங்கிலியம் 5 தோலா முதலில் ஐலத்தையும் எண்ணெயையும் வெண்கலபாத்திரமொன்றில் போட்டு சுமார் 3 மணிசேரம் வரையில் அவற்றை கைகளினால் ஒன்றாகக் கலக்கிக் கொண்டிருக்கவும். அதை இரண்டும் தயிரின் பதத்திற்கு வர எவ்வளவு சேரம் தேவையோ அவ்வளவு சேரம் மேற்பட்டும் கலக்கியாக வேண்டும். பின்னர், சாக்குகளை இடித்தவெத்து, ஒவ்வொன்றின் கிதையை சரிவா கிழுத்துக்கொண்டு பிறகு, அதே வெண்கலப் பாத்திரத்தில் கெட்டிப்படுத்திய எண்ணெயோடு தூள் செய்துள்ள சாக்குகளையும் சேர்த்து, கைகளினால் மேல்மேலும் பிசைத்து ஒன்றாகக் கொண்டபிறகு பளிங்கான் பாத்திரத்திலோ அல்லது வெள்ளிப்பாத்திரத்திலோ போட்டு வைத்து காயக்களின் மேல் பூசவும். 3, 4 காட்டன் கழித்தவுடன் மருந்தை துணியில் நடனி பட்டியாக கட்டிவிடவும். காயத்தில் உள்ள சிழ், அசடு முதலிய அகசியங்கள் யாவும் பட்டியில் ஒட்டிக்கொண்டு வந்து விடும். அப்போது அதை சுத்தப்படுத்தி அதே பட்டியிலோ அல்லது வேறொரு பட்டியிலோ மீண்டும் மருந்தை நடனி கட்டவும். இரவில் உப்பை வறுத்து துணியில் கட்டி காயத்தைச் சுற்றி ஒத்தடம் கொடுக்கவும்.

(35) அடிவிறக்கண்ட பாகமும் காயத்திற்காக அரிய மிளக்காய் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(குறிப்பு:—சேர் ஷாஹி 21 மாஷா ஏடை) கெய் 1 சேர் ஷாஹி, செந்தூரம் 4 சேர் ஷாஹி, முந்தார்கிக்கு 2 சேர் ஷாஹி, பொரித்த துருக் 1 சேர் ஷாஹி, இவைகளை தனித்தனியே அரைத்துக் கொள்ளவும். கெய்யை சுயம் பூசிய செம்புப் பாத்திரத்தில் வைத்து தூறு நடனவகையில் ஐலம் விட்டுக் கழுவவும். அடுத்தபடியாக துருகை அதில் கலக்கவும். பிறகு முந்தார்கிக்கு, செந்தூரம் இரண்டையும் இந்த கலிம்பை கண்ணாடி பாத்திரத்திலோ அல்லது மரடப்பாவினோ போட்டு வைத்தல் வேண்டும்.

மற்றொரு அரிய பாகம்.

(36) செந்தூரம் 1 பங்கு, மஞ்சள் தேன் மெழுக்கு 3 பங்கு கெய் 6 பங்கு, பெரித்த துருக் 1 பங்கு. முதலில் கெய்யை மருக்கவும்,

மெழுக்கை கெய்வில் உருக்கி, செந்தூரத்தையும் துருகையும் பொடியாய் அரைத்த தூளை அதில் போட்டு கன்றாய் கலக்கவும். அவை வந்திற் கேற்றளவில் எடுத்து மூன்றால் உள்ளவைகளைப் போல் மேலே பூசவும்.

கைகால் வேடிப்புக்கும் எரிச்சலுக்கும்.

(37) வெள்ளை குங்கிலியத்தை பொடியாய் அரைத்து, என்னென்னோயில் கலத்து ஏழு மூலாதன்னாவிட்டுக் கழுவி வேண்டும். இதுவே கலிம்பு இதை மேலே பூசவேண்டும்.

காயத்தை சிகிசும் மூன்றி விடும்.

(38) ஆஸ்பாத்தின் பழுத்த இலைகளை எரித்து, எரித்த சாம்பலை மெழுக்கென்னோயில் கலத்து பூசி வரவேண்டும்.

(39) சேவலின் காலாக்கான பெர்ஸியாதோர் கிதையை எடுத்து அதற்கு சம எடை மூயிம்ந்தகியை சேர்த்து காயத்தின் மீது வைத்துக்கட்டி விடவும்.

இரத்தத்தை கிறத்திவிடும்.

(40) மூலத்தில் துண்டை/ எரித்து அதன் சாம்பலை கன்றாய் அரைத்தும் வந்திரகாமடு செய்தும் காயத்தின் மேல் தூவி வேண்டும்.

(41) என்னென்னோய் 1 சேர், தாசியில் போட்டு காய்ச் சவும். மேய்பர் தழைக்கை அரைத்துள்ள மொத்தை அதாவது அடைபாய் நடடிய பிள்கையையும், அடைப்போ சொத்த அருளி இலைகளின் பிள்கை யொன்றும், மலைவேம்பு இலைகளின் 8 தாம்ப எடையுள்ள பிள்கை யொன்றும் 5 திரம் கெய், 1 சேர் தேன் மெழுக்கில் போட்டு எரிக்கவும். சாக்குகளை எரித்து சருகிப் போனவுடன் தைத்ததை சுத்தமாக எடுத்து காயங்களின் மீது உபயோகிக்கவும்.

(42) ஆயுணக்கென்னோய் 1 சேர் அரண் இலைகளின் சாறு 1 சேர், இந்த இரண்டையும் எரித்து, சாறு கண்டிப்போய் என்னென்னோய் தங்கிப் போனதும் அதில் ஒரு தாம்ப கல் கண்ணாற்றைக் கலத்து, காயங்களின் மேல் பூசவும்.

(43) எருக்கன் துளிர், கடுக்காய், கொட்டைப் பாத்ரு ஒன்றையும் எரித்த சாம்பல், சுத்தகாமபு இலை பெர்ஸியா கைகை

1/2 தாம் கெய் அவசியமான அளவிற்கு செடுத்து காட்டுவது வரவும் அதில் கலந்து பூசவும்.

புண்ணை ஆற்றும் சந்தையை சிப்படுத்தும் :—

(44) என்னென்னெய் தேலா 6 வெள்ளை தேன் மெழுரு காகா 9 மத்த கார்பு மாஷா 4 தருக மாஷா 2 கிள்குசியை கட்ட சாயம்பமாஷா 11 இவைகளைக் கொண்டு களிம்பு தயாரித்து 16 தடவைகளும் விட்டுக் கழுவி உபயோகிக்கவும்.

(45) புண், புண்புறை, சிலந்தி முதலியவைகளுக்கு வெடிப் பான திராவகம். இதை வெள்ளை கிதத்துடன் சமத்தின்மேல் ஏற்படும் வெண்கிட்சைகளிலும் தடவலாம்.

மெல்லிக்காய் கந்தகம், வெடியுப்பு, படிசாரம், அன்னபேதி இக்கள்கும் சமளடை எரித்து திராவகம் இறக்கிக் கொள்ளவும். அதாவது சாக்குகளை ஓர் பாட்டில் போட்டு அதன் வாய்க்கு விலைத்துண்டொன்றை கட்டி அதை ஓர் ஓட்டின் துவாரத்தினால் தலை கீழாய் தொங்கச் செய்து, தொங்கும் சீசாவின் வாயை இன்னொரு சீசாவினால் விட்டு அரளை கீழாக விடுத்தி விடவும். ஓட்டில் விராட்டி அல்லது மாக்கரின் தி முட்டி விடவே பாட்டில் உள்ள சாக்குகள் வெந்து அவற்றின் கத்து திராவக ரூபத்தில் கொட்டு கொட்டாக அடிவிலுள்ள சீசாவில் கதிந்து கொண்டே போகும், மற்றொரு விதம்:— சாக்குகளை வாயில் போட்டு திராவகம் இறக்கிக் கொள்ளலாம்.

இந்த திராவகத்தை வெண்கிட்சைகளின் மீது போட வேண்டுமானால் கொஞ்சம் போல் பஞ்சை எடுத்து இந்திராவகத்தில் கினைத்து கிட்சைகளின் மேல் தடவவும். திராவகம் அந்த விடத்தில் கலந்து போகும் வரையில் பஞ்சையைக்கவும். அவசியமாயின் மற்றொரு சமயம் உபயோகிக்கவும்.

(46) அடியிற் கண்ட களிம்பு அதற்கு குணமளிக்கத் தக்கது.

பொரித்த தருக, ஸுமரந்தகி, படிசாரம் வெள்ளை தேன் மெழுரு இந்த கள்கும் சமளடை, இவற்றை அலைத்து, கெயிற் கலந்து களிம்பாக உபயோகிக்க வேண்டும்.

கலக்களிம்பு :

(47) முந்தர் சிங்கு ஒரு பாகம், வெள்ளை குங்கிலியம் 2 பாகம், கெய் கொடிய அளவிற்கு எடுத்து கொள்ளவும். முதலில் முந்தர் சிங்கை எண்ணெயில் அது கருகப்போகும் வரை வதந்துக் கொள்ளவும். அப்பால் அதனுடன் குங்கிலியத்தையும் சேர்த்து மேலுக் உபயோகிக்கவும்.

காயத்தை ஆற்றும், கிரங்கை சிக்குரம் உடைத்துவிடும் :—

(48) பொரித்த வெங்காயத்தை மெய்கிற் கலந்து கிரங்கு கட்டிகளுக்கு மேல் பூசுவாவினும்.

காயத்தை ஆற்றும் களிம்பு :—

(49) மெழுரு, செத்துரம், முந்தர் சிங்கு, தனித்தனியே 1 1/2 தோலா வெள்ளை குங்கிலியம் 4 மாஷா, தருக ஒரு மாஷா, கெய் 4 1/2 தோலா முதலில் கெய்யை காய்ச்சி அதில் மெழுருகைப் போடவும். பின்னர், அதைத்த முந்தர் சிங்கைக் கலந்து, பாத்நித்தை கீழே இறக்கிக் கொண்டு, உன்றாய் கலக்கி விட்டு, அடுப்பிலேற்றி, சூடுமறவும். பின்பு, தருக/சேர்த்து, முன்பேல் கலக்கி விட்டு அடுப்பிலேற்றி, கடவைக்கவும். அப்படி, செத்துரத்தைச் சேர்த்து கலந்து, பாத்நித்தை கீழே இரக்கி, தண்ணீர் ஊற்ற குளிர்த்து விடும். இனிதேவைவான சமயம் மேல் உபயோகத்தில் கொண்டு வரவும். ஆனால் மருத்து தயாரிக்கும் பாத்நிசம் இரும்பு பாத்நிசமாக இருந்தல் வேண்டும்.

களிம்பு, பனழை காயங்களை ஆற்றவல்லது.

(1) எரித்த கடுகாசி, எரித்த கண்டம் கத்திரியின் வேர், பொறித்த கமாச்சாரம், எரித்த சோஜா மோட்டு, கமேலா, வேப்பம் இவை கரிய போளம், பூசாசாணி சீசாம், செத்துரம், எரித்த கருவ இவைகள் சம ளடையுள்ள தேனில் கலந்து கொண்டு காயத்தின் மேல் தவிரியாகவே அக்கூறு கடுகாசி இலை இவற்றிலே தடவி பூசி விடவும்.

(2) கம்புத்தழைகளை என்னென்னெயில் அதைத்து காயத்திற்கு மேல் பூசவும்.

(3) களி கீழ்கும் காயம் ஆறும்:— காயத்தின் மேல் வெங்காயத்தை கலக்கி வைத்துக் கட்டி களி கீழ்கும். சிறு முதலிய

அருகியங்களை வெளியிற் கொண்டு வந்து விடும். பழைய தாயமாக விருந்தால் மூன்று நாள் இடைவெளிக்கு ஒருமுறை மெழுகு.

(4) குழந்தை செத்துப் போன 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

(5) எந்த மிருகத்தினாலும் கவரவாயமாக இருப்பினும் சரி அழைக்க கொண்டு வந்து உலர்த்தி வரக்கூடும். எரித்த சாம்பலை காயத்திற்கு மேல் தூவிவர, இரத்தத்தை நடுத்த காயத்தையும் ஆற்றிவிடும்.

(6) மஞ்சளை அழைத்து காயத்தின் மேல் தூவி, அதன் மேல் கைவலையையே, கொஞ்ச நேரத்திற்குப் பின் கைவலையே மெதுமெதுவாக கசர்த்திக் கொள்ளவும்.

(7) பக்காவை சுட்டு, அதை பொடியாய் அழைத்து, துணிப்பை யொன்றில் போட்டு, இரத்தம் வெளிவரும்படியான விடத்திற்குமேல் வைத்துக் கட்டி விடவும்.

தான் பட்ட காயத்திற்கு, மர்மல்தானம் புண்ணுக்கும் குவட்டத்திற்கும்கூட உள்பட.

(1) கெல்லிக்காவை எரித்த சாம்பல், பொரித்த பழகாரம், இரண்டும் சம எடை, அத்துடன் கொஞ்சம் துருளையும் பொரித்த தூள் செய்து கொள்ளவும். முதலில் காயத்தின் மேல் கொஞ்சம் பசு கெல்லைய தடவி விட்டு, அதன் மேல் மேற்கண்ட பொடியை தூவி விடவேண்டும்.

(2) புண்ணை சிகிச்சை ஆற்றிவிடும்:— பொரித்த வெல் காரம், ஏலக்காய், சிமை அழைக்கி விதை, இந்த மூன்றையும் அழைத்து, வெற்றிலையின் மேல் தூவியேனைக்கு ஒரு வெற்றிலை யாக 3, 3 வெற்றிலைகள் வரைவால் காயத்தின் மீது வைத்துக் கட்டவும்.

(3) மேய்ப்பப்பட்டை, வாகை இலை, கருவேலம் இலை, இவைகளில் எந்ததும் ஒன்றை போட்டு கொடுக்க வைத்த துணிவிறியும் புண்ணைக் கழுவலது உண்டாக.

(4) வெள்ளைக் குங்கிலியம் 1 பாகம் தேன் மெழுகு 1 பாகம் வெய் 4 பாகம் இவைகளை சேர்த்து கலிம்பு தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

(5) முந்தைய எலும்பிற்கு கலிம்பு:—

செங்கனே வெந்த செங்கலை கன்றும் அழைத்து, பாக்கல் கலக்கவும். அப்பாசு, அதில் அரிசியை கலந்துப் போட்டு, சாதம் கமைத்து மூன்று வாரம் வரையில் உட்கொள்ள, முந்தைய எலும்பு தானாகவே சேர்ந்து போகும் வேள வரையப்பட இருக்கிறது.

(6) காயக்களை ஆற்றுவதில் மெச்சத்தக்க சக்தியுடைய கலிம்பு:— பழைய பஞ்சைச் சுட்டசாம்பல் 6 தாம், மெழுகு 3 தாம், குராவை ஒயர் வசம்பு 3 தாம், பசுவே 6 தாம், துருசு 3 தாம். முதலில்மேல் மெழுகு தீக்க இரண்டையும் ஒரு பாத்திரத்தில்போட்டு உருக்கி அதில் பஞ்சை சுட்ட சாம்பலைப் போடவும். அதற்கப்பால் வசம்பு சேர்க்கவும். பின்னர் பொரித்த துருசு அழைத்துப் போடவும். எல்லாம் கலிம்பாகச் செய்து கொள்க.

(7) கல்மதம், கத்தகாய்ப்பு, முத்தார் சிக்கு, தனித்தனியே ஒரு தாம் வெள்ளை குங்கிலியம் 6 தாம் கம்பலித் துண்டு 1 கலும் இவைகளை வெல்லாம் எரித்து வெய் 7 தாயில், சேர்த்து கலிம்பு தயாரித்துக் கொள்ளவும்.

(8) கடுகெண்ணெய் ஒரு தாம் ஏன்கால் பச்சை 4 மாஷா, கல்மதம் ஒரு தாம் மெழுகு எல்லாம் சேர்த்து, கலிம்பு செய்து கொண்டு உபயோகிக்க, புண்புதை முதலிய செடியா புண்வியையும் ஆற்றி விடும்.

(9) புண்ஆழி உட்சதை கவர்த்து வருவதற்கு:—

மாஸிட மலையை எலும்பு தோலா 10, கத்தகாய்ப்பு தோலா 10, துருசு ஒரு தோலா தீக்க மூன்றையும் பொடியாய் அழைத்து புண்மீது வைத்துக்கட்ட 3, 3 வரையில் புண் ஆற்றிவிடும்.

(10) ரண சிகிச்சை கிபுனொருவரின் அனுபவ முறை:—

முதலில் ரணத்தின் மேல் கதி கெண்ணெய் தேய்த்து அதன்மீது முடிவாகச் குளம்பைக் சுட்ட சாம்பலை தூவி விடவும்.

புண் புறா ஒடியிருப்பின், ஒரு துணித்திரியின் மூலம் எண்ணெயை உட்செலுத்திவிட்டு, குளம்பின் சாம்பலை தயிரில் கலந்து, திரியை துவாரத்தில் வைத்து விடவும்.

(11) அம்பு, துப்பாக்கி சண்டை, சுட்டி, முகலிவ் ஆயுத பிரயோகத்தால் உண்டான புண்களை சொஸ்தப்படுத்தும், புண் ஹைக்ரஸ் அஞ்சிடம் தங்கலிடாமற்காகும்:—

மஞ்சள் இரண்டு பாகம் சச்சிகாரம் ஒரு பாகம் இரண்டு டையும் போடியாய் அமைத்து, வஸ்திரசாயஞ் செய்யவும். பிறகு பழைய பஞ்சை கொண்டு வத்து அதை அடையாகத்தட்டி அதனுள் அமைத்த துளை அடைத்து, அதனை ஒரு துணியால் முடிச்சாகக் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தாற் போல், ஏற்கனவே வெண் காயத்தைப் போதித்துள்ள கெய்யில் அந்த முடிச்சை போட்டு சந்தி காய்ச்சவும். பிறகு புண்மீது குத்தமானதோர் துணிவைத்து, பஞ்சை டையைக்கொண்டு மெதுவாக ஒத்தடம் கொடுத்து விட்டு, அதை அப் புண்ணின் மீதே வைத்து, ஆலஇலியின் சாம்பால் அதைக் கட்டி விடவும். காலை, மாலை அதன் மேல் வைக்கும் மருந்தை புதிதாக வைத்தல் அவசியம். இல்லையெல், பழைய மருத்தியுள்ள கிருமிகள் உண்டே சென்று விடும்.

(12) சாதாரண காயங்களையும் பிரமேச சம்மந்தமாயுள்ள புண்களையும் ஆற்றி வைக்கும் கலிம்பு:—

பங்கா, நுமம் இரண்டையும் போடியாய் அமைத்து 4 வயதுள்ள பையன் மூத்திரத்தில் காய்ச்சி வைலமாகப் பூசவும்.

(13) தலை மீதுள்ள புண்களை ஆற்றி வைக்கும்:—

கடலைவாயு (ஒருகைப்பீடி கொண்ட அளவு) பொரித்த துருள் என்றும் அமைத்துக் கொண்டு, இந்த இரண்டையும் கண்ணாடி அமைத்துக் கொண்டு புனிப்புத் தயிரில் சேர்த்து செவ்வெண் பிசைத்து கொண்டு தலைமீதும் தேகத்தின் மேலுள்ள செந்நிறமும் பூசலாம் ஒருமணிகோலுதீத்து, கழுவி விடவும். ஒரு வரத்திற் குள் நுணமேற்பட்டு விடும். கடலைவாய் அனுவினமும் தலை ரோமத்தை சிறைக்கவைத்து மருத்தை தடவி வந்தால் பிரோஷ்ட குணமாவும்.

(14) கால் பட்ட தலைகாயங்களை ஆற்றிவிடும்:—

கருவம் இலைகளை, செப்புபாத்திரமொன்றில் போட்டு அடுப்பின் மேல் ஏற்றி வறுக்கவும். அப்பால் அவைகளை அழைத்து, கடிகெண்ணெயிலே அல்லது வேறெந்த எண்ணெயிலோ கலந்து பூசுவாவும்.

(15) பூண்டு பல் 1—சித்திராலம், வெப்பத்தாலு தகரீத் தனியே 1½ தோலா, எண்ணெண்ணெய் தோலா 5. பூண்டை இடித் தும், சித்திர மூலத்தை அரைத்து, இலைகளை அடையாகத்தட்டி யும், எண்ணெயில் போட்டு எரிக்கவும். சாக்குரன். கருவிப்போன வுடன், எண்ணெயை வடித்துக்கொண்டு தலைக்குத்தேய்க்கவும்.

(16) தலை மீதுள்ள கசிகாண புண் கலைச்சுவத்து:—

கமேலா—மருதோன்றி இலை, முந்தாந் சிங்கு, மாசிக் காய், மாதுளம் பழத்தோல், மஞ்சள் எல்லாம் சம எடை அமைத் தாக கொள்ளவும். மெழுகை ரோஜா எண்ணெயில் உருக்கி மேத் கொள்ள குளாந்தை மெழுகில் கலந்து கொள்ளவும். கடலைவாய் திராட்சைக்காயையும் அதில் ஏற்று சேர்த்துக்கொள்ளவும். எல் லாம் ஒன்றாகக் கலந்து கொள்வதற்கான முறையில் விரல்களைக் கொண்டு கல்லும் பிசைத்து கொள்ளவேண்டும். தலை உரோமங்களை சிறைக்கவைத்து மருத்தை தடவிவேண்டும். ரோஜா எண்ணெய் மெடக்கவிக்கி யாலால், எண்ணெண்ணெய் சேர்க்கலாம். அத்துடன் கோஞ்சம் பன்ஸீர் சேர்த்துக்கொண்டால் இது நும் விசேஷமே.

(17) வெகு கால் பட்ட புண் புறாக்களையும் ஆற்றி விடும்:—

பகலின் குளம்பு, செருப்பின் அடியில் உள்ள தேய்க்த அட்டைத்தோல், இந்த இரண்டையும் சம எடை எடுத்துச் செருப் பில் கட்டவும். அப்பால் பல்லி கொன்றையும் அடித்து மூன்று சரக்குகளையும் கடிகெண்ணெயில் போட்டு எரித்துக்கொண்டு, கல வத்தில் விட்டதைத்து, வடிகட்டி கில துணிகளை புண்ணின்மேல் போட்டுவாவும்.

(18) கருத்து குட்டி விளாமசத்து:—கத்தகாம்பு, இம் மூன்றையும் அரைத்து, அடையாகத்தட்டி இரவில் புண்மீது வைத் துக்கட்டிவாவும்.

(19) ஆண்குழியின் மீது வர்ப்பெம் காயத்திற்கு :—

கரோலாவை என்னென்னெயில் கலந்து பூசிவரவும்.

(20) புண்ணிலிருந்து அருகியம் கொழுப்பு குப்பத்தில் வெகி வரவதற்கு :—

படிக்காததை போர்த்து அழைக்க மிக்க பொடியாய் அழைத்து தலியே தூவிவந்தால், ஒரே காலில் குணப்படுகிறீர்களும்.

(21) புணியப்பட்டை, ஆலம் இலைகள் நடிந்தவரம் இரண்டு சரக்குகளையும் ஐஸம் விட்டதைத்து தலியேல் பூசினால், தலை மீதுள்ள புண் சிரங்கு முதலியன கிணர்த்தி வாய்க்கிடும்.

கை கால் வெடிப்பிற்கு

(1) எழுக்காயால் ஒரு தூவி என்னென்னெயில் கலக்கி இரண்டு உள்ளங்கககலியும் தேய்த்து வந்தால் கைவெடிப்பு ஒரு வரத்தில் கிணர்த்தியாய்க்கிடும்.

(2) கமச்சாரத்தை கடுகென்னெயில் அழைத்து கைகால் காலில் வெடிப்பிருந்தால், அதன் மேல் தேய்த்துவர, ஒரே வரத்தில் குணமடையப்பெறும்.

(3) கறுப்பு காயின் கக்கை காய வைத்தெடுத்து, அழைத்து தூள் செய்து, அதனுடைய காயங்கலின் மேல் தூவி வந்தால் அதிசயிக்கத்தக்க குணத்தைக்காலாயாம்.

(4) வர்ப்பது என் வரையில் ஆறுமலி கோடிதுத்தம் புண் 'காஞ்சு' என்னவழங்கப்படுவதாகு மென்று மேலே கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போர்ப்பட்ட காஞ்சுக்கு கோதுமையை உடைத்து, தண்ணீரில் செவ்வனே வேக வைத்து, புண்மீது வைத்துக்கட்ட தீவிர குண மடையவாம்.

இதைப்பற்றிய திசுழ்ச்சி வருமாறு :—

முன்னர், ஒருவருக்கு காயமேற்பட்டு அது 'காஞ்சு' நிலையை வடைத்து விட்டது. ரணசிகெச்சைக்கு கிபுணர்களும் அழைக்கிறீ என் னென்னமோ சிகெச்சை செய்தார்கள் ஒன்றும் பிரயோசனமேற் பட வில்லை.

நிதியை தேனில் கலந்து துவராததில் வைத்தனர். உபாசை யோ அதிலித்துக்கொண்டே திருக்கது. இதற்குள் அவரது கண்

பொருள் திரிபிரயோகத்தை தடுத்து விட்டார். அப்பாற் கோ வாலிக்கு தக்கதோர் பேதி மருத்தைக்கொடுத்து மேற் சொல்லிய வாத கோதுமையைத்துக்கட்டினார். கோதுமை கட்டிய தினமே கோவாலி நித்திரை புரிந்தார். அவருக்கு ஆறுதலேற்பட்டது. ஒரு வரத்திற்குள் எழுத்து நிழைந்தக்க கத்தி உண்டாயிற்று. சற்று தண்ணீரைப்போல் ஒருவித கசிவு தென்பட்டதே தவிர சிழுவதன் கீன்று விட்டது. ஒரு வரத்திற்குள் எவ்வித கசிவும் இல்லாது பூரண சொக்கிய மேற்பட்டுள்ளது. எனவே உடைத்த கோது மையை தண்ணீரில் சமைத்து வைத்துக்கட்டு வதாயின், காலையில் சமைத்து அதிலிருந்து பாதிபை சாயக்காலத்திற்காக எடுத்து வைத்துக்கட்டவும். ஒவ்வொரு வேளையின் போதும், புதிதாகவே சமைத்துக்கொண்டால் துள்ளமும் மேலானது. கோதுமை கிஞ்சிக் தேனும் வேகாதிருத்தலாகாது. இதுவே பிரதான ஷரத்து. ஏனோ கலி, பச்சையாக விருந்தால், கைப்பின் கீழ்த்தம் புண்ணில் வீக் கும் ஏற்படக்கூடும்.

அந்தாற்றமுள்ள புண்ணுக்கு ஒரே வரத்தில் குணமேற்படும்.

(1) அழுக்குரக்கிறழ்கை சந்தனம் போல் ஐஸத்தில் அழைத்து, புண்ணின் மேல் காலி, பாலை பூசிவரவும்.

ஒருவருக்கு தொடையில் அழுத்தமானதோர் வீக்கம் உண்டா யிற்று. மிதிது காலத்திற்குள் கட்டி உண்டாகி அதற்கு முகம் உண்டது. பிரகு அதிலிருந்து பல நாட்கள் வரையில் இரத்தம் வடித்துக் கொண்டிருந்தது. அதை சுற்றி அழுதுகலெப்பட்டு சிரங்குக் கட்டியின் ஓயங்கள் கெட்டியாகி விட்டன. இதற்குள் இரத்தம் வரு வது கின்று, அதிலிருந்து கஞ்சுள் கிளவானதோர் கசிவு ஏர்ப்பட் டது. அப்பாள், வந்த சிகெச்சையும் அதற்கு ஒத்துக் கொள்ளா திருந்த விதிநிலில் அழுக்குரக் கிழுகை ஐஸத்தில் அழைத்து அதன் மேல் பூசிய பட்ட போது, முதல் தினத்திலேயே உபாசையில் குறைவு ஏற்பட்டது. அடுத்த 10 தினங்களுக்கும் புண் ஆதி முற்றிலும் குணமேற்பட்டுள்ளது.

(2) காயத்தை ஆதரம், உள்வில் உள்ள அருகியைக்கலை வெகியாக்ளும், கீச்சந்த கிணர்த்திக்குள் :— வேப்பம் இலைகளை

இடித்து, அதில் கொஞ்சம் உப்பைச் சேர்த்து மலித மூத்திரத்தில் லைதத்து பூசவேண்டும்.

(3) எப்பெர்ப்பட்ட காயமாகிலும் சீர்ப்பட்டு விடும்:— குடி தண்ணீர் 5 சேர், செம்புப் பாத்நிரத்தில் னாற்றி இள கெருப்பில் கொதிக்க வைக்க வேண்டும். தண்ணீர் கண்டிப் போய் சுமார் 5 தோலா அளவிற்கு வந்தவுடன் அதை எடுத்து ஒரு பாட்டிலில் னாற்றி கொள்ளவும். அவசியமான சேரத்தில், அந்த தண்ணீரில் முந்தார் சிங்கு, பிஞ்சு கடுக்காய் இரண்டையும் இறைத்து, அதில் மீருளுவான வஸ்திரத் துண்டொன்றை களைத்து, புண் மீது மிளவதரி போடவும்.

பூனைக்காலி களிம்பு

(1) என்னென்னெய் ½ சேர் இரும்புச் சட்டையில் காய்ச்சவும். காய்ச்சியானதும் அதில் பூனைக்காலி விதைகளை மருப்பு அடித்துக் கலக்கவும். அப்பால், வேப்ப இலை அடித்து அடை யாகத்தட்டி 4 தரம் எடைகில் சற்று குடேற்றி எண்ணெயில் கலந்து உபயோகிக்கவும்.

(2) மை சாட்சி திரம் 1, சசம் திரம் 1, சசவத் திரம் 2, முதலில் மைசாட்சி, சசவத் இந்த இரண்டையும் ஒலத்தில் கரைக் கவேண்டும். பிறகு, சசத்தையும் அத்துடன் அறைத்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும். இது சகலவித புண்களையும் சொஸ்தப் படுத்தும்.

வேக்குருவுக்கு

(1) வாகை இலையை தண்ணீரில் அறைத்து பூசவும்.

(2) காவி, சஸவத், பிஞ்சு கடுக்காய், முந்தார் சிங்கு, கத்த காய்ப்பு, சிவப்பு கத்தனம், எல்லாம் சம எடைகிலெடுத்து அடித்துக் கலக்கவும். பிறகு, அதை மலத்தக்காலி சாற்றில் கலந்து மேலுக்கு பூசவும்.

(3) முந்தார் சிங்கு, கடுக்காய்த் தோல், பங்கா, கத்த காய்ப்பு நலித்தனவே முரு பாகம், துருகு ½ பாகம், தண்ணீரில் அறைத்து, உருண்டையாக உருட்டி அவசியமான பொது செய்கிற வகை பசுவேண்டும்.

(4) கத்தகாய்ப்பு, முந்தார் சிங்கு, பொரித்த துருகு, குட்டி விளாம்பு சதை யாவும் சம எடைகிலெடுத்து மாத்திரிகள் செய்து, தேவையான சமயம் தண்ணீர் விட்டறைத்து பூசவும். சங்ஸடைப் போன்ற துவாரங்களாக் கொண்டுள்ள சிவந்திரும் இது பிரயோஜனத்தைத் தரத்தக்கதாகும்.

(5) மாகிக்காய், கத்தகாய்ப்பு கடிவிலைத்து பூச, பொட் கேலின் எரிச்சல் தீரும்.

(6) கத்த காய்ப்பு, பொரித்த துருகு, சுட்ட கொட்டை பாகு, முந்தார் சிங்கு, மஞ்ச கடுக்காய்த் தோல், பேவல் சிவி எல்லாம் சம எடைகிலெடுத் தளர்த்து மாத்திரிகள் செய்து கொள்க. தேவையான பொது அடித்து பூசலாம்.

(7) மூன்றாமி விதை, முருங்கைய விதை, வாற் கொதுமை, கடுகு அல்லி சம எடை இடித்தலாத்து வஸ்திரகாபு செய்த பின்பு, பாகம் பாலில் கலந்து மேலுக்கு பூச, கண்ட மால் தீரும்.

(8) சிலத்திப் பூச்சி தேகத்தில் பட்டு அலுக்கிரதையால், அதை தேகத்தில் தேய்த்து விடுவதிலிருந்து உண்டாகக் கூடிய பொடுக்களுக்கு முந்தாய் வற்றலை தண்ணீரில் அறைத்து பூசவும்.

(9) சிரகம், கக்கு தண்ணீரில் அறைத்து பூசவும்.

சிலத்தி விஷத்திற்கும், அதன் கடிக்கும்:—

(1) காக்குப் பூச்சியை அறைத்து மேலுக்குத் தடவவும். இல்லையேல், அதன் துவாரங்களிலுள்ள சாமண்ணை யாகிலும் எடுத்துத் தடவலாம்.

(2) கண்ணுமையை எலுமிச்சம் சாற்றிலறைத்து மேலுக்குத் தடவவும். எலுமிச்சம் பழம் கிடைக்கா விட்டால், என்னெண் ணெய், சார பருப்பு, இந்த இரண்டையும் சேர்த்துக் கொள்ள லாம்.

(3) சிலத்தி விஷத்திற்கு வெள்ளை கத்தனம், முந்தார் சிங்கு அறைத்துப் பூசலாம்.

(4) அறியப்படும், மஞ்சளையும் அறைத்துப் பூசலாம்.

கை கால் வெடிப்பு

இது பெரும்பாலும் குட்டின் பேரில் ஏற்படும். கை கால் வெடிப்புக்கு மருதோன்றி இளைசிய வலத்திலகைந்து பூசவும். 2 மணி கோத்திற்குப் பின் பூசினதை எடுத்து விட்டு, அந்த இடத்தில் ஆமணக்கு எண்ணெய் தடவி விட வேண்டும்.

கை வெடிப்பிற்கு புறக பிடித்தல்

(1) கருவேலம் பட்டை, மாம்பட்டை இரண்டையும் சென் னென வேக வைத்து, பாத்திரத்தின் மேல் பவமரண குடிவிடவும். அதாவது, அதன் புறக வெவியே கரக வண்ணம் இருந்தல் வேண்டும். பாத்திரத்தை இறக்கி, கை கால் வெடிப்புக்கான குழி புறகி சற்று மூடியைத் திறத்ததும் அவற்றின் மேல் படுப்படி புறகப் பிடிக்கவும். புறகப் பிடித்தான புடவ் அந்த இடங்களில் வெண் ணெய் அல்லது, கெய் தடவி விட வேண்டும்.

(2) இது கண்டகத்திற்குச் செடியைய அதன் கொப்பு, இலை, கிதை உட்படகொண்டு வந்து அதனை பொடியாய் கொட்டி, ஒரு பாத்திரத்தில் பேட்டு காய்ச்சவும். காய்ச்சு குடிவிட்டு புறக வெவியிற் கெல்லாதவாறு வைத்திருக்க கொள்ளவும். அப்போம், கோயாளியின் உண்ணாமை உண்ணாமை இவைகளின் மீது பெய்யைத் தேய்த்து புறகபிடிக்கவும். புறகபிடித்தான சற்று கோத்திற்குப் பிறகு, நண்ணீரால் காய்ச்சிய குழி விடவும்.

(3) கொஞ்சம் காய்ச்சரம் எண்ணெயினையில் அறைந்து கைவெடிப்பிற்கு பூசவும்.

தலையில் பேன் விபூவதற்கு

(1) திரோகத்தில் ஹர் லி உண்டாவதற்குமே பேன் அடுக்கிப்புகுதல் காரணமாகும். பேதிமருத்து உட்கொண்ட வேண்டும். இரவில் கிராவெளிசரத்தில் உட்கார்த்த தலையை சேலிக் கோவதனாலும் பேன் உற்பத்தியாகும்.

(2) பகலின் பித்தத்தைதடுக்கும் தேயத்தால் பேன் அறதாய் போகும்.

(3) சரத்தை முன்னந்தெனது கலின் சாற்றில் சேர்த்து, அத்துடன் கட்டகுதிரைக் குவியின் காய்ச்சி கடிவில் கலந்து பூசவும்.

(4) கால் வெடிப்பு கால் கலாச்சன் முதலியவை கருத்து— மருத்பருப்பின் மேல் கண்ண தோள்கள் (எரித்து) எரித்த செவிக் கால் காய்ப்பு இத்த இரண்டிற்கும் கமளகட மருதோன்றிதலை, கொஞ்சம் போல் அருக பொரித்து ஆகஇவையகி கொல்லும் அறைத்து கெயிற் கலந்து பூசவேண்டும்.

(5) எரித்த கொட்டைப்பாக்கு, எரித்த மஞ்சள் எரித்த காய்போக் அரிசி, ஒவ்வொன்றும் ஒரு தாம், கத்திராய்பு, பொரித்த செங்காயம், பொரித்த படிவாசம் ஒவ்வொன்றும் 2 தாம் எரித்த மருத எரித்த போவகை, எரித்த கண்ணா இவையகைக்கு 3 தாம் பிளகு 2 தாம் காவற்றையும பொடியாய் இடித்ததைத்து கடுகெண் ணெயில் கலந்து கொண் வேண்டும். முதன் முதலாக ஆயாசம் இவையகைக்கு கருப்பின் குட்டைதலையகைக் கால் உபாதையின் பேரில் 3 கால் வலையில் கட்டி விட்டதற்குப் பின்னர் எண்ணெய் வைத்தடவ வேண்டும்.

(6) காய்போக் அரிசியை அறைத்து என்ஜிராயத்து செவத பின்னர் அதை எடுத்து கால் வெடிப்பு முதலிய எற்றிற்கு (முதலில் கடுகெண்ணெய் கவராய்த் தடவி விட்டதற்குப்பின்) இத்துலிய லுவி விடவேண்டும்.

(7) காய்பித் தலையில் காய்ச்சிய எண்ணெயில் தோய்த் செடுத்த அல்கை செடிப்பின் மேல்வைத்துக் கட்டவும். 4 மணிகேத்திற்குப்பின்னர் அத்தகையகை அலித்தது விட்டு, வேறு தலையில் வைத்துக் கட்டி விடவும்.

(8) கால், பொரித்த செங்காயம் கமளகடயின் எரித் ததைத்து கமளகி எண்ணெயிற் சேர்த்து 4, 5 கால் வலையில் பூசினதும்.

(9) சேங்கொட்டை எண்ணெயினையில் செவ்வெ கலக்கி, அத்துடன் பொரித்ததுருகையும் கொஞ்சம்போல் அதில் சேர்த்துப் பூசவும்.

(10) ஹருக, பிளகு, கண்ணாம்பு, செங்காயம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு தாம் மருதோன்றிதலை, 2 தாம் கடுகு 4 தாம் கல்லாவற் றையும் பொடியாய் அறைத்து, எண்ணெயில் காய்ச்சி கில் கட்டின் வலையில் கால்புண்ணெடிப்புகளுக்கு பூசவும்.

(11) செந்துளம், மீனகு கொட்டைப்பாக்கு துருக, கந்தகம், பலகாரை, எட்டிக் கொட்டை சம எடை யில் எரித்து, இரும்புக்கு எண்ணெயில் கலந்து பூசுவோம்.

(12) செந்துளத்தை பொடியாய் அரைத்து இரவில் அரைத அறுமிச்சம் சாற்றில் ஊறவைத்து விடியற்காலே வானமும் கால் புளாவில் அசைவியாயும் விராட்டியால் அழுத்தித் தேய்த்து விட்ட பின்னர், காரைவைத்ததை மேலே பூசி விடவேண்டும்.

(13) எட்டிக் கொட்டை 7½ தாம் பரகாரம் 3½ தாம் வெயிற்றலத்து பூசுவோம்.

(14) கால் புண்ணாக்கு மற்றெனது— அலகியின் புண்ணாக்கு, ஏறியில் உள்ள மண், இரண்டையும் தண்ணீர் விட்டு பொடியாய் அரைத்து மேலே பூசுவோம். பூச்சுகடலாந்த மீனடி, கமே வகை வெயிற் கலந்துமேலே தடவிவிடவும்.

(15) புண்ணாக்குடன் சமுத்திர மணலை கொண்டு வந்து ஊத்துடன் சேர்த்து நடித்த தோர் அடைவாகச் செய்து அரைத காலை முதல் சாயங்காலம் வரையில் மேலேயே வைத்துக் கட்ட 3, 4 நாட்களில் குணமேற்பட்டு விடும்.

சரீர சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு

கடபேதி மருந்துகள்

கத்திசெய்த கேவானம் கோலா 1½ செவ்விராய் வற்றல் தோலா 6 இரண்டையும் எலும்புச்சம் சாற்றில் அரைக்கவும். இதற்காக 31 எலும்புச்சம் பழங்களின் சாறு உபயோகித்தல் வேண்டும். பிறகு கடலின் மணலிற்று மாத்திரைகள் உருட்டிக் கொண்டு ஒரு மாத்திரை அடிகாலை யில் உட்கொள்ளவும். குறிப்பு:— கேவானத்தில் பச்சை முகை சிக்கப்படல் வேண்டும்.

மலச்சிக்கல்

(1) சாப்பிடப் போகுமுன் உலர்ச்ச மத்து அத்திப்பழங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு ஆகாரம் உட்கொண்டு வந்தால் மலச்சிக்கல் சிகிச்சை.

(2) அரைபடிமாத வறுத்தசெட்டி குட்டை சாப்பாட்டிற்கு முன் தனியே சாப்பிட்ட நேரு, சாப்பாடி உட்கொண்டதானால் மலச்சிக்கல் சிகிச்சை.

(3) கோலா கட்டாக்கி சதைபதிர்த்து வறுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அத்துடன் குளக்கரை கத்தளம் போல் அரைத்து இரண்டையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து மாத்திரை களாகக் கலந்து வெயிற் அல்லது பண்ணாக்குடன் சாப்பிடவும். உள் பிரயோஜனத்தைத் தரும். ஒட்டடல் எடுக்காது. இஷ்டப்பட்டால் அத்துடன் யாதொரு கஷாயத்தையும் உட்கொள்ளலாம்.

(4) புரு எச்சத்தை தேலில் கலந்து நொப்பூசுக்கு மேல் பற்று போட்டால் வெலிக்குயாரும். பூச்சை ஊடைத்து விட்டால் வெலிக்குப் போவது விந்து விடும்.

நாஜுக்கான பாகம்:—

(1) ரூத்து கிர வரை (இடிக்காமலேயே) 9 மாகா அல்லது 13 மாகா எடை தூண்டு ருறை வானையில் இரக்கப்பட்ட மண்ணில் போட்டு வேக வைத்து காய்விட மாந்தைப் போல் உட்கொள்ள வேண்டும். காஜுக்கான விதத்தில் வெலிக்குப் போகும். விதவர்களுக்கு 4½ மாகா கொடுக்கலாம். பன்னீர் இல்லாமல் போதும். நோஜ் புஷ்பம் ரூத்து கிர வரையுடன் வேக வைத்து உட்கொள்ளலாம்.

விதவர்களின் வயிற்றுச் சிக்கலை வெலிப்படுத்தி விடும்:—

(1) சோம்பு, எலிப் புழுக்கை சம எடையாகக் கொண்டு தண்ணீரில் அரைத்து, இனஞ் குட்டில் அரைத நொப்பூசுக்குச் சிறு பூரி, அதன் மேல் முள்ளங்கித் தழை அல்லது வெற்றிலையை வைத்துக் கட்டி விட வேண்டும். 1½ வாய் அக்கட்டு அப்படியே இறந்து வந்தால், சிக்கல் வெலியாய் விடும்.

(2) கத்தி செய்த சாதி லிங்கம், வெங்காயம், கக்கு, அக்கி திரியிலி வகைக்கு 1½ மாகா. கத்தி செய்த கேவானம் 7 மாகா எல்லையற்றையும் சேர்த்து பசும் பாலில் அரைக்க வேண்டும். குன்று மணி வளவிற்கு மாத்திரை தயாரித்து அவைகளை உலர்த்தி, ஒரு மாத்திரை உட்கொள்ள வேண்டும்.

கத்தி செய்யும் விதம் :—

(1) சாதி கிண்கிணை எலுமிச்சம் சாந்திலோ அல்லது பசும் பாலிலோ ஒரு சான் முழுவதும் அறைத்து உலர்த்திய பின்னர் மருத்தில் சேர்க்க வேண்டும்.

நேர்வாளச் சுத்தி

(1) ஏறமபச் சாணத்தில் தண்ணிலரசு சேர்த்து அப் பரத்திரத்தில் நேர்வாளத்தை முடிச்சாகச் சுட்டி தொங்க விடவும். அந்த சாணத்தை ஒரு ஜாமன் வரையில் அடுப்பின் மேல் வைத்து எரிக்க வேண்டும். பின்னர் கேர் வாளத்தினுள் இருக்கப்பட்ட பச்சையை அப்படியே படுத்தி விட்டு வேலையில் கொண்டு வரவும்.

(2) மூலம் :—இதை கிழை கற்றழைச் சோற்றுடன் சேர்த்து கன்றும் அறைக்க வேண்டும். அப்பால் கற்றழைச் சோற்றை நீக்கி விட்டு சசத்தை உபயோகிக்கவும்.

சசத்தை அழுந்த துணியில் போட்டு 2, 3 நாட்களின் கன்றும் பிழித்து கொள்வதும் சுத்திக்கு சமமே. ஏனெனில் அதுதுள்ள கருமை கிண்கி விடுகிறது. ஆனால் கிண்கி முறை யாதெனில், முதலில் சசத்தை துணியில் பிழித்ததற்குப் பின் கற்றழைச் சோற்றுடன் அறைக்க வேண்டும்.

கத்தகத்தை பொடி செய்து, காண்டிசில் வைத்து கொஞ்சம் வெய்யைச் சேர்த்து, நெருப்பில் வைக்கவேண்டும். கத்தகம் வறண்டு தூல ரூபத்திற்கு வந்தவுடன் அதை பசும் பாலில் போட்டு எரிக்கும் கத்தகத்தையும் சசத்தையும் சேர்க்கவும். இந்த மருத்தை சாப்பிட்ட பின் தலிர் சாதம் உட்கொள்ள வேண்டும்.

(3) கபம் கோறை சம்பந்தமான கட்டிடப்பை நீக்கும், கண்டத்திற்குக் கீழ்ப்பட்ட சோய்களை கண்டிக்கும், காண்பட்ட கால் வலியைத் தீர்க்கும் :—

பெரிய கடுக்காய், மஞ்சள், இரண்டிப்பு, இந்த மூன்றும் சம எடைகிற் கொண்டு, கன்றும் அறைத்து, கண்டம் கத்திப் பழத்தின் சாத்தில் மூன்று சான் தலியே அறைத்து இலங்கைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து கொண்டு தேச மந்திக்குத் தக்கவாறு 1 முதல் 7 மாத்திரைகள் உட்கொள்ளவும். மருத்தை உட்கொண்ட 3 மணி கோத்திற்கு பிறகு அதிக கேர்

வுடன் சமைத்த கிச்சடி சாதம் சாப்பிட வேண்டும். வெய் அதிகம் சேர்ப்பதே முக்கியம்.

கைபேதி

(1) குடல்களின் வறட்சியை நீக்கி மலத்தை தாராளமாகப் போக்கும் :—குதத்து கிராசை, தோல 1½, ருசி சோம்பு, பாதாம் பருப்பு, பனை வெல்லம் இவை வகைக்குறி தோலா. இவை வெல்லம் ஒன்றாக அறைத்து மூன்று பாகங்களாகச் செய்து படுக்கைக்கும் போதும் சமயம் ஒரு பாகத்தை சாப்பிட வேண்டும். (ஒரு பாகமே ஒரு வேலை மருத்து)


(2) கொடிக்காட்டாங்கு கிண்கி 1½ மாஷா அல்லது சற்று கூடக் குறைந்தவாறு அளவிற்கு கெடுத்து, அதன் எடைக்குச் சரியாக வெள்ளை சர்க்கரையைச் சேர்த்து, வெள்ளிருடன் உட்கொள்ளவும். தாராளமாக மல கிர்த்தியாகும். ஆனால் கிண்கிக்கு மூட்டடலும் கெஞ்சு கரிப்பும் வற்படுவதுண்டு. அதற்காக அதை பதப் படுத்தித் கொண்டால் மேலாகும். அதாவது இந்த கிண்கியை சற்று வறத்தெடுத்து, பாதாம், எண்ணெய் அல்லது வேறு எதி வேறும் கிண்கிக்குக் கொள்ள வேண்டும். தலிர், அதன் மேலுள்ள தேலி நீக்கி வறத்த மிகு எண்ணெயில் வறப் போட்டு எடுக்கிறார்கள்.

ஆனால் ஆளுனி வைத்தியர்களின் அபிப்பிராயம் என்ன வெனில் அதை கடுக்காய்த் தோலிலோ அல்லது அரைத்தோ ஸோத்த வேறு சர்க்கரைச் சேர்த்தோ கொடுக்க வேண்டுமென்றவர்களும், ஏனெனில், பேதி மருத்து சீக்கிரத்தில் பலனைளிக்க வேண்டும் என அறியுள்ள முகந்தாம் கூறுகின்றனர்.

கிண்கி இந்திய வைத்தியர்கள், அதை வேறு சர்க்கரையுடன் சேர்க்காமல் தலியே உபயோகிக்கிறார்கள். மருத்தின் சிறம் மாற வேண்டுமாயின் கொஞ்சம் சோஜா புடிபன்களைச் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

சரீர சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் முற்றிற்று.

பல்வேறு நோய்களுக்கு



அம்மைக் குரீய சிகிச்சைகள்

(1) அம்மைக்குரிய ஊட்டங்களில் கொஞ்சம் குழிமைப் பால் பருகச் செய்யவும்.

(2) 2, 3 வயதுவரையில் விலைக்களை விழுங்கி விட்டவர் களுக்கு வைகுரி அதிகம் பூட்டாது.

(3) குழந்தைகளின் மையருக்கு :— அநிமதாரம் (மேல் நோய் சிகிச்சையின்) இடித்து, மரதுளம் பழத்தில் விலைக்களை தேக ஸ்திதிக்கு தக்கவாறு சேர்த்து, தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்த பிறகு தெரரூஇல் சாற்றுவதன் பருகச் செய்யவும்.

(4) அம்மைவின் கொப்பளங்களுக்கு பூச்சு :— இது வரிச் சலையும் குணப்படுத்தும். வாகை மாத்திரை பட்டை, அரகம்பட்டை, பெரிய கழுவளி பட்டை, அத்திப்பட்டை, திஸை பெல்லம் கன்றும் இடித்து, இடித்த பொடித்துவரை, பசு செய்யிற் கலந்து மேலே பூசவும்.

(5) முகத்தில் அம்மைக் கொப்பளங்களினால் அதிக நழுப்பு கள் இருந்தால், கண்டாமிஞ்சான், பாய்க்கோரையின் வேர் கட்டு பலகலனை சமளடை எடுத்து அலற்றை இடித்தும் சலித்தும், எருமை பாலில் சேர்த்து முகத்தில் பூசவும். காலையில் உம்மியை கலறவைத்த தண்ணீரைக் கொண்டு முகத்தை கழுவி விடவும்.

(6) நேலெடுத்த மஞர் பருப்பு, கற்பூசனி விலைவின் பருப்பு சமளடையில் அலறத்து முகத்தில் பூசினால் முகத்தில் விப்பி கிறத்துடன் உடிய மேலிணைந் தரும்.

(7) கோரைக் கிழங்கை துத்தில் வேகவைத்து, காலையில் அந்த துத்தைக் கொண்டு முகம் கழுவவும்.

அம்மையில் தலைமயிர்கள் கொட்டிப்போனால்

(1) வேப்படுலை, இலத்தடுலை, இந்த இரண்டையும் தண்ணீர் விட்டறைத்து, தலைநில் தடவி 1½ மணி நேரத்திற்குப்பின் ஸ்காஸ்க் செய்யவும்.

(2) இலக்கைஇலை, ஷிபாஇலை, இரண்டும் சமளடை எடுத்து, செவ்வளை அலறத்து, மயிர் கால்களில் தடவிவண்டும். 1½ மணி நேரத்திற்குப் பின் கழுவி விடலாம்.

(3) கருஞ்சிகத்தைத் தண்ணீரில் அலறத்து அலறக் கொண்டு மயிர்களை கழுவிவாவண்டும். இவ்வாறு ஒருவாரம் கழுவி வர மயிர்கள் வெகுவாக முளைத்து கீறும்.

(4) கெல்லிக்கையை எலுமிச்சம் சாற்றிலரைத்து மயிர்கால் களில் தேய்த்துவர மயிர் கீறும்.

(5) யானைத் தந்தத்தை கட்டு அதற்கு சமளடை ரஸவத் இரண்டையும் தண்ணீரில் சேர்த்தறைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்து கொள்ளவும். இந்த மாத்திரைகளை தண்ணீரில் கரைத்து உரோமங் களில் தடவிக் கொண்டு வர மயிர்கள் கீணடுவனரும்.

(6) பசுவின் பித்தத்தை கொண்டு வந்து மயிர் கால்களில் தேய்த்து சுமார் 1½ மணி நேரங்கழித்து உரோமங்களை கழுவிவிட வும். இதனால் உரோமங்கள் செவ்வளை கீறும்.

(7) கையாத்துவாச் சாற்றை எடுத்து எள்ளெண்ணையில் கலக்கெறித்து சாறு சுண்டிப்போனவுடன் எண்ணையை பெடுத்து புட்டியில் பந்திசப்படுத்தி வைத்து, இரக்காலத்தில் அதை தலை ரோமங்களுக்கு தடவி கத்தால், உரோமங்கள் கருத்து கீறும்.

(8) தேக காய்களினின்று மட்டுமன்றி ரீரம் பூரையிலிருத் துமே உப்பணம் வீசிக் கொண்டிருக்கும். இம்மருத்து குறிப்பாக ஸ்திரீகளுக்கு உரித்தாகும் :—

மலராத ஆவாயம் மொட்டுகளை கிழலில் உலர்த்திக் கொள்ளவும். அப்பால் அலறகளை பொடியால் அலறத்து வஸ்திகா மஞ்செய்து, பொடியின் எடைக்கு சீனி அல்லது கற்கண்டைச் சேர்த்து சாப்பிடவேண்டும்.

உரோமங்களை கறுப்பாக்கும்

(1) சுமார் 100 சக்களைப் பிடித்து, பாட்டிலொன்றில் லைத்து அதில் எள்ளெண்ணை ஹற்றி காற்பது நாள் வெயிலில் வைத்தெடுத்து, பிறகு அதனை சக்களை விட்டும் சுத்தப்படுத்தி, உரோமங்களுக்குத் தடவிவரவும்.

(2) மயிர்களை கிளம்பாக்கிவைக்கும், மயிர்களும் கன்றும் கழக்கும் :— சவுக்கு இரண்டை ஜலத்தில் கொதிக்க வைக்கவும். இவைகள் செவ்வனே கொதிப் படைத்ததும், அதில் எள்ளெண்ணெய் சேர்த்து ஏரிக் கவும். தண்ணீர் சுண்டிப்போனவுடன், எண்ணெயை யெடுத்து மயிர்க் கம்புகளில் தேய்த்துவா வேண்டும்.

(3) எள்ளின் தகையகளை வேகவைத்து, குளிக்கும்போது அவைகளைக் கொண்டு தலைரோமங்களைத் தேய்த்துக் குளித்துவந்தால், உரோமங்கள் மிருதுவாகி கழத்து கீழும்.

(4) உரோமங்கள் மிருதுவாகவும் சுறுந்தும் வளரும் :— குகம்விதை, குகம்செடியின் மேற்பட்டை, இரண்டையும் சம எடைவிலெடுத்துச் சுட்டுவிடவும். பிறகு அத்த சாம்பலை சம்பங்கி எண்ணெயிற் கலந்து கலிம்பைப் போலாக்வி, மயிர்க்கள்களில் தேய்த்து வந்தால் உரோமங்களில் கருமையும் மினுமினுப்பும் ஏற்படுவதுடன் அவை கீண்டும் வளரும்.

தலைரோமங்கள் கொட்டிப் போனும்

(1) யானைத்தந்தம், ரஸவத் இரண்டும் சமளகடையில் அரைத்து மயிர்க்கள்களில் பூசவும்.

(2) கைபாத்தலையை யரைத்து மயிர்க்கள்களில் தேய்க்கவும்.

(3) குகிரை அல்லது கழுதைவின் குளம்பைச் சுட்டு, அதன் சாம்பலை எள்ளெண்ணெயிற் கலந்து பூசவும். மாட்டுக் கொம்பை சுட்ட காத்ந்துப் பூசலாம்.

(4) கத்தகத்தை நண்ணீரிலிவைத்து அப்பால் அதை தேனிற்கலந்து பூசவும்.

(5) கெல்லிக்காயை சுருத்தர் சாற்றில் அரைத்து பூசுவந்தால் 5, 6 தினத்தில் உரோமம் முளைக்க ஆரம்பித்துவிடும்.

(6) சுவம் பூசப்படாத ஒரு செப்புப் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தயிலா ஊற்றி, செப்பு காயையாண கரணுவைக் கொண்டு அதை மென்மேலும் கலையவேண்டும். அத்தயிற் பச்சையாய்ப் போய் விட்டதும் அதை யெடுத்து மயிர் கொட்டிய விடத்தில் பூச வேண்டும்.

(7) மயிர் கொட்டிப்போகும் விடத்தை கெல்லிக்காய் ஊற வைத்த ஜலத்தால் முதலில் கழுவி விட்டு, அத்த விடத்தில் எதைக் கொண்டே ஊம் மிக்க இலேளை காயக்களைச் செயது பிறகு, காமச்சாரத்தை பொடியாய் அரைத்து, எண்ணெயிற் கலந்து பூசி வரவும். ஒருவாரத்திற்குள் மயிர் முளைக்கத் தொடங்கும்.

(8) உதுஷி, யானைத் தந்தத்தின் அரைத்த துள் இத்த இரண்டையும் செவ்வின் கொழுப்பில் கலக்கி எத்தவிடத்தில் பூச வேறோ அத்தவிடத்தில் அவசியம் மயிர் முளைக்கும் என்றும் அதிநுமச்செஷமாக அது உள்ளங்கையில் பூசப்பட்டாலும் சரியே அத்த உள்ளங்கையிலும் மயிர் முளைத்துவிடும் என்றும் சில புறப்பூண்டு விசுவாசிகள் கூறியுள்ளார்கள்.

(9) முட்டையின் எதலத்தை 14 நாட்கள் வரையில் தொடர்ந்தாற்போல் தேய்த்து வந்தால், தேய்க்கப்படும் விடத்தில் மயிர் முளைத்துவிடும்.

(10) யானைத்தந்தம் சுட்ட சாம்பலை, ஆட்டிப்பாலில் கலந்து தலை முழுவதிலுமே அள்ளுது மயிர் முளைக்க வேண்டிய விடத் திலே தேய்த்து வரவேண்டும்.

வயிற்றுப்புச்சி கிருமிகளுக்கு.

முதல் இரண்டு மூன்று நாள் பாலில் சக்கரைசுட்டுக் குடித்த பின்னர் :—

முரத்து கிளவகா, குல்கந்து, வகைக்கு 5 தோலா கடுச்சாய்ப் பிஞ்சு போஸ்தகா வகைக்கு 2 தோலா, கக்கு மீன திராட்சை வகைக்கு ஒருதோலா எல்லாம் அரைத்து தேனிற் கலந்து ஒரு தோலா எடை சாப்பிடவும்.

குழந்தைகளின் கிருமி உபத்திரவத்திற்கு.

(1) ஆமணக்கம் செடியின் துளிர் இலைகளைக்கொண்டு வந்து கையால் கசக்கி, ஆசனவாயின்மீது சுட்டிவிடவும். பூச்சிகள் மாண்டுபோகும்.

(2) வெள்ளைத்தண்ட நிரம் 1, கலிங்கம் 2, மிருதுவாக இடித்துக்கொண்டு தேனில் கலக்கி கெட்டுடும் உட்கொள்ள பூச்சிகள் யாவும் இறந்து விடும்.

(3) குதிரைச் சூளம்பை எரித்து அதன் சாம்பலை தேனில் கலந்து கொடுக்கவும்.

(4) வேப்பத்தலை, வாய்விளங்கம், கமேலா வலைக்கு 7 மாஷா இடித்ததைத் துருகைப்பிடி யளவிற்கு உட்கொள்ள கிருமிகள் மாண்டு விடும்.

(5) கரும்பைச் சாறுவைத்து, கலந்ததை இலைசாறு வெந்திலைசாறு எல்லாம் சூளாக்கக் கலந்துகொண்டு தினந்தோறும் அதில் கொஞ்சம் விரலால் தொட்டெடுத்து ஆசன வாயில் பூசவும். அல்லது துணித்திர் பொன்னை அச்சாத்தில் களைத்து ஆசன வாயில் வைத்துவா ருந்து சாறில் கலை கிருமிகளும் மாண்டு போகும்.

(6) வாய்விளங்கம், உப்பு, வலைக்கு திரம் 2, வெள்ளைத் தலை திரம் 2, பனஞ்சக்கலா சமளடை எல்லாம் அரைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். வேலை 1க்கு இரண்டு மில்லில் எடை வெங்கீருடன் பருகவும்.

(7) பெரிய கடுக்காய்த்தோல், வெள்ளைக்காய், தாண்டியாய் வற்றல், பெரியகடுக்காய் உறுப்பு, வலைக்கு திரம் 10, வெள்ளைத் தலைசெடிக்கடாங்கு விதைத் தோல் வலைக்கு திரம் 2, கமேலா கசப்பு கோஷ்டம், உப்பு வலைக்கு திரம் 3, இலைகளை இடித்ததைத் துருகை செய்து தேனில் கலந்து கொள்ளவேண்டும். வேலை 1க்கு 4 திரம் சாப்பிடவும்.

(8) அசுந்தாழமம் வாய்விளங்கம் உப்பு, ஐலாகாரம் மஞ்சள் கடுக்காய்த்தோல் அரிசிதிர்ப்பிளி, சுக்கு, இலைவாயும் சமளடை வறுத்த பெருங்காயம் ஒரு சாக்கின் அளவிற்கு 2 பாகம் எல்லாம் ஒரு மிக்க இடித்ததைத் துருகை 2 திரம் எடையில் சாப்பிடவும்.

(9) பெருங்காயம், பொதிரு, வாய்விளங்கம், உப்பு, மஞ்சள் கடுக்காய்த்தோல், சமளடையிலெடுத்து அவற்றை இடித்ததைத் துருகை மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 3 மாத்திரை தின்னவும்.

(10) வாய்விளங்கம், உப்பு, தனித்தனியே திரம் 2 தோல் உரித்த வெள்ளைத்தலை திரம் 2 சாக்கலா சமளடை, மாத்திரைகள் செய்து கொண்க. சாப்பிடும் அளவு மிளகாய் 2 வெங்கீருடன்.

பின்னங்கம், இத்துப்பு கமேலா மஞ்சள் கடுக்காய்த் தோல் எல்லாம் சமளடை இவற்றை இடித்ததைத்தின் சலித்துக் கொண்டு 2 திரம் பகலின் தமிழுடன் சாப்பிடவும். ஆசனம் செச்சு சாதம்.

நாக்குப்பூச்சிகளுக்குக் கிருமிகளுக்கும்.

(1) மலைவேம்புபட்டை, தோலா 2 இதை எட்டு குவளைக் கொண்ட ஐலத்தில் காய்ச்சவும். தண்ணீர் கண்டி ஒரு குவளை யளவிற்கு மீதியாயிருக்கையில் அதை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் வெல்லத்தைச் சேர்த்து பருகியின் பித்தைக் கொள்ளவேண்டும். இதேபோல் மூன்று இரவு செய்து வரவும்.

(2) கழற் கிச்சாய் பருப்பு ஆவாரம் விதை, ஓமம், கமேலா, வாய்விளங்கம், பனஞ் சர்க்கலா, எல்லாம் சமளடையில் எடுத்து நனைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். சாப்பிடும் அளவு திரம் 2.

(3) முலைப்பால்விதை ரஸவத், பெருங்காயம், தனித்தனியே இரண்டொரு மாஷா, கரியபோளம் 1 மாஷா, மிளகு மாஷா 2 வேப்ப இலை 2, சுக்குறுத்தா சாற்றில் அரைத்து சோள மணி களின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். வேலை 1க்கு ஒரு மாத்திரை சாப்பிடவும். இது ஆசன வாயின் கிருமிகளை எடுத்து விடும்.

(4) கத்த காம்பு, அரிணி, இலக்கைத் தழைகள், கோப் பணா எல்லாம் சமளடையிற் கொண்டு வாய்ப்பிறற்ின் அளவில் மாத்திரைகள் தயாரித்து, ஒரு மாத்திரை பாலருக்கு கொடுக்கவும்.

(5) கீச திராட்சையில் உள்ள விதைகளை எடுத்து கிட்டு, அதில் வாய்விளங்கத்தை அடைத்து, முதிபோருக்கு 20 திராட்சையும், பையன்ருக்கு 5 முதல், 10 திராட்சை வரையிலும், கொடுக்கவும். அவைகளை மென்றாமல் கீழங்கிக் கொள்வதே மேல்.

(6) ஐப்பதாறு இலைகளை எரித்து, அவற்றின் சாம்பலை கடுகு சாண்டியிற் குழைத்து ஆசன வாயின் மேல் தடவ, குழை கைகளின் கிருமி உபாஸை கிள்கும்.

காய்ச்சல் (ஜூரம்)

பித்த ஜூரத்திற்கு:—புளி தோலா 2, இரலில் தண்ணீரில் கறை வைக்கவும். காலையில் அதை எடுத்து அதன் தண்ணீரை இடத்து, அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து பருகவும். சிங்க, இதை பருகு முன்னர், 1 தோலா இன்னொரு விதை வாயிற்போட்டு விழும்பி விட்டு, அதன் மேல் மேற்கூறிய பாஷத்தைக் குடித்தால் இன்னும் கலவது.

பித்த ஜூரத்திற்கு

(1) போஸ்தா, காகினி விதை, பாலக் விதை, வெள்ளரி விதை இவை யாவும் சம எடை, 3 பங்கு காடி, 2 பங்கு காடியை 2 பங்கு சர்க்கரையிற் சேர்த்து, பாசு காய்ச்சிக் கொள்ளவும். இதை தர்பூசனி விதையின் கஷாயத்துடன் பருக வேண்டும்.

(2) பெரிய பூசணிக்கு சரியான அளவில் சர்க்கரையைச் சேர்த்து, இரண்டையும் பாசு படுத்திக் கொண்டு தேசாந்திதிக்கும் வயதிற்கும் தக்க அளவில் கொடுத்து வா, பித்த ஜூரத்தைக் கவர டிக்கும்.

பித்த ஜூரத்திற்கு ஆரிய பாகம்

(1) இதை மேலி மருந்து சாப்பிட்ட பின்னர் கொடுத்தால் கலவது:—

மூல்கூறுப்பு, ரோஜா மொக்கு, தனித் தனியே 6 பாகம். சல்லாத்து விதை, காகினி விதை, தர்பூசனி சறை, வெள்ளரி விதை இவை வகைக்கு 3 பாகம், தாமரைப் பூ 2 பாகம், கன்னாப் அறைத்து சிறு பிள்ளைகளுக்குக் கொள்ளவும். ஒரு வேளைக்கு 2 தாம் திண்ணவும்.

(2) சல்லாத்து விதை, பருப்புக் கிரை விதை, வகைக்கு 2 திரம், தண்ணீர் விட்டலாற்று, காற்றைப் பிழித்து, புளிக் கறைத்த தண்ணீரை மேலாக இடத்தீ, அதையும் அத்தாடன் கலத்து, அதில் ஸ்கோல் விதை ஒரு தோலாலைத் துவி, அப்படியே எடுத்து பருகவும்.

(3) தொரா இலைச்சாறு, காகினி விதை, தனித் தனியே 2 திரம், இந்த இரண்டையும் தண்ணீரில் அறைத்து, காநாரா கிளிகுசியின் 2 தோலா வுடன் உட்கொள்ளவும்.

பித்த ஜூரத்திற்குரிய எலுமிச்சம் ஷர்பத்

அரை பவுண்டு சர்க்கரையை பாகாக காய்ச்சி, அதில் எலு மிச்சம் சாறு 6 தாம் வடிகட்டி கலத்து, பதத்திற்கு வந்ததும் எடுத்துக் கொள்ளவும்.

மூன்று காகினிகொரு முறை (இடைநில் விட்டு விட்டு) வரும் ஜூரத்திற்கு:—

சித்தல், மல்லி, சிகப்பு சத்தனம், தாமரைக் கிழங்கின் வித்து, வேப்பம் பட்டைவினது உள் பாகம் வகைக்கு மாஷா 5, இவற்றை இடித்தறைத்து முக்கால் படி ஜலத்தில் கொதிக்க வைக்கவேண்டும். $\frac{1}{8}$ பாகத்திற்கு கண்டிப் போனதும் வடிகட்டி குடிக்கவும். தாமரை ஷர்பத் 2 தோலா அதில் சேர்த்துக் கொள்வதாலும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். ஏனெனில், ஒமட்டல் வரக்கூடியவர்க ளுக்கு அது ஒமட்டல் வராது காரணம்.

தாமரை ஷர்பத்

உஷ்ணத்தால் உண்டாகும் ஜூரத்தையும், குட்டுத் தலைவலி வையும் சிவர்த்திக்கும்.

புதிய தாமரை புஷ்பம் $\frac{1}{2}$ ரத்தல், ரெஞ்சுரி தோலா 4, இந்த இரண்டையும் 4 ரத்தல் ஜலத்தில் கொதிக்க வைத்த பின்பு, பாத்திரத்தை இறக்கி வடிகட்டி ஒரு சேர் ஜீலியில் காய்ச்சி, ஷர்பத் பதத்திற்கு கொண்டுவரவும். வேலை 1 க்கு 21 திரம் வகையில் கொடுக்கலாம்.

கசக்காத நீளச் சிறைக்காய் ஒன்றை கொண்டு வந்து, அதற்கு வில் மண செய்ந்து கயாராக வரியும் ரெஞ்சுரின் மீது (இரண்டு செங்கனின் மேல்) வைத்து விடவும். அதன் மேல் மண் சுட்டு வெட்டிப் போனதும் அதை எடுத்து மண்ணை அப்படியே படுத்தி கரைக்காயில் நுழை செய்து அதில் உன்ன காற்றை வெளிப்படுத்தி ஜீனி, அல்லது நுஞ்சுரின் அல்லது தாமரை ஷர்பத் அல்லது பனப்பா ஷர்பத் ஆக எதிலேதும் கலத்து கொடுக்கவும்.

தான் பட்ட ஜூரத்திற்கும், குட்டின் மேல்
உண்டான காய்ச்சலுக்கும்.

(1) சித்தி, தொய இலை, மல்லி, அரிமதாரம் இடித்து
காட்டா சிற்று, வேட்டி வேர், சிவப்பு சந்தனம், வேப்பம் இலை,
இடித்த கற்பூசனி விதை இவை சம எடை, இந்த சாக்குகளின்
சிந்தும் 2 திரம் எடுத்து, 1 தேர் தண்ணீரில் காட்ச்சவும். கால்
பல்கிற்கு ஜலம் கண்டிப் போய் வந்தவுடன் அதை வடிக்கடி
குடிக்கவும்.

(2) தொல் சிக்கிய அரிமதாரம், காட்டா சிற்று, சித்தி,
செவ்வேடி, வேட்டி வேர், சிவப்பு சந்தனம், உருகிக் கீழங்கின்
மேலிதூண்டி தொல், மல்லி, அருஞ்சரின் மாலும் சம எடை
இதிலிருந்து 2 திரம் திவக்கோலும் 1 படி துடித்தில் கலந்து
காய்ச்சவும். அரைவாசி ஜலம் கண்டிப்போனதும் அதனை எடுத்து
குடிக்கவும்.

நடுக்கம், பித்தம், கபம் சம்மந்தப்பட்ட ஜூரத்திற்கு

சுழற்சிக்காய் பருப்பு, அரிசி திப்பிலி, வகைக்கு 1 திரம்
சோகம் கருவேலம் இலை-தலித் தலிபே 1 திரம்-இலையகி இடித்
தலைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொண்டு, காலை,
மத்தியாஹம், மாலை ஆக கால் 1க்கு 3 தட்டைகளில் ஒவ்வொரு
மாத்திரை உட்கொள்ளவும்.

பித்த ஜூரத்திற்கு :—

சத்தாபாயு 4 பாயம், கற்பூரம் ஒரு பாயம்—இந்த
இரண்டையும் அரைத்து இலையகிப் பருத்தின் அளவிற்கு
மாத்திரைகள் செய்து வேளைக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுத்து
வரவும்.

தடுக்கு ஜூரத்தைத் தடுக்க உபாயம்

எல்லா வேளை இலையைக் கொண்டு கந்து அதை வலது
கைகின் மணிக் கட்டினை மேல் வைத்து அதன் மேல் துட்டஞ்
சலி கொள்ளையும் வைத்துப் பலமாகக் கட்டிவிட வேண்டும்.
அப்பால் கட்டப்பட்ட விடத்தில் கொப்பள கொண்டு தோளும்
காய்ச்சல் வர வேண்டிய முறைக்கு வரலாம். அதிலிருந்தே காய்ச்
சலும் சிந்து விடும்.

நடுக்குக் காய்ச்சலை தடுத்து

(1) பெரித்த படிசாரம், கற்கண்டு இரண்டையும்
அரைத்து மோலாசின் திரை வாக்ஷருத் தக்க அளவில் மோலாசின்
விரித்து 2 மாஷா வலையில் கொடுக்கவும். ஆனால் மோலாசினு
இருமல் ஏற்பட்டிருந்தால் இந்த மருகதை கொடுக்க வேண்டாம்.

(2) அனகி இலை, 6 மாஷா—மிளகு கான்கு-அரிசி திப்பிலி
ஒன்று இவைகளை தண்ணீரில் அரைத்து, ஒரு தோலா கற்கண்டு
மூலிசை செய்து உட்கொள்ளவும்.

நடுக்குக் காய்ச்சல் துரே வேளை மருத்தில் தீர்த்து விடுபட.

(1) அரிசினி மாஷா 1—மிளகு மாஷா 2—கோல்கரி மாஷா 6
எல்லாம் ஒன்றாக அரைத்து தேக எந்திரங்குத் தக்கவாறு ஒரு
மாஷா அளவிற்கு வெறப்பட்டோ அல்லது குறைத்தோ, ஜூரம்
வர வேண்டிய கோத்திற்கு 2 மணிக்கு முன்னர் கொடுக்கவும்.
ஆனால் வெடும் வயிற்றில் கொடுக்கலாகாது. இரத்தமேல்
வாத்தியம் விடும். முதலில் இலையகி ஆகாரம் கொடுக்கவும்.
மருத்து சாப்பிட்ட பின்னர் மத்தியாஹ சாப்பாட்டு கோத்திற்கு
அல்லது அதற்கு முன்னரே சற்று கோல் கழித்த மரு சாப்பாடு
கொடுக்கலாம்.

(2) காமத்தை விதைவய சித்தி தொல் மண் கலவத்தி
லடைத்து, அதன் வாயை மூடி, சிலை மண் செய்து கெடுப்பில்
வைக்கவும். விதைகள் எரிந்து போனவுடன் அவற்றை எடுத்
தலைத்து அதன் சாம்பலை 4 மாஷா அளவிற்கு முதியோருக்கும்,
ரத்தி அளவிற்கு சிறுவருக்கும் கொடுத்து வர, கடுக்கு ஜூரம்
விந்து விடும்.

(3) அரிதாரம், படிசாரம் தலித்தலியே திரம் 6—சோத்துக்
சுற்றுகளின் சாத்தில் போட்டு வேப்பத்தடி கொள்ளை ஒரு முழத்
திற்கு வேட்டி, அதன் ஒரு பக்கத்தில் சோப்பு கானாயலிய
காலஞ்சை அமைத்து, அப்பக்கமாய் அந்த இரண்டு மருக்கை
யும் 16 ஜாமம் அமைத்த பின்னர், சிறு பிள்ளைகளைத் தட்டி
உலர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு, அப்பிள்ளைகளை மட்டகைய
மொன்றில் போடவும். ஆகணக்கு சிறை வரித்த சாப்பலோ
அல்லது அரசம் கிறகு வரித்த சாப்பலோ மேல் கொள்ள

பிள்ளைகளின் மேலும் தீழும் பாய்வி விடவும். இனி கலயத்தை சிலை மண் செய்து, 12 ஜாம்பம் புடம்வைத்தெடுத்திக் கொள்ளவும். வேலை 1க்கு ஓர் அரிசி எடை கொடுக்க வேண்டும். ஆகாரம் புழுங்கலரிசி கஞ்சியே கொடுத்து வரவும்.

(4) மித்த ஜூரத்தினால் கண்டிக்கும், தாகத்தை சாந்தப் படுத்தும், இருதயத்திற்கு வலுவைத்தரும் :—

1) சேர் வெட்டி வேர் சாந்தில், 4 திரைம் வெட்டி வேரை, இரவில் ஊறவைத்து காலைநிலை காய்ச்சவும். அரைப்பாகும் ஐயம் கண்டிப் போனவுடன் அதில் 1/2 சேர் சர்க்கரையைச் சேர்த்து பாகாகக் காய்ச்சவும். அப்போது அதில், வெட்டி வேர் அத்தர் ஒரு மரஹையைப் போட்டு லேகியம் பதம் போல் தயாரித்துக் கொள்க—பன்னிரும் கொஞ்சம் சேர்க்கலாம். சிலர், இதில் கரைக்காய் 1 தோலா எடையும் அறைத்து சேர்க்கிறார்கள்.

இருமல் ஜூரத்திற்காக இதன் ஷர்பத்திலேயே 4 ரத்தி கற்பூர மும் சேர்க்கப்படுகிறது. வசிற்றுப் போக்கேற்பட்டிருந்தால் 2 திரைம் மூங்கிலுப்பு சேர்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த லேகியத் தால் அகேக பிரயோஜனங்கள் உண்டு.

உபாதையுள்ள சமயத்தில் அதாவது ஜூரம் வந்த சமயத்தில் கோயாளிக்கு ஆகாரம் கொடுக்கக் கூடாது. ஜூரம் குறி ஆறிய பிறகு ஆகாரம் கொடுக்கலாம். சூட்டின் பேரில் வாக்கடிய ஜூரத்தின் கோயாளிக்கு உருத்து கிச்சடி, பருப்பு, குங்குர பாணக் கிளை பருப்புக் கிளை, கரைக்காய் பிச்சுக்காய் போன்ற பதார்த் தங்கள் ஆகாரத்தில் சேர்க்க வேண்டும்.

உபஜூரத்திற்கு கஷாய சிகிச்சை

சோம்பு, தோல் கீகிய அபிமதூரம், இரண்டில் இடித் துக் கொள்ளவும். காவலுபான், அசமந்தா நூம், தனித்தனியே 2 திரைம் பர்கியா ஷாஜன் 3 திரைம் எல்லாம் கஷாயமாக எரித்து, குலகத்து 2 தோலா, கிசஞ்சரீன் 2 தோலா அதில் சேர்த்து பருகவும்.

அபிசய சிகிச்சை

(1) ஆகையின் கிறகு, மைசாட்டி, கறுப்புத் துணிவில் எறறி அத்துணியை வெப்பிற் கிளைத்து வினக்குத் திரியைப் போக்

கொளுத்தி எரிக்கவும். எரித்து போனவுடன் அந்த எரித்த சாய்பலி எடுத்து இரண்டு கண்களிலுயர் காயிடவும். கங்கு கங்குக்கொரு முறை வரும் படியான வரத ஜூரத்திற்கு இதோ! இவ்விதமாகவாத சிகிச்சை எக்சர் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

(2) வெள்ளிப்புழை மந்தைச் செடிவை, குாயத்துக்கிழைமை யன்று வேருடன் பிடுறுகி கோயாளியின் கைகளில் கட்டி விடவும். குரே காலில் ஜூரம் கித்து விடும்.

(3) அச்சித்தியில் கழற்சிக்காய் பருப்பு முதலையே ஒரு தோலா, சோகம், கருவேலம் இவை முதலையே 1/2 தோலா, எல்லாசைக்கு கிளையும் அறைத்து கடலை மளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து வேலைக்கு 1 மாத்திரையாக வலை, மத்தியானம் சாயங்காலம் உட்கொள்ளவும். 3 கான் சர்ப்பிடுவதற்குள் ஜூரம் போய் விடும்.

(4) சோம்பு, காகினிவிதை, முதலையே, 4 தாய் பனஞ்சர்க் கரை 1/2 சேர், முறைப்படி சர்க்கரைப் பாகில் ஷர்பத் காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.

(5) மலராத எருக்கன் கொட்டு பனஞ்சர்க்கரையுடன் சேர்த்து கிழங்கிக் கொண்கதனால் கிசஞ்சர் காய் மூன்றே காவில் கின்று விடும்.

(6) ஊரத்தலை திரம் 12 தோல் சிலி திரம் 8, கக்கு கருமை பிசிலிதனித்தனியே திரம் 1/2 மாவம் இடித்தலுத்துக் கடலைவை கிற்று மாத்திரிகள் தயாரித்து, கடுக்குச்சாலை வருவதற்கு சற்று முன்னர் உட்கொண்டு விடவும்.

(7) கழற்சிச் செடியின் துணி 3 மிளகு உருப்படி 2 தண்ணீரில் அறைத்துக் கொடுக்கவும்.

(8) கழற்சிப் பருப்பை தண்ணீரில் அறைத்து தொப்புழரில் கிளதுளியன் விட்டால் கடுக்குச் சரத்திற்கு கல்ல குணம் செய்யும்.

(9) கடுக்குச் சரத்திற்கு:— எருக்கன் வேர் 2 பாகம், மிளகு ஒருபாகம், இந்த இரண்டையும் ஆட்டிப் பாகிக் அறைத்துக் கடலை மளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து, ஜூரம் வருவதற்கு முன்னர் ஒரு மாத்திரை கொடுத்து விடவும்.

(10) கடுக்குச் சரத்திற்கு:—கந்தகம், கக்கு அச்சித்தியில் மிளகு, கத்தி செய்த சேவாளம் வெங்காயம் சாடி எடைவித்

கொண்டு எதுமிச்சம் சரத்தில் இரண்டு ஜரமம் அறைத்து மிளகு அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். வேலை 1-க்கு ஒருமாத்திரை.

(11) பழுத்த ஏருக்கன் இலைகளைச் சுட்டு சாய்வாக்கி, காலை வேளையில் 4 ரத்தி, தேனில் கலந்து உட்கொள்ள சம சம்பந்தப்பட்ட ஜூரத்தை சௌக்கியப் படுத்தும்.

(12) கருஞ்சீரகம், அரிசி திப்பிலி, மிளகு, கல்வேம்பு, காசி, வேப்பஇலை 2 மாஷா, யாவற்றையும் இடித்ததைத்து நூரணயாகவிய மூன்று 1 மாஷா எடை, முறைக்காய்ச்சல் வருமுன் சாப்பிட்டுக் கொள்ளவும். முறைக்காய்ச்சிக்குந்தான் ஒரு மாஷா அக்கும் குறைந்தளவிற்கே கொடுக்க வேண்டும்.

(13) வசனாசி ஒருதாம் சுத்தரிக்காவில் வைத்து வரிக் கவும். செவ்வனே எரிந்து போனதும், அதை அறைத்து இரும் புத்தாச்சியில் போட்டு, அதைச் சேர் ஜலம் வைத்தி இன கெருப்பின் மேல்வைத்து காய்ச்சவும். தண்ணீர் சுண்டிப் போனதும் அதை கொடுத்து ஒரு தாம் காலியுடன் அறைக்கவும். அவசியமான போது ஒரு அரிசி எடைமுதல் ஒருரத்திரைகையில் மிதானித்து பத்தாஷா அதையது சர்க்கரைபாகிலுல் தயாரிக்கப்பட்ட மிட்டா யுடன் கொடுக்கவும். இந்தியர்களின் பழக்கவழக்கன் களுக்கேற்ப ஜூரம் வருவதற்கு ஒரு மணி முன்னர் கொடுக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. இது கடுக்கத்துடன் வரும் ஜூரத்திற்கு அரிசியாகம், ஆகாரம், குஷகா சாதம் பருப்பு.

(14) 4 நாளுக்கொரு முறை வரும் முறைக்காய்ச்சலுக்கு:-- பேதிக்குக் கொடுத்தான பின்னர் பெருங்காயம், உப்பு, 2 மாஷா ஒரு சேர்த்தவகையில் சாய்ச்சவும், 4 தாம் தண்ணீர் அளவிற்கு கண்டி வத்ததும், குடித்துக் கொள்ளவும். முறைக்காய்ச்சல் போய்விடும்.

(15) சமச்சாரம் 3 ரத்தி, மிளகு 2 உருப்படி இதை இடித்தும் சலித்தும் முறை காளன்று கொடுக்க வேண்டும்.

(16) கருஞ் சீரகம் 4 திற்றம், அறைத்து அதன் துளை தேனில் கலந்து சில நாட்கள் வரையில் தொடர்ந்தாற் போல் சாப்பிட்டு வரவும். முறை ஜூரம் வரவேண்டிய தினம் முதல் கொண்டே இதை சாப்பிடத் தொடங்க வேண்டும்.

(17) வாய் விளக்கம், கரும் மைத்தை வெற்றிலை, மிளகு ஒவ்வொன்றும் 2½ உருப்படி, பொடியாய் அறைத்து மிளகு அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்து வேலை 1-க்கு ஒருமாத்திரை சாலை மாலை வெக்கிருடன் கொடுத்து வரவேண்டும்.

(18) தீவன ஜூரத்தைக் கண்டிக்கும் கபத்தை அதுத் தெடுக்கும்:-- சமுத்திரப்பச்சை, மிளகு, துளசி இலை, முன் றையும் அறைத்து ஒரு மாஷா அல்லது அதை விட கூடக்குறைந்த ளவிற்கு சோயாளியின் வயதிற்கும் ஸ்திதிக்கும் தக்கபடி காய்ச்சல் வரும்படியான சோர்த்திற்கு ஒரு மணி முன்னர் துலத்துடன் பருக வேண்டும்.

(19) பொதியை 3 அல்லது 4 மாஷா எடை ஜலத்தில் மிதானத் மிளபு அதில் ஓர் எதுமிச்சம் பழச்சாற்றை மிழ்த்து விடவும். அதில் உள்ள கண்ணாம்பு உண்டல் அடிசிற தங்கிப் போனவுடன் அதன் ஜலத்தை இடித்திக் கொள்ள வேண்டும். ஜூரம் வரக்கூடிய அறிகுறி தென்பட்டவுடன் அதை குடிக்கச் செய்யவும். ஒரு தடவை மருத்து போதா தென்றால் மூலமுறையும் அவ்வாறு கொடுக்கவும்.

(20) கபஜூரத்திற்கு:-- ஓமம் திரம் 3 இடித்ததைத்து தேனில் கலந்து கொடுத்துவரவும்.

(21) முறைக் காய்ச்சலுக்கு:-- சோற்றுக் கற்றுமையில் மேல் சோலை கீச்சி அதனை அடுப்பின் மேல் ஒரு பாத்திரத்தில் வைக்கவும். அப்பால் கொஞ்சம் போன்ற அபிஸியும் மஞ்சளும் பொடியாய் அறைத்து அதில் கலந்து, பாத்திரத்தை கீழே இறக்கி, அதை ஒரு துணியில் வைத்துப் மிழ்த்து, இரண்டொரு அவுன்ஸ் குடிக்கவும். 2, 3, தினத்தில் முறைக்காய்ச்சல் வந்து விடும்.

(22) முருக்கன் பட்டையின் சுவப்பு கிறமுன்ன பாகத்தை அப்புறப் படுத்தி விட்டு அதன் வெள்ளை கிறமுன்ன சதைவைய எடுத்து அதற்கு சம எடையில் கழற்சிக்காய் பருப்பைச் சேர்த் தறைத்து மிளகின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். வேலை 1-க்கு ஒருமாத்திரை கிராகாத்துடன் விழுங்கி விடவேண்டும். முறைக்காய்ச்சல் தீரும்.

(23) வேப்ப, மாத்தின் உட்பட்டை 5 தாம் ½ சேர் ஜலத்தில் கொடுக்க வைத்தல் வேண்டும். அதைவாசி ஜலம்

கண்டிப் போலாவுடன், 3, 4 சர்க்கரைத் துண்டுகள் எடுத்து, கெரூப்பில் காய்ச்சி, அந்த ஜலத்தில் போட்டு சூடாத்தவும். 5 தாம் அளவிற்கு ஜலம் மீதியாயிருக்கும்போது அனை கோயலிற்கு பருகக் கொடுக்கவும். இதன் பிரயோகம் 3 நாள் கொடுத்து வரவேண்டும்.

(24) கான்பட்ட ஜூரத்திற்கு :— போரித்த சிறை அனவலி விதை மாறா 6-உருகுசேகம், திப்பிலி ஆரிசி திப்பிலி வகைக்கு தோலா, 1 இடித்ததைத்து 3 1/2 தோலா வட்டையுள்ள வெவ்வுத்திச் சேர்த்து 3 தாம் வட்டையுள்ள மாத்நிலாசனிகத் தயாரித்து அறி காவியில் 1 மாத்திரை வெக்கிருடன் விழுங்க வேண்டும்.

(25) சகல விதமான காய்ச்சல் களுக்கு இரும்புக்கும் ஷர்பத் :— கிசிலி, கொரா இலை, தாமரை, வெள்ளி விதை, காகிலி விதை, சந்தனத் தூள், வகைக்கு ஒரு தோலா, அதிமூலம் 3 தாம். பெரிய கருவளி 3 உருப்படி, பேதாது சூது, திராம், கள்ளைக்கால் சேர் சர்க்கரையில் முறைப்படி ஷர்பத்து காய்ச்சித் கொள்ள வேண்டும்.

(26) காய்ச்சலுக்கு கஷாயம் :— போஸ்தா, கண்டாஸா, மீனாது இவற்றை இடித்து கஷாயம் காய்ச்சி குடிக்கவும்.

(27) மல்லி, ஆவரம் பூ, தனித்தனியே தோலா 1 1/2, கடலையின் உயிதோலா 3 இவைகளை இடித்ததைத்து 3 பங்கு களாகப் பிரித்து, அறிகாவியில் ஒரு பங்கு குழைந்ததை ஜலத்துடன் பருகவேண்டும்.

(28) கடுக்குக் காய்ச்சலுக்கு :— இஸ்ஸோல் விதை, கொட்டை வெடுத்த புளி, பனஞ்சர்க்கரை, வகைக்கு தோலா 3. முதலில் இஸ்ஸோல் விதையில் ஜலமிட்டு குடிக்க வைத்து விட்டு, அரை மணி தேரத்திலுப்பால், புளியை தண்ணீரின் கறைத்து அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரை கிட்டுக் கொடுக்கவும். ஆவரம் ஆரிசி காதம் புளிப்பிலைகாத மோருடன் அருகக் வேண்டும். 3 நாள் இப்படிச் செய்து வந்தால் காய்ச்சல் கிடும் போகும்.

(29) காட்டு எலிசி மீனாது இந்த இரண்டும் அவசியத்திற் சேர்ப் எடுத்து தண்ணீர் கிட்டைத்து குடித்துக் கொள்ளவும்.

(30) முறைக்காய்ச்சலைக் கண்டிக்கும் :— கிழிஞ்சல், மாகிச் காய்சம் எடையிற் கொண்டு, கொஞ்சம் துளசி இலைகளுடன் அரைக்கவும். அதாவது ஐய்னையும் முக்கால் மணி ரோம் அரைத்ததற்குப் பிறகுபன் கலவத்தில் போட்டு, சிலை மலச்செய்து 4 ஜாமம் கலையில் புடம் வைத்தெடுக்கவும். வேலை 1க்கு 2 சத்தி, பன்பம் கொடுக்கவும். பத்தியம்! வாயுவு பதார்த்தங்கள் தன்னுபடி. பால், சர்க்கரை, கோதுமை தூல்லி கொடுக்கலாம்.

(31) சித்த ஜூரத்திற்கு :— வசகாவியை யாதொரு பாத் திரத்தில் வைத்து அதன் மேல் பசும் பால் ஊற்றவும். வைத்த வண்டியுக்கு மேல், பால் 2, 3, அங்குலத்திற்கு இருதரல் வேண்டும். அப்பால் அதை ஓர் இரவும் பகலும் ஊறலாது விட்டு விடவும். ஆனால், மதுகாவியில், அதில் உள்ள பழைய பால் ஊற்றி விட்டு புதிய பால் அத்தளவிற்கு ஊற்றி விடவும். இந்த விதமாக, 21 நாள், செய்து வந்த பிறகு, 22 வது நாள், பெரியதோர் கட்ட செங்கலைக் கொண்டு வந்து, அதில் குவியின் வடிவத்திற்கு நிறுகுழி பென்று தோண்டி விடவும். குழியின் அடியில் அச் செங்கலைக் கனம் ஓர் அங்குலம் இருக்க வேண்டும். காவியை கட்டி மணலிற்கு ஊண்டுளாகச் செய்து அச்செங்கலின் குழியில் போட்டு விடவும். குழியாவின் மீது சேம்புக்குவளை கொண்டு களித்து அதன் ஓரங்களை முடிவிடவும். ஓரங்களை எதைக் கொண்டேனும் ஒட்டி அடைத்து விடவும். இனி அந்த செங்கலை அடுப்பிலேயே, அதனடியில், இலக்கை விதகுளரின் திழுட்டி எரிக்கவும். மாயிசத்தை வேக வைப்பதற்கொப்ப எரிக்க வேண்டும். ஆனால் 3 காழி வரையில் எரித்தல் முக்கியம். அதற்குப் பிறகு காவியை எடுத்து, ஓர் அரிசி எடை 4 சத்தி சர்க்கரையுடன் கோயலிற்குக் கொடுக்கவும். உஷணக் கோளாது ஏற்படும்கால், புளிக்காத தயிர் மோர் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

(32) முறைக் காய்ச்சலுக்கு :—

போஸ்தாவை 10 மீனகுடன் இடித்து, 10 குவளை ஜலத்தில் போட்டு காய்சியைப் போல் காய்ச்சவும். ஜலம் கண்டி 3 குவளை அளவிற்கு வந்தவுடன் அதை வடிக்கடி கோயலியின் தேகஸ்திதி கின் கிதானத்திற் சேர்ப் ஜூரம் கருமுன் பருகச் செய்யவும். மூன்றே வேலையில் ஆண்டவன் கிருபையால், ஜூரம் போய்விடும்.

(33) குளிர் ஜூரத்திற்கு:—

கால் மீளவை அழைத்து அதன் குரணத்தை மூன்று மாவா வடை இலத்துடன் காலியில் உட்கொள்ளவும்.

(34) குரத்து கிலாவை 2 மாவா, ஓமம் 3 மாவா, அரிசி திப்பிலி 2 மாவா, இலத்தில் 8 இராமம் மாத வைக்கவும். காலியில் அதன் தண்ணீரை இறுத்து சோயாவிற்குக் கொடுக்கவும்.

(35) பெருங்காயம் 3 மாவா, கல்லாப்பு 3 மாவா இந்த இரண்டையும் ஒரு சேர் தண்ணீரில் காய்ச்சி, 6 தோலா அளவிற்கு இலம் கண்டி வத்தவுடன் அதை எடுத்து சோயாவிற்குக் கொடுக்க வும். 2, 3 தினத்திற்குள் கொடிய ஜூரமாவிலும் சிவத்தியாய் விடும்.

(36) குளிர் ஜூரத்திற்கு:—

மீளகு, கல்ல வேசேரின் தலை இரண்டையும் ஒரே அளவிற்கு கொண்டு, மீளகின் அளவில் மாத்திரைகள் தயாரித்து, வேலை 1க்கு ஒரு மாத்திரையாக சாப்பிடவும்.

(37) கடுக்குச் ஜூரத்திற்கு அரியபாகம்:—

அரிசி 1 மாவா, மீளகாய் 2 மாவா வேலம் இறவை கரித்த சதிரின் சுத்து (உப்பு) மாவா 6 இந்த மூன்றையும் அழைத்து, ஒரு மாவா, அல்லது குறைந்த அளவில் ஜூரம் வருவதற்கு மூன் கொச்சிதுடன் பருகச் செய்யவும். பருகும்போது, மேற்கூற திசையில் முகத்தைத் திருப்பி கின்று கொண்டு பருக வேண்டும். ஆகாரத்திற்கும் பிறகே இந்த மருந்தை கொடுக்க வேண்டுமே வல்லது, அதற்கு மூன் கொடுக்க வரலாது. ஏனெனில், இதனால் ஓமட்டல் ஏற்படக் கூடும். ஒரே வேலை மருந்து போதுமானது. ஒருக்கால் அதிக அளவிய மேற்பட்டால், மூன்று நாள் வரையில் கொடுக்கலாம்.

(38) கடுக்கல் ஜூரத்திற்கு:—

பஞ்சா இலை, போந்தகா, இரண்டையும் இடித்துக் கொண்டு, இரண்டு கிராஸ்கரின் சிட்டிகைகளுள் எவ்வளவிற்குக் கொள்ளுமோ அல்லவெலிற்கு நின்னச் செய்யவும்.

(39) அரிசி 2 மாவா, சுத்தனம் சூற்குமப்பு, முறையே 7 மாவா, கவர்கைப் பட்டை 3 மாவா, மீளகாய் 3 மாவா வரவத்

தையும் இடித்தமைத்து, 2 சததி முதல், 3 சததி வரையில், வெந் தீயோடு கொடுக்கவும்.

(40) அரிதாரம் தோலா 1½, எருக்கல் பால் 1½ சேர் கல்ல வேசேர் சாறு 7½ தோலா கண்டிய மென்றில் அரிதாரம் வைத்து, அதன் மேல் எருக்கல் பால் அளவாவசியை ஊற்றி மட்பாத்திரத்தை சீமைமண் செய்து விடவும். அடுத்தபடியாக, மாரணவிற்கு ஒரு பன்னம் பறித்து அது கீமைம வறண்ட சாணத் தையோ அல்லது கிராட்டிகளைக் கொண்டோ அத்த மட்பாத்திரத்தை மடுவில் வைத்து 3 மூட்டி விடவும்.

பித்தவாத ஜூரத்திற்கு

குட்டி 16 மாவா, கிராம்பு 6, ஓமம் 2 மாவா இம்மூன்றையும் செவ்வனே தூன் செய்து, 3 பாகமாகக் கொள்ளவும். 2 ஓட்டாஞ் சுல்லிகளை கொடுப்பிற் கூட்டு கொஞ்சம் குடி இலத்தில் போட்டு அணைத்துக் கொள்ளவும். மூன்றில் ஒரு பாகம் கொண்ட ரூணத்தை இந்த இலத்துடன் உட்கொள்ளச் செய்யவும். 3 நாள் இவ்விதமாகவே கொடுத்துவா வேண்டும். ஆகாரம் கிச்சடி சாதம், உப்போ அல்லது, கெய்யோ அதில் சேர்க்கக் கூடாது. இது பித்தவாத ஜூரத்திற்கு கைகண்ட சிசிச்சையாகும்.

இடை விடாது வரும் காய்ச்சலுக்கு

புளி, ஆறுபுகாரா, தனித் தனியே 4 தோலா-3 மாவா—2 சததி, சீமை இலத்தைப் பழம், பெரிய கடிவளை முறையே முப் படை உருப்படி, இச்சாக்குகளை யாவும் ஒர் இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் வரவைத்து காலியில் பிசைத்து வடிக்கடி பருகவும்.

ஜூரத்தையும் கண்டிக்கக் கூடிய பேதி மருந்து

(1) புளி தோலா, 9-4½ மாவா, சீமை இலத்தைப் பழம் உருப்படி 20, பன்னா 7½ மாவா, ஒர் இரவு முழுவதும் இலத்தில் வரவைத்து, காலியில் சுத்தப்படுத்தி, மேனா தோலா 6, மாவா 3 கொண்டைக்காய் பருப்பு 3 தோலா, 1½ மாவா என, அதில் அழைத் துக் கலந்து அத்துடன் பாதாம் எண்ணெய் 3 மாவா, 6 சத்தியையும் ஊற்றி எல்லாம் நன்றாகக் கலக்கி உட்கொள்ள வேண்டும்.

அழுத்த ரூடல் உடையவர்கள், ரூர்த்து நிலாவரை 1 தோலா, 6 மாஷா, 6 ரத்தி எடை ஜலத்தில் காய்ச்சி மேற் சொல்லிய மருந்தில் கலந்து கொள்ளலாம்.

(2) மாசிபத்திரி ஷர்பத். இதை கப சம்பந்தமான ஜூரத்தில் கிஞ்சுரபிஷாடன் உபயோகித்தல் வேண்டும்.—

மாசி பத்திரி தோலா 1, அல்லது 12 மாஷா, அசும்தா ஒமம் 10½ மாஷா, பெரிய லவங்கைப் பட்டை 7 மாஷா (இடித்து) ஒருடம்ளர் ஜலத்தில் கொதிக்க வைக்கவும். ஜலம் அரைபாகம் கண்டிப்போனதும் அதை இறக்கி வடிக்கட்டி, 22 தோலா 1½ மாஷா வெள்ளை சர்க்கரையில் பசு காய்ச்சிக் கொள்ள வேண்டும். இங் வொரு காலையிலும் ஒரு தோலா, 6 மாஷா 6 ரத்தி ஷர்பத், உடன் கிஞ்சுரபிஷன் 7 காண்டி எடை தண்ணீரில் கலைத்துக் குடிக்கவும்.

(3) கபசம்பந்த கரத்திற்கு பேதமருந்து :—

ரூர்த்து நிலாவரை, ஒரு தோலா, 6 மாஷா, 6 ரத்தி, பண்பாபஜ் ஷே (இடித்து) காசினி விதை (இடித்து) சோம்பு, அசும்தா ஒமம், வகைக்கு 7½ மாஷா ஐர்ஷக், 11 மாஷா, 2 ரத்தி பெரிய ஏறுவளி உருப்படி 3 எல்லாவற்றையும் ஒரு டம்ளர் ஜலத்தில் கொதிக்க வைத்து ½ பாகம் ஜலம் கண்டிப்போனதுடன், அதை சுத்தம்செய்து கிஞ்சுரபிஷன், வெள்ளை சர்க்கரை கொன்னைக்காய் பருப்பு வகைக்கு தோலா 3 மாஷா 1½ பாதம் எண்ணெய் 3 மாஷா 6 ரத்தி, அதில் சேர்த்து இளஞ் ரூட்டின் போதே பருகவும்.

(4) ரோஜா மோட்டு 2 தோலா 11 மாஷா ஜடாமாசி 7 மாஷா காசினி விதை ஒரு தோலா 5½ மாஷா மஸ்தகி 3 மாஷா 6 ரத்தி இவைகளை அரைத்து சிறு பில்லிகளாகச் செய்து உட் கொள்ளவும்.

(5) காலுஸபான், குப்பணபஷா, இவைகளுடன் வெள்ளை சர்க்கரையைச் சேர்த்து ஷர்பத் காய்ச்சிக் கொண்டு காலிதோலும் ஒரு காண்டி ஷர்பத்தை தண்ணீரில் போட்டு ஸபஜா விதையுடன் குடித்துவர, விடாமலே அல்லது முறை காய்ச்சலாகலோ வரக் கூடிய பித்த ஜூரத்திற்கு குணமளிக்கும்.

(6) அரைக்காய், கத்திரவரி, வெள்ளரிவிதைபருப்பு வகைக்கு ஒரு தோலா 5½ மாஷா ரோஜா மோட்டு, அதிமதுரம் ஒங்கிதுப்பு

வகைக்கு 10½ மாஷா, கருவம்பிசின், வெள்ளைசந்தனம், கிலாஸ்தா, வகைக்கு 7 மாஷா சோம்பு, கத்திரவரி வகைக்கு 3½ மாஷா, இந்த சர்க்கரையெல்லாம் இடித்துரைத்து இளநீரால் விதை ஊறவைத்த ஜலத்தில் பிசைத்து, சிறு பில்லிகளாகச் செய்து கொண்டு, காலி தோலம் 3 மாஷா, 6 ரத்தி எடையுள்ள பில்லிகளை அரை குவளை அளவு கொண்டுள்ள பருப்புக் கிரைச் சாற்றில் வெள்ளைச் சர்க்கரை கலக்க பருகவேண்டும்.

காய்ச்சலுக்கு பற்று.

மல்லி இரண்டினுமி கோம் தண்ணீரில் ஊறவைத் தெடுத்து, செவ்வனை அரைத்துச் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு சம எடை சீமை அழுவளி விதையும் அரைத்து, இரண்டையும் துள்ளுக்கக் கலந்து கொண்டு, கெற்றியின்மேல் பற்றுப் போடவும். ஜூரத்தைக் கண்டிக்கும்.

நாப்புச் சிலந்திக்கு சிகிச்சை

(1) சிரங்கு உடைத்து அதன் உள்ளிருந்து தூலைப்போல் ஒன்று வெளியாவதற்குப் பெயர் காம்புசின்தி. முதலில் துர்க்கிரை பேதிமருத்தின் மூலமாய் வெளிப்படுத்தி விடவேண்டும். சிலந்தி வயச் சுற்றி கூடுமாயின் நீர் அட்டைகளைக் கொண்டும் துர்க்கிரை கூடுமான வகையில் வெளிப் படுத்தவும். ஜலத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி கொதிக்க வைத்த வெர்க்கிரைக் கொண்டு சுத்தப்படுத்தி வந்தால் சிரங்குமர்ப்பு இளஞுவாய் வெளிவந்துவிடும். காம்பு முழு வதும் வெளிவரும்படியாக மூலம்சிக்க வேண்டும்.

(2) முதலில் சிகித்திக்கும் அதனைச் சர்க்கை வீச்சத்திற்கும் இளஞ் ரூடான எண்ணெய்த் தடவி எருக்கன் தூலைகளைக் கொண்டு நுழைத்தல் கொடுக்கவும். பிறகு அதே ரூடான தூலைகளை வீக்கத்தின் மேல் வைத்துக் கட்டிவிட வேண்டும்.

(3) மூக்கொட்டை வேரை அதன் இலைச்சாற்றில் அரைத்து சிகித்தியின் பூசி கட்டிவைக்கவும். சிலர், அதில்கொஞ்சம் பேரோற கக்ககாய் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார்கள்.

(4) சேர்வாளத்தை அரைத்து பூசவும். அல்லது கருஞ் சேர் கத்தை தயிரில் வேகவைத்து மேலே பற்றுப் போடலாம்.

(5) காக்ரூப் பூச்சியை உலர்த்தி கோவாளிக்கு கிள்ளலாகத் தரக் கிடைத்தப் புண் சிவகிரம் ஆதரித்தல் எனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(6) 1 தாம் மெய் கோவாய்ப்பூதக் கைதலத்தில் கலந்துகொண்டு வரவும். 3 நாள் அல்லவாறு கொடுத்தமருதம் காலத்தில் கிடை, கழைப்பதாச மருகாமே அகிலம் கொடுத்து மருதம் அளவிடவாரும்.

(7) வெள்ளையம், வெள்ளைப்பூண்டு தலித்தனியே ஒருபால் சவுக்காசத் துண்டு கிறிய்கோர் அளவு சேய்க்கொட்டை மூன்று கிணு 1 தாம். எல்லாம் தூக்கத்தையத்து வகையாகத் தட்டி ஒட்டிவது ஒர் பகல் கிணத்தினால் கட்டி கவகம் மூன்றுகளில் அறிக்கள்ள கரம்பு வெளியாகி விடும்.

(8) வெள்ளைக் குழம்பினால் 1 தாம் சவுக்காசம் 2 தாம் அலகி 15 மாஷா எல்லாம் ஒன்றாக அமைத்து, 3 தாம் என்னென்ன கொளில் காய்த்தி கலிம்மையப் போல் செய்து கொள்ளவேண்டும். அக்கலிம்மைய வெற்றிலையின் தடவி காவை மாலை மேலேவைத்துக் கட்டவும். ஒவ்வொரு வெள்ளை நூல் கலிம்மைய புதிதாகவே தடவிவர வேண்டும்.

(9) குழம்பைக் கிளரின் வேகா அளவத்து கிணத்தினால் வைத்துக் கட்டிவரவும்.

(10) கட்டுப்பெரு மச்சம் 2 தாம் பளஞ்சாக்கலா 2 தாம் இரண்டையும் அமைத்து கட்டு வைக்கதலின் அளவிக்கு மாத் திலாகன் செய்து கிளகரி ஒரு மாத் திலா சாப்பிட வேரவும்.

(11) கலிமேம்பு தீலை 1—ஒவ்வொரு காலும் விழுந்தி விட்டவும்.

(12) கலிமேம்பு மூதல் மாத் 1 தாம், மதுரை 1 தாம், மூன்று நாள் ஒரு கிணகால் சாப்பிடலாம், அமைதியே மேலுக்கும் ஆரவும்.

(13) மஞ்சள்கொகாரத்தோல், தாண்டிக்காய்த்தோல், மெல் கிண்காய், கங்கு, கலிமேல், எல்லாம் சம எகையிலெடுத்தவாத்து, கிணத்தோறும் இரண்டு தாம் எகைய, 5 திரம், தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம். மெல், பால் அதிகம் உபயோகிக்கவேண்டும்.

(14) கஞ்சத்தம் மரவு 10½ மாஷா பெருங்காயம் 4 மாஷா, இரண்டையும் தாம விட்டுவெகைத்து கிணத்தி மேல் பூசினிடவும். மூன்று முதலில் பூச்சு விடத்தின் கொஞ்சம் வெளையத்தலி மருக்கன் தலையையக்கொண்டு ஒத்தடம் கொடுத்த கிண்கோ பூசுதல் முக்கியமாகும்.

(15) சவுக்காசம் 2 மாஷா—கெவலாய்ச்சாது 4 மாஷா—வா தோரு பதத்திரத்தில் போட்டுவாய்ச்சலம், கெட்டியான பதத்திர்து வந்தவுடன் கத்திக்கலாமகொண்டு வந்து அதை ஒரு மாகம் பதத்து கன்னிதுள்ள சத்தகலாவகை, அதில் கல்தாப்பு கேல் வாயம் இத்த திரண்டையும் கலக்க ஒரு தோலா எகைய தாம் செய்து கிதம்பி விட்டபின்னர் அதனை மேலேயை செய்து உலர்த்தி, கலிமேயலில் வைத்து கட்டவும். கட்டுப்பெருதாம் அதை கடுத்த. போட்ட மருக்கை வெளிக்கெடுத்த கிணத்திக்கு மேல் பூசினிடவும். 3 காலில் குணம் அடைப்பெறும்.

(16) சவுக்காசம், தேன் மெழுகு, என்னென்னெய் இம் மூன்றையும் உதக்கி, சலிம்பாகச்செய்து கொண்டு கிணத்தின் மேல் பூசினிடவும்.

(17) கிண்கி கண்ட மூதல் 1½ திரம் பெருங்காயம் தோலா 1½ கொடுத்த வந்து அதனுடன் வெள்ளை மூக்கொட்டைகோர் தன்னார் விட்டமைத்து கிண்கிதின் மேல் பூசினிடவும்.

குஷ்டம்

(1) இத்த கோவை ஆரம்பநிலையினையே போக்கிவிட. மூதற்சிக்கலெக்டிம். முற்றி விட்டாற் கிருவது குஷ்டம். ஆரம்ப நிலையலின் அடிக்கடி பேதி மருக்கை சாப்பிட்டு வரவேண்டும் மாதத்தோறும் பேதிக்கு சாப்பிடவேண்டும். கண்விழித்தலும், துக்கப்படுவதும் கூடாது. ஆட்டுப்பால் எவ்வளவேண்டுமாளிலும் குடிக்கலாம். அரிதா பம்பல் 40 நாள் கொடுத்துவந்தால் குஷ்ட கோவாளிக்கு குணமேற்படும்.

அரிதாக்கை பண்பாக்கும் விதம் :—

அரிதாசம் தாம் 1—கழம்பினால், படிக்காசம், கலக்க 2 தாம் அமைவாடி கழம்பிக்கலின் மருப்பை தூடித்து, புதியதோர்

மண்பாத்திரத்தில் (கலயத்தில்) வைக்கவும். அதன் மீது ஒரு தாம் எடையுள்ள படிக்காத்துளை தூவி பாத்திரத்தை சீலை மண் செய்து 7 சேர் உலர்த்த காணத்தில் புடம் வைக்கவும். தி ஆரிப் போனதும் அதைப் பிரித்தெடுத்து 3 ரத்தி அளவிற்கு வெற்றிலையுடன் அனுதினமும் கொடுத்து வந்தால் ஐம்பது தினத்தில் சோய் அம்மப்போகும்.

(2) அரிதாரம் ஒரு தாம் புட்டையின் வெள்ளைக் கருவுடன் கலந்து உருட்டி, மண்கலயத்தில் வைத்து அதன் மேல் மற்றொரு கலயத்தை கவிழ்த்து சீலைமண் செய்து, 4 ஜாமம் புடம் வைத்தெடுக்க வேண்டும்.

(3) வேப்பம்பூ, இலை, சாய், பட்டைவேர் இவை யாவும் கான்பட்டதோர் வேப்பமாத்நிலிருந்து கொண்டு வந்து, ஒவ்வொன்றையும் 3 சேர் அளவிலெடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர், மிளகு, மஞ்சள் கடுக்காய்த்தோல் தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய் சார் போக் அரிசி, வகைக்கு 3 சேர், எல்லாம் ஒன்றாக இடித்து தூளாக்கி 4 மாஷா முதல் 6 மாஷா வரையில் கொடுக்கவும். இத்துடன் மஞ்சிட்டி கஷாயமும் 4 மாதம் வரையில் கொடுத்து வரவும். பத்தியம்:—மாமிசம், உப்பு உஷணபதார்த்தங்கள் கூடா.

(4) ரசம் 2 திரம், எலி 1 திரம், பாதாம்பிசின் 6 திரம், ரோவல் சீனி 3 திரம், கருவேலம் பிசின் 2 திரம் ரசத்தை முறைப் படி பஸ்பமாக்கிக்கொண்டு எல்லா சாக்குகளையும் எதுமிச் சம் சாற்றில் அறைக்கவும். அப்பால் அதை 7—தான்றிக்காய் சாற்றில் சேர்த்து மிளகின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்து காலி, மாலை ஒவ்வொரு மாத்திரை கொடுத்து வரவும். புளிப்பு தன்னுபடி.

(5) கடலை உமி $1\frac{1}{2}$ சேர் ஜலத்தில் ஊறவைத்து காலையில் அதை பிசைத்து வடிக்கட்டி, ஒரு மாதம் 19 நாள் வரையில் இதே விதமாக குடித்துவரவும். அரிசி, பால், தயிர் வாற்கோதுமை முதலிய வெண்ணிறமுள்ள பதார்த்தங்களையும் புளிப்பையும் தவிர்க்கவும். மாமிசம், வெல்லம், சர்க்கரை இவைகளில் கிடைக்கக்கூடியதை சாப்பிடலாம். சோய் மீதியாயிருப்பதாகத் தெரிந்தால் இன்னும் சிறிது காலம் தொடர்ந்து உபயோகிக்க வேண்டும்.

(6) வேப்ப மாத்நிலிருந்து சில சமயங்களில் தண்ணீர்சை யால் வடியும் கீரை எடுத்துச் சோயானிலின் தேகமென்கும் தடவி வரவும்.

(7) குளஞ்சி சாற்றை உபயோகிப்பதும் குஷ்டரோகத்தை விவர்த்திக்கும்.

(8) மருதோன்றிக்கை 3 மிஸ்கால் இரவில் தண்ணீரில் வைதவைத்து காலையில் அதை பிசைத்து, கொஞ்சம் சர்க்கரை கலந்து பருக வேண்டும். இதே விதமாக, 40 நாள் பருகி வந்தால் குணமடைவதாம்.

(9) வாகை இலை ஒரு தாம், மிளகு 2 மாஷா, தண்ணீர் விட்டதைத்து 40 நாள் வரையில் அது தினமும் பருக வேண்டும்.

(10) அடியிற் காண்ட பாகம் குஷ்டரோகத்திற்காக பண்டை கால வைத்திய சிபுஸார்களால் கையாடப்பட்டுள்ளதா— கடுக்காய், சித்திரை மூலம் வகைக்கு 10 திரம், மிளகு 5 திரம், பிச்சஞ்சு 2½ திரம் யாவற்றையும் இடித்துத் தவிர்த்தும், பசு பெய்திற் கலந்து அதற்கு இருபங்குள்ள தேலில் சேர்த்து லேகியம் தயாரித்துக் கொள்ளவும். ஒரு மிஸ்கால் முதல் 2 மிஸ்கால் வரையில் கொடுக்கவும்.

(11) தொராஜினை, அழகாசன் சிறுங்கு பிரம் தண்டு, மஞ்சட் கடுக்காய்த் தோல் எல்லாம் சம எடை சுமார் 2 தொலா வரையில் எடுத்து ஓர் இரவு முழுவதும் தண்ணீரில் ஊறவைத்து அதிகாலையில் அதை பிசைத்து குடிக்கவும்.

(12) கருவேலம் பட்டை 2 திரம் எடையில் இடித்து தண்ணீரில் ஊற வைத்து, காலையில் பிழிந்து, வடிக்கட்டி, சில நாட்கள் வரையில் தொடர்ந்தாற்போல் பருகி வரவேண்டும்.

(13) குஷ்டரோகிகள், சோக ஆரம்பத்தில், அயிலி, போஸ்தகா, இந்த இரண்டையும் தின்னுவதற்கிலிருந்து விலகி வரவேண்டும். சோய் குறைத்து கொண்டே வந்ததாக அதை சுவணித்து கந்தவர், தம் அனுபவத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

(14) குஷ்டம், வெங்குஷ்டம் இரண்டிற்கு அரிசு சிவச்சை வேப்பம் இலை அதற்கு சம எடையில் என்னு கொஞ்சம் இச்சுப்பு,

இந்த மூன்று சரக்குகளின் எடைக்கு பழைய பனை வெல்லம் எல்லாம் இடித்தறைத்து தினசரி 5 திரம் சாப்பிட்டு வரவும்.

சர்மத்தின்மேல் படரும் வெண்சிட்டடை, வெண்குஷ்டம்

(1) வெண்சிட்டடை சர்மத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்குமாயின் மேல் பூச்சியூல் அனை பெரும்பாலும் செளர்யமப்படுத்தி விடலாம். சர்மத்தின் கீழ் இரத்தத்தில் சம்பந்தப்பட்டுப்போனாயின் உன் மருத்து சாப்பிட்டாலொழிய தீராவது கஷ்டம்.

வெண் குஷ்டம், சிட்டை முதலியவைகளுக்கு:— கார்போக் அரிசி சேர்த்து உப்பு 3 சேர், இடித்தறைத்து ஒரு பிடி சாப்பிட்டு வரவும், கடலை ரொட்டியைத் தவிர வேறெந்த ஆகாரமும் கூடாது.

(2) அத்திப்பட்டை, லாஸா புஷ்பத்தின் விதை இரண்டும் சம எடை இடித்தறைத்து, வஸ்திரகாயஞ் செய்து 40 நாள் ஜலத்தால் புசித்து வரவேண்டும்.

(3) அசம்தா நுமம் முதல் 8 நாள் 4 மாஷா, அப்பறம் சூய் கொரு மாஷா தினசரி அதிகரித்துக் கொண்டே போகவும். ஜலத்தால் உட்கொள்ள வேண்டும். பின்னர் கணக்கு 8 மாஷாவிற்கு எட்டிம் வரையில் இந்த விதமாகவே புசித்து வரவேண்டும். 2 மாசம் வரையிலும் குணம் தெரியவில்லையானால் மூன்றுவது மாதத்தில் வாய் விளக்கம் ஒரு மாஷா மேலதிகமாகச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். புளிப்பு, வாயு பாதாந்தரங்கள், இவைகளை மீளக்க வேண்டும். கொண்டக் கடலை, ரொட்டி, அல்லது கடலையை வறுத்து அனை ஆகாரமாகக் கொண்டால் மேலாகுமென்றும் வரையப்பட்டிருக்கிறது.

(4) கார்போக் அரிசி, ஊசித்தகா விதை, பூங்காவி, யாவும் சமஎடை இடித்தறைத்து இஞ்சிசாற்றில் மாத்நிறைகளாக உருட்டி இரண்டு வாரம் வரையில் அவைகளை ஜலத்தில் கறைத்து தேகமெங்கும் பூசி வந்தால் எல்ல குணஞ்செய்யும், தேய்த்த பின்பு வெளில் காய வேண்டும்.

(5) அசம்தா நுமம் 3 பாகம் காவி 1 பாகம் இடித்தறைத்து 3 மாஷா சாப்பிட்டு வரவும். உயிர்வலாததும் பெய்சம்பந்தப்பட்டதனுமான ரொட்டி புசித்தல் வேண்டும்.

(6) முருக்கன் விதை 3 தாம், கருக 3 மாஷா, கத்தகாம்பு தேலா 1 யாவற்றை தாளாக்கிக் கொண்டு பிறகு எலுமிச்சம்

காற்றில் அறைத்து சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி மேலுக்கு தடவி வரவேண்டும்.

(7) கருஞ் சேகத்தில் காடி விட்டறைத்து தடவவும்.

(8) வாலுளுவை, பசுவின் மூத்திரத்தில் 21 நாள் வற வைத்து பிறகு அதன் எண்ணெயை யெடுத்து, சிட்டைகளின் மேல் தடவி வரவேண்டும்.

(9) மச்சாரத்தை தேனில் கலந்து மேலுக்குப் பூசவும்.

(10) கருஞ்சேகம் திரம் 9 கார்போக் அரிசி திரம் 3 ணமத்தை விதை திரம் 1½ எருக்கன் இலைகள் 8 எல்லாம் ஒன்றாக அறைத்து வெண்குஷ்டவடுக்களின் மேல் பூசவும்.

(11) ஆட்டின் பிருக்கத்தை துண்டு துண்டாக்கி கத்தகத்தை அதன் மேல் தூவி சட்டியில் வைத்து வறுக்கவும். அப்போது அதிலிருந்து வெளியாகும் கசியை யெடுத்து அவசியமான விடங்குகில் தடவி வரவும்.

(12) தோல் உரித்த புளியங்கொட்டை, 'கார்போக் அரிசி, இந்த இரண்டையும் ஒரே எடையில்லெடுத்து பட்டுபோல் அமைத்து மாக்குச்சியைக் கொண்டு வடுக்களின் மேல் தடவி வரவும். 8 நாள் தொடர்ந்தாற்போல் பூசிவரவேண்டும்.

(13) காட்டு அத்தியின்வோர், கார்போக் அரிசி, வெங்காயம் புதியபுளி எல்லாம் ஜலத்திலறைத்து காற்பதுளாவரையில் மேலே பூசவும்.

(14) அரிதாசம், சச்சிகாரம், வகைக்கு ½ தாம் இரண்டையும் அறைத்து மூத்திரத்தில் கலந்து பூசவும்.

(15) கெல்லிக்காய் கத்தகம், ஊசித்தகாவிதை, கத்தகம், சம எடை அறைத்துக்கொண்டு காடியில் கலந்து மேலுக்கு உபயோகிக்கவும்.

(16) மஞ்சிட்டி, சித்திரா மூலம், காவி எல்லாம் சமஎடை அறைத்து வஸ்திரகாயஞ் செய்தபின்னர், காடியில் கலந்து மேலுக்கு உபயோகித்தல் வேண்டும்.

(17) முள்ளங்கிவிதை வெண்சித்திரா மூலம், சித்திரத்தை கெல்லிக்காய் எல்லாம் ஒரே எடையில் கொண்டு காடியிலறைத்து பூசிவரவும்.

(18) கண்ணாம்பூ, சச்சிகாரம் சுமளாடயி லறைத்து செட்டைகளின் மேல் பூசிவரவும். பூச்சுகாய்ந்து போனவுடன் அதை வந்திரத்தால் தேய்த்து விட்டு பீண்டும் அதன்மேல் அய்வாரே பூசியா, அத்தவிடத்தில் உள்ள சர்மமகிணி, கறுப்பானவாதோன் தும். அதன்மேல் என்னென்னெய் தேய்க்க முன்னிருந்த அசல் தோலின் சீரம் வந்து விடும். இது “சஞ்ரபாத் ஆவர” என்ற வைத்திய நூலில் வரையப்பட்டுள்ள அரிவதோர் சிகிச்சையாகும்.

(19) காத்துப் பூச்சியை ஓர் பாக்திரத்திலாடந்து ஒரு மாதம் வரையில் வைத்துவிடவும். இதற்கிட அது காய்ந்து நூலாகி விடும். அத்துடன் வெடுத்து முக்கியமான விடங்களில் தடவி வர வேண்டும்.

(20) கருத்தேனை வடித்து, அதனை காயவைத்து, காயி லறைத்து மேலுக்குத் தடவி வரவும்.

(21) புலையிலியின் விதையை வெடுத்து தேய்த்துவத்தால் கிட கருக்கிடையே வெண்ணிறம் மாறிவிடும்.

(22) பழுத்த எருக்கன் தழைகளை கடுகெண்ணெயில் எரித்து முந்தாசிற்கையும் அத்துடன் சேர்த்தறைத்து பூசிவரவும்.

(23) வரகவிதைகளின் எண்ணெயை வெடுத்து பூசி வரவும்.

(24) ‘பாஸ்’ என்ற ரோகம் கறுப்பு அலைது வெள்ளை நிற முள்ள படைகளைக்கொண்டுள்ளது. அத்தகையபடைகளின் உணர்ச்சிப்படிபடியாய் சர்மத்திலிருந்து சதைக்கு எட்டி அங்கிருந்து எழும்புகள் வரையில் எட்டிவிடுகிறது. அப்போது அதை வளி வால் குத்திப்பார்த்தபோதிலும் இரத்தத்திற்குப் பதிலாக ஹீர் வெளியாகும். பாஸ் ரோகத்திற்குரிய பல்வேறு முறைகள் மேலேயும் சொல்லப்பட்டுப் போயின. மேற்கொண்டு இதனடியிலும் வரையப் படுகின்றன.

கற்பூரம் தோலா 9, மாஷா 4½ அறைத்த மருதோன்றி, ஹைதான் எண்ணெய் அல்லது வெய், வகைக்கு ஒருதோலா 6 மாஷா, 6 ரத்தி, ஆட்டுக்கிட்னியை உறுக்கி கொழுப்பு தோலா 3, மாஷா 1½ எல்லாவற்றையும் கைவால் பிசைத்து இரவில் தடவ வேண்டிய சிட்டுகளில் தடவவும். ஆனால் கக்கக்குழி, தொண்டலின்

சத்துகள். காதுகளுக்குப்பின் இந்த சிட்டுகளில் மருத்து படலா காது. காலையில் தேய்த்து குவிக்கவும்.

(25) பாஸ் கோவாளி ஒருவருஷத்திய காலியை ரெத்தாங் கோஞ்சமாய்த் தின்று வத்தால் குணமடையலாம்.

(26) கொடிக்கன்னிப்பாலை வெள்ளை வடுக்களின் மேல் தேய்க்க கீக்கம் ஏற்பட்டு வெண்ணை மாறிவிடும்.

(27) தினத்தோதும் எண்ணி நூறு வேப்பம் இலைகளை அறைத்து கோவாளிக்கு தின்னக் கொடுத்த அத்த விட சதையும் அதே இலைப்பிசைத்த தண்ணீரில் கழுவிவரவும்.

(28) காப்போக் அரிசி தோலா 1½ அறைத்துத் தின்னவேண்டும். அத்துடன் மஞ்சிட்டி, வெண்டித்திரை மூலம், வெங்காயம், இவைகளை அறைத்து திராட்சைக் காய்ச்சல்கள்து மேலுக்குப் பூசவேண்டும்.

(29) வலித்தகாலிதை, வெலிக்காய்த் தண்ணீரில் இடித்து வறையக்கவும். காலையில் அதை அறைத்து பூசவேண்டிய விடங்களில் பூசவும். மாதத்தில் ஒரு வாரம் இடையில் ஒருகான்விட்டு பூசிவரவும்.

(30) பல்லியொன்றை ஆட்டிமாயிசத்துடன் வேகவைத்து வெத்தவுடன் அதை எடுத்து எறித்துவிட்டு, மாலிசக்குழம்பில் சேர்த்தவேண்டிய மாலாலைச் சேர்த்துச் சமைத்து வியாதியல் தருக்குத் தின்னக் கொடுக்கவும். ஆனால் வியாதியல்தருக்கு பள்ளி லின், தகவல் செய்யலாகாது.

(31) சிலர் கிச்சடி சாதத்தில் பல்லிப்போட்டுச் சமைத்து, சமையல் ஆனதும் அதை கீக்கவிட்டு கிச்சடி தின்னச் செய்கிறார்கள். கருமகச் சொல்லில் அகோப் பல்லியின் கிச்சையைப்பற்றி கிரகத்தித்துச் சொல்லுவார்கள். வள்ள இறைவன் பேரனுமானவன்

(32) ரேக்குத்தானகம் ஒருபாகம் காப்போகரிசி 2 பாகம் இந்த இரண்டையும் தனித்தனியே கர்மாவைப் போல்மெல்லியதாய் அறைத்து மறுபடி ஆற்றின் கத்த ஐந்தில் 4 லாமம் அறைத்து சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொன்ன வேண்டும். அகதியமான சமயம், தண்ணீரில் கலந்து, பூசவேண்டிய படை

களின் மேல் பூசிவர, எத்தகைய படையும் கீங்கிவிடும் எனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(33) கேர்வாளம், கடுகு இந்த இரண்டையும் அறைத்து அனுதினமும் வெண்குஷ்டத்திற்கு பூசிவரவும்.

(34) பொரித்த வெங்காரம், முன்னங்கி விதை இந்த இரண்டையும் ஒரே அளவிலெடுத்து எலுமிச்சம் சாற்றில் அறைத்து தேய்க்கவும் (காடியிலும் அறைக்கலாம்)

(35) பனிக்காலத்தில் வைக்கோல் முதலிய பசுமைகளின் மேல் பெய்யும் பனித்துளிகளின் ஜலத்தை வெண் கிடடைகளின் மீது தேய்க்கவும். கடலைத் தழைகளின் மீதுள்ள அத்தகைய ஜலமாயிருப்பின் இன்னமும் விசேஷமானது.

(36) முள்ளங்கி விதை புளிப்புத் தயிரில் அறைத்து பூசி வரவும்.

வண்டுகடி அறைகடி பற்று.

(1) இதுவும் சர்ம கோயைச் சேர்த்ததே, இது 'தாத்' என வழங்கப்படுகிறது. இரத்தத்தில் சுவர்த்தால் இதுவும் மேல் மருந்தைக் கொண்டு கீங்குவது கஷ்டம். இதற்கான சிகிச்சைகள் பின்வருமாறு :—

வெள்ளைக் குங்குலியம், கந்தகம், வெங்காரம், ஓமம் குராசானி, இடித்தறைத்து தண்ணீருடன் சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி கொள்ளவும். படையை சுரண்டி விட்டு இதை மேலுக்குத் தடவ வேண்டும்.

(2) முத்தர் சிங்கு, கந்தகம், கமச்சாரம், வெங்காரம், மாசிக்காய், மிளகு, கத்தகாம்பு, அபினி ஆவாரம் பிசின் எல்லாம் ஒன்றாக இடித்தறைத்து மாத்திரைகள் செய்து கொள்க. எலுமிச்சம் சாற்றை விட்டு அதில் அறைத்து மேலுக்குத் தடவ வேண்டும்.

(3) மாசிக்காய் ஒரு பாகம், சுண்ணாம்பு 1½ பாகம். மாசிக் கோயை பொடி செய்து சுண்ணாம்பில் கலந்து கொஞ்சம் தண்ணீரில் கலக்கி விடவும். அப்பால் அதன் மேலுள்ள ஜலத்தை இடித்து படையை சுரண்டி விட்டு அதன் மேல் பூசி வரவேண்டும்.

(4) எருக்கன் பூ, ஊசித்தகா விதை இடித்தறைத்து தயிரில் கலந்து பூசவும். தயிர் புளிப்பாயிருக்க வேண்டும். புளிப்புத் தயிர் இல்லையானால் தண்ணீர் போதுமானது.

(5) புளியங் கொட்டை எலுமிச்சம் சாற்றிலறைத்து பூசவும்.

(6) உலர்த்த பன்றி மொத்தை எலுமிச்சம் சாற்றிலறைத்து பூசவும்.

(7) பத்தருசு புஷ்பச் செடியின் தழைகளை உப்பிலறைத்து மேலுக்குத் தடவவும்.

(8) மஞ்சளை எரித்து, அப்பால் அதை வெற்றிலை, சுண்ணாம்புடன் அறைத்துக் கொள்ளவும். படையை செறித்து விட்டு அதன் மேல் அதை பூசவேண்டும்.

(9) எலுமிச்சம் சாறு தனியே, ஒரு காளுக்கு இருமுறை படையை என்றும் சொரித்து விட்டு தடவி வரலாம்.

(10) சிவப்பு சந்தனம், வெங்காரம், அபினி இவை சம எடை, எலுமிச்சம் பழச்சாற்றிலறைத்து தடியுள்ள இடத்திற்கு மேல் பூசவும். பூசமுன் அந்த இடத்தை சுரகாப்பான பொருளைக் கொண்டு தேய்த்து விட்ட பின்னர் பூசவேண்டும். அப்பால் வெயில் காய்வது சிறந்தமுறை. இதை இரண்டு முறை உபயோகித் தாலே போதுமானது, படை உதிர்ந்து போகும் வரையில் இந்த பூச்சு அத்தவிடத்தை விடாது.

(11) ஒவ்வொரு இடத்தில் உள்ள படைகளையும் கிவர்த்திக் கும்:-செல்லிக்காய், எருக்கன் பூ, ஊசித்தகா விதை, இம்மூன்றையும் அறைத்து புளிப்புத் தயிரில் கலந்து பூசவும், ஆனால் அண்டை களின் மீது மாத்திரம் பூசவேண்டாம். எருக்கன் பூ கிடைக்கா விடில் அதன் இலைகளே போதுமானவை.

(12) கந்தகம், தருசு, செல்லிக்காய், ஊசித்தகா விதை, கடலை வறுத்த மணல், எல்லாம் சமஎடையிற் கொண்டு அறைக் கும். பின்னர், வஸ்திரகாயஞ் செய்து தண்ணீரில் கலந்து காள் 1க்கு 3 தடவை பூசி வெயில் காய வேண்டும்.

(13) கன்னி (திருக்கள்ளி கூடாது) யை இடித்து, அதன் சாற்றை எடுத்து அதில், ஊசித்தகா விதையை அறைத்துச்

சேர்த்து, 3 நாள் அப்படியே வைத்து விட வேண்டும். அப்பால் படை தடிப்புள்ள இடத்தை சுண்டி விட்டு இந்த மருத்தை அதன் மேல் பூசி வெயில் காயவேண்டும்.

(14) ஊசித்தகா விதையை அறைத்து தயிர் சக்கையிற் சேர்த்து குறித்த இடத்தை சோரித்து விட்டு பூசிடவும்.

(15) ஊசித்தகா விதை தண்ணீரில் ஊறவைக்கவும், அப்பால் ஏற்கனவே, கெல்லிக்காய் ஊறவைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீரை அந்த விதைகளில் ஊற்றி நன்றாய் அறைத்து தடவும்.

(16) வச்சிரத்தை உறுக்கித்தடவி விடவும். இடம் சுத்தப் படாத வரையில் அதனை மீக்க வேண்டாம்.

(17) கெல்லிக்காய், கத்தகம், ஊசித்தகாவிதை, வெங்காரம் கத்தகம்பு, எல்லாம் சமம் எடையாக எடுத்து தண்ணீர் விட்டறைத்து மேலுக்குப் பூசிவரவேண்டும்.

கர்ப்பம் தரிக்க சிகிச்சை

(1) யானைத் தந்தத்தின் சக்கை (தூள்) செவ்வனே இடித்தறைத்து அதன் சமளடையில் கற்கண்டு தூளைச் சேர்த்து நயா ரித்து வைக்கவும். ஸ்திரீ தன் மாத விடாயை பூர்த்தித்துக் கொண்டனம், அந்த ஸ்திரீக்கு இத்துளை 7 நாள் வரையில் வேளை 1 க்கு 9 மாஷா சாப்பிடக் கொடுத்தபின்னர், உடனடியாக படுக்கை ஏற்பட்டால் ஆண்டவன் கிருபையால் மூன்றே நாளில் கர்ப்பம் தரித்து விடும்.

(2) மாதவிடாயின் ஆரம்பத்திற்கு முன்னிருந்தே, அழக் குராக் கிழங்கை இடித்தறைத்து இரண்டொரு திரம்எடை கொடுத்து வரவும். கஞ்சிமாதிரிமே ஆகாரம் உட்கொள்ள வேண்டும். விடா முடிவுற்று தலைக்குத் தண்ணீர் ஊற்றியானவுடன் படுக்கை வைத்துக் கொள்ளவும்.

(3) ஊமத்தைப்பூ, மிளகு, இந்த இரண்டையும் அறைத்து தேனிலும், கெய்யிலும் கலந்து உட்கொள்ள வேண்டும்.

(4) சமத்தர்பல், கொஞ்சம் தயிருடன் விழுங்கிக் கொள்ள கர்ப்பத்திற்கு இடமளிக்கும்.

(5) விடா முடிவுற்றதும் புரூவின் எச்சத்தை துணித் துண்டில் தடவி அதை மர்ம ஸ்தானத்தில் வைக்கவும்.

(6) ஒரு கைப்பிடியளவிற்குரிய ஓமம் தினந்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தால், கர்ப்பம் தரிக்காத ஸ்திரீகளுக்கு கர்ப்பம் தரிக்கக் கூடும்.

(7) பூலாங்கிழங்கு, சுக்கு, வாய் விளங்கம், வகைக்கு தோலா 1½ இவைகளை இடித்துக் கொண்டு 3 பங்குகளாகச் செய்து கொள்ளவும். ஒருபங்கை 2 சேர் ஊத்தில் கொதிக்கப் போடவும். கொதித்தவுடன் ஒருதடவையில் உள்ள ஜலத்தை வடிகட்டி எறித்து விடவும். அப்புறம் அதில் 3 தோலா பழைய வெல்லத்தைச் சேர்த்து கொதிக்கவைத்து அதை இளஞ் சூட்டிலேயே குடிக்கச் செய்ய வேண்டும். அதாவது 3 நாள் குடிக்கவேண்டும். மாதவிடாய் என்றைக்கு முடிவுறுகிறதோ அன்றைக்கு இம்மருத்தை குடிக்கத் தொடங்குவது மேலாகும்.

(8) கல்லாப்பு, கையாத்துரைச்சாறு, ஆலம்பிழுது, கடு கெண்ணெய் வகைக்கு மாஷா 3½; யாவற்றையும் ஒன்றாய் இடித்து கொடுத்துவரவும். அதாவது விடாயின் ஆரம்பத்திலிருந்தே கொடுத்து வரவேண்டும். ஆண்டவன் கிருபையால் ஆண்குழந்தை பிறக்குமெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(9) கருவழிவைத் தடுக்க ஏழுசாடுகளைக் கொண்டுள்ள நூலொன்றை ஸ்திரீயின் உச்சித் தலையிலிருந்து கால் கைகள் வரையில் அளவு எடுத்துக் கொள்ளவும். பிறகு அந்த நூலினால் வெங்காயம், கரும் ஊமத்தையின் வேர் (ஏழுதுண்டாக்சி) இரண்டையும் கட்டி அந்த ஸ்திரீயின் இடுப்பில் அந்த நூலை கட்டிவிட வேண்டும். கருவழிவு ஒரு போதும் ஏற்படாதெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(10) பனைமரத்திலுள்ள கார் (தும்புறு) இடித்து அதன் தூளை 3 மாஷா வெல்லத்தில் சேர்த்து 3 மாத்திரைகள் உருட்டிக் கொள்ளவும். ஸ்திரீக்கு விடா முடிவுற்று ஸ்கானம் ஆய்விட்டதும் ஒருமாதத்திரை தின்னக் கொடுக்கவும். அத்துடன் படுக்கையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். இதேபோல் 3 நாளும் கொடுத்து மூன்று நாளும் படுக்கை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

(11) கார்ட்டுக் கிழங்குவிதை, சேம்பு, முள்ளங்கி விதை வாய்விளக்கம், சுக்கு, பூலாங் கிழங்கு, கஸ்தூரிமஞ்சள், வகைக்கு 7 மாஷா, தனித்தனியே இடித்துக் கொண்டு அதை மூன்று பங்காகப் பிரிக்கவும். ஒருபங்கை காலையில் ஒரு சட்டியில், ஒருசேர் ஜலத்துடன் போட்டு எரிக்கவும். அதைவாசிஜலம் மீதியாயிருக்கும் போது பழையவெல்லம் 4, 5 தோலா எடை யுள்ளதை அதில் சேர்த்துக் கலக்கி வடிகட்ட வேண்டும். அப்பால், அதில் பசுவெய் 1½ தோலாவைச் சேர்த்து பருகச் செய்யவும். பிறகு அந்த மருத்தில் ½ சேர் தண்ணீர் ஊற்றி சாயங் காலம் எரிக்கவும். ½ சேர் ஜலத்திற்கு சற்று குறைவாக இருக்கும் சமயம் 4½ மாஷா பழை வெல்லத்தை அதில் கலந்து வடிகட்டி சேர்த்துக் கொள்ளவும். இரண்டு மாஷா செய்வைச் சேர்த்து குடிக்கச் செய்யவும்: மருத்தை மூன்று நாள் வரையில் இரண்டு தடவைகளில் கொடுத்துவா வேண்டும். மேலும் விடாவின் மூன்று வது நாள் இந்த மருத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஸ்திரீ யின் மாதவிடா 6 நாள்நீடிக்கும். அத்தகையோருக்கு மூன்றாம் நாளிலிருந்து மருத்து கொடுக்க ஆரம்பித்தால் அது முடிவுறும் தினத்தில் மருத்து நாளின் கணக்கும் முடிவுறும். சூதகம் மூன்று நாளில் முடிவுறும் ஸ்திரீகளுக்கு முதல் தினத்திலிருந்தே மருத்து கொடுத்துவா வேண்டும். சூதக காலம் பூர்த்தியடைபவ் வரையில் புளிப்பும் வாயுவு பதார்த்தங்களும் தன்னுபடி. ஆண்டவன் கிருபை யால் இந்த சிகிச்சையின் பயனாக அந்த ஸ்திரீ ஆண்குழந்தையை சுன்மெடுக்கக் கூடும்.

(12) சிறு காகப்பூ, பசு வெய்யில் சேர்த்து சூதக காலத் திற்குப் பின் 3 நாள் ஒரு ஸ்திரீதின்று வந்தால் கல்ல குணம் செய்யும். சாப்பிடும் காலம் வரையில் கஞ்சியில் பசும் பாலிட்டு கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் வந்த பசுவின் பால் கஞ்சியில் சேர்க் கப்படுமோ அப்பசுவின் கன்று ஆண்கன்றாக இருத்தல் வேண்டும். இந்த மருத்தை சாப்பிட்ட ஸ்திரீ ஆண் குழந்தை ஜனிக்கக் கூடும்.

(13) கர்ப்பம் தரிக்க:— கசப்பு பிரக்கங்காவின் பச்சை கிழமுள்ள தோலை கீக்கி விட்டு, அதனை அரைத்து, சூதகம் கின்ற அடுத்த தினம்முதல்மூன்று நாள் தொடர்ந்தாற் போல் ஸ்திரீதனது

மர்மஸ்தானத்தில் தேய்த்து வந்த பின்னர் படுக்கை ஏற்படுத்தி, குணமறியலாம்.

(14) மாண்ட தலையின் எலும்பை கன்றும் அரைத்துப்பொடி செய்த பின்னர், அதை ஆட்டுப் பாலுடன் சேர்த்து, தின்னக் கொடுக்கவும் சூதகம் கின்றவுடன் படுக்கை.

கர்ப்பம் தரிக்காமற் போக கர்ப்பத்தடை

(1) காட்டுப்புறவின் எச்சம் மாஷா 9 ஜலத்தில் அரைத்து காலையில் ஸ்திரீ அதை யெடுத்துக் குடித்து விடவேண்டும். இந்த விதமாக ஒருகாளோ அல்லது மூன்று காளோ செய்து வந்தால் அந்த ஸ்திரீ மலடியாய் விடுவாள்.

(2) கல்லுப்பு, கடுகெண்ணையில் கலந்து, சம்போகத் திற்குப்பின் ஸ்திரீ அதை நன்மர்மஸ்தானத்தில் வைத்தால் தரித்த கர்ப்பம் உடனே கலைந்து விடும்.

(3) சம்போகத்தின் போது ஆண்குழியை எள்ளெண் ணைய தடவிக் கொண்டால் கர்ப்பத்தடைக்குக் காரணமாகும்.

(4) கர்ப்பத்தடைக்கு குன்றுமணி பெரும் ஆதாவளிக்கும். சூதகத்திற்குப் பின்னர், ஸ்திரீ ஒரு சூன்று மணிபருப்பை தின்று விட்டால், ஒரு வருஷம் வரையில் கர்ப்பமேற்படாது முனமப்படி எத்தனை குன்று மணிகள் தின்னப் படுகின்றனவோ அத்தனை வருஷங்கள் வரையிலும் கர்ப்பமேற்படாது.

(5) சம்பங்கி வேர், தேனுடன் உட்கொண்டு ஸ்திரீதன் மர்மஸ்தானத்திலும் வைத்தால் கருவழிவு ஏற்படும்.

(6) போட்டுலுப்பு மாஷா 9 அதிகாலையில் ஆகாரம் அருந்து முன்னர் ஓர் கர்ப்பஸ்திரீ தின்றால், வயிற்றில் குழந்தை இறந்து போயிருப்பினும் வெளியாய் விடும்.

(7) எள்ளை ஜலத்தில் ஓர் இரவு முழுவதும் அரைத்துத் திருத்து காலையில் அதன் ஜலத்தை எடுத்து, குடித்துக் கொண் டால் கருவழிவு மட்டு மன்றி தடைபட்டிருக்கும் சூதகத்திற்கும் குணமளிக்கும்.

(8) குமட்டிக்காயைப் பிழித்து அதன் சாற்றில் பஞ்சை களைத்து மர்மஸ்தானத்தில் வைக்கவும்.

(9) கார்ட்டிக் கிழங்கின் விதை, காட்டுப்புறவின் எச்சம் இத்த இரண்டையும் கெருப்பில் போட்டு புதை பிடிக்கவும்.

(10) எந்த தோர் ஸ்திரீ தலையில் எலும்பையோ அல்லது பார்பின் பல்வேயோ தன்னிடத்தில் வைத்திருப்பாளோ அவளுக்கு கர்ப்பம் தரிக்காது.

(11) கள்ளிக் கொடி பச்சையாகக்கொண்டு வந்து அதை கீழலில் உலர்த்தியபின், கெருப்பில் எரித்து அதன் சாம்பலை 1 மாஷா அளவி லெடுத்து அதன் எடைக்கு சர்க்கரையைச் சேர்த்து 21 நாள் சாப்பிட கர்ப்பத்தரிக்கக் காரண மில்லை.

(12) மனிதகாதில் உள்ள அழுக்கை மொச்சையளவிற்கு சேகரித்து, அதை கறுப்புக் கம்பளத்துண்டொன்றில் சுற்றி, முடிச்சிட்டு ஸ்திரீயின் கழுத்தில் தொங்கவிடவும். ஒரு போதும் கர்ப்பம் தரிக்காது.

(13) முருங்க விதையை செவ்வனே அரைத்து பசு வெயிலிலும் தேனிலும் கலந்து கொண்டு மாத விடாவிற்கு பிறகு மர்மஸ்தானத்தில் பூசவும்.

(14) ஒரு ஸ்திரீ தன் குமாரனின் மூத்திரத்தின் மீது ஒன்றுக்கிருந்தால் கர்ப்பம் தரிக்கா தென வரையப்பட்டிருக்கிறது.

(15) ஒரு ஸ்திரீ மாதத்தோறும் கோவெழுக் கழுவதின் மூத்திரத்தை சொற்பளவில் குடித்துவந்தால் கர்ப்பம் உண்டாகாது.

(16) மாசிக்காய் க்ஞாக அரைத்து கொஞ்சம் பஞ்சை அதில் கிணைத்து உருட்டி சம்போகத்திற்கு முன்னர் அதனை மர்மஸ்தானத்தின் குளவைத்தெடுத்து விட்டால் கர்ப்பமும் ஏழ் பாடாது. சம்போகத்திற்குப்பின் கிளருக்கு ஏற்படக் கூடிய மர்மஸ்தானவலியும் இருக்கா தெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(17) பேசுதலை பனஞ்சர்க்கரையில் வைத்து சாப்பிடவும். தாமதையை அரைத்து மர்மஸ்தானத்தில் பூசவும்.

(18) கத்தகம், போனம், மைசாட்சி பெருங்காயம், கூடு மாநின் பசுவின் பித்தத்தையும் சேர்த்ததைத்து புதை பிடிக்கவும்.

(19) குதிரைச் சாணத்தை எரித்து அதன் புதையை கர்ப்ப ஸ்திரீயை முகாச் செய்தால் வயிற்றிலுள்ள சிவையிரோடிருப்

பிணும் சரி, அல்லது இறந்து போயிருந்த போதிலும் சரி வெளி யாக்கி விடும் கர்ப்பழிவை உண்டாக்கும்.

(20) ஆவாரம் விதை, மாதனம் பழத்தோல், வகைக்கு மாஷா 7 இத்த இரண்டையும் 4 குவளைக் கொண்ட ஜலத்தில் கன்றாய்க் கொதிக்கவைத்து, ஒரு குவளை வளவிற்கு ஜலம் கண்டி வத்தவுடன் காலையில் கர்ப்பஸ்திரீக்கு கொடுக்கவும். இரத்தப் பெருக் கேற்பட்டிருந்தால் நின்று விடும்.

(21) பழமனே கருக், பழமனே சுபேத் இரண்டும் சம எடையி லவைத்து அதில் தேனை விட்டோ அல்லது சர்க்கரைப் பாலிலோ கலத்து, லேசியம் செய்து கொள்ளவும். அல்லது மேத் சொன்ன இரண்டின் தூளை குல்கத்துடன் சேர்த்தும் சாப்பிடலாம். வேலை 1க்கு அளவு தோலா 2½

(22) கருவழிவுக்கு:—மூக்கொட்டை வேரை 6, அல்லது 8 அங்குலத்திற்கு வெட்டித்தண்டாக்கி அதன் ஒரு புறத்தை சிவிக் கொள்ளவும். அப்பால் சிவினைவிடத்தில் கொஞ்சம் கரியபோளத் தையும், கருஞ் சோகத்தையும் தண்ணீர் விட்டோ அல்லது பசுவின் பித்தத்திலோ அரைத்துத் தடவி, அதை உலர்த்திக்கொள்ளவும். பிறகு, அப்பாகத்தை மர்மஸ்தானத்தின் புகத்துவாரத்தின் புறமாகக் கிட்சி இரண்டாவது புறத்தில் நூலிக்கட்டி அந்த நூலை, துடைந்து கட்டிவிடவேண்டும். 4, 5 நாள் இவ்வாறு செய்துவந்தால் பலன் ஏற்படும்.

(23) முள்ளங்கி விதை தோலா 3 இடித்து 1 சேர் தண்ணீரில் கொதிக்கவைக்கவேண்டும். ஜலம் கண்டி கால் பாகத்திற்கு வத்த போது, அதை கீழே இறக்கி வடிகட்டிவிட்டு முள்ளு தோலா, பன்னீர், கலந்து கொடுக்கவும். ஒரு காளில் குணம் தெரியாமற்போனால், 3 நாள் வரையில் கொடுத்து வரவும்.

(24) சீமைமுள்ளங்கி சககுப்பை, கெந்தயம், வகைக்கு திரம் 5 இவைகளை 2 சேர் ஜலத்தில் கொதிக்கப்போடவும். அனாவாசி ஜலம் கண்டிப்போனவுடன் அதை வடிகட்டி 2 வாரம் வரை நில் இதைப்போலவே குடித்துவந்தால் கருவழிவிற்குக் காரணமாகும்.

(25) கரியபோனம், மூக்கொட்டை விதை, துருகு பலாப் பழவிதைகளைப் பருப்பு சம எடையில் எடுத்ததைத்து துணியில் களைத்து உன்சியோகம் செய்யவும்.

(26) ஆமணக்கான் பூ மொட்டு தாம் 1, கரிய போனம் மாஷா 4 பலாப்பழவிதைகளைப் பருப்பு மாஷா 4 எல்லாம் சந்தனம் போலதைத்து திரியில் தேய்த்து மர்மஸ்தானவாயில் காலை மாலை வைத்து வரவேண்டும்.

(27) கஷாயம் :—

அக்க ரொட்டிதோல், பருத்திக்கொட்டை தோல், முன்னங்கி விதை, காஜர் விதை, சதருப்பை விதை கருஞ்சீரகம் யாவும் சம எடை இவைகளை இடித்து இருமடங்கு வெல்லத்தைச்சேர்த்து ஜலத்தில் காய்ச்சவும். மூன்றாவது பாகத்திற்கு ஜலம் கண்டிவந்தவுடன் குடித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

சந்திர திவ்யந் பேரமுபந்திய குறை, ஆனில் உண்டா அல்லது பெண்ணிலா? :—என்பதை தெரிந்து கொள்வதாயின், அதனை பின் வருமாறு சோதித்துக் கொள்ள சாத்தியமுண்டென பூஞ்சரிவைத்திய தாலொன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(1) அமாவாசை புதிய மடபாத்திர மொன்றில் கோதுமை, மொச்சை முதலிய நாளியத்தை விதைத்து விடவும். அதே மாதிரி இன்னொரு மடபாத்திரத்திலும் விதைத்து விட்டு தம்பதிகள் முறையே குறித்ததோர் பாத்நிரத்தில் ஒரு வாரம் வரையிலும் ஒன்றுக்கு இருந்து வரவேண்டும். எத்ததோர் பாத்நிரத்தின் விதைகளில் முளைக்காதி விடுமோ அந்த பாத்நிரத்தைச் சேர்த்தவர் மீது மலடு என்ற குறை ஏற்படுவதற்கில்லை.

(2) இரண்டாவது சோதனை முறை :—

கணவனும் மனைவியும் தனித்தனி குவளையில் ஜலம் ஊற்றி அந்த ஜலத்தில் தந்தம் தூற்றியதின் லெ துளிகள் போடவும். போட்ட துளிகள் ஜலத்தின் அடியிற் சென்றும் விடலாம். செல்லாமதும் மேலே மிதக்கலாம். இத்த விவகையில் துளிகள் அடியிற் சென்றவர் மீது பின்னயிக்கு பென்று தனைக்கவேண்டும்.

(3) மூன்றாவது முறை :—

கணவன், மனைவி தனித்தனியே இரண்டு கடைக்காய் கொடி களின் அடியிற்சென்று ஒன்றுக்கு இருத்தல் வேண்டும், பின்னர் முன்னவரின் அத்தாட்சியாக அங்கொடி பட்டுப்போம்.

மீரசவத்தின் போது முக்கியமாய் கவனிக்கத்

தகுந்த விஷயங்கள் :—

மீரசவத்திற்கு முக்கியமாய் கர்ப்பத்தின் கண்காபது மாதத்திற்கு முன்னரும் 7 வது மாதத்திற்குப்பின்மும் பேதிக்கு கொடுக்க வகாது. ஜாக்மிரதையாய் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பரம் அலட்டியையுண்டாக்கக் கூடிய பேச்சுகளை அவர்களுக்கெதிரில் பேசக்கூடாது. 2 மாதத்திற்குபின் சம்போகம் கூடாது ஆகாரம் அதிகம் புசித்தல் கூடாது. அஜீரணத்தை விடும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். சந்தோஷமாகவும் சீராகத்தொடும் இருக்கக் கூடிய முறைகளை கையாள் வேண்டும். சரியான பசி இருத்தல் அவசியம். ஒமட்டல் கிரு கிருப்பு முதலியவைகட்கு இடத்தாலாகாது.

கர்ப்பவதியின் வலது விலாவில் கையாண உணர்ச்சியும் வலது மார்பு தடித்த ஒரு வித சிவந்த சிறம் போல் இருக்கத்தென்பட்டால் பெரும் பாதுகா மூன்றாமுத்தை பிறக்குமென எதிர்ப்பார்க்கலாம்.

பெண் குழத்தை பிறப்பதாக விருத்தால் அதற்குமுன்ன அறி குறிகளை தென்படக்கூடும், அவளது தலையும் முகமும் அவளுக்குப் பருவாகத்தெரியும், முகலக்ஷணமாயது; குறைந்தபசி, அழிச்சோம்பல், சதா நித்திரையின் ஆவலாக இருந்து வரும்.

கடங்கும் போது முதலில் வலது காலையே மறித்து வைத்தல் சகஜமாகும். எழுத்திருக்கும் போது வலது கையை கணன்றி எழுத்திருப்பதைக் காணலாம். வைத்திய கிபுணர்கள் ஒரு கர்ப்பவதி ஆண் குழத்தை ஜனப்பாளா அல்லது பெண் குழத்தையா என்று சோதிப்பதா விருத்தால், அவன் தன் உண்ணல் கையின் பெண் ஒன்றை வைத்து அதன் மீது தன் பால் பிடிக்கக்கூடும். வைக்கப்பட்ட பெண் பாலின் கிழ ஆடி அசையுமாறுல் ஆண் குழத்தை பிறக்கும் என்பதன் அறிகுறியாகும், பெண் அவைவதற்

ரூப் பதிலாக இறந்தே விடும் பட்சத்தில் மிதச்சுப் போவது பெண் குழந்தையே என அதிக.

செல் ஸ்திரீகளுக்கு கர்ப்பம் நரித்த சிறிது காலத்திற்குள் கர்ப்பழிவு ஏற்பட்டுப் போகிறது. ஆகையால் அத்தகையோர் களை சிகிச்சைகள் மூலம் காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(1) சிவப்பு குஸ்பா வஸ்திரத்தில் சிவப்பு நூலினால் சுழற் திக்கா யொன்மைக் கட்டி. அந்த நூலை கர்ப்பவதியின் இடுப்பில் மூன்பது மாதங்கள் வரையில் கட்டியே வைத்திருத்தல் வேண்டும்.

(2) குமரி யொருவன் இறைந்த நூலை பெடுத்து அதை கர்ப்பவதியின் உச்சத்திலே விருத்து காலின் கைம் வரையில் கணக் கெடுத்து அதையே 21 இழைகளின் அளவிற்குக் கொண்டு வந்து அதில் 7 ஆண்டுகளாகப்பட்ட சுறுப்பு ணமத்தையின் வேரை தனித் தனியாகக் கட்டி கர்ப்பவதியின் இடுப்பில் கட்டி விட வேண்டும்.

(3) சுஹருப் பிசினியை கர்ப்பவதியின் இடுப்பில் கட்டப் பட்டிருந்தால் கர்ப்பழிவு ஏற்படா வண்ணம் காத்துக் கொள்ளும் எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பிரசவ சமீபமத்தப்பட்ட சிகிச்சைகள்

(1) பெரிய ஏலக்காய் 10 திரம், 6 மீஸ்கால் சர்க்கரை யுடன் அரைத்து தினச் தோறும் 3 மாஷா தின்று வந்தால் பி மினத்தை மீக்கும்.

(2) ஆண் குழந்தை பிரசவ வேதனையின் போது கர்ப்ப வதிகளாகில் வாசனைத் திரவியங்களைக் கொண்டு மேலாக் கூடாது. கொன்மைக் காயத்தோல் 4 மீஸ்கால் ஏடை தண்ணீரில் காய்ச்சி அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரைப் போட்டு குடிக்கச் செய்யதால் அபூர்வ சந்தியைத் தருமென வரையப்பட்டுள்ளது.

(3) குதிரைக் குளம்பை எரித்து அதன் புகை முகர்வதும் வேதனையை இலகூப்படுத்துவதாகும்.

(4) குதிரைச் சாணத்தை கொஞ்சம் போலெடுத்து அத் துடன் புழு எச்சையும் தண்ணீரில் கலக்கி குடிக்க வைப்பதும் விவிரபிர சவத்திற்கு அனுகூலமாயிருக்கும்.

(5) பாம்பின் சட்டை எரித்து அதன் புகையை முகர்வதும் வயிற்றில் இறந்து விட்ட சிசுவை உடனே வெளிப்படுத்து வதாகும். காஜர் சிதைகளின் புகையும் அப்படியே குணமாகிக்கும்.

(6) கர்ப்பவதிக்கு மர்மஸ்தானத்தில் கமயச்சல், எரிச்சல் ஏற்பட்டிருப்பின், சீமை துத்தி விதை முத்தான் காவி, இவையகளை மலத்தக்காவரி இலைச் சாற்றில் அரைத்து பூசி வரவும்.

(7) சீமை சாமத்தி 3 மாஷா கொஞ்சம் தண்ணீரில் காய்ச்சி அதில் தேன் கொஞ்சம் கலந்து கொடுப்பதும் கற்பனைவிக்கும்.

பிரசவத்தில் இரத்தம் போக்கு உண்டாயிருந்தால்

(1) அத்திலேரை இடித்து துளத்தில் கொதிக்கவைத்து குடிக்கச்செய்யவும்.

(2) தாமரை, அரிமதுரம் (இடித்து) அரைத்த சந்தனம், கற்கண்டு எல்லாம் சம ஏடையிலெடுத்து, கன்றும் அரைத்து, குரணமாகிக்கொள்க. அதுபது காலில் விளைந்த அரிசியைக் களைத்து அதன் சுழலியில் விளைத்து, ஒரு பிடி சாப்பிடவும். பிர சவம் இலகுவாய்விடும்.

(3) சிச்சவத்தின் போது காத்தகல்லில் வகையில் வைத்திருப்பதும் கஷ்ட நிலாணத்திற்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட சிகிச்சையாகு மென கூறப்பட்டிருக்கிறது.

(4) பிரசவவேதனையை இலகுவாக்கி, நிவிரபிரசவத்திற்கு கால பல்வேறு சிகிச்சைகளும் உபாயங்களும் இதனடியில் வரையப் பட்டுள்ளன :—சுழற்சிக்காயை தோல் துண்டிலென்று மடித்து அதனுண்டை வலது கெண்டைக்காலில் கட்டிவிடவேண்டும்.

(5) பிரசவ வேதத்திற்கு சற்று முன்னர் கொஞ்சம் பெருங் காயத்தை திள்ளச் செய்யவும்.

(6) பிரசவவேதனையின் சமயத்தில் மனித பிராமங்களை எரித்து அவற்றின் புகையை பிரசவவதியை முகர்ச்செய்யவும்.

(7) மனித உரோமங்களை எரித்து அவற்றின் சாம்பலை பண் னீரில் கலந்து ஸ்திரீயின் உச்சத்திலேயில் தேய்க்கவும்.

(8) சிவப்பான வஸ்திரத்தில் உய்யைக்கட்டி ஸ்திரீயின் இடது புறம் படுக்கைக்குமேல் தொங்கவிடவும்.

(9) பாம்புசட்டையை ஸ்திரீயின் குண்டியின் மீதுவைத் துக்கட்டி அந்த சட்டையைச் சுட்ட புண்களையும் முகரவைக் கவும்.

(10) கலையான் கொம்பைத் துண்டித்து துண்டை வைத்துக் கட்டவும்.

(11) இராவாவி எனற பறவையின் சிறகும் காலின் கீழ் சுட்டி விடவும்.

(12) குளஞ்செடியின் வேரை ஸ்திரீ இருப்பில் கட்ட வேண்டும்.

(13) உயிருடனிருக்கப்பட்ட பாம்பின் பற்களைப்பிடுங்கி ஸ்திரீயின் கழுத்தில் சுட்டி ந்தொண்டவிடவும்.

(14) குளஞ்செடியின் வேரை அரைத்து பசுவின் கொம்பிற் கலத்து துணித் துண்டொன்றில் தடவி மர்மஸ்தானத்தில் வைக்கவும்.

பிரவசத்திற்குப் பின் ஸ்தானத்தில்

ஏற்படக் கூடிய வலிக்கு:—

(1) சுத்பூசனி தேய் தாம் 2, உலா வைத்து, சோம்பு திரவ சுத்திலைதந்து குடிக்கவும்.

(2) ஷம்பு காயம் போட்டிக் கொடுக்கவும்.

(3) பழய கொப்பரை தின்று வர வலி குறைவும்.

மாதர்களின் மர்மஸ்தான விரிவை ஒதிக்குப் சிசிச்சைகள்

(1) சுத்தரிக்காயை காயவைத் தறைத்து, துணித் துண்டில் பூசி அதை ஸ்தானத்தில் வைத்தெடுக்கவும்.

(2) ஆவாரம் பூமொட்டுகளை கீழலில் உலர்த்தி அதற்கு சம எடையில் சர்க்கரை கலந்து 3 தாம் அளவில் தினத்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தால், 14 தினத்திற்குள் கெடுக்கம் ஏற்படும்.

(3) கருக்கள் வேரை ஸ்திரீ தன் முதலிரத்தில் அறைத்து, ஸ்தானத்தினுள் பற்று போட்ட பின்னர், சுமார் 2 மணி கோம் கழித்து நன் வீட்டானை யணுகினும், சுத்த உலர்ச்சி யடைய லாம்.

(4) காக்குப் பூச்சியைக் காயவைத்த அதன் துளை ஸ்திரீ மர்மஸ்தானத்தில் தடவிக் கொண்டால், ஆடவரது ஆணைமைத் துண்டிச்சமயம் வீழ்ச்சி யடையச் செய்யும்.

(5) கருவம் பட்டை, மகிழம் பட்டை, மாதுளம் பட்டை, எல்லாம் ஒரே இடைவில் வாக்வி இடித்து, கொஞ்சம் ஜலத்தில் போட்டு விடவும். அந்த ஜலத்தில் கிறம் ஏறிவிட்டதும், அதில் கொஞ்சம் துணியை களைத்து மர்மஸ்தானத்தில் வைக்கவும்.

(6) ஆவாரம் துளிர் கீழலில் உலர்த்தி அறைத்துக் கொள்ளவும். அதன் கனத்திற் கேற்ப கற்கண்டு துளைச் சேர்த்து 3 தாம் முதல், 2 தாம் வரையில் சாப்பிடவும்; 7 நாடில் குணமேற்பட்டு விடும்.

(7) காண்டா மிருகத்தின் தோலை எரித்து, அதன் சாம்பலை தேய்த்து வரவேண்டும்.

(8) புளிப்புக் கிரையின் விதைகளை இடித்தமைத்து தேய்த்து வரவும்.

(9) மர்மஸ்தானத்தில் விருந்து வெளியாய்க் கொண்டிருக்கும் படியான கடிவை கிறுத்தி விடும்:—

மகிழம் பட்டையை உலர்த்தி அதனை இடித்தமைத்து, அதற்கு சம எடை சர்க்கரையைச் சேர்த்து, காலி தோறும் ஒரு னை கொண்டளவிற்கு சுத்த ஜலத்துடன் கொடுத்து வரவேண்டும்.

(10) புளியங் கொட்டையின் மாலை செய்வனே இடித்து அறைத்து காலி, மாலை தேய்த்து வரவும்.

(11) கழுதை காணத்தை காயவைத்து, காய்க்த வுடன் அதை கன்றாய் அறைத்து, சிறியதோர் முடிச்சாகக் கட்டி மர்மஸ்தானத்தில் வைத்து வந்தால், இரத்தமும் கின்று விடும்.

(12) ஸ்கானத்தின் போது நிரோகத்தி வின்னும் வெளியாகும் அழுக்கை உருட்டிச் சேர்த்து அதை ஒரு துணித் திரியில் தடவி மர்மஸ்தானத்தில் வைத்து வர, உதிரமும் கின்று விடும்.

(13) கோரைக் கிழங்கை அறைத்து, அதன் துளை உள் மருந்தாகவோ அல்லது, ஸ்தானத்தின் மீதோ தேய்த்து வந்தாலோ, ஓடிக்கம் ஏற்பட்டு விடும்.

(14) சேமக் கிழங்கு தோலா 1½, கிராம்பு மாஷா 1, சேமக் கிழங்கு இடித்து உலர்த்தவும். அப்பும் இரண்டையும் பொடியாய் அறைத்து மினு அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து சம்போ கத்திற்கு ½ மணி கோம் மூன்னர் விழுங்கி விடவும்.

(15) மானுளம் பிஞ்சு தோலா 3, கருவங்காய் (பிஞ்சாக இருந்தல் வேண்டும்) மாம்பிஞ்சு (புளிப்பு ஏறுதலு) ஆலம் பிஞ்சு இத்த கால்கும் ஒவ்வொரு சேர் எடையி லெடுத்து, கிழலில் உலர்த்தி இடித்ததைத் தின் ஐலத்துடன் 40 கான் நிண்ணக் கொடுக்க வேண்டும்; அநிக செய்யுடன் கடிய ரொட்டியை உணர்வாகக் கொள்ள வேண்டும்; 9 கான் வரையில் புளிப்பும் வாயுவு பதார்த்தங்களும் கூடா. இதன் உபயோகத்தால் யெளவனப் பரு வத்தின் கிலை ஏற்பட்டு விடும்.

(16) கருவங்காயை இடித்து அதன் சாற்றைப் பிழித்து அநில துணித் துண்டொன்றை தேய்த் தெடுத்து மர்மஸ்தானத்தில் வைக்கவும்.

(17) கருவம் பட்டையை இடித்து ஐலத்தில் 2 கான் கறை வைத்து அதன் பின் அதை எடுத்து அரைவாசி ஜலம் கலாடிப் போகும் வரையில் காய்ச்ச வேண்டும். அப்பால், அறை வடி. சுட்டி புட்டி ஒன்றில் போட்டு வைக்கவும். மாதவிடா ஏற்பட்டு முடியும் காலம் வரையில், ஒன்றுக்கொரு சேர்த்த போதெல்லாம், ஒன்றுக்கொருத் தின் இத்த ஐலத்தைக் கொண்டு தூப்பாவு செய்து வர வேண்டும். அடுத்த சூதம் காலம் வருவதற் கிடையே யெளவன நிலைம யடையலாம்.

(18) மாசிக்காய் 1½ தோலாவை மாலின் உருண்டையில் வைத்து வறுக்க வேண்டும். பிறகு, அதை எடுத்து மண் கருமர லைப் போல் பொடியாய் அறைத்து அதில் முதல் கம்பர் கலந்து 1 மாஷாவையும் சேர்த்ததைத் து, கடலை யளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். அத்த மாத்திரைகளை அதற்கேற்ற மெல்லிய தோற் துணித் துண்டில் முடிச்சாகக் சுட்டி, சூதகம் கின்றவுடன் அதை மர்மஸ்தானத்தில் 3 கான் வரையில் வைத்தெடுத்து வர வேண்டும். ஒரு வாரம் வரையில் 8 மாஷா அளவிற்கு வைத்தெடுத்த பின்னர் படுக்கையில் சடுப்பட்டால் வாலிப அறிகுறியே தென்படக் கூடும்.

(19) முதல்தந்தில்குட்டி போட்டபென்குதிரையின் பாலிக் கொண்டு வந்து அதில் பவழா வஸ்திரத்துண் டொன்றை களைத்து உலர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அவசியமான போது அதை (ம. ஸ) லுணரி முழுவதும் களைத்து விடக்கூடிய கோம் வரையில் வைத்தெடுத்தபின், படுக்கையில் சடுபடவேண்டும்.

(20) என்னுமாஷா7 செஞ்சி மாஷா 14 தேன் மாஷா 14 ½ சேர்பாதுடன் ஒரு ஸ்திரீதினக் தோறும் சாப்பிட்டு வந்தபின் ஏற்படும் யெளவன நிலைமை குறிப்பிடத்தக்கது.

(21) மாசிக்காய், கம்பூரம், தேன் எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்த்து மர்மஸ்தானத்தில் பூசிவர, கிழவியும் குமரியான ஸ்திரீயை யடையலாம்.

(22) பட்டுப்பூச்சியை அறைத்து பசுசெய்யுடன் கலத்து மர்மஸ்தானத்தில் 3 கான் தேய்த்து வரவும்.

(23) மானுளைத் தோல் எவ்வள பிசின் ஒவ்வொன்றும் 5 மாஷா காயவைத்த கருவங்காய், 4 மாசிக்காய் 1 இவைகளை யாவும் பொடியாக அறைத்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து உபயோகிக் கவும்.

(24) கான் பட்ட வேப்பமரத்தின் பட்டை தோலா 2 சுக்கு மாஷா 4 பவழா பனஞ்சர்க்கரை தோலா 2 வேப்பம் பட்டை, சுக்கு இத்த இரண்டையும் இடித்து கஷாயமாகக்காய்ச்சி அதில் சர்க்கரையைக் கலத்து பருகி வந்தால் சூதக பந்தம் நிவாரணமாகும்.

(25) ஓமத்தை தொடர்த்தாற் போல் சிறிது காலம் தின்று வந்தாலும் மாதாத்திர விடாயின் தடை நீங்கி விடும்.

(26) பருத்திக் கொட்டை தனியே ஐலத்தில் காய்ச்சி 3 கான் இடைவிடாது கொடுத்து வர நிவாரணமாகும்.

(27) அதிவடயம், கரிய போளம், போளம், பந்தால், இவையாவும் சமளடைநிலெடுத்து கன்றும் இடித்து விட்டதற்குப் பின்னர் சராயத்தி லறைத்து மர்மஸ்தானத்தின் மேல் பூசவும்.

(28) மர்மஸ்தானத்தின் கசியை நிறுத்தும்:— அஸம்மா ஓமம் வாய்விளங்கம், உலர்த்த பேரோலா, வகைக்கு தோலா 1½ கிஷுப்பு மாஷா 2, தேன் தேவை யுள்ள வரையில் தேனை காய்ச்

சிக்கொண்டு, சரக்குகளை சரிவர அழைத்து அதில் கலந்து கொண்டு, திரியில் தடவி வைத்தெடுக்கவும்.

(29) சோம்பு, ரூரிசோம்பு, அசம்தா ஓமம், திபலி பொதிரை, இவையாவும் வகைக்கு தோலா 1½ தேன் தோலா 6 தேனை காய்ச்சி சரக்குகளை அழைத்த பொடிமைய அதிற் கலந்து பேரிச்சம் பழத்தின் கொட்டையளவிற்கு மருந்தை கொஞ்சம் பஞ்சில் உலித்து மர்மன்தானத்தில் வைத்து வரவேண்டும்.

(30) ரூதக பெருக்கை கட்டிப் படுத்திவிடும்:— பசும் பால் சேர் 5 வண்ணிக்காய், பெரியது, மேற்படிசிறியது இவை இரண்டும் தனித்தனியே தோலா 4, கொட்டைப் பாக்கின் பூ, தாவரவின்னது வகைக்கு தோலா 7½ ஆவாரம் பிசின் ½ சேர், களிப்பாக்கு ½ சேர், வெள்ளைசர்க்கரை ½ சேர். முதலில் பாலை அடுப்பிலேற்றி காய்ச்சிக் கொண்டு, பாக்கை செவ்வனே இடித்து அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். அகப்பையால் அதை கிளறித் கொடுத்துக் கொண்டே வந்து சர்க்கரையைச் சேர்த்தவுடன் மறுபடியும் அடுப்பிலேற்ற வேண்டும். பாகு பதத்திற்கு வந்தவுடன், இதரமருந்துகளை இடித்ததைத்து அதில் கலந்து கொண்டு, அவசியத்திற் கெற்ற எலில் தின்று வரவேண்டும்.

(31) ரூதக பெருக்கத்தை சிறுத்தும்:— மலைவெம் புத்துலிர் தோலா ஒன்று, பங்காவைப்போல் கடைத்து சாற்றெடுத்து குடிக்க வேண்டும்.

(32) பருத்திப்பூக்களை எரித்து அவற்றின் சாம்பலை ஒரு பிடிக்கொண்டளவிற்கு ஜலத்துடன் உட்கொள்ள ரூதகத்தின் மிகுதத்தை கட்டுப்படுத்தி விடும்.

(33) மஞர் பருப்பு, அவரை உளுத்து இரண்டிரண்டு தோலா எடை, வாட்டி அரிசி (60 தினத்தில் விளைந்தது) ஒரு தோலா இவற்றை எரித்து சாம்பலாக்கி ஒருபிடி உட்கொள்ள பெருக்கு கட்டுப்படும்.

(34) வறுத்த கொண்டக்கடலை, பெரியலவங்கப்பட்டை இரண்டும் சம எடையி லுறைத்து அவற்றின் சமஎடையில் சர்க்கரையைச் சேர்த்து ஒருகைப்பிடியளவிற்கு உட்கொள்ள, பெருக்கு கடைப்பட்டு விடும்.

(35) மேனா, காகி, இரண்டும் சம எடையில்லுறைத்து காலையில் 6 மாஷா சுத்த ஜலத்துடன் உட்கொள்ளவேண்டும்.

(36) சிறிய அம்மான்பச்சரிசி சீழலில் உலர்த்தி, அதனை அழைத்து காலி தோலும் ஒருபிடி உட்கொள்ளவும்.

(37) அழுக்குரக்கிழங்கு இடித்ததைத்து அதற்கு சம எடையில் கற்கண்டைச் சேர்த்து ஒரு தோலா சாப்பிட்டு வரவும்.

(38) கருவ கோக்கை வறுத்து அதன் சரியான அளவிற்கு காவியைச் சேர்த்ததைத்து காலி தோலும் 2 மிஸ்கால் உட்கொள்ளவும்.

(39) மல்லி ஒரு பிடி அளவிற்கு ஜலத்தில் காய்ச்சி அப்பால் அதனை வறுக்கட்டி சில தினங்கள் வரையில் குடித்து வரவும்.

(40) ரூதக இரத்தத்திற்கும் கசிவுக்கும்:— பசும்பால் சேர் 5 களிப்பாக்கு சேர் ½, களிப்பாக்கை கன்றும் இடித்து பாலில்போட்டு இளை கெருப்பில் காய்ச்சவேண்டும் பாக்கு வெத்துபோன சமயத்தில் ½ சேர் சர்க்கரையைப் போட்டு பாகு படுத்திக் கொள்ளவும். பிறகு வண்ணிக்காய் சிறுதும் பெரிதும் வகைக்கு 2½ தாம் புத்தா பாக்குப்பூ, குஸ்தாபா, வகைக்கு 5 தாம் புத்தா ஆவாரம் பிசின் ½ சேர் அனைத்தும் பட்டுப்போலுறைத்து சர்க்கரைப் பாவின் ரூதி ஆறியரும் தருவாயில் அதில் கலந்து கொள்ளவும். இறுதியாக, சுத்தமானதோர் பாத்திரத்தில் போட்டு வைத்து அவசியத்திற்குத் தக்கபடி 1 முதல் 3 தாம் வரையில் சாப்பிடக்கொடுக்கவும்.

(41) ரஸவத், கருவம்பிசின், வெள்ளைக்குங்கிலியம் வகைக்கு ஒரு மாஷா இவற்றை கன்றாய் அழைத்து ஜலத்தில் பிசைத்து ஒரு மாஷா எடையுள்ள சிறுபில்லைகள் செய்து கொள்ளவும். வேளை 1க்கு 2, அல்லது 3 பில்லைகள் சாப்பிடவும். ரூதகத்தின் மிகுதத்தை தடுக்கும்.

(42) ஆட்டுப் புழுக்கையை காயவைத்து அதை முடிச்சாகக் கட்டி ஸ்தானத்தின் வாயில் வைத்திருக்கவும். அதில் கொஞ்சம் பறங்கி சாம்பிராணியை சேர்த்துக் கொண்டால் இன்னலும்மேலாகும்.

(43) மாதுளம் பழத்தோல் தோலா 1 செவ்வனே கொடுக்க வைத்து அந்த ஜலத்தை குடித்துவந்தால் ரூதக இரத்தத்தை சிறுத்தும்.

(44) சோகம் (வறுத்தது) மாஷா 1 சோகம் (வறுத்தது) மாஷா 1 அரிசிக்கஞ்சியிலைத்து துணியில் தடவி பற்றுபோட்டு வந்தால் உதிரத்தை நிறுத்திவிடும்.

சூதகத் தடையை நிவர்த்திக்கும் சித்திகளாகள்:—

(1) பரங்கெக்காய், மஞ்சிட்டி, வெந்தயம், காலூர்விதை, சதகுப்பை, முள்ளங்கி விதை, ஓமம் சோம்பு, எள்கீரி, பனஞ் சக்கரை எல்லாம் சமனடை யெடுத்து கஷாயமாகக் காய்ச்சி குடிக்கவும்.

(2) பருத்திச் செடியின் புஷ்பத்தையும் இலையையும் கொண்டுவந்து தண்ணீரில் காய்ச்சி அது கண்டி கால்வாசிகளுக்கு வந்தபோது, அதில் 4 தாம் வெல்லத்தைச் சேர்த்து குடிக்கச் செய்யவும். தடை நீங்கும்.

(3) கர்ப்பத்தை அழித்து சூதகத்தை வெளிப்படுத்துதல்:— அக்கோட்டத் தோல், முள்ளங்கிவிதை, கொன்னைக்காய் பச்சியா ஷான், வாய்விளக்கம் எல்லாம் இடித்து வகைக்கு 9 மாஷா எடுத்துக் கொள்ளவும். பனஞ்சர்க்கரை இரும்புடனாக எல்லாம் ஒருமிக்க காய்ச்சி குடிக்கவும். கருஞ்சோகம், பருத்திப்பட்டைமரையும் சேர்த்தும் கொள்ளலாம்.

சூதக காலங்களில் உண்டாகும்படியான இடுப்பு வலிக்கு

(1) கஞ்சு, வாய்விளக்கம் தனித்தனியே 2 தாம் பனஞ் சக்கரை 2 தாம் இவைகளையாவும் காய்ச்சி பருகவேண்டும்.

(2) எள்ளு, கெருஞ்சி, வகைக்கு ஒரு தோலா இரவில் தண்ணீரில் ஹைவைத்து, காலையில் அதன் சத்தை எடுத்து, கொஞ்சம் சக்கரையைச் சேர்த்து குடிக்கவும்.

(3) முள்ளங்கிவிதை, காலூர்விதை வெந்தயம் எல்லாம் இடித்து ஒருமிடியளவில் வெங்கிருடன் உட்கொள்ளவேண்டும்.

(4) கருஞ்சோகத்தின் ஜலசிக் (லேபியம்) தடைபட்ட சூதகத்தை நிவர்த்திக்கும்

(5) கருஞ்சோகம் தாம் 2 ஆமணக்கன்கொட்டை பருப்பு 1/2 சேர்க்கு தாம் 1 எல்லாம் காய்ச்சியபின்னர் பொடியாக

அமைத்து நொப்புழின் கீழ் பற்றுபோடவும். அது கர்ப்பஸ்தி கலின் அடியிலுள்ள வலியைத் தீர்க்கக் கடியதாகும்.

(6) பேனம், கிராம்பு இரண்டும் சமனடை இடித்து முடிச்சாகக்கட்டிலைத்து வர 3 தினத்தில் சுவை நீக்கும்.

(7) அசும்தா ஓமம், வாய்விளக்கம், உலர்ந்த கந்தாரப்போலா வகைக்கு ஒரு பங்கு, சதகுப்பை இத்துப்பு வகைக்கு அரைபங்கு அமைத்து தேனில் கலந்து கொள்ளவும். பிறகு கொஞ்சம் பஞ்சை அதில் கலந்து ஸ்தானத்தில் வைக்கவும்.

(8) அவரிகை அமைத்துயறைத்த, சூட்டென நொப்புழின் கீழ் பற்றுப்போடவும். இது சீதனத்தின் பேரில் உண்டாகும்படி யான மர்மஸ்தான வலியை நிவர்த்திக்கும்.

(9) கந்தாரப்போலா, கிராம்பு, வாய்விளக்கம், இத்துப்பு, பூலகிழங்கு ஒவ்வொன்றை ஒரளவி லெடுத்து என்னென்ன மில் அமைத்து பஞ்சில் தடவி, ஸ்தானத்தில் வைத்து வர சூத கத்தடையை நீக்கும்.

(10) மாசிக்காயை பொடியாக அமைத்து, கெய்நீர்கலந்து அதில் கொஞ்சம் பஞ்சை கலந்து, மர்மஸ்தானத்திலுள்ளவைத் தெடுக்க வீக்க உபாதையை கண்டித்து அதிக பலனளிக்கும்.

(11) மர்மஸ்தானத்தின் வீக்கத்தையும், அழுத்தாத்தையும், போக்கும்:— குங்கமப்பூ 50 மில்லகல், 3 1/2 ராக்தல் தண்ணீரில் 5 நாள் வரையில் ஹைவைத்திருக்கவும். ஒவ்வொரு நாளும் அவை வகைகளில் பிசைத்துவரவேண்டும். அப்பால் அமை உபயோகத் தில் கொண்டுவேண்டும்.

(12) சோலாவிதைகளை அமைத்து அதை மர்மஸ்தானத்தில் வைத்து வந்தால், சோலா மொட்டைப்போல்ஸ்தானம் நெருக்கத்தை கண்டியும் அத்துடன் ஜடாமாசியையும் சேர்த்துமைத்துக் கொண் டால் துர்க்காத்தத்தை கீக்கி பரிமனத்தையுண்டாக்கிவிடும்.

இவை உபயோகிக்கும் விதம்:—

சோலா விதை 10 1/2 மாஷா, ஜடாமாசி 7 மாஷா இரண்டையும் இடிக்கவைத்து பொடியாக்கிக்கொள்ளவேண்டும். பிறகு வகையில் கலி விரகை பச்சியிரோ அல்லது துலத்திலோ கலந்து, அப்பால் அப்

பொடியில் தோய்த்து விரலை ஸ்தானத்திற்குள் செலுத்தி, மருத்து எங்கும் படும்படியான விதத்தில் விரலைச்சுற்றி எடுக்கவேண்டும்.

(13) கர்ப்பம் தரிக்காதிருக்க:—

கர்ப்பம் தரிக்காதிருக்க வேண்டுமாயின் யானையின் சரணத்தை தேனில் கலக்கி ஒரு ஸ்திரீகொஞ்சம் போல் உட்கொண்டால் போதுமானது.

(14) குலவாயுவுகளுக்களில் வலி முதலிய ரோகங்களுக்கு ஷாயம்:—(பேதிக்கு)

சோம்பு, காகினிவிதை, மனத்தக்காளிவிதை, பர்ஸியாஷான், வகைக்கு 2 திரம், சோப்புவேர், காகினிவேர், வெந்தயம், ஆருளி விதை, இவை வகைக்கு 2 மீஸ்கால், சீமை சாமத்தி 2 மீஸ்கால், குலகத்து 3 தோலா, காய்ச்சி பருகவும்.

(15) பேதி மருத்துக்குப்பின்னர் அடியிர் கண்ட மருத்தை 5 நாள் சாப்பிடவும்:—

தித்திப்பான ரூஞ்சான் 10 திரம் ரூத்து நிலாவரை 7 திரம் மஞ்சகடுக்காய்த்தோல் 4 திரம், வெள்ளைத்தகடை 3 திரம் பாதாம் பருப்பு 3 திரம்—மருதோன்றி இலை 2 திரம், குங்கமப்பூ ஒரு தாண்-யாவற்றையும் இடித்தறைத்து தூளாக்கி, அத்தூளுக்கு அரை பாகம் சர்க்கரையைச்சேர்த்து வேலை 1க்கு 5 திரம் சாப்பிட்டு வரவும்.

(16) கரியபோளம் 10 திரம், மஞ்சட்கடுக்காய்த்தோல் 5 திரம், வெள்ளைத்தகடை ரூஞ்சான், மைசாட்சி, வகைக்கு 2 திரம்—சுக்கு, சித்திரை மூலம், சுடுகு, உப்பு, குமட்டிக்காய்த் தோல், மஞ்சிட்டி வகைக்கு ஒரு தாம், ஓமம் அரிசி திப்பிலி, மிளகு, வகைக்கு ½ திரம், பனைவெல்லம் 3 திரம் சாக்குகளை இடித்தறைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக்கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 3 திரம் எடையில் உபயோகிக்கவும். ஆனால் இவைஉஷ்ண உடம் பிற்ரு ஒத்துக்கொள்ளா.

தூடைவலி முதுகு வலிக்கு.

(1) மைசாட்சி ஒரு பங்கு, பனை வெல்லம் 2 பங்கு, இலகைப்பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரிக்கவும். ஒரு

மாத்திரை கொஞ்சம் செய்யுடன் விழுங்கிக்கொள்ளவும். பேதிக்கு சாப்பிட்டபின்னரே இதை உபயோகிக்கவேண்டும்.

(2) குலக்கட்டு, இடுப்புவலி, முதுகுவலி முதலிய உபாதை களைக்கண்டிக்கும்:—

கலப்பணங்கிழங்கு வெள்ளையும், * கறுப்பும், திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி, ஓமம், வகைக்கு தாம் 1—ஸத்தாஸர் சுக்கு, அழுக் குராக்கிழங்கு வகைக்கு 2 திரம் இடித்தறைத்தபின்பு பனைவெல்லத் தைச்சேர்த்து காட்டு இலகைப் பழத்தின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக்கொள்ள வேண்டும். உபயோகிக்கும் அளவு அவரவர்கள் திரேகஸ்திதிக்கு தக்கவாறு.

(3) பிஞ்சுகடுக்காய்த்தோல், சோம்பு, மிளகு, அரிசி திப்பிலி—கழற்சிக்காய் பருப்பு, கருஞ்சீரகம், வகைக்கு சம எடை. கீளதிராட்சை 5 மடங்கு எல்லாம் ஒன்றாக இடித்தறைத் துக்கொண்டு, மாத்திரைகள் செய்து, வேலை 1க்கு 2 திரம் தின்னவும்.

(4) சுத்தி செய்த சாதிலிங்கம், மஞ்சள், அசம்தா ஓமம், அக்கிராகாரம், ஓமம், சொச்சி இலை, குமட்டிவேர், குளஞ்சி, அழுக்குராக்கிழங்கு, மிளகு, மலைவேம்புவேர், எருக்கனவேர், செங்கொட்டை எல்லாம் சம எடையில் வாங்கி கன்றும் இடித் தறைத்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக்கொள்ளவும். வேலை 1க்கு 1 திரம் எடை இது பிாமேகத்தையும் கண்டிக்கும்.

(5) களுக்களின் வலியையும் பிாமேகத்தையும் போக்கி ண்டும்:—

சாதிலிங்கம், ரசம், அபினி வகைக்கு 2 தாம், ஓமம் 5 தாம், செங்கொட்டையின் மேல் ஓட்டை அப்புறப்படுத்தி 6 தாங்கு—பழைய வெல்லம் 5 தாம். ரசம், சாதிலிங்கம் இரண்டையும் கன்றாக அறைக்கவும்.

இதர சாக்குகளையும் இடித்தறைத்து, இஞ்சி சாற்றித் துறைத்த பின்னர் மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

குறிப்பு:—சாதிலிங்கம், ரச மாத்திரை, கானி மாத்திரை சம பதப்பட்டு மருத்துகளை உட்கொள்ளும் காலத்திற்செய்த புளிப்பு, வாயுவு பதார்த்தங்கள், மயிசம், உப்பு இவைகளை முற்றி

தும் தவிர்க்கவேண்டும். கஞ்சி, சட்டினி அல்லது உப்பில்லாத கோதுமைரொட்டி அதிக கெய்யுடன் சாப்பிடவேண்டும். அல்லது குஷகா அரிசி சாதமும் மோரும் சாப்பிடலாம்.

இடுப்பு வலிக்கு.

(1) அத்திலேர் பட்டை, சுக்கு, மல்லி சம எடையில் வாய்விட்டு இடித்தபின்பு அதிலிருந்து 10 திரம் எடுத்து ஒரு சாத்தல் ஜலத்தில் இரவில் ஊறப்போடவும். காலைநில அந்த ஜலத்தை காய்ச்சவேண்டும். ஜலத்தின் அளவு கால் பாகத்திற்கு எட்டியவுடன் அதை வடிகட்டி குடிக்கவும்.

(2) சுக்கு, ஆமணக்குப்பருப்பு வகைக்கு 6 திரம்—செய், சர்க்கரையகைக்கு 12 திரம், பசும் பால் ½ சேர், முதலில் பருப்பை அரைத்து செய்வில் வறுக்கவும். பிறகு பாலைச்சேர்த்து காய்ச்சவும், நடிப்பு பதத்திற்கு வந்த சமயம் சர்க்கரையைப்போட்டு ஹல்வா தயாரித்துக்கொள்.

உபயோகத்தின் அளவு தேக நிலைமைக்குத் தக்கபடி இருத்தல் வேண்டும்.

(3) ஹாதுன், ஓமம், கருஞ்சிரகம், செந்தயம் சம எடை சிலெடுத்து அதிகாலையில் 3 விரல்களில் அடங்கத் தக்க கட்டியை கையக் கொண்டு ஜலத்துடன் விழுங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பாகம் தேகாரோகிய அபிபதி எனவும் வழங்கப்படுகிறது.

(4) கஸகஸா 3 திரம் பனைவெல்லத்துடன் உபயோகித்து வந்தபோதிலும் வாயு வலியை சிவர்த்திக்கும்.

(5) வாதுளுவைய, ஊசித்தகா விதை, ஹாதுன் சரிவான எடையில்லா பெடுத்து, காலைநில 3 மாஷா ஜலத்துடன் விழுங்கிவிட வேண்டும். இது வெஞ்சிட்டையையும் போக்கிவிடும்.

(6) சூலக்கட்டு, வாயுவுவலியைத் தீர்க்கும், கபத்தை அறுக்கும். தேகாரோகியத்தை பாதுகாக்கும் :— (அரியசிகிச்சை)

வாதுளுவையை எடுத்து முதல் நாள் அதன் ஒரு மணி விழுங்கவும். அதற்கடுத்தடுத்த நாட்களில் நாள் 1 க்கு ஒருமணியாக அதிகரித்துக் கொண்டே போக வேண்டும். அதாவது கணக்கு 100 மணி களுக்கு எட்டும் வரையில் உபயோகிக்கவும்.

அதற்குப்பிறகு காளைடவில் ஒருமணி குறைத்துக் கொண்டே வறுக்கிடவும். இதற்கிடையே சோபிவாரண மாசிலிதம், பசியும் அதிகம் எடுக்கும். மணிகளை அதிகரித்துக் கொண்டு போகும்படி யான சக்தர்ப்பத்தில் சூடு அதிகம் உண்டாகி விட்டதாகத் தெரிந்தால் மணிகளை அதிகரிக்க வேண்டாம். அன்றியும் அந்த சேரத்தி லிருந்தே ஓவ்வொன்றாக குறைத்துக் கொண்டு வந்துவிட வேண்டும்.

(7) பொட்டுதுப்பு 2 மாஷா, பாதம்பிசின் 6 சாத்தி— இந்த இரண்டையும் ஒருதாம் தேனில் சேர்த்து 3 நாள் சாப்பிட்டுவர வேண்டும். அத்துடன் அதை 2 மாஷா, என்னெண்ணெயிற் கலந்து இடுப்பின்மேல் தடவிவர, இடுப்பு வலியும் தீரும்.

(8) கொப்பரையும் சர்க்கரையும் சேர்த்தாற் போல் தின்று வந்தால் இடுப்பு வலியைப் போக்கும்.

(9) இறுப்பன் கொட்டை யிலிருந்து எடுத்த புதிய எண்ணெயை மேலுக்குத் தேய்த்துவா சூலக்கட்டு வாயு வலி தீங்கும்.

(10) இடுப்பு வலிக்கு :—

ஆமணக்கு பருப்பு, இத்துப்பு, பிசினப்பட்டை, வகைக்கு ஒருதோலா பெருங்காயம் 6 மாஷா, கோதுமை உயி ½ சேர், இந்த சர்க்கரையெல்லாம் ஒன்றாக அரைத்து ரொட்டி சுடவும். ரொட்டியின் ஒருபுரத்தை சுட்டால் போதுமானது. மற்றொரு புரத்தில் சுடாமலேயே அந்த ரொட்டியை பெடுத்து, வலியுள்ள விடத்தில் வைத்துக் கட்டிவிட வேண்டும்.

(11) கொச்சிதுலைகளை இடித்து அவற்றின் சாற்றைப் பிழிந்து அந்த சாற்றிற்கு சமஎடையாக என்னெண்ணெயைச் சேர்த்து எரிக்கவும். ஜலம் வற்றி எண்ணெய் தங்கிவிட்ட போது அதை பெடுத்து இளஞ் சூட்டிலேயே தேய்க்க வேண்டும்.

(12) கொச்சி தாமரையும் கெருப்பில் வாட்டி வலியுள்ள விடத்திற்கு மேல் கட்டிவரவும்.

(13) ஆமணக்குச் செடியின் வேர் இரண்டுசேர், இதை 3 சேர் ஜலத்தில் போட்டு காய்ச்சவும். ஜலம் நூரவும் கண்டிப் போனதும் கைலத்தை பெடுத்து வலியுள்ள விடத்தில் தேய்க்க

(14) அலசி எண்ணெய், கடுகெண்ணெய், எள்ளெண்ணெய் முதலிய 1½ சேர், ஊமத்தலைச் செடி சிந்துலை, காய், வேர் உள்பட இடித்து எண்ணெய் கலரில் சேர்த்து காய்ச்சவும். இளஞ்செடியாக இருந்தால் வேண்டும். ஜலம் சுண்டிப்போக விட்டு, எண்ணெயை யெடுத்து வடிக்கட்டி மேலுக்குத் தேய்க்கவும். மேலும் அகலம் இது ஆயுணக்கில் அல்லது எருக்களிலே வைத்துக் கட்டிலிடவும்.

(15) எருக்கள் சம்பந்தப் பட்ட சிசிச்சை கணுக்காய்களையும் குலங்கட்டையும் கிவர்த்திக்கக் கூடியதாகும். எருக்கள் மேலாகக் கொண்டு வந்து அதை இடித்து கடுகெண்ணெயில் எரிக்கவும். வேர் எரிந்து அடிமீர் தங்கிவிட்டால் எண்ணெயை வடிக்கட்டி வலியின் மீது தேய்த்து வருவதுடன் முழங்காலில் வலியிருந்தால் எருக்கள் இலைகளை வாட்டி அந்த விடத்தில் வைத்துக் கட்டவும்.

வாய்வு, வாதம், குலங்கட்டு முதலிய வளிகளுக்கு:—

(1) கல்லெண்ணெய் ½ சேர், பூண்டு ½ சேர் சேர்க்கொட்டை 1, பூண்டை தோலுரித்துக் கொள்ளவும், சேர்க்கொட்டையை கல்லெண்ணெயில் சுட்டு வரியாக்கிக் கொள்ளவும், பூண்டையும் அதனுடையே எரித்துக் கொள்ள வேண்டும், சின்னச் வடிக்கட்டி வலியுள்ளவிடத்தின் தேய்க்கவும். தேய்த்தபின் திறந்த காற்று உடனாக.

(2) சீமை அழுவலிவிதைகளை எண்ணெண்ணெயில் எரித்த பின்னர் அதை வடிக்கட்டி உபயோகிக்கவும். சிலர் இந்த அழுவலி விதைகளை வப்படி எண்ணெயெடுத்து உபயோகிக்கிறார்கள் என்றால்:—

சீமை அழுவலிவிதை 2 தாம், கக்கு 2 தாம், இரவில் ஜலத்தில் கதறாமாக்கிறார்கள். காலையில் ½ சேர் எண்ணெண்ணெயில் எரிக்கிறார்கள். தண்ணீர் சுண்டி கக்கும் விதையும் எரித்துப்போகின்றன. அப்போது அதை எடுத்து உபயோகிக்கிறார்கள், வேறுசிலர் இதில் கசப்பு கொஷ்டத்தையும் சேர்க்கிறார்கள். இதுவும் கணுக்காய்வு, வாந்திரோக்களின் வலியைத் தீர்க்கக் கூடியதாகும்.

(3) சித்திகுசுமம், அபிணி வகைக்கு 2 திரம், சர்வரத்தின விதை, ஓமம் வகைக்கு 10 திரம். இவைகளை இடித்ததைத் தலையில்

கோஸ பருப்பளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள். வேலை 1 க்கு ஒருமாத்திரை. இது கணு வாய்வுகளை கிவர்த்திக்கும்.

புலையிலைத் தைலம்

கணு வாய்வுகளைக் கண்டிப்பதில் இதுவும் இன்றியமை யாதது. புலையிலை ½ சேர், எண்ணெண்ணெய் ½ சேர். புலையிலை வையக் கிள்ளித் துண்டாக்கி ½ சேர் ஜலத்தில் இரவில் ஊறப் போடவும். காலையில் அந்த ஜலத்தை யெடுத்துக்கொண்டு அதில் எண்ணெண்ணெயைச் சேர்த்து இள கெருப்பில் எரிக்கவும். ஜலம் சுண்டிப் போனவுடன் அதை யெடுத்து வடிக்கட்டி மேலுக்குத் தேய்த்து வரவும்.

துன்னாற்றுப் பச்சை தைலம்

இது முக்கியமாக முழங்கால் வலிகளைக் கண்டிப்பதில் கிவர்த்து. துன்னாற்றுப் பச்சை இலையின் சாறு 2 பங்கு, கல்லெண்ணெய் 2 பங்கு, இந்த இரண்டையும் ஒன்றாகக் காய்ச்சவும். சாறு சுண்டிப் போய் எண்ணெய் தங்கி விட்டபோது கொண்டக் கட்டித் தலைகளை மிழித்தெடுத்த ஒரு தோலா சாற்றில் (சிரகத்தை அதில் போட்டு வேகவைத்தபின் ஒரு தோலா சாறு மீதியாக இருக்க வேண்டும்) அதை கலந்து உட்கொள்வதுடன் மேலுக்கும் தேய்க்க வேண்டும்.

பறங்கிப் பட்டை தைலம்

கில் வாய்வு, முதுகுநலி, பிறமேக வளிகளைப் போக்கி லிடும். பறங்கிப்பட்டை இடித்துக் கொள்ளவும். கல்லெண்ணெய் இந்த இரண்டு சாக்குகளும் வகைக்கு 10 மிள்கால், 5 சேர் தண்ணீரில் காய்ச்சவும் தண்ணீர் சுண்டிப் போனவுடன் எண்ணெயை எடுத்து வலியுள்ள விடங்களில் தேய்த்து வரவும்.

வெளவால் தைலம்

கில் வாய்வு, முடக்குவாதம் முதலியவைகளை கிவர்த்திக்கும்:— பெரியதோர் கோழுத்த வெளவால்கொண்டு வந்து கல்லெண்ணெயில் எரிக்கவும். அது எரிந்து வெந்து போனவுடன் அந்த எண்ணெயை கத்தப்படுத்தி மேல் உபயோகத்தில் கொண்டு வரவும்.

வேறு

மருதோன்றி இலை, கொச்சி இலை, மனத்தக்காளி இலை, இவற்றின் சாற்றை எடுத்து அதற்கு சம எடையில் கல்லெண்ணெயை கலந்து காய்ச்சவும். சீமை அழுவளி விதை ஒரு தோலா சதகுப்பைவிதை ஒரு தோலா ஒமம் 6 மாஷா சேர்க்கவும். இந்த சாக்குகள் எரித்து போளவுடன் அவற்றை சுத்தப்படுத்தி முதன் முதலாக அபிணி இரண்டு மாஷா எண்ணெயில் கலக்கவும். அடுத்தாற் போல் ரூரஞ் சான் கசப்பு ஒரு தோலா சேர்த்து உபயோகிக்கவும்.

சுக்குத் தைலம்

சகல வித வாய்வு வளிகளையும் கண்டிக்க வல்லது:— இஞ்சி சாறு 4 பாகம், கல்லெண்ணெய் 3 பாகம் இரண்டையும் சேர்த்து எரிக்கவும். தண்ணீர் எரித்து போய் தனி எண்ணெய் தங்கி விட்டதும் அதை வடிகட்டி மேலுக்குத் தேய்க்க வேண்டும்.

வேறு

முழங்கால் வலி, முதுகு வலி அவயவங்கள் வலி, சேர்வு இவைகளை நீக்கி தளர்ந்த கரம்புகளுக்குத் முதுக்கேற்ற விதம். தாமும்பு சாற்றை எண்ணெயில் கலந்து காற்பது நாள் வரையில் வெளியில் வைத்தெடுத்த பின்னர் அதை மேல் உபயோகத்தில் கொண்டு வரவும்.

சலாசய நோய்க்கு

(1) கழற்சிக்காயை ஜலத்தில் செவ்வனே கொதிக்கவைத்து அதிலிருந்து ஆவியை புகைப்பிடிக்க, சலாசயவலி திரும். புகை பிடித்த பின்னர், உடனே நிறந்த காற்றில் போகலாகாது. ஜல தோஷம் பிடித்தவர்கட்கும் இது சல்லது.

(2) காட்டு வாகை இலை, கொச்சி இலை. முருங்கைஇலை. தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து புகை பிடிக்கவும். புகை பிடித்தானதும் அத்தழைகளை யெடுத்து குறித்த விடத்தில் கட்டி வைக்கவும். காற்று மறைவில் இருக்க வேண்டும்.

(3) கீல் வாய்வு முதலிய சகல அவயவங்களின் வலியையும் விவர்த்திக்கும் கிராவி புகை:— கொச்சி இலை, சதகுப்பை விதை,

சீமை அழுவளி விதை இவைகளை ஜலத்தில் கொதிக்க வைத்து ஆவியை அதற்குரிய முறைப்படி புகை பிடிக்க வேண்டும்.

(4) கீல் வாய்வுக்கு:— மனத்தக்க இலைகளை ரெருப்பில் வரட்டி மேலே வைத்து கட்டவும்.

(5) பிசின் பட்டையை அறைத்து துணித் துண்டொன்றில் தடவி மேலே பற்று போட்டுக்கட்டவும். முழங்கால் வலி முதலிய எல்லா வளிகளையும் கண்டிக்கும்.

(6) முழங்கால் வளிக்காக, வேப்பத்துளிரும், வேப்ப மரத் திரை உட்பட்டையும் எடுத்து ஜலத்தில் தடிப்பாயறைத்து இளஞ் சூட்டிலேயே வலி மீது தடவி விடவும்.

(7) முழங்கால் பிடிப்பு, கீல்வாய்வு, இடுப்பு வலி இவைகளை போக:— பகுத்திக்கொட்டையை இடித்தறைத்து கொஞ்சம் தண்ணீரில் கொதிக்க வைக்க வேண்டும். வெத்து போளவுடன் அதை அறைத்து பிலிகளாகத்தட்டி, எள் 1க்கு இருமுறை அவற்றை சற்று அணலினால், ரூட்டெற்றி கட்டி விடவும், சிலகாட் களில் உபாறை நீங்கி விடும்.

(8) கீல் வாய்வுவளிகளுக்கு:— பசுவின் புதிய சாணத்தை கரையில் எரித்து வலி, வீக்கமுள்ள விடத்தில் வைத்துக் கட்டி விடவும்.

(9) முழங்கால் வலியைத் தீர்க்கும்:— அருளி இலைகளை ஜலத்தில் காய்ச்சி நிறகு அவற்றை அறைத்து கல்லெண்ணெயில் கலக்கி பூசவும்.

(10) ஆட்டுப்பூங்கை 2 பங்கு, வாதகோதுமை மாவு ஒரு பங்கு இந்த இரண்டையும், காடியிலும் ஆமணக்கெண்ணெயிலும் சேர்த்து மேலுக்குப் பூசவும்.

(11) வாதகோதுமை மாவு, சீமை துத்தி விதை, இந்த இரண்டையும் அறைத்து தேனில் கலந்து பூசவும். குளிர்ச்சியிலால் ஏற்படும்படியான கால் விரல்களின் வலியை சிவர்த்தித்து விடும்.

(12) முருங்க விதையை அறைத்து, ரூட்டென் வலியுள்ள விடங்களில் தடவி விடவும். துடை முழங்கால் வலியை சொஷ் தப் படுத்தும், கான்பட்ட வலியும் தீரும்.

(13) முழங்கால் கள்ளிப் பட்டையை நீளத்து வலியுள்ள இடத்தில் அல்லாம் பட்டையும் வைத்துக் கட்டி, வரவும். எல்லித வலியையும் சீக்கிரத்தில் போக்கி விடும்.

(14) நுட்டெனின் வலியை நீக்கும்:—

தோள் உரித்த என்னு, சீமை சாமந்திப் பூ, முறைமே தோலா ஒன்று, ஆமணக்குப் பருப்பு 6 மாஷா தண்ணீர் விட்டபிறகு மேலுக்குப் பூசவும்.

(15) வாயுவின் விதை, சுக்கு, இந்திரசண்டையும் அறைத்து கல்லெண்ணெயில் கலந்து, சற்று சூடு காட்டி, வலிக்குத் தடவவும்.

(16) கால் வலிகளில் ஏற்படும்படியான வலிக்கு:—ஆமணக்கு இலைகளை வேகவைத் தறைத்து வலியுள்ள இடங்களில் நெல்லாம் பூசி வரவேண்டும்.

(17) பால் சாம்பிராணியை அறைத்து பின்னர் அதை, கொஞ்சம் போல் வறுத்து, வஸ்திரத்தில் கட்டி, ஒற்றடம் கொடுத்து வந்தால், வலியை நீக்கி விடும்.

(18) பால் சாம்பிராணியை அறைத்து பின்னர், அதை கொஞ்சம் போல் வறுத்து, வஸ்திரத்தில் கட்டி, ஒற்றடம் கொடுத்து வந்தால், வலியை நீக்கி விடும்.

(19) சவர்க்காரத்தையும் மருதோன்றியையும் தண்ணீரில் அறைத்து மேலுக்குப் பூசவும். சிலர், அதில் குமட்டிகையச் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்வர்.

(20) முழங்கால் வலிக்கு:—

மருதோன்றி இலை, ஆமணக்குத் தலை இரண்டையும் அறைத்து, கெருப்பு காட்டி, முழங்கால்களின் மேல் கட்டவும்.

(21) இடுப்பு வலி, முதுகு வலி முதலியன தீரும்:—

கல்ல வெள்ளை செடியின் பட்டை மேல் தூருத்து வரும்படியான கறுப்பை அப்படிப் படுத்தி, உன்வில் இருக்கும் படியான பட்டையை கிழலில் உலர்த்தவும். அதன் பிறகு, அதனை இடித்து ஜலத்தில் வேக வைத்து, அதன் எடைக்கு சர்க்கரையைச் சேர்த்து அதிகாலையில் ஆகாரம் அருத்து முன் 5 திரம், சோம்பு கடியாத துடன் கொடுக்கவும்.

(22) விரல் வாயுவுக்கு:—

ஆட்டுப் புழுக்கைகளை அறைத்து, தேனில் குழைத்து பூசி வரவேண்டும்.

(23) கால் சேர் சுக்கை என்றும் அறைத்து அதில் 1 தோலா சசத்தைப் போட்டு, கல்வத்தில் மீண்டும் செவ்வனே அறைத்த பின்பு, மேலுக்குத் தடவவும்.

(24) வாயுவு வலிகளுக்கு:—

மருங்க இலை, ஜலத்தி லறைத்து சூடு காட்டி தடவவும்.

(25) சிதளத்தின் மேல் உண்டான வலிக்கு:—

சுக்கு, அழுக்கிராக் கிழங்கு சம எடைவிலேறித்து என்றும் அறைத்த பின்னர் பற்று போடவும்.

(26) வாயுவும், கபமும் சம்பந்தப்பட்ட வலிகளுக்கு:—

ஆமணக்குப் பருப்பு, இத்துப்பு, சிசின் பட்டை இவை வகைக்கு தோலா 1, பெருங்காயம் மாஷா 6, கோதுமை மாவு $\frac{1}{8}$ சேர் எல்லாம் அறைத்து ரொட்டியாகத் தட்டி, அதன் ஒரு பக்கம் தட்டில் கட்டி இளஞ் சூட்டிலேயே வலியிது கட்டி விடவும்.

பாம்புக் கடிக்கு

(1) சமுத்திரப் பச்சையை அறைத்து இரண்டு கண்ணி மைகளிலும் மைமிடுவது போல் பூசவும்.

(2) இரண்டு திரம் படிக்காரத்தை தண்ணீரில் அறைத்து குடிக்கச் செய்யவும்.

(3) கார்த்தம் தகரை 1 தாம், மிளகாய் $\frac{1}{2}$ தாம் சேர்த்து தின்ன வேண்டும்.

(4) வேப்பம் பருப்பும், எட்டிக் கொட்டையும் சேர்த்து அறைத்து பாம்பு திண்டிய இடத்தில் பூசவும்.

தேள் கடிக்கு

(1) ஒருவருக்கு 40 இடங்களில் ஏக காலத்தில் தேள் கொட்டியதாயும், விஷம் திண்டியவர் உடனே ஒரு குமட்டிப் பழம் அருந்தியதன் கிமித்தம் அந்த விஷம் இறங்கி விட்டதாகவும் வைத்திய சிபுனரொருவர் வரைந்துள்ளார்.

(2) எந்த தோரீடத்தில் தேனே அடித்து எரிக்கப்படுகிறதோ, அந்த இடத்திலுள்ள தேன்கள் அந்த இடத்திலிருந்து ஓடியே விடும்.

(3) பெருங்காயம், அரிதாரம், துருங்கு சாற்றில் மேற் கூறிய இரண்டும் அறைத்து, மாத்திரைகள் தயார் செய்து கொள்ளவும். எந்த இடத்தில் தேன் கொட்டுகிறதோ, அந்த இடத்தில் அந்த மணியை ஜலத்தில் அறைத்து பூசவும்.

(4) கொட்டு வாயின் மேல் வெங்காயப் பல்லொன்றை தேய்த்து, கொஞ்சம் வெல்லத்தையும் உள்ளுக்குள் சாப்பிடக் கொடுக்கவும்.

(5) தேன் மெழுகை எரித்து தேன் கொட்டுவாயின் மேல் அதன் புகைப் படும்படிச் செய்தால், விஷம் இறங்கி விடும்.

(6) மூக்கோட்டை இலையை, காயுருவி இலையுடன் சேர்த்து கொட்டு வாயின் மேல் தேய்க்கவும்.

(7) சாணிப் பூழுவை அறைத்து கொட்டு வாயில் தேய்க்க, விஷம் இறங்கி விடும்.

குளசி விஷத்திற்கு

(1) இஸ்கோல் வினையை முழு வினையாகவே காடியில் ஊறப் போட்டு ஊறின காடியை எடுத்துக் குடிக்கவும்.

(37) சுயைப்பிடித்து அதன் மேல் அதாவது கொட்டு வாயின் பேரில் தேய்த்தாலும் விஷம் இறங்கி விடும்.

(38) தேனைக்குடித்து தேனையே கொட்டு வாயின் மேல் தடவவும்.

(39) மனத்தக்காளி இலையை காடியி் ஊறத்து பூச வேண்டும்.

(40) வெய்யை 21 தடவைகளில் கழுவி விட்டு கொட்டின விடத்தில் தடவ விஷம் போய் விடும்.

(41) அந்த விடத்தை குடானவெற்றிரைக் கொண்டு 2, 3 தடவை தேய்த்து கழுவவேண்டும். புதிதாய் அறைத்தெடுத்த மல்லியின் சாற்றை காடியிற் சேர்த்து பூசவும். கற்பூசத்தை காடியிற் கலத்தும் உபயோகிக்கலாம்.

(42) கந்தகத்தை அறைத்துப் பூசவும். என்னை காடியிற் சேர்த்து தறைத்துப் பூசவும். புமொசாணத்தையும் கொட்டு வாயின் மேல் பூசலாம்.

(43) கந்தகத்தையோ அல்லது வெள்ளைப்பூண்டையோ எரித்தால் அந்தவாசனைப் பட்டதாய் குளவிகள் அதனாய் விடும்.

வெறிநாய் கடித்து சிதிகை

(1) வெறிநாய் கடித்தவனது நிலைமை சிறிது கோத்திற்குப் பின் ஒருவித மூளைக் கோளாறையுண்டாக்கக் கூடியதாகி விடும். அச்சநிலைமை அதிகரித்து விடுமாயின் அப்பால் அவனது ஜீவித்திருத்தலுக்குக் குறைந்த கம்பிக்கையே ஏற்படும். ஆதலால் அவனது சிதிகை விஷயத்தில் அலட்சியம் செய்யலாகாது. 40 கால வரையிலும் அந்த புண்ணை எதிர்ப்படுவதற்கு விடக்கூடாது. கடிவாய்க்கருகில் கொம்புவைத்து உறிஞ்சி விஷத்தை வெளியாக்கி விடவேண்டும், வெள்ளைப் பூண்டை காடியில் வைத்தறைத்து மூலம் பூசவேண்டும். குளிர்ந்தகாற்றை விட்டும் கோயானியை பாது காக்கவேண்டும், கோயானி தண்ணீரைக்கண்டு பயந்தால் அப்பால் அவன் ஜீவிப்பான் என்பதற்கு கம்பிக்கை இல்லை.

(2) பெரிய கறுவளி ஒரு தோலா எடை, மிளகு 15 இந்த இரண்டையும் அறைத்து வடிகட்டி காயக்கடியுள்ள வறுத்து கொடுத்துவந்தால் சீச்சலமான குணமவிற்கும். இது பரிமுறையும் பரிட்சிக்கப்பட்ட அதுபல முறை.

(2) வெங்காயத்தை இடித்து தேனிற் கலந்து காயத்தின் மேல் பூசிவந்தால் காயம் அதிகரிக்காதிருக்கும்.

(3) எட்டிக் கொட்டையை மணித மூத்திரத்தில் வேக வைத்து அறைத்துப் பூசவும். அல்லது

அதை சாராயத்தில் கொதிக்க வைத்து தோலை சீக்கி ஒரு ரத்தி தின்னவும் அல்லது

தண்ணீரில் கொதிக்கவைத்து இடித்து, அத்துடன் கொஞ்சம் சர்க்கரையைச் சேர்த்து தின்னவும்.

(4) கசப்புக் கோஷ்டம் 3தாம் - இடித்து தண்ணீரில் கொதிக்கவைத்து, ஒருதாம் தண்ணீர் மீதியாயிருக்கும் போது அதை வடிகட்டி குடிக்க வேண்டும்.

(5) கடித்த காயின் காக்கை அறுத்து, அதைச் சுட்டு அதன் சாம்பலை காயத்தின் மேல் தூவவேண்டும். புண் ஆறியிடும. விஷத்தின் வேகமும் குன்றி விடும்.

(6) திராட்சைக் கொடியின் இலைகளை கிள்ளி விட்டு, அதன் மலையை எரித்து அதன் சாம்பலை காயிற் சேர்த்து காயத் தின் மேல் பூசவும்.

(7) சிவப்புக்கம்பளியிலிருந்து கடலை மாவிற்கு துட்பமான 7 துண்டுகளாக வெட்டியெடுத்து ஒவ்வொரு துண்டையும் பனை வெல்லத்தில் வைத்து 7 மாதங்களுக்கி காய்கடித்தோருக்கு கொடுத்து வரவேண்டுமென ஆங்கில டாக்டரொருவர் கூறியுள்ளார்.

(8) கடித்த விடத்திலிருந்து இரத்தத்தை உறிஞ்செடுத்த பின்னர் கடுகை அறைத்து மூலம் பூசவும்.

(9) எருக்கன்பாலை காயத்தின் மேல் தடவவும்.

(10) கடித்த காயின் உரோமங்களை எரித்து அதன் சாம்பலை காயத்தின் மேல் தூவவும்.

(11) காய் கடிக்கு கருஞ்சீரகத்தின் லேகியத்தை தின்றால் விஷம் நீங்கியிடும.

(12) முள்ளங்கித்தழைகளை நெருப்பில் வாட்டி கடித்த விடத்தில் வைத்துக் கட்டலாம்.

(13) எலிப்புழுக்கையை அறைத்துப் பூசலாம்.

எலி கடிக்கு:—

(1) காட்டு வாகையின் விதை, வேப்பம் இலை, கழற்சிப் பருப்பு, எல்லாம் சம எடையிற்கொண்டு பசு மூத்திரத்திலறைத்து உருண்டைகள் உருப்படிக்க கொள்ளவும், அவசியமேற்பட்டபோது ஜலம்விட்டுத் தேய்ந்து மேலுக்குத் தடவ வேண்டும்.

(2) பசுமாட்டின் கொழுப்பை பெடுத்து விட்டில் எரித் தால், அந்த வாகையை முகர்த்த எலிகள் யாவும் ஓட்டம் பிடித்து விடும்.

மற்ற விஷக்கடிக்கு

(1) மனிதன் மனிதனை கடித்து விட்டால் நோயிதழைக்கி தேனிலறைத்து அந்த விடத்தில் மூலம் போடவும்.

(2) பூனைக்கடிக்கு:— என்னு, சுத்த ஜலத்தி லறைத்து கடித்த விடத்தில் பூசவும். பொதினாணையும் தின்னக் கொடுத்து அதை மேலுக்கும் பூசலாம்.

(3) கீரட்டைக் கடியாலேற் படும் காயத்திற்கு கஸ்கஸாவை அறைத்துப் பூசவும்.

(20) வெங்காயம், வெள்ளைப் பூண்டு இவ்விரண்டையும் அறைத்து பூசலாம்.

குரங்கு கடித்தால்:—

(1) மூர்தார் சிங்கு, உப்பு, இக்க இரண்டையும் தண்ணீர் விட்டறைத்து பூசவும்.

(2) குரங்குக் கடியின் காயம் அதிகமாக வீருத்தால், கருஞ் சீரகம் தேனிலறைத்து பூசவும். வெங்காயத்தை அறைத்தும் பூசலாம்.

கொடி உபத்திரவத்தைத் தடுக்க

(1) குதிரையின் வால் ரோமங்களை படுக்கும் அறையின் வாயில் கட்டித் தொங்கவிட்டால் கொடிகள் அங்கே அதிகம் வரா.

(2) உம்மி, மைசாட்சி, கத்தகம், கலைமான் கொம்பு இவற்றின் புதை காற்றத்திற்கும் கொடிகள் ஓடிப் போம்.

பிரமேகத்திற்கு பேதி மருந்து.

(1) ரசம், செல்லிக்காய் கத்தகம் வறைக்கு ஒரு மாஷா. காலி 3 மாஷா உள்பசுமை கீக்கப்பட்ட கேர்வாளப் பருப்பு 3 மாஷா—முதலில் ரசத்தையும் கத்தகத்தையும் சேர்த்து செவ்வகை அறைத்த பின்னர், இதர சரக்குகளை ஜலத்தி லறைத்து பில்லையாகத் தட்டி அதை ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து தண்ணீர் சிறப்பி, அடுப்பி லேற்றி எரிக்கவும் தண்ணீர் முழுதும் சுண்டிப்போன போது அதை எடுத்து 3 ரத்தி எடை 3 சேர் பாதுடன் உட் கொள்ளவும்.

(2) ரசம் கெல்லிக்காய் கந்தகம், இவை இரண்டும் வகைக்கு ஒரு மாஷா, வெங்காயம், சித்தரை மூலம் மிளகு, சுக்கு, வகைக்கு 3 திரம்—சேர்வானம் (உள் இலையை கீக்கி) பருப்பு 11 திரம் வீர சோற்றின் ஜலத்தில் 7 ஜாமம் அரைத்துக் கொண்டு வேலை 1க்கு 1 ரத்தி முதல் 2 ரத்தி வரையில் சுத்தகண்டு ஷர்பத்துடன் சாப்பிட்டு வேண்டும்.

(3) சுத்தி செய்த சேர்வானம் ஒரு திரம், கெல்லிக்காய் கந்தகம் 4 திரம், இடித் தலைத்து எதுமிச்சம் சாற்றில் 7 ஜாமம் அரைத்து கடலை யளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். உட்கொள்ளும் அளவு ஒரு கண்டி முதல் மூன்று கண்டி வரையில் தேக வாக்கிற் கேற்றவாறு.

(4) சுத்தி செய்த சேர்வானம் பிஞ்சு கடுக்காய் வகைக்கு ஒரு பருகு. மாவு இரண்டு பருகு, எதுமிச்சம் சாற்றில் கன்றம் அரைத்து, துப்பாக்கி ரவைகளின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து, ஒரு மாத்திரை தின்னவும்.

குமட்டி ஷர்பத்து :—

(1) குமட்டிக் காயின் தோலை துண்டு துண்டாக வெட்டி இரும்புக்கு ஜலத்தில் கொதிக்கப் போடவும், போட்ட ஜலம் இரண்டு பங்களில் சுண்டிப் போனவுடன் அதை வடிகட்டி வெள்ளை சர்க்கரை அதன் சம எடையில் சேர்த்து பாகாக காய்ச்சிக் கொள்ள வேண்டும்.

வேலை 1க்கு 12 திரம் முதல் கொண்டு 20 திரம் வரையில் பருகவும்.

(2) குமட்டி வேர் 1½ சேர், இடித்து 2 சேர் ஜலத்தில் காய்ச்சவும். ஜலம் சுண்டி ½ சேர் அளவிற்கு வத்தவுடன் அதை அடுப்பி லிருந்து கீழே இறக்கி, கன்றம் பிசைத்த பின்பு வடிகட்டி, ½ சேர் ஆமணாக் கெண்ணெயில் சேர்த்து இள நெருப்பில் எரிககவும். தண்ணீர் பூராவும் சுண்டி எண்ணெய் தங்கி விட்டதும் அதை எடுத்து ஒரு சீசாவில் அடைத்துக் கொண்டு காலைக் கமர் ஒரு தாம் அளவில் பகல் பாலில் சேர்த்து குடிக்க வேண்டும். ஆகாரம் பரித சம்பந்தப்பட்ட கிச்சடி சாதம். ஆண்டவனருளால் 2, 3 நாடில் விபாதி தீர்த்து விடும்.

ஞானம் :—

(1) நாமரை இடித் தலைத்து முதல் தினத்தில் ஒரு மாஷா, இரண்டாவது தினத்தில் 2 மாஷா இதே விதமாக ஒவ்வொரு காலும் ஒவ்வொரு மாஷா அதிகப்படுத்திக் கொண்டு 7 நாள் வரையில் சாப்பிட்டு வரவும். 7 நாள் முடிவடைந்தவுடன் விட்டு விட வேண்டும்.

இந்த ஒரு வாரத்திற்குள் பல தடவைகளில் வெளிக்குப் போகவும், வாக்கி யெடுக்கவும் சேரிடச் சுடும். புனிப் பொன்மைத் தவிர இதற்கு வேறு யாதொரு பத்தியமுமில்லை.

(2) எருக்கன் விறகை எரித்து சாம்பலாக்கி, அதனை அரைத்து, சம எடையுள்ள சர்க்கரையிற் சேர்த்து ½ தாம் முதல் 2 தாம் வரையில் கெய்லிற் கலத்து 7 நாள் வரையில் சாப்பிட்டு வர வேண்டும். ஆகாரம் தனியே ஆட்டிவைக்கிக் குர்மா.

(3) பத்தருசுச் செடியின் சிவந்த புஷ்பங்களின் விதைகளை வேண்டிய மட்டில் கொண்டு வத்து வறுத்து, அவற்றின் மேல் உள்ள தோலை அப்புறப் படுத்திய பின்னர் பருப்பை அரைத்து அதற்குச் சம எடையில் சர்க்கரையைச் சேர்த்து, அனுதினமும் ஒரு தாம் எடை சுத்த ஜலத்துடன் சாப்பிட்டு வரவும்.

(4) மஞ்சட் கடுக்காய்த் தோல், பெரிய கடுக்காய்த் தோல், பிஞ்சு கடுக்காய், மிளகு இவை தனித்தனியே 2 மிஸ்கால், ரசம் 7 மிஸ்கால்—சர்க்கரை 16 மிஸ்கால், எல்லாம் இடித் தலைத்து உபயோகித்து வரவும்.

பிரமேக நிவாரணி :—

(1) மஞ்சட் கடுக்காய்த் தோல், பிஞ்சு கடுக்காய்த் தோல், பெரித்த திருசு, சுட்ட மஞ்சள், பலகாணை, எல்லாம் சம வகை யில் வாக்கி எதுமிச்சம் பழச் சாற்றிற், இரும்புப் மாத்திரைத் தில், 16 ஜாமம் அரைத்து, மிளகின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து தினத்தோறும் ஒரு மாத்திரை வெற்றிலையில் வைத்து 15 நாள் சாப்பிட்டு வருவதுடன் இதே மாத்திரையை அரைத்தும் ஒரு துணித் துண்டில் தடவி காயத்தின் மேல் போடவும்.

(2) ஐளசி பச்சை இலைகள் தாம் 4 துருசு பச்சை தாம் 1, இந்த இரண்டையும் அறைத்து இலக்கை பழத்தில் அளவில் மாத்திரைகள் செய்து காலையில் ஒருமாத்நிரை வெங்கிருடன் சாப்பிடவும். ஆகாரம்: வெப்போடாத கிச்சடி சாதம்.

பிரமேகத்திற்கு

(1) எருக்கனலேர் 5 திரம், மிளகு 2½ திரம், இரண்டையும் இடித்தறைத்து பனியெல்லத்தில் சேர்த்து, சோளமணி அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து காலையில் ஒருமாத்நிரை சாப்பிட்டுவரவும். பத்தியம்:—புளிப்பு-வாயுவு பதார்த்தங்கள்.

(2) பிஞ்சுக்கடிகாய் 4 தாம், மிளகு ஒருதாம் துருசுபச்சை ½ பாகம் கொடி. எலுமிச்சம் சாற்றில் அறைத்து காட்டு இலக்கையின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து, காலையில் ஒவ்வொரு மாத்திரை கொஞ்சம் எலுமிச்ச சாற்றுடன் விழுங்கிவிடவேண்டும்.

ஆகாரம்:—பயிற்றம் பருப்பு சாப்பிட்டுப்போது தொண்டையில் புனைச்சல் ஏற்பட்டால் கொஞ்சம்மேல் குடிக்கவும். சிலமுறைகளில் கடுக்காய் பிஞ்சு 20 தோலா துருசு ஒரு தோலா சேர்க்கலாம் என்றும் வரையப் பட்டிருக்கிறதே தவிர மிளகு என்பதே கிடையாது.

(3) சுத்தசெய்த ஸங்கியா (எலி பாஷாணம்) ஒரு டாண்ட், சுத்தகாம்பு 6 டாண்ட், கையாந்துரைச் சாற்றில் அறைத்து கட்டிய வளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக்கொள்ளவும். முதல்கான் ஒரு மாத்திரை காலையிலும் ஒரு மாத்திரை சாயங்காலமும் கொடுக்கவேண்டும். ஆனால் கோயாவிற்கு திரேக திடகாத்திரமும் மருத்து சாப்பிட்டுப்போது பருவம் குளிர்ச்சியாய் மிருக்கவேண்டுமென்பதே ஷாத்து. அப்படியிருந்தால் மூன்றாவது கான் இரண்டு மாத்திரை காலையிலும் இரண்டு மாத்திரை மாலைகளும், 14 கான் இதே பிரகாரம் கொடுக்கவும். கூடுமானால் 21 கானும் கொடுக்கலாம். கோயாவிற்கு பலஹீன மேற்பட்டு வேளிறு காலமாயிருந்தால், ஒரே மாத்திரை கொடுக்க வேண்டும். (அதாவது காலையில் 1 மாலை 1) ஒவ்வொரு ஏற்படுகால் வெற்றிலை அறுகம் அருக்தலாம். கடுமையான பத்தியத்தையும்கடையிடத்தல் அளவியம்.

பிரமேகத்திற்கு ரசமாத்திரை

(1) ரசம், காசுட்டி, வாய்விளங்கம், ஓமம், மிளகு இலப்பம்பூ, இவைவகைக்கு ஒருபங்கு (சமஎடை) யாவத்தையும் கன்றாய் இடித்தறைத்து, இலக்கையளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து வேலை 1க்கு ஒருமாத்நிரையாக காலையில் ஜலத்துடன் சாப்பிடவும். ஆகாரம்: கோதுமை ரோட்டி.

(2) சுத்தி செய்த ரசம், அக்கிராகாரம், ஓமம், எல்லம் பிளின்இவை யாவும் வகைக்கு 6 மாஷா, சேங்கோட்டை, 7 உருப்படி பனைவெல்லம் சரக்குகளுக்குச் சமஎடை, எல்லாம் இடித்தறைத்து வெல்லத்தில் சேர்த்து, 14 மாத்திரைகள் தயாரித்து காலையில் ஒருமாத்நிரை வீதம் பசுமோருடன் உட்கொள்ளவேண்டும்.

(3) மேகவெள்ளியின் கீழ்த்தம் ஏற்பட்டுள்ள மூட்டு வலிக்கும் பிரமேகத்திற்கும் ஆரிய சிகிச்சை:— ரசம் குராசானி ஓமம்- மேல்தோல் கீக்கிய சேங்கோட்டை, அசும்தா ஓமம், வகைக்கு 6 மாஷா பனைவெல்லம் 2 தாம் எல்லாம் இடித்தறைத்து காட்டிலக்கைப் பரிமாணம் மாத்திரைகள் செய்து தினந்தோறும் ஒவ்வொருமாத்நிரை | தொண்டையிலடக்கி, ஜலத்துடன் மேல்காமலேயே விழுங்கி விடவேண்டும். மாத்திரை பல்லில் படக்கடாது. ஆகாரம்: கிச்சடி, குடிசா, கோதுமை ரோட்டி. பத்தியம் புளியும் வாயுபதார்த்தங்களும் கூடாது. ஐத்தேதினத்தில் வியாதி தீர்ந்து விடும். இதனை பேதிக்குச் சாப்பிட்டபின்னரே உபயோகிப்பது மேலாகும்.

(4) சாதிலிங்கம் அரிணி ரசம் தனித்தனியே 2 தாம், ஓமம் 5 தாம். ரசத்தையும் ராதிலிங்கத்தையும் ஒன்று படுத்திவிட்டு இச்சரக்கு இரண்டையும் இடித்து, அப்பால், கன்கையும் கலவத்தில் இஞ்சி சாற்றை விட்டுச் செவ்வனே அறைத்து 7 மாத்திரைகள் செய்து தினந்தோறும் ஒரு மாத்திரை உட்கொள்ளவேண்டும். இது கணுவாயுளையும் போக்கும்.

(5) சுத்தகாம்பு, தோராதிலை வகைக்கு ஒருதாம் ரசம் 4 மாஷா மூன்று வருஷத்திய பழைய வெல்லம் 3 தாம் இந்த கான்கு சரக்குகளையும் சேர்த்தறைத்து 7 மாத்திரைகள் செய்து பிரமேகத்திற்கு உபயோகிக்கவும்.

(6) பிரமேகம் தீரும், தாதும் விர்த்திக்கும். ரசம், கந்தகம், அரிதாரம், வெங்காரம், இவையாவும் வகைக்கு ஒரு திரம், மிளகு 2 திரம் எல்லாம் இடித்ததைத்து எழுபிச்சம் சாற்றைச் சேர்த்து மாத்திரைகள் தயாரித்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகிக்கும் விதம்:- வேளை 1க்கு ஒரு மாத்திரை விதம் காலி, மாலை உட்கொள்ளவும்.

(7) பிரமேகத்திற்கு: ரசம், ஜலம், கிளிப்பனங்கிழங்கு, வகைக்கு 2 திரம், சேங்கொட்டை 1 திரம், பனைவெல்லம் 16 திரம் இவைகளினால் 11 மாத்திரைகள் தயாரித்து வேளை 1க்கு ஒரு 1மாத்திரை மோருடன் சாப்பிடவும்.

பிரமேக கவசாயம்

(1) கச்சூல் பட்டை, குமட்டி வேர், கருவேலன் மாத்தின் இளங்காய் சிறு குமட்டி இலை வேர் உள்பட பழைய பனைவெல்லம், இவை யாவும் வகைக்கு 1/2 சேர் எல்லாவற்றையும் 3/4 படி ஜலத்தில் காய்ச்சவும். ஜலம் சுண்டி கால் பாசத்திற்கு வந்தபோது, அதை வடிகட்டி புட்டியில் போட்டு வைக்கவும். இதனை 7 பாகமாக வகுத்து, வேளைக்கு 1 பாகம் கொடுத்து வரவும். இது ஒழுட்டி உண்டாக்காது. வெள்ளை வெட்டையைப் போக்கி விடும். இதற்கு யாதொன்றும் பத்திய மில்லை, அதுபல முறை எனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

(2) வாகையின்பட்டை, கருவேலன்பட்டை, வேப்பம்பட்டை, இவை வகைக்கு 1 1/2 சேர், இயற்கை பெல்லம் 7 கலயங்களுக்கு குரிய ஜலத்தில் கொதிக்க வைக்கவும். ஒரு கலயம் தண்ணீர் அளவிற்கு வந்தவுடன் அதை வடிகட்டி புட்டியில் அடைத்து வைத்திருந்து, தினத்தோறும் 1/2 சேர் கோயாளிக்கு பருகத்தரவும். ஆகாரம்: கொண்டக்கடலை ரொட்டி ஒரு வாரம் சாப்பிடவும்.

(3) ஆலத்தழைகளை எரித்து அவற்றின் சாம்பலை 2 தம்பிடி எடையில் வெற்றிலையில் வைத்து தினத்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தால், பிரமேக சம்பந்தமான குறைகள் யாவும் கவர்த்தியாய் விடும்.

(4) கல்ல வேளைச் செடியின் இலைகளை அரைத்துப் பங்கா குடிப்பது போல் குடிக்கவும். அரைத்த தழைகளை (காயிற்குத் தால்) அதன் மேல் வைத்துக் கட்டவும்.

(5) ஆலம் பட்டை, அர்கெல்லி மரத்துப் பட்டை தனித் தனியே 5 திரம், மிளகு 3 திரம். 50 தாம் ஜலத்தில் அரைத்து 14 நாள் சாப்பிட்டு வரவும்.

(6) 'ஹன்ஸ்' (ஒருவகைப் புல்) அரைத்துத் தனித் தனியே, இலை சகிதமாய் எரித்து அதன் சாம்பலை 6 மாஷா அளவில், தினத்தோறும் ஒரு தோலா தேனிலோ அல்லது, வெல்லத்திலோ சேர்த்து 7 நாள் வரையில் சாப்பிட்டு வரவும்.

(7) கார்த்தம் தகவா இலை 5 திரம், மிளகு 1 திரம் இந்த இரண்டையும் ஜலத்தில் அரைத்து குடிக்கவும். உப்பில்லாத ஆகாரமே இதற்குரிய பத்தியம்.

(8) முதிர்ந்த யாழ்வுவைச் செடியின் தழைகளை ரோகத்தின் ஆரம்ப கிடைமையில் ஒரு தாம் எடையிலெடுத்து அதை தினசரி தண்ணீரில் ஹைப் போட்டு அத்தண்ணீரை 20 நாள் வரையில் குடித்து வந்தாலே, இவ்வியாதி அற்றுப் போகும்.

(9) குராசானி ஒழம் 2 1/2 மாஷா, சாதிலிங்கன் 5 மாஷா, தருக 2 ரத்தி, அக்கிராசாரம் 5 மாஷா, எருக்கன் வேர் 10 மாஷா எல்லாம் இடித்ததைத்து, இலக்கை மாத்தின் விற்றகு எரியும் கெருப்பில், அரைத்த சர்க்கரையின் பொடியைத் தூசி அதிலிருந்து வெளிவரும் புகையை கோயாளி முகமும்படிச் செய்யவும், புகையும் கோயாளி மீது பட வேண்டும்.

(10) எருக்கன் இலை 21, கடுகெண்ணெய் 1 1/2 சேர் மும்மூன்று இலைகளை எண்ணெயில் எரித்து சாம்பலாக்கிக் கொள்ளவும். இவ் வாய் 21 இலைகளை மூன்று தடவைகளில் எரித்துக் கொண்ட பின் னர், தேன் மெழுகு 6 கூடாண்க் எடையில் கருக்கி, அது உருகி னவுடன் எரித்த சாம்பலை அதில் போட்டுக் கலக்கி, சுளிம்பாகச் செய்து கொண்டு, பிரமேகத்தால் உண்டாகும் புண்களுக்கு தடவி வரவும்.

(11) சாதிலிங்கம், தருக வகைக்கு 2 1/2 தாம், வாய் விளங்கம் 5 மாஷா, எருக்கன் வேர் 10 மாஷா, திடக்காத்திர மூன்று சரீரமாக விருத்தால் 20 மாஷா. எல்லாம் இடித்ததைத்து 6 பில்லைகள் செய்து கொள்ளவும். தண்ணீர் நறுக்காவில் இலக்கையின் விதகை எரித்த கெருப்பின் மீது பில்லையை வைத்து, குடாகு

புகையில் குடிப்பது போலவே குடித்து அதன் புகையை வாயில் அடக்கி விடவும். பிள்ளை சாம்பலாய் விட்டதற்கு பின், அந்த சாம்பலை எச்சலிச் சுலுத்து புண உள்ன இடங்களிலெல்லாம் காலை நேரத்தில் 3 நாள் தேய்த்து வரவும். ஆகாரம்: ரொட்டி, வெய், சர்க்கரையுடன் சாப்பிடவும். இந்த மருந்தை உபயோகிப்பதற்கு முந்தி பேதிக்கு சாப்பிட்டால் கல்லது.

(12) சாதிலிங்கம், அக்ஷிராகாரி, வேப்பம் பிசின், மாசிக் காய், வெங்காயம் வகைக்கு ஒரு தாம் கன்றும் இடித்து, 7 பொட்டலங்களாக மாடித்து, ஒரு பொட்டலத்திலுள்ளதை சுங்காவனில் வைத்துக் குடிக்கவும். இலந்தை மரத்தின் கரியால் நெருப்பாக்கிக் கொள்ளவும். இதற்கிடையே வாய்நி வந்தாலும் பாதக மில்லை. காலை, மத்தியாஹம், மாலை ஆக 3 நாள் 3 நடவைகளில் உபயோகப்படுத்தவும். ஒரு வாரம் இப்படி செய்து வந்தால் போதுமானது. நுக்காளம் எடுத்தால், சம்பக்கி இலைகளை வேகவைத்து அந்த ஜலந்தால் வாய் கொப்பளிக்கவும்.

(13) பிரமோத்திக்கு:—

கழற்சிச் செடியின் பச்சிலைகள், வேப்ப மரத்தின் பசுமை யான இலைகள், தனித்தனியே 15 மாஷா, சியாற்ற 7½ மாஷா இம்முன்றின் சாற்றை எடுத்து, பறங்கிப் பட்டை 4 மாஷாவை அறைத்து அதில் கலந்து குடிக்கவும். இதே மாதிரியாக தினத் தோறும் குடிக்க வேண்டும்; உப்பில்லாத ஆகாரம் உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதே பத்தியம்.

(14) சாதிலிங்கம், படிக்காரம், சிமை அழுவணி விதை துமம், இலை வகைக்கு ஒரு டாங்க, எல்லாம் அறைத்து அரை யரை டாங்க இரண்டு வேலைகளிலும் சுங்காவனில் வைத்து புகையில்லையப் போல், இலந்தை விறகின் நெருப்பில் தூவி குடித்து வர வேண்டும். நிறைந்த காற்று செல்லக் கூடாத கட்டிடத் திசு இருந்தல் வேண்டும் உப்பும் வெய்ப் பசையும் கூடா. சாதாரண ரொட்டியே ஆகாரம்.

(15) குதக காலங்களில் உபயோகப் படுத்தப்பட்ட கண்டி ரத்தை எரித்து அதன் சாம்பலின் நிறைக்கு பனை வெல்லத்தைக்

சேர்த்து இலந்தை யளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து தினத்தோறும் காவையில் ஒரு மாத்திரை சாப்பிடவும்.

பத்தியம்:—அரிசி, ரொட்டி (உப்பும் புளிப்பும் கூடா.)

(16) ரச கற்பூரம், சாதிலிங்கம் தனித் தனியே 6 மாஷா, ஹருசு 3½ மாஷா—தேன் மெழுகு வெள்ளை 2 தாம், பசு வெய் 4 தாம், வேப்பம் இலை சிறிதளவிற்கு.

முதலில் வேப்பம் இலையை இடித்து பிள்ளையாகத் தட்டி அதை வெய்யில் அல்லது எண்ணெயில் போட்டு எரித்த பின்னர் பிள்ளையை அப்புறப்படுத்தி விடவும் அப்புறம் அதில் மெழுகைப் போடவும், அது உருகினதும், பாத்திரத்தை கீழே இறக்கிவைத்து அதில் ரசகற்பூரத்தைப் போட்டு கலக்கவும். அடுத்தாற் போல் சாதிலிங்கத்தையும் அதற்கடுத்த படியாக துருசையும் கலந்து வஸ்திரத்தில் முலாம் பூசி அதை 6 திரிகளாக்கிக் கொண்டு ஒரு திரியை சுங்காவனில் வைத்து குடிக்கவும். இலந்தையின் விறகா லேப்பட்ட நெருப்பே உபயோகித்தல் அவசியம்.

ஆகாரம்:—உப்பில்லாத கஞ்சி 3 நாள்.

(17) கத்த காம்பு, பழைய பாக்கு, தனித்தனியே 2½ தாம் சங்கால் பச்சை 1 தாம் இந்த சாக்குகளை யெல்லாம் ஒருதாம் ஜலத்தி லறைத்து கடுதாசியின் மேல் தடவி எரிக்கவும். எரித்து போன சாம்பலை எடுத்து காயங்களின் மீது தூவி வரவும்.

(18) பழைய செருப்பின் தோல், மஞர் பருப்பு, கடலை (எரித்து) இவற்றை ஒன்றாக அறைத்து காயங்களின் மீது தூவி வேண்டும்.

(19) மஞ்சட் கடுக்காய், வெங்காயம், செல்லிக்காய் எல்லா வற்றையும் எரித்து அவற்றின் சாம்பலை காயங்கள் மீது தூவி வரவும்.

(20) சேம் கொட்டை 7½ தோலா, எள்ளு 12 தோலா பனை வெல்லம் 18 தோலா—ரசம் 86 தோலா, 8 மாஷா. முதலில் சேம் கொட்டையை தனியே அறைக்கவும். பிறகு எள் போட்டு அறைக்கவும். பிறகு வெல்லத்தை போட்டு அறைக்கவும்.

அப்பால் ரசத்தைச் சேர்த்து 9 மாத்திரைகள் தயாரித்து 2 மாத்திரைகள் ஆண்டவன் பெயரால் ஒதுக்கி விட்டு ஒரு மாத்திரையை மேற்கு முகமாக உட்கார்த்து விழுங்கிக் கொள்ளவும். பரிசு ஒன்றைத் தவிர வேறு எதுவும் பத்தியமில்லை.

(21) குமட்டி வேர், முத்தாசிக்கு, தனித்தனியே 2 தோலா, பழைய வெல்லம் 6 தோலா, வெல்லத்தை அடுப்பின் மேல் ஏற்றவும். அது மிருதுவானதும் அதில் முத்தாசி செக்கு அறைத்துச் சேர்க்க வேண்டும். சேர்த்ததும் பாத்திரத்தை கீழே இறக்கி, குமட்டி வேரை யறைத்துச் சேர்த்து, 7 மாத்திரைகள் செய்து கொண்டு, வேளை 1 க்கு ஒரு மாத்திரை கொடுத்து அதன் மேல் கொஞ்சம் வெங்கீர் குடிக்கச் செய்யவும். சிலருக்கு இதனால் மல விருத்தி ஏற்படும்—ஆகாரம் கடலை ரொட்டி கெய் தாராளமாகச் சேர்க்கலாம். இந்த மருந்தை நாஜுக்கான சரீரமுள்ளவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம். ஏனைய மருந்துகளால் குணம் மேற்படாவிடில் கொடுக்கவும்.

பிரமேகத்தையும் அது சம்பந்தப்பட்ட காயங்களுக்கும்

(1) கடுக்காய், தான்றிக்காய், கோரைக் கிழங்கு, கஸ்தூரி மஞ்சள், குமட்டி வேர், இவை யெல்லாம் வகைக்கு 1½ தோலா எல்லாம் இடித்து மூன்று பங்குகளாகச் செய்யவும். ஒரு பங்கை ஒரு சேர் ஜலத்தில் ஊறவைத்து காலைமீல் காய்ச்சவும். அரை பங்கு ஜலம் சுண்டிப் போன போது அதை வடிகட்டி குடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(2) குராசானி ஒமம் 9 மாஷா ரசம் 4 மாஷா ஒமம் 1½ சேர் சேங்கொட்டை ½ சேர். பழைய வெல்லம் ½ சேர். குராசானி ஒமத்தையும் ரசத்தையும் ஒன்றாக 2 ஜாமம் வரையில் அறைக்க வேண்டும். அப்பால் ஒமத்தைச் சேர்த்து, ஒரு ஜாமம் அறைக்கவும். பிறகு 2, 3 சேங்கொட்டைகளைச் சேர்த்து 2 மணிவரையில் இடித்து பிறகு வெல்லத்தை சேர்த்தும் 2 மணி வேரம் இடித்த பின்னர் எல்லா சரக்குகளி லிருந்தும் 15 மாத்திரைகள் உருட்டிக் கொள்ளவும். முதலில் ஒரு மாத்திரையை என்னு துண்டுகளாகச் செய்து என்னு புறங்களிலும் விசி எறியவும்.

பிறகு காலைமீல் ஒரு மாத்திரை மாலைமீல் ஒரு மாத்திரை ஒரு குவளை யளவிற்குரிய புளிப்பு மோரில் கலந்து கொடுக்கவும். குடித்தானதும் மேற் கொண்டும் கொஞ்சம் புளிப்பு மோரை குடிக்கக் கொடுக்கவும். புளிப்பும் வாயுவு பதார்த்தங்களும் சேர்க்கலாம். ஆனால் பாலும் தித்திப்பும் கொடுக்கக் கூடாது. 3 நாட்கள் குப்பின் ஒமட்டல் ஏற்படுங்கால் மருந்தை நிறுத்தி வைக்கலாம். ஏனெனில் வாந்தியின் மூலம் வயிற்றிலுள்ள தூர் கீர் முதலியன யாவும் வெளிவந்து விடும். அதன் பிறகு காட்டு இலத்தையின் வேரையோ அல்லது சம்பங்கி இலைகளையோ ஜலத்தில் கொதிக்க வைத்து அந்த ஜலத்தால் வாய்கொப்பளிக்கவும். 7 நாட்களில், புண் ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் சொஸ்தமாகி விடும். சேங்கொட்டையை உபயோகிக்குமுன் அதன் மேல் தோலை அப்புறப்படுத்தியே உபயோகிக்க வேண்டும்.

(3) என் பட்ட வாய்வுக்கு இந்த பாகம் இன்றியமையாததாகும் :— ரசத்தை ஒரு மாஷா எடுத்து பனை வெல்லத்தில் வைத்து உருண்டையாக உருட்டி விழுங்கி விடவும். இதே விதமாக 3 நாள் உட்கொண்டு வரவேண்டும். ஆகாரம், கடலை ரொட்டியை அதிகச் செய்யுடன் புசித்தல் வேண்டும்.

(4) வாய்வு கோளாறுகளையும் மலத்தின் மூலமாய் வெளியாக்கி விடும் :—முத்தாசி செக்கு ஒரு தாம் ஆலம் கீரி தோலா 1½, சுத்தி செய்த கேர் வாஸப் பருப்பு 3½ இவற்றை அறைத்து 3 பாகமாகச் செய்து அந்த மூன்றையும் 3 மாத்திரை களாக்கிக் கொண்டு 3 நாள் உபயோகிக்க வேண்டும். முதல் மாத்திரையில் பல தடவைகளில் மலப்போக்கு ஏற்படும். அதிக காய்க்கையும் தெரியும். ஆனால் இது குடல் லேமையும் கிவர்த்திக்கும். கெய் ரொட்டி உப்பில்லாமற் கொடுக்கவும். உஷ்ணம் அதிகமாகத் தெரிந்தால் தயிர் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். இந்த மருத்தினால் சிற்சில சுமயங்களில் வாந்தி மூலம் இரத்தமும் வெளியாகும். அச்சந்தர்ப்பத்தில், சிரகத்தை வறுத்து தயிருடன் கலந்துகொடுக்க வேண்டும் வாந்தி நின்று விடும்.

(5) பிரமேகத்திற்கு கைகண்ட மருந்து :— தாமரையை இடித்ததை முதல் நாள் ஒரு மாஷா இரண்டாவதுநாள் இரண்டு மாஷா இதே பிரகாரம் 9வது நாள், 7 மாஷா உட்கொண்டு. நிறுத்தி

விடவேண்டும். வாரத்திற்கொரு தடவை, வெளிக்குப்போய் வாந்தியும் ஏற்படும். ஆனால், அது, முதல் வாரத்திலே அல்லது மத்தியிலே அல்லது கடைசியிலே என்று சொல்வதற்கில்லை. புளிப் பொன்றைத் தவிர வேறு பத்தியம் கிடையாது.

(6) கான் பட்ட பிரமேகத்திற்கு வெளிக்குப்போகாது வாந்தியும் எடுக்காது :— கருஞ்சோகம் தாமரை விதைகள் ஆய் போதே உரித்தெடுக்கப்பட்டவை, பனைவெல்லம் இவை வகைக்கு 1½ தோலா, முர்தார் சிங்கு 9 மாஷா எல்லாம் இடித்தறைந்து வெல்லத்துடன் சேர்த்து மாத்திரைகள் உருட்டி சரிவர 14 நாள் உபயோகித்து வாணெண்டும். இது 14 நாள் மருத்து. ஆகாரம் :— ரொட்டியை அதிகம் செய்யுடன் சேர்த்து புசிக்கவும். மாத்திரைகளை சற்று வறுத்துக் கொண்டால் மேலாகும். முர்தார் சிங்கிற்கு மாற்று செய்யாகையால், அது சம்பந்தப்படும் மருத்துக்காக செய் ஏராள மாய்ச் சேர்க்கலாம்.

(7) சாதிலிங்கம், அக்கிராகாரம் வெங்காரம், மாசிக்காய், இக்கான்கையும் பொடியாக்கி சுங்கானில் முதலாவதாக புகையிலையை வைத்த பின்னர் அதன் மேல் இத்தப்பொடியை வைத்து அதன் மேல் மறுபடியும் கொஞ்சம் புகையிலைத் தூளை போட்டு தீயூட்டவும். ஒரு நாளில் 2, 3 தடவை குடித்து வாவும். ஒரு வாரம் இதே பிரகாரம் குடித்து வந்தால் குணமேற்பட்டுவிடும். கோய் கொடுமராக யிருந்து வேறெந்த மருத்தைக் கொண்டும் நீங்காவிட்டால் இத்த சிகிச்சை செய்யவும். ஆகாரம் :— பருப்பு, குஷ்கா, ரொட்டி, செய் இவற்றைத் தவிர வேறென்றையும் கொடுக்க வேண்டாம். செய்யை ஏது வரையில் அதிகம் கொடுக்கமுடியுமோ கொடுக்கவும். சிகிச்சைக்குப் பின்னர், ஒரு மாதம் 10 நாள் வரையிலும் வாய்வு பதார்த்தங்களையும் புளிப்பையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

(8) அடியிர்கண்ட சரக்குகளை யாவும் இடித்து மூன்று பொட்டலங்களாக மடித்துக் கொள்ளவும். ஒவ்வொரு பொட்டலத்தில் உள்ள மருத்திலிருந்து அரைவாசியை யெடுத்து சுங்கானில் வைத்து புகையிலையைப்போல் குடிக்கவும். மீதி அரை வாசியை வெல்லத்தில் கலந்து சுட்டு அதன் புகையைப் பிடிக்கவும். இதே விதமாக மூன்று நாள் செய்து வாவும். ஆகாரம் :— அரிசி, பால், பருப்பு பயிறு, குஷ்கா. இனி அந்த சரக்குகள் யாதெனில் :—

சாதிலிங்கம், முர்தார் சிங்கு குரத்து திராவரை, கர்பன், கல்ல வேளேச் செடியின் விதை, அக்கிராகாரம், எல்லாம் சமவடை.

(9) பிரமேகத்திற்கும் அது சம்பந்தப்பட்ட கொப்பளங் களுக்கும் :— கெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், கடுக்காய், கோரைக் கிழங்கு, கஸ்தூரி மஞ்சள், குமட்டிவேர், இவையாவும் வகைக்கு தோலா 1½ எல்லாவற்றையும் இடித்து மூன்று பங்குகளாகக் கொள்ளவும். ஒரு பங்கு மருத்தை ஒரு சேர் ஜலத்தில் இரவில் ஊறவைத்து காலையில் காய்ச்ச வேண்டும். அரைவாசி ஜலம் சுண்டிப் போனதும் அதை இறக்கி வடிகட்டி குடித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(10) கொடிய பிரமேகத்திற்கு :— கோயாளியின் தலைரோ மங்கள் உதிர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கை கால் இப்படி முதலிய அவயவங்கள் குன்றிப்போயிருப்பினும் அல்லது ஆண் குறியில் துவாரங்கள் விழுந்து விட்ட போதிலும், காலையில் 5 மாத்திரைகள் மாலையில் 3 மாத்திரைகள் கொடுத்து வந்தால் உபரதை நீங்கி யென வனப் பருவத்தை யடைந்து விடுவான். முதலில், ஆட்டிறைச்சி, கோழிறைச்சி சம்பந்தப்பட்ட ஆகாரத்தை கொடுத்து விட்டபின்னர் மருத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தல் வேண்டும். மருத்து பாகம் யாதெனில் :— ரசம் 9 மாஷா வசகாவி 4 ரத்தி இத்த இரண்டையும் கல் வத்தில் எலுமிச்சம் சாற்றை விட்டு கன்றாய் அரைக்கவும். ரசகுபம் அற்றுப்போகவேண்டும். அப்பும் அதில் அக்கிராகாரம் மஸ்தகி தனித்தனியே 9 மாஷாவைப் போட்டறைத்து மிளகு பரிமாணத் திற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(11) பிரமேகத்திற்கு :—

ரசம் 10½ மாஷா, சுயமான அயினி 7½ மாஷா பழைய பனைவெல்லம் 21 மாஷா இத்த மூன்றையும் எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் மூன்று தடவைகளில் அரைத்தபிறகு, 3½ மாஷா சாதி லிக்கத்தைச் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும். இனி இவைகளிலிருந்து 30 மாத்திரைகள் தயாரித்து வேளைக்கு ஒரு மாத்திரைவீதம் காலே மாலே கொடுத்துவர பிரமேக காயங்கள் தீரும். மருத்துசாப்பிட்ட பின்னரும் 40 நாள்வரையில் மீதும் புளிப்பும் உபயோகித்தல் கூடாது.

(12) பிரமேகத்திற்கும் அதற்குரித்தான புண்களையும் சொஸ்தப் படுத்தும்:—

கேர்வானப் பருப்பு, கழற்சிக்காய் பருப்பு, மிளகு, சுக்கு எல்லாம் சமளடையிலெடுத்த ஜலத்தில் அறைத்த பின்னர் மிளகு பரிமாணத்திற்கு மாத்திரைகள் உருட்டிக் கொள்ளவும். வேளைக்கு இரண்டொரு மாத்திரைகள் வீதம் மூன்று வாரங்கள் வரையில் கொடுத்துவந்தால் போதுமானது.

(13) ரசகுரணம்:—

கடுக்காய்த் தோல், பிஞ்சு கடுக்காய்த் தோல், பெரிய கடுக்காய்த் தோல், தான்றிக்காய்த் தோல், மிளகு இவையாவும் வகைக்கு 7½ மாஷா, இடித்தறைத்த பின்னர் ரசம் 2 தோலா, 2 மாஷா, 2 ரத்தி சர்க்கரை 5 தோலா, 4 மாஷா, அனைத்தும் சுறிய தோர் கோணியைக் கொண்டு செவ்வனே தேய்த்து ஒன்றுபடுத்திக் கொள்ளவும். பிறகு 14 பாகங்களாகி, காலையில் ஒருபாகம் மாலைமீல் ஒருபாகமாக கொடுத்துவரவும். மருத்து சாப்பிட்டவுடன் கொஞ்சம் பன்னீர் பருகவும். வியாதி தீரும்வரையில் திரேகத்தை வஸ்திரத்தைக் கொண்டு மூடியே வைக்கவேண்டும். ஆகாரம்:— ஆரிசாப்பாடு பால் அதில் சீனி, அல்லது கற்கண்டு போட்டு புசிக்கவும். உப்பில்லாத கெய் ரொட்டி, ஆட்டிக்குட்டியின் கால் சூப்பு உப்புபோடாமல் சேர்க்கவும்.

(14) ரசமாத்திரைகள்:—

மிளகு தோலா 1 மாஷா 3, பிஞ்சு கடுக்காய்த் தோல் 11 மாஷா 2 ரத்தி. இவற்றை இடித்தறைத்து 2 தோலா 2 மாஷா, 2 ரத்தி எடையுள்ள ரசம், 4 தோலா, 8 மாஷா 2 ரத்தி எடையுள்ள வெல்லம், மைதா, பகசெய் இந்த இரண்டும் முறையே 1 தோலா 10½ மாஷா இவைகளை யெல்லாம் சேர்த்து ஒருகோணியைக் கொண்டு சுன்றாய் தேய்த்து ரசத்தையும் சாக்குகளுடன் ஒன்றுபடுத்திக் கொண்டு, அதை 14 பாகமாகி, வேளை 1க்கு ஒருபாகமாக காலை மாலை ஒருவாரம் சாப்பிட்டுவரவும். ஆகாரம், பத்தியம் முதலியன மேலே கூறப்பட்டது போலவே அனுசரிக்க வேண்டும்.

(15) பிரமேகரணங்கள் ஆறிப்போன விடங்களில் தென் படும் படியான கஷ்டமாகவிளையும் பூங்காவியை காடியிலறைத்து

பூசிவந்தால் அவை மறைந்துவிடுமென பிரபல வைத்திய சிபுண ரோருவர் எழுதியுள்ளார். இப்பூச்சு பேதிமருத்து சாப்பிட்டதற்குப் பின் உபயோகித்தல் கன்று.

குழந்தைகளின் பக்கங்குலை வலிகளுக்கு

ஜூரம், இருமல், பக்கங்கள் துடித்தல் இம்மாதிரியான கோளாறுகள் இருவகைப்படும். ஒன்று ஜூரத்துடன் கூடியது, அது உஷ்ணத்தாலேப் படுவதாகும். அது அவ்வளவு கவலைக்கிடமுன்னதன்று, இரண்டாவது, கபத்துடன் கூடியது, அதிலும் ஜூரம் வருவதுண்டு, மூச்சிரைப்பும் உண்டாகும். இதுதான் கவலைக் கிடமுள்ளது.

(1) பக்கங்குலைக்கு மாத்திரை:— கமேலா, சுண்ணாம்பு, துருசு, மஞ்சள்கடுக்காய், தான்றிக்காய்த் தோல், கத்தக் காய்பு இவையாவும் சமளடை, எல்லாம் அறைத்து தூளாக்கி அவசிய மேற்பட்ட போது கொஞ்சம் கெய்யிற் கலந்துகுறித்த விடத்தில் பூசவும்.

(2) கழற்சிக் காய்பருப்பு ஒருவித்து, துருசு 1 குன்றுமணி எடை, இந்த இரண்டையும் பொடியாய் அறைத்து கடுகு பரிமாணத் திற்கு மாத்திரைகள் தயாரிக்கவும். காள் 1க்கு ஒருமாத்திரை கொடுக்கவும்.

(3) கரியபோளம், கேர்வானம், (உள்இலையை நீக்கி) சமளடை இரும்புப் பாத்திரத்தில் போட்டு, குட்டிப்போடாத பகங் கிடேரியின் மூத்திரத்தில் இரும்புஉலக்கையால் அறைத்து வயப் பரிற்றன் அளவுக்கு மாத்திரைகள் தயாரித்து பிராயத்திற் கேற்ற வாயு முலைப் பாலில் இறைத்துக் கொடுக்கவும்.

(4) சிறுவர்களின் பக்கங்குலைக்கும் வயிற்றுக் கிருமிகளுக்கும்:—

கமேலா 8 மாஷா, பெருங்காயம் ஒருமாஷா, இடித்தறைத்து பசுமோரில் மிளகு பரிமாணத்திற்கு மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். உபயோகிக்கும் அளவு:— பால்சூடிக்கும் குழந்தைக்கு ஒரு மாத்திரை வெக்கிருடன் கொடுக்கவும். சிறுவர்களுக்கு அவரவர்கள் பிராயத்திற்குத் தகுந்தவிற்கு கொடுக்க வேண்டும்.

(5) காக்குப் பூசையை காயவைத்து பின்னர் அதை ஜலத்தி லுறைத்து அதிலிருந்து ஒரு துளியை சிறுவன் தொண்டைக்குள் விட்டு விடவும். இது கல்ல குணம் செய்யும்.

(6) மலை வேம்புத் தழையை கெருட்டில் வாட்டிய பின்னர் வயிற்றின் மேல் வைத்துக் கட்டி விடவேண்டும். ஆனால், அதைக் கட்டு முன், கொஞ்சம் ஆமணக்கெண்ணையை அந்த விடத்தில் தடவி விடவேண்டும்..

(7) குசம்பூ ஒரு மாஷா, இரண்டு திரம் அளவிற்குரிய சிறுவன் மூத்திரத்தில் காய்ச்சவும். சுண்டி கால் வாசிக்கு வந்தவுடன் அதை குடிக்கச் செய்யவும். இந்த மாத்திரைகளை உட்கொண்டு வந்தால் காளடைவில் அத்துர்ப்பழக்கம் விட்டுப் போகும்.

(8) வெள்ளை அருளியின் வேர் 10½ மாஷா சந்தனத்தைப் போல் இழைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கார்போக் அரிசி செவ்வனே, அறைத்தது 21 மாஷா சுட்ட சீமை அழுவணி னிதை 12 திரம் பற்கி இலை 7 தோலா வெந்தயம் 14 தோலா எல்லாம் இடித்ததைத்து 3½ மாஷா எடையுள்ள மாத்திரைகளாக தயாரித்துக் கொள்க. 10½ மாஷா அளவில் அபிணி உட்கொள் பவருக்கு 10½ மாஷா இந்த மாத்திரைகளினின்றும் கொடுக்கவும்.

அபிணியை சுத்தி செய்யும் முறை:— அபிணியை இஞ்சி சாற்றில் நூறு தடவைகளில் அறைத் தெடுக்கவும். 10, 12 நாள் வரையில் அதை ஒரேவிடத்தில் வைத்து விட்ட பின்னர் அதை ஓர் அடையாகத் தட்டி ஒரு மண் பாத்திரத்தில் வைத்து அதன் வாயை மூடி ஞாயிற்றுக் கிழமைமன்று பூமியில் புதைத்து விட்டு அடுத்த ஞாயிற்றுக் கிழமை அதை வெளிப்படுத்தி உபயோகத்தில் கொண்டு வரவும்.

பங்காவை வெள்ளை நிறமாக்கும் முறை.

(1) பச்சைநிற முள்ள பங்காவை, துவாரமுள்ள பாத்திரத் தில் போட்டு அதன் கீழ் கத்தகத்தின் புகை போடவும். மேலே பங்காவை கையால் கிளறிக் கொண்டே போனால் பங்காவில் அதன் ஆவி ஏறி அது வெள்ளைச் சர்க்கரை கிழத்திற்கு மாறிவிடும்.

(2) பச்சை பங்கா 2 சேர், (ஷாஹி) சாய்ரிராணி உப்பு 2 மாஷா வெள்ளைச்ச்சி 1 மாஷா அறைத்த வெள்ளை சந்தனம்

2 மாஷா இவை யாவும் ஒன்றாகச் சேர்த்ததைத்து பங்காவில் கலந்து கொள்ள அது வெள்ளை கிழமாகி விடும்.

முக்கிய பொருளை

வைத்திய சாஸ்திரத்தைப் பின்பற்றி எடப்பதன் கோக்கம் இரண்டே அப்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. அதாவது தேகாரோக் கியத்தை கலைப்படுத்தி வைத்தல், இரண்டாவது கோய்வாமற் கடுத்தல்.

தேகஸ்திதி கலைத்திருக்க வேண்டுமென்றெண்ணினால் ஒவ்வொரு வியாதியையும் அதற்கு மாறான பதார்த்தங்களின் உபயோகத்தினாலே தான் கடுத்தல் கிழத்த முறை யாகும். அடுத்த படியாக சுகாதார வழிகளையும் கடை பிடித்து எடக்க வேண்டும்.

குளிர்ந்த ஜலத்தால் யாச் யாருக்கு ஸ்காணம் செய்யலாகாது:—

(1) விருத்தாப்சியர் (2) பாலர் (3) வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டிருக்கக் கூடியவர்கள் (4) ஜலதோஷம் கொண்டவர்கள் (5) திரோகத்தில் புண்பட்டவர்கள்.

கலம்பகமான பதார்த்தங்களின் குணங்களும்

சில அலுபவசிட்கா முறைகளும்.

பிழுக்கத்தின் பல ஹினத்திற்கு:— கொண்டைக்கடலை, தேன் அசும்தா ஓமம் இம்முன்றினால் மாஷாவின் எஃகை வேகியம் செய்து சாப்பிட்டு வரவும்.

நாது நஷ்டம்.

புறு இறைச்சி, கொண்டைக் கடலை இவையின் சில நாள் உபயோகித்து வரவும்.

குழந்தைகள் தூக்கத்தில் பயப்படாதிருக்க

குழந்தைகளின் கழுத்தில் சுயமான தக்கத் துண்டொன்றை கட்டி விட்டால், தூக்கத்தில் பயக்கு எழுந்திருக்க மாட்டார்கள், விசிவு கோயும் ஏற்படாது.

சேவலின் சிறகு

இதை சுட்டு அதன் சாம்பலை காயத்திற்கு மேல் தூவிவந்தால் காயம் உடனே ஆறத் தொடங்கும்.

தொரா இலை

இதன் சாற்றை தினந்தோறும் 12 தோலா, 6 மாஷா எடையில் பருகி வந்தால் தேகத்தில் ஏற்படும் கமைச்சல், வரட்டுச் சொறி தடிப்பு முதலிய தோல் வியாதிகள் கிவர்த்தியாய் விடும்.

வலப்ஜா (துண்ணாற்றுப் பச்சை)

இதன் விசையும இலையும் குடலுக்கு வலிமைத்தரும். பூசக் காலின் மேல் தேய்த்து வா குணமேற்படும்.

மாதுளைத்தோல்

இதை பேரிச்சம் பழச் சாற்றில் அறைத்து கழல்களின் மேல் 2, 3 நாள் தடவி வந்தால் அழை உதிர்ந்து விடும்.

நில வேம்பு

இது கணுவலிவைப் போக்கும். தேமல், படை முதலியவைகளுக்கு காடியிற் கலந்து மேலுக்குப் பூசுவா சொஸ்தமாயி விடும்.

மளரித எலும்பு

இதன் சாம்பலை பன்னிரில் கலந்து மேலுக்குத் தடவிவந்தால் தலைவலி, பிரக்கஞயற்றுப்போதல், கணுக்களில் புண்களினால் ஏற்படும் படியான வலி முதலியவைகளை கிவர்த்திக்கும்.

உலக குத்தாவல்

இதன் ஷர்பத்து கால் பட்ட மூலரோகத்தை போக்கும். மனத் துடிப்பை கீக்கி முகைக்கு வலிமைத்தரும்.

லம்மூறுது

இதன் புகை மச்சம்வந்தானத்திற்குக் கொடுக்க, ஆண் பெண் இரு பாலரின் காம இச்சையும் ஆற்றப் போம்.

வேபு (தப்புலாப் பழம்)

இதனை கட்ட சாம்பலை மெதித்து பல் விளக்க, பற்கள் முததைப் போன்ற வெண்ணிறத்தை தரும். கெட்டிப்படும். கண் களில் சுர்மாவைப்போல, இமைகளில் தடவி வந்தால், காயம் அடையும்.

சவுக்கு

இதன் இலைகளின் சாற்றை சற்று ரோம் வாயில் அடக்கிக் கொண்டிருந்தால் பல்வலி திரும். காடியில் சேர்த்து உரோமங் களின் மேல் தடவி வா, உரோமங்களை கறுப்பாக்கி அவற்றின் அடிக்கால்களில் வலுலையுண்டி பண்ணும்.

முனியின் பாதுகாப்பு

அதிக காய்கையைமுண்டாக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை தவிர்க்க வேண்டும். இரவில் கன்றாய் கித்திரா புரியவேண்டும். பகலில் தூங்கும் பழக்கத்தை மேற் கொள்ளலாகாது.

விரமேகப்பூன், கொப்பளங்கள் முதலியவைகளுக்கு ரச மாத் திரைகளைக் காட்டிலும் கல்ல மருத்து கிடையாது.

பஹுமனே எருக் அல்லது கபேத

தினந்தோறும் அதிகாலையில் இதில் ஏதேனும் ஒன்றை அறைத்து ஸேப் ஷர்பத்துடன் உட்கொண்டு வந்தால் தாது விர்த் தியை முண்டாக்கும்.

சமுத்திர துளா

இதை மெழுகு, ரோஜா எண்ணெய் இந்த இரண்டு சாக்கு களுடன் சேர்த்து நிரோகத்தின் மேலும் முகத்தின் பேரினும் தேய்த்துவந்தால் தேமல், படை, மச்சம் ஆகியவைகளை போக்கி விடும்.

தெல்லி முறப்பா

தினந்தோறும் காலை இடில் ஒன்று தின்று வந்தால், தூர் கீரை கீக்கும். இருதயத்தின் பலவீனத்தை அப்பறப்படுத்தி ஆதமரவுக்கும் ஏனைய ராஜ கருவிகளுக்கும் சக்தியைத்தரும்.

மொச்சை

இதன் மாவை முகத்தில் தேய்த்து வந்தால் முகத்தழும்பு தேமல் காய் கொடுக்கன் முதலியன மறைந்து விடும்.

நக்கிண்கி (தும்மல் பூண்டு)

நக்கிண்கி ஒரு மாஷா 7 சற்றி சிமை அழவணி விதை அதே அளவிற்கு இந்த இரண்டின் ஷர்பத்தை தேனுடன் சேர்த்து அடி

காலையில் வெறும் வயிற்றில் இளஞ் சூடாகவே கர்ப்ப ஸ்திரீக்கு குடிக்கச் செய்வதால் வயிற்றில் உள்ள இறந்த பிள்ளையை இளஞ்சில் வெளிப்படுத்தும்.

தித்திப்பு மாதுளை

இதன் சாற்றை எடுத்து, யானொரு சுத்தமான சீஸாவில் வைத்து, அது தடித்து போகும் வரையில் வெயிலில் வைத்து வர வேண்டும். பிறகு அதை சலாசி மூலம் எடுத்து கண்ணிமைகளில் பூசி வந்தால், கண்ணிமைகளில் ஏற்படும் படிவான கமச்சலைப் போக்கும், பார்வை சக்தி உண்டாகும்.

பத்தியம் எப்பொழுது கூடாது?

பரிபூரண தேகரோக்கியம் அடையப்பெற்றவரும் காலத்திற் கிடையே உணவு பதார்த்தங்களுக்கிடையே எதையேனும் பத்திய மெனத் தள்ளுபடி செய்யலாகாது.

சிறு நருவளி

இது இருமலை போக்கும். பித்த ஜ்வரத்திலேற்படும் நாகத் தைத் தணிக்கும், அணலை யாற்றும்.

சம்போகம்

இது கதி கிலமையிலாவிருந்தல் அவசியம். அப்பொழுது தாகத் தேக சக்தியும் குன்றாது.

சுக்கு

அதிகம் காலில்லாத புதிய சுக்கு, வாய்வு, வாதம் பசுவாதம் சம்பந்தமான கோங்களை கிவர்த்திப்பதில் பயனளிக்கும். இதனை அறைந்து இதன் தூளை தினந்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தால் நரது விவர்த்தியேற்படும்.

பிசின் (கோந்து) சுர்மா

சூதகப் பெருக்கேற்பட்டுள்ள ஸ்திரிகள் இந்த இரண்டையும் மர்மஸ்தானத்தில், 2, 3 கால்களுக்கு வைத்துவர குணப்படுத்தும்.

முள்ளங்கி

இருமலைத்தணிக்கும், பார்வைசக்தியை அதிகரிக்கச் செய்யும், கண்களுக்கு ஓலிவைத்தரும். தளர்த்த ஆண் குறிக்கு முறுக்கிற்றி வைக்கும்.

ஆரிசி திப்பிலி

இதை தினந்தோறும் ஓர் குறித் தளவில் சாப்பிட்டு வந்தால், நரது கஷ்டம் நீங்கும், இரப்பைக்குவலுவைத் தரும், சபசம்பந்தப் பட்ட குறைகள் கிங்குவதோடு, வீக்கத்தையும் போக்கும்.

சூரத்து நிலாவரை

ஒரு தோலா 6 மாஷா 6 ரத்தி எடையுள்ளதை, ஜலத்தில் கொதிக்கவைத்து. அந்த ஜலத்தை உட்கொண்டு வந்தால், கபம் நீங்கும், வாய்வு பித்தம் சம்பந்தமான தூர் கிரையாவும் வெளிப்படுத்தி விடும். இதன் ஆவியின் புகைப் பிடிப்பதனால் கணுக்களில் ஏற்படும் படிவான வலி திரும்.

லவங்கப்பட்டை

இதை தினந்தோறும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஓர் குறித் தளவில் சாப்பிட்டு வந்தால் என்பட்ட இருமல், கிச்சல், அண்ட வலி முதலியன கிங்கும், மறதியை கிவர்த்தித்து கல்ல ரூபக சக்தியை யுண்டாக்கும்.

யாருடன் சம்போகம் கூடாது?

(1) கிழவி, (2) ருதுவாசாத ஸ்திரீ, (3) மாதவிடாவுள்ள வன், (4) அவலக்ஷண முள்ளவன், (5) கோபுற்றவன்.

மாசிக்காய்

இதை அறைத்து தினசரி ஒரு ஸ்திரீ தன் மர்ம ஸ்தானத் தில் வைத்து வந்தால், ரொக்கம் ஏற்படும்.

வச நாவி

இதை ஒரு மாஷா, 1 ரத்தி அளவிற்கு ரோஜா பன்னி லில் கலந்து தினந்தோறும் வெறும் வயிற்றில் தின்று வந்தால் மன சக்தியும், உற்சாகமும் உண்டாகும். முகவசிகர மேற்படும், இரப்பை, கிட்னி இரண்டிற்கும் வலுவு அடையப் பெறும். சூதகபத்தம் கிவர்த்தியாகும். கீர்தாராளமாய் பிரியும், தேன், பாம்பு முதலிய விஷக் கடிக்கையையும் போக்கும்.

காஜர் முறப்பா

முதல் தரமான இந்த முறப்பாவை காணில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால், இரப்பையின் பலவீனம் நீங்கும் தாது வித்தி அதிகரிக்கும்.

பசுவின் சாணம்

இதை அடுப்பின் மேல் ரூடேற்றி மேலே கட்டி வந்தால், வீக்கம் நீங்கும், குளவி கொட்டின இடத்தில் உள்ள வளியையும், வீக்கத்தையும் போக்கும்.

வெள்ளைப் பூண்டு

பூண்டை வேகவைத்து சாப்பிட்டு வந்தால், கான்பட்ட இரு மல்திரும். வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால், வயிற்றில் உள்ள கீண்ட பாக்குப் பூச்சிகள் வெளியாய் விடும்.

சிறு ஏலக்காய்

தினந்தோறும் இதை 7 மாஷா அளவில் சாப்பிட்டு வந்தால், இருதயத்திற்கும் இரப்பைக்கும் பலத்தைத் தரும், வாந்தி ஓமட்டலை சிறுத்தும்; கெஞ்சிடி ஏற்படாது.

தலை வலி

தலைவலி யுள்ளவர்கள் சம்போகத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும். இல்கியேல், வலி அதிகரிக்கும். கண் விழித்தல் கூடாது; இரவு, பகலில் எப்பொழுதேனும் ஒரு கோத்தில் படுத்து இளைப்பாற வேண்டும். ஏனெனில், அதிகம் கண் விழிப்பதனால், மூளைக்கு பலவீனமும் ஜீரண சக்திக்குப் பங்கமேற்படவும் கூடும்.

சிறு சரீரத்தில் உள்ள வியாதிகளை வாந்தி மூலமாயும், மேல் சரீரத்தில் உள்ள வியாதிகளை பேதி மருத்தின் மூலமாயும் சிகிச்சை செய்து போக்குவது இலகுவாகும்.

ருயி சோம்பு

இதை ஒவ்வொரு வாரமும் சாப்பிட்டுவந்தால், இடுப்புக்கு சக்தி ஏற்படும், சித்திரம் ஸ்கலிதமாவதை தடுத்தும் விடும்.

தண்ணீர் விட்டால் கிழங்கு

இதை 10½ மாஷா அளவில் இடித்ததைத்து தேனுடன் கலந்து சாப்பிட்டால், 2 மணி போக கழித்து சம்போகத்தை மேற்கொண்டால், அரியதொரு இன்ப உணர்ச்சி அடையப்பெறும்.

அபாபீல் (தலையில்லாக் குருவி)

இதன் இறைச்சியைத் தின்றால் பார்வை சக்தி அதிகரிக்கும். அதன் இரத்தத்தை ஓர் ஸ்திரீ பருகி விட்டால், காம இச்சை குன்றி விடும்.

எந்தெந்த சமயங்களில் தண்ணீர் குடித்தல் கூடாது

- (1) எல்லா விதமான கணிவர்க்கங்களை சாப்பிட்டவுடன்.
- (2) சம்போகத்திற்குப் பின்னர்.
- (3) ஜலரூப மருத்தை உட்கொண்ட பின்னர்.
- (4) சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடன் அதிகம் குடித்தல் கூடாது.

சல்லாத்து விதை

இதன் கஷாயம் கிட்னியைக் காக்கும். சுகமான சித்திராவைத் தரும்; இரப்பைக்கு சக்தி கொடுக்கும்; அதிக நாகத்தைத் தவிரிக்கும்; சித்திராவில் தண்ணிச்சையாய் ஸ்கலிதமாகும் கபாலம் படைத்தோருக்கு பிரயோஜன முன்னதாகும்.

குங்கமப் பூ

இதை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால், இரப்பைக்கு சக்தி யளிக்கும்; இடுப்புக்கு வலுவூண்டாகும்; மனோ உற்சாகமேற்படுவதுடன் மலசிக்கல் நிவர்த்தியாய் விடும், சாப்பிட வேண்டிய அளவு 3½ மாஷா.

கவலகலா

சித்திரா மில்லாதவர்கள் இதை சாப்பிட்டு வர கல்ல சித்திரா புரிவார்கள். மேலும், இது தவிர ஸ்கலிதத்தையும் தடுக்கும்.

அதிக சம்போகம்

இது மிகவும் கெட்டது. மிதமிஞ்சிப் போவதனால், கரம்பு தளர்ச்சி, கடுக்கம் உண்டாகும். பார்வை சக்தி குன்றி விடும்; கால்கள் பணைற்றுப் போம்.

தலைவலி காதுவலி

மல்லி, பனப்ஷா, கோஷா மோட்ரி இவை வகைக்கு 3½ மாஷா இடித்தமைத்து சர்க்கரையைச் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால், தலைவலியும், காதுவலியும் நிவாரணமாய் விடும்.

மலலி

இது இருதயத்திற்கு பலமளிக்கும். இரத்தப் பிபருக்கை அடக்கும். தலைவலியைக் கண்டிக்கும்; கெஞ்செரிச்சலைப்போக்கும்

சோம்பு

இரப்பை வாயுவைப் போக்கும், கண்களுக்கு ஒளிவைத்தரும். இதன் ஷர்பத்தை 7½ மாஷா அளவில் பருகி வந்தால், தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

எள்ளு

கிணத்தோறும் இதை உட்கொள்ள இருமல் தனியும்; தாது விர்த்திக்கும், இச்சை அதிகரிக்கும், ஆன்குறி கெட்டிப் படும்.

மருதோன்றி

அறைத்த மருதோன்றியை சவர்க்காரத்தண்ணீரில் சேர்த்து காயங்கலின்மேல் தடவாயம் ஆற்றினும், தொடை வலிகிற்கும்.

கரியபோளம்.

இதை 10½ மாஷா அளவிலெடுத்து அதன் அரைபாகத்திற்கு சர்க்கரையைக் கலந்து கன்றாக அறைத்து வஸ்திரகாயஞ் செய்த பின்னர், கண்ணிமைகளில் தடவிவந்தால், கண்ணிமைகளில் உண்டாகும் அரிப்பு புண்காயத்தை சொஸைப்படுத்தும்.

மஞ்சள்.

மஞ்சளை தண்ணீரில் இடித்து கண்ணிமைகளில் தடவிவர கீர் வடிதல் கின்றுவிடும். 3½ மாஷா எடையுள்ள இதன் தூளை சர்க்கரையைச் சேர்த்து உட்கொள்ள இரப்பைக்கும் இருதயத் திற்கும் வலிமைத் தரும். 2 தோலா 1 மாஷா எடையுள்ள இதை ஜலத்தில் ஊறவைத்து அதைப் பருகிவர கபத்தையும் பித்தத்தையும் போக்கிவிடும்.

எலிப்புழுக்கை.

இதை கெஞ்சு கஷாயத்தில் சேர்த்து பருகிவந்தால் பிருக் கத்தில் உள்ள கல்லடைப்பு கீழும். கண்ணிமைகளில் தடவி வந்தால் கண்பருகாவை அறுத்து புண்களை அகற்றும். திரிசிக் கனைத்து ஆசனவாயில் வைத்து வந்தால் மலபத்தம் கிங்கும்.

பழுக்கப்போட்ட இரும்பை ஜலத்தில் போடுதல்

இவ்விதமான ஜலத்தை பருகுவதால் இரப்பைக்கு வலுவேற் படும். தாதுபுஷ்டியைத்தரும். குடல் புண்கள் ஆறும், மலபோக்கு கின்று விடும். விஷத்திற்கும் வாந்திபேதிற்கும் உல்தை.

பெருங்காயம்.

இதை கண்ணிமைகளில் அறைத்து தடவியால் கண்புண்கள்க் கிற்கும். ஒருகாங்கு எடை உட்கொள்வதனால் வாயுவைக் கண்டித் தும். விஷ உபரவத குறையும், கபாவத்தில் கதுகதுப்பு உண்டாகும்.

அக்கரோட்.

அக்கரோட் பருப்பு இடைவிடாது 5 நாள் நின்றவந்தால் வயிற்றில் உள்ள நெருநிகள் காக்குபூச்சிகள் மாண்டுவிடும். வயிற்று கடுப்பு, இடிப்புலி தீரும். தேகத்தில் கதுகதுப்பு உண்டாகும்.

வெளவால்.

இதன் இரத்தத்தை தொப்புழுக்குத்தே தடவியால் உரோமம் கள் பூனைக்கமாட்டா. பிரவச கோத்தில் இதன் பித்தத்தை எடுத்து மர்ம ஸ்தானத்தில் தடவ பிரசவம் சுலபமாய் விடும்.

அப்பொழுதே தேர் எடுக்கப்பட்ட வெளவாவின் புதிய ஸ்ரீஸையை தாதுவயதுள்ள கிழவனும் தன் உள்ளங்கால்களில் தேய்த்துக் கொள்வானாகில் உடனே அவனுக்கு சம்போக சக்தி ஏற்படக்கூடும் எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஆமையின் பித்தம்.

இதை உட்கொண்டால் விஷதுஷ்டிகளின் விஷவிஷை ஏற் படாது, இருமல் தீரும்.

ஜாதிபத்திரி.

இதை 7 மாஷா அளவில் உட்கொண்டால் வாய்க்கு மணர் தரும். இரப்பைக்கும் இருதயத்திற்கும் வலுவைக் கொடுக்கும். இடுப்பு வலி தீரும், பசிபெடுக்கும், கீர்பிரியும், குதகம் தடைப் படாது. மனதிற்கு உற்சாகமளிக்கும்.

வேட்டிவேள்.

இதன் ஒருதோலா 3 மாஷா எடையை அரைத்து, தேலுடன் கலந்து தின்றால் திரோகத்தினுள் இருக்கப்பட்ட எல்லாவித நொயி களும் வெளியாய்விடும்.

கலைமான் கொம்பு.

இதை எரித்து அதன் சாம்பலைக் கொண்டு பல்விளக்கிலும் ஈறுகளின் இரத்தம் வெளிவருதல் விந்து விடும். பற்கள் முத்து போன்ற வெண்மை யடையும்.

கொண்டைக் கடலை.

இதை வறுத்தோ அல்லது பச்சையாகவோ தின்றுவந்தால் தாது விர்த்தி யுண்டாகும். உபசம்பந்தப் பட்ட இருமல் நீங்கும் தொண்டையின் காகரப்பு நீங்கி குரல் சுத்தி ஏற்படும்.

வெண்ணெய்.

இதை திரோகத்தில் தேய்த்துவந்தால் திரோகபுஷ்டி உண்டாகும். அடித்தொடை, அண்டைவாயு வீக்கம் இதைக்கொண்டு நீங்கி விடும்.

அத்திமரலை.

பூரணின் தலையை அதன் கிருகுகள் உள்பட எரித்தின்பு அதைப்பொடியாய் அரைத்து வள்ளிகாயஞ் செய்து, இரண்டு கண்ணிமைகளிலும் சுர்மாவைப்போல் பூசி வந்தால் அக்கிமாலை நீங்கி, கண்மூலி அதிகரிக்கும்.

கலைதூளி

இதை 4½ வாரத் தோதுமை எடையிலெடுத்து சாப்பிட்டுவந்தால், இடுப்பு, மூளை, முதுகு முதலிய அங்கங்களிலுள்ள வலிமை

ஏற்படும். குராக சக்தி அதிகரிக்கும். ஐந்தோடித்தால் உற்படக் கூடிய தலைவலியும் இதன் உபயோகத்தால் சிவர்த்தியாய்விடும்.

அபிணிபழக்கத்தை அகற்ற.

ஜாதிக்காய் ஒரு பாகம், ஆமணக்கஞ்செடியின் துவீர் இரண்டு பாகம், இந்த இரண்டையும் சேர்த்துரைத்து மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். அத்தமாத்திரைகள் அபினியானன் உட்கொண்டு வந்த அபினியானவிற்கே இருத்தல் வேண்டும். இனி எத்தெந்த கோத்தில் அபினி உட்கொள்ளப்பட்டு வந்ததோ அத்தந்த கோத்தில் இந்த மாத்திரைகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.

வேப்ப மரம்

இதன் இயற்கை குணதீசயங்கள்.

(1) இதன் தழைகள் கண்வலியை சிவர்த்தித்து, கண் களுக்கு கல்ல குணமளிக்கக் கூடியவை (2) கிருமிகளை அதஞ்செய் யக்கூடியவை (3) ஜீரணசக்தியை யுண்டுபண்ணக்கூடியவை (4) வெண்குட்டத்தைப் போக்கும். (5) அஜீரணத்தை சிவர்த்திக்கும்.

வேப்பம்பட்டை சர்மவியாதிகளைப் போக்கவும், பித்தத்தைத் தணிக்கவும் வல்லது. இதை இரண்டுமாஷா எடையில்ரைத்து காய்ச்சலின் போதும் தாகவமட்சியின் சமயத்தினும் கொடுக்க கல்ல குணம் தரும்.

புதிய இலைகளின் சாறு 3 மாஷா, கடுக்காய்ச்சாறு 3 மாஷா, கெய் 3 மாஷா, மூன்மையும் சேர்த்து உட்கொண்டால் எல்லாவித மரன் சொற்சொற்கு உபாதைகளும் சிவர்த்தியாய்விடும். இதை அனுபவமுறை. இதன் இலைகளை வேகவைத்த பின்னர் அவைகளைக் கொண்டு ரணங்களைத் தேய்த்துக் கழுவு அலற்றின் தூரீர் அகன்று ரணங்கள் சுத்தமாய்விடும். இதன் பழத்தின் குணம் வாதேனில் அமைத்தின்றால் குடு அதிகரிக்கும், வெண்குடுப் போகும்.

மூலம், குட்டம், சொரி பிரமேகம் முதலிய கோய்களைக் கண்டிக்கும்.

இதன் வித்தினின்றும் எடுக்கப் பட்ட எண்ணெய் அதாவது வேப் பெண்ணெயுடன் கடுக்கெண்ணெயையும் சேர்த்து தேகத்தில்

பூசிக்கொண்டால் பிளேக் கோய் அதுவா நேன உதப்பட்டிருக்கிறது. இதன் விளைவை அழைத்து தேகமென்றும் பூசிக்கொள்ள சர்மவியாதிகளுக்கு அரிய குணமளிக்கும்.

வித்திலிருந்து எடுத்த புதிய எண்ணெயை சாதிஸ் சிலதுளிகள் விட்டு வா காது சம்பந்தமான கோய்களை மட்டி மன்றி, காது மந்தத்தையும் போக்கிவிடும். இதன் பூக்களின் உபயோகம் மூலக்கு வலிமைத்தரும்.

இதன் பூக்களை அழைத்து தொப்புவின் கீழ்ப்பற்றுப் போட வாக்தியை நிறுத்தி விடும்.

பூவை அழைத்து தொப்புவின் கீழ் பூசுவதிலிருந்து வயிற்றுக் கிருமிகள் யாவும் மாண்டு விடும்.

புதிய இலைகளின் சாறு ரூதகத்தை வெளியாக்கி, மீரையும் பிரிக்கும். சலாசயத்தில் உள்ள கல்லடைப்பையும் விலாவலியையும் நிவர்த்திக்கும்.

சிலபுதிய இலைகளை இஞ்சிசாற்றிலிறைத்து ஒருஸ்திரீ பருகி வந்தால் மர்மஸ்தான வலியையும் மாதவிடாயின் போதுள்ள கோவையும் கண்டித்து விடும்.

இதன் இலைகளை எரித்து புகைப்போட்டால் தொத்து விபாதிக்குரிய கெட்டகாற்றை சுத்தப் படுத்துவதுடன் கொடி முதலிய ஜந்துக்களும் இறந்து போம்.

இலைகளின் சாற்றை பிழித்தெடுத்து அதில் சுர்மாக்கல்லி ஊறவைத்தறைத்து அதனை சுத்தி செய்து கொண்டு கண்களில் பூசிவந்தால் கண்களுக்கு நல்ல குணத்தைத்தரும்.

விதைகளின் பருப்பை மெடுத்து அதற்கு சமமான எடைமில் ரஸவத் கலந்து, இரண்டையும் அழைத்தபின்னர் இலக்கையளவில் மாத்திரைகள் தயாரித்து சில காட்கள் தொடர்க்தாற் போல் கொடுத்துவந்தால் கார்பட்ட மூல உபத்திரவமும் நிவாரணமாகி விடும்.

இதன் இலைகளை ஜலத்தில் கொதிக்கவைத்து அந்த ஜலத்தைக் கொண்டு உரோமங்களை கழுவிவந்தால் உரோமங்கள் செவ்வளவு கறுத்து நிற்கும். இலைகளை வறுத்து இளஞ்சூட்டிலேயே தொப்புவின் கீழ்வைத்துக் கட்டி விட்டால் ஸ்திரீகளுக்கு மாதவிடாயின்

போதோ அல்லது பிரசவ காலத்திற்குப் பின்னர் உண்டாகும் படியான வலியையோ கண்டிப்பாய் நிவர்த்திக்கும்.

இலைகளின் சாற்றை எடுத்து அதில் தேனைக் கலந்து அதைக் கொண்டு வாய் கொப்பளித்து வந்தால் தொண்டைவலியை போக்கும். இதன் பழுத்த பழங்களைத் தின்று வந்தால் கால் பட்ட வயிற்றுக்கழிச்சலை நிறுத்தும். இதன் மரத்திலிருந்து வழியும் பிச்சைப் போன்ற கசியை எடுத்து பிரமேகத்திற்கும் குஷ்டத்திற்கும் கொஞ்சம் போல் கொடுத்துவா கல்ல குணஞ் செய்யும்.

இதன் இலைகளிலிருந்து ஒருசேர் சாற்றை எடுத்து அதில் ரோக்கு அரிதாரம் ஒரு தோலா எடையுள்ளதை ஊறவைத்த பின்பு அதே வேப்ப இலைகளுக்குள் சுருட்டிவைத்து, ஒருபக்கைப் போன்ற வடிவத்திலாக்கி இலேசான புடம் வைத் தெடுத்தால் வெண்ணிற பல்பமாக மாறிக்விடும்.

சுத்தமான ரசம் ஒரு தோலாவை எடுத்து அதில் 3 சேர் சாற்றை கவரும் படியான அளவிற்கு அழைத்து வந்தால் அதன் அழுக்கு மீங்கி உபயோகத்திற்கு தகுதியாய் விடுமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எருக்கஞ்செடி.

இந்தச் செடியை அறியாதார் இவர், ஆனால் இது எவ்வளவு பிரயோஜன மூள்ள செடியாகும் என்பது அடிநிற்கண்ட விவரம் கவனிலிருந்து தெரியவருகிறது.

எருக்கன் வேர் 4 தோலா, மிளகு 1 தோலா, சோன்ச்சல் உப்பு 1 தோலா, எல்லாம் ஒன்றாக அழைத்து கடலைப் பரிமாணம் மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். உவசியமானபோது காலை, மாலை ஒரு மாத்திரை விதம் கொடுத்து வா இரப்பை சம்பந்தமான கோளாறுகளை நிவர்த்திக்கும். அதாவது வாக்தி பெதியின் கோயாளிக்கு இரண்டொரு மாத்திரை கொடுக்க உடனே குணப்படும்.

அஜீரணத்தைப் போக்கி பசி திபயத்தை யுண்டு பண்ண சாப்பாட்டிற்குப்பின் ஒருமாத்திரைவிழுங்கிக் கொள்ளவும்.

அதன் பூவிலிருந்து கிராம்பைப்போலிருக்கும் காய்பை தணிப் படுத்திக் கொண்டு அதற்கு சம எடையாக இத்துப்பும் அரி

திப்பிலியும் சேர்த்து இம்முன்றையும் ஒன்றாக அறைக்க காம்பு களின் ஈரத்தைக் கொண்டே மாத்திரைகள் உருட்டக் கூடிய பதத்திற்கு வந்து விடும். வந்ததும் மிளகின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் தயாரித்துக் கொள்ளவும். இரும்பு உபாதை யுள்ளவர் களுக்கு ஒரு மாத்திரை இரவு படுக்கைக்குச் செல்லும்போது வாயில் போட்டு சப்பவைத்தால் இரும்பு கஷ்டம் ஏற்படாது. குழந்தைகளுக்கு மாத்திரையின் அளவில் குறைத்து கொள்ளவும்.

மேற்சொன்னபடி பூவிதூண்டு மிரம்புகளை எடுத்துக் கொண்டு அத்துடன் மிளகு தோலா 1 இஞ்சி தோலா 1½ எல்லாம் சேர்த்து கட்டியப் பரிமாணம் மாத்திரைகள் செய்து காற்று சேய்க் கண்டவர்களுக்கு ஒரு மாத்திரைக் கொடுக்க, அகழணமே குணமேற்படும். இது வயிற்று வலியையும் போக்கும்.

மலராத அரும்பைக் கொண்டு வந்து அதில் ½ சேர் அளவிற்கெடுத்து, ஓமம் ½ சேர் சேர்த்து அறைக்கவும். பிறகு அதை கிழலில் உலர்த்திக் கொண்டு வயதை கிதானித்து அதற்கெற்றவாறு காலையில் ஒரு ஸகப்பிடி தின்னக் கொடுக்கவும். இது இரும்பு, கவாசகாசம் முதலிய வயிற்றின் உபாதைகளை நிவர்த்தித்து விடும்.

பத்தியம் ஒன்றுமே கிடைக்காது. மனம் கொண்ட ஆகாரத்தை புசிச்சலாம்.

எருக்கன் இலை (கால் வாய்க்கு மேல் முறிந்தவை) கல்லெண்ணெயில் எரித்து என்றும் அறைத்து களிம்பாகச் செய்து, அண்ட வாயுவினால் விரைகள் சிறிது பெரிதாக வீக்கம் கொண்டிருந்தால் அவைகளின் மேல் தடவவும். இந்த களிம்பை பூவிய மிளகர் வஸ்திரத்தைக் கொண்டு கைகட்டு கட்டுவது போல் இறுக்கமாய்க் கட்டிக் கொள்ளவும்.

எருக்கன் கீர், அருளி வேர் இரண்டையும் சேர்த்து என்றும் அறைத்து அத்துடன் கொஞ்சம் தேனையும் கலந்து உருண்டையாக உருட்டி வைக்கவும்.

வீரிய விர்த்திக்காக இந்த உருண்டையிலிருந்து கொஞ்சம் விட்டு அதை ஆட்டுப் பாலில் தேய்த்து ஆண் குறியின் மீது இரவு படுக்கைக்குப் போகும்போது தடவி விட்டு காலையில் பூவியை ஒரு கண்ணாடி தேய்த்து விட்டு வெகீரால் குழி

விடவேண்டும். இதே விதமாக சில நாட்கள் வரையில் செய்து வந்தால் காம்புகளின் சோர்வு நீங்கி வலு உண்டாய் விடும்.

இரோகத்தின் எந்த பாகத்திலேனும் பலத்த அடி ஏற்பட்டு அதன் பேரில் வீக்கம் உண்டாகியிருப்பினும் அல்லது வேறெவ்வித காயமுண்டாகி கவலிக்கிட மேற்பட்டிருப்பினும் சரியே, இவ்விதமான நிலைமையில் இதன் கொப்பு இலைகளைக் கொண்டு வந்து அவற்றின் இலைகளை யெல்லாம் நீக்கி விட்டு அவற்றை இடித்து தனியே மேற் பட்டையை யெடுத்துக் கொண்டு, அதை கண்ணாய் இடிக்கவும். இடித்தானதும் அதை உருட்டி உருண்டையாகித் கொண்டு இரும்பு தாச்சி யொன்றில் கெய் இரண்டு தோலா எடை போட்டு காய்ச்சி, அதில் இந்த உருண்டையை வைத்து அதன் இருபுறத்தையும் சிவந்து போகத்தக்களவில் மாத்திரை வறுத்து, வீக்கத்தின் மேல் அப்படியே வைத்துக் கட்டி விடவும். இனி எவ்வளவு சேக்கிரத்தில் வலி கீங்கி வீக்கம் இறங்கி விடும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். அதே விதமான 2, 3, உருண்டைகளை வைத்துக் கட்டுவது பேரதுமான தாகும்.

இதன் இலைகளின் சாற்றை ½ சேர் எடுத்து அதில் 10 தோலா கல்லெண்ணெயைச் சேர்த்து காய்ச்சவும். கீர் சுண்டிப்போய் தனியே எண்ணெய் தங்கி விட்டதும் அதை யெடுத்து பத்திரப் படுத்தி வைக்கவும். இதை கணுக்களில் ஏற்படும் படியான வலி களுக்குப் பூசுவா அபூர்வ குணமளிக்கும்.

எருக்கன் பால் 5 தோலா உப்பு தோலா 5 இந்த இரண்டையும் சிறியதோர் மண் கலவத்தில் போட்டு விரட்டிப் புடம் கைத் தெடுக்கவும். அப்பால் அதை அறைத்து பல்வலிக்குத் தேய்க்க வலி உடனே நிவர்த்தி யாகும்.

இரோகத்தின் வீக்கத்தை நிவர்த்திப்பதில் கைகண்ட மருந்து:- எருக்கன் பச்சிலை ½ சேர் மஞ்சள் 1½ தோலா, இந்த இரண்டையும் அறைத்து வயப்பயிற்றின் அளவிற்கு மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். தினக்கோறும் 4 மாத்திரைகள் மனத்தக்கவாறி சாற்றுடன் அருந்தச் செய்யவும். தினசரி 1 மாத்திரை அதிகரித்துக் கொண்டே போக வேண்டும். அதாவது 7 மாத்திரைகள் கண்களிற்கு வருமவரையில் அதிகரிக்கவும். அப்பால் 7 மாத்திரை

262

பூனூனி வைத்திய முறைகள்

கள் ஒருவராம் கொடுத்த பின்னர் ஒவ்வொரு மாதத்திரையாக குறைத்துக் கொண்டு வரவேண்டும். ஆண்டவன் கிருபையால் சிக்கிரம் குணமேற்பட்டு விடும். ஆகாரம் குறைத்தனவிற்கு உட்கொள்ளவும். அதாவது வழக்கமான அளவில் 1/3 பாகம் சாப் பிட்டு வந்தால் போதுமானது. மனத்தக்காளி சமைத்துக் கொடுப் பதும் கல்லம். தண்ணீருக்குப் பதிலாக அதன் கஷாயத்தையே கொடுக்கலாம்.

ஒரீலைத் தாமரை

இதாவது பேர் போன மூலிகை யாதலால் இதன் அடை யாளத்தைப்பற்றி அதிகம் விவரிக்க அவசியமில்லை. இதன் பிரயோ ஜனங்களுக் கிடைய முடியுமானவை பின் வருமாறு:—

உச்சித் தலையில் எரிவு கண்டு, தலைப்பாகையை தலையில் வைக்க முடியா நிரூப்பவர்கள் அல்லது அளவிறந்த சூட்டினால் மனத் துடிப்பு அல்லது கீர் எரிச்சல் அல்லது கீங்காத வெட்டை யுள்ளவர்கள் இதை 6 மாஷா அளவி லெடுத்து 1/3 சேர் தண்ணீரில் அறைத்து அதில் 2 தோலா கற்கண்டைச் சேர்த்து ஒரு வாரம் பருகி வர நிச்சயமான குணமடைவப் பெறுவர். நிற்க, இந்த மூலிகை வாயுவை கிவர்த்தித்து, மலப் போக்கையும் கிழத்தக் கூடியது. சூதும் தடைபட்டிருப்பினும் அதை குணப்படுத்தும்; கான்பட்ட ஜூரத்தையும் போக்கும். இதை அறைத்து கழுத்துக்கு மேல் பற்று போட்டால் கண்டமாலையைக் கண்டிக்கும். காடியில் சேர்த்து பூச, கால் விரல்களின் வாயு வலியைத் தீர்க்கும். கர்மாவை இதன் சாற்றில் அரைத்துப் பூசுவா அகேக கண்ணோகல் கள் கிவரணமாகும்.

குமட்டி காயின் குணங்கள்

ஒரு குமட்டிக் காயை யெடுத்து அதில் 1 1/2 தோலா கறுப்பு கர்மாக் கட்டியை யடைத்து விடவும். போட்ட கர்மா உலர்ந்து போனதும் அதை யெடுத்து அதைப் போலவே இன்னொரு குமட் டியில், அடைத்து விடவும். அதிலும் உலர்ந்து போனவுடன் 3 வது குமட்டியில் அடைக்கவும்.

பிறகு அதை யெடுத்து செவ்வனே அறைத்து கண்களில் பூசி வரவும்.

பெரிய குமட்டியை வாங்கி அதில் இத்துப்பு தூள் செய்து கிறப்பி, அறுத்த துண்டை மீண்டும் ஓட்டி விடவும், பிறகு வாயை பிசைந்த மாவைக் கொண்டு ஓட்டி முழுக்காய் மீதும் மாவை ஓட்டி விடவேண்டும், அடுத்த படியாக அச்சாயை அடிப்பில் வைத்து மேலில் உள்ள மரவு சிவந்து போகும் வகையில் சுட்டெடுக்க வேண்டும். மேலில் உள்ள மாவை சுண்டி எடுத்து விட்டு காயை உப்பு உள்பட பொடியாய் அறைத்துக் கொள்ளவும்.

வயிற்றுக் கட்டி விழுந்தவர்களுக்கும் அல்லது யாதொரு வியாதியின் காரணத்தைக் கொண்டேனும் வயிறு பெறுத்த கோயாளிக்கும் அத்துளி விறந்து 4 மாஷா முதல் 6 மாஷா வரையில் அதிகரலையில் சுத்த ஜலத்துடன் உட்கொள்ளச் செய்தால் ஆண்டவன் கிருபையால் சொற்ப நாட்களுக் கிடையே உபாதை கீங்கி விடும்.

இதன் வேரை காய வைத்து பின்னர் அதை ஜலத்தி லறைத்து மூல வியாதியஸ்தர்களின் ஆசன வாயின் மேல் ஏற்படும் படியான வலிக்கு அந்த வலியுள்ள விடத்தில் பூச உடனே வலி நின்று விடும்.

இதன் வேர் 3 தோலா அளவி லெடுத்து 1/3 சேர் (பெரிய சேர்) தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து அரைவாசி தண்ணீர் சுண்டிப் போனதும் அதில் வெள்ளை சர்க்கரை 3 தோலா கலந்து வடிகட்டி பருகச் செய்யவும். பருகின பிறகு அரிசி தோலா 2. அரிசி, பயிற்றம் பருப்பு கெய், உப்பு சம்பந்தப்பட்ட இனகலான கிச்சடி சமைத்து உணவாகக் கொடுக்கவும். இது அவயவங்களில் உண்டாகும் வலி, பிரமேக தூர் கீர் முதலியவற்றை மலவீர்த்தியின் மூலமாக வெளிப் படுத்தும். இக்கஷாயத்தை கொடுப்பதற்கு முன்னர், பூசனி மிட்டாய், காலர் முறப்பா, பால் கோலா இவற்றுள் எதை யேனும் சாப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

இதன் சாற்றை 5 சேர் எடுத்து அதில் வெள்ளைத் தகடை 2 தோலா கக்கு 1 தோலா, மஞ்சட் கடுக்காய்த் தோல் 5 தோலா சேர்த்து காய்ச்சவும். பாகு கெட்டியாய் விட்டதும் அதை இறக்கி கடலை பரிமாணம் மாத்திரைகள் தயாரித்து அவற்றை பாதாம் எண்ணெயில் கனைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்.

இரவு படுக்கைக்குப் போகும் போது ஒரு மாத்திரை பாறு டன் விழுங்கிக் கொள்ளவும். இரேவல் சின்னிப்பால் 4 தோலா—

குமட்டியின் மேல் தோல் கீக்கிய சதை 4 தோலா, மஞ்சட் கடுக் காய்த் தோல் 4 தோலா உயரிய பனப்ஷா 3 தோலா மஞ்சள் கரிய போளம் 4 தோலா மைசாட்சி 1 தோலா தேன் 10 தோலா. மைசாட்சி சியை தண்ணீரில் கறைத்துக் கொள்ளவும். இதர மருத்துகளை யாவும் தூளாக்கி அதில் கலந்து இலந்தை யளவில் மாத்திரைகள் செய்து கொள்க. இரவுபடுக்கைக்குப் போகும்போது இரண்டொரு மாத்திரை ஜலத்துடன் விழுங்கி விடவேண்டும். மலபந்தம் கிவர்த்தி யாய் விடும்.

இதன் இலைகளின் சாற்றைப் பிழித்தெடுத்து அதை விடெங் கும் தெளித்து வந்தால், பாம்பு தேன், கரையான் முதலிய கொடிய ஜந்துக்கள் அணுகா.

இதன் வேரை வெட்டி அதைக் கொண்டு பல் விளக்கினால் சகலவித பல் ரோகங்களையும் கிவர்த்திக்கும். பல் வலியைப் போக்கும்.

வஸத்தியா நாசி

இச்செடியின் பெயரிலிருந்தே இது கோய்களின் காசுகாரி என வழங்கப்படுவது கன்கு விளங்கும். இச்செடியின் அடையாளத் தைப்பற்றி அதிகம் கூறத்தேவையில்லை. இது தென்காட்டில் கிடி கிட்டி எனச் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இது என்னென்ன பிர யோஜனங்களைக்கொண்ட மூலிகை என்பது அடியிற்கண்ட விவரங் களிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். இதைப்பற்றிய அடையாளங் களையும் சுருக்கமாகக் கூறமிடத்து இது 3 கஜத்துக்கு மேலதிக மாகவே உயரமாகிறது. இலைகளின் மேல் முட்கள் உண்டு, மஞ்சள் கிறமுள்ள காலுக்கான பூ பூக்கும். கொப்பை முறித்தால் மஞ்சள் கிறமான பால் வெளிவரும். இதன் காய்க்குள் 4 அறைகளை போன்ற பள்ளங்கள், அவற்றுள் துப்பாக்கி சுத்தத்தைப் போன்ற கூறு கிறமுள்ள விதைகள் கிறம்பி இருக்கும். இச்செடியின் குணம் குடும் வறட்சியும் கொண்டுள்ளது.

இதன் பூ, காய், விதை, பட்டை, கொப்புளி, இலை, பால், வேர் முதலியன யாவும் கிறத்த குணதிசயங்களைக் கொண்டுள்ளவை. தாது புஷ்டிக்கு மட்டுமன்றி உடல், இடுப்பு, முதுகு, முதலிய அவயவங்களின்வலிகளையும் கிவர்த்திப்பதில் இன்றியமையாததாகும். இச்செடியின் வெவ்வேறு பாகங்களின் பிரயோஜனம் அடியில்

வருமாறு:— எவ்வளவு நாள் பட்ட சொரி சிறங்கு எத்த விடத்தி லிருந்த போதிலும் இதன் விதைகளை தண்ணீர் விட்டறைத்து அதன் மேல் களிம்பைப்போல் பூசி வா உடனே குணப்படுத்தும். விதைகளை அறைத்து அத்துடன் ஜலத்தைச் சேர்த்துப் பிசைத்து கடலைப் பரிமாணம் மாத்திரைகள் செய்து வேலை 1க்கு ஒரு மாத் திரை வீதம் காலை, மத்தியானம் மாலை ஆக நாள் 1க்கு 3 தடவை களில் உட்கொள்ள இரத்த சுத்தி ஏற்படும். தூர் கீர் சம்பந்தப் பட்ட சொரி சிறங்கு முதலிய உபாதைகள் யாவும் கிவாரணமாகும். இதன் விதைகளுடன் சமளடை மிளகைச் சேர்த்து ஜலத்தி லறைத்து காய்கடித்தோருக்கு பருகக் கொடுத்தால் உடனே இரண் டொரு தடவை வாத்தி எடுத்து அதன் மூலம் விஷ உணர்ச்சி அற்றுப் போகும். குழந்தைகள் இதன் விதைகளை மெருப்புக்கட்டி களின் மேல் தூவுகிறார்களாகில் பட்டாசைப்போலொத்த சட பட சட பட சத்தம் உண்டாகிறது. இதன் விதைகள் பிரமேகம் நாள் பட்ட சொரி, காயங்கள் இவைகளை ஆற்றுவதில் கிகரற்றகுண முடையவை விதைகளுக்கு சம எடையாக ஹப்புன்னில் சேர்த்து இந்த இரண்டிற்கும் சம அளவில் கற்கண்டைச் சேர்க்கவும். பின்னர் எல்லாம் ஒன்றாக அறைத்துக்கொண்டு வேலை 1க்கு 7 மாஷா ஜலத்துடன் உட்கொள்ள வேண்டும்.

விதைகளுக்குச் சமமான அளவில் கற்கண்டைச் சேர்த்து 7 மாஷா எடை பகம்பாறுடன் சாப்பிட்டு வந்தால் வாத்தி, வயிற் துப்போக்கு இவைகளை கிறுத்தும்; வயிற்று வீக்கம், கணுக்களில் உள்ள வலியைப் போக்கும்.

விதைகளின் தைலம்

விதைகளினின்றும் இரு விதங்களில் எண்ணெய் எடுக்கப்படு கிறது. முதலாவதாக கைதேர்ந்த யாதோரு வானிகரின் சகாயத் தால் இதன் விதைகளை செக்கில் ஆட்டி எண்ணெய் எடுக்கலாம். இரண்டாவது விதம், இதன் விதைகளை பொடியாவிடித்து ஒரு செப்பு பாத்திரத்தில் ஜலத்துடன் போட்டு கன்றாய் பிசைத்த பின்பு அடுப்பிலேற்றி காய்ச்சவும். சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அதன் தைலம் மேலே மிதந்து கொண்டு வரும். அப்போது அதைவழித்து எடுத்துக் கொள்ளலாம். பெரிய சேர் ஒன்றின் எடையுள்ள விதை

களிலிருந்து 5 கஷ்டராக எண்ணெய் வெளியாகதாக அனுபவத் தால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கால்நா கோயலிக்கு இந்த எண்ணெயிலிருந்து நவ்வாறு துளிகள் இரண்டிரண்டு மணி கோத்திற்கு பின் கொடுத்து வர கித்திரை வந்து விடுகிறது.

வாத்தி எடுக்க வேண்டுமென்ற அவசிய மேற்பட்டால் இதே எண்ணெயை சற்று அதிக அளவில் கொடுத்தால் வாத்தி எடுக்கும். வயிற்று வலி, சித்பேதி, இருமல் முதலிய கோய்களுக்கு இது கை கண்ட மருத்து.

சோரி சிறங்கு சூல வாய்வு இவற்றிற்கு இந்த எண்ணெயைத் தேய்க்க கல்ல குணம் செய்யும் காய்ச்சலின் போது ஏற்படும்படி யான ஆறுதலின்மையும் இதன் உபயோகத்தால் கிவர்த்தியாய் விடும். சில நாட்களில் இந்த எண்ணெய் விளக்கெரிக்கவும் உபயோ கப்படுகிறது.

இதன் பூவின் பிரயோஜனங்கள்

பூக்களை கீழலில் உலர்த்தி அவற்றிற்கு சமளடை மூங்கிலுப்பு, சிறிய ஏலக்காய், இலையாவும் ஒன்றாய் அறைத்துக்கொள்ளவும். பூக்களின் அளவிற்கு கால்காவதுபாகம் குங்கமப்பூ. இதை தாளம்பூ எண்ணெயில் அறைத்துக்கொண்டு அவசியமான அளவிற்கு தேனையும் சேர்த்து, கட்டைப் பரிமாணம் மாத்திரைகள் செய்து கொள்ளவும். வேளைக்கு ஒரு மாத்திரை யாக காலை, மத்தியானம், மாலை 3 மாத்திரைகள் உட்கொள்ள எத்த வியாதிக்காக சாப்பிடப் படுகிறதோ அது உடனே சோஸ்தமாய்விடும். தாது புஷ்டி கித்திரைஸ்தலிதம், தாது கெட்டிப்படுதல், வெள்ளைவெட்டை முதலியன குணம்.

இலை கொப்புக்களை

ஒரு தாக்கில் 5 சேர் (பெரியசேர்) எடையுள்ள இலை களை இடித்து உருண்டையாக்கிக்கொண்டபின்னர் அரிதாரம் ஒரு தோலா அதனுள் வைத்து மற்றொருபாக்திரத்தை அதன் மேல் கவிழ்த்துவிடவும். இரண்டு பாத்நிரங்களும் ஒன்றோடொன்று சேரும் படியான ஓங்கலின் மீது மண்ணைப்பிசைத்து ஒட்டி விட்டு 18 மணிரேம் வரையில் அடியில் நெருப்பு தோடர்த்தாம்

போல் எரித்துவரவும். கோம் முடிவுற்றதும் எடுத்துப்பார்க்க சுத்தமான வெள்ளைப்பஸ்பம் அடையப்பெறும்.

இதன் கொப்பை சீவி இறைச்சியில் போட்டு சமைக்கலாம், அதிருகிரமாயிருக்கும்.

இதன் இலைகளின் சாறு கண்களிலு, கண்சிவப்பு, கண் அரிப்பு ஆகிய வற்றிற்கு கல்ல குணம் செய்யும்.

இச்செடியிலிருந்து வெளியரும் மஞ்சள் கிறமான பாலை யெடுத்து காக்கில் தடவி வந்தால் சில நாட்களில் திக்குவாய்க்குறை கிவர்த்தியாய் விடும்.

இதன் பாலை செய்யுடன் சேர்த்து எரித்த பின்னர் கண்ணிமை களில் பூசி வந்தால் கண்மங்கல், சிவப்பு, கண் அரிப்பு இவைகளை கிவர்த்திக்கும்.

இதன் இலைகளின் பாலை தினத்தோறும் 2 அல்லது 4 தோலா அளவிற்கு சாப்பிட்டு வந்தால் பிரமேகம், குஷ்டம் இத்தகைய கோயாளிகளின் கொடிய கோய்களையும் 40 நாட்களில் சொஸ்தப் படுத்திவிடும்.

மிருகங்களின் காயங்கள் பேரிஹம் இதன் இலைகளை இடித்துக் கட்டி வந்தால் சிக்கிரம் காயங்களை ஆற்றி விடும்.

வேரின் குணங்கள்

வேரின் பட்டையை யெடுத்து கீழலில் உலர்த்தி அதற் குச்சரியான எடைபில் சர்க்கறையைச்சேர்த்து தினத்தோறும் 5 அல்லது 7 மாஷா பகம்பாறுடன் சாப்பிட்டு வந்தால் தாது கஷ்ட சம்பந்தமான குறைகள் கிவாரணமாகிவிடும்.

ஆடா தோடை

இது இரண்டு வகைப்படும்; ஒன்று சிவப்பு பூ வைக் கொண்டது. வெள்ளைப்பூச்செடியின் தழைகளின் சாற்றை யெடுத்து வாய் கொப்பளிக்க பல்வலி நீங்கும். இதனை எரித்து சாம்பலாக்கிய பின்னர் அதன் உப்பை யெடுத்து ஒரு ரத்தி உப்பை ½ சேர் ஜலத் தில் கலக்கி சில நாட்கள் குடித்து வந்தால் கடிய ரோகத்தை கண் டித்து விடும் அந்த சத்தில் உப்பையும் கலந்து இருமல் கோ யாலிக்கு கொடுத்துவந்தால் குணமேற்படும். அதன் காயைக்கட்டி குழத்தைகளின் கழுத்தில் தொங்கவிட இருமல் தீரும்.

ஆமணக்கஞ்செடி

இதன் இரண்டு தழைகளைக் கண்டால் காமநிலை உட்கொண்டவர்களுக்குக் கொடுக்க விஷத்திரும். இதன் பருப்பை தயிருடன் அறைத்து சோரி சிரங்கு கோயாவியின் நிரோகத்தில் பூச உபாஸை நீங்கும்.

கொண்ணாச்செடி

இதன் காயின் சத்தை யெடுத்து ஊசவைத்துக்குடித்துவா பேதியாகும். பூஞ்சுனி வைத்திய முறைகளில் மலச்சிக்கலை நீக்கக் கூடிய சாக்குகளில் இதுவும் ஒர் பிரதானசாக்காகும். பால்கட்டும் கர்ப்பஸ்திரிகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இதனால் எத்தகைய தீங்கும் நேராது. இதன் புஷ்பத்தினால் தயாரித்த குலகத்தும் கல்ச பிரயோகனத்தையும், அதாவது மலக்கட்டை நிவர்த்திக்கும். வாயுவு, கபசம்பந்தமான உபாஸைகளை நிவர்த்திக்கும்.

கார்போக் அரிசிச்செடி

இதன் விதைகளை உட்கொள்வதனால் அல்லது அறைத்து மேலுக்குத்தடவிவருவதாலும் வெண்குஷ்டம் கமைச்சல், குஷ்டம் சம்பந்தப்பட்ட குறைகளைப்போக்கும்; மர்மஸ்தானத்தில் உள்ள புண் களையும் ஆற்றக்கூடும்.

சீமை சாமந்தி

சலாசயக்கோளாதுகியப் போக்கு நீரைப்பிரிக்கும். வீக்கத்தின் மேல் பூசுவா அதன் விளைப்பை மிருதுவாக்கும். இதன் வேர் புஷ்பமையத்தரும்.

ஐடாமாசி

இதன் சத்து 3 வரும் கீழ்த்திருக்கும். இது முளைக்கு வலி மைத்தரும், பச்சைக் கொத்தமல்லி சாற்றில் அறைத்து கண்களில் தடவ கண்சுவப்பை மாற்றும்.

முகக்கொட்டை

இதன் வேரின் சத்தில் கத்தகப் பஸ்பத்தை தயாரிக்கிறார்கள். இதன் இலைகள் கபம், பித்தம் இரத்தக்கோளாது, வாயுவு சோரி சம்பந்தமான கோய்களைக்கண்டிக்கும். சாற்றைப்பூச தலைவலி தீரும். சிலர் இதன் சகாயத்தால் ஈயத்தையும் புடம் வைத்தெடுக்கிறார்கள்.

சிறு செறுப்பாடி

இதன் இலைகளின் சாற்றை உட்கொள்ள சிதளத்தின்பேரில் ஏற்படும் இருமல் சிவராணமாகும்; நீர்நிரியாதுருத்தல் சலா, சயத்தி ஊள்ள எரிச்சல் கீங்கும். வீக்கம், செறி கட்டிசுத்தல் ஆகிய வற்றிற்கு இதன் இலைகளை யறைத்து பூசவேண்டும். வேகவைத்துத் தின்பதிலாவும் அல்லது இதன் சாற்றில் மிளகையும் சேர்த்து நறைத்து குடிப்பதாலும் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும்.

கையாந்துரை

இது 3 வகைப்படும்; முறையே வெள்ளை, மஞ்சள், கறுப்பு பூக்களைக் கொண்டது. வெள்ளைப்பூ எங்கும் கிடைக்கிறது. இதன் சாறு புஷ்பமையத் தரும், பார்வைசக்தியை யுண்டு பண்ணும். அதைக் கொண்டு வாய்கொப்பளிக்க பல்வலி தீரும். பிரமேகம், குஷ்டம், கிட்டை இதன் உபயோகத்தால் நிவர்த்தியாகும். கருப்புப் பூவுடையது உரோமங்களையும் கறுப்பாக்கும். இது வெள்ளைப் பூவைக்காட்டியும் அதிக குணமுடையது.

நாயுருவி

இதன் வேரைக் கொண்டு பற்களை விளக்க பற்கள் கெட்டிப்படும். மென்றுவந்தால் தீவிர ஸ்கலிதத்தைக் காக்கும். ஸ்திரீ இதன் கஷாயத்தை பருகினால் கர்ப்பம் தரிக்கும். இதை அறைத்து மார்புகளின் மேல் பூச பால் அதிகரிக்கும், கைகால் எரிச்சலுக்கு இதை அறைத்துப் பூசலாம். வேரின் பஸ்பத்தை தின்பதாலும் பூசுவதாலும் கண்டமால் சிவராணமாகும். வேரை தண்ணீரில் இறைத்து தேன்கொட்டு வாயின் மீது தடவ உபத்திரவம் கீங்கும்.

இதன் வேரை அறைத்து ஸ்திரீயின் உள்ளங்காவில் தடவுவதனால் அல்லது அறைத்த வேரை மிக்கச் சிறிய தோர் முடிச் சாகக்கட்டி மர்மஸ்தான வாயில் வைப்பதாலும் தீவிர பிரசவத்திற்குக் காரணமாகும். இதன் விதைகளின் அரிசி யெடுத்து அவை களினால் பாயாசம் தயாரித்தோ அல்லது அந்த அரிசியை ஒரு பிடிதனியே தின்பதாலோ இந்திரியம் கெட்டிப்படும். ஆனால் இதன் விதைகளை உட்கொள்வோருக்கு சில என் வஸரில் படு ஏற்படாது.

விதைகளை சுங்கானில் வைத்துக் குடிக்க இளைப்பு இருமல் திரும். இலைகளை அறைத்து கட்டியாக வைத்து ஆசன வாயிற் கட்ட மூல உபத்திரவம் தரும். இச்செடியும் இருவகைப் படும். அதாவது, சிவப்பு, வெள்ளைப் பூக்களைக் கொண்டது சிவப்பு பூச் செடி. தென்படுவது அரிது.

துளசி

இதன் இலைகள் இருக்கப்பட்ட இடங்களில் கொசுக்கள் கொளுக்க மாட்டா. விஷ ஜூரமும் வராதெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது இலைகளின் சாற்றினால், வாயின் துர்நாற்றமும், கக்கக் குழியின் வியர்வை நாற்றமும் நீங்கும் இதன் வாசனை மனோ உற்சாகத்தைத் தரத்தக்கதாகும். சிலர் இதன் இலைகளை துலையலாக அறைத்தும் புசிக்கிறார்கள்.

தாளிசபத்திரி

இதன் இலைகளை ஆடைகளில் வைக்க அத்து அரிக்காது, வாயுவைக் கண்டிக்கும், திக்குவாயின் காக்கின் கீழ் இதன் இலையை வைத்து வர சில காலில் குறை நீங்கும்.

வாகை

இது பெயர் பெற்ற விருகமும். இது இரு வகைப் படும்: ஓர் வகையின் காய், மெல்லிய தாயும், கருப்பாய் மிருக்கும். மற்றோர் வகையின் காய், வெண்மையும், பெரிதுமானது. குண மடைத்தோர் தங்கள் அனுபவத்தை பின்வருமாறு வரைந்துள்ளார்கள்:—

இதன் விதைகளை சாதாரண கர்மா கல்லுடன் அறைத்து, கண்ணில் பூசலாம். எவ்வித கண் ரோகத்தையும் கிவர்த்திக்கும். இதன் விதைகளை அறைத்து, அதன் தூளை கொஞ்சங் கொஞ்சமாக முகர்த்தால் தலைவலி நீங்கும். ஓர் கீர் வெளியாகி விடும். இதன் விதையின் பருப்பை 2 மாஷா அளவிற்கு எடுத்து ½ சேர் பாலுடன் சில எட்கள் வரையில் பருகிவர, தாது விர்த்திக்கும், கீத்துப்போன இத்திரியம் கெட்டிப் படும். இதை இறைச்சியுடன் சமைத்து சாப்பிடுவதாலும் அதே குணம் தரும். இதன் விதைகளின் குரணம் மூன்று ரத்தி யளவிற்கு காலே, மாலை 2, 3 நாள் வரையில் சாப்பிட்டுவர இரத்த பேதி கிவராண மாகும்—விதை

வின் குரணத்தில் 2 மடங்கு சேனைச் சேர்த்து அதை கோதுமை மாளில் பிசைத்து உருண்டை செய்து கொண்டு, அதிலிருந்து 1 முதல், 4 மாஷா வரையில், இரவு படுக்கைக்குச் செல்லும் போது சாப்பிட்டு வர, கண்ட பாலையைத் தீர்க்கும்.

இதன் விதைகளின் தைலத்தை முறைப்படி சுத்தமாயும், நெளிவாயும் எடுத்து, அவசியமான நேரத்திற்கு ஒரு மணி முன்னர், உள்ளங் காலில் தேய்த்துவர தினிஸ்கலிதத்தைப் போக்கும்.

இதன் பட்டையை 9 மாஷா அளவில் எடுத்து 6 ஷடானக் கீஸத்தில் கொதிக்க வைக்கவும். ½ வாசி லுலம் சுண்டிப்போன தூம் அதை வடிக்கட்டி குடிக்கவும். இரப்பையின் வீக்கம் மட்டும் அல்லாது முகம் முதலிய அலையங்களின் வீக்கத்தையும் கிவர்த்திக்கும்.

இதன் இலைகளின் சாற்றை புதியதோர் மட்பாத்திரத்தில் போட்டு அதில் இத்துப்பு, படிக்காரம், கமச்சாரம், வெடியுப்பு, சங்கிலிசாரம், இலையாலும் வகைக்கு ½ சேர் அறைத்துப் போட்டு பாத்திரத்தின் வாயை செவ்வனே அடைத்து வைக்கவும். 3 அல்லது, 4 நாட்களுக்குப் பின்னர், அந்த மட்பாத்திரத்திற்கு வெளிப் புறத்தில் வெண்மை கிறமுள்ளதோர் வஸ்து வெளியாகும். அதை ஒரு குச்சியினால் எடுத்தெடுத்து சிறியதோர் சீசாவில் போட்டு அச்சீசாவின் வாய்க்கு காரைகக் கொண்டு அடைத்து விடவும். இல்லாவிடில் இக்க சத்தானது சாற்றப் பட்டால் ஜலசுபமாக மாறி விடும்.

இந்த மருத்து கண் புகைச்சல், கண் பருதா முதலிய உபாபை களைப் போக்க வல்லது. கண்ணில் பூ விழுந்திருக்காலும் அதை கிவர்த்திக்கும்.

இதே சத்தை ஒரு மாஷா அளவில் எடுத்து ஜீனியில் கலந்து அத்துடன் செஞ்சரின் இரண்டு தோலா, சுத்த ஜலம் 10 தோலா வைச் சேர்த்து எல்லாம் ஒரு மிக்க உட்கொள்ள, வயிற்றுக் கட்டி கிவர்த்தியாகும்.

இதன் விதையை ஜலத்தில் அறைத்து தேன் கொட்டு வாயின் மேல் பூச உபாபை உடனே தீரும்.

இதன் இலக்களை சுத்த ஜலத்தில் அறைத்து, நெருப்பால் வெந்துப்போன விடங்களில் பூசுவா, உடனே எரிச்சல் நீங்கும். சில நாட்கள் உபயோகித்துவா காயமும் ஆறியும்.

இதன் விதைகள் 2 தோலா, மிளகு ஒருதோலா இரண்டையும் பொடியாய் அறைத்து பல் தேய்த்துவா பல் கொய்த திரும்.

இதன் பட்டையை என்னுடன் சத்தனம் போல் அறைத்து முகப்பருவுகளின் மேல் பூசுவா குணமேற்படும்.

கர்மாவில் இதன் பூக்களையும் சேர்த்துரைத்து கண்களில் பூசுவா நலிவளி நீங்கும்.

அந்தி மாலிச்சாக, இதன் புதிய இலக்களை மென்று தின்னவா அல்லது இலிச்சாற்றை கண்ணிமைகளில் பூசலாம்.

இலிச்சாற்றின் 2, 4 ஹளிகளை காதில் விட்டுவா கரது மத்தத்தை சிவர்த்திக்கும்.

வெப்பஇலை, மாஇலை, ஆமணக்குஇலை, வாகைஇலை, எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்த்துரைத்து, அறைத்த உடனடியாக காதில் பிழிய காதவளி சிவராணமாகும். மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வந்து கொண்டிருப்பின், இதன் கரும்பட்டையைக் கொண்டு வந்து, அதை கண்ணாய் இடித்து, ஜலத்தில், வேகவைத்து அதைக்கொண்டு காசத் துவாரங்களை கழுவிவா வேண்டும்.

இதன் இலிச்சாற்றில் பஞ்சை உனைத்து, கிழலில் உலர்த்தி, அதை சம்பங்கி எண்ணையில் எரித்து, எரித்தபின்னர், அதே எண்ணையில் கொஞ்சம்போல் கலந்து கண்ணிமைகளில் இட்டு வந்தால் கண்ணிரிப்பு நீங்கும், குன்றிய பார்வைசக்தி அதிகரிக்கும். இதன் பட்டையை எரித்து அதை ஜலத்தில் அறைத்து, அதன் மூலம் எடுத்த உப்பை ஒரு ரத்தியளவிற்கு ஜலத்தில் கலந்து கொடுக்க இருதய சம்பந்தமான சோளாறுகளை சோஸ்தப் படுத்தும்.

வா லுஞ்ஞைச் செடி

இதன் வித்து மூளைக்கு வலுவைத்தரும். உபயோகத்தால் ஞாபகசக்தி அதிகரிக்கும். தாது விர்த்திக்கும். இரப்பைக்கு வலுவைத் தரும். பக்கவளி, கணுவளி, பட்சவாதம், வாதம், உப சம்பந்தப்பட்ட கோய்களை சிவர்த்திக்கும். இதன் எண்ணெய்

கொஞ்சம் போலேடுத்து உள்ளங்கையில் தேய்த்துவா கண்ணளி அதிகரிக்கும். ஆண்குறியிது தடவிவா, கரம்புகளுக்கு முயல் தேற்றும். சகல வலிகளுக்கும் விசேஷ சஞ்சிவி.

மனத்தக்காளி

இச்செடியின் அதிக உயரம் ஒருகஜத்திற்கு எட்டும். சிரங்கு கட்டிகளை பழுக்கவைத்து அவற்றின் உள்ளி உள்ள அருசியங்களைக் கொண்டுவருவதில் இது இன்றியமையாததாகும். தாகத்தை தணிக்கும் குடலை சுத்தப்படுத்தி இரப்பையில் உள்ள எரிச்சலைப் போக்கும். தொண்டைவலி, கண்டமலை, இவற்றிற்கு இதன் சாற்றை எடுத்து வாய்க் கொப்பளிக்க வேண்டும்.

கொட்டை கரத்தைச்செடி

இச்செடியில் பூ பூத்து காய்ப்பதற்கு முன்னர், அதிகாலையில் இதை வேருடன் பிடுங்கிக் கொண்டுவந்து கிழலில் உலர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்பால் அதை சுத்தமாக எடுத்தறைத்து அத்துடன் மெய், சர்க்கரை, கோதுமை மாவை பிசைத்து புசிக்க யௌவனப் பருவம் கீடித்திருக்கும். உரோமங்களும் கறுப்பாகவே இருந்துவரும்.

சில வைத்திய கிபுணர்களின் அபிப்பிராயம் அடியில் வருமாறு:—

இச்செடி பூத்து காய்க்கும் வரையில் இதில் ஓர் விசேஷசக்தி கிலிகொண்டுள்ளது. அதாவது:— இதன்வேரை இடித்து ஓர்வருஷம் வரையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு வந்தால் அளவிறந்த கண்மைகளை யடையலாம். இதன்காயை தனியே தண்ணீர் சகாய மன்றி கிழங்கிக்கொள்ள அடுத்த வருஷம் வரையில் எவ்வித கண் ரோகமும் அதுவாகாது.

உள்ளங்கைகளை சம்பங்கி எண்ணையில் உனைத்த பின்னர் இடித்த வேரை கைகளினால் பிசைத்து அதன் எதலத்தை எடுக்க வேண்டிய முறைப்படி எடுத்து, ஒருமாஷா அளவுக்கு தார்பூலத்தில் வைத்தருத்த விபரிதசக்தி யுண்டாகும் இரத்தத்தை சுத்தஞ் செய் வதிலும், தாதுபுஷ்டி உண்டாக்கு வதிலும் இதோர் அருமையான மூலிகையாகும்.

வெந்தயக் கீரை

இது இடுப்புவி, மர்மஸ்தானவி, சலாசயத்திலுள்ள ருளிச்சியை நீக்கும். மாதவிடாவை தடை படுத்தாது; வாய்வைக் கண்டிக்கும். வாதம், பகலவாதம், காம்பு தளர்ச்சி, மூட்டுவெலி கீங்கும்.

காட்டு வெங்காயம்

இதன்வெரில் வெங்காயத்தை போலொத்த முடிச்சுகள் உண்டு. இது தாதுவை விர்த்திக்கும். இரப்பையையும் மர்ம ஸ்தானத்தை யும் சுத்திசெய்யும். வெள்ளி, கால், செத்துரம், இவைகளை இம் முனிகையினால் அருகூர் சுத்தி செய்கிறார்கள்.

கீர்ப்பிளரிஸம், ஜலதோஷம், ஆகியவற்றின் சிகிச்சைக்காகவும் சிலர் இம்முனிகையை உபயோகப் படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள்.

தும்பல் பூண்டு

இதுவே கக்கிங்கீ எனப்படுவது. இதன் ஒருவழைப்பு வேண்மையையும் மறநேர் வகையில் வெள்ளைக் கருப்பு கலத்ததாயும் பூக்கும். இதன் இலைகளை சற்று கசக்கி முகா, தும்பல்வரும். குடலேற்றம் ஏற்பட்டவர்களுக்கு இதன் இலையை ஒரு மாஷா அளவில் கசக்கி கொஞ்சம் பனைவெல்லத்துடன் கலந்து உட் கொள்ளச் செய்தால், ஏறினகுடல் அதற்குரிய விடத்தில் வந்து விடும். இதன் எண்ணை வாயுவைக் கண்டிக்கும்; படை, செரி, ஆகியவற்றை நிவர்த்திக்கும். சக்கியாகிகள், இதை பலவாறு உபயோகப் படுத்துகிறார்கள்.

தேள் கொடுக்கி

இதன் சிறுசிறு வெள்ளைப் பூக்கள் அரை அல்லது ஒரு அங்குலத்திற்கு வளைந்த வடிவமாய் பூத்திருக்கும். அதாவது:— யானையின் தும்பிக்கையைப் போலொத்த வளைவு கொண்டதாகும். அதனாலேயே இது விரத்தி ருண்டி என்னும் பெயரால் வழங்கப் படுகிறது.

சொங்கு கட்டி அல்லது அளவிறந்த வீக்கம் உண்டான விடம் களில் இதன் இலைகளை கசக்கி உருண்டையாக வைத்துக்கட்டி, கிச்சம் வரவும்; சிறங்கு உடைத்துவிடும்.

வெறியை கடித்தேற்றுக்கு உடனே 5 தோலா எடையுள்ள இலைகளை இரண்டுமின்குளுடன் சேர்த்ததைத்து குடிப்பாட்டவும். 3 நாள் சேர்த்தாற்போல் குடிப்பாட்ட, மலவிர்த்தியும் வரத்தியும், உண்டாகி அவற்றின் மூலம் மலம் நிவர்த்தியாய்விடும். இதை இலைச்சாற்றில் இரும்பு அல்லது எஃகு துளை வளவைத்ததைத்து மட்கலய மொன்றில் போட்டு, சீலை மண் செய்து, விரட்டிப்பூடம் வைத்தெடுக்க உயரிய பஸ்பமாய் விடும். இது ஒரு ரத்தியளவில், எடுத்து 5 தோலா எடைஉள்ள பசுவெண்ணையில் கலந்து உட் கொள்ள சரீரத்தில் எதிர்பாராத சக்தி ஏற்படுவிடும்.

ஏழு புடங்களில் வெள்ளி பஸ்பமும், இதிலிருந்து சிறத்தவாறு தயாரிக்கிறார்கள்.

குதிரைக் குளம்பு இலை

இதன் இலையை ஜலத்துடன் கடைத்து பருக தாதுவிர்த்திக் கும்; தாது ஷ்டம், பலஹீனம் கீங்கும். பார்வை சக்திக்கு ஈந் பிரயோசனமளிக்கும். இதிலிருந்து ரஸபஸ்பத்தையும் செய்கிறார்கள்.

தல்லவேளை

இதோர் அரியமுனிகை குணத்தில் குடும் வறட்சியும் கொண் டது. இலைகளின் சாற்றாக கால்களை அலம்ப மூலவியாதியை குணப் படுத்தும். சாறு காதில் பிழிய காதுகளி தீரும்.

பூனாணி வைத்திய முறைகள் முற்றிற்று.



பூனனி வைத்திய முறைகள்.

அட்டவணை.

(இதில் குறிக்கப்பட்ட எண்கள் பக்கங்களைக் குறிக்கின்றன)

அக்ரோட்	255	உரோமங்களை கருப்பாக்கும்	171
அடிப்பட்ட கோய்களுக்கு	142	உள்ளங்கையில் தேரல்	
அதிக சம்போகம்	253	உரிதல், தடித்தல்	133
அத்திமாலை	13, 256	உஸ்தகுத்துஸ்	248
அபாபில	253	எட்டிக்கொட்டை உட	
அபினி பழக்கத்தை அகற்ற	257	கொள்ளும் விதம்	31
அம்மைக்குறிய சிகிச்சை	170	எப்பொழுது தண்ணீர்	
அரிசி திப்பிலி	251	குடித்தல் கூடாது?	253
அரை தலைவலி	1, 2, 7	எரிச்சலுக்கு	153
அவயவங்களில் உண்டாகும் வலி		எருக்கஞ்செடி	259
கதிக்கம், வாதம் முதலியவை		எலிக்கடிக்கு	230
களுக்கு	31	எலிப்புழுக்கை	255
அன்னாசிபழத்தின் ஷர்புத்து	37	எலுமிச்சம் ஷர்பத்	177
ஆகாரம் ஜீரணம் ஆக	41	என்றா	254
ஆடாதொடை	267	ஒமட்டலை நீக்க	52
ஆமணக்கஞ் செடி	268	ஒமம் ஜவாரிஷ்	40
ஆமையின் பித்தம்	255	ஒரிலைத்தாமரை	262
இஞ்சி ஜவாரிஷ்	39	கக்கத்தின் எற்றத்திற்கு	147
இடுப்பு வலிக்கு	29, 226	கட்டியை பழுக்கவைக்க	139
இதீபல் கபீர்	41	கண்ணிவப்புக்கும் எரிச்ச	
இதீபல் கஷ்னீஸி	5	லுக்கும்	13
இரத்த பேதிக்கு	59, 60	கண்டமாலை	115
இருமல்	23, 119	கண்டோய்	11
இரைப்பை கோய்களுக்கு	38, 44	கண்பார்வை சக்தி	13
களை இருமல்	124	கண்புழுக்கல்	13
கறுகளில் சிழுவருதல்	23	கத்தகத்தையம்	130
கறுவிக்கம்	21, 23	கபம் நிவர்த்தி	30
உரோமங்கள் கொட்டிப்		கபஜூரத்திற்கு	180
போனல்	172	கரிய போனம்	254

பூனனி வைத்திய முறைகள் அட்டவணை 277

கருஞ்சீரகம் ஜவாரிஷ்	41	குழந்தைகளின் வயிற்றைப் போக்	
கரும்பேறுக்கு	136	சிந்து	54
கர்ப்பம் தரிக்க	200	குழந்தை களுக்கு பச்சை சித்	
கர்ப்பம் தரிக்காதிருக்க	203	மாய் வெனிக்குப் போவது	58
கலைமான்கொம்பு	256	குழந்தைகள் தூக்கத்தில் பயப்	
கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட கோய்	115	படா திருக்க	247
கண்களா	253	குளனி விஷத்திற்கு	228
கஸ்தூரி	256	குன்றிப் போனகளை போனவைக்கு	11
காச சம்பந்தப்பட்ட கோய்	118	குடித்திற்கு	156, 191
காட்டு வெங்காயம்	274	கை, கால் வெடிப்பிற்கு	153,
காதில் கிருமி நீக்க	18	160, 164	
காதில் பூச்சினிழுவதுக்கு	16	கையாத்துரை	269
காதுக்குள் விருத்து புணர் சிழ்		கொசு உபத்திரவத்திற்கு	231
வருதல்	16	கொட்டை கரத்தைச் செடி	273
காது கோய்	15, 254	கொண்டை கடலை	256
காது மந்தம்	16	கொத்தமல்லிக் கஷாயம்	38
காயங்களை ஆற்ற ரணக் களிம்பு	155	கொன்றைச் செடி	268
காய்ச்சல்	176	கனி	6
காச போசு அரிசி செடி	268	சமுத்திர துரை	249
காவுஜபான் ஷர்பத்	36	சம்போகம்	250
காஜர் முரபா	252	சரீரசம்மந்தப் பட்ட கோய்	27,
கிருகிருப்புக்கு	4	145, 166	
குங்குமப்பு	253	சரீரத்தைத் தடிப்பாக்க	145
குடலை மிருது வாக்கும்	42	சரீரத்தை மெல்லிய தாக்க	146
குடல் வேக்காட்டிற்கு	56	சலாசய கோய்க்கு	224
குதிரை குளம்பு இலை	275	சல்லாத்து விதை	253
குமட்டிகாயின் குணங்கள்	263	சவுக்கு	249
குமட்டி ஷர்பத்	232	சாம்பிராணி ஜவாரிஷ்	40
குரங்குக் கடிக்கு	231	சித்தரத்தை ஜவாரிஷ்	40
குழந்தைகளின் பக்க குளவனி	245	சிரங்கிற்கு	125, 130, 137, 138
களுக்கு	245	சிது ஏலக் காய்	252
குழந்தைகளின் கிருமி உபத்திர	173	சிது செருப்படி	269
வத்திற்கு	173	சிது கறுவனி	250
குழந்தைகளின் கவாச கோய்க்கு	28	சிதுவர் வயிற்று சிக்கல் நீக்க	167

சிறத்தினுள் உண்டாகு வலிக்கு	56	தாது சம்மந்தப்பட்ட கோய்	61
சிறப்பேடு	53	தாது ஷ்டம்	61, 247
சிறை நேகத் தோரின் வெட்டை		தாது ஷ்டத்தால் ஏற்படும்	
கோய்திர	89	காமனை சோர்வுக்கு	70, 72
சிறைம், வலிவளை கிவர்த்திக	30	தாது புஷ்டிக்கு	65, 67, 69, 71
சிறை சாய்த்தி	268	தாது புஷ்டிக்கு குரணம்	61, 67
சுருபேதி மருந்து	166, 169	தாது விர்த்திக்கு	64
சுக்கு	250	தாதுவைக் கெட்டிப்படுத்து	
சுரு ஷ்டலம்	224	மாத்திரை	62, 64
சிறிக்கு ஜவாரிஷ்	39	தாமரை ஷர்பத்	172
சுர்மா மருந்து	12	தாய்க்குப் பாலை குறைக்க	48
சுலாச காசம்	118	தாய்க்குப் பால் அதிகரிக்க	47
சுருக்கிற்கு	143	தானிச பத்திரி	270
சுருக்கக் காலங்களில் ஏற்படும்		தித்திப்பு மாதுளை	250
வலிக்கு	216	திபட்டு வெந்து போனால்	141
சுருக்கத்தடை கிவர்த்தி	216	தடை சிறந்திற்கு	137
சுருத்து சிலாவரை	251	தடை வலி	218
சுருத்து சிலாவரையின் மாந்		தும்பலுக்கு	10
நினைகள்	42	தும்மல் பூண்டு	274
சுருக்கட்டு	228	தூர்வாழ் முள்ள புண்	
சேவலின் சிறகு	247	தூங்கு	161
சொரி, கொடுக்கிறகு	125, 130	தூவசி	270
சோமபு	254	தூண்டூற்றுப் பச்சை	248
சோர்வுக்கு சிகிச்சை	144	தூண்டூற்று பச்சை தைலம்	223
தண்ணீர்விட்டால் கிழங்கு	253	தேமலுக்கு	136
தப்புளாப்பழம்	248	தேன் கடிக்கு	99, 227
தலை இல்லாக் குருளி	253	தேன் கொடிக்கி	274
தலை காயம், கொப்புளம்		தொண்டைக் கம்மலை கீக்	
திரங்கு புண்ணுக்கு	3	கும்	117
தலை மயக்கம்	4	தொரு இலை	248
தலையில் பேன் நீங்க	164	தோல் சம்மந்தப்பட்ட கோய்	125, 147
தலைவலிக்கு	5, 252, 254	தோல் வெடிப்பிற்கு	133
தலைவலிக்கு கஷாயம்	8	ககோகம்	133
தலைவலிக்கு குரணம்	8	கக்கினி (தும்மல் பூண்டு)	249
தாதுத்தா ஷ்டக்க	52	கக்கினி பாகம்	49

கடுக்கு ஜூரத்திற்கு	173	பாங்கிப்பட்டை தைலம்	213
காமபுசுக்கு சக்தி யுண்டு		பருத்திப் பூவின் ஷர்பத்	36
காமபுசு	35	பல் ஆடுவதைக் கெட்டிப்	
காமபு சிலந்திக்கு	189	படுத்தல்	20
கல்ல கோலை	275	பல் இரத்தம்	19
காகப்பழம் ஷர்பத்	54	பல் கோய்	19
காக்கு பூச்சிகளுக்கு	175	பல் பூச்சி கீக்கல்	20
காயுருவி	269	பருக்கப் போட்ட இருப்பை	
கீத்திரை வாரிடுக்க	5	ஜலத்தில் போடுதல்	253
கீத்திரை வருவதற்கு	5	பழமனை கருக் அல்லது சுபேத்	249
கீலவேம்பு	248	பாம்பு கடிக்கு	99, 104, 227
கீர் தடைப்பட்டுப் போனால்		பால்களின் தாகவாட்சிக்கு	52
கிரிக்க	38	பால்களுக்கு பல் முனைக்கும்	
கீரில் இரத்தம் வருவதற்கு	38	போது வெனிக்குப் போவ	
கீரிழிவு கோகத்திற்கு	86, 87	தற்கு	57, 58
கீர் பீனிசம்	8, 123	பாலர்விக்கலுக்கு	47
கீர்பீனிச தலைவலிக்கு பந்து	6	பித்த ஜூரத்திற்கு	176, 187
கெஞ்சு வலி	27	பிசுவத்திற்கு பின் ஏற்படும்	
கெருப்புப்பட்டு வெந்து போ		வலி கிவர்த்தி	210
கூள்	141	பிசுவத்தின் விஷயங்கள்	207
கெல்லிக்காய் முறை	53	பிசுவேகத்திற்கு பேதி மருந்து	231
கெல்லிக்காய் ஜவாரிஷ்	40	பிசுவேக சிவாரணி	233
கெல்லிக்காய் ஷர்பத்	54	பிலின் (கோத்து) சுர்மா	250
கெல்லி முரபா	249	புகையிலை தைலம்	223
கேர்வாள சுத்தி	168	புண்ணுக்கு	161
பங்காவை வெள்ளை கிழமாக்க		பூசனிக்காய் மாவுடன்	65
பசிக்காக குரணம்	44, 49	பூலாங்கிழங்கு ஜவாரிஷ்	53
பசி யெடுக்க	41, 43, 45,	பூனைக்காசி கவிம்பு	162
பசுவின் சாணம்	252	பெருங்காயம்	255
பதார்த்தங்களின் குணங் கள்	247	பேன் கீங்க	164
பத்தியம் எப்பொழுது உடாது	250	பொதின ஜவாரிஷ்	41
பாங்கி சாம்பிராணி ஜவாரிஷ்	40	போளம் பிலிக்கள்	130
		மச்சங்களுக்கு	134
		மஞ்சள்	254

மதன கசுத்த லேப்	62	மூலக்கு வலிவை	2
மர்மஸ்தான புணாறுக்கு	156	மூலக்கு வலுவை தாத்தக்க	
மர்மஸ்தான விரிவை ஒடுக்க	210	மூலக்கு வலுவை	6
மருதோன்	254	மூலையின் பாதுகாப்பு	249
மலச் சிக்கலை நீக்கும்	42, 166	மொச்சை	249
மலதி ஆணியா, பெண்ணியா	206	மாரூடன் சம்போகம் கடாது	251
மலபக்த சிவராணி	50	குமி சோம்பு	252
மலப்போக்கை சிறுத்த	65	குமி சோம்பு லவாரிஷ்	41
மல்லி	254	கோகனேசுல் செய்யும் முறை	11
மறதி	2, 4,	கோஜா குல்கத்து	51
மறதிக்கு மாஜுலினை குத்தர்	13	ஸவங்கப் பட்டை	251
மனச் சோர்வுக்கு	38	வசகாவி	251
மனத்தக்காவி	273	வண்டிகடி	198
மனக் கடிப்புக்கு	36,	வயிற்றின் வாயுவை நீக்கும்	43
மனித எதும்பு	248	வயிற்றுக்கட்டி	27, 28, 30
மாசிக்காய்	251	வயிற்றுக் கோனாறுக்கு குணம்	43
மாதர்கவின் மர்மஸ்தான விரிவை	210	வயிற்றுக் கோனாறுக்கு மாத	
ஒடுக்க	248	கிராகன்	42
மாதுளைத் தோல்	68	வயிற்றுப்புசம் நீங்கும்	45
மாம்பழ ஹல்வா	48	வயிற்றுப் பூச்சி, சிறுமிகளுக்கு	173
மார்பு தளராதிருக்க	13	வயிற்று வலிக்கு பூச்சு	49
மாஜுலினை குத்தர்	13	வலி வீக்கத்திற்கு	139 141
முகத்தில் தோண்டும் கருத்தே	136	வாகை	270
மதுக்கு	135	வாதத்தால் வாய் கோணிய்	34
முகப்பருவுகளுக்கு	141	போவதற்கு	33, 35
முகவீக்கத்திற்கு	27, 218	வாதத்தைக் கேட்கும்	51
முதுகு வலி	250	வாத்தி பேதி	45
முன்னங்கி	185 187	வாயு, அஜீரணம் சிவர்த்தி	30, 31
முறைக் காய்ச்சலுக்கு	10	வாயு சிவர்த்தி	27, 145
மூக்கின் துர்நாற்றத்திற்கு	11	வாயுவை, வாதம்	222
மூக்கின் வாட்சிக்கு	5	வாயுவை, வாதம்	32, 33,
மூக்கு இரத்தத்திற்கு	268	வாயுவை வளங்கண்டிக்கும்	35
மூக்கொட்டை	32		
மூச்சு சிடிப்பு	106		
மூலத்திற்கு			

ம் காற்றத்தை போக்க	19	வெந்துபோன காயங்களுக்கு	141
வர்க்கமினகு ஐவாரிஷ்	39	வெள்ளியப் பூண்டு	252
வாறுவனவைச் செடி	272	வெள்ளியப் பூண்டு மாஜுலின்	66
வாறுவனவை மாஜுலின்	65	வெள்ளிய வெட்டைக்கு	89
விக்கலுக்கு	46	வெள்ளிய கடிக்கு	229
வியர்வைக்கு	148	வெற்றிலைச்சா	50
வியர்வை காற்றத்தை போக்க	147	வெற்றிலை ஷர்பத்	37
விவரகளின் மேல் உண்டாகும்	86	வேக்குறுவுக்கு	162
காயங்களுக்கு	85	வேப்ப மரம்	257
விரை வாய்வுக்கு	86	வெளவால்	255
விரை வீக்கத்திற்கு	27	வெளவால் தைலம்	223
விலாபக்க வலி	57	ஜடாமாசி	268
வில்வ பழத்தின் கஷாயம்	57	ஜடாமாசி ஷர்பத்	50
வில்வ பழத்தின் ஷர்பத்	57	ஜலகோஷத்திற்கு	2, 5, 8
விஷக் கடுகளுக்கு	99, 198, 231	ஜாதிபத்திரி	256
விஷம் அருக்தியவனுக்கு	98	ஜீரணசக்தியை உண்டாக்கும்	42, 43
வெங்காய மாஜுலின்	66	ஜூரத்திற்கு	176
வெங்காய மாத்திரை	42	ஸக்தியாகாசி	264
வெடிப்பிற்கு	153	ஸப்ஜா	248
வெட்டிவேர்	256	ஸப்ஜா	248
வெட்டிவேர் பாகம்	38	ஸ்கலிதத்துக்கு மாஜுலின்	66
வெட்டை கோய்க்கு	91, 97	ஸ்கலிதத்தை தடுக்க	83, 84
வெண் சிட்டை, வெண் குஷ்டம்	194	ஸ்கலித மாவதற்கு	62
வெண்ணெய்	256	ஸேப்	248
வெந்தயக் கோ	274		

பூனாணி வைத்திய முறைகள் அட்டவணை முற்றிற்று.



அளவு விளக்கம்.

தமிழ் கவியியல்:—

இப்புத்தகத்தின் மருத்து பாக்களில் உள்ள கிதை, அளவு
வரவும் பூனாவிப்பதங்களில் உள்ளவாதே வரையப் பட்டுள்ளன.
அவற்றின் விளக்கம் அடியில் வருமாறு:—

8 கலகலா எடை	=	1 அரிசி எடை
8 அரிசி எடை	=	1 ரத்தி
8 ரத்தி	=	1 மாஷா
12 மாஷா	=	1 தேலா
1 திரம்	=	3 மாஷா, 4 ரத்தி
1 தகம்	=	1 தேலா, 8 மாஷா
1 திர்த்தம்	=	8 வரத் கோதுமை
1 மிஸ்கால்	=	3 மாஷா, 4 ரத்தி
1 கைபரான்	=	5 தேலா
1 டரன்	=	4 மாஷா
1 பஹலேலி	=	14 மாஷா
1 ரத்தல்	=	23 தேலா 4½ மாஷா
1 சேர்ஷாஹி	=	21 மாஷா

